

Est 117


R. 3
3/13

M. 2 - 798

Don't believe that is your letter
from La. Bayou, La.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



1188960

IO. BAPTISTAE BENEDICTI

Patritij Veneti Philolophi,

DE GNOMONVM
VMBRARVMQ. SOLARIVM VSV


Liber.

AD SERFNIS. EMAN. PHILIBERT.

ALLOER. ET SVBALPIN.

Ducem Inuictis.

*Nunc primum publica utilitati, Studiosorumq.
commoditati in lucem editus.*



AVGVSTAE TAURINORVM.

Apud haredes Nicolai Beulaque.

M D LXXIII.

*Del catalogo del Arzobispo de Com. de ... de
Sevilla. de Cab. de ... 1819.*





AD INVICTISS. EMAN. PHILIBERTVM Allobrogum & Subalpinorum Ducem &c.

IO. BAPT. BENEDICTVS.



HELLVS noster de re Cnemonica Dux Sereniss.
quem superioribus annis composui iam tandem in lu-
cem emerſi. Et id quidem te uolente, atque iubente,
qui ut es animo in aduerſis intrepidus, Et in obeundis
principatus muneribus conſtantiſſimo, ita in diſci-
plinis comparandis ingenio polles acutiſſimo, Et
quas ipſe optimas cenſes, inter homines quamprimis diſſeminari deſi-
derio flagras ac deniſſimo. Vt qui probi noſtri quam ſi indignus imperio
quicunque caeteris non praeſtat ſapientia, Et non aſtudet Republica
commodis inuigilat. Atque compertum habes quam ſi diſſicile cum va-
rias gentes Et populos bene regere, qui praecipue à Mathematicis abor-
reat documentis: In quibus ueritatis intelligibilium neſtigia re ſurgunt,
Et ordo ille mirabilis atque exactiſſima meſſura comprehenduntur,
quibus tota mundi machina gubernatur, omnium naturae perſe-
tua rerum commutatio pulcherrimas imprimis formas, Et harmoniam
diuina mentes ſuauiſſima rerum multiplicium contemplatione mirum
immodum recreantur. Vnde prudenſiſſimus Joſephus cenſus langari-
tè uenendi ſpacia Antiquis illis hebrais Deum optimum maximum con-
damauiſſe, Et latiffima imperia detuliſſe, propter Aſtrogiam, Et Geo-
metricam quas ingiter perſeuerabantur. Et platonem diuinum legimus
Archita Endaxag, ſuccenſuſſe, quòd Geometria bonum perderent, qua
ſibi aeternas Et incorporeas mundicat ſubſtantias, in quibus ueſt ipſe
Deus. Et eundem abibi ſcitiffimè pronunſiauiſſe Deum maxime Geo-
metria intendere, coq, ueluti unico inſtrumento uniuerſum orbem mode-
rari. Atque Licurgum de bene conſtituenda Republica diſerentem do-
cuſſe, Arithmeticam qua aequalia tantum numero diſtribueret De-

mocraticam Republicæ formam præ se ferre, Geometriam uerò (qua secundum sapientissimum Philonem initium omnium, & cæterarum scientiarum metropolis existit) legitimo regno congruere. Vt qua ratione, ac pro dignitate nil temere permiscendo, bonorum malorumq; sit utrius discretio, quam inuisitam nauicupamus, cumq; qui bene hanc nouerit optime indicaturum quam præset inustum potius quam aequalem esse, quod plerique aboqui boni, minime uide legunt. Tu dum Læcinium Imperatorem sordidissimum imperitia conceptaculum detestaris, impurissima Agripina consilia damnas & quotquot asseruerunt nihil minus debere Imperatores quam philosophia incumbere, Augusti Traiani Marci exemplis didicisti, non esse studij aptius quicquam ad confirmandam potentiam. Et excessiua concepti nihil dignius esse uiro Principe, quam cum multum posuit, uelle etiam multum prodesse mortaliibus, & de orbe uniuerso bene mereri. Sic enim latissimum propagatur Imperium sic a quis spargat in populos qua meliores homines reddant, & bonos quosque ac sapientes sibi deuinciat. Et ac tu ratione maximo superasti reges, quod cum cæteris careas uicij sordidum maxime carere inuidia luore, & candidissima liberalitate conspicuus Alexandrum nicij Macedonem. Is enim cum phisicis auduisset lectiones ab Aristotele, & postea intellexisset enulgatas fuisse, indignibundus successit præceptor, quod eo facto non permisisset regem plus cæteris scire, usque adeo inuidens mortaliibus disciplina bonum, ut gloriosum sibi existimaret si secum sepeliretur. Tu uerò dum populos tuos regis & maioræ tractas negotia, tanto ordine singula disponis, ut semper tibi supersit tempus quod studij liberalibus impartiaris, & qua didicisti quasi non tibi assumpseris sed cæteris prouideris, ubi incunditas atque utilitatem disciplinarum percepisti, nihil habes antiquius quam curare, ut quam primum ad alios non modo qui tua subsunt ditiori, sed externos quosque transferantur. & omnium animi tua ope ad uirtutis gloriam erigantur. Cum igitur ex nobis inter cætera audire uolueris de umbrarum usu, & quam certissima methodo antiquorum, & neotericorum, profugatis erroribus per exigui gnomonis rellationem totus orbis sitis & fulgentissimi sideris semita deprehendatur: & in angusta pariete perpetua describantur temporum distincta curricula, ut ueluti in speculo sa-

cili

cile quam quisque labescens em u' dere possit aetatem, & redeuntem ad
 noua germina considerare naturam, & quando ad nitam necessaria
 comparanda, aut qua ad Reipublica regimen pertinent sint peragen-
 da cognoscere. Neg tamen satis audiuisse sufficeret, scriptis etiam
 in scriptis excipis in edam chartis per Ludouicum Nasium tibi à secretis,
 & biblioteca refertissima custodem, ac pingendarum literarum arte
 conspicuum. Cumq; lecta indices placere magis, & digna iudican-
 ris qua ab omnibus perdiscerentur, pro tuis animi magnitudine ne tanto
 tui seculi praeclara ingenia commodo fraudarentur, & semper sitibunda
 posteritas uersaretur in tenebris, à nobis imprimenda committi deside-
 rasti, fecistiq; ut hoc gnomonicum uolumen, ueluti impluuium uolu-
 erem, e nido in quo nostros partus fouemus emiserim. Prodiit igitur te à
 spere & nunc sic Deo annuente in tua celsitudinis conspectum feliciter
 peruenit. dum fortissimus Rex Polonia Gallus, nepos tuus, ab ex-remis
 Sarmatia sedibus, ad galliarum autum regnum capefcendum per Ger-
 maniam atque Italianam contendens apud te, longo de seffus itinere, que-
 scit: tuo & Serenissima coningis suauissimo conspectu fruatur, & pru-
 dentissimis consilijs recreatur, ut ceteris tuis gaudijs hoc accedat ani-
 mi oblectamentum. Erunt autem nunc partes tuae, auctoritate tuae, &
 conitansissimo fouere praesidio libellum hunc, qui morsibus nunc detra-
 ctorum obiectus, te solum habebit protectorem, quem unicum sibi antbor
 delegit mecenatem & dominum. Ego interea dabo operam ut meliora
 in dies tuo nomini consecrata, ex qualicunq; nostra prodeant officina
 qua simul aliud animi saltem mei propensionem erga tuam celsitudinem
 non obscure indicabunt. Vale Principum optime quem dum nobis, &
 Christiana Reipublica Deus omnipotens seruet incolumen.

Ad Lectorem.



Vicinusque se hominem esse intelligit, mentes subicit divina atque ingenio
traditum animal, quod sua voluntate omnibus nostris elementis, per opera
da quaeq; penetrare, ceterum sua subicere speculativa parte. Et quasi
mortalis Deus quidam ratione humanitatem artifex utitur, mirabili po-
tenti industriae temporis lapsus fillere, et omnino superari uti quisquis
curiam. Et facti talis se fuisse gloriosus oportet, atque dei operam, ut omnino inter homi-
nes non esse solatione relinquat: ne sibi sua vita, solus ipse sit contentus, quoniam de natura esse
quasi de non quid nemini communitatem inter eruditissimos acies animi curibus detestatur.
Ad autem praestare non alia melius ratione potest, quam si quidam maiorem beneficium ac-
cepit magis rependat pollentis, accipit vero unusquisque ab alijs maxime disciplinas, quae
vera sunt humanarum mentium pabula, cum nihil natura magis vultis impresserit om-
nis quam sciendi cupiditatem. Haec ergo ut scias quae est quaeque ingenio per antiquorum
traditiones, non si posse aliquid eis incrementis addere, et sollicitudinis curibus anspicijs persi-
llentes reddere, non debet hoc politeris invidere, sunt enim propriae hae humanitatis officina,
benefactoribus gratias habere, et de omnibus bene mereri, quibus neglectis ne hominem
quidem esse liceat. si quo autem sunt disciplinae quae speculativae existunt, et tractationis
incumbunt, aut usus utilitate praestent, haec profecto sunt mathematicae, per quas et divi-
nas operationes intelligimus, et praestantissimum rerum operam emulamus, dum sint il-
le naturalium nos artificialium rerum auctores efficiuntur. Harum utique adeo studia homi-
nibus conveniunt, ut vel ex his homines ipsi an verè sint dignoscantur. Unde Aristoteles Cyre-
naeus ex philosopho in Rhodiarum litas excessus, ab imbecillitate videt in pulvere figuras,
quidem gaudens profuisse fertur, quod in Syria hominum cognovisset inter mala motus
autem fixitatis illam valde excellere nemo sane ventis nega verit, quae ea totum amplitudi-
nem, et supernum luminum firmatas indagatur, et ipsarum subiectum astrorum series
affertur examinet, quod quidem per hanc immensos illos impudens glabris parva men-
te comprehendimus, et mirabili ordine rapidis orbium motibus, et simul contra sponta-
neis motus cognoscimus, unde tanta rerum resolu et convenientia, et mirabilis eo magis,
quae ductus consideratur. Per hanc illius principis siderum pulchritudinem intuemur, qui
sunt luminis, et coloris, naturae partem, et generationis auctor, hanc totam mundum in bi-
nario suis radijs illustrat, et omnes spectes sua virtute conservat. Huius momenta observa-
tione qui tempora distinguunt, et vitam operat utiqueque nostras exactissima dirigat regula.
Atque ut universi methodos, praeterita quoque nos removere sunt futura praemonstrat, et
praesentia profertur in modum: unde quid appetendum, quid vitandum sit, et quando
aut quomodo, aut quomodo modo aliquid tentandum, certissimis cognoscimus indicibus. Huius
autem facti fulgura atque orbis moderatores per vultus caeli ambitus a nobis super te-
rrenam orbitam, inaequales tamen arcus distribuitum supra nostrum hemisphaerium, hanc
aliam sicut nos vestigia grata conspiciuntur, et lucis ac tenebrarum species noscuntur, quae in
mundum

remittitur per quatuor differentias, quae velle nos adoptatas rationes perducit. Primi
sunt horum ergo speculativa cum ego non habere tale ingenium, aut certum contentendum
operam dedit mi, videret quod nonnulla (habet enim quatuor) cooperasset, quae in condi-
tatem speculativam, sed in operantibus, et utilitatem omnibus afferre possent, rem
propterea ad humanitatem, atque, a me in ingenium aut aliam causam, auctore meo ita reco-
dere, ut quod me perpetuo desideraret, nec in communis laudem transferretur. (Cum pro-
pter nonnullam ab aliquo habere iam edictam ex illi nonnulla translationem immoverem
et si nonnulla differret, non) (Principi in hac facultate) de ea scripsit Ptolemaeus, ut enim suo
Amaltheae in tribus tantum planis horologia descripta dicunt orientalia, occidentalia, et
tertium vocant, necesse est nihil praeterea de superficialibus ab his profectibus declinationibus, dixit,
quo fit ut cum rari parietes sint qui non aliquam in partem inclinant, rarissimi quoque per-
filla sunt solaria. Cuius, huius, descriptio succurrere voluerit Federicus Comandinus Episcopus
vixisse est. Viderem si Comandinus sequatur, non opus sit cuiusque parietis declinationis con-
suetudinem adnotare, ut in se lector optime cogita quam difficile, et subleprosa hoc
sit me, quam mirum, veluti hercule non laborem, de uterque quoque meo in et adhibue-
rant. In hisque articulis geminam qui praedictis (ut dicitur) quibus silum notis horologia non
valde obliuiscunt, aut deservire docuerant, ut plurimum accurrant, ita ut per omnia ha-
bitum in aliquibus partibus depicta, sunt et ea quae in summis, et alijs machinulis fabri-
cata sunt, perfectissimae, et cooperantur, et quod nonnulla fuerint legibus artificibus, sa-
cum autem ego hoc non labori (si mihi non saltem opus, ut in posterum hanc meo in con-
modo, quod si, sicut quae quod nonnulla, sed in notis et peritauerat radij, sicut notis et
ita, sicut si mihi sint horologia, et alijs nota, et alijs nota, et alijs nota, et alijs nota, et alijs nota,
aliquam per a dicitur huius operantibus et dicitur ut ornatus adhibere possint, et meo in
vixisse est, Episcopus, Sabaudus, Tuncis auctoritas, qui cum huius a me adhibuit, et dicitur si
peris mandata intellexeret, veluti peris dicitur utraque nostras parietes continere, sed
fecit ut peris in operantibus subleprosis. Sed eodem meo in nonnullis non cooperant, cum
nonnullam dicitur quae per non percipit dicitur, vel quae intelligunt alijs accepta ferre
veluti, nec dicitur qui peritauerat suam, veluti de demonstratione quoque de sideribus,
quibus omnia possent dicitur reddi, et modo modo fuit utraque nostras adhibuit. Sed huius-
modi esse indicium si omni creaturae nonnulla huiusmodi, quod etiam ego per se materia non pa-
teat, ego non invenit ut aut unum propter hominibus hoc dicitur, et in omnia quae non
cum propter si, quae velle ab alijs sunt tradita, ut veluti aliquod dicitur, vel ab
aliorum labori lectoris dicitur, meo paginas repetens traditibus auctoritatem, quod
alij fecerunt. Quis enim Sebastiani Munsteri, et Orontij Ptolemaei horologiorum operas leg-
git, qui non animadvertit quomodo multa propter negligentiam de verba ad unum in po-
sterioris opere sunt translata, quae poterant rationi cum utraque laude apud prorem
videnda relinquere, aut potius ab utroque praetermitti, cum aliter alterius imper-
tus dicitur
re utitur, et quandoque videtur errore modo dicitur, et in omnia in eadem finem sibi
propter

Tabula eorum quae hoc uolumine continentur.

De altitudine poli supra horizontem.	Cap. 1
De eadem contra Petrum Nonium.	Cap. 2
De eadem secundum antiquos, alio modo speculata.	Cap. 3
De eadem ex longitudine diei.	Cap. 4
De eadem ex plano.	Cap. 5
De eadem ex amplitudine stellarum.	Cap. 6
De eadem ex altitudine solari verticali.	Cap. 7
De eadem ex altitudine solari meridiana.	Cap. 8
De linea meridiana orientali.	Cap. 9
De eadem ex hyperbole diurna.	Cap. 10
De eadem uno tantummodo puncto mediante.	Cap. 11
De eadem ex altitudine solari.	Cap. 12
De eadem ex hora data.	Cap. 13
De eadem ex amplitudine cuiusuis corporis caelestis.	Cap. 14
De eadem noctis tempore.	Cap. 15
De inclinatione, siue declinatione parietum.	Cap. 16
De incertitudine magnetis.	Cap. 17
De cognitione declinationis parietum linea meridiana mediante.	Cap. 18
De eadem parietum septentrionalium.	Cap. 19
Consequencia precedentis capituli.	Cap. 20
De eadem tempore aequinoctij.	Cap. 21
De eadem ex hora cognita.	Cap. 22
Consequencia precedentis capituli.	Cap. 23
De eadem iterum ex hora cognita.	Cap. 24
Consequens precedentis capituli.	Cap. 25
De eadem ex simplici gnomonis umbra in muro affixa.	Cap. 26
De modo cognoscendi qua hora diei sol inueniatur in quouis aximat propo- sito.	Cap. 27
De eodem ex discreto.	Cap. 28
Exemplum precedentis capituli.	Cap. 29
De eodem ex triangulis sphericis.	Cap. 30
De eodem ex duobus triangulis, alia methodo.	Cap. 31
De crepusculari theoria.	Cap. 32
Crepusculorum praxis.	Cap. 33
	Crepu-

Crepusculorum alia praxis.	Cap. 34
De eadem compendiosè.	Cap. 35
De eadem via triangulorum sphericorum.	Cap. 36
De utilitate horarum communium.	Cap. 37
De utilitate horarum italicarum.	Cap. 38
Iterum de horis communibus.	Cap. 39
De utilitate horarum ab ortu solis.	Cap. 40
De utilitate horarum temporalium.	Cap. 41
De altitudine horarum inaequalium, quæ babilonice appellantur.	Cap. 42
De ijs quæ capitibus sequentibus continentur.	Cap. 43
De horologio communi orientali.	Cap. 44
Theoria præcedentis capituli.	Cap. 45
De horologijs communibus muralibus, ex methodo distincta.	Cap. 46
De iisdem super omnes parietes.	Cap. 47
De iisdem ex methodo compendiosa.	Cap. 48
Examinatio (circa eandem operationem) modè antiquerum, secundum quæ omnia ferè horologia communia muralia tertius mundi fabricata sunt.	
Cap. 49	
Comparatio modorum capitum præcedentium.	Cap. 50
De Analemate ab Authore toto excogitato, & speculato.	Cap. 51
De horologio italico orientali.	Cap. 52
De horologio italico murali.	Cap. 53
De lineis horarijs italicis muralis absque tropico hyemali, & de principijs signorum, de cuspidibus domorum, de horologijs italicis meridionalibus, & verticalibus.	Cap. 54
Theoria aliquot prædictorum.	Cap. 55
De horologio ab ortu.	Cap. 56
De horologio horarum temporalium.	Cap. 57
De horologio italico orientali ex discreto, ope triangulorum sphericorum, absque necessitate tropicorum.	Cap. 58
De modo finiendi lineas horarias, præcedenti capite inventas.	Cap. 59
Supplementum ad 12. primi. Nicolai Copernici, necnon ad 31. & 32. quarti Joannis Regiomontani.	Cap. 60
De alio modo lineandi horarias lineas italicas orientales indeterminatas absque tropicorum vel triangulorum sphericorum auxilio, tam ex continuo quam ex discreto.	Cap. 61
De recognitione anguli intercepti à circulo horario, & ab horizonte.	Cap. 62
De subiecto. 61. capituli ex methodo compendiosa ac breui.	Cap. 63
De eodem subiecto supra murum propositum.	Cap. 64
De	

De eodem horologio italico, alia theoria.	Cap. 65
De praxi precedentis capituli in orizontali horologio.	Cap. 66
De eodem praxi supra parietem obliquum.	Cap. 67
De eodem horologio italico alia methodo.	Cap. 68
De eodem horologio italico ex alio Analemate.	Cap. 69
Examinatio modi antiquorum circa hyperboles describendas.	Cap. 70
De verò modo ex prædicta methodo, vbi antiquorum error manifestatur.	
Cap. 71	
De pulchriori modo describende hyperboles paralleli æquatori.	Cap. 72
De describendis lineis horarijs ex hyperbolis tropicorum.	Cap. 73
De lineandis hyperbolis almicantaræ seu circulorum altitudinum supra murum.	Cap. 74
De modo cognoscendi (ex gnomonis umbra) totius cœli situm.	Cap. 75
De modo describendi supra murum, eam terræ, & maris partem, quæ sibi è directo obijciunt, ita vt ex gnomonis umbra possimus cognoscere solis situm, respectu totius terræ globi.	Cap. 76
De modo describendi horarias lineas in portione spherica excavata.	Cap. 77
De examinatione pensilium horologiorum, & de nouo horologio circulari.	
Cap. 78	
De nouo horologio pensili.	Cap. 79
De modo lineandi horologia supra tres facies tetrahedri.	Cap. 80
De alio modo inueniendi punctum horæ supra planum inclinatum orizonti.	
Cap. 81	
De modo (ex discreto, inueniendi angulum axis orizontalis cum facie tetrahedri.	Cap. 82
De triplici modo sciendi quibus terræ locis, vel maris, sol exoritur, vel occidat in quolibet temporis momento.	Cap. 83
De horologio italico vniuersali.	Cap. 84
De altitudine solis quælibet hora.	Cap. 85
De azimuth solis qua volueris hora.	Cap. 86
De modo, ab antiquis tradito, altitudinis solis inueniende quavis hora.	
Cap. 87	
Precedentis capituli theoria.	Cap. 88
De azimuthiua antiquorum methodum.	Cap. 89
De fabricando horologio supra parietem orizonti inclinatum.	Cap. 90
De cylindro concauo.	Cap. 91
De horologio ex refractione radiorum.	Cap. 92
De horologio ex ipsorum reflexione.	Cap. 93
De horologio tympani forma.	Cap. 94
De	

De horologio mirabili atque exactissimo.	Cap. 95
De noua diuisione horologij circularis.	Cap. 96
De horolo. horologiorum. rote forma.	Cap. 97
De nocturnis h. ris.	Cap. 98
De horologio lunari.	Cap. 99
De errore Munsteri circa gnomonum umbras.	Cap. 100
De nouo instrumento conoidali cum iis rheo-remantibus.	

IO. BAPTISTAE BENEDICTI

PATRITII VENETI PHILOSOPHI,

de Gnomonum umbrarumque solarium usu. Ad Sereniss.

EMAN. PHILIBERTVM Alobrogum,

& Subalpinorum Ducem iuiciss.

LIBER.



Nunc primum in lucem editus.



Recipuas Gnomonum, usas umbrarumque de quibus tractamur sumus, cum ad compositionem horologiorum solarium pertinet, quorum prope infinitae sunt species, prout quisque sibi necessitate, aut voluptate ductus formam & locum eligit, & omnino non eadem sit ubique coeli constitutio, sed alicubi altior, alicubi demissior appareat cynosura: prout regionis situs, aut propius accedit, aut longius recedit ab ipsis mundi polis, quo fit ut nec ubique eadem esse possit umbrae quantitas, atque delineationum ratio. illud in primis demonstrandum videtur, quae possit certissima, faciliq; via cognosci ipsius poli ab horizonte elevatio, in quoquoque terrae situ positus sit is quilibetarium sibi fabricandum proposuerit.

De altitudine poli supra horizontem.


Cap. I.



Altitudo igitur poli ab horizonte, desinetur eo plane modo, qui ab antiquis descriptus est, interdum beneficio altitudinis meridianae solis, noctu ope altitudinis meridianae alicuius stellae, ex ijs, quae cognitae sunt, vel etiam incognitis, quarum circuli descripti non secantur ab horizonte, mediantes maxima, minimaque altitudine sua meridianae, ut scribit Petrus Apianus primo tractatu de introductione geographica, utq; alij restarum reliquerunt. Obseruandum tamen est diligenter ne aliquam ex ijs stellis accipiamus, quae circa polum magnos circulos describunt, sed potius ex ijs aliquam eligamus, quae ad ipsum polum propius accedunt,

A dunt,

dunt, quia ex quæ magnos circulos describunt, cum sunt in meridiano sub ipso polo, denantur radios suos per lineam curvam, ab eo statim loco ubi vapores effluat reperiuntur, vsque ad oculum nostrum, sed continuatam refractionem, cuius causa est continua diversitas diaphanitatis, quæ obliquè penetratur ab ipsis radijs luminosis, & à maiori copia ipsorum vaporum, quæ interponitur inter stellam (in huiusmodi situ collocatam) & nos, radijs suis penetrantibus quasi per eum locum in quo vapores extenduntur: neque item per eorum profunditatem, seu crassitatem, nullo intercedente medio, ad differentiam earum stellarum quæ circa zenit, aut orientis polam reperiuntur, ut ex præfenti figura faciliè cognosci potest.



Cuius rei si quis desiderat sensibile indicium, ita desumat. In die æquinoctij figat stilum in pariete bene posito, & plano, qui sit perpendicularis ad orientem, & respiciat aliquam ex quartis meridianis, aut ipsam australem plagam,

plagam, deinde incipiat signare extremitatem umbræ sili, quæ supra parietem resistabit, statim atq; à sole ceperit illuminari, paulatim singulis medijs horis plus minusve, signet iam dictas extremitates umbrarum, dum sol parietē illuminat. Accipiatur deinde exacta regula, & supra dicta signa locetur: & statim apparebit signa eotempore facta, quo sol proximus erat orienti, declinare à rectitudine, & deorsum aliquantulum vergere, ita ut ipsē sol appareat altior, quam pro rei veritate esse debeat, ob supradictas rationes, quod facile ijs persus debitur qui Vitellionem legerint, & observauerint refractionem radiorum, ob diversitatem mediorum transparentium, & obliquitatem incidentiæ. & eo maxime si quis noverit continuum augmentum perspicuitatis aëris à terra colum versus. Neq; hic tacebo, minorem errorem commissum iri circa horam matutinam, quam vespertinam, quia inclinante sole, magna vaporum copia decidit, non item aduentante mane: idq; melius hyeme, quam æstare succedens. melius item statim ut aër purgatus tenuiorq; factus à ventis septentrionalibus fuerit.

Idem præstari potest amplitudine solari mediante, aut alicuius incognitæ stellæ, siq; mediante earum altitudine ab horizonte in circulo verticali, ab ascensione obliqua, cum arcu Ecclipticæ cognito, à gradu medij cœli cum amplitudine puncti orientis, aut cum opposito puncto, à gradu medij cœli cum puncto quod oritur aut occidit, à stellis fixis cognitis, quæ simul oriuntur vel occidunt, ab arcu semidiurno cognito, à maxima vel minima die cognita, aut quavis alia ipsius anni; (excepta æquinoctiali) ab altitudine solis ab horizonte cum azimuth cognitis. Hæc porò omnia tradita fuerunt, & scriptis mandata ab antiquis, & à recentioribus usurpata, ut facile deprehendi potest in Erasmo Osualdo, qui omnem ferè sui primi mobilis rationem, à Petro Apiano desumpsit, Petrus verò Apianus hæc eadem cum multis alijs propositionibus à Monte Regio accipiens sibi ipsi ascripsit.

Decadem contra Petrum Nonium,


Cap. II.



Erōm antequam ulterius progrediamur æquum mihi videtur veritatis amicos admonere, Petrum Nonium decipi capite decimo libri. 2. artis nauigandi, qui negat posse nos deuenire in cognitionem altitudinis poli, his tribus tantum medijs, scilicet hora cognita, gradu solis, & altitudine ipsius solis ab horizonte. cui respondeo nullo alio requisito hoc rectissime fieri posse, quamvis huiusmodi problema ab alijs nunquam, (quod sciam) propositum fuerit. Hoc ita fieri poterit. Pona tur hic meridianus a. b. c. d. in quo protracta sit orientalis linea. b. o. d. nec non verticalis. a. o. c. æquinoctialis a. f. o. e. axis mundi. p. o. q. diameter verò

A 2 parallela


paralleli diurni. h. i. i. & diameter almicantrat, in quo sol reperitur illa hora. n. k. Cognoscitur gradus solis, cognoscetur etiam eius declinatio, consequenter etiam illius sinus. o. l. vel eius vice, complementum quoque illius declinationis dabitur cum suo suo. h. l. medietas videlicet diametri dicti paralleli. Sinus præterea altitudinis solis sit. o. l. vel eius vice, sinus autem versus oppositæ horæ erit. h. g. qui qui sem nobis cognitus erit, ex quo. g. l. differentia. g. h. & l. h. nobis manifesta apparebit protracta postea. o. g. ipsa etiam nobis data erit. o. p. o. l. & l. g. circumdantes rectum angulum. o. l. g. ex penultima primi Eucl. vel ex 26. primi Regiomontani de triangulis. & similiter manifestabitur angulus. l. o. g. ex 27. dicti hb. Ex. o. g. & o. l. datis postea dabitur. l. g. tertium latus trianguli orthogoni. g. l. o. ex prædicta, item & angulus. g. o. l. à quo (si maior, & borealis fuerit ab orientis axe) subducemus angulum. g. o. l. minorem, vel ei adiciemus, si angulus. g. o. l. non fuerit eius pars, vel detrahemus. g. o. l. ab angulo. g. o. l. si ipse angulus. g. o. l. fuerit meridionalis ab orientis axe, & ita cognitus nobis erit angulus. o. o. p. cuius residuus à recto erit quadratus.



Admonens

Admonens Nonium; hac ratione facile cognosci; quæuersus positus sit punctus, respectu verticalis lineæ. a. o. hoc tamen modo, sapientius pambiturum punctus. g. sit versus punctum. i. aut versus punctum. h. à puncto. si declinatio erit versus. i. cum sinus versus. h. g. horæ propositæ, maior fuerit sinu recto. h. l. complementi declinationis, sed si e contra, tunc punctus. g. erit h. versus à puncto. l. & cum. o. g. equalis fuerit. g. l. sicuti altitudinis solis, tunc punctus. g. idem erit cum puncto. l. in puncto, committit verticalis lineæ cum diametro paralleli, sed si punctus. g. fuerit. i. versus. a. b. l. nulli dubium erit, quin punctus dictus sit etiam ab eodem puncto verticali dicto, versus. i. sed si fuerit ab. l. versus. h. potest fieri, ut ipse fuerit. l. & dictu in verticali punctum, vel in ipso met verticali puncto, uel infra dictum punctum uerticalem, & h. At si ipse fuerit in dicto verticali puncto, iam dixi quo modo id cognoscatur hoc est ab æqualitate lineæ. o. g. cum. o. l. sed si in altero duorum locorum fuerit, hoc plane modo inueniemus. Ponatur primò punctum dictum esse inter punctum uerticalem diametri paralleli, & punctum. l. centrum ipsius paralleli, unde angulus interceptus ab. o. g. & o. l. hoc est. g. o. l. nobis cognitus erit ex prædictis, similiter & g. l. quæ quidem. g. l. semper minor est portio ne illa diametri paralleli, terminata à puncto. g. & à puncto uerticali diametri dicti; eo quod opposita sit semper angulo recto illius trianguli orogonij. nunc detracta sit illa. g. l. à sinu uerso h. g. propositæ horæ, à parte. g. tunc, si ab extremo residui. h. g. protracta fuerit linea à d. centrum. o. ipsa cum uerticali comprehendet angulum angustiorum angulo. g. o. l. quod quidem clarissimum in diuisionem erit, punctum. g. esse inter uerticalem, & i. nam si angulus ille altitudinis factus, fuerit maior angulo. l. o. g. manifestum erit, punctum. g. fuisse inter. h. & uerticalem supputetur ergo angulus dictus, ut ueritas eluceat. Possimus igitur facillimè, ope trium illorum principiorum cognitorum, peruenire in cognitionem eorum omnium rerum, quæ supersunt eo modo quem huc vsq. tradidi. Ambiguitas Nonij locum nullam habet, nisi quando angulus sphaericalis. b. a. c. sine figura recto minor reperitur, uidelicet dum altitudo solis ab oriente, maiore est de clinatione propria ab æquatore, Exempli gratia, sit in secundo h. clibus ipso meridiano, sinus. o. l. altitudinis solis, maior sinu. o. l. de clinationis eiusdem, sitq; primo punctus. g. australis ab arc. a. e. orientis, accipiatur postea sit. eiusdem anguli sinus; quæ. g. l. ducta; q. o. l. fiat angulus. t. o. i. æqualis angulo. g. o. p. ducta etiam. t. e. ad rectos; cum t. a. in puncto. e. producta; ipse. t. vsq; ad. ut hinc sit. æ. q. u. æ. l. h. g. quod manifestè patebit, cum triangulus. t. o. p. in duobus æ. q. u. æ. l. h. g. in angulo. p. o. l. angulus enim. t. o. e. factus fuit æqualis angulo. q. o. l. & e. l. sunt recti, latera. o. t. & o. g. sunt æqualia, quarta pro-
 de eiusdem. t. e. & g. l. æqualia esse necesse est, similiter si punctum. o. l. cog-
 tentur

ventur nunc protractis dux. o. u. & o. h. quæ quidem erunt duo diametri, unde ex penultima primi Eucl. u. e. & h. l. erunt inter se æquales vel ex. 13. tertij. a quibus demptæ. o. l. & l. g. remanebunt. u. t. & h. g. æquales inter se. Nunc verò si constituantur polus esse in. a. habebimus in tali altitudine solis, ab horizonte eandem horam, siue distantiam à meridiano (nam. u. t. probatum fuit æqualem esse. h. g.) quod quidem accidere non potest, non existente altitudine solaris maiore, ipsius declinatione.



De eadem secundum antiquos abo modo speculata.



Nterdive rios autem modos inveniendi altitudinem poli ab anti- quis traditos (qui à germanis in suis voluminibus conscripti fue- runt) vus innotescit, qui ope trium quoq; instrumentorum con- surgit, nempe ratione altitudinis solis, eius gradus in zodiaco, & eiusdem solis azimuth, in eo puncto temporis qui beneficio usperius polita si- gura

gurg, facile potest in opus redigi, & h'alia diuersaq; ratione ab ea qua reliqui omnes vti sunt, in hunc planè modum. Primò enim ex solis gradu cognito à nobis cognoscitur. o. l. declinationis sinus, ex eius altitudine uerò cognoscitur. o. l. si plus altitudinis sinus, ex azimuth uerò, sinus eiusdem azimuth extensus in plano orientali, qui quidem sinus azimuthalis, ita se habet ad semidiametrum ipsius orientis, quemadmodum. g. l. ad semidiametrum. f. k. almican tarat. hoc est ad sinum complementi altitudinis solis. nam cum latera omnia huiusmodi duorum triangulorum, sint inter se æquidistantia. ex. 6. & 16. undecimi Euclidi. similes erunt isti duo trianguli inter se, ex. 10. eiusdem; & ideo latera proportionalia habebunt, quare. g. l. nobis manifestabitur: qua quidem mediante cum. o. l. ostendet etiam quantitatem. g. o. cum amplitudine quoq; anguli. g. o. l. sed g. o. cum o. l. (existente. l. rectò) nobis dabit. g. l. cum angulo. g. o. l. habebimus igitur intentum eo modo quo diximus in præcedenti capite, adijciendo, uel detrahendo, inter se dictos angulos.

De eadem ex longitudine cognoscendi.

Cap. IIII.



Modus uerò, quem adhibent antiqui mediante longitudine cognita dici propositi, & gradu solis, eadem figura facile demonstrari potest, quia. h. l. semidiameter paralleli solis, nobis cognita est, ut dictum fuit, & h. m. ut sinus uersus arcus semidiurni cogniti, unde. l. m. differentia nobis cognita erit, que quidem ope. o. l. cognitam dabit etiam. o. m. & angulum. m. o. l. trianguli orthogoni, quod est propositum. ex quo patet impossibilitas huiusmodi problematis tempore æquinoctij, ut cap. primo diximus.

De eadem ex plana.

Cap. V.



Cribit quoq; Petrus Nonius, & ostendit diuersos modos, quibus altitudo poli cognosci potest, ut facile uidere est cap. 8. 9. 13. 14. 15. 16. 17. secundi libri artis nauigandi, quantum ex his nonnullos ab antiquis mutetur, & quia horù aliqui sunt in quibus oportet adhibere globù, qui cum difficultate exquisitus haberi potest, existimo ego supputatione meliorem, & perfectiorem esse, ut operationem quoq; in plano sciam. Atque (ut exemplum afferamus.) quod aliquando mihi in mentem venit, inter varios diuersosq; modos, vnus hic est, ut duabus altitudinibus solaribus ab horizonte cognitis & inæqualibus, in diuersis eiusdem dici instantibus, & mediante duplici distantia cognita duorum azimuth, (eorundem instantium) à meridiano (que omnia facile cognosci possunt ut quisq; nouit, & ipsemet


Nonius

Nonius innuit cap. 14. libri superius citati) possumus supputare, aut statim cognoscere in plano, per paucis ductis lineis, altitudinem poli. Sic ergo circulus. c. b. g. d. pro orizonte diuiso, ut decet à meridiana. h. d. & verticali. e. g. sint q. q. h. & q. k. communes sectiones ipsorum azimut solis (duobus instantibus obseruatis) cum orizonte, amboe etiam in eadem quarta primo, sitq; in azimutali. q. h. pars eius. i. h. sinus uersus altitudinis solis, in azimutali uero. q. k. huiusmodi sinus uersus sit. p. k. qui quidem sinus nobis cogniti erunt, cum recti earundem altitudinum dantur, sint postea. h. u. & k. l. sinus arcuum. h. d. & k. d. qui ex hypothese dantur, ducti postea sint duæ perpendicularares. i. o. & p. r. ad meridianam. b. q. d. deinde. q. u. & q. l. cognoscemus ex penultima primi Eucli. uel (& cælesius,) ut sinus complementorum arcuum. h. d. & k. d. hoc est sinus arcuum. g. h. & g. k. demum proportio. q. u. ad. q. o. eadem est quæ. q. h. ad. q. i. ex similitudine triangulorum quæ nobis cognita est, ex cognitione terminorum, Idem dico de analogia. q. l. ad. q. r. æqualis ei quæ. q. k. ad. q. p. Cum igitur datæ nobis sint analogiæ. q. u. ad. q. o. & q. l. ad. q. r. cum quantitatibus. q. u. & q. l. (ut dictum fuit) dabuntur etiam magnitudines duarum linearum, scilicet. q. o. & q. r. ita quod si dempta fuerit. q. o. ab. q. r. (existentibus ut si pponitur ambobus azimut in eadem quarta) nobis cognita remanebit. o. r. Volo nunc ut circulus. c. b. g. d. intelligatur pro meridiano, in quo b. d. orizontalis sit, & g. e. verticalis. & quoddà à punctis. o. & r. erigantur sinus. o. l. & r. m. duarum. datarum altitudinum, qui quidem sinus squidistantes erunt sibi inuicem, & verticali. q. e. similiter. ex. 6. unde cimi, & per eorum extremitates transeat recta. l. n. f. a. t. quæ quidem erit communis sectio meridiani cum parallello solis, incusis postea sit sinus. o. l. maior in puncto. n. ita ut o. n. eius pars inferior æqualis sit sinui. m. r. minori, ductaq; n. m. quæ ex. 33. primi æqualis erit. o. r. unde omnia latera trianguli. l. n. m. nobis cognita erunt. n. m. primam ex. o. r. l. n. autem ut residuum totalis sinus. o. l. dempta. o. n. equalis. m. r. l. m. postea ex penultima primi, quapropter anguli huiusmodi trianguli omnes nobis cogniti similiter erunt: ex quibus. l. erit quæsitus, sed quia nonnulli fortasse desiderabunt eadem quoq; ratione cognoscere quales essent horum illis ita poterit satisfieri. Cum triangulus. l. o. z. similis sit triangulo. l. n. m. & o. l. cognita, cognite etiam nobis erunt. o. z. & z. l. nec non. q. x. eo quoddà. q. o. cognitum superius fuit, & quia triangulus. q. x. z. ite uniformis est cum triangulo. l. n. m. & cum triangulo. l. o. z. eodem igitur modo cognoscemus. q. x. & x. z. sed. q. x. æqualis est sinui declinationis solis, dabitur ergo. f. x. medietas diametri paralleli, sed ut sinus complementi declinationis dictæ, ut euitemus laborem penultimæ primi Eucli. & sic totum. f. z. semis uersus arcus semidiurni cognitum nobis erit, à quo dempto latere. l. z. (trianguli. l. o. z.) iam protinus inuento, innotescet nobis. f. l. sinus uersus horum communis, siue distantis



Modus autem quo antiqui rati sunt amplitudine solis, vel alicuius stelle mediante, ut videre est in 14. probationato Apiani, vel in 10. propositione Oualdi, satis pulcher, & brevis esse videtur, & satis theoreticam, hoc loco non erit inconueniens inserere. Sit meridianus. e. p. u. x. in quo horizontalis linea sit.

Hic æquinoctialis verò. E. n. axis vniuersæ, p. i. x. diameter paralleli aëris. l. sinus altitudinis poli. t. i. & c. n. erit vice sinus amplitudinis aëris, c. o. verò vice sinus declinationis aëris, & c. i. loco sinus complementi altitudinis, qui quidem omnes cogniti sunt. cum autem duo trianguli. o. c. n. & i. c. x. similes sint inter se, & c. n. c. o. & c. x. latera data, dabitur: & c. i. eo quod omnia latera unius, proportionalia sunt lateribus alterius, unde arcus sinus. c. i. hoc est. a. x. illico notus habebitur, hinc. t. x. aëris uicinis arcus quaesitus manifestus erit. aduertendum tamen est, si de stellis in orizonte positis, sicut ad eum propius accedentibus, ratione usque ordinis, ob quos earum radij, à rectitudine deuiant, ut nunquam uerum sint nostris oculis subijcere possint.



De eadem ex altitudine solis circuli

Cap. VII.




Lter verò ille modus ab ipfide[m] traditus, vt apparet pronantiato .
 27. Apiani & 17. Ofualdi. Sit verticalis, a. c. g. in precedenti figu-
 ra, & altitudo solis in circulo verticali data sit, cum eiusdem de-
 clinatione ab æquatore, sinus verò altitudinis solis sit. f. c. vel ei
 æqualis, in linea verticali, qui quidem cognitus erit ex data altitudine, nec
 non. c. o. loco sinus declinationis, qui erunt latera trianguli orthogoni, f. o.
 c. vnde angulus. f. c. o. complementi altitudinis poli, erit cognitus, & ex
 hoc residuus à recto, hoc est. x. c. t. quæsitus. Vel sic, protracta. a. y. æquidistan-
 ter diametro, b. l. paralleli solis, tunc habebimus duos triangulos similes. a. c.
 y. & f. c. o. sed trianguli. f. c. o. cognita nobis sunt latera. f. c. & c. o. vnde. f. o. ex
 penultima primi, dabitur immediate, ad quod sic se habet. c. f. quemadmo-
 dum. a. c. ad. a. y. sunt tamen nobis cognita tria latera. c. f. l. o. & a. c. quare a.
 y. sinus complementi polaris altitudis, illico dabitur, item & reliqua.

De eadem ex altitudine solis meridiana.

Cap. VIII.



Sed si forte fortuna deficientibus instrumentis, vellet aliquis altitudi-
 nem poli supra horizontem cognoscere, auxilio altitudinis meridia-
 næ ipsius solis, inueniatur primo meridiana linea horizontalis in pla-
 no exactissimo, & orizonti parallelo, ex doctrina antiquorum; vt à Vitruuio
 traditum est, cum stilo erecto, qui quidem stilus, in subiecto meridiano, sit
 n. o. linea verò meridiana sit. M. Q. horizontalis, verticalis a. e. axis vniversi.
 q. p. radius solaris meridians. h. o. t. qui quidem obseruatus manifestabit. n. a.
 vmbra[m] stili meridianam, quæcum gnomone. o. n. cognito, habebimus &
 o. t. vnde angulus. n. o. t. vel. a. o. h. statim emerget in lucem, & ex hoc arcus. h.
 a. cui si declinatio solis addita fuerit (existente ipsa septentrionali) vel ab ip-
 so dempta (si australis fuerit) illies residuetur latitudo regionis, & propositi.
 Et quamuis, vt vnum aut alterum ex ijs problematibus in opus reducaris;
 necessarium sit cognoscere meridianum sitam, & verticalem, respectu loci,
 plani, aut alterius generis, in quo reperitur, nec de his ullam dispositionem
 susceperim, hoc tamen non ualde curandum; & si inuenteretur harum rerum
 pertractandarum ordo, in scribendo, dummodo in agendo, ab eo ducatur
 initium, quod in tali re primo loco statui debet. quoniam ut in sequentibus
 faciliè apparet, aliquando ad inueniendam meridiani verticalisq; sitam, co-
 gnitio altitudinis poli præcedere debet, aliàs verò, primò cognoscendus
 erit situs meridiani, ut ex hoc capite colligi potest, & ex alijs deinceps col-
 ligetur.




De lineis meridianis orientatib.

Maximè necessarium erit, cum propter horologia horizontalia, tum propter innumeras commoditates, quæ inde manabunt, reperire lineam meridianam horizontalem, super aliquod planum, quod non moveatur. Sed quia de faciliori modo tractationem susceperunt antiqui, & diligentes satis fuerunt, in hac re explicanda, non utar copiosiore oratione: sed tantam proponam modum, quem adhiberem ad huiusmodi operationem faciliorem reddendam; atq; id præstarem, describendo plurimos circulos circa unum, & idem centrum, super planum exquisitè æquidistanti orienti, & plantatis cum fuerit stilus in dicto centro aduentante mane, multos ex illis circulis signarem, ubi ab umbre extremitate pertingerentur, post meridiem uerò hora commodiore posset signari unus ex ijs, qui mane signati erant. debemus deinde sequi diuisionem arcus inter ea duo puncta per medium, & ducere lineam meridianam, ut quisq; nouit.


Possit etiam & aliaratione inueniri linea meridiana horizontalis, in hunc planè modum; Ducta sit linea .m.n.o. in plano leuigato, circa quam describatur hyperbolæ .y.m.u. dicti propofiti, eo modo quo suo loco dicam, uel secundum doctrinam antiquorum, situs autem gnomonis sit .n. in quo figatur gnomon proportionatus dictæ hyperbolæ, quo facto, ponatur planum ad solem, parallelum orienti, & circumducatur, quousque umbra extremi tangat peripheriam hyperbolæ descriptæ, & sibi quiescat planum, propterea, quòd .m.n.o. erit linea meridiana quæsitæ.

Diebus uerò æquinoctialibus, factis erit (uicè hyperbolis) ducere lineam rectam perpendicularem ad .m.n.o. sed ita à pede gnomonis .n. distantem, ut (si .m. fuisset earum linearum communis sectio, proportio .n.m. ad gnomonem esset eadem, quæ sinus latitudinis loci, uel altitudinis poli, ad sinum eius cõplementi. Sed cum quis pluri uoluerit ad solem locare, animaduertat (ut res exactior euadat) oportere eã locare multò ante meridiem, uel multò post; sic tamen, ne hoc fiat tempore ualde matutino, aut uespertino, ne à uaporibus decipiamur, quod tempus est circa horam & mediam, post ortum, & ante occasum solis. At circa meridiem hoc non faciendum cenfeo, propterea quod meridies est solstitium dñei. Modus autem inueniendi meridianam lineam ex aca portatili ab omnibus serè usus, non est exquisitus, imò simplicissimè nostallit.






Edm cum mane signatus fuerit aliquis ex supradictis circulis in plano horizontali, & post meridiem, sol à nebulis statim per residuum diei ofuscatus remanserit, rationi consentaneum mihi uidetur, hoc loco exponere quid circa propositam questionem speculatus fuerim. Sit igitur dictus horizontalis circulus, p. t. cuius centrum, a. (cum dico circulum, seu planum horizontale, ipse ferre uolo parallelum sub horizonte, ab ipso tamen distans, per longitudinem gnomonis) longitudo autem umbræ gnomonis (hoc est semidiameter dicti circuli) sit, n. t. gnomon uero sit, o. n. describatur separatim meridianus, a. b. c. d. in quo horizontalis linea sit, b. d. verticalis autem, a. c. æquinoctialis, e. f. iuxta latitudinem loci, diameter paralleli diurni sit, h. i. Accipiatur nunc in uerticali, sub horizontali, pars, o. n. æqualis gnomoni proposito, ductaq; sit, M. n. Q. ad rectos cum uerticali, quæ secetur in puncto, o. ita quod, n. p. æqualis sit umbræ propositæ, à quo, a. per centrum, o. ducta sit t. o. i. vsq; ad circumferentiam in puncto, k. quæ quidem ostendet nobis arcum, k. d. altitudinis solis ab horizonte in tali instanti, à puncto postea, a. duceatur, k. d. horizontali æquidistans, quæ quidē erit diameter almicantrarū solis, & se cabit, h. i. diametrum eiusdem paralleli, in puncto, g. uerticalem uero in puncto f. Nunc obseruandum est, quod si, k. r. transit per, y. punctum commune uerticali, & diametro paralleli, umbra, n. t. erit linea uerticalem horizontalis, & tunc si ducta fuerit linea, n. p. ad rectos, cum, n. t. in plano horizontali, ipsa, n. p. erit meridiana, sed si, k. r. non transit per, y. transeat ergo sub ipso, uel supra, & describatur semicirculus paralleli, h. i. in quo, à puncto, g. intersecationis supradictæ, ad, h. i. erigatur perpendicularis, g. l. vsq; ad circumferentiam dicti semicirculi, quæ quidem erit communis sectio almicantrarū cum parallelo, in cuius diametro, à puncto, g. accipiatur, g. n. æqualis, g. l. ducatur postea, u. l. quæ erit communis sectio almicantrarū, cum azimuth: & ita habebimus angulam, g. l. u. æqualem angulo facto ab azimuth cum uerticali, ex. 17. primi, qui quidem angulus, si applicatus fuerit ad lineam, n. t. in centro, ut, t. n. p. ipsa, n. p. uerticalem erit, Azimut uertendum tamen prius erit, qua parte (respectu, n. t.) locanda sit, n. p. propterea quod d. si punctus, g. fuerit à linea uerticali uersus septentrionem tunc linea, n. p. locanda erit uersus meridiem; sed si punctus, g. fuerit uersus meridiem à dicta linea, tunc, n. p. uersus septentrionem in plano horizontali, locanda erit.



II



De eadem ex altitudine solis.

Cap. XII.



Bsq; longitudine ipsius horizontalis umbræ, idem perficere
 possimus, signato situ lineæ n.e. in plano horizontali; dum-
 modo sumpta sit altitudo solis, ope altrolabij, vel alterius
 instrumenti, unde cognitus nobis erit arcus k.d. ducto po-
 stea diametro almicantaræ, cum reliquis lineis, perficiemus
 quod nobis proposuimus faciendum, Hac etiam ratione sta-
 tim innotescet hora, puncto l. mediante, hoc est ex arcu h.l. diuiso, ut
 deest,

Dea-

Sed si quis in tali instanti daret horam cōmanem, uel partem exactā ip-
sius horæ, absq; aliqua solis altitudine, uel umbræ longitudine, uel
co finis rectus ipsius horæ, hoc est. g.l. daretur, & consequenter eius
finis uersus. g.h. qui quidem finis uersus (si. g. uicinior fuerit. i. quam. h. ab.
z.) compositus erit ex. h. z. totali sinu. & ex. z. g. sinu recto complementi ar-
cus. l. i. sed si uicinior fuerit. h. quam. i. dictus finis uersus. h. g. erit minor tota-
li. per sinum rectum. z. g. complementi arcus. h. l. latus posita. z. A. trianguli
orthogonij. z. A. o. nobis cognitus esset, cum eisdem anguli cum latere. o. z.
cogniti præxillant. quod quidem latus. o. z. datur ut finis rectus (uel eius ui-
ce) declinationis paralleli, item dabitur latus. A. o. quo mediante cum angu-
lis. A. & y. trianguli orthogonij. A. o. y. cognoscetur latus. A. y. à quo dempto
A. z. remanebit. z. y. cognitus, cui. x. y. addita uel dempta à. z. g. (differentia in-
ter. g. h. & z. h.) aut ipsi. z. g. ab. y. z. dabitur latus. y. g. trianguli orthogonij. y.
g. l. quo mediante simul cum angulis eiusdem trianguli, notum nobis dabitur
latus. g. l. hoc est. g. n. quò intercedente simul cum. g. l. & angulo. g. recto, ha-
bēbimus angulū. l. cognitum & quesitum quo ad dito ad lineam umbræ. n. t.
(ut dictum est superius,) statim uidebimus lineam. n. p. uerticalem, & ex hac
meridianam.

De eadem ex amplitudine solis, uel alterius

stella.

Cap.

XIIII.

Mediantē amplitudine cognita solis, aut alterius cuiuspiam corporis
in celi caelestis, idem possumus absq; ullo temporis tractu consequi,
nempe cum iam dictum corpus in horizonte sedem figit, si signabitur,
super planam nostram horizontale lineam. e. a. recta, quæ à centro ipsius
plani recedit, & directè ad idem corpus tendit, cui si coniungamus angulum
amplitudinis dicti corporis, parti aduersæ ipsius amplitudinis, habebimus li-
neam uerticalem, & statim deinceps meridianam, ad quod peragendum ma-
gno nobis esset adiumento, aliqua dioptra similis; quæ in doctō Astro-
bijs fieri solet.

De eadem noctis tempore.

Cap.

XV.

Si uerò aliquis hoc illustrante iam omnia die, præstare nequiret, ab ali-
qua causa impeditus, uelletq; idē ex alteri buste corporis facere, facillī-
mè id consequi poterit mediante aliqua stella; quamuis in cōgnitū
longitudinis, & latitudinis, quæ eadem, nocte cadat & orietur, uel exortatur,
& cadat

& cadat, si signentur duæ rectæ lineæ, quæ eam à centro nostri plani respiciant, in duplici orientis situ, & diuidatur deinde angulus in hunc modum coalitus, per medium, habebit lineam meridianam,

De inclinatione, sive declinatione parietum.

Cap. XVI.



Osceæ quamscum horologiorum horizontalem inuenimus, rationi consentaneum mihi videtur insinuatam esse disputationem de sitibus parietum, quoniam supra parietem, nullum horologium constitui potest, nisi prius eius situs respectu meridiani, aut verticalis, sub cognitionem nostram cadat: unius tamen cognitio, nos in alterius cognitionem deducet. In quo ut præclare nobiscum agatur, illud primò sciendum est, in omnibus horologijs, quorum gnomones non reperiuntur in situ axis uniuersæ, extremitatem accipi semper loco centri ipsius mundi: hinc superficies, super quam horologium depingi solet, imaginatione comprehenditur tantam distans à dicto iam centro, quantum exiit ipsius gnomonis longitudo, præsupponentes eam in eadem superficie, ad angulos rectos fixam: quod commune est non minus horizontalibus, quam in pariete depictis horologijs. Sed quia hæc horologia, quæ in parietibus pinguntur, & eorum figuræ inter se ualde differunt, ratione faciei ipsius parietis, quod non item horizontali bus usu uenire solet, quæ sunt eiusdem altitudinis poli, necessarium est, ut ipsius parietis faciem optimè noscamus; quæ facies, in genere, octo modis, in specie uero infinitis planè variari solet. Octo illi generales modi, ita se habent, ut qui paries sit in eodem situ uerticis circuli, ubi duos habet aspectus, alterum uersus austrum, alterum septentrionem uersus: aut ut idem sit positus, in eodem meridiani loco, ubi ad alia quoq; duo aspectum dirigat, ad ortum æquinoctialem, & eiusdem occasum. Hæc uero quatuor parietum aspectus simpliciter alij uero quatuor qui reuoluantur, inter supra dictos positi erunt, ut aut facies alicuius parietis respiciet quartam orientalem meridianalem, aut meridionalem occidentalem, aut orientalem septentrionalem, aut occidentalem septentrionalem. Sed quia quilibet quarta ex nonaginta gradibus interualli consistit, & quilibet gradus ex sexaginta minutis componitur, & sic per quosdam quasi gradus omnia procedunt, sequentur posteriores hos à nobis recitatos, & comprobatos quatuor modos simplicem naturam non retinere, neq; sufficere cognoscere solum faciem parietis respectu quartæ, sed etiam cognoscendum esse præcisè punctum, quod gnomon in ipso ad angulos rectos confusus intueatur. Declinatio parietis à meridiano semper est arcus opozontalis minor quarta, à pariete & meridiano interceptus quemadmo-

C dum

dum rectè scripsit Orontius cap. 13. & Munsterus. cap. 16. Nam huiusmodi acus manifestat nobis quantitatem anguli acuti dictæ aram duarû superficierû.


De inveniendâ magnetis. Cap. XVII.

Mncipiens igitur dicam, vsum acus agrimenforiz, huic rei non magna adjuvmentum offerre, & si ea omnes utantur, quapropter diversos, aliolq; modos magis certos, & tutos, ac, ut ita dicam, omnis planè erroris et pertes indagavi: quorum unus hic erit propter parietes meridionales, quod ineptè satis hæc potest acus ostendere.

De declinatione parietum ex linea meridiana.
Cap. XVIII.

Primum inveniatur linea meridiana horizontalis super planum quoddam orizonti æquidistans, proximum parieti, in quo depingi debeat horologium, & cum umbra styli in ipso plano horizontali ad angulos rectos infixa, dictâ lineam ex æquo teget, in eodem instanti oportet extremitas umbræ, quæ à gnomone in pariete fortiter ad angulos rectos confixo refular. Signata verò ubi fuerit puncto, quod visu percipi possit extremitas umbræ à gnomone super parietem procedentis, duçetur primo linea una, orizonti perpendiculariter per medium puncti super parietem notati, quæ erit meridiana parietis respecta gnomonis plantati, ad quam à medio pedis dicti gnomonis, ducta sit una ad angulos rectos linea, & sic ab omni parte indefinitè protracta, quæ linea orizontalis appellabitur, ut in infrascripta figura scillamè videri potest, figura inquam, b. a. loco parietis, in quò, g. o. sit gnomon, ad angulos rectos in ipso confixus, eius verò umbra, g. i. in instanti meridiano, cuius extremitas sit. i. & m. i. linea perpendicularis supradicta, transiens per. j. & g. q. horizontalis ad rectos, cum. m. i. transiens per. g. gnomonis basim, quò factò, si ab extremo. o. gnomonis ad punctum. m. intelligatur linea. o. m. quæ quidem cum. m. g. horizontali murali comprehendet angulum acutum questum declinationis scilicet muni à meridiano, eo quòd ipsa. o. n. c. meridiana horizontalis, habebimus ergo quòd quærebamus.

tur orientem. a. b. c. d. cuius centrum sit. o. paries. f. e. cuius gnomon sit. g. o. respiciens quartam. b. a. quam supponamus nunc septentrionalem, & punctus. m. azimuth obseruati, accipiens. g. m. æqualem ei quæ est parietis, hinc ducent. m. t. n. habebit communem sectionem azimuth, cum oriente, sed quia adhuc nescimus, in hoc circulo, quæ nam sint puncta cardinalia ipsius, proficiscemur in planam orientalem, à nobis capite undecimo assignatum, & computabimus gradus arcus t. p. obseruantes partem orientalem vel occidentalem ab. n. p. meridiana, quos gradus numerabimus in giro presentis orientis, uersus australem situm, incipientes à puncto. c. & computationem terminantes, (exempli gratia) in e. unde. c. erit punctus australis à quo per centrum ducentes. c. o. a. hæc erit meridiana orientalis, & ducendo. o. b. d. ad eam perpendicularem, hæc erit verticalis orientalis, quæ duæ nobis ostendent punctos. h. & k. communes ei & orientali parieti. f. e. quorum. k. erit meridiana muralis, & h. verticalis muralis.



De eodem tempore æquinoctij.

Cap. XXI.

SI quis verò vellet horologium in muro depingere, tempore æquinoctij, posset facillime inuenire faciem muri, si supra parietem designabit duos punctos extremitatis umbræ à gnomone proficientis, in duobus diuersis, & a se inuicem longereuotis instantibus, die æquinoctij, & ducēs deinceps rectam vnã lineam vsq; ad orientalem parietis, (quam præsuppono iam ductam) punctus communis huic lineæ ductæ, cum orientali,

tali erit punctus verticalis: & dicta linea ducta per duos punctos signatos, erit communis sectio parietis cum æquinoctiali. Cum verò habuerimus punctum verticalem in orientali respectu propofiti gnomonis, ab alia parte, in nostram statim lucem punctus meridianus prodibit.

De eadem ex hora cogitur,

Cap. XXII.


Sed cum etiam æquinoctio non existente (aliquo impedimento) nobis esset incommodam lineam unam meridianam præparare, habentes præ manibus aliud aliquod horologium horarum communium, alium indagavi modum, ut hoc facile fieret, si tamen aliquis diei hora, sol & horologium, & parietem illuminaret. Atque primum dico, si sol illuminet & horologium, & parietem, hora meridiana, assequemur statim quod proposuimus, quia in instanti meridiei signaremus extremitatem umbre gnomonis affixi super parietem, & id omne exequemur, quod decimo-octavo capite præscripsimus. Sed si aliquando requiremus signare punctum meridianum, signare verticalem conabimur, quando possit in horologio propofito occultè signari, communis sectio circuli verticalis, cum superficie horologii.

Consequentiæ præcedentis capitis.

Cap. XXIII.

Sed si forte fortuna neuser punctus signari possit, tentemus novum hunc modum. Sit (exempli gratia,) gnomon perpendiculariter affixus parieti. *o. t.* & linea orientalis. *a. t. d.* notetur extremitas eius) umbre, in instanti unius horæ, cum sol tam horologium iam fabricatū, quam parietem propofitum illuminat, quod signum sit. *u.* & ducta sit. *u. a.* azimuthalis, plumbo, inter. *u.* & orientalem: oportet deinde notare distantiam. *o. a.* nempe ab extremo gnomonis vsq; ad punctum. *a.* & sic angulum *a. o. t.* oportet deinde imaginari one comprehendere dictæ horæ horariam lineam (licet supra parietem nondum noscantur.) *u. d.* protractam ad interfecationem vsq; cum orientali, in puncto. *d.* Imaginari quoque debemus lineam. *d. o.* ab extremo gnomonis ad punctum orientalem. *d.* & communem lineæ horariæ imaginatione comprehendē, similiter & *o. u.* oportet nunc nos in intellectu formare pyramidem. *o. d. a. u.* cuius sumitas sit punctus. *o.* & basis. *d. a. u.* cuius pyramidis nobis cognita erit facies triangularis. *o. a. u.* id est latus. *a. o.* & *u. o.* elevationis, & *u. a.* latus basis, & angulus lateralis rectus terminatus à latere. *a. o.* ab azimuth & orizonte procreato, necessarium nanciscit, ut in cognitionem anguli lateralis ipsius pyramidis, terminati ab. *o. d.* perducamur, qui est acutus, confectus ab orizonte & circulo horariis, quia superficies tribus angulis constans. *o. d. a.* orientalis est, & triangularis. *d. o. u.* circuli est horarij. Ut hunc igitur angulum habeamus, infra scriptura orizontem effigiemus mente, fa-

per quem imaginabimur medietatem g. p. r. meridiani, & medietatem circuli horarum horarum communium q. p. d. & axem mundi o. p. r. communem eorum sectionem, & communes sectiones orientis, cum hisce circulis. sint. g. o. r. (linea meridiana orientalis) & q. o. d. linea horaria communis, & orientalis horæ obseruare, cuius angulus cum meridiana. d. o. r. à nobis cognoscetur, ope constructionis horologiorum. orientalem, & angulus meridianæ. o. r. cum axe mundi. o. p. à nobis quoq; cognoscitur, auxilio altitudinis poli iam cognitæ. oportet deinde à quolibet puncto lineæ meridianæ. r. o. ponamus à puncto. r. ducere aliam perpendicularem lineæ horariæ orientali, quæ sit. n. e. r. pus est deinde ab ipsomet puncto. r. erigere aliam perpendicularem orienti, usq; ad axem mundi in puncto. x. (quod separatio fiet, ut æqualis longitudo. r. x. habeatur) unde duæ lineæ. r. e. & r. x. erunt longitudinis cognitæ, quæ intra se ipsas angulos rectos constituunt in puncto. r. ducentes deinde lineam. x. e. (separatio ad constituendum triangulum orthogonium ex æquo) obtinebimus angulum. e. acutum trianguli. x. e. r. desiderati. Oportet nunc sumere distantiam. u. à iam super parietem inuentam, & super ipsam ad umbra-re portionem circuli. u. z. a. capaxem anguli. e. ex Eucl. 3. libri. 3. deinde ducere diametrum. n. l. quod fieri poterit, quia portio maior erit medio circulo, existente angulo. e. a. acuto, ut iam superius est dictum, oportet deinde coniungere. a. cum. l. unde habebimus triangulum rectangulum. a. l. u. qui habebit angulum. l. equalem. e. id est equalem angulo contento à triangulo orientali. o. d. a. & à triangulo horario. o. d. u. quemadmodum ope dictentis, quisq; facile intelligere potest, auxilio figuræ orientalis iam effectæ. opus est deinde super latus. o. a. pyramidis, medium circulum describere, & à puncto. a. ponere lineam. a. l. (quæ semper minor est. o. a. quia. u. l. equalis est uni latorum duobus à puncto. a. trianguli. o. a. d. perpendiculariter usq; ad latus. o. d. & ad una perpendiculis à puncto. a. ad latus. d. o. in triangulo. o. d. a. & ambe in unum & eundem punctum concurrentes, ut facile cognoscitur, unde. a. o. relinquatur ut sit latus cuiuslibet trianguli orthogoni, oppositum angulo recto ipsius trianguli, & ob id maior erit. a. l.) & deinde ducere lineam. l. o. unde angulus. a. a. l. erit equalis angulo. a. o. d. trianguli orientalis in puncto. o. æterno gnomonis & quia angulus. l. o. a. ex lateribus cognitæ compositus, nobis cognitus existit, cognoscemus quoq; per consequens angulum. e. o. d. residuum à totali. a. o. d. iam inuento; cuius angulus. o. d. gnomon est. a. o. qui angulus. l. o. d. applicatus in centro circuli orientis, ad lineam horariam orientalem. o. e. d. à parte ad quam conieci figurare poterimus eum totaliter, (quod multis modis percipi potest) nobis statim occurrit gnomonis declinatio à linea meridiana eius complementum ex una quantitate erit declinatio superficiæ parietis à superficie meridiana.





De eadem ex hora cognita.


Cap. XXIII.



Lia quoq; ratione cognosci potest respectus quem paries habet ad meridianum & verticalem, una mediante hora cuiusvis generis cognita. Describatur primum meridianus diuisus ab orientali & verticali, in quatuor quartas, secundum commune omnium consuetudinem, ducaturq; diameter paralleli solis ad suam situm, respecta duorum diametrorum, quibus a. a. ipse quoq; parallelus describatur circa diametrum suum, diuiditurq; ut docet, ut. x. l. singis sit horq; b. d. uero semidiameter almicantharum solis, ducatur de inde linea horizontalis. g. p. super tabulam leuigatam, ac planam, ad quam ducta sit. g. f. perpendicularis longitudinis gnomonis iam parieti affixi, & g. p. sit distantia orientalis, à pede gnomonis usq; ad communem sectionem a rimis horq; cum pariete, quæ capite. i. s. g. m. appellabatur, & cap. vigesimo secundo. t. a. ducta etiam sit linea. p. f. quæ capite. i. a. nomine. o. a. insignita fuit, scindatur postea. p. f. in puncto. o. ita ut. f. o. equalis sit. b. d. semidiametro almicantharum solis, supra quam. f. o. ad dexteram, aut ad sinistram (prout in sequenti cap. explicabo) designetur semicirculus. f. z. o. in quo

o. in quo locabuntur duæ lineæ ab extremis diametri ad circumferentiã, quarum una sit medietas communis sectionis paralleli solis cum suo almican-
 taræ, hoc est. *a. c.* sinus horæ. alia uero. *b. x.* pars communis sectionis almican-
 taræ cum meridiano, collocata inter diametrum paralleli & verticalem, sic
 enim habebimus angulum. *g. f. x.* inter gnomonem & verticalem, seu me-
 ridianam.





Consequens precedentis capitis.

Cap. XXX.




dicendum nunc est quo pacto locandi sint lineæ in præcedenti capite dictæ in semicirculo. f. a. o. & ad quam partem ipse designandus sit. Atq; primo illud sciendum est, si murus quædam orientalem septentrionalem aspexerit, tunc considerandum esse in præcedenti meridiano. a. d. u. ubi punctus. z. (respectu lineæ verticalis) occiderit, ad dextram scilicet, vel ad sinistram: hoc est septentrionem versus, seu meridiem. Nam si septentrionem uersus inuenius fuerit, hoc est inter. b. d. Tunc semicirculus designandus erit supra lineam. p. f. ad dextram

D partem,

partem, ut in figuris. A. manifestè uideri potest. Sed si α . meridiani, fuerit sinistram uersus, hoc est uersus meridiem respectu uerticis, id est extra. b. d. tunc dictus semicirculus designandus erit supra lineam. p. f. ad sinistram partem, uersus gnomonem, ut in figura. B. uideri potest. At cum murus fuerit meridionalis orientalis, tunc sol à tribus suis potest umbram generare gnomonis, à quarta orientali septentrionali scilicet, aut à quarta orientali meridiana, seu à quarta meridiana occidentali. Nam si punctus. α . fuerit intra. b. d. & punctus. ζ . fuerit alicuius horæ ex ante meridianis, tunc sol erit in quarta orientali septentrionali, & propterea semicirculus describendus erit uersus gnomonem ad dextram, ut in figura. C. Si autem. α . fuerit ad ζ . u. hoc est extra. b. d. & ζ . ante meridianarum horarum, tunc semicirculus describendus erit ad ζ . u. ipsius. p. f. ut in figuris. D. uideri est, in quibus omnibus locis est. h. α . meridiani, inchoando ab extremitate. o. diametri, & α . ζ . incipiendo. ab. f. extremo gnomonis, ut habeatur. ζ . α . communis scilicet uerticis cum horizonte; quare hactenus habebimus. ζ . α . uerticalem horizontalem. Sed si punctus. ζ . fuerit horarum postmeridianarum, tunc semicirculus ad ζ . u. designandus erit & b. α . in eo collocanda incipiendo ab. f. extremo gnomonis & α . meridiana orientalis erit. Sed si murus aspexerit quartam occidentalem meridianam, tunc sol in tribus locis constitutus esse poterit, hoc est, in quarta orientali meridiana, in quarta occidentali meridiana, uel in quarta occidentali septentrionali. Sit ergo primum in quarta orientali meridiana, hoc est punctus. ζ . sit horarum ante meridianarum, tunc semicirculus describendus erit ad dextram, & b. α . locanda ab extremo gnomonis in semicirculo, siq. ζ . meridiana orientalis erit ut in figura. G. Sed si. ζ . fuerit pomeridianarum horarum, id est cum sol inuenitur in quarta meridiana occidentali, semicirculus collocandus erit ad ζ . u. u. ut in figura. H. & b. α . locanda ab extremo gnomonis, & ζ . similiter meridiana erit. Existente postea puncto. ζ . pomeridianarum & α . infra. b. d. tunc semicirculus collocandus erit ad ζ . u. u. ut in figura. B. uel. F. uideri est, & b. α . locanda inchoando ab. o. & ζ . α . erit iterum uerticis orientalis. Sed si unus fuerit occidentalis septentrionalis, & cum hoc punctus. α . extra. b. d. semicirculus locandus erit ad dextram, & in eo. b. α . ab. o. ut in figura. G. & ζ . uerticis orientalis erit. Sed si α . fuerit extra. b. d. tunc semicirculus constitutus erit ad ζ . u. u. ut in figuris. D. Que omnia ex oriente. α . colliguntur cum meridiano, & parallelis. R. Sed in oriente. α . nunc sumenda est quarta. k. n. pro septentrionali orientali, nunc pro meridiana orientali, nunc uero pro meridiana occidentali, nunc autem pro septentrionali occidentali, ut clarius hæc omnia patebunt capite. 55.

De calculo ex simplicibus umbra gnomonis in muro affixi, modus
perquam pulcherrimus. Cap. XXVI.



Ungè tamen reliquis omnibus superius propofitis, accuratior hic erit modus, quæ nunc ob oculos omnium proponemus. Qui liberè excurrent, & vagans, nullo lineârâ, aut meridianâ, aut verticali, vel azimuthali, vel æquinoctiali, impetio præmitur; neq; altitudo horæ alterius horologij vinculis detinetur, nisi ut sciatur si tempus fuerit ante meridianû, aut post meridianû. Res igitur ita cõponamus ut fabricetur meridianus. A. b. e. d. cuius orizontalis sit. b. d. & verticalis. a. c. diameter paralleli solis. h. i. & media eius circumferentia h. l. i. & notata extremitate umbræ gnomonis supra parietem qualibet hora, aut in quolibet temporis instanti, (quemadmodum pro inquirenda linea verticali orizontali ostendi cap. 11.) & ducta distantia perpendiculari, ab orizontali murali, ad ipsû punctum, quæ cap. 22. a. u. azimuthalis nominata fuit, punctus verb. u. & mensurata distantia ab extremitate gnomonis usq; ad punctum communem orizontali & azimuthali, quæ cap. 22. o. a. nominabatur, locetur hæc. o. a. in orizontali nostri subscripti meridiani, initium ducendo ab. o. centro, versus partem quæ parallelo è regione opponitur & à puncto. a. ad angulos rectos descendat. a. u. azimuthalis, & deflectat ad proprium punctum. u. æqualis ei quæ est parietis, & à puncto. u. ducta sit. u. o. usq; ad circumferentiam in puncto. k. à quo. k. ducta sit deinde. k. l. x. parallela orizontali, quæ erit diameter almicantrarum solis, in eo puncto temporis qui in puncto. g. diametrum paralleli secabit, à quo ducto sinu g. l. horæ communis in semicirculo. h. l. i. & desumpta g. u. æqualis. g. f. & ducta. u. l. manabit angulus. g. l. u. ut applicetur puncto. o. gnomonis, applicandus ad unam aut alteram partem. o. a. secundum quod punctus. g. meridionalis aut septentrionalis fuerit ab. A. c. verticali, & secundum quod punctus. l. fuerit orientalis, aut occidentalis in parallelo, ut in precedenti cap. dictum est, & hoc modo verus situs verticalis, aut meridianæ cognoscetur, ut etiam cap. 11. dictum fuit. Adde quod si nova hac ratione à me in lucem emissâ, antequam ad exitum perveniamus, perducatur in cognitionem horæ, aut eius partis, quam in eo instanti sol percurreret. Quod etiam fieri potest exactè, si cognitam habeamus altitudinem solis ab horizonte, beneficio huius à me modò indagati, ut aliis quoq; diximus. Neq; quisquam miretur quod tot modos inveniendi ptagæ celestis, quam paries respicit, ex cogitaverim, cum hoc fecerim non ut aliquo ex eis utamur, excepto hoc ultimo, sed potius ut omnibus ostenderem, quam multis & diversis modis poterat aliquis in certam huius rei à nobis propofitæ cognitionem ferri, abiq; eo quod ad usum acus confugeremus.


De modo iuueniendi qua hora diei sol iuueniatur in quouis azimut
propofito. Cap. XXVII.



Vm tractationi faciei fiparietum intenti fumus, in animum induxi meum vrile futuram, fi conabor rationem oftendere, qua mediante cognofci poffit qualibet annū die, qua hora, aut eiuſdem parte, incipiat fol, aut definat illuminare quemlibet parietem, ex fitu cogniro cōſtanti, reſpēctū ad meridianū. Quod vt facile fiat, ſciendū eſt in primis, paſſerē nullū

orizonti perpendicularē, qui ab ortu ad occaſum ſolis lumine illuſtretur, dū eſſe mouetur per medietatē ſeptentrionalē eclipticæ (in ſphæra obliqua) & parietes colloq̄atos in eodem verticali, illuminatos eſſe ab ortu vſq; ad occaſum ſolis, dum ipſe in medietate aſtrali ipſius eclipticæ excurrit, alij quoq; parietes iuueniuntur qui aſtrales ſunt, licet non præciſe, qui per multos dies in hysce illuminantur ſemper, ſi raven ab ortu ad occaſum extra maximam ſolis amplitudinē non diuogentur, ſed ut accedamus ad tractationem eoſum qui incipiunt aut definiūt illuminari, aliqua diei hora vel eius partes ſit exempli gratia) ſubſcripſus orizon. A. diuiſus à duabus lineis cardinalibus, meridia. d.k. & verticali. p.l. & communis ſectio parietis; ex cognito ſitu conſtantis cum dicto orizonte. c.q. vnde angulus acutus q; eodē ab hac linea eſt alia. d.e. productus, (quam meridianam præſupponimus) nobis cognitus eua det, qui angulus ſit ſemper aſtralis ſupponamus nunc ſolem eſſe in quolibet parallelo extra æquatorē, quia in ipſo æquatore deſinitus hic propriè & per ſe cognofcitur, mediante fabrica horologiorum horarum eorumundum, in quibus æquator in vſum cedit, ſupponamus igitur, exempli loco, quod ſol eſſet in parallelo cancri, imaginemur igitur meridianum. B. eiuſdem magnitudinis cum orizonte. A. cuius verticalis ſit. x.x. & diameter paralell. b.b. nā p̄ dicto extremo cuius. b. ducatur. b.o. perpendicularis verticali, vnde b.o. erit ſūnus arcus. b.a. & quia arcus. b.x. nobis cognitus exiſtit, cognitus quoq; nobiſerit eius ſinus. b.o. quemlibet ſi ſeparatim pono, cuius extremitas. C. vniſiſſimo ad angulos rectos. b.n. ipſe determinatam, applico deinde ipſi. o. b. in puncto. o. angulus acutum. b.o.n. æqualem ei qui eſt parietis eiuſdem meridiano, id eſt. d.c.g. vnde. b.n. terminabitur ab. o.n. deſcribo deinde ſeparatim circumlum. C. paralleli, & ad extremitatē eius diametri. h. ducō. b.n. ipſi diametro perpendicularē, & æqualem. h.n. ſeparatim poſito, ſeco deinde huius paralleli. C. diametrum in puncto. t.t. tam longè diſtanti à puncto. b. quantum. r. diſtat à h.circuli. B. & ab iſto. t. qui eſt circuli. C. ducō. t.n. que diuidet giram paraleli in puncto. e. unde mihi cognitus erit arcus. b.e. qui propoſitus eſt ad inquirendum, quia punctus. b. eſt meridici. Quod vt facile intelligatur, ſcie. d. em. eſt. t.n.

est. a. n. esse quandam portionem communis sectionis parietis cum parallelo & o. n. esse in pariete & parallelam orizonti, i. de st. g. c. ipsius. A. & b. u. in super-
 ficie paralleli. In eo nunc nobis est laborandum, & accuratè prospiciendum,
 ne circa parietes in errorem ducamur, qui bis in die possunt à sole illuminari,
 dum ipse per signa septentrionalia defertur, & huiusmodi parietes, sunt qui
 orizontem iuxta maximas solis amplitudines, in eiusdem ortu & occasu dis-
 secant, hi verò quæ extra maximas amplitudines subsistunt, semel tantum mo-
 do illuminantur; & cum de uno pariete loquor, intelligo vnam solam eius fa-
 ciem, & quia cum quidam parietes bis illuminentur, harum illuminationum
 aliam meridiem præcedit altera vero subsequitur, ut cognoscamus quæ nam
 ea sit quæ mane exurgit, considerabimus semper angulum acutum australe,
 g. c. d. (supponentes semper. d. c. g. pro meridiana orizontali) qui angulus, si
 erit orientalis & maior complementi maximæ amplitudinis orientalis meri-
 dionalis solis, ut infrascripta figura. D. patet, stante. d. c. k. meridiana, & p. c. l.
 verticali, & g. c. q. murali, & existente arcu. l. f. maximæ amplitudinis ori-
 entalis meridionalis, eius complementum. l. d. minus est arcu. g. d. unde in tali ne-
 gotio, arcus. b. e. paralleli, erit orientalis, operando mediante angulo acuto.
 d. c. g. Sed si voluerimus, deinde scire arcum dicti paralleli, comprehensum
 inter meridianum & parietem à parte occidentali, oportebit (innentus cum
 fuerit prius arcus. b. e. paralleli auxilio anguli acuti. d. c. g.) protrahere è dire-
 cto lineam. a. e. t. à parte. c. ipsius circuli. C. vsq; ad punctum. l. circumferentia,
 & arcus. b. m. f. erit arcus occidentalis paralleli, ad investigandum propositus.
 Idem dico cum angulus. d. c. g. esset occidentalis, unde & arcus quoq; ipse.
 b. e. occidentalis existeret, & arcus. b. m. f. orientalis, ut in figura. E. orizontali
 innotescit, huius porro rei contemplatio seipsam explicat, & in locum pro-
 fert, cum omnium duarum superficierum planarum, communis sectio sit linea
 recta: at verò cum sectio communis parietis cum orizonte, id est. g. q. in eodè
 situ verticalis. p. l. moram traheret, (unde nec ab vna, nec ab altera uersus me-
 ridiem parte, angulum acutum haberemus.) tunc. b. t. esset sinus uersus arcus
 ad inquirendum destinati, unde ab s; alio ministerio, ducendo in parallelo
 lineam. t. q. y. diametro perpendicularem in puncto. t. duceret nos ipsa in
 cognitionem arcuum æqualium. b. m. & b. y. orientalium, & occidentalium pa-
 ralleli,



De eadem ex difformi.

Cap. XXVIII.



Ed quia quæ precedenti cap. tractauimus si ad numeros reducatur, maiorem fortasse utilitatem afferent; eodem seruato ordine, cognitus camerie angulus acutus. g. e. d. mediante quouis supradictorum modorum, & ad gradus & minuta reducitur, accipimus sinum. b. o. arcus. b. z.

cus. b. z. iam cogniti, quo. b. o. mediante, & angulo. d. c. g. & angulo recto, deducemur in notitia lateris. b. n. trianguli. o. b. n. orthogoni, vi vigesimo neq; lib. primi triangulorū Monte Regij, quam. b. n. separationem in numeris definiabimus, donec egeamus, postea autoritate eiusdem. 29. ducemur in cognitionem. b. t. cum angulus. o. rectus sit, & angulus. o. t. b. notus: auxilio anguli. z. x. x. ei æqualis, & latus. b. o. qui iam vt sinus arcus. b. z. nobis innotuit. Nunc verò medianæ. b. t. & b. n. lateribus cognitis, trianguli orthogoni. n. b. t. cognoscemus angulum. b. t. n. Imaginatione deinde concipientes à tropici centro. a. : a. t. u. paralellam lineæ. t. n. & ducta, imaginationis quoq; vi. b. c. r. dictis paralellis perpendiculari, autoritate eiusdem. 29. obtinebimus duos triangulos. b. c. t. & b. r. a. cognitos, quia. c. r. recti sunt, & anguli. t. a. æquales, & hac ratione noti, & latera. b. t. & b. a. similiter quoq; nota: hinc latera. b. c. & b. r. cognita nobis erunt quamobrem. c. r. eorum differentia à nobis cognoscetur, quæ confertur cum sinu arcus. e. u. vnde fiet ut arcus. e. n. nobis quoq; cognitus euadat; at arcus. b. u. iam nobis est notus ope anguli cogniti. b. a. u. hinc igitur sequetur, vt arcus. b. e. cognitus nobis remaneat, cuius rei cognitionem querebamus.

Exemplum precedentis capituli.

Cap. XXXVIII.



Ed ut exemplis rem illustremus, ponamus polo Taurinensi. 44. gradus & 50. minuta, parietem declinare. 26. gradibus minutis. o. 3. meridiano, occidentem versus, id est ut gnomon in ipso muro ad angulos rectos confixus, 26. gradum à verticali meridianum versus, è directo respiciat, & b. circuli. B. sit gradus. 23. & minuta. 28. (nempe secundum maximam declinationem) ab æquatore, unde sinus b. o. constabit ex partibus. 36433. & sinus declinationis parietis componetur ex partibus. 43837. & sinus complementi declinationis parietis à meridiano, collabitur ex partibus. 89879. Nunc ut habeamus. b. n. dicemus si ex. 89879. resultant. 43837. quid prodibit ex. 36433. id est. b. n. unde. b. n. ex. 17769. exurget eiusdem nature, cuius sunt partes semidiametri coeli, octesimo millesimo numero contentæ, quæ sunt duo trianguli similes ut cōsequamur deinde lineā b. t. dicemus si. 70505. id est sinus arcus. z. x. nobis tribuit. x. x. 100000. quod ex. b. o. 36433. deriuabitur deriuabit. b. t. ex partibus. 51674. His peractis sumemus radicem quadratam aggregatā ex duobus quadratis. b. t. & b. n. vnde. e. n. erit ex partibus. 54643. constituta, queremus deinde perpendicularem. b. c. dicentes si. e. n. 54643. nobis dat. b. n. 17769. quid ex. b. t. 51674. deriuabitur: certè promanebit b. c. ex partibus. 16863. constans, sed. b. n. ut sinus complementi declinationis solis, coalescit ex partibus. 91729. ut assequamur deinde alteram perpendicularem.

cularem. b. r. dicemus s. b. t. 51674. nobis largitur. b. c. quid ex. b. a. fluet? certe fluet. b. r. ex partibus. 298:7. secundū quod. b. a. significat. 91729. sed secundam quod eadem. b. a. denotat. 100000. b. r. denotabit. 3316. qui sinus est anguli. b. a. u. graduum. 18. minutorum. 58. & linea. b. c. ex huiusmodi partibus. 18317. componetur, subtracta igitur. b. c. (reducta) ex b. r. reducta (ani maduertendo in septentrionalibus parallelis subtrahi. b. c. ex b. r. & in australibus ē contra) restabit. e. r. sinus arcus. e. u. ex partibus. 14199. & e. u. eius arcus ex gradibus. 8. minutis. 10. qui subtractus in presenti, ab arcu. b. u. ex gradibus. 18. minutis. 58. coalito, remanebit arcus. b. c. perquisitus ex gradibus. 10. minutis. 48. at verò in parallelis australibus arcus. e. u. arcui. b. u. adiungitur, & aggregatum inde provenit arcus. b. c. requisitus, qui ad horas & minuta reductus, propositæ rei apertam & facilem cognitionem præbet. Non inuoluam tamen silentio, angulum. b. t. n. in vno parallelo, eidem futurum æqualem in quouis alio parallelo, quod vi. 10. propositionis undecimi libri Euclidis, facile potest sub contemplatione cadere. sic semel inuento dicto angulo. b. t. n. aut. b. a. u. (qui sunt ijdem) eum semper habebimus.

De eodem ex triangulari sphaerico.

Cap. XXX.




Liua modum longè breuiorem indagari, ad idem problema numerorum ratione demonstrandam, nobis inferuientem, ordo sci licet triangularum sphaericorum, à Nicolao Copernico, in primo libro resolutionum coelestium propositorum & is licet à Mōteregio hæc desumpserit, nos tamen ob maiorem comoditatem, eum hic adhibebimus, cum eodem loco adhibeat etiam sinuum tabulas. Quapropter sit hic subscriptus meridianus. p. z. b. x. r. in quo orientis medietas sit. r. t. q. & æquatoris. x. u. q. & azimut in cuius situ est paries sit. z. o. t. cuius situs iam cognitus præsupponitur, id est angulus. r. z. t. gradus arcus. horizontalis. r. t. cogniti, supponendo. z. zenit, & medietatem paralleli cogniti solis. b. o. & arcus circuli horarij (cuius situs ad inuestigandum nobis propositus, & in quo sol reperitur, cum similiter est in dicto azimut, & parallelo dato) sit. p. o. u. suppones. p. polum mundi, huius nostri hemisphaerij, nunc verò, quod querimus est arcus æquatoris. x. u. id est angulus. x. p. u. qui nobis cognitus erit ut in decimi libri primi Copernici, qui angulus. p. z. o. notus nobis existit, ut re fiduam quoddam duorum rectorum subtracto angulo. r. z. t. iam cognito declinationis parietis à meridiano: arcus verò. p. o. nobis cognitus erit, ut cōplemetum declinationis paralleli, velut copulatum vni ex quartis, quia. o. u. arcus dictæ declinationis, nobis iam est concessus, arcus. deinde. z. p. inter zenit & mundi polum, nobis iam illuxit, vnde ex iam citata propositione, neces-

E sario



fariū efficitur, vt propofitus angulus. 2. p. o. nobis immotefcat. Ponamus loco
 exempli (vt hoc in practicum opus dirigamus.) declinationem. r. t. parietis à
 meridiano, ex gradibus. 26. minutis nullis conſurgere, & h. o. eſſe tropicum
 cancri: unde imaginatione comprehendo triangulum ſubſcriptum. A. B. C.
 cuius. A. reſpondeat. 2. B. 1 p. i. o. & C. p. quæ propter angulus. C. A. B. reſiduum
 duorum rectorum, ex gradibus. 154. minutis. o. componetur, & latus. A. C.
 graduum. 45. minorum. 10. polo Turinenſi & B. C. graduum. 66. minuto-
 rum. 32. qui eſt complementum declinationis paralleli, id verò quod nunc
 inquiritur eſt angulus. C. complentes igitur quantas. C. D. & C. F. habebimus
 A. D. graduum. 44. minorum. 50. & B. E. graduum. 23. minorum. 28. &
 angulum. B. A. D. graduum. 26. minorum. o. vnde ex. 4. libri primi Co-
 pemic, angulus. F. trianguli. A. F. D. conſtabit ex gradibus. 71. minu-
 tis. 53. & latus. F. D. ex gradibus. 18. minutis. 58. imagina-
 tione deinde formantes triangulum. B. E. F. cuiſdem
 propoſitionis vi habebimus angulum. B. F. graduum.
 24. minorum. 46. & E. F. graduum. 8.
 minorum. 10. quo ſubtracto ab
 arcu. F. D. graduum. 18. mi-
 nutorum. 58. remanebit
 arcus. D. E. reſpō-
 dens angu-
 lo. C.
 perquiſito graduum
 decem, minu-
 torum.



De eodem ex dictis triangulis alia methodo.
Cap. XXXI.



Lia etiam ratione idem inquiri potest, ut cognito angulo
r. q. a. beneficio eius arcus. r. x. & cognito arcu. t. q. com-
plemento declinationis azimuth ad meridiano, existente
deinde angulo. r. recto, a nobis statim cognoscatur angu-
lus. q. i. t. & latus. q. i. trianguli. q. i. t. ex quarta superius
citata: & sic eius contrapolicum cognoscemus. Et quia in
triangulo. o. u. i. rectus angulus. u. comprehenditur, & la-
tus. o. u. cognitus, efficietur ut auxilio eiusdem quartae ducatur in notitiam la-
teris. u. i. quod vel addito, vel detracto à latere. q. i. (iam reperto,) trianguli.

q. Lt. cognitum euadet. q. u. & per consequens hinc deueniemus in cognitionem complementi unius quartæ. u. z. correspondentis angulo. p. loco trianguli rectanguli. q. t. i. possumus quoq; desumere triangulum rectangulum. z. x. i. cuius latus. z. z. nobis cognitum, simul cum angulo. z. & angulo. z. recto unde ex quarta dicti lib. angulus. i. & latus. z. i. obtinebimus tamen semper & facilius ueniemus in cognitione. x. i. mediante triangulo. q. t. i. Nemq; verò eiusmodi problema inutile arbitretur, poterit enim sese occasio offerre, qua multum proderit, vt mihi ante duos annos accidit Taurini, anno videlicet. 1759. cum ordinarem descriptiones vitrorum ambulatorij maioris serenissimi Ducis Sabaudie Domini mei clementissimi, quod quidem ita situm est ut parte ex vna sese opponat. 26. gradui ab oriente meridiem versus, ex altera. 26. gradui ab occidente septentrionem versus, accidebat, vt quotidie hora vna post meridiem, nunc amplius, nunc amplius, sole existente in azimut ambulatorij, nulla facies illius illuminaretur, & quoniam extremum ambulatorij quod. 26. gradum respicit à meridiano occidentem versus, coniungitur arcui Taurinenti, quo fit vt illa ex parte ambulatorium solis radijs illustrari non possit, & alterum extremum intra septentrionem & orientem situm, seu strâ habeat, que illa dici hora. à sole feriri non potest, iocireo in eiusmodi fenestra, tria vitra aparti iussi quorum vnumquodq; quatuor figuras celestes continet, ex duodecim domibus, ijs diebus calculatis, quibus zodiaci signa his nominibus temporibus sol ingreditur, ea tamen hora qua sol in azimut dicti ambulatorij, post meridiem reperitur, vt iam in dictis vitris, non tantam hora dici certatur verum etiam illa ipsa hora, celestium signorum situs & quantitas ab vno ad alium mensum triginta serè dierum sit interuallum, hoc certè non impedit, quominus intermodijs diebus hora plenè iusta cognosci possit, collata proportione, totali differentia partiali, ut totius mensis ad eam partem in qua quicq; fuerit,

De crepusculis aëtheris

Cap. XXXII.




Vm hæcenus de poli altitudine, lineis meridiana. & verticali, & parietum facie tractauerimus: proposituri nunc diuersos modos, diuersis quoq; temporibus à me obseruatos, & indagatos, ad cognoscendas (ope affulgentium diuinorum solis radiorū:) perultras & perpulchras res scitadignissimas, de quibus licet antiqui præstantissimi viri abundè, & pro rei dignitate discuerint, & huius rei principium atq; à diuiniuisionibus desunari, ex quibus, (tanquam clarissimis quibusdam fontibus;) maximè commoditates, pro varijs & diuersis huma-


nis actionibus emergunt, rationi consonum mihi videtur (postquam divisiones ex pro varietate humanarum actionum observate fuerint) addendum esse aliquem modum inveniendæ crepusculorum quantitatis: quæ si vna eademq; specie per totum annum, & vbiuis gentium existeret, nulla nos causa compelleret ad suscipiendam longam hæc de re disputationem, sufficeret tantummodo explicare quantitatem eius durationis, à principio ad finem, atq; id semel tantum. Quod verò utile sit scire quantitatem temporis crepusculi, nullus hoc in dubium revocare debet, quia eo perdurante multi multas actiones perficiunt, ac si iam sol supra orizontem appareret, & cum finiatur hoc crepusculum tam matutinum quam vespertinum (tempore sereno, nullis nubibus obdueto, ære purgato, in late patentiæ camporum planitie, non in vallibus, aut locis subterraneis, aut intra montes) ab orizonte, & ab vno quodã almicanarum, sub dicto orizonte, ab ipso per decem & octo gradus, (vt antiquis observatum fuit) distanti, videndum nunc est quemadmodum certa scientia cognosci possit, quo tempore maius, aut minus sit, & cuius durationis, quod vt commodius fiat, necessarium est aliquo ex à me positis modis prænotificare aliquot theoremata: quorum, hoc vnum est vt illa ex singulis duabus æqualibus vnius circuli diametri partibus subsistere debeat arcui maioris, quæ à centro longius distabit. vt exempli gratia, in subscripto circulo. a. b. c. acceptæ cum fuerint duæ quantitates æquales diametri, a. l. id est. k. h. & h. f. & ductæ. k. b. h. d. & f. c. perpendicularares ipsi diametro, dico, b. d. esse maiorem arcum, quam sit d. e. sit punctus h. prima, communis dictis duabus æqualibus partibus, duco, b. e. quæ diuisa erit per medium à. d. h. quod facile esset ad demonstrandum, ducendo. b. p. parallelam. a. f. (mediante. 34. libri primi Euclidi. & secunda lib. sexti) à centro deinde duco, g. i. c. & g. e. & g. b. vnde. ex. 8. lib. primi. b. g. e. erit æqualis angulo. e. g. e. arcus igitur. b. e. pars est arcus. d. b. & arcus. d. e. pars est arcus. c. e. verum est igitur arcum. d. b. esse maiorem arcum. d. e. At si punctus. h. communis ambabus partibus non existeret, sit ergo quemadmodum in secundo hic subscripto circulo videri potest, protrahensq; lineis vt supra, ducantur (per puncta communia. e. b. & d. h.) duæ. g. f. c. & g. t. e. vnde per. 4. primi, anguli. h. g. f. & e. g. t. inter se æquales erunt, cum. g. b. e. & g. e. b. lineæ inter se æquales ex quinta dicti lib. duosq; latera. d. b. & h. g. æqualia duobus lateribus. t. e. & e. p. ergo per 27. tertij, arcus. b. c. (pars arcus. d. b.) æqualis erit arcui. e. c. cuius quidem, arcus. e. d. pars est, patet igitur propositum. Non ignorandum præterea est, quod vna supradictarum diametri quantitatum puta. k. h. vel. h. f. desumpta in aliquo diametro circuli maioris supradictorum, ita tamen distans ab vna extremitate maioris quemadmodum ab extremitate minoris, vt videre est in tertio hic subscripto exemplo, in quo. h. k. ita communis pars est diametri. à. l. minoris, sicut. a. g. maioris, in eadem distãtia. b. a.

tia ab a. extremitate communi. Dico nunc quod protractę cum fuerint æque
 distantes lineę. k. b. & h. d. ipsę de circumferentia minoris circuli sec abunt ar-
 cum. e. c. qui quidem (respectu totalis sive circumferentię) maior erit arcu.
 b. d. circuli maioris. Producatur igitur. d. h. vsq; ad. u. circumferentię maio-
 ris, quę quidem transibit per. n. circumferentię minoris, ductęq; sint. h. u. &
 e. n. quę se inuicem secabunt in puncto. o. vnde ex. 16. primi Eucl. habebi-
 mus angulum. o. n. e. extrinsecum, maiorem angulo. o. u. n. intrinsecis opposi-
 to, ex quo arcus. e. c. in minori circulo, maior erit arcu. d. b. in maiori, idem
 infero si ambe diametrorum quantitates, à centris sporum circulorum æqua
 liter distantes fuerint. Minę sequitur etiam quod si circuli non sunt inter se
 æquales, existens. k. h. (maioris circuli) propinquior suo centro, quam mino-
 ris, sequitur dico illud idem quod supra dicebamus, quod scilicet. e. c. in suo
 circulo maior erit, quam d. b. in suo. Detur nunc meridianus. b. q. p. cuius cõ-
 munit sectio cum horizonte sit. r. a. æquatoris autem sit. x. q. tropicorum verò
 b. p. & h. k. sit postea. a. x. almicantrar, sub horizonte, terminantis crepusculi,
 quod quidem almicantrar distet ab ipso horizonte per. grad. 18. & à punctis
 communibus huiusmodi sectionis, a. x. cum sectionibus tropicorum, & æqui-
 noctialis. g. i. u. ductę sint tres perpendiculares horizontali lineę. g. a. r. e. & u.
 d. quę inter se æquales erunt per. 34. primi, cum inter se æquidistantes sint,
 ex. 28. eiusdem, quarum quilibet æqualis erit sinui arcus æquius intercepti
 inter horizontē & dictam almicantrar. Mora nunc crepusculi, sole existente
 in principio cancri, erit secundum quantitatem illius arcus dicti tropici in-
 tercepti inter horizontem & dictam almicantrar, qui quidem arcus respicitur
 à quantitate. u. t. diametri dicti tropici, idem de alijs dico, sed cum omnes
 er portiones. u. t. o. & g. p. æquales sint inter se, ex dicta. 34. primi, eo quod
 ex. 16. vnde ceteri inter se æquidistantes sunt, sequitur ex prælibatis theorema-
 tibus, quod crepusculi tropici æstiu, longius erit crepusculo tropici hyema-
 lis, & quod quodlibet crepusculi septentrionale, longius erit quolibet crepus-
 culo australi, suo relativo, hoc est eiusdem declinationis paralleli, & quod
 crepusculum paralleli borealis erit, maius erit crepusculo paralleli borealis mi-
 noris declinationis, item aperte videbitur quomodo. 17. qui sub æquatore
 veriantur, crepuscula æquinoctialia breuiora totius anni habebunt, quod
 quidem in sphaera obliqua non ita evenit, quamvis ex ijsdem theorematibus,
 facile comprehendı potest huiusmodi totius anni crepusculum, nobis se-
 ptentrionalibus in australi parte reperiri, & hoc plus minusve australe pro-
 ratione altitudinis poli, eo quod decem a omnium dictorum parallelorum sunt
 in ipso mundi axe, admonendo quod consequentia non semper valet, ut si di-
 cas parallelus iste australior est illo, ergo eius crepusculi breuius esse debet,
 quemadmodum septentrionalibus parallelis absq; vlla dubitatione evenit,

quod

quod septentrionalior parallelus semper crepusculū habet longius ab æqua-
tores inchoādo septentrionem versus, quod quidem ex secundo supradicto
rum theorematum quivis elicere potest Sed in australibus parallelis notan-
dum est, quod portionum diametri aliquæ sunt, quæ capiunt cætrum eius pa-
ralleli, & aliquæ non, ex igitur quæ centrum in se habent, per supradicta, mi-
nore arcu n sui circuli capiunt, quam si centrum extra fuisset, sed possibile
est, quod aliqua portio, centrum in eius medio comprehendat, & arcus eius
oppositus maior sit arcu (alicuius alterius paralleli) opposito portioni æqua-
li non continentis cætrum in medio. & hoc evenit cum primus parallelus di-
ctus multo maior est secundo quod quidem exemplo facilius comprehe-
ditur. Sint igitur ut in figura. A. duo cōcentrici circuli. f. c. minor, & q. b. maior,
quorum cætrum sit. o. sitq; medietas portionis. g. n. diametri minoris circuli,
o. i. verò æqualis sit portioni. g. n. quæ quidem o. l. sit diametri circuli maioris,
ductæq; sint æquidistantes. i. b. o. r. t. c. t. & g. f. q. & ad angulos rectos diame-
tris circulorum; sine etiam à centro. o. ductæ. o. b. o. c. o. q. & o. f. considerandū
nunc est utrum angulus b. o. æ. maior an minor sit angulo. c. o. f. cuius rei gra-
tia, dividatur arcus b. æ. per equalia in puncto. r. ad quem à centro ducatur. o.
r. quæ angulum b. o. æ. per equalia dividet, tūc. o. r. locata erit aut inter o. c. &
o. æ. vel inter o. c. & o. b. siue una & eadem cum. o. c. sit ergo primo dividens
angulum. c. o. æ. unde clarè patebit angulum b. o. æ. minorem esse angulo. c. o.
f. eo quod eadem est ratio totius ad totam quemadmodum dimidij ad dimi-
dium, si verò. o. r. divideret angulum b. o. c. contrarium eveneret, sed si eadem
una esset cum. o. c. i. pñ duos anguli b. o. æ. & c. o. f. æquales essent inter se, Atta-
men si caperet aliquis scire cuius magnitudinis oporteret esse circulū mino-
rem respectu maioris, ut anguli dicti essent inter se æquales, videndum est ubi
o. r. interfecat. n. t. in maiori circulo (quod quidem necesse est, nam ex primo
theoremate, arcus b. t. maior est arcu. t. æ. unde punctus. i. erit inter b. & t.)
punctus verò sectionis sit. f. fiat postea circulus. c. æ. qui erit questus.






De crepusculis praxio.

Cap. XXXIII.

Propositus nunc nobis sit aliquis parallelorum cuius crepusculum scire cupiamus, ut si sole existente in æquinoctiali circulo, uoluerimus eius crepusculum inuenire, altitudine poli proposita, tunc illico habebimus arcum $x.r.$ meridianæ (altitudinis æquatoris) cognitum, ex quo eius sinus $x.m.$ dabitur, unde proportio $x.m.$ ad $x.o.$ nota erit, hoc est

F proportio

proportio. e. i. ad. i. o. ei æqualis, sed cum e. i. nobis nota sit (vt finis arcus gra-
 duum. 18.) cognita etiam nobis erit portio. i. o. ex qua arcus ei correspondēs
 cognitus dabitur, cuius finis erit. o. l. cum. o. centrum sit æquatoris, sed cum
 inuenta fuerit. o. l. ceteræ portiones omnium parallelorum nobis cognitæ
 erunt, eo quod omnes inter se æquales sint. Verum cum reliquos arcus pro-
 positum sit inuenire, ita faciendum erit, Esto quod crepusculum tropici hye-
 malis vellet aliquis inuenire, inueniemus primo arcum semidiurnum illius cir-
 culi, cui respondet portio. h. n. vt finis versus, arcus verò dictus sit. h. f. (in pa-
 rallelo. h. f. k. ad partem posito.) arcus verò correspondens portioni. g. n. lit.
 f. f. in dicto parallelo, nunc autem cum. h. f. arcus cognitus sit, eius corda. h. f.
 & fines. f. u. cognitæ erunt, cuius finis quadratus, si à quadrato cordæ. h. f. dē-
 pto fuerit, tunc radix residui, erit. b. u. vel sic, cognito arcu. h. f. complemen-
 tum eius quartæ illico dabitur, idem & eius finis, cui æquatur. n. x. quæ dem-
 pta ex. h. x. totali sinu, remanebit, h. n. nobis cognita, quæ finis versus est arcus.
 h. f. (hec etiam breuior est via). h. g. igitur nobis cognita resultabit ex eius par-
 tibus. h. n. & n. g. cognitis, residuum quoq; g. k. ex toto diametro, nobis datū
 erit, vnde productum ex. h. g. in g. k. dabitur, cuius radix quadrata erit. f. g. si-
 nus arcus k. f. cogniti ergo nobis erunt arcus. k. f. & h. f. à quo. h. f. subtracto
 h. f. cognito, residuus arcus. f. f. nobis datus erit, vel sic, cognito sinu uerso. h. g.
 à quo subtracto. h. x. sinu totali, (si. h. g. maior fuerit vel e contra si minor)
 remanebit. g. x. sinus reclus, cuius arcu addito uni quartæ (si. h. g. maior tota-
 li fuerit, uel e contra si minor) nobis cognitus eueniet arcus. h. f. à quo dem-
 pto. h. f. habebimus arcum. f. f. quæ situm, modo breuiori. non ignorandum
 tamen est, quod cum portio. i. o. nobis cognita exurgit, ipsa à nobis cognosci-
 tur ex partibus sinu totalis circuli maioris in sphaera. ut (gratia exempli) ad
 latitudinem. gra. 45. m. o. portio. i. o. primo cognita, & se ex partibus. 43702.
 talium quatuor. q. o. est. 100000. tunc desumpto sinu complementi declina-
 tionis (hoc est dimidium diametri paralleli. h. k.) partium. 91728. qui quidē
 sinus acceptus postea ut totalis ipsius paralleli ex partibus. 100000. ita pos-
 ita discimus endo, vt si dicas cum à partibus. 91728. proueniūt partes. 43702.
 quæ partes resultabunt à partibus. 100000. resultabunt partes. 43702. pro
 u. g. portionis diametri. h. k. dicti paralleli &c.



De crepusculis alia praxi.

Cap. XXXVIII.





Lia quoq; ratione possumus durationem crepusculi inuenire, quapoterit aliquis horam communem reperire, consequenter etiam & italicam, quamuis hoc ipsum, methodo capitis 16. nacti solis mediante, breuiter possumus cognoscere varietatis etiam potius, quam breuitatis gratia alium huc modum speculatus sum. Sit meridians hic subscriptus. H. b. u. in quo horizontalis sit. H. t. quinodialis verò, E. u. & diameter paralleli solis. b. l. d. f. autem diameter almicantrar, distans

F a per

per gradus. 18. ab horizontali, ductaq; sit. b. d. Tunc. E. H. distantia meridiana æquatoris ab horizonte nobis data supponitur, ex altitudine poli, ut equalis complementi ipsius post altitudinis, & cum E. b. declinationis arcus datus sit, dabitur etiam totus. b. H. à quo dempto arcus. d. H. graduum, 18. habebimus arcum. d. b. eiusq; cordam. d. b. nunc verò demptis arcibus cognitis. d. H. & f. e. ex dimidia circumferentiâ. H. b. e. relinquetur nobis. d. b. l. arcus cognitus, ex quo dempto. d. b. dabitur. b. c. arcus. & ab galus. b. d. f. portionis residuæ ex toto circulo demptis etiam arcibus. E. b. & a. l. cognitis (declinationis datæ) à dimidio g. u. f. La. restabit arcus. b. l. cognitus, cui addito. b. d. habebimus totum. d. b. l. nobis datum, quare & angulum. d. b. l. portionis cognoscemus; habebimus igitur in triangulo. d. b. n. latus. d. b. datum simul cum angulis duobus. d. & b. unde reliquus angulus. n. cum reliquis lateribus. d. n. & b. n. dabitur, sed. b. n. est sinus versus arcus paralleli intercepti à meridiano & ab almucantarat proposito, quo. b. n. subtracto ex. b. a. sinu verso arcus semidiurni, dabitur. a. n. & eius contrapositus arcus in parallelo, ut dictum est in precedenti cap. sed cognito. b. n. ut sinu verso dicti arcus illico cognoscetur hora maturina quæ quidem arcus horæ, demptus ab arcu seminocturno cum fuerit relinquetur tempus crepusculinum. Idem problema perfici potest modis antiquorū inveniendæ horæ, altitudine solis medianre, ut

Apianus scribit propositionē octuagesima, & Orisaldus trigesima-septima.



De hylis compendios, Cap. XXXV.




Ed ex 3 a cap cognita e i. ut sinu graduum 18. cum angulo o. o. i. co-
 plementi altitudinis poli, & e. i. o. altitudinis ipsius poli, cognosce-
 tur. o. i. v. sinu arcus equatoris, relique vero equidistantes linee o. i.
 dabunt arcus. sinu circularum, vt supradictum est.

De ipsdem



Non pretereundam cenſeo viam triangulorum ſphaericorum. Sic igitur
 meridians q. p. equator verò t. d. parallellus autè diei n. a. cuius n.
 n. fit arcus ſemidiurnus, cœtrum ſolis ſit. c. ſub orizonte, à quo diſtet
 per arcum viſionis e. e. graduum. i ſ. circuli azimuth. c. e. a. & a. ſit polus orizon
 tis, ideſt zenit, vnde arcus. e. e. a. nobis cognitus erit, ſit quoq; arcus. e. t. o. trã
 ſiens per. o. polum uniuerſi, ita quò d. c. t. erit arcus de declinationis dicti paral
 li, quapropter. e. t. o. cognitus etiam erit, ſed arcus etiam. a. o. complementi
 altitudinis poli, nobis cognitus eſt, erunt igitur nobis ex triangulo. a. c. o tria
 latera cognita. o. a. ſcilicet. o. e. & t. a. dempto itaq; a. c. & o. c. ex dimidia cir
 cunferentia graduum. i ſo. habebimus duo reſidua ſimiliter cogni
 ta, quæ quidem cum latere. a. o. efficiunt triangulum cuius late
 ra nobis cognita erunt, quorum vnamquodq; in hoc caſu
 minus erit quarta, ex. 13. igitur primi lib. Copernici
 vel ex. 34. quarti Monteregij dabuntur anguli
 dicti trianguli, vnde angulus. a. o. c. reſi
 dus ex duobus rectis, cognitus re
 ſtabit, & quia angulus. n. o. a.
 iam cognitus eſt ex ar
 cu ſemidiurno. n.
 u. ſimili ar
 cui. d. ſ.
 æquatoris, ergo angulus. u. o. c. reſiduus, cum
 eius arcu. ſt. æquatoris, ſimili arcui.
 u. c. paralleli inter ſolem,
 & orizontem,
 cognitus erit.



De utilitate horarum communium,
Cap. XXXVII.



IRacturi nunc de diei ipsius divisione, ab ea quæ est diei naturalis sumemus initium, præcipueq; sphaeræ rectæ, quæ vulgato nomine horarum communium appellatur, cuius rei hæc est causa, quod Europæ maxima pars, Italia Boemiæq; dempta, eiusmodi horis utatur. imò & ipsi Arabes, & si uellint nonnulli ordinem horarum quibus Italia utitur in Egypto quoq; Ieruzalem, ut que tamen utilis admodum est, quamuis Italicum ipsum commune, utilitate longe antecellat, qui etiam magis naturalis uidetur, ut situs quoq; cœli, respectu eorum qui in terris degunt, magis naturalis iudicatur sphaeræ rectæ, quam obliquæ, atq; illæ hoc natura prior, ut etiam æqualitas inæqualitatè, rectitudo obliquitatè præcedunt, proprius enim illa ad unitatis terminatæ finitæque

rei simplicissimam naturam accedant, hæc uero ad multiplici-
tatem, indeterminatum, & indefinitum quid desistant cõstituantur itaq; habitatores sphæ-
ræ rectæ, hi toto anno diem naturalem duplo maiorem habebunt artificiali,
pariter diem artificialem perpetuò æqualem nocti, ut cuilibet manifestũ est.
quare iusta ratione factum est, ut partes diei per se, partes etiam noctis sepa-
ratim cõputarentur, absq; ulla permixtione, cum nullã utilitatem afferat diur-
nas partes nocturnis copulare, cum longitudinis utriusq; perpetuam cog-
nitionem habeant, arcu diurno nunquam uariato, itaq; si cõstituerimus homi-
nes ad labores accedere, cum primũ sol in ortu ab horizonte egreditur, de-
derimusq; usq; ad prandii tempus, quatuor horarum spacium, ut ubiq; obser-
uatur, manifestè patebit toto anno pransuros homines decima hora post no-
ctem mediam. Quod si à prandio in cenam usq; laboribus, duplum interual-
lum horarum scilicet octo concesserimus, quod passim iustèq; cõceditur, cla-
rè patet elucefcet cenaturos eos toto anno hora sexta à meridie, idq; sem-
per in ipso solis occasu, subseruiente crepusculo, rursus, à cena usq; quo dormi-
tam eant, horæ quatuor permittuntur, quare cubitum ibũt hora decima post
meridiem. At uerò in parallelis extra equatorem sole existẽte, in sphæra obli-
qua, cum toto anno in ortu occasusq; solis, hic ordo concordari nequeat, ob
diurnorum, nocturnorumq; arcuum inæqualitatem, quod semper & toto or-
be terrarũ. temporis interuallũ quod est à meridie in mediã noctẽ, æquale
sicuti quod à mediã nocte in meridiem, idem profus præstante meridiano cũ
diurnis parallelis, quod orizon rectus, eos enim semper per me dium fecit, ual-
de fuit cõsentaneum rationi, regulam ab illo sumere, uelut ab horizonte re-
cto, eòq; amplius quod natura homini institum uideatur quodãmodo, ut
quo loco & quando poterit, recto potius quam obliquo se se orizonte regat;
addidi non sine causa, quo loco, quandoq; poterit, quod sint aliqua quæ sine
diuinis solis radijs ac lumine difficillimè percipi possint. hoc in Italia perspi-
cimus, in qua: nunquam eiusdem horæ ordo seruetur quatuor prædictarũ rerũ
si somnum matutinum attendamus, diuersis anni temporibus, nos euigilare
inueniemus, exempli gratia, mensẽ Iunio serè semper expergiscemur intra
decimam undecimanq; à præcedente occasu solis; hora nempe una & me-
dia à solis ortu, æquinoctiorum temporibus circa solis ortum, duodecima
nempe hora à præcedenti occasu, mensẽ Decembri hora serè quartadecima.
Hoc tamen uerissimum est quæq; in Italia suo modo in his esse uariũ, neq;
ullum ordinem regulamq; seruare, prandij, cenæ, euigilationis somni. Ple-
risq; in locis Italicis à festis diui Martini usq; ad Pascha nocte coenam sumũt,
die uero Paschatis nullo intermedio, cenare inci piunt hora uigesima secunda,
qua ratione, supradictæ quatuor absq; regula mutant. Tota uerò Hispania,
Gallia, Cermania, Britãnia, pulcherrimo ordine regitur, quod ducent sequã-
tur

rum hi populi ipsam meridianam, & quam iustitiam possunt incolis ipsarum re-
cta, similes esse doceant. Vereres Romani hunc ordinem egregium ser-
uabant, incipiebant enim à media nocte, qui respectus idem erat ad meridia-
nam, vel ad rectum horizontem, nõ obliquum, & recte hinc, ab illius noctis
media sunt bñt initium, unum in ita, cui principium fecerunt tempus il-
lud quo sol ad nos accedere incipit, atq; ita intelligere simili modo voluerit
dicere naturalem, originem, principiumq; habere, in eõ ipso puncto, à quo re-
cedens sol incipit nostro hemisphærio appropinquari, ut si illarum horarum
ordo ab his nostris communibus nullo pacto differat, quas sequutus quilibet
tempus suorum laborum & operum exactissimè, & citra laborem ac sensum
in dies commutat. Ijs autem hominibus tantam loquitur qui cum iudicio &
ex regula viuunt non fortuito & temerariè.

De utilitate horarum Italarum. Cap. XXXVIII.

Itinus de communium horarum utilitate, agendum nunc est de ea
quæ ex Italicis horis percipitur, hæc autem vnicæ non est, sed maxi-
mas sectum afferunt Italicæ horæ utilitates, a gendarumq; rerum op-
portunitates, atq; illam vel maximè quod hac ratione citissimè cognoscere
possumus, quor horæ quolibet instanti diei usq; ad solis occasum supersint,
quæ res iteragentibus & artificibus, qui miro solis lumine egent, maximè af-
fert oportunitatem, estq; per commoda verum illud tamen est, hoc immedia-
te hominibus non innotescere, cum sine necessarium numerum subtrahere ho-
rarum, ex numero vigintiquatuor, propterea quod præteritarum horarum
numerus, nihil aut per partem adiuuenti afferat, ut iam ea utilitas quam præ-
bere potest exigua raraq; sit, itaq; melior esset cognitio, via retrograda, quæ
directa, viæ nempe subtractionis, & cognitio futuri temporis immediata,
quo perpetuo indigenus. Quid enim prodesset nobis scire uixisse nos annos
vigintiquinque, triginta, quadraginta, aut sexaginta, cum scire possumus spa-
tium futuræ uixisset certe utilius multo, reliquum nobis tempus nosse, quæ
præteritum, quo iam amplius nihil peragere possumus. Neq; hæc dico quasi
non recte factum sit præteriti mensuram exactam tenere, quæ ratione eo pri-
uemur, multo tamen utilius est futurum quam præteritum scire, quare illud ef-
ficere uolo si in solaribus horologis italicis, numeri constituerentur contra
communem usum, & antea fuerit semper, abiq; vno discursu quilibet tanquæ
in primum obiectum intelligibile intuens reliquum diei à quolibet puncto
in occasum usq; solis perciperet, exempli gratia, collocaudo in linea viginti-
quatuor horarum, signum quod vulgo zero dicitur, & in ea quæ est viginti-
trium, signum unitatis, in ea quæ est vigintiquatuor, binarii, in ea quæ est vi-
gintivnius, ternarij, atq; ita deinceps, hac ratione circa aliquod suppetatio-
nis ge-

nis genus, immediate scirent homines quantum d'iei laboribus superesset. Ipsa natura sanè, non in occipite, sed inincipite oculos non sine graui causa collocauit, ut pari ratione necesse sit omnes nostras cogitationes in futurum tempus ferri, atq; ita partiri, & ad proportionem reuocare omnes nostras actiones, & effectiones, non ex præterito sed futuro, præteritum enim nunquam refluxurum effluxit, nobis tantummodo profuturum ut exemplum sit eorum quæ futuro tempore possant accidere. Perpetuus ille instantis fluxus, si ita loqui fas est: nunquam retrogrado pede fertur, sed semper directo & in momenta singula futurum in præteritum commutat, uel ut melius dicamus, absumit futurum, & in nihilum quodammodo redigit, instar ignis qui cordi tormentariam sclopætarum, aut lichnum candele absumit quare rectè dicere licet, futurum potius quam præteritum aliquid esse, futurum etenim tandem aliquando præteritum erit, eo saltem momento indiuiduo ad quod pertingimus, præteritum autem in ipsa tota futura æternitate, neq; est, neq; præteritum futurum est. Sed ad id unde digressi sumus redeamus, rursusq; de utilitate percepta, ex cognitione reliqui temporis usq; ad solis occasum tractemus. Censeo igitur utilissimum futurum ob iam dictas rationes, modumq; horarum communem, si in uno eodemq; horologio uterq; modus describatur. Quod facile fiet si lineas horologii italici nigro, communium horarum, rubeo, insciamus, ex quo alia etiam utilitas enascetur, scire etenim qualibet hora poterimus, quam longa breuiusq; sit dies, atq; id facillimè hac uia, constituamus, exempli gratia, extremitatem umbræ gnomonis signare uigesima primam horam italicam, & quartam à meridie horarum communium, detrahendo igitur de uigintiuna, quatuor, remanebunt septemdecim, quare decima septima hora italica, dicemus fuisse meridiem, & arcus semidiurnus erit septem horarum, cuius duplum erit quatuordecim, hinc nox erit decem horarum, & medietatis quinque, idem cum partibus horarum perfici poterit.

Iterum de horis communibus.

Cap. XXXIX.

Quod uerò ad horas cões spectat, cū dētur mane horæ quatuor à tpe quo surgimus in prædiū usq; octo à prædiū usq; in cenā, rursus à cenā quatuor, usq; quo cæmus cubitū, si qs uellet hac rōne posset plicere designādo hora sexta matutina charactērem quaternariū, septima ternarij, octaua binarij, nona unitatis, decima deinde octonarij, undecima septenarij, duodecima senarij, tum hora prima à meridie signando charactērem quaternariū, secunda quaternarij, tertiā ternarij, quarta binarij, quinta unitatis, sexta postea quaternarij, septima ternarij, octaua binarij, nona unitatis, decima uerò post meridiem signum octonarij tempus somni designantis, qua ratione etiam horologia, quæ rotis aguntur ita construui possent, ut hoc ipso ordine horarum, signum dent .

hoc

hoc tamen multis fortasse non effec̄ commodam, sunt enim pleriq; qui ita sunt corpore constituti, ut septem horarum somno contenti sint, alii sex, alii quinque, tantam, alii etiam novem, aut decem somni horas exigant, quos reliquas actiones mutare necesse est, ut iam non sit opus uel minima in re horarum communium ordinem variare, eoq; amplius, quod ordo eiusmodi cognoscendę longitudinis diei noctisq; sit accommodatissimus, diei quidem vesperere sub occasum solis, noctis mane in ipso orto, & si non omnino precipite, orationes à me primo capite adductas.

*De utilitate horarum ab ortu solis.**Cap. XXXX.*

 **V**od verò ad horas quę ab ortu solis numerantur pertinet, quibus Turę, Perę, Norimbergenſes utuntur, eandem ferè illis commoditatem præbent, quam reliquis horę communes, aggrediuntur enim suos labores, ab ortu solis quarta hora deinde elapſa prædent, duodecima cum effluxerit coenant, decimaſexta dormitum concedant, qua in re ſimiles illę horę ſunt, horis communibus, diem igitur toto anno traducunt exactiſſima ex regula, multò quam nos in Italia melius, quibus tamen prompta illa facultas deest reliquum diei cognoscendi, ut etiam in iis regionibus quę horis communibus utuntur. Etenim circa præcedentium dierum obſervationem, longitudinem præſentium cognoscere nequeunt, & ſi horarum communium ordo magis ſit naturalis, ut potè qui ſimilior ſit illi, qui eſt in ſphæra recta, quod facile deprehendi poteſt ex ſomno quem in diebus Junii maratino tẽpore ſentimus, cum menſe Decembri ante ſolis ortum maxima hominum pars, ſi non omnes, ſomno libera ſit.

*De utilitate horarum temporalium.**Cap. XXXXI.*

 **E**d quod ſpectat ad horas temporales, quas vocant, aut planetarias, aut alio nomine inęquales, quę diem, noctemq; in duodecim partes æquales diuidunt, alia certè utilitas ex hæ nō percipitur, quam quod per hæ, de minium cuiuſq; planetę, qualibet hora cognoscere poſſimus: ſcire etiam partem diei propriam, ut duodecimam, ſextam, tertiam, quartam, dimidiam, duas, tertias, tres quartas, quinque ſextas, & ſi quis etiam vellent ita loqui, quinque, ſeptem, & undecim duodecimam.

MORE Babilonicae minus sunt caeteris omnibus utiles, eo quod minus sint regulatae, unam enim horam vocat singulos quidem circuli adus zodiaci ab oriente in oriente egressos, incipiendo à solis ortu.

De ijs quae capitibus sequentibus continentur. Cap. XLIII.



His itaq; horis praetermissis, ut ad propositum redeamus, ab oriente si horologio horarum communium sumemus initium, id tantum amicis novarum inventionum manifestaturi, quod nos diuersis temporibus, diuersisq; occasionibus excogitauimus, non quod ab alijs inuentum excogitatum esse (neq; enim rectè factum puto, si alienis inuentis, quispiam sua uoluntate impleat, aut oneret,) nec tamen passim quempiam in errore versari. Sed si quid ab alijs peccatum fuerit, erroribus notatis, ueritatem ipsam patefaciam. Itaq; praetermittam horologia muralia, orientalia, & occidentalia communia, quae sunt ab alijs factis, superq; tractata; idem faciam de horologijs sphaericis rectis, quae lineas horarias omnes parallelas habent inter se, ut ipsa orientalia, & occidentalia muralia. Idem de ijs quae polaria dicuntur, quarum linea horariae, circulum in uiginti quatuor partes aequales diuidunt nec tractabo de chylindris, alijsq; plurimis instrumentis, cum in his explicandis copiose antiqui uersati fuerint, ea tantum proponam, quae à me uariè, & ab antiquis diuersè excogitata, & speculata fuerunt; examine nõ praetermissis eorum, quae ueteres sunt contemplati.

De horologio communi orientali. Cap. XLIII.



Vm igitur proposuerimus horologium commune orizontale describere, breuiori modo quam haecenus ab alijs traditum sit, supponatur primo, g. b. linea meridiana, in plano parallelo orizonti, & b. sit meridiem uersus. g. autem uersus septentrionem supra quam g. b. describitur quarta. g. b. r. quae quidem quanto maior fuerit, tanto exactior erit, diuidaturq; eius circumscriptione in sex partes aequales, mediantibus punctis p. d. o. n. c. ad quae à centro ductae sint semidiametri, g. p. q. d. e. g. n. g. c. quo facto ducatur linea. p. e. parallela lateri quantae, hoc est semidiametro. g. r. distans ab ipsa. g. r. quantum libuerit, quae. p. e. diuidetur à semidiametris iam productis, puncta uero diuisionum sint. p. q. s. a. y. c. accipia-

accipiatur postea arcus .x. altitudinis poli, & à puncto .x. ducatur .x.g. que erit vice dimidij axis mundi, & ubi hæc linea secabit parallellam .p.e. notetur punctus .t. accipiamur postea in meridiana .c.f. æqualis .g.t. & à puncto .f. ducantur per puncta .p. q. l. u. y. lineæ indefinitæ quantitatis & sic habebimus lineam .f.c. meridianam, lineam verò .f.y. primæ post meridiem, vel undecimæ horæ post mediam noctem lineam autem .f.u. secundæ, vel decimæ horæ, lineam deinde .f.f. tertię, vel nonæ horæ, lineam postea .f.q. quartæ, vel octavæ horæ, lineam denum .f.p. quintæ, vel septimæ horæ, quæ producta ad partem .f. dabit horam quintam matutinam vel septimam vespertinam, & per .f. ducta parallela lineæ .g.r. & producta versus .f. erit linea horæ sextæ, sed si horologij hoc transferendum fuerit ad alium locum auxilio regulæ circiniq; sit exempli gratia locus in quo delineandum est horologium .B.D.E.C. in cuius medio describatur circulus, cuiusvis magnitudinis, cuius diameter .= o. sit linea meridiana, verticalis autem .Q.o.Q. quæ horæ sextæ erit, & = sit ad partem septentrionalem, immoto postea circino, lineetur arcus .z.h. circa centrum .f. primæ figuræ, notando puncta communia lineis horarijs & arcui .z.h. quæ quidē puncta sint .l. t. l. m. z. quo facto incipiendum est à puncto meridiano .= circuli iam designati secundo arcus .= i. ad utramq; partem æquales arcui .h.i. & = k. æquales, arcui .h.k. & = l. æquales arcui .h.l. & = m. æquales arcui .h.m. & = n. æquales arcui .h.n. à quibus punctis ad centrum .o. ducantur lineæ, quæ horariæ erunt, protrahis .z. o. ut uidere est in subscripta figura, quæ horizontalis horologij communis est, sed si libuerit verticalem describere, nihil aliud mutandum erit, nisi quòd loco .e. f. æqualis .g.t. accipiemus .e. f. qualem lineæ .t.M. ductæ à puncto .t. perpendiculariter ad .g.t. & terminata ab .g.r. in puncto .M. & ab axe in puncto .t. gnomon autem si desideretur, ut hylus, uideatur primò quo in loco lineæ meridiane cum figendum esse quis uoluerit, ponatur ergo quòd in R. & accipiatur distantia .o. R. in linea .p.e. à puncto .t. (axis mundi) versus .p. quæ quidem sit .z.R. à quo puncto .R. erigatur perpendicularis .R.T. ad .e.p. vsq; ad axem mundi quæ quidē .R.T. erit gnomon horologij horizontalis, à cuius extremo .T. (cuius in loco plantatus fuerit) ad centrū .o. si ductum fuerit filum illud erit loco axis mundi, cuius umbra mediante poterimus etiam horas cognoscere, sed sine filo, extremitas tantummodo umbræ gnomonis nobis insinuet. Verū nemini hæde rem uti stylo tantummodo, nisi lineæ terminatæ fuerint ab hyperbolicis tropicorum, que in modum docebimus. In verticali verò horologio, si quis simplicem styllum uoluerit, supponatur quod .T.R. sit distantia propofita à centro horologij ad pedem gnomonis, tunc .R.t. erit longitudo ipsius gnomonis, ac si quis desumeret distantiam dictam in linea .g.b. à puncto .g. versus .b. à cuius extremo ducta fuisset parallela ad .g.r. vsq; ad axē, tunc ipsa esset longitudo styli,





MI autem superioris capitis modus, bonus, imò exactus esse cognoscatur, effigiemus meridianam, a, b, c, d. in quo horizontalis linea sit, b, d. verticalis, a, c. axis mundi, q, p. æquinoctialis, x, k. communis sectio planè horologij & meridiani sit, r, t. quæ, r, t. sit parallela, b, d. distans ab ea quantum voverimus. Hæc, r, t. erit meridiana in plano horologij, & punctus, t. erit communis omnibus, lineis horarijs horologij ipsius, quæ sunt communes sectiones circulorum horariorum cum plano, dæctæ per punctum, t. pertranfibit communis sectio æquatoris cû iam dicto plano, qui quidem æquator, cum fuerit diuisus in viginti quatuor partes æquales à circulis horarijs communibus, quarum sectionum communium dicit æquatoris dictorumq; circulorum, plurimæ in iisdem punctis communicabunt lineæ quæ per t. transit, quam dixi esse communem sectionem æquatoris cum plano horologij, per quos lineæ horariæ feruntur, ut facillè ex figura, B. C. comprehendere potest, tunc o, r. erit gnomon perpendicularis plano horologij, & o, r. axis mundi, cuius umbra lineas horariæ poterit designare. Videmus igitur an præcedens modus cum hæc speculatione concordet, nemini iam dubium est, quemlibet triangulum similem, o, r, t. id ipsam præstaturum in eiusmodi elevatione poli, sumpta proportionali ipsius, o, r. pro semidiametro æquatoris horarij, & proportionali, r, t. pro semidiametro horologij, & proportionali, o, r. pro axe gnomonico, consideremus igitur an triangulus, e, t, g. præcedentis capitis pro orizzontali, similis sit triangulo, o, r, t. subscripti meridianæ, suppositæ una eademq; altitudine poli, manifestum est angulum, e, t, g. (æqualem angulo, x, g, r. precedentis capitis) futurum æqualem angulo, p, r, t. qui æqualis est angulo, p, o, d. præsentis: angulus deinde, e, illius, est rectus, ut etiam angulus huius, o, rectus est: itaq; tertius angulus vnus, æqualis erit tertio angulo alterius, hinc latus, g, e. illius, proportionale erit lateri, o, t. huius, ut latus, g, t. illius, proportionale est lateri, r, t. huius axis gnomonici ad ipsam p se patet. Idè dico pro verticali horologio, ducta prius, r, t. parallela verticali, a, c. Quæ verò prædèti capite semidiametrum, g, b. supposita loco semidiametri æquatoris horarij, loco videlicet, g, e. hoc de tantillum quidè variat effectiorem, imò verò id feci, quod hæc ratione, exactius sectiones fiant, sufficere lineam, e, p. distare à g, r. per, g, e. & operi incumbatur, eiusmodi distantia, omnia regulare. Quare Orontius fallitur summo opere, cum loco lineæ, g, e. indifferenter ad omnes mundi polos sumit quartam partem axis mundi, ut ex secundo capite horologiographiæ ipsius patet. hoc enim non nisi fortuito potest accidere polo, 45 sumpta eius, A. H. pro semidiametro horologij, loco, g, t. aut, f, e. præcedentis capitis.


De horologijs communibus muris, ex methodo distincta.

Cap. XLVI.

NVnc cum desiderem via vniuersali, & modo proprio scientiæ, muralia horologia obliqua communium horarum delineare, quo distinctè progrediar, sumpto initio à muris meridionalibus, siue orientalis meridionalis, qui versus eiusmodi quartam orientis vergat. Quare sit hic subscriptus orizon, diuisus à meridiana, & verticali, in quo communis sectio muri, cum ipso orizonte sit. *o.* & plantatus autem gnomon in eo, sit. *g. n.* propositum murum nobis representet. *e. t.* in quo. *e. n. o.* linea sit orientalis, *e. o.* sit meridiana muralis. *n. g.* gnomon, hinc imaginaria seu occulta. *g. o.* erit meridiana orientalis, occulta. *g. t.* verticalis orientalis erit: atque ita iam punctus. *o.* communis erit orientali murali & sectioni æquatoris cum muro. Ad inueniendum autem dictum punctum. *e.* in linea orientali muri data reperitur tantummodo distantia. *n. o.* inter gnomonem & meridiana, distantia occulta. *g. o.* sumenda erit (quæ est meridiana orientalis, & transferenda in circulum orientalem, & collocanda in semidiametro septentrionali, inchoando à centro, supra quam. *g. o.* ducatur semicirculus. *g. n. o.* in quo à puncto. *g.* centro collocabitur gnomon. *g. n.* sit à puncto. *o.* linea. *o. n.* deinde à puncto. *o.* ducetur linea. *o. n. t.* quæ terminabit distantiam. *n. t.* à pede gnomonis, & *g. t.* ab æquinoctiali orientali. Admonitum inrerim queri que uolo, si forte gnomon aliquando ita longus fuerit ut ex eo cætera distantie, ob earum longitudinem, incommodè reluctarent, tunc sumenda esse mediâ partem gnomonis, aut tertiam, aut quartam; ita etiam reliquarum omnium que referre supra murum eo numero multiplicabentur, quo fuerint diuisæ. Quo perfecto, seorsum fingatur meridiana, in quo ducta sit orientalis. *g. o.* axis mundi. *g. e.* æquinoctialis. *g. t.* sumatur deinde ab orizonte. *g. o.* meridiana orientalis, & mensuretur in medietate septentrionali lineæ orientalis in circulo meridiano, tunc ab ipsius puncto. *o.* ducatur perpendicularis. *o. e.* orientalis, usque ad intersectionem ipsius cum axe mundi & æquinoctiali in punctis. *e.* & quod semper accidit, præterquam in sphaera recta vel sub ipsis polis, quare linea. *e. o.* erit communis sectio muri cum meridiano, muri scilicet meridiana, distantia autem puncti. *l. a. b. o.* erit æquatoris in meridiana murali, ab orientali, quæ transferretur in murum, in quo ducetur linea. *l. t.* quæ erit communis sectio æquatoris cum muro, respectu gnomonis. *g. n.* in meridiana deinde murali, transferretur linea. *o. e.* meridiana, quare punctus. *e.* in muro, centrum erit linearum horarum.

H

Describatur deinde tenius circulus qua libuerit amplitudine, qui quo maior fuerit, eo melior erit, qui denotet æquatorem, cuius dimidium in duo decim partes æquales secetur, ductis eius semidiamentris à centro. g. in quartâ vna transferatur. g. t. horizontis in altera verò (quæ cum g. t. angulum rectum faciat) transferatur. g. s. meridiani, tum per duo hæc puncta. i. t. ducentur linea indefinita, quæ à semidiamentris interfecabitur: in quarum intersectionum punctis, collocabuntur hoc modo horarum numeri, in puncto. f. signabitur numerus. 12. & in t. numerus. 6. ceteri suo ordine procedant, ut ex sequenti figura patet, quo absoluto, inchoabimus diuisionem æquinoctialis muralis, ab uno punctorum. f. aut. t. eodem profus pacto, quo fuerit diuisa linea. t. f. quæ per tertium circulum, æquatorem videlicet, transferrim feritur. Per puncta verò diuisionis, à puncto. e. meridiane ducentur lineæ rectæ, eo numero, & longitudine, qua libuerit, descripto circa punctum. o. aut punctum. e. arcus circuli prælibito, horum deinde ut à puncto. e. in extremum usq; gnomonis, linea ducatur ex materia valida fortissq; quæ sit. e. g. quæ subleuet uiz axis gnomonici. Etenim umbræ styli extremitas interdum deflicere possêt, dum lineæ horariz suis hyperbolicis non terminantur.




De hysdem super omni pariete.
Cap. XLVII.



Qvod haecenus de muro orientali meridionali dixi, idem eodemq; modo de occidentali meridionali dicendum est, neq; vlla alia in re differt quam hac, vt enim meridiana muralis dextrę nostrę manui re spondet à gnomone perpendiculari in muro, in muris orientalibus meridionalibus, ita in occidentalibus meridionalibus, prædicta meridiana sinistrę re spondebit. ceteris in rebus planè conueniunt. Idem perficietur in muris quar tarum septentrionalium, excepto quod vniuersà e contrario collocabuntur, scilicet in secundo circulo meridiano constituetur axis mundi. g. l. & g. e. equinoctialis, quare in muris punctus. l. centrum erit linearum horariorum, linea vero. e. t. erit equinoctialis muralis. Quamquam autem linea. l. c. meri-


midia, hinc sumemus in linea *g. p.* punctum *o.* ita remotum à *g.* ut punctus *o.* ipsius *g. u.* distat ab eodem *g.* & ab ipso *o.* ipsius *g. p.* ducebimus lineam *f. o. e.* perpendiculararem *g. p.* ducebimus deinde *f. t.* à puncto *f.* ad punctum *e.* quæ erit communis sectio æquatoris cum muro proposito, nondum tamen in debito situ. Diuidemus postea quartam *o. u.* in sex partes æquales, & ad unquamq; diuisionis punctum, à centro occultas lineas ducebimus, quæ lineam *f. t.* in tot partes diuidant, quot fuerint in circumferentia *o. u.* quo factio sumetur punctus *T.* ita distans à puncto *g.* ut distat *t. ab. o.* in linea *t. n. o.* & aperto circino quantum *t. f.* sequitur, immobiliq; permanente uno crure circini in puncto *T.* altero signabitur punctus *f.* in meridiana sub *g.* ducentiq; linea *T. f.* quæ diuisa in tot partes æquales illis quæ sunt in *t. f.* & sumpto puncto *E.* in meridiana, adeo eleuato supra *g.* in muris quartarum meridionalium, ut *e.* alter re peritur supra *o.* linea *e. o. f.* à puncto *E.* postea per puncta linea *T. f.* tot lineæ ducentur, quæ erunt lineæ horariz. Verum in muris septentrionalibus, sumetur dictus punctus *E.* sub horizontali, punctus autem *f.* supra collocabitur. Quod si protracta linea *t. f.* scicari poterit ab aliqua occultarum ex altera parte meridianæ, aut à parte ipsius *T.* aut *f.* rectè scindetur in quot partes fieri poterit, quod ego in sequenti figura feci, mediante linea occultæ *g. x.* ex parte ipsius *f.* quod ipsam ex altera etiam parte fieri poterit. Porro huius effectiõnis consideratio, ex capite. 46. tota dependet. Quæ enim hæc videntur esse permixta & confusa, ibi distincta cernantur, tuncquæ hæc & illa via ad eundem terminum perueniatur.



*Examinatio (circa eandem operationem) modi antiquorum, secundum quem
 omnia ferè horologia communis muralia totius mundi fabricata
 sunt. Cap. XLIX.*



Nūquā mōdus designandi horologiā muralia horarum
 communium, perpulcher admodum esset, ni defligeret,
 sepeque falleret; ut manifestè cernitur apud Munsterium
 cap. 15. & 16. & 13. Orontij libris horologiographiæ, al-
 liosq; nonnullos. Patet enim antiquos (à quib. Orontius
 & Munsterius, ac ceteri didici auctores eiusmodi proble-
 ma sumant) non caluisse huius effectio nis perfectam theo-
 riam, aut præcipuè, tū quod ducant illi lineam. B. k. vlg; ad punctū. F. quod ne-
 cessarium non est, imò verò ferè semper impossibile, tum quod sumant lineā.
 A. K. æqualem. H. I. & K. L. æqualem. A. I. ex quo erratur in omnibus. Nos igitur
 eiusmodi problema ad perfectum deducemus hac via. Sint supra summi
 propositi



Comparatio modernum capitum praecedentium. Cap. L.




*A*m praecedentis capituli opus idem substantia esse cum eo quod 46. cap. tradidi patet; in praecedenti enim linea. G. F. hoc est. B. A. est linea. e. o. in meridiano, & in muro. 46. capituli, & A. G. hoc est. A. H. praecedentis, est. g. o. dicti capituli, & angulus. H. A. L. praecedentis, est angulus. g. o. n. 46. & A. I. scilicet. A. K. praecedentis, est. n. o. 46. & H. I. hoc est. K. L. praecedentis.

precedentis, est. g. n. 46. & B. K. precedentis, est. e. n. occulta ducta ex punctis supra murum. 46. & B. L. precedentis est. e. g. imaginaria extra murum. 46. una videlicet pars axis mundi. Hactenus fortiter antiquis confendi, præterquam in ijs quæ à me superiore capite dicta fuerunt, neq; enim aliquem adhuc videram huiusmodi materię tradatorem, quod mihi quoq; circa Ptolomei Analem accidit, casu enim factum est, vt cum eorum nullis in rebus concordarem, ne tamen si aliqua in re non consentirem, mutare volui vel tantillum à me inuenti proposui, vt nec nunc etiam à proposito desisterem, ea in re qua ab antiquis dissentio, & si rectè fieret quod faciunt, hoc inquam, cum enim concordemus, vsq; ad lineam. B. L. quæ in mea figura est. g. e. constructo à me. g. centro mundi, & extremitate gnomonis horizontalis. g. n. fixi perpendiculariter in muro, mediante deinde. g. c. horizontali æquinoctiali sex t; hor; g. f. meridiana æquinoctiali duodecim; simul perpendiculariter applicatis, formatoq; triangulo rectangulo. t. g. l. in superficie æquatoris, cuius. g. centrum, mundi etiam centrum est, duco imaginatione perpendicularem basi pro semidiametro æquatoris, quamuis ego æquatorem ampliore multo describam, quo exactius in partes debitas diuidatur, quæ supposita linea. A. K. precedentis capitis (quæ in 46. est. o. n.) communi sectione muri cū horizonte (ut idem fiat præcedenti capite, quod à me factum est quadragesimo sexto) si vulerimus. A. K. horizontalem muri remanere, gnomonem, aut perpendicularem muro: esse amplitudinis. K. L. fixi in puncto. X. cuius vmbre extrinsecus, æquinoctiorum temporibus, æquatorem demonstrat, doceamus. L. x. perpendicularem ipsi B. L. vsq; ad conuexam cum dicta. B. K. in puncto. X. quæ pars erit communis sectionis æquatoris, & vnus circuli horarij cõmunis, qui perpendicularis sit muro, ducta deinde à puncto. X. perpendiculari ipsi. B. X. extensa supra muri superficiem, quam punctis notau, hæc erit communis sectio æquatoris cum muro, & L. X. semidiameter æquatoris horarij, quoniam autem superficies trianguli. B. L. X. muro perpendicularis est, ex. 18. v. decimi Eucli. 17. & communicat cum muro mediante linea. B. X. iccirco sumpto à puncto. X. versus. B. puncto vno adeo distanti ab. X. vt. L. ab eodem. X. distat, qui sit centrum circuli quantumlibet ampli, æquatorem horarium habebimus. Antiqui verb, communem sectionem æquatoris cum muro traiciunt per punctum. K. quare perpendicularem. K. M. ducunt ipsi. B. L. quæ est proportionalis meæ. L. X. sumuntq; punctum. N. adeo remotum à. K. in linea. K. B. vt M. ab eodem distat, vt ex eo. centrum faciant æquatoris horarij, quod rectè factū est. & ad eundem finem tendit, quoties vulerint vmbra axis mundi. B. L. nulla habita cura, vt in muro, tempus æquinoctij videant, mediante linea æquinoctiali. Verum si vmbra desideremus huius perpendicularis in muro, æquatorem suis temporibus designantem, necesse erit doce-

re. *M. u.* perpendiculararem. *B. g.* & stylum longitudinis. *M. u.* in puncto muri. *u.* perpendiculariter desigere. Recte autem sit cum linea. *R. N. P. O.* ducitur per punctum. *O.* communem muro, meridiano, & æquatori, per centrum. *N.* æquatoris, etenim linea. *O. N.* æqualis est communi sectioni æquatoris cum meridiano, quæ in muro coniunguntur in puncto. *O.* cui à puncto. *N.* ducta perpendiculari, *Q. N. S.* ut linea. *O. R.* est meridiana, & ex consequenti circuli duodecime horæ, ita, *Q. S.* erit æquali horæ sextæ. Dicitum autem iam est punctum. *B.* antiquorum, in muro esse proportionalem meosæ, qui communis est æqi mundi, & omnibus lineis horarijs qui in muris meridionalibus semper est supra orientalem, in septentrionalibus infra, quod nunquam gnomonicè scriptosæ hæcenus aduerterant. Dubium autem esse non potest. *O. N.* æqualem esse illi parti, communis sectionis æquatoris cum meridiano, quæ terminatur à puncto. *O.* æquatorisq; centro, in axi mundi signato, *M.* in collecto triangulo, *B. M. N.* perpendiculari muro, super lineam. *B. k.* cum duobus iisq; *M. N.* & *g. N.* inuisiq; sint æquales & *g. O.* communis ut triangulo. *M. k. O.* ita triangulo. *N. g. O.* & angulus. *M. k. O.* rectus cum statuaq; *M. N.* perpendiculararem muro, & ex consequenti ipsi. *N. O.* quæ est communis sectio æquinoctialis cum muro, ita angulus. *B. k. O.* pariter rectus, quæ ex quarta aut penultima primi Euclidis. *N. O.* æqualis erit ei quæ terminatur ab. *M.* & *O.* basi videlicet trianguli. *M. g. O.* Ut autem pariter manifestè pateat communem sectionem æquatoris cum muro, lineam videlicet. *O. g. L.* semper esse perpendiculararem ipsi. *B. g. X.* in qua est defixus stylus, quæ est communis sectio vnus circuli horarum. communium perpendicularis muro (hoc faciente stylo ex. 18. vndecimi) cum muro ipso, consideremus murum perpendiculararem esse huius circulo, cum hic ita sit muro, cui etiam æquator perpendicularis erit eadem ratione, quia videlicet est perpendicularis æquatori, quare linea. *O. g. L.* (communis sectio muri cum æquatore) perpendicularis erit dicto circulo, ex. 19. vndecimi Euclidis, quod etiam propositum ex secunda definitione prædicti vndecimi patet. Ex rationibus quadragesimo sexto capite adductis alium modum elicio idem præstandi, ut in subscripta figura patet in qua statua. *e. d.* orientalem muri, & *c. h.* gnomonem fixum perpendiculariter in muro, & *e. g.* meridianam muri; & punctum. *d.* verticalis in orientali, & *e. b.* meridianam orientalem, & *b. d.* verticalem orientalem, quæ in *b.* angulum rectum efficiunt. ducò deinde. *e. h. a. b. e.* usq; ad punctum. *h.* in rectitudine ipsius. *b. d.* ita ut angulus. *b. e. h.* æqualis sit meridianæ æquatoris hoc est æqualis complemento altitudinis poli, proinde deinde. *b. e.* inchoando à *b.* mediante termino. *f.* ad æqualitatem. *e. h.* quæ quidem. *e. h.* est meridianæ æquinoctialis; ducò deinde. *d. d.* quæ est æqualis æquinoctiali murali, inter meridianam muralem, & muralem orientalem.

horizontalem : oſducto poſtea circino quantum ipſa longitudo .d.f. requirit ,
 fixoq; altero crure in puncto .d. ſeco meridianam .e.g. in puncto .g. quare im-
 mediate habeo ſitum æquatoris , &c. e.g. equalis erit .b.h. diuiſo deinde angu-
 lo recto .e.b.d. in ſex partes æquales , diuiſionis lineæ æquatoreæ .f.d. diuidet ,
 prout neceſſitas poſtulabit , punctus deinde communis axis mundi & meri-
 dianæ muralis , iam ſatis dictum eſt , quomodo reperiri poſſit , ſed ne nihil
 omnino hic dicamus protrahetur .b.d. verſus .b. indeterminate , & à puncto .
 e. duceatur .e.a. perpendiculari .e.h. viq; quo concurrat cum .d.b. in puncto .a.
 quare .b.a. erit diſtantiã dicti puncti in meridia murali à puncto .e. ſupra
 infra .e. , horizontalem .e.d. prout muri facies , aut ſeptentrionalis , aut meridio-
 nalis fuerit . Vt autem neruum huius operationis planè deſcribam , cum fue-
 rit repercus ſitus .e. & d. punctorum meridianæ & verticalis reſpectu .c. cru-
 ris gnomonis in horizontali .e.d. inuentaq; .e.b. meridia horizontali , & b.d.
 verticali horizontali , aut æquinoctiali horizontali , deſcribetur ſupra .e.b. trian-
 gulus orthogonus eiufmodi vt in vna extremitatẽ .e.b. angulus rectus con-
 ſtituatur , in altera acutus , æqualis meridianæ elevationi æquatoris , cu-
 ius trianguli latus , angulo recto oppoſitum , ſumatur , & ad vnã
 ipſius extremitatẽ orthogonè verticalis , aut æquinoctia-
 lis horizontalis .b.d. applicetur , abſoluaturq; triangu-
 lus orthogonus , cuius latus maius , erit æquino-
 ctialis muralis , definita ab horizontali , &
 meridia murali , & latus oppoſitũ
 angulo altitudinis æquatoris
 in altero triângulo ortho-
 gono , erit æqua-
 lis ipſi . e.
 g. reliqua iam dicta
 fuerunt .

aequales, & angulus o. rectus; quare ex quarta dicti libri a. p. aequalis erit a. p. anguli quoque oppositi aequales erant. In prima igitur figura cogitemus p. b. & in secunda p. T. quae inuicem erunt aequales cum sint cordae quaeque partibus circuli. Iam azimut muri sit m. d. e. r. & o. d. communis & etio ipsius superficiei & aequatoris, & cum fuerit ita superficies, m. d. e. ut quae trianguli p. a. b. utraq; perpendicularis orizonti ex. 18. vndecimi Euclidis, sequetur ex. 19. eiusdem vndecimi u. i. communem sectionem perpendicularem quoque esse dicto orizonti. quamobrem constituto p. centro secundi circuli & p. T. semidiametro, designato R. q. T. arcu, factoque centro a. & a. b. semidiametro ducta circumferentia b. q. à puncto q. communi, utriusque arcus ducatur ad a. lineae q. a. quae aequalis erit a. b. ex ratione circuli, habebimusque angulum q. a. p. in secunda figura, & aequalem angulo b. a. p. in prima, ex. 8. primi Euclidis, descriptoque angulo m. o. p. in centro secunde, & equali eidem in prima, cum fuerint anguli o. p. i. aequales inuicem sequetur ex. 26. dicti p. i. vnius esse aequalem p. i. alterius; idem dico de o. i. ducta postea. V. i. in secunda, perpendiculari a. p. habebimus dictam u. i. secundam aequalem u. i. primae ex eadem 26. aut penultima primi, ducta postea n. l. perpendiculari o. m. sed equali i. n. ducta etiam o. a. habebimus angulum i. o. n. in centro secunde, & equali angulo i. o. n. in centro primae ex. 4. primi, quare arcus m. d. erit cognitus, quod fuit primum propositum, esset enim o. d. eius sectio aequatoris cum muro qui per centrum fertur. Iam si voluerimus cognoscere arcum b. d. & d. p. in prima figura, habebimus p. u. vnius aequalis p. u. alterius, scilicet ex. 1. p. f. partem aequalem. P. u. sit hęc p. g. d. d. arcus quoque o. g. d. quare ex quarta primi, angulus p. o. d. erit aequalis angulo p. o. d. quare arcus p. d. erit cognitus & ita residuum vnius quartae d. b. Ex improposito autem dum hęc cogitarem, breuior alius modus occurrat, ducatur enim m. a. sinus ipsius m. p. & puncto; . a. p. plicetur angulus m. a. & equalis angulo A. o. b. cognito altitudinis aequatoris, & à puncto m. erigatur perpendicularis m. a. ad m. s. ita ut concurrat cum a. s. in a. quare mediante m. a. & m. o. cognitis c. onfundis ad angulum rectum in puncto m. & ducta o. a. angulus m. o. a. erit cognitus; & ex consequenti arcus eius m. d. His ita peractis, cepi inuestigare arcum circuli positionis, quantum videlicet polus mundi ab hoc muri azimut elongetur, constituto c. mundi polo, & o. c. medietate axis mundi, duxi perpendicularem c. r. ad o. y. sinum videlicet altitudinis poli, simpliciter h. distans ab m. quarta una, in orizontali giro, duxi postea o. h. & mente concepi arcum h. c. r. magni circuli transire per polum, c. quare h. erat polus azimut m. d. e. r. & o. h. ipsi perpendicularis & eiusdem axis, & circulus, cuius h. c. est arcus, pariter perpendicularis erat ipsi azimut, & quarta, quare c. r. arcus erat questus, iam si à puncto r. duxero e. k. (quomodo mihi magis uidetur) ad o. h. habebit c. r. & i. k. cognitas & angulum c. c. k. rectum, quare etiam k. c. quam primum erit cognita, & quandoquidem o. k. cognita est utpote terminata inter o. k. & ipsa o. c. cognita, erit igitur angulus c. o. h. cognitus, cuius arcus etiam nobis cognitus erit, & residuus c. r. quem querebamus.



De Analemate ab antore toto excavato & speculato.
Cap. LL.



Cecidimus iam ad ipsa italica horologia atq; sumpto ab
 horizontalibus initio, ad muralia deveniemus, dicentisq;
 ea omnia quæ ante speculati fuerimus, quàm aut in Vi
 truvium incidissemus, aut Ptolomei nondum editi Ana
 lema inspexissemus, cum quor, aliquibus in rebus concor
 dante nos animadvertimus: qd ad Analemati divisione
 pertinet. In qualibet igitur elevatione poli sic aptata la
 mina cinea, aut ex aurichalco, semel tantum, latitudinis varias pedis
 cum dimidio, crassa quantum cuiq; libuerit, neq; enim refert, modo levis
 sit, & perpolita, idq; vtraq; ex parte, in quantum vna describatur circulus me
 ridianus eius loci, cuius axis mundi sit. T. e. diameter æquatoris. K. l. ortu
 K tis. q. b.

tis. q. b. verticalis. m. l. tropici cancri. f. h. ita etiam tropici capricorni, quo facto sumatur diameter tropici cancri, iuxta cuius amplitudinem: ex altera parte laminae, circulus describatur, subleuaturus diei longissimo breuissimoq; anni, hic diameter, huiusce tropici in suo circulo dividatur in puncto. a. ex planè ratione, qua in figura meridiana. f. h. ab orientali dividitur, à quo puncto. a. perpendicularis dicto diametro. f. h. ducatur, q. a. b. quo peracto, à puncto. b. circumferentia tropici, totam circumferentiam in 24. partes aequales diuidere incipimus, quare q. a. b. erit instar communis sectionis orizontis est dicto tropico, & arcus. b. f. q. erit diurnus longissimae diei anni, & arcus. b. h. q. erit diurnus arcus brevissimae diei, itaq; notabimus punctum. b. h. me. 24. horarum proxima puncta ipsi. b. numero. 23. secunda. 22. tertia. 21. atq; ita deinceps, donec vterq; arcus finiatur. Necessè est deinde ab vnoquoq; puncto circumferentiae, lineas perpendiculares ducere diametro. f. h. quae communis est sectio meridiani cum tropico; haec sanè perpendiculares, medietates sunt communium sectionum tropici, cum almicanteras, in quibus sol illis horis reperitur. Quo facto, diametrum. f. h. in meridiano positum, diuidere oportet eo prius pacto, quo diuisus à dictis perpendicularibus est tropici diameter. Exempli gratia, perpendicularis. 23. horarum arcus maioris diei, fecit. f. h. tropici in puncto. r. distantiam igitur a. r. tropici sumemus, quae referre mus in. f. h. meridiano, punctum. r. à deo ab. a. distantem, vt dictum est signando, quod ipsum in reliquis punctis faciemus, quibus in. f. h. meridiani signatis, ducemus per ea puncta totidem parallelas orizonti quae ab arcu. f. l. e. b. terminentur, & ab axi orizontis, hoc est à verticali. l. g. m. de ijs parallelis loquendo quae fuerint sub puncto communi. f. h. & verticali. l. g. m. quod vocetur. u. illae verò parallelae quae fuerint supra. u. à residuo terminentur ipsius. f. h. & à dicta circumferentia meridiani, vnaquaeq; autem parallela suis characteribus notetur. Z. r. o. Hoc peracto diuidatur quarta. f. T. in sex partes aequales, & quot fuerint puncta, tot perpendiculares aequinoctiali. g. l. ducantur, à punctis verò communibus dictis perpendicularibus, & aequinoctiali, totidem parallelae orizonti ducantur, à verticali giroq; meridiani terminatae, quarum quae fuerit orizonti propinquior, erit. 13. & 23. horae quo tempore sol fuerit in equatore, altera erit. 14. & 22. tertia. 15. & 21. quarta. 16. & 20. quinta. 17. & 19. quo facto in linea horizontali. q. b. inter vnam alteramq; diametrum tropici, inueniantur puncta communia diametri. q. b. horizontalis vna cum diametris parallelorum aequatori, in quibus cum fuerit sol, illi orizonti, in extremo instanti horae prodeat, vt nunc, (exempli causa) volui eleuari polum supra orizontem. 39. graduum quare maxims anni die, cum descriperit tropicum cancri, orientur hora nona cum minutis. 16. vt in subscripto tropico, geometricè videre fas est, quamuis & alijs vijs id ipsum certò sciri poterit, itaq; cum voluerimus punctum

pro meridiano, cogitemus punctum. f. principium cancri, & oppositum capricorni, ac ducatur occulta diameter. f. g. 3. & à puncto. f. in diametro dicto, sumatur distantia. l. d. quæ vocetur. f. d. & per punctum. d. huius diametri (quæ est eclipticæ) occultè ducatur parallela æquatori, quæ paralleli quælibet erit diameter, hæc, punctum decimæ horæ quantum in orizzonti monstrabit: cuius rei speculatio apertissima est, quoties mente conceperimus, tum eclipticam, tum parallelum solis illius diei esse perpendicularia coluro solstiorum, quare communis sectio eclipticæ cum parallelo, quæ est. t. d. perpendicularis reperitur in puncto. d. ipsius. f. 3. coluro ipsi, per. l. 9. vndecimi. Nec præmittam alium modum, qui ab antiquis desumptus, iam occurrit, & eiusmodi est. Circum arcum meridianorum cordas à tropicis terminatarum, designabimus duos semicirculos, vnumquemq; in 6. partes æquales diuisum, & quamlibet partem in 30. gradus, sumpto deinde in circumferentiis semicirculorum, gradu solis, ductaq; recta linea, quæ erit parallela æqui noctiali, hæc erit summet parallelus quæ sit. Verum quamvis hoc rectè fiat, cum tamen ab antiquis non fuerit tradita speculatiua huius effectio: nis ratio, & nos eam exactam tradere velimus, cogitare debemus, quoties duæ rectæ lineæ binas diametros diuersorum circulorum in partes proportionales perpendiculariter diuiserint, earum quoq; giros in partes proportionales pariter diuisent, vt si in duobus subscriptis circulis. b. l. f. & b. d. q. duæ lineæ. l. m. & d. x. perpendiculariter diuiserint binas diametros. b. f. & b. q. in punctis. t. & e. ita vt proportio. f. t. ad. t. b. sit eadem quæ est. q. e. ad. e. b. tunc dico arcum. l. f. m. arcui. l. b. m. ita futurum proportionatum, vt arcus. d. q. x. arcui. d. b. x. quare ductis lineis. l. f. l. b. d. q. & d. b. cum l. t. sit media proportionalis inter. f. t. & t. b. atq; ita. d. e. inter. q. e. & e. b. vt in sexto probauit Euclides; cum fuerit proportio. f. t. ad. t. b. æqualis proportioni. q. e. ad. e. b. ex supposito, igitur eadem dicatæ etiam inter se æquale erunt; proportio inquam. f. t. ad. l. t. æqualis erit proportioni. q. e. ad. e. d. & quæ est. l. t. ad. t. b. æqualis illi quæ est. e. d. ad. e. b. & cum anguli qui. t. & d. circumdant, æquales inter se fuerint, vt potè rectè, igitur ex sexta sexti Euclidis angulus. f. æqualis erit angulo. q. & angulus. b. vnus angulo. b. alterius, quare ex vltima sexti Euclidis, arcus. f. l. & l. b. inter se proportionati erit, vt sunt arcus. q. d. & d. b. quod pariter dico de eorum duplici imaginemur itaq; circulum. b. l. f. eclipticam esse, & h. p. communem diametrum eclipticæ & æquatori, & diametrum. b. q. cordam esse dupli. inanisq; declinationis eclipticæ ab æquatote, & h. prius punctus sit est: cuius ex quo. t. o. pars erit vnus semidiametri æquatoris perpendicularis ipsi. h. p. cum. o. centrum sit circuli. b. d. q. e. o. inquam pars erit communis sectionis eclipticæ & solstiorum cum æquatote. l. m. communi sectione vnus paralleli ad æquatorem cum ecliptica, sit etiam. t. e. communis sectio dicti collinæ solstiorum

cum paralello supposito: ex quo. o. e. & e. t. paralellę quoq; erunt adiuicera ex. 16. vnde cini Euclidis, quare ex. 2. sexti eadem erit proportio ipsius. b. e. ad. e. o. quę est. b. t. ad. t. c. & ita etiam ipsius. o. e. ad. e. b. vt est. e. t. ad. t. b. coniundim vero ita erit ipsius. b. o. ad. o. t. ut est. b. e. ad. e. t. hoc est ipsius. q. o. ad. o. e. vt ipsius. f. c. ad. c. t. e. x. septima quinti, & coniundim ita. eris. q. e. ad. e. o. ut f. t. ad. t. c. & cum dixerim ita esse de. o. e. ad. e. b. ut. c. t. ad. t. b. igitur ex proportionum equalitate, ita se habebit. q. e. ad. e. b. vt. f. t. ad. t. b.

Quę si cōtingeret nos tū Ephemeride, tū quouis alio libro desitatos esse, aliā ego viā id quę iā dictū est præstandi, non minus egregiā, quā ingenij plenā cōtemplando nactus sum. Hęc ei usmodi est. Inuenire utrbigracia velimus in orizontali. q. b. punctum communem diametro. q. b. orizontis, & diamet̄o paralelli, in quo cum fuerit sol, oriatur in extremo instanti decimę horę Italię, quare hac oratione pergemus: in tropico cancri, à puncto decimę horę, ad punctum. 2. 4. rectam lineam ducemus, sit hęc. b. Q. & à puncto instantis merid. ei illius temporis (quod in proposito exemplo, extremum instans est. 17. horę) per centrum tropici vsq; ad oppositam. partem ducemus: R. M. quę erit perpendicularis ad. b. Q. cum arcus. b. R. equalis sit arcui. R. Q. & punctus intersecationis sit. a. qui diuidit lineam. R. M. eadē proportione quā diameter dicti paralelli ab orizontali. q. b. in meridiano diuiditur, quod non deest in strabo, cum per se quilibet, vel mediocriter exercitatus hoc facile scire possit vel ex conuerso hic supradictę demonstratio sit, vt igitur. R. M. in puncto. f. diuiditur, ita ex. 12. sexti Euclidis diameter. æquationis. f. x. in puncto. c. diuidatur diducto deinde circulo quantum semidiamet̄er, aut mediis axis. g. e. postulat, & altero crans in puncto. c. fixo, altero secemus axim mundi in duobus punctis. x. & y. postea sumamus filum (ex materia quę difficulter longior fieri tracta possit) adeo longum, vt longitudini axis. T. e. respondeat unus extremis in punctis. x. & y. firmetur, tam acu, ut alio instrumento accomodatō describatur figura oxigonia, Deficiens, aut Ellipsis (quę dicitur) medio filo, quę ex conuerso. 52. propositionis tertij Apollonij Pergę, verō sectio erit conica iam dictę cuius circūferentia, & axis sit in orizontalem in duobus punctis secabit, quorum vnus sit. v. qui est quadratus. Neq; erit absq; hoc demonstrare cum à communi hominum sensu non parens remouetur sit. Cogitemus igitur per punctum. a. ferri. s. a. paralellam æquatori, quę interfecet axim mundi in puncto. a. manifestē patet igitur ex vigesima prima primi libri Pergę, eandem proportionem, prædicti ipsius. T. g. in. g. e. productō ipsius. T. a. in. v. e. (quadratum videlicet ipsius. g. k. quadrato ipsius. v. e. x. 3. v. e. t. ij. octaua, decimasextaq; sexti Euclidis) quę est quadrati ipsius. g. quadratū ipsius. a. itaq; etiam ita se habebit g. k. ad. v. e. vt g. e. ad. v. e. ex communi scētia, & permutatim ita. g. k. ad. g. e. ut. v. e. ad. v. e. hoc est, ita. f. g. ad. g. e. ut. a. ad.

Alium quoque modum, idem præstandi adinueni cum libris omnibus, deſti-
tuti fuerimus.

Sit itaque ſubſcriptus circulus meridianus. f. b. q. g. in quo diametri tropi-
corum ſint. f. g. & b. q. at. n. ſit centrum mundi. r. orizontalis, circulus verò. f.
m. g. k. ſubſcriuiat vtriq; tropico, iam cum velimus in propoſito exemplo pun-
ctam decimæ horæ italicæ orizontalis inuenire, iubeo (tum in æſtuo, tum hic
mali arcu) meridianam illius temporis horam in tropico inueniri, quæ in caſu
propoſito eſſet decimæ ſeptima, cuius horæ punctus in arcu eſtuo, ſit. m. in
hiemali, k. quarum ſinus ſint. m. e. & k. u. duo vero puncta e. & u. diametrum
tropicorum ſignentur in diamentris ipſorum tropicorum ductorum in meri-
diano, vnuſquique in ſua diámetro, ducta linea. i. e. u. d. quo factò, ſumme lineam.
i. e. u. d. ſeparatim in figura. A. cui à punctis. u. & e. perpendicularæ in contra-
rias partes ducantur hę duæ. m. e. & k. u. æquales duobus ſinibus decimæ ſep-
timate horæ amborum tropicoſum, deinde lineam duc. m. k. quę lineam. u. e.
inter vtrunq; punctum ſecabit in puncto. o. qui ſignandus erit in linea. i. e. u.
d intra. e. u. meridiani, tum per punctum. o. meridiani ducatur. t. o. n. p. quæ
erit communis ſectio circuli horarij cum meridiano, ex quo t. p. punctus erit. i 7.
horę in meridię, à quo ducta. t. s. æ. quamprimum punctum. s. queſitum habebi-
mus, cuius quidem rei ratio difficilis non eſt ſi conſideremus puncta. m. &
k. eſſe in diuerſis partibus à meridiano, & vtraq; in circulo horario Italico, ex
quo linea. m. o. k. in eodem circulo erit, quæ ſeparatim ducta fuit: & cum. u. e.
ſit linea meridiani, igitur punctus. o. communis erit circulo horario, & meri-
diano, centrum verò mundi. n. duobus pariter circulis communis erit, quare
linea. n. o. t. iſſdem erit communis, ex quo punctus. t. giri meridiani, erit. i 7.
horę, reliqua mediocriter introductis relinquo.

Hac etiam via, puncta omnia communia circuli horarij Italici cum meri-
diano, quauis hora, in meridiani circumferentia reperiri poſſunt eorum quæ
ſunt intra tropicos, modus eſt iam hic demonſtratus, quæ verò ſunt extra me-
diam zonam, in figura. B. modo patebunt, in reliquis enim nullum eſt discrimen.

Ex quo, in linea meridianæ murali, aut horologio orizontali (vbi ſignantur
puncta horarum meridianarũ. i 7. i 8. i 9. & reliqua iuxta cuiuſlibet loci lati-
tudinem) ſic notari hac via poſſent cætera omnia horarum puncta in orizon-
tali murali, aut verticali horologio orizontali, tum lineas horarias italicas da-
cere, quod tamen aliquibus horis, parum erit accommodatum, punctus enim
interſectionis meridianæ, aut orizontalis cum horaria, plus æquo elonga-
retur.

Hiſ ita peractis, circulo. q. l. m. b. lineas aliquot adde mus, ſubſcriuituras ho-
rologijs orizontaliſibus, (quę vitandę confulionis gratia minus appareant,
quam


quam prima) sumpta; igitur longitudine styli pro libito, vice gnomonis, illa in verticali sub horizontali applicabimus, sit hæc. g. *A.* sumpto initio à centro, & à puncto *A.* parallelam horizontali ducemus indeterminatam, quam lineam umbrarum appellamus, ad quam vsq; per mundi centrum ab extremis parallelarum supra orizontem terminatarum, à circumferentia meridiani, totidē occultas rectas lineas ducemus, quibus numerum horarum notabimus, hæc quantitatem umbræ à puncto *A.* in dicta parallela sub orizonte demonstrabunt. Quod verò dico de parallelis, quæ per diametrum tropici cancri feruntur, assero de illis etiam quæ per diametrum æquatoris, hæc ferentur ad dexteram.


Propter umbras autem horarum tropici capricorni, notabimus gnomonē contrariò à puncto. g. ad punctum. *A.* in verticali supra orizontem; & à puncto *A.* horizontali parallelam ducemus, ad quam vsq; per mundi centrum ab extremis in circumferentia terminatis parallelarum, sub orizonte, totidē n. re-ctæ lineæ ducentur, quæ umbras horarum quæsitaram definient, in secunda iam dicta parallela supra orizontem ducta. Hæc ratione ad horologia horizontalia cõficienda, necessaria parua erunt. Præterea in circumferentia meridiani, inter utranq; diametrum tropicorum, supra infraq; principia signorum zodiaci notare oportebit, mediante eorum declinatione, aut aliquo superiorum modorum, à quibus signorum principijs occultæ lineæ per centrum ducendæ erunt ad lineam umbrarum vsq; quæ signorum principia, in linea meridiani horizontali, aut meridiana murali ostendent, cum dictæ lineæ occultæ, vsq; ad parallelam xii orizontis ductæ fuerint, quantum minus partus, tantum parallela à centro distat.


Propter supra dicta omnia, interdum cogitandum erit iam dictum meridianum æstrum uices orizontis subire, tum cognoscendæ solaris amplitudinis gratia: in quolibet zodiaci signorum eidem amplitudini cognoscendæ, cum egreditur in extremis instantibus horarum ab orizonte, quare ab horarum punctis in diametro orizontis signatis, totidē parallelæ occultæ producendæ erunt verticali. *Lm.* vsq; ad circumferentiam circuli. *q. l. b. m.* & in circumferentia, horarum parallelarum notandæ, à quibus punctis vsq; ad centrum. g. totidē lineæ ducentur, quæ erunt semidiametri, quarum singulæ cum semidiametro. g. *m.* in mundi centro, angulum solaris amplitudinis designabunt, eo tempore, quo hora illa erit.

Idem circulus. *q. l. b. m.* ut plurimum uices azimuth subit, idq; horis singulis, cum parallelæ horizontali, horis respondentes, aliud nihil sint, quam cões sectiones ipsorum æmlicancrarat & azimuth, in quibus sol reperitur illa hora, ut et amplitudines umbrarum in linea ducta à puncto *A.* parallela orizonti cões sectiones sunt ipsius azimuth solis cum plano horologij, quarum communis sectionum, quoniam plurimæ longa superficiæ indigebunt, recte fiet, si prius superficies

perficies preparatur. Hic circulus, q. l. b. m. cum ab antiquis Analemati no-
men sortitus fuerit, per placet ut à nobis etiam Analema nominetur.







De horologio Italico orientali.
Cap. LII.



Vpientes igitur italicum orientale horologium formare, ex preparato iam Analemate, lineam vnā ex *ij* quæ parallelæ sūt orizonti sumemus, exempli gratia, eam quæ est *z* horꝝ tropici cancri, quæ antea iam vocata fuit *o. z.* & separatam super eam semicirculū delinebimus. Aduertendum tamen semper est, semicirculū hunc supra parallelā formari, ab axi orizontis, & à circumferentiā Analematis, (iam pro aximet solis sumpti) terminatam. Quo facto eam partem lineæ *o. z.* (quam terminat axis orizontis & tropici diameter) sumemus, quæ nunc vocetur *o. r.* & ab extremo *o.* diametri *o. z.* in semicirculo isto formato applicabimus, protractam indeterminatè, protrahendo quosq; *z. o.* diametri ex parte ipsius *z.* donec *o. n.* equalis sit umbræ sumptæ in linea vultarum Analematis, inchoando à puncto *l.* vsq; ad puncti *z.* horꝝ propoliti; ducemus deinde in

de in femicirculo lineã. Z.r. ad quam à puncto.n. ducemus parallellam.n.v. vel formando femicirculum supra.o.n. & producendo.o.t.vlq; ad eius girum in puncto.V. protrahendo postea.n.V. Quare angulus.o.z.r. equalis erit angulo, ea hora, à solis azimuth formato cum verticali; & r.z. equaliserit parallellæ illius horæ in tropico iam ductæ, nominata hætenus.r.z. quando quidem.o.r. meridiani, cum r.z. tropici, angulum rectum constituunt ex. 19. vnde cimi Eucli. definitione q; & o.z. azimuth, tertium est latus, aut basis trianguli orthogoni, qui in almicantrat solis illo puncto inuenitur, cui similis est triângulus.o.n.V. mente conceptus in plano horologij, cuius.o.n. camportionẽ significat communis sectionis azimuth cum plano horologij, quæ à pede gnomonis & à puncto horæ definitur, seu melius à solis radio, quo loco planum horologij ferit, & n.V. camportionem communis sectionis verticalis cum plano horologij quam pes gnomonis, & extremum vnius perpendicularis ipsi verticali in plano extensæ determinat, quæ incipit à puncto horæ designatæ per.o.V.

Facillimum autem erit probare prædictum triangulum.o.n.V. in plano horologij similem esse triangulo.o.z.r. in almicantrat cum o.n. parallella sit.o.z. ex 16. vnde cimi Eucli. & n.V. parallella.r.z. ex sexta eiusdem, quare ex eiusdem. 10. angulus.o.n.V. equalis erit angulo.o.z.r. tum angulus.V. rectus est, vt angulus r.ex quo cætera necessario consequantur.

Iam cognitis tribus his lineis per omnes horas tropici cancri, easdem præparare necesse est ob tropicum capricorni, & ob eas etiam horas æquatori, quarum hiænali tropico destituti sumus.

Hoc itaq; facto, nostri horologij planum orientale sumemus in quo lineæ horariæ duccende sunt, & in eobinas perpendiculares inuicem ducemus quarum commune punctum in medio plani sit, & in extremo vnius, scribemus orientis nomen, in altero eiusdem, occidentis, quæ quidem lin.ræ erit inter communis sectionis plani horologij cum circulo verticali, & vocabitur verticalis, in qua sumemus lineas.n.V. altera verò linea, erit ut ar meridianæ orientalis, seu ut melius dicam (quamuis minus latuè) horologica.

Sic sumptum ante nos planum, ita constituetur, vt pars orientalis sinistra tenent, dexteræ occidentalis occupet, in ea autè extremitate meridianæ q; vergit ad nos, & p̄t̄rionem, in altera meridiem, vel austrum scribemus, quarum duarum linearum intersecationis punctum, situs erit, quo ligendus est gnomis perpendiculariter plano horologij ductis iam lineis horarijs, qui tunc tum eminebit plano, quantum longitudo.g.r. aut g.A. Analematas requirit.

Describendam autem linearum horariarum, hic erit modus, imprimis horas pomeridianas sumemus veluti, gratia. 22. horæ, eius lineam.n.V. cancri sumemus quam referemus in lineam verticalem horologij, à centro orientale

partem versus, & ab extremo V. huiusce distantie occultam perpendicularē vertic aliducemus, versus horologij australem partem, quā ita producemus, ut o. V. dicti cancri existit, punctumq; apparens notabimus, signaturam horā vigesimamsecundā cum solin tropico cancri reperietur, quod ipsam gratia 22. horæ tropici capricorni faciendum erit, ductatamen perpendiculari occulta versus horologij septentrionalis partem: ut verò duobus his punctis mediarecta linea apparenti coniunctis, illius horæ toto anno lineam horariam duxerimus, gnomoni proposito accommodatam. Idem de reliquis lineis agendum erit, quandiu in tropico hiemali horæ superfuerint. Rectè autem factum esse, si perpendicularares occultæ 22. horæ ex parte orientali horologij ductæ fuerint, facile est deprehendere. Tunc enim sol ad occidentem reperitur, ex quo necessariò umbra centri mundi ad orientē vergit, quod in dicto tropico quamprimum cognoscetur, qua scilicet in parte orientis aut occidentis sol reperitur, in arcubus diurnis tropicorum; mediante diametro. f. h. quæ linea est meridiana ita vt perpendicularares occultæ. o. V. horarum pomeridianarum, ex parte orientali horologij ducantur, ante meridianæ verò ex parte occidentali. Cur autem perpendicularis, o. V. occulta 22. horæ cancri, ad partem australem horologij ducenda sit, & quæ est capricorni ad septentrionalem, causæ est hæc, quod umbra semper à lumine in oppositam partem fundatur, & cum hora 22. tropici æstiu in parte septentrionali à circulo verticali sit sol; & dum per tropicum capricorni voluitur ea hora, meridionalis est, & circulo in oppositas partes lineæ ducendæ sunt, illis quibus eo tempore sol reperitur, qui quidem sinus solis, quod ad hanc australitatem vel septentrionalityatem pertinet, in Analemate, meridiani loco sumpto, mediante verticali facillimè cognosci potest, vniuersam enim pñcta horarum in diametro. f. h. tropici cancri quæ in medietate septentrionali ipsius meridiani fuerint, septentrionalia erunt, reliqua verò australia: cum circuli verticalis, cuius. l. g. m. est etiam diameter minus sit septentrionem ab austro respectu orientis distinguere, & quamuis in figura Analematis meridiani, puncta horarum arcus diurni tropici hiemalis, sint in eadē tropici æstiu diametro, nihilominus in parte sub orientali sunt tanquam æquali æqualiterq; sita respectu verticalis, & orientalis, velut propria diametri hiemalis pars supra horizontalem iam dictam. Quod à me factū est, ne tanta esset linearum permixtio, cum tamen eiusmodi puncta horarum hiemalium consideranda sint proprijs in locis supra orientalem, idq; dum cognoscere volumus qua in parte verè sint, quod ad septentrionem, vel austrum spectat.

Inuenta cum fuerint puncta omnia horarum tropici hiemalis, voluerimusque nascisci quo puncta reliqua horarum tropici æstiu coniugamus ad horā vig. da odecimam, pari ratione æquatore vtentur, qua sumus ante tropicis usi,

aut compendiosiore hac via. In Analemate eam portionem lineæ umbrarum, sumemus, quæ intra verticalem iacet hoc est inter punctum, & diametrum æquatoris, quam distantiam in meridianam lineam horologii transferemus, à centro septentrionem versus, à cuius distantia termino (quæ semper puncti, est commune lineæ horariæ horæ decimogonæ cum meridiana), duæque perpendicularem meridianæ, hæc erit communis sectio æquatoris cum plano horologii, quam æquinoctialem appellabimus, quo factò deducemus circinum, quantum distantia in lineæ umbrarum postulat, à puncto. A. ad umbraem vsq; à radio æquatoris terminatam, ea hora qua in tropico hiemali hæc reperitur amplius, fixoq; altero circini crure in centro horologii; altero in æquinoctiali occidentem versus, punctum portabimus, per quod ducta linea ad punctum vsq; eiusdem horæ in tropico cancri, erit horaria linea quaesita. Quæ breuiori alia viæ eiusmodi punctum inuenire voluerimus, ducta æquinoctiali punctum commune intuebitur illi & lineæ horariæ post meridianam, adeo à 18. hora distans, ut quaesita ab eodem distare reperitur, & ita signabimus punctum vnum, ex parte occidentali horologii; qui erit punctus quaesitus. Huius autem rei rationem, cum manifesta sit, reddere necesse non est. Linea horaria. 12. horæ semper verticali parallela ducetur, à puncto. 12. horæ tropici æstiu, cuius ratio persè patet, cum consideremus circuli horarij polos illa hora in meridiano esse, reuolutis iam. 180. gradibus à sui motus principio, ex quo communis sectio dicti circuli cum plano horologii, meridianam ex 12. vndecimi Eucl. perpendicularis erit, cum horarius etiã meridiano perpendicularis sit ex 20. primi Theodosij, quare iam dicta communis sectio parallela verticali orizontali quaq; erit ex 6. vndecimi prædicti.

Varijs autem modis lineæ horariæ. 11. 10. & 9. horæ duci possunt, quarum puncta solummodo habemus in tropico æstiuo, erit autem vnus hic.

Sumpto aut concepto circulo Analemate, orizontis loco, sumpto etiam angulo amplitudinis ortus solaris tali hora, applicatoq; in centro horologii ipsi verticali ex australi parte, si à puncto horæ tropici æstiu parallelam inde terminatam duxerimus, illi quæ cum verticali angulum amplitudinis describit, erit parallela hæc lineæ horariæ quaesita. Idipsum. 13. 14. & 15. horæ gratia fieri posset ceterarumq; horarum quarum hiemalis tropicus desistitur, angulo amplitudinis in parte septentrionali ad verticalem horologii applicato.

Ratio autem hæc est, cum enim sol orientali hora (exempli gratia. 11.) illo puncto in communi sectione orizontis, & circuli horarij illius horæ. 11. reperitur: quæ orizonti quoq; & azimuth communis est, quoq; per centrum corporis solaris fertur, communi etiam dicto azimuth & circulo horarii prædictæ horæ 11. cui communi sectioni parallela est communis sectio circuli horarij cum plano horologii ex 16. vndecimi Eucl. quæ communis sectio, est horæ.

ria linea. 11. pro exemplo sumpta: quare etiam communis sectio plani horologij cum azimuth solis tali puncto, parallela est communi lineæ orientis in eodem azimuth, ex prædicta. 16. vnde etiam, quare et 9. eiusdem, linea horaria, quæ communis sectio plani horologij cum circulo horario, parallela erit communi sectioni eiusdem plani cum azimuth solis tali hora.

Hæc vero communis sectio plani cum azimuth, cum verticali horologij angulum æqualem describit, sicut et communis sectio orientis cum azimuth, & verticali horizontali formatur eie 10. vnde etiam prædicti, quare opus nostrum recta ratione perficitur.

Idipsum autem breuissimum alia via is præstabit, qui à puncto horæ (exempli causa 11. tropici) ortus, occidentalem partem horologij versus, lineam duxerit, quæ concurret cum hora. 23. æquinoctialis, & alteram lineam simili modo à puncto 10. horæ tropici, quæ concurret cum. 12. æquinoctialis, tertiam quoque per 9. horam, quæ cum 18. æquinoctialis concurret, ex quo iam consequentur erimus quod cõpõrebamus.

Quod si rectissime sanè fieri, si velimus intelligere, imprimis circuli horarij situs in puncto occasus solis mente concipiendus est, qui circulus, solum septentrionalem habebit in nostro zenit, & oppositum in nadir.

Quare circulo hoc in huiusmodi situ posito, communem eius sectionem cum æquatore cogitare oportet, hunc autem circulum collocando in situ 23. horæ, eius poli in giro paralleli loci, per 15. gradus distabunt à prioribus locis, septentrionalis quidem orientem versus, australis verò versus occidentem.

Communis autem sectio circuli horarij cum æquatore in tali situ, iam à priori communi sectione orientali. 15. gradus recessit, quæ secunda communis sectio, cum ea quæ meridiano & æquatori communis est, bines angulos inter se oppositos comprehendet, singulos graduum. 75. cum pars quæ inter centrum mundi, & planum horologij est, umbra erit centri mundi. 23. horæ æquinoctialis.

Iam verò cogitemus circulum hunc horarium, cum horam. 12. describit, certe manifestum cum poli qui prius australis erat in nadir ipsius zenit, septentrionalem tunc futurum in eodem zenit, alterum verò in nadir: cuius circuli communis sectio cum æquinoctiali eadem: ut prius erit. Nunc circulum hunc in situ. 11. horæ cogitemus, proculdubio ex supradictis causis æquatorem fecabit, in eadem prædicta communi sectione periret uallam. 15. graduum, inter unam alteramque sectionem: quare prædicta communis sectio. 11. horæ redierit ad punctum plani horologij in situ. 23. horæ æquinoctialis.

Igitur prædictus punctus. 23. horæ æquinoctialis in plano horologij est in circulo horario, dum punctus. 11. horæ in eodem plano, semper est in dicto iam circulo horario, cum omnium duorum planorum communis sectio linea recta sit

de fit ex 3. v. decimi Eucl. necessario itaq; cōsequetur lineam horariam. 1 1. horæ in sua rectitudinem 2 3. æquatoris recipere, idem de 1 0. cæterisq; dico.

Antiqui, alia vtebantur via inueniente dorum punctorum; horarum eiusmodi in aliquo alio non tropico parallelo, ita vt ab huiusmodi punctis, ad pūcta tropici æstiu, lineæ horariæ duci possent, sed mihi displicet, tum quod proluxa nimis sit, tum quod bina illa puncta quæ sitam lineæ horariæ ostendunt, proxima inter se plus satis existant, quod facile oculo scilicet potest.

Orontius alium adfert modum hoc idem præstandi, mediante sua linea. H. N. qui nihil omnino ad rem facit, vt etiam falsum est ipsius punctum. O. (extremæ umbræ rectæ meridiæ hiemalis) punctum semper esse intersecationis meridiæ cum linea. 2 0. horæ: quod nullibi accidit præterquam in parallelo latitudinis graduum. 4 9. vt etiam prætermittamus, quod lineam horariam. 1 3. horæ appellat. 1 2. à vigesimatercia cum fit. 1 1.

Horarum communis lineæ quam citissime duci in eiusmodi horologio poterunt, hac via.

Ducta enim quinoctiali sumendum est punctum in meridiana austrum versus, adeo distans à pede gnomonis, ut punctus cōsaxi mundi & lineæ umbrarum distare à puncto. 4. reperitur, quod vocabitur. 4. à quo, ductæ lineæ rectæ per puncta communia æquatoris, & lineis horarijs italicis erunt horariæ lineæ communes, quinque videlicet mane, & quinque vesperi, sextæ autem horæ tum matutine, tum vespertinæ: gratia, parallellam verticali horologii per punctum. 4. ducere oportet, quinque autem matutine, & septimæ vespertinæ horæ causa se prima matutina & quinta vespertina producent ærunt, & intantum consequenti erimus.

Cuius sectionis ratio, tam est manifesta, vt in ea declaranda, operam consumere necesse non sit, neq; enim tyronibus scribere me profiteor.

Ad hæc zodiaci signorum principia facile in meridiana notare poterimus si in linea umbrarum à puncto. 1. distans in sumptissimos vnus cuiusque signi ab eius radio monstratam, qui per centrum mundi ferunt, hanc referentes in meridianam horologii, ab eius cetro septentrionem versus.

Sæx quoq; domus celestes rationales, hoc modo distincti poterunt, ducta parallella meridiæ, à puncto communi quinoctiali, & lineæ horariæ. 1 4. horæ, quæ signis cet cuspidem. 1 2. domus, altera parallella eisdem ducta à puncto. 1 6. horæ quinoctialis, cuspidem habebimus unæ de cing; meridiæ cuspidis semper est decimæ, tum aliam parallellam per punctum. 2 0. horæ quinoctialis si duxerimus, cuspidem nonæ domus habebimus, per punctum autem 2 2. cuspidem. 8. Atque hoc intellecta difficile non est, cum ex 1 6. v. decimi Eucl. unaquæque prædictarum parallellarum, parallella sit communi sectioni circulorum domorum; meridiæ videlicet orientalis: & cum singulæ binæ horæ, 3 0. æqua-

toris gradus requirant, manifestum erit unamquamq; ipsarum parallelarum communem sectionem esse plani horologii cum circulo cuspidis eiusmodi.

Alia etiam via id ipsum speculari poterimus. Cogitemus totidem rectas lines iam ductas esse, quot parallelas, a puncto supermo gnomonis tamen, ad puncta usque predictarum horarum æquinoctialium. Ex quo apertum erit, harum unamquamque futuram in sui cuspidis circulo: at unamquisque eiusmodi circulus, planum horologii per parallelam meridianæ horizontali fecit, ex 16. prædicta, quare communium harum sectionum unaquæque, meridiane horologii parallela erit, ex 9. vndecimi: at prædictæ parallelæ, tales iam doctæ fuerunt prædictæ meridianæ, igitur erunt quæsitæ.

Pariter assero optimum fore si spacia domorum, colore aliquo lucido insciantur, idque ne superficies horologii tam multis lineis impediatur. Notandum hoc loco est quoties in Analemate accidet, esse portionem aliquam parallelæ orientis que interponitur inter verticalem, & diametrum tropici o. r. scilicet quæ magnitudine ferè toti parallelæ æquetur: ne eam in suo semicirculo locare difficile sit, hortor prius sumat quis parallelam eiusmodi horæ in tropico diuiso, z. r. scilicet quam in suo semicirculo collocaet, & a puncto. z. inchoet, tum ducat lineam. o. r. quæ o. r. equalis erit ex supradictis rationibus, illi quæ est in Analemate.

At cum mihi sæpius acciderit diuersimode speculari modum collocandi puncti communis, radio solari (qui per mundi centrum feritur) & plano horologii, aliquid hoc loco mihi dicendum videtur ea dè re, quamuis non sum nescius, aliquid me predictorum re petiturum.

In primis cogitare cepti videre me planum horizontalis horologii sub oriente per distantiam propositi gnomonis, mente concipiens communem sectionem azimut cum dicto plano, cuius pars est linea. n. o. sumpta in linea verticali, quæ in horologio, ea distantia est, quæ in vertice inter centrum, & punctum horæ, quod commune quidem est solis radio per centrum mundi lato, & plano horologii. Punctum enim superum gnomonis, centrum mundi significat, à quo horæ puncto, cogito perpendiculararem occultam communem sectioni verticali cum plano horologii hæc perpendicularis parallela semper erit lineæ. o. t. Analemetis meridiani ex 6. vndecimi Euclidis, linea vero o. n. pars communis sectionis plani cum azimut, parallela est communi sectioni azimut cum almicantrat, ipsi videlicet. o. z. ex 16. vndecimi prædicti, quare ex 10. eiusdem, anguli intercepti inter has inuicem parallelas, inuicem quoque æquales erunt, at unaquæque perpendicularium circulo verticali angulum rectum comprehendit, altera quidem cum linea verticali horologii, altera cum parallela tropici, quæ communis est sectio tropici, & almicantrat: iam hæc tenus habebimus binos triangulos rectangulos, ac similes, quorum vltis

qui est in almicantrat, totus iam cognitus est per .o. .210. r. in Analemate & r. z. in tropico, alterius vero in plano horizontali facti, cognita est umbra lineæ, in Analemate terminata à .A. & radio per centrum mundi cadente, cui reliqua duo latera in triangulo proportionando, via iam ostensa, ad proportionem ipsius .o. r. cum .o. z. iam cognitis, triangulus quoque prædicti plani horizontalis cognitus erit, ad cuius angulum .o. rectus solis radius pertingit, è celo per fitum: centri mundi demissus, ut etiam facile deprehendi potest, mediis duobus aliis triangulis in superficie azimuth solis, quorum primum vnus latus, ea pars est communis sectionis plani horologii cum azimuth que à centro horologii solarisque radio finitur, alterum erit gnomon, tertium umbra centri mundi, ab extremo videlicet superiori gnomonis vsque ad punctum horæ.

Alterius verò trianguli, primum latus erit communis horizontis sectio cum azimuth, ad finem vsque altitudinis solis, alterum, idem finis altitudinis, tertium, semidiameter cæli, hæc autem bina triangula, similia sunt adinuicem, cum prima latera parallela sint inuicem ex. 16. vndecimi Euclidi, secunda latera etiam parallela inuicem sunt, ex. 6. prædicti, tertia porò vna eodemque linea sunt radii solis, que prima secundo, angulos æquales producit ex 29. primi Euclidis, secunda latera cum primis, angulos rectos faciunt, & sic de cæteris.

Itaque mediis binis triangulis his, medioque azimuth solis, pariter horologia fabricari poterunt. Alia quoque via, speculatione excogitavi modum inueniendi puncti .o. vbi dictus solis radius incidit, que mediis duobus aliis triangulis reëctangulis similibus inter se perficitur, sitis in superficie vnus magni circuli perpendicularis verticali, in quo centrum sit corporis solaris, quare prima linea trianguli sub horizonte, erit perpendicularis ducta a puncto horæ ipsi verticali in plano horologii, que pars erit communis sectionis dicti circuli cum plano horologii, altera, linea erit terminata ab extremo primæ in verticali horologia, & à mundi centro, que pars erit communis sectionis circuli verticalis cum prædicto circulo: tertia linea, ea portio erit radij solaris, que inter centrum mundi, & planum horologii interponitur.

Trianguli autem supra horizontem positi, prima linea, sinus erit arcus huiusce circuli, qui à centro corporis solaris, & circumferentiæ verticalis terminatur, qui sinus pariter est ipse arcus alinæ antaræ solis ab ipsidem terminatus, æqualis scilicet .o. r. Analematæ, secunda linea istius trianguli, ea portio est communis sectionis iam dicti circuli cum verticali, que à prædicto sinu, & mundi centro definitur, tertia linea, semidiameter est cæli, à centro solari ad centrum mundi, ecce quo pacto primæ sunt inuicem parallelæ ex. 6. vndecimi, anguli vero a primis, & secundis intercepti, recti sunt, secundarum vero, & tertiarum anguli quoque æquales, sunt enim oppositi, quare hi trianguli similes inter se sunt. Minima multa, libens silentio prætereo, ne viris medio-

De horologii italico aequali.

Cap. I. III.



Describere si quis cupiat italicum horologium in muro perpendiculari orizonti, ad hanc ratione perficiet. Imprimis respectus muri ad meridianam, & verticalem, aliquo dictorum muro dorsu inueniendus erit, & primo, tanquam exemplum, constituamus orizontem amplitudinis nostri Analemati à muro secari, vt in subscripta figura. *a.* secat, polus *c. o.* communi sectione orizontis cum meridiano, & *d. o. a.* dicti orizontis cum verticali, & *c. b.* muri cum predicto orizonte. Murus autem *c. b.* inter orientem, & meridiem vergat, inuēti iam angulis *c. o. x.* & *i. o. x.* descriptis à gnomone *o. x.* in mundi centro cum meridiano & verticali. Constituamus primum nos inuenire velle punctum vnius horæ à sole factę, dum in quarta orientali septentrionali, & in tropico cancri reperitur. Tabulam igitur ex ligno solido sumamus apprimè dolatam & planam septem octo uel pedum longitudinis, latitudinis verbò, quantę fieri poterit, hanc vocabimus *B. V. Q. T.* in cuius longitudinis medio, aut circiter, lineam doceamus *O. X.* per tabulę latitudinem, ita vt *o. x.* nostri gnomonis magnitudinis sit æqualis, aut ipsius dimidio, aut tertie, quarta uel parti, pro ut melius visum fuerit, ipsiusque punctum *o.* (significans gnomonis summam) alteri *B. V.* ipsius tabulę accedat, ad mensuram dimidij pedis, plus minusue, iuxta quod necessitas exiger, hoc enim praxis ipsa docebit, Ipsum autem punctum *o.* centrum sit dimidij circuli, nostro Analemati æqualis; cuius diameter, parallela sit longitudini tabulę, & lineę *o. x.* à puncto *x.* perpendicularem duceamus, quę orizontalem significabit muri, tum applicabimus in puncto *o.* lineę *o. x.* angulum *c. o. x.* æqualem angulo orizontis. *a.* & angulum *i. o. x.* alteri, ex altera parte, auxilio arcuum correspondentium circumferentię. Itaque *o. c.* lineam meridianam vocabimus, & *o. i.* verticalem, quarum vtriusqueq; iubeo indefinitè produci, aut eate nus, dum intersecet orizontalem & girum portionis iam factę, quod sufficiet. Hoc facto iubeo ad eundem Analema, in quo parallela orizontis sumatur quę sit horę *o. x.* videlicet, quam metiatur in verticali *o. i.* à puncto *o.* vocabimusque *o. a.* super quam lineę circulum describemus externa ex parte trianguli *c. o. i.* (si enim punctum vnius horę a sole effectę dum est in quarta orientali meridionali quęreremus, semicirculus intra triangulum formandus esset) postea redeamus ad Analema & lineam *o. i.* pro positę horę sumemus, aut in tropico cancri parallelam horę videlicet *a.* sydico verbò in vno, alteroue, quia centro sumendum alteram duarum linearū quę breuior focia fuerit, quamuis vtraque in predicto semicirculo ad angulum

Iam rectum cadat. Iam cum sumptimus lineam. o. r. Analematis, collocanda erit in prædicto semicirculo, inchoando à puncto. a. & vocabitur. a. d. si autem tropici lineam. z. r. sumptimus, erit collocanda in semicirculo, inchoando à puncto. o. & vocabitur. o. d. Deinde à puncto. o. per punctum. d. lineam ad orientalem usque muralem. c. b. ducemus, quæ vocabitur. o. d. b. ex quo habebimus quam primum distantiam. c. b. horizontalis, quæ distantia, erit interposita inter communem sectionem azimuth horæ, & meridianam; ita punctum horæ in perpendiculari sub horizontali erit, ducta à puncto. b. Nunc inveniendum est quantæ longitudo a puncto. b. usque ad punctum horæ esse debeat hæc linea, quod hac ratione consequentur, diducemus circum quantum. o. à semicirculi diametere requirit, scilicet. o. z. Analematis, cuius altero crure in puncto. o. extremo gnomonis fixo, altero in puncto. f. secabimus lineam. o. d. ita ut o. f. æqualis sit. o. a. aut. o. z. Quo per actum, in quamcunque voluerimus partem, perpendicularem à puncto. f. erigemus ipsi. o. b; æqualem tamen sinui altitudinis solis in Analemate sumpti, cui sinui. g. o. verticalis in Analemate semper æqualis est, sit hæc. n. f. quam ut brevis coniequatur, diducemus circum quantum postulat. g. o. & altero crure in puncto. f. firmato, altero circum medietatis circuli secabimus (qui ad hoc ante omnia factus fuit) in puncto. n. Tum a puncto. o. per punctum. n. lineam indefinitam ducatur, ad quam a puncto. b. duci iubeo parallelam ad. f. n. perpendicularem scilicet. o. b. & vocetur. b. t. quæ illa hora, erit muri azimuthalis, inter punctum. b. & punctum horæ interiecta. Ducendo postea in muro, a puncto. b. perpendicularem sub horizontali. b. c. protractam ad o. ut b. t. ex actum situm illa monstrabit extremitatis umbre gnomonis tali hora, quæ suo numero signabitur, & caractere cancri.

Iam si in eiusmodi muro, linea. o. r. Analematis ut dictum est, esset in quarta. l. g. q. & non in l. g. b. semicirculus describendus esset intra triangulum. c. o. i. horarum ante meridianarum gratia, illarum videlicet, quæ in tropico essent in dimidio. f. q. h. Quod si in eodem muro horæ essent pomeridianæ, dimidij videlicet. f. b. h. tropici, semicirculus, supra lineam. o. c. meridianam extra triangulum formandus esset, in quo linea. o. r. collocaretur a puncto. o. & linea. r. z. a puncto. a. quod quam diligentissimè notandum est. Quæ verò tropici cancri causam in eiusmodi muro dixi, e ipsa assero tropici capricorni, & cuiuslibet alterius paralleli, ad horas tamen italicas simpliciter, hi duo tropici sufficient, additis ijs quæ a me dicenda sunt, de horis matutinis quæ desunt in tropico Capricorni. Alias tamen ob eas cuiuslibet horæ, tria puncta inveniri iubeo, binarum tropicorum tertium æquatoris. In muris occidentalibus meridianis iidem puncta servantur modi, tamen terti meridianæ & verticalis situm respectu gnomonis commutet, quæ enim antea erat ad dexteram, iam ad levam reperitur, & e contra, quare semicirculus horæ occidentalis septentrionalis perpetuo super verticalem

ticalem & extra triangulum describetur: pro vero semicirculus horæ occiden-
talis meridianus, supra verticalem quidem, sed intra triangulum, horæ vero me-
ridianus orientalis super meridianam, extra triangulum intra quam collocabi-
tur. o. r. a puncto. o. extremo gnomonis & r. z. a puncto. a. Quod si semircu-
lus intra triangulum designandus erit, non minus super meridianam quam su-
per verticalem fundari poterit, ac si super meridianam fundabitur, perpetuo
applicanda erit linea. o. r. a puncto. o. extremo gnomonis, & linea. r. z. a puncto. a.

Cum vero hæcenus de muris meridionalibus tractatum fuerit, non erit
ab re de septentrionalibus sermonem facere, in quorum gratiam eadem præ-
standa erunt, quæ in meridionalibus, hoc vno excepto, quod septentriona-
lium orientalium murorum, horarumque septentrionalium causa, semircu-
lum intra triangulum supra verticalem fundabimus, in quo lineam. o. r. a pun-
cto. a. collocabimus, & lineam. r. z. a puncto. o. aut si prædictum semirculum
super meridianam fundare cupimus, collocabimus. o. r. a puncto. o. & r. z. a pun-
cto. a. Ad horarum autem meridianas orientales, semirculum fundabimus su-
per verticalem extra triangulum, in quo lineam. o. r. a puncto. a. & r. z. a pun-
cto. o. constituemus. Porro ob muros septentrionales occidentales, horarum-
que septentrionalium, semirculum intra triangulum super verticalem funda-
re oportebit, collocata. o. r. a puncto. a. & r. z. a puncto. o. aut super meridia-
nam intra triangulum, constituta. o. r. a puncto. o. & r. z. a puncto. a. in eo.




Gratia vero horarum occidentalium meridianarum, semirculum super ver-
ticalem extra triangulum describemus, collocata. o. r. a puncto. a. & r. z. a
puncto. o.

Super eiasmodi muro, præter cetera iam dicta, signari facile poterit azimat
ventorum, necesse circulo. a. orientali, iuxta ventos diuiso, ad quos azimu-
tibus orientibus ductis, apparebit quo loco orientalis muralem.

b. c. a puncto. x. fecerint, a quibus intersecatorum punctis,
totidem perpendicularibus. b. c. orizôn-
tali murali in ipso muro ductis,

habebimus inven-

tum.



Delius horarjs muralibus abque tropico hyemali, & de principijs signorum,
de cuspibus dierum de horis hjs utalibz meridionalibus,
& verticalibus. Cap. LIIII.

Anuentis iam sitibus punctorum horarum vtriusque tropici, quod li-
nez horariz duci possint, earum horarum quae non sunt in tre pi-
co hiemali, in muris orientalibus puncta invenire necesse est,
earundem horarum, in linea crizontali muri, sicq; ad eundem
Analema pro orizonte sumptum, suspendi que in centro, g. anguli amplitudi-
nis praedictarum horarum, vt super ius fuerit preparati: qui applicati verti-
cali.

cali. o. i. in tabula. B. T. extra triangulum. o. i. c. gratia horarum, quæ duodecim antecessant, aut intra eundem, earum horarum causa, quæ duodecim subsequuntur. Ea verò linea, quæ prædictum amplitudinis angulum comprehendet, horizontalem. c. b. in puncto horæ ortus solaris fecabit: qui erit questus, & punctum. i. in dicta. c. b. horæ. 12. semper punctum erit, iunctis deinde punctis earundem horarum per lineas rectas, horarias lineas italicas eiusmodi horarum nacti erimus.

Verum cum ego hortor (si fieri possit) ut bina horologia designentur, alterum in muro orientali matutini temporis causa, alterum in muro occidentali, vespertini gratia, qui in sola meridiana linea inuicem communicent, vti iam necesse non sit finis horarum postmeridianarum tropici æstivi in orientabilibus inuenire, neque item in occidentalibus ante meridianas tropici hyemalis, quæ in eiusmodi elevatione poli sunt. 17. 18. 19. quarum, puncta respondentia tropicorum punctis, in muro orientali, tropici hyemalis, in occidentali, æstivi, in meridiana inuenienda eunt, supra infraque horizontalem muri, infra, si quidem murus meridionalis fuerit, supra, si septentrionalis, id hæc ratione perficietur.

Exempli gratia inuestigandus sit punctus. 17. horæ in muro orientali meridionali, in linea meridiana, sumenda est linea. o. c. meridiana orientalis in proposito tabula, transferendaq; in extremum tabulæ. V. T. vitandæ confusio nis literarum gratia, & producenda ad punctum vsque. u. ita ut. u. o. æqualis sit semidiametro nostri Analemati, post modum à puncto. c. ipsius. o. c. ducti iubeo lineam. c. e. indefinitè ad angulos rectos cum prædicta. o. c. & circum punctum. o. describatur arcus. u. r. circuli æqualis nostro Analemati, tunc adhibebimus prædictum Analema, & sumemus arcum. q. ipsius, loco. 17. horæ, quem transferemus in portionem vtriusque descriptam, incipiendo a puncto. u. hæc verò sit. u. m. & a centro. o. per punctum. m. ducemus. o. m. e. vsque ad. c. e. quare punctum. e; erit. 17. horæ in meridiana muri, mensurata deinde in prædicta muri meridiana distantia. c. e. sub horizontali, quamprimum habebimus punctum. 17. horæ quod mediante vna linea recta coniunctum cum puncto. 17. horæ tropici æstivi in muris occidentalibus, aut tropici hyemalis in orientabilibus, necessariam partem lineæ horariæ 17. horæ habebimus. Quod si murus septentrionalis fucrit, dictam distantiam. e. e. in meridiana murali mensurabimus super horizontalem, reliqua vtdictum est perficietur. Sed si super eodem muro, eidem gnomoni, lineas horarias communes sumere voluerimus, iubeo in portione. u. r. vtriusque descripta, signari punctum. K. tantum ab. u. distans, quantum in Analemate polus. e. supra punctum. b. horizontale eleuari reperit, ducaturq; linea. o. k. vsque ad lineam. c. e. in puncto. l. tum in meridiana muri sumatur, (in meridianis quidem muris supra horizontalem, in se-

ptentrionalibus verò infra) distantia. c. l. & à puncto. l. in muro iuxta singula puncta horarum æquatoris, lineæ rectæ ducantur vsque ad situm hyperboles æstivæ, quæ apparent inter utranque hyperbolem, alio colore infectæ quam sint lineæ italice. Verum quoniam quinta matutina & 7. vespertina in situ æquatoris supra murum notatæ non erant, idcirco vice puncti æquatoris, ducemus lineam à puncto. l. per punctum decimæ horæ italicæ iam inuentum in orizzontali super murum orientalem. At in muro occidentali, punctum. 7. horæ in orizzontali inueniemus, utemurque calculo. 10. horæ matutinae eadem profors ratione, amplitudo enim. 7. horæ vespertinae in occidentem semper equalis est amplitudini quintæ matutinae in orientem. Porro lineæ æquinocctialis muri, per omnia puncta in æquatore horarum inuentarum ferretur.

At si quis principia signorum zodiaci, omnia in meridiana notare voluerit, ea in æquatore poterit, ostensa a me via inueniendarum horarum meridiana rum, ex exemplo. 1. 7. horæ. Amplius si interualla celestium rationalium domorum, distinguere veluerimus, occulta lineæ super murum orientalem ducetur à puncto communi orizzontali & meridiane per punctum. 1. 6. horæ æquinocctialis, quod ferretur cuspidis loco undecimæ domus, alteram item lineam à prædicto puncto orizzontali meridiano per punctum. 1. 4. horæ, eritque tanquam cuspidis duodecimæ domus. At in muro occidentali, gratia cuspidis octauæ domus, lineam ducemus à puncto orizzontali meridiano per punctum. 1. 2. horæ æquinocctialis, gratia cuspidis nonæ domus, à prædicto puncto lineam ducemus per punctum æquinocctialem. 20. horæ, domum autem undecimam & octauam, flavo lucidissimo colore infectemus, solum ut ab alijs domibus hæc distinguantur, sicque omnia perfecta erunt.

Eginus hæcenus de horologijs orizzontalibus, & muralibus à meridiano & verticali declinantibus, tanquam de ijs quorum frequentior erit vñs, raro enim contingit offerri occasionem fabricandorum verticalium, & meridianorum, hoc est australium, septentrionalium, orientalium, & occidentalium, neque ego in hanc vsque diem murum aliquem inueni qui non aliquantulum à binis dictis circulis declinet: tamen ne à quopiam, in hoc nostro volumine eiusmodi effectio, quæ se ipsa seu substantia eadem est cum ea de qua scripsi capite. 1. 3. desideretur, exponam breuiter eiusmodum, exortus ab horologijs verticalibus, subiecto exemplo, faciei muri perfecte ad septentrionem vergentis.

Sitigitur in dolatice à nobis parata tabula, lineæ horizontalis muralis. x. b. & x. o. gnomonis longitudo, prædictæ lineæ, perpendicularis, à cuius extremitate. o. ducatur lineæ. o. a. parallela. x. b. quæ. o. a. orizzontalis verticalis mundi erit, supposito. o. eius centro, & muro parallelo verticali, ab eodem distante iuxta quantitatem. o. 1. circa centrum verò. o. circunferentia describatur circuli,

culi, amplitudine equalis nostro Analemati, vt capite. 53. dictum est. Tum su per lineam. o. a. vespertinarem horarum gratia: semicirculus describatur ad dexteram, o. d. a. sumpta. o. a. equali. o. z. Analematis: cetera ita progredian tur omnino, vt predicto capite tradita fuerunt, & vt in subscripta figura ob a. z. horam italicam patet, quod de muri facie septentrionali dico, id ipsum de australi assero, hoc tantum notato, quod in septentrionalibus semicirculi ad dexteram describentur ob occidentales horas, ad sinistram verò ob orienta les, sed in faciebus australibus, omnia hæc fient econtrario.

At vt rō horologiorum meridianorum causā, sit pariter ducta linea. z. b. ori zontalis muri in tabula preparata, & o. x. perpendicularis ipsi, longitudo sit gnomonis, quare o. x. verticalis erit mundi, cuius o. cum sit cetrum, circa qd, circulus Analemati equalis, vt predictum est formabimus, & super lineam. o. x. qua libuerit parte protractam, describemus semicirculum. o. d. a. vt iam dictum fuit: reliquas si ita perficientur vt in subscripta figura gratia. a. z. horæ monstratur, nullus accidet error, quod ipsum de horis orientalibus dico.

Notando semper punctum. b. horarum septentrionalium in muris orientali bus, qui scilicet a quarta orientali septentrionali prouenit esse ad leuam gno monis, & horarum meridionalium, hoc est quæ a quarta orientali meridiona li proueniunt, ad dextram inueniri gnomonis. Verum in muris occidentali bus, omnia fiunt e contrario. Hanc verò rationem horologiorum italicorum æne inuentam, perpetuò seruari, quam cæteris omnibus, tum a me excogita tis, tum ab aliis traditis, meliorem esse consp. Sæpi enim formato Anale mate, inuenio a nobis modo, perpetuò & quamprimum situs puncti horæ in muro inuenietur, tribus tantummodo mensuris ex Analemate sumptis me diantibus, scilicet. o. z. o. z. aut a. z. tropici, & o. g.

Neque hæc silentio inuoluendum existimo (quod a multis iam annis obser uari) amitti, vel potius breuiores fieri longas gnomonis umbras, cum sol ad modum obliquè parietem vel aliud quodlibet planum suo iustrat lumi ne. Neque est quod aliquis hac de re admirationem capiat,


cum necesseario accidat, vt umbra corporis in paci lacido minoris procedat aut pyra midaliter producta tur.

trianguli orthogoni, cuius duo latera sunt. o. r. Analematris & r. z. tropici vt ca-
pite. 5 2. dictum est, & cum angulus acutus ipsius trianguli inter. x. z. tropici &
o. z. intercepus æqualis sit angulo azimut cum verticali in proposito exem-
plo ex. 29. primi Eucli. & hic opposito, ex. 1 5. eiusdem, igitur acutus dictus,
æqualis erit huic c. pposito vltimo dicto, vt facillè patere potest in exẽplo sub-
scriptæ figuræ horizontalis, in qua linea. d. a. sit verticalis. o. c. meridiana. b. c.
muralis. z. o. b. azimutalis, punctum. z. vbi cadit sinus altitudinis solis, a quo
ducta perpendicularis. z. r. meridiang, hęc. z. r. æqualis erit parallela tropici ex
34. primi Eucli. cum ex 6. vndecimi sit illi parallela, & sinus prædictus, paralel-
lus communi sectioni superficies, in qua sunt hę duæ lineæ, cum meridiano, &
o. r. æqualis illi almicantaræ, & meridiani ex prædicta. 2 9. cum hę duę. o. r. sint
in vicem parallele ex 1 6. vndecimi, & verticalis meridiana, paulo antedicta,
vbi aperte cernitur angulum. z. o. d. æqualem esse angulo. o. z. r. & angulum.
b. o. r. æqualem angulo sibi opposito. z. o. d. ex prædictis, quare & angulo
o. z. r. æqualis erit. Ex quo etiam manifesta patet ratio, cur in tali casu, semicir-
culus extra triangulum formatus sit, hęc mihi iudicasse sit est. Patet item
cur linea. o. r. Analematris, in semicirculo collocanda sit, a puncto. z. nō
à puncto. o. quoniam extra, nōc intra triangulum, quod a situ p̄uenit, v. q. c. b.
lineę. o. r. horizontalis muralis, respectu binorum diametrorum præcipuorum, ori-
zontis, diuerso que situ solis, respectu duorum præcipuorum circuloꝝ nostri
hemisphæri, figura o. r. horizontali subscriptæ similitudine formata, sita hęc collatæ
omnibus. Operaturque eiusmodi lineæ. o. r. horizontalium, in cognitionem
venimus distans. c. b. hoc est quantum azimutalis horę, a meridiana murali
distet, & ab. o. b. azimutali horizontali.


Quod autem inveniendæ quantitatæ azimutalis lineę gratia facio, cui li-
bet facillè erit comprehendere, qui subscriptum solis azimut tali hora cōside-
rauerit, supposito sole in puncto. g. & sinu altitudinis eius. z. g. æquali. o. g.
Analematris, & o. z. huiusce circuli æquali. o. z. ipsius Analematris, nobis cog-
nitis. cumq; iam cognita sit. o. g. huius circuli, tanquam semidiameter cœli,
quamprimum singulę partes trianguli. o. z. g. illius circuli, venient in cogniti-
onem porro inuenta quantitate lineę. o. b. in tabula, ex supradictis rationibus,
cognitis cum fuerit angulus. b. o. r. contrapositus angulo. z. o. g. cognito, sta-
tim & ab. c. alio medio quantitatẽ. b. t. quę sitamẽ cognoscemus: quę. b. t. est
muralis azimutalis perpendicularis orizonti ex. 1 9. vndecimi Eucli. & para-
lella ipsi. z. g. quę sinus est altitudinis, ex 6. eiusdem vndecimi: quare duo trian-
guli similes sunt ad inuicem. Idcirco capite. 5 3. tãtum diduci circinum volui,
quantum. o. z. semidiameter almicantaræ requirit, æqualis. o. z. hic subscripti
azimut, transferendumq; duxi sũ per. o. d. b. vsque ad punctum. c. vñ in nostro
hoc azimut cernitur. Iussu deinde a puncto. f. perpendicularẽ ipsi. o. f. duci,
quæ

que sit æqualis sinui, g. r. istius azimut, cui sit æqualis, g. o. Analematis, quod eo capite breuitatis causa volui eiusmodi mensura à puncto. f. fecari arcum portionis circuli in tabula descriptæ æqualem Analematis, vt in hoc azimut scienter comprehenditur, punctum. n. venire in circumferentiam ipsius azimut, cum ex quarta primi Eucl. b. a. s. n. æqualis sit b. a. s. o. g. in hoc circulo. Ipsi deinde lineam. b. t. parallellam. f. n. duci vsque ad. o. n. quod quam rectè fiat, ex hoc circulo azimut apertissimè intelligitur. Eorum verò que cap. 54. tradita sunt, rationes iam per se satis manifestæ sunt.

Inuentis igitur distantijs omnibus in linea horizontali ipsius tabulæ, inter pedem gnomonis & azimutales, ac cetera puncta ipsarumque azimutalium quantitibus horisq. meridianis in meridiana, coniungendis cum eisdem tropicorum, has omnes mensuras notari iubeo in regula lignea, quantum sat erit longa, que deferretur supra pontem à fabricis murarijs extructum, gratia depingendi horologij ex qua, mensuræ circino sumuntur, & in muro collocabuntur, quod vel tantillum ingenij habenti, facillimum erit, ducta prima horizontali per medium gnomonis pedem tum meridiana suo loco, prout in regula signata fuerit, tam in muris septentrionalibus, quam meridionalibus. Nam apud omnes reperitur, (exceptis ijs qui sunt in eodem meridiano) & prædicti muri omnes meridianam intersecant. Illud interim aduertendum, si forte gnomon. o. x. in tabula notatus, pro dimidio eius qui in muro fixus est, aut tertia, quartaue parte sumeretur, singulæ distantie regulæ lignæ, eadem analogia seu proportione multiplicidè essent, dupla tripla, aut quadrupla. Minuta autem pleraque, que scribere longum esset, praxis ipsa docebit.



rrr



De horologio ab ortu.

Cap. LVI.



T si cui liberet horologium designare horarum ab ortu solis incipientiam, id nullo negotio prestaret, supposito tropico ita diuiso, vt horarum ab occasu gratia diuisus fuit. tamen notando, tropici lineam (in eo qui est occasus) notatam numero. 23. in hoc qui ortus sit, notandam numero. 1. lineam viginti duarum, numero. 2. lineam. 21. numero. 3. atq; ita deinceps: idem in Analemate faciendo; partem verò tropici in occasu, pro occidentali sumptam, in ortu sumemus pro orientali, cetera facilia erunt, bene intellecto horologio italico, à quo in nullo hic differt præterquam in situ linearum, lineis occidentalium horologiorum italicorum in maris orientalibus huius horologii ab ortu solis collocatis, in maris autem occidentalibus horologii ab ortu, lineis orientalium italicorum horologii. Idipsum dico pro horologijs orientalibus, commutato dictarum linearum situ, vt quæ ante a dextris erant, iam sint sinistris, & e conuerso.

De



Lineaturus autem horarum inæqualium horologium, duo-decimarum, scilicet partium dici, denno formabit Analema, & tropicum, arcu maxime dici ipsius tropici in 12. partes æquales diuiso, arcu item manans dici subiecto, & hac ratione designabit Analema, in reliquis feruatomodo pro italicijs horologijs prescripto, tum horizontalis, tum muralis gratia.

De horologio italico orientali ex discreto apæ triangularum
 sphaeræcum absq; necessitate tropicorum.




Vm varios diuersosq; modos, in diuersis planis, collocandi lineas horariasitalicas adiuuentum, quorum nonnulli plus voluptatis, quam necessitatis habent, currentem calamus adhuc cohibere nullo, sed primum de vno agere, qui numeris in plano orientali, citra tropicorum ne celsitatem absoluantur.

In primis planum, non quidem horologii, sed ipsius orientis. L. A. P. S. mente concipio, in quo L. punctū sit ortus. P. occidentis. S. septentrionis. A. australi, æquinoctialis sit. L. t. P. continuamus igitur velle nos inuenire ante omnia, lineam horariam orientalem. 23. horę sub polo. 44. 0. idq; exempli gratia, cogito itaq; arcum. P. t. æquatoris. 15. graduum, per punctum. t. verò ferri circulum horarium, cuius polus septentrionalis, semper est in parallelo loci, atq; hic circulus horarius significetur his literis. h. t. o. cuius communis sectio cum horizonte tali hora sit. o. h. quæ non erit amplius. S. A. communis ipsi circulo horario & meridiano, dum idemerat cum horizonte, hoc est occasus solis tempore: cum prædictus eius polus à zenit recedens, non feratur per circūferentiam verticalis, sed per eam quę est paralleli loci, quare septentrionalis erit à verticali, itaq; communis sectio. h. t. o. iam non erit institum. S. A. sed punctum. h. in casu proposito erit inter. S. & P. cuius motus, per arcum horizontalem. S. h. factus fuerit inchoatus ab. S. vsque ad. h. (retrograde intellecto) quæramus igitur. h. P. (vltimam cognoscatur. S. h.) & arcum. h. t. angulum item. P. h. t. qui est angulus inter ceptus inter circulum horarium. h. t. o. & orientem. h. P. o. quæ cognita nobis erunt ex. 12. primi Copernici. latius enim. P. t. graduum. 15. iam est cognitum & angulus. h. P. t. æquatoris cum oriente similiter cognitus, atque ita etiam angulus. h. t. P. tanquam residuū duorum

duorum rectorum, remoto angulo. h. P. t. cui equalis est angulus. h. t. L. cum eam polos orientis quam circuli horarij in eodem circuli giro sit. Itaque ex 12. primi Copernici, arcus. P. h. erit graduum. 84. minutorum. 45. & arcus. h. t. graduum. 95. minu. 11. angulus item. P. h. t. graduum. 10. minu. 47. qui est angulus interceptus inter circulum horarium, & orientem residuum, verò vnius recti, hoc detracto, erit graduum. 79. minu. 13. ut rectus gradus continet. 90. qui angulus pariter intercipitur inter axem orientis, & perpendiculararem ipsi. h. o. in puncto. g. extendam in superficie circuli horarij, aut inter gnomonem in mundi centro & prædictam lineam sub oriente in dicto circulo horario, extendam perpendiculararem communi sectioni plani horologij cum circulo horario, lineæ videlicet horariæ, quam perpendiculararem, dictæ lineæ horariæ à vertice gnomonis scilicet à mundi centro cogitatam tanquam diametrum vnius circuli, & angulum perpendiculararum huius & gnomonis conceptum in circumferentia, qui in casu proposito erit graduum. 158. minu. 26. & residuum ex gradibus. 180. erit graduum. 21. minu. 34. cuius arcus. 21. 34. corda erit partium. 22. minu. 27. ex ratione Ptolomei, quæ corda gnomon erit: at corda arcus. 158. 26. erit partium. 117. minu. 52. & hæc erit distantia perpendicularis à pede gnomonis ad lineam horariam prædictam in plano horologij.

Ut autem necesse non sit tabularum Copernici primo libro traditarum ordinem inuertere, possumus facillimè proportionem gnomonis à prædicta distantia, inter ipsius gnomonis pedem, & lineam horariam inuenire, quæ illa ipsa est quæ intra sinum anguli graduum. 10. minu. 47. partium. 18709. & sinum anguli graduum. 79. minu. 13. partium. 98235. continetur, & hæc distantia perpendicularis à pede gnomonis usq; ad lineam horariam, communis est sectio vnius aximut cum plano horologij, cuius aximut, h. o. orientalis, est axis. quare communis sectio dicti aximut cum oriente, angulum rectum cum orientali. h. g. constituit: quod ipsam præstabit communis sectio illius aximut, & plani horologij cum communi sectione plani ipsius horologij, & alterius aximut, in quo sit orientalis. h. o. Quare si planum horologij erit. L. M. P. S. in quo ducere vellimus prædictam lineam horariam, sumpto à puncto. S. septentrionis versus L. arcu. S. t. equali arcui orientis. P. h. graduum. 84. minu. 45. & à puncto. t. usque ad centrum. g. ducere. t. g. ex qua à centro sumpta portio. g. d. partium. 98235. circino di, qualium gnomon est partium. 18709. & à puncto. d. ducere. h. d. o. perpendiculariter dictæ. g. d. hæc. h. d. o. erit linea horaria prædictæ horæ.





Supplementum circa. 1. 2. primi, Nicolai Copernici, secus circa. 21. 22. 23.
 quarti Ioannis Regiomontani.
 Cap. LX.



VONIAM verò breuitas qua vsus est Nicolaus Copernicus in explicanda. 12. primi sui libri, ita etiam à Monteregio in declaranda. 31. & 32. sui quarti, parere difficultatem, in efficiendis quæ præcedenti capite docuimus, ei posset, qui in tractandis triangulis sphericis non esset exercitissimus, cum si angulus. C.A.B. in figura. R. 12. primi Copernici acutus fuerit, necessario angu-

lus. D.A.F. residuum duorum rectorum, erit obtusus, quare in triangulo. D.A.F. confusa mens esse posset, cum 4. dicti constituat angulum. D.A.F. acutum esse, idcirco in eiusmodi casu, cogitemus (quod in subscripta figura patet) bina latera. A.F. & F.D. producta esse vsque ad T. vtriusq; conuersum. Ita habebimus. A.T. & T.D. residuum binorum semicircularum, cum sine circuli maiores sphaeræ, habebimusq; angulum. T.A.D. acutum, quare ex 4. prædicta inueniemus angulum. T. qui quidem æqualis est angulo. F. & pariter latus. A.T. & latus. T.D. inueniemus, quæ detracta à suis semicirculis. T.A.F. & T.D.F. remanebunt latera. A.F. & D.F. cognita. Exempli gratia, si hæc voluerimus efficere gratia. 22. horæ sub polo. 44. minu. 0. arcus. A.C. æquatoris erit. 30. graduum & angulus. C. 134. qui ab æquatore, & horizonte fixo septentrionem versus supra terram comprehenditur, & angulus. C.A.B. graduum. 46. qui à circulo horario, & æquatorem septentrionem, & orientem fixum versus continetur. quare. A.D. erit. 60. graduum, & ex 4. prædicta angulus. T. id est. F. 68. minu. 55. & T.A. 68. minu. 5. & A.F. residuum semicirculi. 111. minu. 55. & T.D. 41. minu. 52; D.F. residuum semicirculi. 138. minu. 8. quare detracto. D.E. hoc est. 134. gradibus anguli. C. remanebit. E.F. graduum. 4. minu. 8. & iterum ex 4. prædicta angulus. E.B.F. erit. 21. minu. 24. & B.F. 11. minu. 14. quare. A.B. erit. 100. graduum, minu. 31. & B.E. 30. minu. 58. quare. B.C. residuum vnius quartæ erit. 79. minu. 22. cætera per se patebunt.

Homini parum versato in mathematicis disciplinis in tricis se conijcere circa decimam octauam horam posset, si figuram. a. subscriptæ similem mente conceperit in qua latus. A.C. arcui. P.t. æquatoris in figura cap. 58. graduum. 90. respondet, quare producto. A.E. vsque ad concursum cum. A.B. in puncto. F. ex ijs quæ præcedenti capite dicta fuerunt manifestum erit. A.E.F. semicirculum esse perfectum, atque ita etiam. A.B.F. & angulū B.A.F. residuum

residuum vnius recti gradum. 44. minu. 0. & angulum. F. pariter, arcum vero. E. F. residuum semicirculi esse graduum. 46. minu. 0. quare ex 4. predicta angulus. F. B. E. hoc est. A. B. C. erit graduum. 61. minu. 9. cuius sinus erit par tisi. 87589. & arcus. B. F. graduum. 55. minu. 13. eius vero sinus partium. 82126. quare arcus. A. B. erit graduum. 124. minu. 47. & arcus. E. B. 34. minu. 47. igitur. B. C. gradus habebit. 55. minu. 13.

Difficultatis quoque plurimum afferet decimaseptima. 16. 15. & 14. hora, circa subsistit per signu. Q. cogitationem. in qua. A. C. aequatori respondens, gradus continet. 102. minu. 0. A. D. 15. minu. 0. angulus. A. 46. minu. 0. arcus vero. D. E. angul. A. C. B. 134. minu. 0. quare cum angulus. A. sit minor recto, & D. E. nonagesimum gradum excedat, cum sit graduum. 134. apertè patebit. A. B. intersectare. D. E. in puncto. F. erit quoque manib. sum. A. F. & D. F. quartis minores esse, cogitemus igitur binos arcus. F. F. & E. B. sese interseca re in puncto. T. In semicirculo tenuimus, quare in primis ex 4. predicta in trian gulo. A. D. F. habebimus angulum. A. F. D. hoc est. E. F. Itaut. T. (sunt enim hi tres anguli æquales sinic. 0.) graduum. 45. minu. 59. cuius sinus erit. 71914. & arcus. A. F. graduum. 21. minu. 6. cuius sinus erit. 35950. & arcus. D. F. gra duum. 15. minu. 0. cuius sinus erit. 25888. cui quidem arcus. D. F. detractus ex arcu. D. E. graduum. 134. minu. 0. remanebit arcus. F. F. graduum. 119. mi nu. 0. qui. F. E. ex semicirculo deo ad us. relinquet nobis arcum. E. T. graduum. 61. minu. 0. Jam in triangulo. B. E. T. ex predicta. 4. angulus. E. B. T. hoc est an gulus. A. B. C. gradus continet. 69. mi. 36. cuius sinus erit. 93727. & arcus. B. T. 69. minu. 10. cuius sinus. 93496. quare arcus. B. T. residuum semicirculi gradus. 100. minu. 50. continet, qui nactus arcu. A. F. arcum dabit. A. B. gra duum. 431. minu. 56. & arcum. E. B. 42. minu. 14. quare arcus. B. C. residuum vnius quare erit graduum. 47. minu. 46.


At. 13. hora gsa in figura. M. detracto arcu. D. F. ex arcu. D. E. remanebit ar cus. F. E. graduum. 89. minu. 0. qui est sit minor quarta, necesse non erit de se micirculo detrahere, sed eo uti, & sinu eius de inuenire. 99985. & est ex vna quarta detrahere, quare tanquam residuum arcus remanebit. F. F. 51. adu. 1. minu. 0. cuius sinus. 1745. multiplicatus cum angulo. A. F. D. productumque diuisum per sinum totalem, sinum dabit. 1714. cuius arcus graduum. 0. minu. 59. ex quarta subtractus dabit angulum. E. F. I. graduum. 89. minu. 1. cuius sinus erit. 99985. quo mediante diuiso producto sinus. F. F. 99985. au sinu totali. 100000. proueniet idem sinus totalis vnius quartæ, eritque. E. F. quoniam multiplicatus per sinum. 1714. residu angul. E. B. F. diuisioque producto per si num residui ipsius. F. F. qui est. 1745. proueniet sinus arcus. B. F. 98223. qui arcus erit graduum. 71. minu. 11. qui ex vna quarta detractus, remansit gra dus. 10. minu. 49. arcus. B. C. orientis iuncto deinde arcu. B. F. arcum. A. F. habebimus

habebimus arcum A. B. graduum. 169. minus 28. tanquam arcum horarium.

Alio opere. 12. hora non indigebit, quam ut lineę horarię distantia à pede gnomonis, ab ipso gnomone inveniatur, quod enim ad lineam horariam. 12. horę attinet, semper parallela est communi sectioni verticalis cum plano horologii, cuius causam cap. 52. manifestauimus. Però angulus à gnomone, hoc est axe orientis, & à linea quę communis est sectioni meridiani cum circulo horario tali hora comprehensus, hac ratione facile inueniri poterit, unmerato arcu meridiano comprehenso inter punctum septentrionalem, communem orienti, & meridiano, & punctum qui est trans axim mundi, communem meridiano, & parallelo loci: qui quidem arcus meridianus in casu proposito, erit graduum. 1. minus 0. sub oriente, tantus quoq; erit predictus angulus, ab axi orientis, & communi sectione meridiani cum circulo horario terminatus, qui erit septentrionalis à verticali, quare linea horaria in plano horologii, meridionalis erit à verticali ipsius horologii, sinusq; eiusdem arcus, erit. 3490; tanta erit distantia predictę lineę horarię à pede gnomonis respectu gnomonis, partium. 99935; sinus residui vnus resti.

Vndecima hora erit notata facillima, equi putata enim in plano horologii, cap. 58. significato arcu. s. t. in quarta. C. P. 2. quartę (quo ad gradus) arcui. 13. horę, si vñ fuerimus angulis ipsius. 13. horę, recte omnia perficiemus. tali enim. 11. hora, circuli horarij septentrionalis polus, qui per circumferentiam paralleli loci voluitur, adeo distare à meridiano occidentem versus reperitur, ut ab eodem orientem versus decem tertia hora distat, intervallo 15. graduum, (si ipsum de altero polo horario, contrario versu dico in parallelo opposito) & ex consequenti cum eodem respectu orientis 11. vt 13; quare

codem pacto eundem situm retinebit circulus horarius, respectu meridiani, orientis, & æquinoctialis 11. vt 13. hora, quamuis diuersis ex partibus respectu verticalis, quę partium diuersitas, in causa est, cur arcum. s. t. in quarta. P. s. ad occidentem sita sumamus. Id ipsum facimus gratia. 10. horę, & 9. vsq; 14. & 15. hñdem de causis,



De alio modo lineandi horarias lineas ita ut sit orientales indeterminatas
 abique proportionum subsidio, vel triangulorum sphaerica-
 rium abscisso, tam ex continuis quidem ex ab-
 scissis. Cap. LXI.



ITA quoque via in cognitionem devenire possumus ar-
 cum P.H. & h. e. anguli quodq. P. h. e. figure cap. 58. pre-
 termittis reliquorum speculationibus, nec tantum cogi-
 tationibus adductis. Quam cognitionem consequi, tum
 discreti, tum continui methodo poterimus, & primum in
 horologijs horizontalibus. Cogitamus igitur planum
 æquatoris subscriptę figure, notatum characteribus.
 G. V. elevatum à plano horizontali. X. L. M. H. quantum eo loco adest, quo
 fabricandum est horologium, sitq. planum. T. G. quod circulum horarium
 inclinatum æquatori iuxta propositam horam significet, quare. G. e. Q. erit
 linea

linea recta ex 3. vndecimi Eucli. sitq; in superficie æquatoris. G. V. angulus. P. G. Q. æqualis, illi qui in figura. cap. 38. signatur. P. g. t. respōdēs arcui æquatoris cognito, tum linea. d. t. a. quo puncto liberit inter. Q. g. sit perpendicularis lineæ. g. t. Q. in superficie æquatoris. In cuius. d. t. a. situ, cogitemus erectam superficiem perpendiculariter plano. G. V. æquatoris, quæ sit. b. a. cuius communis sectio cum superficie. T. g. sit. b. t. quæ. b. t. perpendicularis erit lineæ. Q. t. g. ex definitione Eucli. vndecimo libro adducta, quare angulus. b. t. d. cognitus erit, cum illi angulo septentrionali occidentali æqualis sit, qui inter circulum horarium, & æquatorem comprehenditur, tum à puncto. a. ipsi. G. P. perpendicularis ducatur. t. e. in cuius situ, cogitemus rectam superficiem perpendicularem æquatori. i. e. quare ex ratiocinatione. 18. vndecimi, erit quoq; perpendicularis orizonti, cuius communis sectio, cum superficie. a. b. sit linea. t. i. quæ perpendicularis erit plano æquatoris ex 19. vndecimi. Cogitemus deinde in linea. b. t. quem voluerimus punctum. b. k. quo lineam. b. c. parallellam ipsi. d. a. in superficie. b. a. & T. b. n. parallellam. Q. t. g. in superficie. g. T. Imaginemur deinde à b. ad planum æquatoris perpendicularem. b. d. in superficie. b. a. ac superficiem in qua sint duæ lineæ. b. n. & b. d. quæ perpendicularis erit æquatori ex 18. vndecimi culus communis sectio cum prædicta superficie, sit. d. a. huius autem superficiæ. b. a. cōmunis sectio cum superficie. i. e. sit. u. n. iam. d. u. perpendicularis erit superficiæ. a. b. ex definitione prædicta, quare superficies. b. a. & b. g. perpendiculares quoq; sunt superficiæ. a. b. ex dicta. 18. b. g. quidem ob. t. g. b. u. verò ob. b. a. cum b. a. p. a. riter perpendicularis sit eidem superficiæ. a. b. ex 8. vndecimi, erit igitur. d. u. parallela. b. a. ex 6. vndecimi, atq; ita. d. b. parallella. u. n. quare erunt æquales inuicem ex 34. primi, angulus igitur. b. t. d. cum fuerit vt iam dictum est cognitus, angulus. b. d. t. rectus ex dicta definitione, quare angulus. d. b. t. ex 22. primi Monteregij, (si numerorum ratione vtamur) cognitus erit, & ex 6. secundi eiusdem, proportionem laterum cognoscemus adinuicem dicti trianguli. d. b. t. quare pariter, & ipsè de causis in cognitionem veniemus proportionis laterum trianguli. t. u. d. cum angulus. d. i. p. s. sit rectus, ex prædicta definitione, cum. d. u. perpendicularis sit superficiæ. d. f. quandoquidē ex 9. vndecimi parallela est. t. g. & angulus. d. t. u. cognitus est, tanquam æqualis angulo. e. g. t. cum tam angulus. e. g. t. quam angulus. d. t. u. angulo. e. t. g. cōiunctus rectum definiant, proportio igitur ipsius. d. u. aut. b. n. æqualium inuicem ex 34. primi, & d. b. aut. u. n. pariter æqualium, cum. d. t. cognata erit, ita. u. t. ad eandem. d. t. vt prædictum est, proportio itaq; u. n. cum. u. t. cognita quoq; erit, & cum angulus. u. in triangulo. n. u. t. sit rectus, vt iam diximus, itaque angulus. u. t. n. cognitus erit ex 28. primi Monteregij, & ex prædictis rationibus proportio. t. n. cum qualibet dictarum linearum cognoscetur,

quare in superficie .i.e. equatore & orizonti perpendiculari, angulus .n.r.e. cognitus erit. Iam verò cogitemus lineam .c.e. communem sectionem superficiem .i.e. & orizontis, quæ cum .e.r. angulum æqualem angulo ab æquatore cum orizonte factò describet, & .z.e. ex definitione perpendicularis erit. e.g. quare angulus .z.e.g. rectus erit. Porro, g.h. sit communis sectio circuli horarij cum orizonte, itaq; angulus, nondum cognitus .h.g.P. æqualis erit angulo à communi sectione circuli horarij, & orizontis cum communi sectione verticalis cum eodem orizonte, qui ad horam vltj; duodecimam semper acutus est, retrocedendo à 24. in duodecimam vsq; , vt est ante dictum, concurrent igitur .e.z. & g.h. in puncto .z. ex parte quatt; septentrionalis occidentalis, ex petitione Eucli. lib. primo, à Proclo demonstrata, cumq; sit .t.n. communis sectio superficiem .b.g. & i.e. in quibus, ex supposito, cum sint duæ lineæ .g.z. h. & e. r; proculdubio concurret .t.n. sectio communis dictarum duarum superficieum, in eo puncto, quo duæ lineæ .g.h. & e.z. coniunguntur, hic verò est .z. Cognito igitur angulo .e.t.z. vt diximus & t.e.z. æquatoris cum orizonte versus septentrionem, supra eundem orizontem, pariter angulus .e.z.t. residuum duorum rectorum, cognoscetur, consequenter proportionales laterum trianguli .e.z.t. ex prædictis rationibus, quæ pariter cognitionem dabunt proportionum laterum trianguli .e.g.r; cum angulus .e. sit rectus, & angulus .g. datus, quare proportionales .e.g. & e.z. ad .e.t. cognitæ erant, & ex consequenti ipsius .e.g. ad .e.z. deinde, cognita cum fuerit proportio .e.g. ad .e.z.

quæ latera sunt, angulum rectum .e. trianguli .g. e.z. ambientia;

angulus .g. ipsius pariter cognitus erit ex 28. prima Mon-

uilegij, consequenter ipsius arcus orizontis cap. 38.

nominatus .h. P. similiter cognitæ proportio-

nibus trium laterum adinvicem .z.g. z.

t. & g. r; cognitus erit angulus .z.

g. t. & ex consequenti


eius arcus cir-

culi

horarij, prædicto capi-

te vocatus.

h. t.



De cognitione anguli intercepti à circulo horario & ab oriente.


Cap.

LXII.




HActenus in cognitionem devenimus trium arcuum figuræ cap. 58. videlicet .P.h.t. & P.t. quare facillimum erit cognoscere angulum .P.h.t. à circulo horario cum horizonte descriptum. sint in subscripto circulo tres arcus .h.t.h.p. & p.t. cogniti, si velimus angulum à secōre .h.g.t. & h.g.p. comprehensum cognoscere, cum pyramidaliter terni sectores simul applicati fuerint, ita progrediamur, ducta sit à puncto .t. ad .h.g. perpendicularis .t.e.o. productaque

vsque ad concursum cum $g. p.$ in puncto. $o.$ concurret autem proculdubio cum $p. g.$ quando quidem angulus $h. g. p.$ in dicta figura cap. 38. acutus est, ut nos iam diximus, & angulus $o. e. g.$ rectus, quare utriq; minores erunt duobus rectis, ducta deinde $o. r.$ tres lineas habebimus. $t. e. o.$ & $o. r.$ ex quibus formato triangulo, ducte $t. e.$ & $e. o.$ angulum quęsitum dabunt. Quod cum sic speculans facillimum, cuilibet mediocriter erudito relinquatur.



b. horizonis, in figura capitis. § 8. quæsitum. Etenim si cogitabimus tres hos
 circulos, orientem æquatorem, & horarium, sitos iuxta propositum, ut in
 figura cap. 61. cernitur, & in eis extensas lineas à me dictas, exceptis b. d. &
 q. n. cum line extra ipsos, quamvis inter se reuera parallellas, perpendiculari-
 ter in superficie æquatoris finientes, in punctis d. & n. extremis lineæ. d. u. pa-
 rallellæ ipsi. t. g. ex 28. primi, exactiss. opus cõsequetur. Formetur deinde trian-
 gulus ex tribus lineis. R. z. G. r. & t. z. quare angulus à t. G. & R. z. compre-
 hensus, erit angulus respondens arcui circuli horarij. h. e. capitis. § 8. quoniam
 prædictæ lineæ, communes sectiõnes sunt circularum angulus cuiusmodi con-
 stituentium. R. z. inquam communis sectiõ est horarij cum oriente; G. t. ho-
 rarij cum æquatore, t. z. tertium latus circuli horarij. Qui volet, inchoare
 poterit ab angulo. d. r. b. tum ducere. t. G. perpendicularem. t. d. & à quouis
 puncto. G. lineæ. t. G. applicare angulum. P. g. t. æqualem respondentem arcui
 æquatoris, & à puncto. t. ipsi. P. g. perpendicularem ducere. t. e. cetera ut est
 ante dictum perficienda sunt. Quod verò pertinet ad terminandas lineas
 horarias, satis iam capite. § 9. dictum fuit, excepto quod si via continui, &
 non discreti, operi incumbamus & si quam brevissimè fieri potest, maxi-
 mam amplitudinem solis in continuo invenire voverimus designandus erit
 meridianus, in quo sit communis sectiõ ipsius cum verticali, & oriente, alie
 roq; tropicorum, & à puncto communi diametri tropici cum orizon-
 tali, ducat parallellam verticali, vsque ad circumferentiam dicti
 meridiani, atq; ita arcus istius meridiani inter paral-
 lam hanc & verticalem comprehensus, ma-
 ximæ amplitudini solis æqua-
 lis erit, quod cui-
 libet
 rudi tyroni sine doctore
 patere po-
 test.

prehendatur, quibus perpendicularis erit. G. L. communis sectio orientis cum predicto circulo & G. X. communis circulo horario & muro, quæ sita, & G. r. communis muro, & orienti, quare angulum. X. G. r. quærcimus, in cuius gratiam à punto. r. cogitur. r. X. in muro, perpendicularis tamen orienti, quæ ex definitione alius notata cum. G. r. & r. L. angulum rectum efficit, angulus autem. r. G. P. muri cum orientali verticali cognitus est ex supposito, pariterq; angulus. L. G. P. ut iam ostensum est, cognitus, cuius arcus capite 38. eo loco, erat. P. h; angulus itaq; r. G. L. cognitus erit, ita etiam angulus. r. L. G. cum sit rectus, quare proportionem trium laterum trianguli. G. L. r. cognite erant, idem dico in triangulo. L. r. X; cognita igitur proportione. G. r. cum r. L. mediante triangulo. G. r. L. proportione. r. L. cum r. X. via trianguli. X. r. L; quamprimum, copulatum ex utraq; proportione cognoscetur, hoc est G. r. ad r. X. proportio, & cum angulus. X. r. G. rectus sit, statim quæsitus angulus. r. G. X. cognoscetur. Ut autem ducatur linea horaria in muro, distans à centro mundi, mediante longitudine gnomonis, parallela ipsi. G. X; qui eiusmodi operationem in orientali sub lineam capitis. 38. comprehenderit, nihil in hac re difficultatis patietur.



De eodem horologio italico alia theorica.

Cap. LXV.



LI A quoq; via, modum speculatus sum, duccendarum linearum horariorum italicarum in qualibet superficie plana, quem nunc describam, primum casu repertum quidē, verum eius rationem postmodum speculatione adiunxerim. At prius quam ulterius progrediar, scire necesse est, mihi semper placuisse in horologijs depingendis, duplices semper horas ordinare, italicas videlicet, & communes ab vno eodemq; ynomone indicatas, vt videre est Zibelli, in Cisalpi-

na Galla, Rupi, Albi, alijq; locis, & in hoc Pedemontio maximam partem eorum quae Taurini à se sunt ordinata, maximam inquam partem sunt enim nonnulla simplicia, vt illa Palatii Veredariorum, & faciei orientalis palatij Domus à Leini, & vtrius comitū Panthaleri. Orizontalia nihilominus duplicia semper à me sunt descripta, qua orizontali occasione animaduerte hā semper aliquem ordinem intersecationum linearū horariorum italicarum cum ipsis vobis esse in vna rectitudine, hoc est in vna linea recta; esse autē hae lineae horariae. 1. o. horae italicae cum. 11. hora eōi, & 12. italicae cum meridiana, 1. 4. cum prima communium, 1. 6. cum secunda communium, 1. 8. cum tertia communium, 2. o. cum 4. communium, 2. 2. cum 3. communium.

Quod expertus in diuersis elevationibus poli, idem semper accidere vidi, distas nempe intersecationes in vna semper eademq; rectitudine esse, hoc est in vna eademq; recta linea. Cumq; animaduertere in singula intervalla horarum communium binas horas italicas importare, veni in opinionem singulas dimidias horas communes horam vnam italicam requirere experientiaque comperi dimidiarum horarum communium intersecationē cum italici lineis disparilibus, pariter in eadem rectitudine esse cum primis, cumque examinare quanam esset haec rectitudo in quavis elevatione poli, inueniēbam semper esse in rectitudine linear italicarum horar. 1. h. quare huius rei causam ac rationem perquirere mēte cepi, quod prius feci quam anima duceret, aut putar, in quemquam eiusmodi re ad formanda horologia italica mediū ibas intersecationibus, vt ipse, hanc igitur speculationē primum literis mandabo, tum quae postmodum animaduerti. Cogitavi subscriptum orientem e bliquum. q. d. p. b. meridianam. q. x. e. p. xquatozem. d. n. o. e. b. circulum horarium italicum. d. l. x. b. eo sita, aliorum respectu, quo reperiri solet cum lineam. 1. 1. horae producit, qui sita, eiusmodi est, vt eius polus spectrationalis, qui p. r. circumferentiam parallelū loci (quo quisque fuerit,) volui consuevit,

Q

commo-

commouisse se inueniatur à zeni, spacio graduum. 180. quare denno in meri-
diano reperitur, eiusq; circulum interfecare orizontem in eodem loco. d. o.
b. quo ab æquatore idem orizon fecatur, cum horum trium circulum poli
in eodem meridiano existant. Cogitavi deinde alterum circulum horarium
italicum, situm ad libitum, hic erat. a. l. n. c. cuius circuli situm consideraui re-
spectu circuli. d. x. b. quorum intersecatio sit. o. i. deprehendi postmodum ra-
tione, motum ipsius circuli horarij, resolutione sui poli per circumferentiam
paralleli loci, quantitatem nunquam aut augere aut minuire angulorum, ab
eo cum æquatore descriptorum: quod semper in eodem esset situ respectu ip-
sius æquatoris, cum ipsius poli à polis æquatoris distantiam non varient, qua-
re illud efficitur, vt semper angulus. x. b. e. æqualis sit angulo. i. n. d. & cum an-
gulus. i. d. n. æqualis sit angulo. x. b. e. itaq; bini anguli. i. n. d. & i. d. n. inuicem
æquales erunt, quare arcus. n. i. & d. i. æquales quoq; erant adinucem ex quar-
ta primi Menelai, aut ex 40. tertij Monteregij, quæ eadem est. Cogitatis po-
steatribus circulis horarijs communibus à polo. t. mundi, qui feratur per tria
puncta illa. d. i. n. bini trianguli efficiuntur. t. i. n. & t. i. d. æquilateri inuicem.
quare angulus. i. t. n. æqualis semper erit angulo. i. t. d. ex 35. tertij Montifre-
gij, atque ita à circulo horario. t. i. u. arcus. d. n. æquatoris per medium semper
secabitur, res igitur hi circuli, circulus videlicet. d. x. b. duo decimæ horæ ita-
licæ, & a. i. n. c. alterius horæ italicæ. & communis circulus. t. i. u. qui per me-
dium arcus. d. n. fertur, vnam eandemq; habebunt adinucem communem se-
ditionem. l. o. itaq; si sumatur circulus orizontalis. q. d. p. b. pro 14. horæ ita-
licæ, vt reuertest, circulus. a. i. n. c. verbi gratia pro 19. horæ italica, arcus. n. d. e-
rit horarum quinq; & arcus. n. u. duarum cum dimidia, quamobrem circulus,
t. n. horarius communis erit primæ horæ à meridie, & circulus. t.

u. tertie cum dimidia postmeridiana, ex quo sequitur
duas illas lineas horarias, italicam horæ.

19. & communem tertie cum


dimidia, in circu-

lo. d. i.

x. b. duo decimæ ita-

cæ sese interse-

care.



De praxi precedentis capituli in orientali horologio.

Cap. LXVI.




MA C speculatione inuenta, paucis post diebus cogitavi me id facere posse quod antiqui faciebant, qui eum velent lineas horarias italicas ducere, primam intersecutiones hyperbolarum tropicorum cum circulis horarijs communibus inueniebant, vti maxima, & minima anni die, illi elevationi polari, ita ego idem vt praestarem intersecutionibus vteret linearum communium cum italicis in 12. italicis ducendis lineis italicis, indeterminate tamen, hac ratione.

Q 2 Sic

Si exempli gratia, efformatum iam horizontale horologium horarum communium cum suis medietatibus, punctis significatis, occultis nihilominus, cum solum horologium italicum depingendum erit, cuius centrum sit. u. erutum (pro presenti casu) ex subscripta figura meridiani. l. f. e. d. a. cuius centrum sit. o. axis mundi. e. o. u. diameter equatoris. n. o. q. horizontalis. o. d. verticalis. l. o. g. meridiana horologii. u. r. g. q. & in plano horologii ducta sit equinoctialis. h. q. k. ductenda postea est in eodem plano linea. 1. 2. horae italicæ, quæ hæc ratione inueniri poterit. ducto videlicet in subscripto meridiano diametro paralleli loci à zenit qui erit. l. a. aut citra ductum habet. f. a. x. cum non subleuitura sit, inuenimus punctum. a. à nostra polo. e. u. mundi distans quantum nosse reperit ab eodem mundi polo distare similiter reperitur, quare certum erimus polum septentrionalem circuli horarii italicæ. 1. 2. horæ futurum in puncto. a. g. meridiani à quo. 4. per unam quartam ipsius meridiani versus polum. e. l. d. p. erit, cuius quartæ terminus sit. f. i. quo puncto. a. per mundi zenit. u. o. ducta sit diameter. l. o. r. q. i. erit communis sectio circuli horarii cum meridiano, & punctum. r. commune erit prædictæ sectioni, & meridiano horologii, & quoniam hæc linea dicitur circulus horarius perpendicularis est meridiano, cum eius poli sint in quo ipsius meridianus ex 20. 7. rini Theodosij secundum veterem interpretationem, ita etiam planum nostri horologii perpendicularis est dicto meridiano, unde sequitur ex 19. vnde ceterum. l. a. linea horarium. 1. 2. horæ italicæ in horologio horizontali etiam perpendicularis esse dicto meridiano, pariter meridianus etiam. u. r. q. quartæ supra in plano horologii distantia. ita ducta q; perpendicularis. u. r. a. puncto. o. a. 1. redit, cum lineam horariam italicam. 1. 2. horæ habebimus, in qua horæ eam. u. r. a. cum italicis communicant, & cum in æquinoctiali singulæ quoq; communicent, quandoquidem circuli horarii italicæ, se communibus intersecant etiam in æquatore, ut per se patet, itaq; certum erimus, eam punctum. 7. horæ communis matutine in æquinoctiali, idem sit cum eo qui est 11. horæ italicæ si punctum hoc recta coniunctum. f. i. u. a. puncto dimidietate horæ post. p. r. l. i. n. e. in linea. 1. 2. horæ, certum inquam erimus ex præcedente. s. p. r. d. u. a. t. i. o. n. e. illam futuram lineam. 1. 3. horæ italicæ cum arcus. d. n. in supra scripta s. p. r. a. sit horarum. 1. 1. quartæ post. p. r. d. u. erit horarum, 1. cum dimidietate horæ. s. e. c. p. o. m. e. r. i. d. i. a. n. a. & inuenit dimidietatem horæ pro meridiano, cuius extremitas coniungitur cum lineæ. 1. 3. horæ italicæ, recta. d. e. i. d. e. s. e. u. n. d. o. p. t. a. t. a. s. h. o. r. æ. c. o. m. m. u. n. i. s. matutine in æquatore eam puncto. p. a. r. t. e. p. u. n. c. t. u. m. p. o. l. l. m. e. r. i. d. i. a. n. e. in prædicta linea. 1. 3. horæ italicæ, lineam horariam italicam. 1. 4. horæ habebimus, & variatione. d. u. i. n. c. e. p. s. i. q. u. e. ad 3. horam post. p. r. e. d. i. c. i. m. u. s. : gratia verò vnde ceterum italicæ, punctum horarum vnde ceterum dimidietate matutina cum in linea. 1. 3. italicæ, iungamus cum puncto. 3. p. o. l. l. m. e. r. i. d. i. a. n. e. in æquinoctiali, pro:

decendo

ducendo ex parte occidentali horologij, cum sit linea horarum orientalis, gratis verò. 1 o. horæ, iungemus punctum, 1 1. horæ communis in linea. 1 2. italica, cum puncto quartæ communis postmeridianæ in equatore, & gratia. 2. horæ coniungemus punctum. 1 o. cum dimidia communis in 1 2. italica cū puncto. 3. italica equatoris, quod tum ex prædictis rationibus, tum ex ijs quæ de his horis capite. 5 2. sum speculatus rectè fiet.



De eadem praxi supra parietem obliquam.

Cap. L X V I I.



T verò si quis horologis italica in muro obliquo ipsi meridiano, & verticali designare vellet, quorum vias est frequentior, cum per raro muri paralelli altero dictorum duorum circularum occurrant, de quibus primum dicā, quod his amplius indigemus, subiecto exemplo orientalis meridians, seruetur autem hic ordo.

Designetur circulus horizontalis diuisus à meridiana. g. o. & à verticali. g. t. communis sectio muri cum dicto horizonte sit. o. t. sit g. o. m. o. n. g. n. præsupposita iam inuentione sinus muri, qui (verbi gratia) ad quam orientalem meridianam vergat, quare. t. erit commune punctum horion tali muri, & lineæ. 1. 2. horꝝ italicꝝ, communis enim sectio circuli horarij. 1. 2. horꝝ italicæ cum horizonte, illa ipsa est. g. t. verticalis, & etiam æquatoris. Hoc peractio: clarioris speculationis gratia seorsum meridianus describitur, cuius horizontalis sit. g. o. æquinoctialis. g. f. axis mundi. g. r. pars autem. g. o. horizontalis in meridiano, æqualis sit. g. o. meridiansꝝ horizontis, & à puncto. o. in meridiano, sit erecta perpendicularis. o. r. l. ipsi. g. o. quæ, præterquam in sphaera recta, æquinoctialem secabit. secet autem in puncto. s. & axim mundi in puncto. r. præterquam sub mundi polo, vt capite. 46. iam dictum fuit, quæ. l. o. r. muralis meridianæ erit. Porro in hoc meridiano inueniatur linea. 1. 2. horꝝ italicꝝ via iam ostensa, quæ sit. l. g. cuius intersecatio cum murali meridianæ fiat in puncto. f. quod semper accidit, præterquam in eleuatione poli graduum. 45. tali enim polo, circulus eiusmodi horꝝ. 1. 2. idem est cū verticali. quo facto, tertius circulus describatur pro æquatore diuisus in partes æquales quadraginta octo, ob dimidijs horas, ab soluarurꝝ horologium horarum communium cum suis dimidijs, ratione à me speculata cap. 46. aut sequentibus capitibus: cuius horizontalis linea sit. o. t. meridianæ. o. f. æquatoris sit. l. t. 1. 2. horꝝ italicꝝ sit. l. t. & præter lineas horarias communes cū suis medietatibus, quas sol illuminare queat, omnes duodecimas lineas horarias cum suis medietatibus duci iubeo, quæ intersecari aptæ sint à linea. 1. 2. horꝝ italicæ, vt in subscripta figura cernitur. Hoc peractio, punctum. 1. 2. horæ communis æquatoris recta coniungatur cum puncto. 3. horꝝ communis in 1. 2. italica, quare lineam horariam italicam habebimus. 1. 5. horꝝ ex superiore speculatione. deinde punctum. 1. 1. horæ communis æquatoris, cum puncto dimidiꝝ horꝝ inter secundam, & tertiam communem in d^{na} e. coniungatur habebimus quæ lineam horariam italicam. 1. 7. horꝝ, tum. 10. horꝝ cū bis æquatoris


æquatoris punctum, iungatur puncto. 2. communis ipsius. f. t. & habebimus lineam. 16. horæ coniunctio deinde nonæ communis in æquatore, cum puncto dimidiæ eius primæ, & secundæ in f. t. lineæ dabit. 15. horæ, & coniunctio octavæ cõis in æquatore, cum puncto primæ cõis in f. t. lineæ dabit. 14. horæ, punctum. 7. cõis in æquatore cum puncto dimidiæ inter meridianam, & primam in f. t. dabit lineam. 13. horæ, lineæ. 12. iam ducta est, gratia verò. 11. italicæ iungemus punctum ipsius quintæ cõis in æquatore, cum dimidiõ inter vñdecimã, & 12. communem in f. t. ob 10. italicam iungemus punctum quartæ communis in æquatore, puncto. 11. communis in f. t. quod idem servabimus in muris à prædictis circulis declinantibus meridiano atque verticali.

In muris autem meridianis lineæ horaria. 12. horæ italicæ, semper orientalem interfecabit in puncto pedis gnomonis obliquè, præterquam sub polo. 45. quo ad angulos rectos interfecat, ut cuiq; contemplari per se licet.

At in muris verticalibus dicta lineæ. 12. horæ italicæ, parallela semper est orientali murali, tanquam ab ipso orientali distans quantum o. f. subscripti meridiani postulat, quæ. o. f. nunc est supra, nunc infra horizontalem, supra quidem, ijs quorum polus ad gradus. 45. non pertingit, infra verò ijs quibus ab oriente ultra. 45. gradum polus eleuatur, quibus verò polus perfectè est altitudinis. 45. graduum, ijs, murus prædictæ horæ circulo horario perfectè parallelus est ex gnomonis distantia. quare in reliquis muris prædictus modus servandus erit, verticali autem altitudinis poli. 45. graduum gratia formabitur horologium italicum orientale eiusmodi elevationis poli, ac loco numeri. 23. horæ illius lineæ, ponetur numerus. 13. lineæ. 22. horæ, numerus. 14. vigesimæ primæ numerus. 15. atque ita deinceps, quo factò erectoq; plano horologij perpendiculari orienti, habebitur inuentum. Cuius ratio facillima hæc est.

Tali enim polo, circulus horarius italicus. 12. horæ, idem est cum verticali, qui parallelus est plano horologij, ut 24. horæ idem est cum oriente, & 13. eundem situm habet respectu verticalis sub eiusmodi polo, ut respectu orientis hora. 23. cum axis mundi cum meridianâ verticali angulum æqualem constituat, angulo axis cum meridianâ orientali, ex 32. primi Eucli. ita 14. hora, in eodem situ dictus circulus reperitur respectu verticalis, ut 22. hora respectu orientis, idem dico de reliquis. Cæterum, cum hac via lineæ horariæ italicæ, in quouis muro ductæ fuerint, satis erit si pars lineæ horariæ sub orientali tantum apparuerit, quam si quis medio tropicorum terminare non curaverit, vitandi laboris causa, securus de eorum longitudine esse hac ratione saltem poterit, ne umbra gnomonis ipsas excedat. Nam in muris declinantibus à meridiano & verticali inueniet in meridianâ murali punctum tropici cancri, quod est facillimum, & in orientali extremum amplitudinas

diuis ælii, ortum videlicet æliuum à me capite. 54. Solis demonstratum, & à puncto in orientali inserto ad punctum in meridiana repertum rectam lineam ducere, quæ prædictas lineas horarias interminet, ut umbra gnomonis nunquam excedat, quod cuilibet intelligenti curitates girificationum consuecarum, manifestum est. Eiusmodi terminacione vltus sum ego, anno. 1570. supra faciem orientalem ædis diuo Laurentio factæ, in hortis fert. ad unum Ducis Sabaudie clementissimi Domini mei, cuius impulsu, tunc horologium via hoc capite à me monstrata designari.



De eodem horologio italico alia methodo.

Cap. LXVIII



LIAM quoq; rationem ducendi lineas horarias italicas indeterminatas in quolibet plano proposito aliquando specularis sum. Hæc eiusmodi est, proposito in primis plano parallelo orizonti tantum sub ipso orizonte depresso, quantum gnomonis longitudo exigit. Cogitavi nostrum hemispherium, cuius orizon sit. *h.l.g.g.* centrum mundi. *l.m.* meridianus, *b.o.g.* polus mundi. *o.* verticalis. *l.z.u.g.* zenit. *u.* equator. *l.m.f.g.* circulus horarius italicus. *f.z.m.p.* qui exempli causa in situ. *z.j.* horæ constituitur. Quart arcus. *l.m.* equatoris, erit graduum. *15.* à quo, polus septentrionalis huius circuli, totidem gradibus distabit (ex giro paralleli loci) remotus à zenit. *u.* qui circuli horarii polus sit. *n.* Jam à zenit. *u.* per polum. *n.* cogitavi quartam. *u.n.h.* & cognita amplitudine paralleli loci, facile est cognoscere cordam. *15.* graduum arcus dicti paralleli loci, quæ eadem est cum corda arcus. *u.n.* maioris circuli, qua mediante, in magno circuloq; collocata; quamprimum cognitus est arcus. *u.n.* quarta. *u.h.* quare residuum. *n.h.* immediate cognoscetur vna cum angulo. *n.i.h.* equali angulo comprehenso inter gnomonem horologii, & communem sectionem azimuth perpendicularis circulo horario, cuius. *u.h.* quarta est, & dicto circulo horario; cuius communis sectionis pars illa, linea est, quæ à centro mundi, & linea horaria in plano horologii terminatur, hanc angulum vocamus inclinationis. Duceo deinde circulum. *o.r.x.* equalem orizonti hemispherij, cuius centrum sit. *o.* & arcum. *o.r.* sumo equalem arcui. *o.a.* qui cognitus est, & quam qui interpolaris mundi, & giro paralleli interijciatur, postmodum sumo arcum. *l.x.* equalem. *u.n.* parti quartæ. *u.h.* via iam ostensa cognoscitur arcum. *x.z.* capio equalem. *o.h.* qui etiam. *o.r.* iam sumpto equalis erit, & duco perpendicularem. *o.a.e.* ipsius. *c.v.b.g.* ad. *x.c.* postea alteram. *x.iungo.* e. quare si in hemispherio à puncto. *o.* cogitauerimus suam ipsius. *o.n.* videlicet. *o.a.* & à puncto. *a.* perpendicularem. *a.e.* ipsius. *u.i.* & lineam. *ab.ead.* o. inuenimus tres has lineas esse illas ipsas. *o.a.* *a.e.* & *o.e.* in secundo circulo ductas, illasq; hemispherij angulum. *a.* comprehendere, equalem angulo. *b.h.* *i.h.* ex 10. vndecimi Euclidi. ita vter his tribus lineis formato triangulo, habituissimus cognitum angulum. *a.* cuius. *b.h.* arcus est. Quo mediante, seu. *u.h.* lineæ. *i.* *h.* inuenimus, seu medius parallelæ eius, eiusdem azimuth in plano horologii, quæ eandem angulum cum verticali horologii constituit ex 10. vndecimi prædicti. quæ. *i.h.* in plano horologii, lineæ horariæ à pede gnomonis perpendicularis

habet

laris est. Inuenturi autem quantitatem ipsius inter pedem gnomonis, & lineam horariam, hanc rationem sequemur.

Sit (exempli gratia) planam horologij. *a. f.* in quo sit meridiana. *a. d.* & angulus. *b. i. h. sit. a. d. a.* duci iubeo. *d. i.* equalem gnomoni perpendiculariter occulte ipsi. *d. a.* & à puncto. *i.* versus *a.* applicari angulum. *d. i. k.* equalem superius seruato, vocatoq; angulo declinationis, vbi verò. *i. k.* secauerit. *d. a.* in puncto. *k.* ducatur. *A. K. S.* perpendicularis. *d. a.* quæ. *A. i.* erit horaria linea quæ sita. Neq; verò prætermittam circulum cuius. *u. n. h.* quarta est, perpendicularare ita esse orienti, vt circulo horario, ex 19. primi Theodosij, atque hos duos illi, quæ ex 19. vndecimi Eucli. *f. i.* perpendicularis erit eidem, angulum rectum cum. *i. h.* constituet. Itaq; ex 10.


prædicti vndecimi linea horaria. *A. S.* quæ parallela est. *f. p.* ex 16. prædicti angulos rectos in puncto.

k. cum *d. a.* efficiet, quæ parallela est ipsi. *i. h.* ex 16. prædicta.




Elincetari porro hac ratione horologium italicum in muro perpendiculari brizonti, & primum in muro parakello verticali: idem hemisphæriam cum iisdem circulis cogitamus, præterquam quod à puncto polo verticalis, mente concipienda est quarta. b. n. y. quæ per polum. n. circuli horarij feratur: circulus igitur dictæ quartæ vtriq; circulo perpendicularis erit, ex 19. primi Theodosij, quæ-

rendusq; erit situs lineæ. z. i. eius enim parallela in plano horologij erit horaria, itaq; cū supremus arcum. l. z. qui toties erit cognitus, quoties arcus. n. y. cognoscetur qui. n. y. intermeridianum, & quartam doctam interponitur, cuius circulus, per polos verticalis, & circuli horarij feratur, ex quo cum sit perpendicularis vtriq; circulo, & vterq; ipsi, igitur ex 17. prædicti, punctum. z. prædicti circuli polum erit: & cum. a. polum sit orientis, arcus. n. z. duabus quantis. n. l. & z. y. communis erit, qui ex vtraque parte detrahitur eodem modo, remanebit n. y. æqualis. l. z. Cumq; ego inuenierim (occasione horologij horizontalis hac via) arcum. n. n. & eius residuum vnus quartæ, videlicet. n. h. corda igitur. n. h. cognita erit, & ita sinus eius. a. x. idem dico de. h. g. cum eius sinus. h. a. & ex consequenti etiam cognoscemus. i. a. i. x. & a. x. angulus enim. h. i. g. cognitus est, cognito arcu. h. g. & quoniam angulus. n. x. a. rectus est, igitur. n. a. cognoscetur. Iam verò cogitamus. n. t. sinum arcus. n. y. qui verticali perpendicularis erit, & ex 6. vndecimi Eucli. parallelas. h. a. quem hac ratione cognoscere dabimus operam; Tria latera iam cognita sumo. n. h. : h. a. & a. n. ex quibus triangulum seorsum constituo ex 22. primi, & super latus. a. h. perpendiculararem erigo. a. t. & à puncto. n. duco. n. t. parallelam. h. a. quare immediate. n. t. cognoscitur. nam cum. n. t. & h. a. in hemisphærio sine inuicem parallelæ, manifestum est futurus eas in ea ipsa superficie plana qua fuerit. n. a. ex 7. vndecimi, quare dubitandum non erit. n. t. seorsum, æqualem esse illi, quæ est in hemisphærio, nam cum anguli. h. a. t. vt in hemisphærio, sic extra recti sint, æquales erunt inuicem, & h. a. n. intra extraq; æquales ex 8. primi, & anguli. n. a. t. pariter, tanquam residui rerum æqualium, & a. n. t. similiter, cum æqualis sint. n. a. h. ex 17. primi, quare ex 16. eiusdem. n. a. & t. a. extra, æquales erunt illi intra hemisphærium, ex quo ipsius. t. i. cognitio consequetur, quæ mediante, & t. a. & a. i. denueniemus in cognitionem anguli. t. i. a. arcus videlicet. y. g. & ita eius residui vnus quartæ. y. u. & idcirco. j. z. Cognito igitur sinu. n. t. cognoscemus arcum eius. n. y. cuius angulus. n. i. y. angulus declinationis erit in quo ne vel minimum difficultatis remanebit, semel bene intellectis ijs quæ de hac re in orientali diximus.




68

2



Tantum lineę horarię italicę hac via in muro obliquo meridiana, & verticali ducantur, sit idem hemisphęrium, in quo arcus sunt parallelum muro sit. u. t. l. & l. t. sit communis sectio circuli horarij cum predicto arcu, quę primo cognoscendo proponitur respectu. l. l. orientalis. Quamobrem primum do operam, ut cognoscam arcum. l. l. quemalmodum superius ostensum est, cum de orientali loquerer, ita etiam arcum. l. d. ut demonstratur cum de verticali primo dicit,

effet, quo facto duco sinam. d. m. arcus. d. l. quare in cognitionem venit eius
 longitudo: tum à puncto. m. duco perpendicularem. n. a. ipsi. f. i. quæ etiam
 cognoscitur, cum. m. i. & angulus. l. i. f. cognoscatur, & quoniam angulus. d.
 m. a. rectus est. d. a. pariter cognita erit, ita etiam. a. i. cognito deinde angulo.
 l. i. f. declinationis muri à verticali (quod ante omnia constituendum est) ex
 consequentia nota erit. m. n. pars ipsius. m. a. & n. a. similiter, & etiam. n. i. &
 quoniam. d. a. in superficie est circuli horarij, & i. t. similiter, igitur sese interse
 cabunt in o. & cum triangulus. d. m. a. sit perpendicularis orizonti, ex 18. vn-
 decimi Eucli. & ita etiam a. i. m. u. igitur. n. o. communis eorum sectio,
 orizonti quoq; perpendicularis erit, ex 19. prædicti, quare ex. 6. eiusdem. n.
 o. parallela erit. d. m. itaq; n. o. quam primam cognita erit, atq; ita. o. a. & quo-
 niam angulus. o. n. i. rectus est, itaq; i. o. cognita erit, pari ratione. n. i. o. quæsi-
 tus. Declinationis verò angulus sphericali respondebit. u. t. f. quod est specu-
 lara facillimum, illi qui à me dicta in orizontali rectè intellexerit, quem an-
 gulum si velimus cognoscere, querenda in primis est cognitio collateralis
 eius. f. t. l. residui duorum rectorum, quare duco sinam. f. r. arcus. f. t. cogniti,
 cum angulus. a. i. o. cognitus sit, ope trium laterum trianguli. a. i. o. cogniti,
 duco deinde. r. k. perpendicularem. t. i. quæ cognita est in aento iam angulo.
 t. i. f. tum duco. f. k. quam etiam cognoscam, cum noverim angulam. f. i. f. resi-
 duum anguli. f. i. l. detracto angulo. f. i. l. tres enim hæ lineæ. f. r. r. k. &
 k. f. m. e in cognitionem ducunt anguli. f. r. k. æqualis correspon-
 denti in centro mundi anguli sphericalis. f. t. f. ex 10. vn-
 decimi Eucli. cuius residuum duorum re-
 ctorum, angulus quæsitus e-
 rit illius ho-
 rz.



De cosmologia italica ex alio Analema etc.

Cap. I. XIX.



REGÈ facturum me arbitratus sum si aperirem que mea primo fuerit
 inventio, prius quam statuerem Analema nuda formandum esse ca-
 pite. 3 r. speculatum, & traditum.

Mente concipiebam Analema, quem appellabam arimat diuisum,
 quem cum in formam dicti capitis mutassem, vitruvianum vidi, & deliberavi,
 vti

vt & me etiam Analema vocaretur. me autem confirmauit plurimum opus Ptolomei, in scriptum Analema quod mihi illa ipsa hora ab Illustris, & Excel. Domino Duce Parmæ oblatam quæ à Michael Angelo Muciasco ex Federico Comandino accepterat, à quo recenter interpretatū declaratum, & excussum fuerat anno. 1562. Cogitavi itaq; subscriptum meridianum. z. x. t. d. in quo horizontalis erat. x. d. verticalis z. t. x. quinoctialis. æ. l. axis mundi. A. X. diameter tropici. can. cri. k. h. diuisus, vt & inferius patet, & prædicto capite. 5. t. traditus fuit. verum, vt in eo prædicti capitis, parallelas horizontali ducere statui, per puncta diuisionum, itaq; in hoc ducebam à dictis punctis parallelas verticali, perpendicularares scilicet horizontali, sumpta earum vnaquaque pro sua altitudinis solis illa hora. quo facto sumebam secorsum lineam. q. p. æ. qualem semidiametro cæli, supra quam ducebam semicirculum, eaq; ne vte bar tanquam semidiametro azimuth horarij, & à puncto. q. prædicto, sinus omnes collocabam, quorum extrema altera iungebam cum puncto. p. extremo diametri. q. p. tam. p. q. recta ex parte. q. producebam vsque ad. n. ita vt q. n. æqualis esset gnomoni proposito, horizontalium gratia, & à puncto. n. perpendiculariter erigebam. n. m. ad quam vsque, sinus omnes à puncto. q. ducebam protractos vsque ad perpendiculararem. m. n. qui mihi prædicta. m. n. finiebant inchoando ab. n. ea proportione ad. n. q. quare ipsa umbra recta horæ proportionati gnomoni reperiebatur, ex triangulorum similitudine, quod in azimuth horæ facillimum est speculari, cuius declinatione à verticali, aut meridiano cognita, quamprimum cætera omnia cognoscuntur.

Consequenda autem cognitioni huic, sumebam à semicirculo ipsius. q. p. eam quæ sinui horæ respondet, vnam videlicet terminatam, à p. quæ exempli gratia sit. f. g. supra quam semicirculum describebam, & in eo partem eam horizontalis. x. d. collocabam, quæ inter centrum. o. mundi, & sinum horæ interponebatur, quam dicamus esse. b. f. iungebam deinde. b. g. quare. b. g. angulus erat declinationis azimuth à verticali, & angulus. b. f. g. declinationis prædicti azimuth à meridiano. quare propositum consequbar, ipsam verò. f. b. sinum esse anguli ab azimuth, & verticali facti, cuiuslibet mediocri speculati per se manifestum erit.

Gratia verò muri perpendicularis orizonti, & paralleli verticali, in primis duos triangulos conicipiebam similes, & orthogonos in orizonte, quorum vnus est prædictorum. f. b. g. in secundo semicirculo, alter verò similis huic triangulus est. g. d. t. supposito. g. d. gnomone, & d. t. parte illa orizontis muri, quæ inter pedem gnomonis, & communem sectionem azimuth horæ cum muro interponitur, quam azimuthalem muralem nominare soleo, maioris facilitatis tamen causa, secundum triangulum ex parte ipsius. f. hac ratione accommodabam, producebam. b. f. vsque ad. d. ita vt f. d. æqualis


effet gnomoni : erecta deinde .d.t. perpendiculari ipsi .f.d. usque ad concursum cum .g.f. in puncto .z. habebam quam primum lineam .d.t. Cognoscenda remanebat pars illa azimuthalis muralis , quæ inter punctum .t. & punctum horæ in muro terminabatur ; quare duos alios triangulos orthogonos , & similes cogitabam , quorum vnus erat triangulus horæ , in primo circulo ipsius .q.p. alter ab azimuthali muri primum terminabatur , inter horizontalem , & punctum horæ , qui est quæsius , cuius secundum latus , erat linea azimuthalis horizontalis à centro mundi , & dicta azimuthali murali terminata quam inuenimus esse . f.t. tertium verò latus erat solis radius inter centrum mundi , & punctum horæ in muro , qui , prædicto triangulo , primi semicirculi .q.p. similis est , vt cuique per se licet speculari . Quò itaque cognoscerem latus eius , quod azimuthalis muralis dicta est , producebam .p.q. ex parte .q. usque ad punctum .n. ita vt q.n. æqualis esset ipsi .f.t. azimuthali horizontali iam inuentæ : erecta deinde à puncto .n. linea .n.m. perpendiculari ipsi .n.q. protractus sinus ; n.m. definiebat iuxta propositum ex triangulorum similitudine .

Ob murum autem meridiano , & verticali obliquum , cogitemus murum propositum capite . 46. qui verticalem faceret in puncto .t. & meridianam in puncto .o. tunc cognoscebam inuento angulo .f.g. b. azimuth cum verticali , necesse esse , aut detrabere , aut coniungere eiusmodi angulum cum angulo .o.t.g. verticalis cum muro , & supra correspondentem sinui horæ primi semicirculi terminatam in puncto .p. vocatam . g.f. alterum semicirculum describere , qui sit .f.b.g. & in eo collocare angulum .b.g.f. æqualem detracto , aut aggregato ex binis angulis prædictis , azimuth scilicet cum verticali , & verticalis cum muro .g.t.o. capitis . 46. quare .b.g. semicirculi istius , ita proportionabatur horizontali murali inter pedem gnomonis , & azimuthalem muralem , vt .b.f. gnomoni proportionatur , quod sequenti exemplo fiet manifestius .


Sir in subscripto orizonte , meridiana .g.o. verticalis . u.g.t. muralis .o.n.t. gnomon .g.n. azimuthalis horæ .f.g. z. azimuthalis parallela muro .g.b. quare apertè comprehenditur . g.b. ita esse proportionatam .n.z. vt f.b. ipsi .g.n. quocirca si ex .f.b. secta fuerit pars .f.a. æqualis gnomoni .g.n. & à puncto .a. ducta .a.y. perpendicularis ipsi .f.a. quamprimum .n.z. cognosceretur æqualis .a.y. quæ erit horizontalis muralis , inter pedem gnomonis , & azimuthalem muralem terminata , atque ita etiam azimuthalem muralem .g.z. cognosceremus . Vt autem sciamus quanta sit azimuthalis muralis , inter punctum .z. & punctum horæ in muro , curabimus vt .q. n. primi semicirculi æqualis sit .g.z. istius orizontis , & in linea .n.m. dictam azimuthalem muralem habebimus , videlicet vmbra veris ipsius .g.z. propositæ horæ .


Qua ratione, Rupi albi Opido Illustris admodum Domini Comitis
Iulij Rangonis anno. 1559. horologia designavi. At gra-
tia horarum matutinarum, quae in tropico hyemali
non reperiuntur, utbar reliquis para-
lellis minus australibus, via
certè longa, & la-
boriosa.

Necdum enim contemplatus fueram quod post-
modum, anno sequenti vide-
licet, sum specu-
latus.



69





Cum



V M capite. § 1. scripserim beneficio vltimarum figurarum, in eius calce positarum, posse horologium ali quod, exempli gratia italicum, describi: & quia ibi eam dispositionem sacis natu. sua patentem, & longiori dignam tractatione, intra angustos nimis verborum cancellos conclusi, antequam ad alias restrangendas me conferam, opere pretium existimaui pau cis eam operationem dilucidius explicare quo faci-

lius ab omnibus percipi queat. Affero igitur, quod verum cum sit imaginatione coniunctis, (beneficio vnus ex lineis rectis) duobus quibuslibet punctis in superficie spherę positis, huiusmodi lineam rectam locari in superficie plana circuli maioris, qui per dicta duo puncta transit, quemadmodum quilibet facile cognoscere potest, necessario sequetur. *m. k.* tam in figura. A. quã in figura. B. in circulo horario talis horę exillere, cum supponatur tam punctum. *m.* quam punctum. *k.* esse eiusdem horę, idest in vno eodemq; circulo horario, quem circulum supposueram esse horę. *t 7.* exempli gratia. Hinc nihil refert duo puncta. *m. & k.* siquam esse duorum parallelorum ex equo distantium ab equatore, propterea quod etiam ex parallelis non æqualiter ab equ. tore declinantibus hoc contingeret, neq; vlla etiã inde diuersitas resultaret. Et quia sinus, *e. m. & k.* adsunt in vna eademq; superficie plana meridiano perpendiculari: quod à *t 8.* vnde cimi libri Eucl. Clare perspicui potest, certi erimus per *7.* eiusdem lib. propositionem, lineas. *m. k. o.* & *e. u. o.* esse in eadem superficie, cum ex *6.* eiusdem sint parallele adinuicem. Sed quia lineæ. *m. k. o.* reperitur in circulo horario, & altera nempe. *e. u. o.* in meridiano, punctum. *o.* commune erit vtriq; circulo: sed illud centrum, vt iam dictũ sit, est quoq; commune dictis duobus circulis: vnde fit, vt in figura meridiana hic subscripta, linea. *e. u. o. n. p.* sicura sit similiter communis dictis duobus circulis, que producta si esset vsq; ad eorum centrum cum meridiana murali (cum esset collocata adeo distans à centro huius meridiani quãrum sufficit. *t 1.* sicut patetis simul cum gnomonis longitudine) in ipsamet punctum talis horę in nostram cognitionem veniret. Neq; est aliquo modo dubitandum quod puncto. *o.* comperto in figura. A. beneficio sinuum contrapositionum in partibus contrarijs lineę. *e. u.* reperiri non possit idem in modo figurę. B. propter rationes iam propositas. Verum quidem est nos exactos perquiriuros parallelos inæqualium declinationum ab æquatore quamuis nudis figurę. A. cum sinibus parallelorum similiter inæqualium declinationum, ex suprãdictis rationibus obseruari possit. Inuenta verò cum fuerint omnia puncta horarum maioris diei ipsius anni in meridiana murali, inuenientur etiam in circulo murali mediantibus duobus sinibus altitudinis solis eiusdem horę in duobus

duobus diversisq; temporibus anni quorum vnum semper stabile erit, & firmum, solstitij est solitius vnde sinus habebimus omnium horarum illius solstitij, in nostro Analemate cap. § 1. significatos per. g. o. aut in Analemate precedentis capituli alios verò sinus in eodem Analemate accipiemus mediante tropico hyemali in verticali linea sub horizontali, aut mediante æquatore in verticali supra horizontalem, aut aliquo alio mediante parallelo mutando prout rei necessitas postulat. Atq; ij sinus altitudinis solis eiusdem horæ in diversis anni temporibus, erant loco sinuum supradictorum. m. e. & K. u. qui collocabuntur super aliquam lineam, vt super lineam. i. d. ad angulos rectos in punctis. u. e. que nam distantia inter se ipsos, reperietur, si in vno aliquo circulo pro horizonte sumpto inueniatur sinus azimuth solis horum duorum temporum, in quibus adiuueniatur sinus verſi harum duarum altitudinum, vt ex figura quinti capituli huius libri facillè videre est, in duabus a circumvallibus horizontalibus, q. K. & q. h. duos sinus verſos K. p. & h. i. Oportet deinde à puncto. p. ad punctum. i. lineam ducere, quia hæc erit distantia que queritur, inter. u. & e. & in reliquis eo modo procedere quem superius prescripsimus, in quo negotio nobis maxime vile erit; si utamur opera vnus alicuius circuli, similis ei quem quinto cap. proposui (quantum ad duos azimuth distos in duo puncta. p. & i. spectat) pro horizonte, ducentes per duo puncta. p. & i. vnam aliquam lineam loco eius, que isthic sub scripto meridiano ducta, & characteribus demonstrata fuit. l. e. o. u. d. Vnde linea. i. d. fiet, vt e colloceatur in superficie orientis & m. K. in superficie horarij, quibus duobus circulis punctum. o. commune erit. Ducentes deinde per dictum punctum. o. & per centrum circuli horizontalis, lineam. n. o. v. p. & hanc producentes vsq; ad horizontalem collocari prout muri gnomonisq; necessitas requiret, (vt iam dictum. cap. 46.) habebimus punctum horæ in horizontali murali, comungentes deinde puncta eorundem horarum inter se inuicem, deueniemus subitò in cognitionem linearum horariorum.


Ratione orientalis horologii idem affirmo vt superius dictum fuit quantum ad puncta horarum in meridiana pertinet: sed quod ad alia puncta attinet, cum quibus priora illa copulanda sunt, oportebit ea in linea verticali horologica notare, que propter necessarium erit, si ea velimus in dicta verticali inuenire, adhibere operam circuli verticalis, loco orientis, & sinus. m. e. & K. u. à nostris Analematibus desumentur qui erunt lineæ. o. r. Analematibus capituli § 1. aut lineæ horizontales Analematibus precedentis inter centrum, & sinus altitudinis. Sed vt acquiratur possessio eius distantie, que inter puncta. e. & u. intercedit, si uel cum situ lineæ. i. e. o. u. d. in verticali circulo, sic nosgeremus, sumetur circulus verticalis diuisusq; à meridiana, & ab orientali, in eaq; collocabuntur duo diametri ipsorum Almicantaræ, duarum

duarum altitudinum solis, desumpti ab Analemate, quorum medietates in ipso Analemate literis. o. z. tanquam nominibus extornatę erant, & collocabuntur in ipso verticali, ipsi orizontali lineę paralleli, quod factum cum fuerit, super quodlibet horum diametrorum, suum medium Almicantarat describetur, & in quolibet horum mediocum circularum, sua linea. o. z. collocabitur, accepta ab Analemate: dummodo collogetur, ut factus suo diametro perpendicularis, in quibus perpendicularitatis punctis, erit transitus lineę. j. c. o. u. d. quod quilibet in ijs scientijs exercitatus poterit cōtemplari, & huic operationi accommodare quidquid superius dictum fuit, reliqua non variant.

Et quod de italico horologio in parte protuli, de alijs omnibus horologijs in uniuersam intelligendum esse volo. Posset aliquando fortallē euenire, quod linea. n. o. hic subscriptę figurę sit meridiana, aut orizontali parallella. Quod significabit suam lineam horariam esse pariter vni ex dictis lineis parallellam. Vnde tunc temporis docetur huiusmodi linea horaria parallella dictę meridianę vel orizontali à puncto iam in altera linea inuenito.

Hos omnes modos à me inuentos hic propono, non quod aliquis ijs omnibus vti debeat (faciliores tantum eligantur) sed potius, ut omnibus per se innotesceret non esse tantam penuriam modorum, quibus posset talis operatio fulciri, quantum nostris animis superiores philosophi inculcarunt, per multos alios modos inueni etiam, quos vt longiores, & tedium parituros, hoc loco tacendos decreui: alijs tamen aliam nactus

occafionem eosdem nō prætermittam scriptis diulgare, & literarum monumentis mandare,
quamuis potius curiositatē,
& nimiam diligentiam
quam vtilitatem
prę se ferant.



Examinatio modi antiquioris circa hyperboles describendas.

Cap. LXX.



Næquorum ratio in designandis lineis horarijs italics me
dio hyperbolarũ tropicorũ, & aliorũ signorũ, atq; ope
æquatoris horarij, re cta est, atq; p̄clara, quãvis aliqua in
re falsi illi sint (ve infra docebo) cũ prædictas hyperboles
declinare voluerint. Quare sumpto arcu g. x. vnius circu
li horarij cõis, qui inter vtrunq; tropicũ interponit̄, in
uentisq; p̄ctis cõabus ip̄i arcui, & singulis parallelis si
gnorum, ducendis sectionibus cõicis signorum orbũ, & à prædictis punctis
T ductis

ductis totidem lineis per centrum. t. vt in subscripta figura. B. apparet diuisiō; quarta. t. e. p. equa totis horarij in suas sex partes equales, lineę. e. d. con-
tingenti; (quę communis est sectio equatoris cum plano horologij) lineas. t. e. t. h. & alias ducendo, quę communes sectiones sunt equatoris cum circulis horarijs, puncta. c. h. u. n. m. d. in communi sectione equatoris cum horologio applicando, sito prius puncto. e. remoto à t. quarta est distantia semidia metri equatoris horarij, applicata post modum linea. f. e. ipō. t. e. in angulo. t. e. f. aequali angulo à communi sectione superficiē horologij, & circuli perpendicularis ipsi superficiē (in quo est axis mundi, & gnomon) & communi sectione dicti circuli cum equatore, quę. f. e. adeo à puncto. t. distet, vt perpendicularis. o. t. requirit, quę. o. t. equalis sit gnomoni, proportionato equatori horario, quod toties continget quoties sumpta fuerit pars. t. e. equalis semidiametro equatoris horarij in linea. A. E. t. e. h. u. n. m. tum à puncto. f. ducendo tot lineas quoc puncta fuerint in linea equinoctiali horologiali. e. h. per eadem puncta, relatisq; inuentis distantijs (vt inferius ostendemus) à puncto. f. ad puncta intersecationum, vt par est, in lineis horarijs horologij communis, habebimus intentam quoad sectiones conicas atinet, de quibus priusquam ulterius progrediar non erit absq; panca tractare. Itaq; sciendum est quemlibet circulum horarium communem diuisa parallelis curvas diurni pariter, & æquę ac meridianum. quare cum sol in meridiano, & æquatore fuerit extremitas vmbre gnomonis in orbitalibus feriet punctum. e. & in muralibus obliquis verticali aliquod aliud punctum. verbi gratia. d. hora autem postquam a meridiano recesserit, feriet. h. in orientali, & in murali feriatam. m. quod si sol in meridiano in aliquo alio parallelo fuerit, vt in eo qui per principium Tauri & Virginis fertur, vmbra solis labatur exēpli causa in puncto. x. & ante aut post horam vnam, in puncto. r. cum pariter linea. r. solis radius sit in circulo horario hora vna ante postue meridiana, & f. e. communis sectio tauri cum circulo horario, idem & de alijs sentiendum est. Verum quod pertinet ad triangulum. f. t. e. in gratiam horologiorum muralium, quis aperius loquar non prætermittam.

Esto igitur murus in quo linea horizontalis sit. o. n. t. & meridiana. e. o. l. gnomon. g. n. perpendicularis muro, equator. e. u. l. pimum inuentio lineam. e. g. basim trianguli orthogoni. e. g. n. cuius duo latera. e. n. & n. g. cognita sunt, mediante qua. g. e. & angulo. g. e. n. inuenio latus. g. n. trianguli. n. g. e. orthogoni quod quidem latus. g. u. erit in equatore, eritq; t. e. prædicta, & g. e. prædicta erit. f. t. & u. n. erit. e. o. & n. e. o. f. reliqua quod clara sine a me prætermittentur. Aduertat autem quam diligentissime quisque ne se decipi patiatur à subscripta figura semicirculi. Q. A. E. M. cum reliquis hinc datis ex antiquorum more arque vsa. Etiam radij signorum zodiaci, qui procedunt ex
semi-

femirculo horario per centrum. a. vt. t. e. t. h. t. ut. n. t. m. t. d. in superficie æquatoris, & ita ceteris, exempli causa. t. r. t. x. cum reliquis, lineæ nõ sunt inter se recta coniunctæ, neq; enim. t. e. & t. h. vna eademq; res sunt, in o. t. e. cum. t. h. angulum in centro. t. inter se constituunt & e. h. tertiu latas est vnus trian- guli prædicto angulo oppositum in puncto. t. id ipsam de ceteris lineis dico,

quod cum a multis scriptoribus præteritis animaduersum non fuerit,

illis erroris causa fuit, cuius exemplum subieci, partem in figu-

ra auri prædicta, sumpto. g. pro centro mundi. t. & g.

u. pro. t. e : g. h. pro. t. h. g. y. pro. t. u : g. z.


pro. t. n. quod de ceteris radijs

in superficie-

bus


conicis reperian-

tur.



De veris modo ex prædictis methodis, ubi antiquorum error manifestatur.

Cap. LXXI.



VNC rationi consentaneum videtur verum vsum huius
 vię, media regula, & circino docere, veteres enim instru-
 mentum semicirculare componebant velut, Q. AE. M. su-
 per diametro. Q. M. atq; diametrum hanc applicabant axi
 mundi. f. t. circumductoq; instrumeto circa axem, in lineis
 horarijs communibus (inter ipsas etiam) signabant puncta
 quę à radijs principiorum signorum aspiciuntur, inter K. & 31. quę per cen-
 trum. t. vsq; ad prædictas lineas horarias (& inter ipsas) ferebantur, quare ani-
 maduertendum est, ne semicirculum patemus idem esse planum cum horolo-
 gio in quo lineę horarię. f. e. f. h. f. i. f. n. f. m. f. d. designatę sunt, planum etenim
 horologij, nunc perpendiculare, nunc obliquum est plano in quo dictę lineę
 horarię ductę sunt. Quod ut regula circinoq; præstemus circa alterius instru-
 menti vsum, semicirculum duci in beo ut Q. AE. M. diuisum eodem pacto quo
 superius, quem cogitemus applicatum axi mundi. f. t. cuius centrum sit. t. sup-
 posito deinde. f. e. b. lineam meridianam esse primo in plano orientali, ceterę
 q; lineę horarię erunt prædictę. Iam cum voluerimus lineę horarię f. l. pun-
 ctum inuenire, quod radius solis aspiciat, cum in parallelo, quod per princi-
 pium tauri, & virginis in plano orientali fertur, cogitemus semicirculum.
 Q. AE. M. tanquam circuli horarij communis, in eo situ cœli quo lineam. f. d.
 constituit communem sectionem ipsi & plano horologij: solis autem cen-
 trum in puncto. — quare eius radius erit. — t. x. nobis autem quę redam est pun-
 ctum. x. quantum distet videlicet à puncto. f. quod regula circinoq; inuentu-
 ri in primis mente concipienda est pyramis quatuor facierum triangulari, —
 quarum prima est ea quam nunc appellabimus basim, eritq; triangulus. f. e.
 d. in eodem plano horologij, alter triangulus à tribus lineis. t. e. e. d. & tertia
 cogitata, quę à t. & d. terminatur, comprehenditur. Nam. t. e. & e. d. utreq;
 in plano horologij non sunt quantum in plano æquatoris tres sint, quę singu-
 læ cognitę sunt, nam cum cognitę sunt ductę. t. e. & e. d. cum angulo constituto
 in puncto. e. qui semper in orientalibus rectus est, quam primum tertia. t. d.
 cognita erit, tertia postea triangulus orthogonus erit, à paulo ante. t. d. co-
 gnita. & ab. f. d. nota, & ab. f. t. pariter cognita, & perpendiculari æquatori
 comprehensa, quartus postea ab. f. t. & f. e. & t. e. comprehendetur, punctum
 autem. t. centrum mundi, angulus supremus erit pyramidis. Nunc trianguli
 orthogoni seorsum fornicemus, quo loco vsum fuerit commodius,
 qui ex linea. t. d. in ære ellecta, & in superficie æquatoris, & linea. f. d. in pla-
 no horo-

no horologii, hæc. f. t. axi mundi constat, qui triangulus à radio. t. x. diuiditur cum radio. a. t. directè coniuncto. Nam vt iam dictum est, à coeli puncto. a. oritur, quam diuisionem, si in triangulo seorsum descripto inuenire voluerimus, res erit inuentu facilissima, cum rectum angulum. f. t. d. prædicti trianguli tertij, ea ratione diuiserimus, qua radius. a. t. angulum. A. E. t. M. partitur cū anguli oppositi sint inuicem æquales. Atq; ita intentum consequemur. Hac vera speculatione error antiquorum aperitur, cum opus hoc, regula & circino pericere voluerunt, vt manifestè apud Sebastianum Munsterum cap. 30. videre licuit. Cartusianus monachus Mediolanensis Dominus Ioannes Baptista Vilmercatus ad ceteros suos errores vnum hac in re cap. 13. addidit dum voluit puncta lineæ. y. y. signiferi proportionalis transferri in æquinoctialem sui radij. Constituit enim. a. i. in eadem superficie plana esse cum lineæ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. cuius hæc est communis sectio æquatoris cum

plano horologii, illa verò æquatoris cum meridiana. Vt inten-

tim prætermittamus, quod in antiquorum errorem la-

batur, dum rationem huiusce rei ignorat,

& mente concipere, aut idea for-


mare nequit prædi-

ctam

pyramidem, versus tertio triangulo

orthogono, vt prædi-

ctum est.



Quod



QUOD si quis cupiat lineas horarias italicas in plano ducere hac via, methodum antiquorum in omnibus sequendum non sentio, nempe ut ita exactè in predicto plano horologii lineæ horariæ communes ducantur, præterquam locis ijs quibus, maioris minorisq; diei merides, exactè terminant, ab cuius horæ italicæ occurrunt, nam si non occurrat, duci iubeo lineas communes ab hora vna in alteram sumpto initio non quidem à meridiana, sed ab ea parte horæ, quæ differentia est inter exactum terminum horæ, & meridiem. Exempli causa sub polo 45. maioris diei merides à 16. hora differt minutis. 17. tunc igitur duci iubeo lineas communes occultas ab hora in horam, includendo à 17. minuto distantiam à meridiana, & ante ipsam, tunc enim tropicus canceri cum predicta linea se interse cabit, & ita gradatim per horas prosequi: id ipsum dico de tropico Capricorni, cæterisq; locis quibus fuerit necessarium, quod de situ vnde decimæ decimæ & 9. horæ mantinæ æliæ intelligo; & de reliquis horis italicis idem dico.

De pulcherrimo modo describenda hyperbole paralleli æquatoris.

Cap. LXXII.



LIAM rationem & viam, si quis cuiuslibet giri cuiusvis sectionis conica: horizontalis, aut muralis, cursus umbræ gnomonis quavis anni die requirat, notareq; desideret, hanc methodum sequatur, & primum in horizontali, subscriptus meridianus partus sit. g. k. q. l. in quo sit axis mundi. z. t. y. horizontalis. r. t. n. diametri tropicorum. g. l. & k. q. linea meridiana plani horologii horizontalis. b. a. h. gnomon perpendicularis plano horologii sit. o. t. Constituumus autem velle nos hyperbolam tropici canceri designare. Quare ducio lineam. k. t. l. & q. t. g. ex quo binos triangulos habeo. g. t. l. & k. t. q. in plano meridiani qui conus rectos facit, qui quidem conus bases habent circulos tropicorum, axes, binas partes axis mundi, ut licet in figura subscripta cernere, tum in line. a. b. a. h. plani horologii consideranda est pars. a. f. cono Capricorni comprehensa, quæ axis, erit sectionis ipsius cono, in hyperbole canceri, ut b. u. in cono Capricorni, axis erit hyperbolæ Capricorni, necesse deinde est, à quot voluerimus punctis alicuius axis, exempli gratia axis ipsius. a. h. hyperbolæ canceri, parallelas ducere ipsi. k. q. ut in figura cernitur, quarum vna est. d. x. Hæ per me-

V diom

dum ab axi mundi omnes secabuntur, circa quod medium iuxta cuiuslibet moderatam, totidem semicirculi formandi sunt. g. m. q. d. y. x. ceterisq; à fin-
gulis vero punctis ipsius. a. f. vsq; ad circumferentiam semicirculi totidem per-
pédiculares diametro duco, parallelas videlicet axi mundi, has m. h. x. c. atq;
alias, quarum perpe dicularium, & punctorum axis. a. f. adminiculo, totidē
puncta in dimidio circumferentiæ hyperboles cancri, plani horologij repe-
rientur, credis occultè, ac perpendiculariter in dicto plano axi. a. h. prædictis
m. h. l. c. & ab ijs, suis punctis. Idem de reliquis partibus. a. f. fiet, quousq; girum
hyperboles, aut alia quævis sectio absoluetur, ut est in figura per aper-

tum, idem dico de Capricorni hyperbole, cuius est

axis. b. a. deq; ceteris omnibus sub qua-

libet elevatione. Quarum


rerum specula-

tio,

ijs, qui vel medioeriter sectiones conicas degu-

starent, satis perse aper-

tærit.



De horariorum horis et hyperbolis tropicorum.

Cap. LXXIII.



AT verò quoties libuerit lineis horariis hinc inde ducere, si
 necesse fuerit omnibus contentis prospicerem, longitudo proli-
 moris diei aut illi polus interpretatur, media tabula arcus
 semidiametrum, aut quibus illis cernitur; qua hora, &
 minuto horæ talisq; ex die solis meridiano reperitur,
 quoties autem horarum hinc ratione dividitur. Sum-
 tur inquam semidiameter æqualis horarum, que iuxta
 proportionem gnomonis propositi, erit: & figurarum; & dividatur in par-

tes æquales. 14. supposita. t.e. meridiana, ex altera verb parte contiguz, & perpendicularis meridianæ semidiameter communis horologij notetur. f. e. (vt in figura cernitur) & à puncto. e. in semidiametro. f.e. sumatur. e. 3. ex altera parte. e. b. æqualis illis, quæ sunt in Analemate, quæ coniunctæ in uicem, meridianam componunt. b. a. inter utrumq; tropicum horologij. Porò finitis sectionibus conicis dictorum tropicorum, sectio puncti. a. erit cancri, altera capricorni. Iam exempli causâ maxima dies anni illi eleuationi poli sit hora 17. cum tertia, diuisus cum fuerit vt iam dictum est equator horarius in 24. partes, tertiam partem vnus horæ sumemus, quam collocabimus vbi est. e. o. ad leuam matutinarum horarum à linea meridiana, quare certi erimus punctum. o. esse. 17. horæ à quo sumemus. o. f. circuli ipsius partem. 24. ad dexteram quæ erit. 18. hora, & lineam. o. d. ad sinistram, quæ erit. 16. atq; ita deinceps. Ductis deinde à centro. t. per secunda hæc puncta ipsi contingenti æquinoctiali, quot oculis duci poterant, & à punctis intersectionem harum cum æquinoctiali prædictâ, ductis totidem lineis occultis, puncta communis harum postmeridiam cum communi sectione conica cancri notabimus, quæ puncta etunt prædictarum horarum. Atq; hæc iuncta punctis eandem horarum in communi sectione capricorni (eadem ratione inueniendis) tot lineas horarias dabunt, quot faciunt minoris diei anni horæ. Gratia tamen. 13. & 14. horæ, & aliarum quæ in tropico Capricorni non reperiuntur, loco tropici, vtetur æquinoctiali, primis lineis per equatoris horarij prima puncta à centro. t. ad æquinoctialem contingentem vsq; ductis. Ob 11. 10. 9. & 12. etiam horam, ducenda est linea. q. p. per centrum. f. horologij perpendiculariter meridiana. f. t. quæ q. p. esset. 6. matutina, & vespertina horarum communium. gratia igitur. 11. attendendum est quanta sit inter ipsam, & horam meridianam differentia loce stante in tropico cancri, quæ in proposito casu esset horarum. 6. cum tertia. Porò cum hæc differentia, sextam horam tertia parte excedat, in æquatore horario sumemus lineam. t. u. sub. t. b. (quæ. t. h. perpendicularis meridianæ, esse constituitur) ex parte horarum postmeridianarum adeo distantem vt h. u. tertia pars sit horæ, quæ vsq; ad sectionem cum æquinoctiali contingenti producat, cui sectioni ducta. f. x. & ex parte opposita protracta vsq; ad intersectionem cum sectione conica cancri, ex parte horarum antemeridianarum, punctum. 11. horæ habebimus, idem de cæteris horis dico, & pariter de horis vespertinis ex parte ipsius. p. inuenis autem punctis dictarum horarum in sectione conica, cum voluerimus lineam ducere. 12. horæ, hæc parallela indeterminata æquinoctiali contingenti ducetur à puncto. 12. cancri. Vna autem aliqua ratione ex his quæ cop. 52. tradite sunt, vti poterimus ad 11. 10. & 9. ducendam.

Porò tropici in muro perpendiculari orizonti, cum erunt designandi, procedens

precedens operatio non variabitur, præterquam quod loco circuli. z. g. k. y. q. l. meridiani, ille circulus sumendus erit, qui latus per axem mundi perpendicularis est muro, quiq; in se & axim, & gnomonem perpendicularem muro habet. ex epli gfa quam inuersa (huius Analematidis) præcedenti figura in qua punctum. r. loco zetit sumatur, in muro ad vnam quartam meridianam verso, erit. y. noster polus; z. erit polus subterraneus, & k. q. tropicus cancri. g. l. Capricorni; o. t. gnomon perpendicularis muro in superficie orientis extensus, & f. a. u. communis sectio muri cum circulo qui in se axim mundi habet qui in prædicto circulo efficit cū muro minimū angulorū. Quod si murus ad vnā quartam septentrionalem vergeret, esset. y. loco. z. cætera per se patent, exempli gratia, in muro orientali meridionali designanda sit hyperboles paralleli, qui per principium geminorum, & leonis fertur, ita etiam suorum oppositorum, cuius quidem muri horizontalis linea sit. E. B. a. meridiana. A. B. & A. sit punctum commune axi mundi, & muro; M. R. sit gnomon perpendicularis muro. A. M. axis mundi, communis sectio muri cum circulo in quo est axis mundi, & gnomon sit. A. R. quæ, axis erit sectionis conicæ prædictæ, formato igitur circulo. g. k. q. l. amplitudinis meridiani, ductisq; parallelorum diametris. g. l. g. q; k. l. cum antea ducta fuerit axis.

y. z. mundi inuenienda est linea. u. b. a. h.

quæ in muro erit. A. R. & an-


gulus. R. A. M. ille


ipse

est. o. f. t. cætera vt prædictum

est consequen-

tur.





De lineis hyperbolicis almicantaratis seu circularum altitudinum supra muros.

Cap. LXXIIII.




Alter hyperboles altitudinum solis, almicantaratis videlicet in muro proposito designande erunt, cogitandum erit quodlibet almicantaratis basim esse vnus coni, cuius supremus angulus, perpetuo centrum mundi sit, extremam videlicet punctum gnomonis, murus vero planum sit in quo hyperboles generetur, communis autem sectio azimut perpendicularis muro, in quo est gnomon cum muro, axis esse hyperboles cogitabitur. Quare sit in subscripto azimut linea *mi* *ris*, u. f. gnomon, e. t. diameter vnus almicantaratis, g. l. orizontis, l. z. ductis deinde, t. l. & t. g. producta q. l. t. vsque ad intersectionem cum murali in puncto, a. punctum, a. sumitas erit hyperboles in muro, cuiusmodi almicantaratis. Quare cogitato cono sub orizonte cuius planam triangulare

lare per axim, sit in linea. q. t. k. & in eodem plano ductus sint parallela ipsi. q. K. anchoando à puncto. a. ac descendendo versus. q. K. & si ita necessitas exigeret superando, super quantum vnaquaq; tanquam super diametros, semicirculi deficiantur, quare immediate prædicta gira semicirculorū, muralen. a. f. scabent in totidem punctis, quot gira fuerint. puncta vero hæc vtilia erunt etenim inter puncta illa atq; diametros, definitam quantitatem dimidię perpendicularis axi hyperboles reperiemus, cum. e. a. f. perpendicularans sit singulis diametris prædictorum semicirculorum, ita vt quolibet horum intervallo sumpto, à diametro scilicet ad suum girum, in linea. a. f. circini crure fixo immobiliq; permanente in puncto diametri, si metiamur eadem didinctione in ipso diametro, perpendiculares hyperboles (axi prædictę hyperboles) omnes habebimus, quod opus, in eo muro perfici potest, quo signanda est hyperboles altitudinis solis, occulte ductis omnibus, præterquam lineis inter puncta ductis in circumferentia hyperboles, quæ quidem lineę ipsam circumferentiam componunt. etenim quamvis prædictę lineę rectę sint, rectitudo nihilominus eiusmodi, sensum effugiet, cum puncta inuicem propinqua erant. Breuius tamen hoc fieri notandum est, ductis iam parallelis ipsi. q. K. inuentisq; centris prædictorum semicirculorum. etenim lineę prædictorum semicirculorum notatione, figi poterit in quolibet centro immotum circini erus alteroq; mensura medietatis parallelę (ipsi. q. K.) sumi, stabiliq; permanente in centro, aut dimidio parallelę circino, vno crure cum alio, vel signare, vel secare. a. f. à quo signo, aut sectione, sumi distantia ipsius lineę vsq; ad punctum sibi, & parallelę prædictę commune, in quo communi puncto, crure circini permanente immobili, alterum circumduci poterit,

&

vtrinq; parallelam in muro notare, hoc est latitudinem hyperboles tali situ terminare.



De modo cognoscendi (ex gnomonis umbra) totius caeli situm.

Cap. LXXV.



Digitanti mihi diuersas, ac varias sectiones, quas superficies eclipticæ perpetuò æfficit cum quolibet plano immobili, quæ rectè omnes sunt ex secunda vnde cimi Euclidi, Agnoscis quam primùm fieri posse, vt quis medio extremo vmbre gnomonis, intelligat quod 20 diaci signum in oriente sit, aut occidente, cæliue medio, super aut subrus terram vel alia quauis domo ex 12. celestibus rationalibus, aut iuxta quauis aliam opinionem sumptis atque ita sciri posse cuiuslibet

X

stellæ

ficliq; situm, quod cum præclarum valde sit, & admirabile, vt à me inuentum, sic hoc loco tradendum esse censui. Quare in primis sit nobis animus inueniendæ, in elevatione poli graduum. 45. minu. 0. communis sectionis eclipticæ cum muro declinante à meridiano gradus. 26. minu. 0. tum cum primo punctum cancri est in oriente, cuspidè videlicet primæ domus. Tali inquam puncto temporis, medijs tabulis directionum Montisregij/tabulis primobilis nuncupatis inueniemus in cæli medio secundum gradum esse piscium: patet autem slante ecliptica in eiusmodi situ, secans eam superficiè muri, vna linea recta mediante, quæ ita sita respectu orientalis, & meridiane muri, vtilio in situ quam ecliptica reperitur, nunquam sectio vna in eiusmodi situ alteri occurret, vt in eodemo neque situ sit respectu duarum prædictarum, quamvis sol in quavis parte ipsius eclipticæ sit, quandoquidem umbra centri mundi (vt ita dicam) semper est in eadem superficiè eclipticæ, quare inuenta prædicta communi sectione in proposito plano, habebimus lineam principij cancri in oriente, ita vt semper cum extremitas umbræ gnomonis, eiusmodi lineam attinget, tunc in oriente supra horizontem, primum punctum cancri oritur hoc interim notando, ne multitudo intersecationum nos perturbet hac in re, rectum futurum, vt eas in plures gnomones partiamur, vt amarique cognitione signi, in quo sol fuerit inuentus, nam numerando de linea in lineam ab ipso signo, vsq; ad extremum umbræ gnomonis, exactè signum inueniemus, quod in oriente fuerit. Idem & de cæteris dico.


Verum, vt ad huiusmodi opus deveniamus, in primis subscriptum meridianam. A. D. X. N. efformo, quo etiam vt oriente (profert occasio) vt or, quo in quatuor partes æquales diuiso, vnam earum in gradus. 90. diuiso, vsurus ipsis gradibus, & æquinoctialem cum diametris parallelorum principiorum signorum ducō, vt videri possint communia puncta diametrorum parallelorum cum orientali. N. D. ducō deinde gnomonem. o. iuxta declinationem prædicti muri, qui (exempli gratia) sit orientalis meridionalis, ducō pariter, perpendiculariter gnomoni, orientalem muralem. V. T. tum in circumferentiâ. N. X. D. sumo puncta communia circumferentiæ ipsi, & parallelis ductis à verticali. A. X. à punctis communibus dictorum diametrorum cum orientali, velut in Analemate factum fuit grana horarum principij diei 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. sumpto o. circulo pro oriente, à quibus punctis, ductis per centrum. o. rectis lineis ad muralem vsq;, ortum principiorum celestium signorum zodiaci habeo, quæ in muro iuxta has distancias designanda erunt præcisè à pede gnomonis. Iam verò cogitato hoc circulo adhiectamquam orientem & A. sumpto pro occidentali puncto. X. pro orientali, N. pro australi, D. pro septentrionali, habebimus meridianam lineam. o. q. inter centrum mundi. o. & murum, supra quam à puncto. q. perpendiculararcu
ducemus

ducentus. q. p. prædictum igitur circulum nunc pro meridiano sumentes, in arcu inter tropicus quartæ. A. N. puncta signabo declinationum illorum signorum, & eorundem graduum, ac minorum, quæ quolibet ortu principij signi in meridiano inuenta fuerint. Exempli gratia, oriente, (polo hoc 45. graduum) principio cancri in meridiano, secundus ferè gradus erit Piscium qui ab æquatore Australi uersus gradibus decem. minu. 47. declinat, idem & de cæteris facio, & ab his punctis declinationum per cenarum. o. ad lineam. q. p. totidem lineas duco, quæ in meridiana murali. q. p. puncta demonstrant, cum quibus, reliqua puncta orientales coniungenda sunt, superius iam in muro notata. Verbi gratia, in h. q. p. puncto à decem gradibus. minu. 47. declinationis meridiane monstrato iungetur punctum ortus principij cancri orientalis, mediâ vna linea recta, quæ, eclipticæ, communis erit sectio, & muri, cum supra orientem cancri principium orientur.

Quod verò de prima cæli domo dico idem de cæteris cuspidibus assero. Nam si exempli causa inuenire uouerimus communem sectionem eclipticæ cum muro proposito, gnomone mediante, quo tempore principium cancri in cuspe est vndeccima mediantibus prædictis tabulis, talis eleuationis poli, animaduertemas quod nam eclipticæ punctum orientur sic temporis in oriente, quodq; punctum in meridiano reperiatur, medijsq; duobus punctis istis amplitudinis scilicet primis, declinationisq; secundi, vt est superius factum, idem præstabimus uelut iam antea dictum fuit. Idem fiet gratia sitis cuiuslibet stelle. Id ipsum si quis in muro septentrionali efficere uoluerit, prædicta omnia præbet, præterquam quod sicut puncta. p. & socia sub orientali mari in meridiana notabantur, nunc supra ipsam orientalem

signanda erunt. Confusionis autem linearum vitandæ gratia, rectæ quamlibet faciem
mari

duobus gnomonibus partemur, quorum quilibet medietati eclipticæ tropicis interpositæ inferniat.



*De modo describendi supra murum tam terre: q̄: maris partem, qua sibi è directo obij-
citur, ita ut ex umbra gnomonis possimus cognoscere solis situm respectu
antae terrę globi.* Cap. LXXVI.



Ornato iam horologio horarum commentum in proposito plano, ea terrę pars, aut maris depingi potest, quam prædictum planum inuenit: vtrunq; lines horarias cões partitido, tanquã meridianos, sumendo inchoandoq; à meridia, à nobis in muro ducta. Quoniã verò meridiani non sufficiant, vt debita proportio seruetur, sed paralellis etiam opus est, qui occulti sint in dicto plano, sineq; hyperboles, quarum illę, quę inter hyperboles tropicorũ existunt, erũt exactis, extrinse cas verò exactas esse nõ ita erit necessariũ, qđ siqs intrinsecas apparere cũ solis gradib; latitudinis voluerit, mihi recti videbit, vt declinatio solis, ppetua, quã p̄sumẽ vera fieri poterit, cognoscat. Hortor autẽ, vt meridiani qui lines horarię cões sunt, appareat indeterminati, qbus mediantibus cuiusq; populi meridies dignoscatur

De

De modo locandi bararias lineas in portione spherica excavata.

Cap. LXXVII.




Vpientibus horologium orientale commune, aut italicum, aut aliud quodlibet in portione spherica concava, amplitudinis ad libitum formare, cogitandus erit circulus (qui basis erit portionis sphericae) idem esse cum horizonte, cuius centrum pariter esse poterit extremitas gnomonis in ipsa portione spherica definiti, centrumq; mundi. hic circulus scorum sumptus in 4. partes aequales diuidatur, vt infra apparet, mediante. a. b. c. d. supposito. a. puncto septentrionali. c. meridionali. b. orientali. d. occidentali. postmodam maxima solis amplitudo inuenienda est, vt ortus, ita occasus, cum vna specie sit, & accomodanda circa. b. d. mediante. e. f. g. h. quo peracto in superficie plana, & perpendiculari, circulus orienti. a. b. c. d. equalis describatur, qui vocetur. i. k. l. m. & primo pro meridiano seruiat, in quo pro equinoctiali ducta. j. m. pro axi mundi. i. k. pro diametro tropici zstiu. n. o. orientalis, erit. q. r. s. l. r. aequalis altitudini poli ab horizonte ducatur, quare punctum. f. tropici diametro, & orientali commune, sinit. f. maxime solis amplitudinis terminabit, immo formato à principio oriente. a. b. c. d. & meridiano (haecenus, vt iam dictum est) dicta amplitudine alia via non quaesita, inuentoq; puncto. f. a. c. ducta. l. e. perpendiculari. q. r. arcum. r. e. statim aequalem habebimus arcui. a. e. quare punctum. e. in horizonte notare poterimus, adeo distans ab. a. & f. ab. a. pariter, & g. & h. à c. vt in meridiano e. ab. r. distare reperitur, quod erit sane melius. Iam vero confectis ijs primis ea pars diametri sphericae, quae axis portionis nuncupari solet, definiatur, quae semper maior, minor, aut aequalis erit ipsius sphericae semidiametro, sit h. c. t. u. semidiameter autem sphericae sit. t. x. haecenus incognita, quae pars, aut portio axis, quando idem cum semidiametro praedicto esset, omnia facta essent facilissima: at si inaequalis fuerit, maior scilicet, aut minor, nullum enim erit discrimen quo ad affectionem, & sit longitudinis, vt praedictum est ipsius. t. u. quae pro gnomone utemur sitq; z. zenit in meridiano, at mediante. t. t. & diametro. a. c. praedicto inuicem perpendiculariter applicaris, circulum maiorẽ sphericae reperimus, cuius orienti. a. b. c. d. basis est portionis propositae, qui circulus. a. u. c. sit, cuius centrum sit. x. cuius portio. a. u. c. notanda erit in portione spherica, quae pro meridiana subferat. Hic vero modus signatus facillimus est. Tum circa punctum. t. tanquam centrum designetur circulus. a. z. c. meridiano. j. k. l. m. aequalis qui pro azimuth vniuersali inferuet, sumaturq; arcus:


2. A.


a. A. equalis arcui meridiani inter orientē, & tropicum, exēpli gratia cancri (q. n. scilicet supra terrā) ducaturq; .t. A. & cōsideretur quo loco se causet cir-
 cūferentiam .a. .a. .c. scilicet in puncto .B. quod erit umbre gnomonis in meri-
 die extremitas, cō sol in prædicto tropico extiterit: qua die curius umbre
 per hæc tria puncta feretur .c. scilicet aut .h. per f. aut .g. de mane, & vesperi &
 per .B. in meridie. Iam cum voluerimas punctum alicuius horæ in cavitare
 propofita portionis sphericæ, invenire, dum sol in prædicto tropico versatur
 primo arcum horizontalem inter æquatorem, & azimut solis illa hora defini-
 tum inveniri iubeo, ut præcedentibus capitibus docui, qui nunc verbi gratia
 in oriente sit .d. .x. quiq; in circumferentia basis portionis propofitæ sit deli-
 gnatus à quo puncto .x. versus gnomonis pedem designetur occulta por-
 tione circuli maioris sphericæ propofitæ, ac postmodum in Analemæ superius vo-
 cato meridiano, solis altitudo supra orientem tali hora sumatur, quæ in ar-
 culum .a. .x. .c. vniuersale azimut referatur, & à puncto .a. capiatur arcus .a. .D.
 æqualis prædictæ altitudini, & à puncto .D. per cōtrum .t. ducatur .D. t. t. tum
 circino distantia sumatur .c. E. ac referatur in horologium fixoq; albero ciare
 in circumferentiæ puncto .x. altero, arcus occultus iam ductus in concavitate
 datæ portionis signetur, qui semper est communis scōtio prædictæ superficiæ
 portionis sphericæ, tali hora cum azimut.

Hoc itaq; in uno alteroq; tropico peracto, aut alio quouis parallelo æqua-
 tori, si literas horarias in concavitate hac ducere necesse fuerit, quæ sunt su-
 perficiæ planæ, & sphericæ communes sectiones, erit manifestum illas futu-
 ras circulorum arcus, in quibus semper punctam superneum gnomonis repe-
 rietur cum inuentis iam in concavitate prædictæ extremis duobus horæ pun-
 ctis, quare sufficiet regulam supra quam stylus designatoribus hæreere debue-
 rit, collocare in situ extremi gnomonis, & prædictorum duorum punctorum
 horæ, cogitato plano trianguli, cuius duo latera ab extremo gnomonis ter-
 minantur duobusq; punctis horæ; tertium verò inter prædicta duo puncta ho-
 ræ, arcum curuum. Sunt autem qui tropicos designatos in concavitate per-
 tionis sphericæ arcus circulorum faciant, sed decipiuntur, etenim communis
 scōtio vniuersæ superficiæ sphericæ cum superficie conicæ, cuius axis per cen-
 trum prædictæ sphericæ non feratur, arcus circuli esse non potest, cuius rei de-
 monstratio quam facillima est.



77





De examinatione pugillorum horologiorum, & de nouo horologio circulari.

Cap. LXXVIII.




Enasilium autem horologiorum, varia genera confici solent, vt Astrolabia quadrantes, cylindri, anuli, & id genus alia, quę omnia in hoc deficient, quod necesse sit homini, prius nosce num tempus matutinum, aut vespertinum sit, videlicet ante postue meridiem: quod quidem circa meridiem laboriosum est atq; difficile, & quamuis hoc innotescat, tamen

circa meridiem facilis error est dimidit horę, aut eo amplius, ob breuem elevationem solis ab horizonte multo tempore, longo scilicet cursu ab oriente in occidentem, sumere autem tunc temporis horam difficile est, & fallax ita medijs Astrolabijs, vt alijs quibus vis instrumentis pensilibus. Equidem Astrolabium in hanc vsq; diem (quamuis ex auri calco) non reperi qui ita exactus esset, vt meridiana linea, recta eaderet ad perpendicularam in situ directionis lineę, quę ab armilla centrum terrę prospicerat, centrum scilicet grauium, verum tamen est, exacta fieri posse, commutatione situs araneę, quę semper in vnam, quam in alteram partem grauior est, & situs eiusmodi notari, vt ponderis huius æqualitate vtamur, cum erimus sumpturi altitudinem solis, lune, aut aliarum stellarum. Multo verò difficilius est, ita exacto cylindros reperire, vt indice, quo quis anni mense, posito semper ad perpendicularum, exacti sint, cuius difficultatis est causa, quod exactum in medio foramē & parallelo perfecte superficiē conuexę vix fieri possit, cuius imperfectio nis vitandę causa, aliud horologiorum genus excogitari à præcedenti re ipsa non omnino diuersum quamuis cylindrus commodius ferri possit.

Huius autem instrumenti forma talis erit. Metallica lamina circularis formetur, in cuius circumferentia extremo signata sint. 12. signa zodiaci, & in altero intervallo menses signis respondentes suo quoq; loco mensium terminos vsq; ad centrum lamine ducendo, in quo gnomon fixus sit, ita proportionatus semidiametro circuli interioris, vt gnomon perpendicularis verticali, solstitij æstiuo tempore, vmbre versę proportionari reperitur, suisq; tum locis notare puncta altitudinis horę, præcisę velut in cylindro, cum autem ad solem horam cognoscere voluerimus, à pede gnomonis filum cum pondere ad perpendicularam cadere faciemus, & tandiu laminam circumuoluemus, donec mensis dies, filo occurrat; dorso deinde, ad solem verso, laminamq; parallela filo tenentes, ita vt vmbra gnomonis pariter in situ filii sit, quam pri-

nam hora certetur, citra suspicionem deceptionis ab instrumento. Dividi quoque lamina possit (vno semidiametro mediante) in bina spacia equalia, binos videlicet semicirculos, & in eorum vnoquoque duodecim signa, duodecimq; anni menses notare, & in altero horarum italicarum altitudinem, altero communium designare.





Asimqueq; annuli quidam cen laminaꝝ circulareshorarum commu-
nium circumferuntur, in quibus loca mensuꝝ designata sunt, atq; fo-
ramen anguli, aut stilius laminaꝝ dirigitur. horuꝝ autem in parte op-
posita existit, eorū toto anno vnico intervallo a se inuicē distant, ac si almican-
tarat. 1. a. horuꝝ stilius solstij tempore ita super almicantarat primuꝝ, aut vndeci-
mū elikuaretur, vt in solstio hycmali. Qui quidē annuli, aut laminaꝝ si re-
dē fierent, necessario ex 20. tertij Euclij. prædicta almicantarat (vt iam dictum
est) sē se haberent. Vt autem error hic, ex scientiæ legibus innotescat, dicam
apertius. Sane dubium non est cum erit sumenda hora dicto annulo, aut lami-
na, solis radio mediæ, necesse esse, vt prædicti annuli, aut laminaꝝ superficies,
sit in superficie azimut solis, & quoniam arcus, aut intervallum vniushorū in
annulo, aut lamina signatum, idē semper est, igitur anguli eiusmodi arcui in
circumferentia respondentes, semper inuicem æquales erunt, ex 20. tertij præ-
dicti. cumq; vt notum est, centri mundi loco, foramen sumatur, necesse igitur
erit arcus circuli altitudinis illi horuꝝ respondentes, inter se æquales esse ex an-
gulum æqualitate, qui in dicto centro sibi respondent angulis oppositis,
ex 15. primi, exempli gratia cum sol fuerit in æquatore, à meridiano gradibus.
15. remotus, constituatur arcus circuli altitudinis, hoc est azimut solis, inter
solem atq; zenit differre ab arcu meridiani illa die sub nō polo. 3. gradib. cū
sol postea extra æquinoctialem, à meridiano. 15. gradib. remotus fuerit, oport-
tebit necessario arcū talis azimut solis ea die à meridiano quoq; 3. gradibus
differre, alioquin annuli arcus, aut laminaꝝ toto anno interire non possent.

Hanc verò differentiam æqualem esse non posse demonstratione confir-
mo, vt sum ante pollicitus. Sit itaq; sphaera. o. e. z. m. cuius e. k. z. p. a. m. sit me-
ridianus & z. zenit sit loci, quo annulo vsuri sumus, aut lamina, & e. u. sit æqui-
noctialis. & k. o. sit parallelus æquinoctiali, verbi gratia ille qui per primum
punctum canci fertur. Cogitemus deinde bina almicantarat æqualiter
distantia à z. polo eius videlicet, sint hęc. k. r. p. & e. x. z. qui per bina illa pun-
cta. z. & k. feruntur, in quibus à primis parallelis, ita meridianus interfecat-
tur, vt ea distantia, quæ inter giros primorum erit sit quoque inter secundo-
rum suura: sumptis deinde in duobus primis parallelis arcibus simili-
bus. e. u. & k. o. & per puncta. o. & u. cogitato à puncto. z. processu binorum
arcuum circularum maiorum. z. o. & z. a. quorum z. r. & z. t. æquales erunt,
animaduertere oportebit nunc, o. r. & u. x. æquales sint inuicem, ductis, enim
per bina puncta. o. & u. parallelis. o. b. & u. y. circa polum. z. arcus. o. r. arcui.
b. k. respondebit, & u. x. arcui. y. e. quæ differentia sunt paulo ante nomina-
te, æquales hi necessario esse debent, si modo arcus annuli, aut laminaꝝ
dictis differentijs respondens, vtrique subferatur se sit, itaque si. y. e. æqua-
lis fuerit. b. k. ex communi scientia. y. b. æqualis erit. e. k. quare etiam


oportebit giros binorum parallelorum y. u. & b. o. tantum distare alterutrum quantum e. u. & K. o. & pariter quantum e. x. & k. i.

Cogitemus postea per puncta. u. & o. arcum maioris circuli ferri, qui necessario per polos parallelorum e. u. & K. o. ex 19. secundi Theodosij feretur, & utriq; perpendicularis erit. ex 19. primi eiusdem, & predictus. u. o. & equalis erit arcui. e. k. ex 14. secundi tam punctum. i. punctum illud sit in quo arcus. z. u. parallelum b. o. m. intersecat, & punctum. c. ubi parallelum. K. c. o. quare ex communi scientia inter. u. & c. erit punctum. i. & c. u. i. & equalis erit. y. b. & perpendicularis parallelis. y. u. & b. o. ex predictis, quoniam angulus. u. i. o. rectus erit, & cum angulus. u. o. c. pariter rectus sit, angulus. a. o. i. minor erit angulo. u. i. o. quare ex 41. tertij Monteregij. a. o. i. maior erit. u. i. & ita. e. K. maior erit. y. b. & ita.

b. K. maior. y. e. & r. o. ipsius.

x. u. quod erat pro
positum.

••



De noua horologii pensili.

Cap. LXXIX.




OV A me pensilis horologii forma delectavit, quæ ad ceteras meas cogitationes speculatione accessit. Hæc huiusmodi est.

Laminam argenteam oxigonam seu manis onatam parari iussi, in qua ex vna parte designavi lineas horarias matutinas in meridiem vique, constituens laminæ aspectum esse, quasi mui: i gradum. 45. quartæ orientalis meridionalis intuentis, & in altera parte laminæ seu facie designavi lineas horarias occidentales, incipiens à linea

à linea meridiana, constituens apud me hanc secundam faciem esse quasi mu-
 ri ad 45. graduum quartæ meridianæ occidentalis vergentis, & in utraq; facie
 designavi hyperboles principiorum signorum omnium zodiaci, præterea me-
 dietatem eorundem, præterquam medietatem Genitorum canceri Sagitarij,
 Capricorni, tum ex utraq; parte senos menses cum suis signis addidi, (velut
 etiam in subscripta figura indico) & è regione singulorum principiorum, &
 medietatis mensis, arcum semidiurnam non necessitatis, sed ornatus gratia
 imò etiam utilitatis admonens. 7. illas lineolas, quæ inter meridianam, & col-
 umnam signorum collocatæ sunt, tantum esse indices, hyperbolarum de-
 monstratrices, quæ umbræ gnomonis in eis nil significationis habitura sit.

Cum autem horam cogniturus erimus prius necessario scire debemus, sit
 ne ante meridianam, aut postmeridianam tempus, quod ubi cognoverimus,
 etiam scire nos oportet hyperbolem dici illius, aut eius situm, exempli gratia
 si dies illa esset. 25. Julij animaduertemus iuxta marginem in spatio dicti
 mensis, esse numerum. 13. qui indicat. 13. die aut circa solem ingredi Leonis,
 & cum à 13. usq; ad 27. supersint. 12. & sol graduum unum singulis diebus con-
 ficiat certi erimus solem medietati Leonis vicinum esse, quaremus igitur hy-
 perbolem dimidij Leonis in aspectu laminæ temporis matutini, aut vesperti-
 ni, quæ hyperboles erit tertia numerando à maxima. at quoniam solis cursus
 præcisè tali die per dictam hyperbolem non peragetur, imò potius paulo an-
 te, itaq; prudenti oculo situm cursus inter secundam, & 3. hyperbolem con-
 siderabimus, & paulatim manum circuducemus, pendulam laminam

annallatentes, donec extremitas umbræ gnomonis situm
 attingat diurni sui cursus, & quamprimum
 attigerit hora cogno-
 scetur.



Peris huius ratio per se manifesta est quoniam motus in orbem laminae circa directionis lineam, aut axim orientis, hoc praestat, ut extremitas umbrę gnomonis in lamina hyperbolem unam gignat, aut circumscribat, quę hyperboles est almicantharæ solis. etenim si lamina immota maneret, sol autem per circumferentiam dicti almicantharæ circa axim orientis volueretur, prædicta umbrę extremitas

eandem hyperbolem describeret, & quoniam signorum hyperboles in lamina designatę sunt parallelorum æquatori, & paralleli æquatori secant almicantharæ parallela orienti, ita quoque eorum hyperboles sese interfecabunt: & cum per centrum solis circulus horarius cogitetur, qui semper est in puncto intersecationis parallelorum æquatori, & orienti, itaq; dubitare non poterimus cum extremitas umbrę in hyperbole parallelorum æquatori fuerit, quia futura quoq; sit in hyperbole ipsorum almicantharæ, atq; ita in circulo

culo horario qui per punctum intersecationis fertur. Cogitaueram eiusmodi instrumentum orientale describere, verum difficultas exactè laminam parallellam orizonti constituendi, me vt pensile conficerem ad egit semel æquata linea directionis hoc est meridiana, in perpetuum sabièritura.

De modo lucendi horologia supra tres facies terra ledi.

Cap. LXXX.



Li quando me in cæcis cupiditas terna horologia formandi ternas superficies apparentes tetrahedri, vna sita quæ exactè ad meridiem, supposita orizontali basi, parallela scilicet orizonti, quare ternos magnos circulos mente concepi, quorum vnusquisq; per centrum mundi latus, ternis quoq; faciebus parallellus esset quisq; alteri: quæsiuisq; situm poli mundi respectu vnusquisq; nec tamen necessitate adductus. Quod vt prestarem cogitavi pyramidem in celo sitam, & ab eodem celo circumscriptam in situ prædicto, statuens axim orizontis à zenit ad nadir ferri, cuius axis, quæ pars intra pyramidem fuerit, dupla erit eius, quæ extra versus nadir, ex ijs quæ. 13. decimi tertij demonstrat Euclides in cuius propositionis figura. a. b. erit axis orizontis, & c. d. trium linearum vna, quæ à centro basis pyramidis orta, in vno angulo cum basis terminatur, quare hæc cum fuerit cognitus diameter cæli a. b. c. consequenter. c. d. media proportionalis cognoscetur, inter. b. e. & a. c. quarum vna, tertia pars est, altera, tertia duo, diametri cæli propositi, ducta deinde ab. a. ad. d. recta lineæ, notum erit latus prædictæ pyramidis, quæ eiusmodi sex habet, cui quidè lateri si à centro circuli faciem vnã circumscribentis, cuius. c. d. est semidiameter, ducta perpendicularis fuerit, nota erit similiter, et ite enim perpendicularis etiam axi mundi in puncto. e. ex secunda definitione vndecimi Euclidi. Iam si ex. c. d. partem æqualem dictæ perpendiculari, quæ minor est. c. d. (ex 18. aut penultima primi Euclidi.) secauerimus, & c. communis, vt totæ. e. d. ita parti fuerit, & ab altero extremo partis, quod inter. e. & d. fuerit, ad punctum a. lineæ ducatur, angulum in puncto. a. æqualem habebimus ei, qui in centro mundi ab axi orizontis cum communi sectione vnias circuli paralleli faciei, & ab vno circulo azimut perpendiculari ipsi faciei constituitur, quare ob faciem meridionalem, quamprimum sciemus quantum distauerit noster zenit à communi sectione meridiani eum eadem facie, per centrum mundi lata, aut cum circulo prædicto parallelo ipsi, sciemus videlicet arcum meridiani inter-

teric. Struc

rectum inter zenit, & extremum septentrionale sectionis prædicitæ.

Ut autem sciamus reliquarum duarum facierum situm, hunc modum sequamur. Cogitemus à centro basis prædictæ pyramidis perpendicularem lateri pyramidis ipsius basis, quæ axi quoque orientis perpendiculis erit, atque per huius lineæ situm, cogitemus azimuth, qui per summitatem pyramidis eiusque medium feretur, & faciei orientali perpendiculis erit, per medium dictæ faciei latum, quæ demonstratu facilissima sunt, & à me breuitatis causa prætermittuntur. Tum à centro mundi per centrum basis orientalis unam lineam cogitemus usque ad cæli circumferentiam ipsius videlicet azimuth, erit enim in superficie azimuth. Iam pars a, communis sectionis azimuth cum prædicta facie, quæ inter centrum faciei, & zenit extat, cognita est, ut fuit probatum superius, media c. d. æquali huic iam dictæ, & angulus inter azimuth, & meridianam septentrionem versus comprehensus, pariter cognitus est, cum sit æqualis comprehenso angulo inter perpendicularem lateri basis à basis ipsius deorsum ductam, & inter unam c. d. septentrionalem ipsius basis, qui duabus tertijs unius recti æqualis est, hæc tamen igitur agnoscimus arcum meridiani inter zenit, & polum mundi collocatum, qui arcus vocetur. q. p. & arcum azimuth inter prædictum zenit, & polum faciei collocatum, cuius arcus faciei sinus est c. d. quem vocabimus. q. b. cognitus quoque est angulus inter hos duos arcus q. p. & q. b. comprehensus, meridiani scilicet cum azimuth ad septentrionem, ut fuit antea dictum, quem angulum, æqualem duabus tertijs unius recti vocabimus. d. o. e. hoc constituto, singulas, d. o. & o. e. perpendiculares esse axi orienti, & à centro mundi ductas intelligemus.

Nunc verò querimus arcum .p. b. cognoscere, eiusque residuum unius quartæ, quare duæ rectæ per .b. & p. à puncto .q. ducuntur usque ad concursum cum sinibus totalibus, præductis sinibus quartarum. o. d. & o. e. quare notæ erunt. o. d. o. z. q. d. & q. e. & quoniam angulus. d. o. e. notus est cognita quoque erit. e. d. quare formato triangulo. q. e. d. ductæque à p. ad b. rectæ. p. b. cognita erit cum suo arcu, cuius ipsa est corda, & residuum unius quartæ pariter, quare habebimus quantum super ipsam polos artellatur, quod verò de facie orientali dico id ipsum de occidentali enuntio.

Hæc cum cognita sunt, non esse necessarium animaduerti, situm poli mundi cognoscere à dictis faciebus collateralibus, cum sufficit nosse situm zenit, & meridiani, aut verticalis ipsarum, sed in tribus prædictis faciebus, lineam horizontalem quævis, communem videlicet sectionem orientis cum utraque facie, quæ à longitudine gnomonis dependet, supposita extremitate gnomonis pro centro mundi, quem gnomonem non sine causa in

centro faciei perpendiculariter figi iubeo. exempli gratia in prima subſcri-
ptarum figurarum circuli azimut. b. h. u. p. ſit. b. u. ſitus vnus faciei reſpectu. b.
p. axis orientis. ſit. b. u. parallela comuni ſeccioni vnus faciei curſi ſuo azi-
mut perpendiculari ipſi, parallela, inquam, dictæ communi ſeccioni, ob gno-
monem qui illam in eiufmodi diſtancia à mundi centro collocat, qui quidem
gnomon perpendicularis dictæ faciei ſit. o. d. & centrum mundi ſit. d. & ad
oriſon quamohrem cognita erit diſtancia. o. a. à pede gnomonis ad lineam
orientalem faciei, & per tantam diſtanciam à pede gnomonis ducenda erit
linea orientalis prædicta, in ea facie, quæ perpendicularis erit. b. u. in ea-
dem collocato prius gnomone, longitudinis quali ſextæ partis vnus lateris
pyramidis, in qua orientali linea, communes ſeccionis ipſorum azimut re-
perentur omnium horarum tropicorum, eadem proſus ratione qua. 53.
cap. docuimus, reſpectu horologiſ italici, idq; præciſè, ac ſi planum horolo-
gi perpendicularare eſſet orienti in ſitu orientalis ipſius horologiſ reſpectu
meridiane, & verticalis orientalis, medio tamen gnomone. a. d. quare ſi hoc
pro facie meridiana præſtituerimus, erit. b. u. meridiana horologiſ, in reliquis
verò faciebus, communis erit ſeccio toties dicti azimut cum ipſa facie, qui à
meridiano ſeptentrionem verſus declinat, angulo. d. o. e. & à verticali reſiduo
vnus redi.

Quod ſi punctum horæ in facie inueniendum erit, inuenietur diſtancia per-
pendicularis, ſub orientali, in plano, vt dictum eſt perpendiculari orienti,
in eodem ſitu ductæ orientalis, ſuppoſito ſemper gnomone. d. a. vt cap. 53.
diximus, verbi gratia, in figura. a. ſubſcripta in qua conſtituo. c. b. eſſe lineam
orientalem & m. punctum proportionatum, aut reſpondens ipſi. a. & n. h.
diſtanciam azimut horæ in orientali ab azimut faciei ipſi perpendiculari,
hoc eſt a linea. b. u. communi ſeccione, & cætera, & b. t. ſit diſtancia perpen-
dicularis puncti horæ ab orientali in ſuperficie perpendiculari orienti, vt eſt
prædictum.

At cum nobis quærendum ſit punctum dictæ horæ in facie pyramidis, pun-
ctum ſcilicet commune faciei pyramidis, & lineæ terminatæ à centro ſolis, &
puncto. t. quod eſt in ſuperficie perpendiculari orienti, & eiufmodi linea ſit
terminata, etiam per mundi centrum fertur, cogitemus azimut illius horæ, & di-
ſtantiã. b. t. quæ pars eſt cõiſeccionis circuli azimut horæ, cū prædicta ſuperficie
perpendiculari orienti, itaq; diſtantiã à centro mundi vsq; ad punctũ. b. ori-
zontalis ſumemus, q; cap. 53. erat. o. b. pars cõiſeccionis circuli azimut horæ
cum oriente, quam. o. b. referemus in c. b. & d. b. ipſi æqualem faciemus. d. au-
tem centro mundi reſpondeat. ſuppoſita in præſentiarum. c. b. orientali
azimutali horæ, tum in hac orientali azimutali ſumemus. d. l. æqualera

fini complementi altitudinis solis, quam cogitabimus esse eam portionem
 horizontalis azimuthalis, quæ inter centrum mundi, & finem altitudinis solis
 interiacet, & cap. 33. vocata fuit. o. n. & à puncto. f. sursum versum erigemus
 perpendicularem. f. n. ipsi. c. b. æqualem tamen finis altitudinis solis, quæ cap.
 33. f. n. & 12. g. e. appellata fuit, tum ducemus duas. n. b. & n. d. t. quare. n. t. ne
 cessario per punctum. d. feretur, quod tali casu proportionalis erit centro mun-
 di & n. centro solis, & triangulus. n. b. t. triângulo in cælo descripto in azimuth,
 & n. t. proportionalis radio solari, & triangulus. n. f. b. pariter cælesti similis.
 Nunc à puncto. d. perpendicularis descendet. d. z. æqualis. d. z. circuli azimuth
 subscripti, & à z. ad b. sub horizontali, rectam unam lineam ducemus, quæ in
 puncto. c. interfecabit lineam. n. d. t. quod punctum erit horæ in facie quæsi-
 tum. Postmodum in eadem pyramidis facie occultè duci iubeo. z. b. deo lo-
 co, & à puncto. z. faciei consideremus quo loco feriet punctum. e. etenim ha-
 bebimus intentum. Nam in cælo trianguli. b. t. n. b. f. n. & b. d. z. præcisè in su-
 perficie azimuth siti sunt, vt infra apparet. Neq; verò cuiquam mirum esse de-
 bet, sumere me. e. b. horizontalem nunc pro vnus superficiæ, quæ alterius
 communi sectione, hoc enim idcirco facio ne paginam lineis onerem, & cõ-
 pleam. Formatis enim tribus triangulis subscriptis, vt illa horæ in cælo verè
 tant in superficie circuli azimuth, est mihi. p. b. communis sectio dicti azimuth
 cum facie pyramidis, ex quo quamprimum mihi sese punctum. e. obijcit. Hoc
 interim notabitur, huic operationi præstada, tam multis opus non esse, quæ
 literis mandare nihilominus volui, quò facilis rationem, linearum necessa-
 riarum intellectus contemplari possit. Triangulus. b. t. n. necessarius opera-
 tioni, non est, vt neq; triangulus. b. f. n. sed inuento puncto. d. cætro mundi,
 hoc est distantia. d. b. & formato triângulo orthogono. b. d. z. super latus. d. b.
 media. d. z. parte axis horizontalis, ducto. g. d. t. quæ portio est radij solaris sta-
 tim habebimus intentam. Huiusmodi autem operatio, maris omnibus ad
 orientem inclinatis facillè inferre potest, inclinationis angu-
 lo. da. z. act. d. z. a cognito, & angulo azimuth cum me-
 ridiano ipsi muro perpendicu-

lari.





Fig.



De alio modo inveniendi punctum horę supra planam inclinatum orizonti.

Cap. LXXXI.





DEM alia quoq; via, & ea quidē geometrica cognosci potest. Quamobrem sit superficies. c. f. loco eius, quæ perpendicularis est orizonti in situ lineę orizontalis, ut est ante dictum, & superficies. c. g. sit loco faciei pyramidis, aut muri ad orientem inclinantis, & c. b. sit linea orizontalis, communis ipsarum sectio, in qua sit punctus a. pro-

a. proportionatum. a. circuli præcedentis capitis. Cogitemus autem cernere nos. a. b. proportionalem id est æqualem ipsi. m. b. distantiam a zinet horæ à pede gnomonis. a. d. ita etiam. b. t. distantiam perpendicularem puncti horæ. t. ab horizontali. Amplius mente concipiamus solarem radium. d. t. qui à superficie. e. g. interfecetur, quæ faciei est, in puncto. e. quæsito. Quod cognitur, hæc methodum sequemur. Triangulum orthogonum. b. t. u. formabimus in puncto. t. mediante cognita. b. t. & angulo. t. b. u. cognito descripto à duabus superficiebus inuicem, qui in præcedenti capite angulus est. p. z. u. aut. h. z. b. in circulo, quare statim cognoscemus latus. u. t. ducta deinde. t. a. cognita, tanquam basi trianguli orthogoni. a. t. u. in superficie. c. f. perpendiculari orizonti, & a. u. in superficie. c. g. faciei, habebimus cognitam. a. u. tanquam basim trianguli pariter orthogoni. a. t. u. & cum triangulus. a. t. u. & triangulus. t. a. d. in eadem superficie perpendiculari ipsi. c. f. sint, ex ijs rationibus quas quilibet poterit intelligere atq; proferre, qui vel mediocriter vndecimū Eucli. attigerit itaq; quæsitum punctum. e. ipsi. a. u. & d. t. commune cognitum erit, in ipsa. a. u. igitur ducta in facie pyramidis. b. u. linea perpendiculari occulta ipsi. c. b. à puncto. b. & u. a. occulta quamprimum in ea collocare poterimus punctum. e. vt in linea. u. a. seor

sum inuentum fuerit: nihilominus tamen
 præcedentis capitis modus,
 tum pulchrior
 tum
 breuior
 est.

De





De modo ex discreta invenendi angulum axis verticalis cum facie tetrahedri.

Cap. LXXXII.



T verò si quis cuperet numeris invenire angulum comprehensum ab axis orientis, & communi sectione vnius faciei cum azimus, ipsi perpendiculari, qui præcedenti capite æqualis est angulo. h. a. b. illi modus hic sequendus esset. In superscripto azimus constituamus diametrum. a. b. esse partium. 200000. duplum finis totali quare. b. c. tertia eius pars erit. 66666. cum duabus centis, & 2. c. axis pyramidis 133333. cum vna tertia, & productum ipsius. a. c. in c. b. erit. 8888777778.

8888777778. cuius quadrata radix videlicet. d. e. erit. 94380. quadratum
 deinceps a. c. erit. 17777688889. cuius aggregatum cum quadrato ip-
 sius. c. d. erit. 36666466667. & quadrata radix huius aggregati videlicet. a. d.
 latus vnum pyramidis erit. 163298. cuius lateris dimidietas erit. 81649. ac
 medietatis huius quadratum erit. 666633924. id quod subtractum ex qua-
 drato. c. d. remanebit. 1122218377. cuius residui, quadrata radix erit.
 47146. illa videlicet perpendicularis, quæ à centro basis pyramidis ad latus
 dicitur basis ferat, quam vocabimus. e. f. iam si medietatem. e. f. a. c. angulum
 rectum formauerimus, triangulum scilicet orthogonum absciderimus, medietate
 basi. a. c. quæ erit partium 14142. æquales sunt ipsius. a. c. 133332, & c. par-
 tium 47146. itaque si. a. c. partium 141421. nobis preter. e. f. partem. 47146.
 quid dabit totalis sinus. 160000. inuenietur cetera. d. e. 33333. qui pro si-
 nu sinuque arcus habebit, & angulus in centro graduum. 19. minut. 28. qui
 erunt anguli acuti comprehensives inter axem orientis, & communem seclio-
 nem faciei cum predicto axitum, angulum scilicet. c. a. e. in centro, non au-
 tem in circumferentia, quare habebit latus propositum.

Cupienti vero numeris centro angulum acutum à communi se-
 clione vnius faciei collateralis cum oriente, & me-
 ridiane orientali, hoc erit obliqua fa-
 cillimam, erit enim gra-
 dum 130.

in
 centro, & 60. in circumferentia.

cum sit tertia v-
 nius recti

par-

sup-

sup-

sup-

sup-

sup-

sup-

De triplici modo faciendi quibus locis terra, vel maris sit ex-
 -ratur, vel occidat in quolibet temporis instanti.

Cap. LXXXIII.



Ubi verb. desiderasse, in aliquando modum, atq; viam
 re perire quae possem cognoscere quousque diei, ac no-
 -dis tempore, quibus terrae locis, maris, aut orien-
 -tur, aut occideret sol, tres adiuvant rationes. Pri-
 -mam quidem globo exactissime confecto.

Sumatur cum globus, & in eo circulus horarius
 horarum communium instantis desiderati temporis
 reperiat, in circulo autem horario capiatur pun-
 -ctum in quo sol eiusmodi instanti reperitur, quod unum est duorum gari para-
 -lelli illius diei per praedictum circulum horarium lati, collocetur autem reuo-
 -luto globo in longum latumq; punctum hoc in zenit orientis globi eiusmodi
 -di, attendantur deinde illa globi loca omnia, quae dicto ortu materiali oc-
 -current, & illa etiam, quae medietati orientali, occidentali, illa inquam erit
 -quibus sol oriatur illo instanti, quae verò occurrerent medietati orientali orien-
 -tali, illa erant quibus occideret.

Altera ratio sine globo, sed calculis perficitur, quae & securior, & fidelior
 est, cum globus exactus vix vaquam reperiat. Constituamus igitur sub-
 -scriptum meridianum, p. b. q. in quo imaginariè situm sit praedictum pun-
 -ctum, sitq; d. & b. a. sit aequator. e. a. ortu, tum parallelus aequatoris sumat-
 -ur cogniti declinationis, ex ijs dumtaxat, qui ab oriente. e. a. secari apti sunt,
 -sit parallelus hic. f. t. l. cuius punctum. l. commune sit giro orientis, sitque gi-
 -rus. p. t. a. q. circuli per polos mundi lati, perq; puncta communia aequatori at-
 -que orienti, quare arcus. f. t. similis erit arcui. b. a. sit autem nobis propositum
 -cognoscendi punctum. l. commune parallelo huic, & orienti, quod, cognito ar-
 -e. u. t. quamprimum cognitum erit: etenim arcus. t. l. cognitus est esse gra-
 -dum. 90. cum similis sit arcui. b. a. & arcus. f. t. nobis cognitus erit quoties e-
 -ius sinum cognoverimus, qui semper equalis est vni parallelo in superficie me-
 -ridiani, hae verò sit. e. u. quae, e. u. pars est communis sectionis dicti paralleli ad
 -meridiano ab axi mundi, & oriente terminata, quam mediante triangulo.
 -e. u. o. in meridiano cognoscemus, etenim. u. o. parallela finis declinationis
 -cognita est cum ex suppositione declinatio. f. h. cognita sit, & angulus. u. o. e.
 -elevationis axis supra orientem pariter cognitus sit, & angulus. u. rectus.

Exempli

Exempli gratia, inveniri sinus arcum. t. f. quare sumpta quantitate sinus
 altitudinis poli, videlicet. p. g. multiplicatoq; sine hoc cum sine declinatio-
 nis, videlicet. o. u. (est enim. o. u. æqualis prædicto sinui) diuisioq; producto
 per quantitatem sinus residui, aut complementi altitudinis poli scilicet. o. g.
 (estq; o. g. æqualis prædicto sinui) quod super fuerit erit. e. u. æquale sinui ar-
 cus. t. f. quatenus continuum, triangulus enim. p. g. o. similis est triangulo. e. u.
 o. Habitur autem. e. u. tanquam sinum discretum arcus. t. f. si diameter. u. f. pa-
 ralleli. f. t. (intellectus tanquam sinus complementi declinationis, diuisus in
 partes æquales partibus semidiametri mundi, videlicet. 100000.) præbet
 m. h. i. e. u. similibus partium diuisam, quid daturus est diameter. u.


f. paralleli diuisus tanquam totalis sinus partium.

100000 ? quare statim proveniet sinus


ipſus. t. f. quo mediâte quæ-
 primum habituri

ſu-
 mus arcum.

t. f.



• 83.



Eritia præter ceteras præstantissima ratio est inveniendi prædicta puncta terræ marisque quibus sol quæcumque hora, aut citur, aut accumbit, in superficie plana, via continui. Quamobrem mediante æquatore, globum terrestrem in duas partes æquales cogitatione dividemus, depicta vnaquaque eorum in plano, hac tamen ratione, notatis primum parallelis æquatori iuxta tradita à Ptolemeo theoricè in suo planisferio, & practicè à Ioanne Stoflerino (quos duos tanquam optimos noto) de modo describendæ spheræ, in plano,

in plano, quare centrum, dictis parallelis in vno hemisphærio, commune, vni polo subseruet, alterum, alteri in altero, à quibus, mēdiani forma, diametri, vñq; ad circumferentiam equatoris ducentur, quā prius diuisus fuerit in suos, 360. gradus. Tum in planis his descripta vbi fuerit terra, depictumq; mare, summentur, in nostro plano meridiana, à quo in arca equatoris gradus, 90. ad occidentem recedemus, signabimusq; punctum prædictum, atq; eius oppositum, exempli gratia Taurini hic, dictum punctum erit. 199. eius verò oppositum graduum: 179. tum in nostro meridiano numerabimus gradus, & minuta declinationis solis, inchoando à centro, hoc est polo, circumferentiam versus, neq; aliter, & per punctum extremum diſtē supputationis, cum duobus alijs punctis circumferentię iam inuentis, ducetur arcus circuli in quo ortum, & occasum solis illo temporis instanti habituri sumus, in altero quidem medietate ortum, in altera occasum, primam vocamus occidentalem à meridiano, alteram orientalem. Id ipsum præstatori sumus hora ante meridiem gradibus. 13. ante. 314. videlicet ex vna parte, & altera, 134. eadem semper seruat distantia medijs punctis à centro in meridiano, gradibus semper. 173. antea idem de reliquis horis. 14. fiet.

Inter cetera verò, quę in gratiam serenę Sabaudię Ducis Domini mei à me perfecta fuerūt, hoc vnum extitit, quod in vitris feci vltus opera Albertini Ramo Allobrogis excellentissimi vitrorum pictoris, sex enim vitra parauit, in quibus tertio integer globus maris, atq; terre depictus erat quorundam vnusquisque hemisphærium vnum habebat, tria videlicet hemisphæria septentrionalia, tria etiam meridionalia quò minor esset linearum permixtio: Inueni namq; sufficere horum orizontium delineationem, gratia principij cuiuslibet signi.

Quare in vno planisphærio delineant orizontes. 24. horarum subseruiturorẽ principio Canci, Capricorni, Arietis, & Librę, in altero subseruituros principio Geminarum, Leonis, Sagittarij, & Aquarij, in tertio eos, qui principio Tauri, Virginis, Scorpionis, & Piscium, seruiati erant. Praxis deinde ipsi docet quo loco signa ceteraq; collocanda sunt. Insi quoq; numero. 12. horę quo meridies designatur, stans colere

inſici, vt differret à numero. 12. dimidie noctis.



V M specularer aliquando quam ratione possem horo-
logij italici vniuersalis formam in uenire, prætermisso cir-
culorum modo, & forma annuli astronomici, quo circulus
horarius italicus, suis polis innixus, per versus para-
lelli loci voluitur: venit in mentem horologij polaris cir-
cularis paralleli æquatori formâ, vt quicquid hac in re fieri
potest præstetur, neq; enim dubium erit quin circa æqui-
noctis eiusmodi instrumentum subsisterarum non sit. Primum igitur meri-
dianum. a. g. i. q. cogitemus diuisum ab horizontali. q. g. & à verticali a. i. in quo
axis mundi sit. f. h. æquinocctialis. e. r. meridiana horologij, quæ meridiana æqui-
noctialis. e. r. parallela semper est, sit. f. m. Hæc horizontalem. g. q. perpetuo in-
tersecat, præterquam sub polo, & punctum intersecationis sit. o. centrum ho-
rologij. p. axis. p. r. mundi, gnomon sit prædicti horologij, & b. punctum ma-
ximæ declinationis solis, quare radius. b. r. k. definiet in puncto. k. semi-diamete-
trum. p. k. g. rimâque umbræ gnomonis, toto anno; tum capiatur semi-diamete-
ter. p. n. maximæ amplitudinis totius horologij, quamuis tãtus esse nunquam
poteat quantum sufficiat. Iam verò cogitandum est, quod si æquinocctialis
e. r. eadem esset cum verticali. a. r. punctum. p. idem quoq; esset cum puncto.
o. quod est per se notissimum, quare si horologium. u. f. n. m. confectum cogi-
tauerimus, cuius circumferentia externa. n. f. u. m. in 24. partes æquales diuisa
sit, inchoando à puncto. n. atq; ita interna pariter in 24. inchoando à puncto.
k. & ductas esse lineas horarias, quæ omnes in centro concurrent eiusmodi
horologium, in colis æquatoris inferuiret pro verticali, quibus neuter polo-
rum eleuatur, quare. u. n. horizontalis horologij esset, quibus verò locis polus
atollitur super horizontem, velut in præsentis exemplo, manifestum erit horizon-
talem horologij, quæ fertur per punctum. o. perpendiculariter meridiana. f.
m. horologij ipsius, non transitam per centrum. p. sed per distantiam. o. p.
partis ipsius meridiana. ab eo remotæ. Cogitemus autem in præsentis casu,
horizontalem horologij esse. n. c. in puncto. o. per medium diuisam, à quo per
centrum ducta. a. o. p. litum dabit meridiana. f. m. punctum verò. k. non amplius
erit. 24. horarum punctum, vt antea, sed. d. quare. n. d. linea erit. 24. horæ, atq;
ita deinceps ceteræ omnes lineæ horariæ situm commutauerint, neq; amplius
centrum. p. introibuntur, tamen puncta externa horarum in maiore circumscrip-
tionis commutata non fuerint. Itaq; cognoscenda est quantitas anguli. p.
n. o. horologij, quocumque gradu eleuationis poli supra orientem, quod d

hac

hac ratione speculari poterimus. In meridiano à puncto. o. ducatur. o. n. perpendicularis ipsi. o. p. indefinita, tum collocato vno circini crure fixo in puncto. p. & ducto altero. p. n. axi mundi perpendicularis requirit, circumductoq; donec secet. o. n. in puncto. n. ac ducta altera. p. n. triangulum formauerimus. p. n. o. cuius angulus. n. erit questus, & o. n. diuidia horizontalis horologii. Porro angulum. p. n. o. via numerorum cognitari, graduum scilicet ac minorum illum in centro circuli esse constituamus, ducemus autem à centro. r. meridiani lineam. r. n. ipsi. f. p. m. u. que nobis angulum. h. r. n. ostendet, & hic mediante suo arcu cognoscetur, cuius sinus proportio, sinu complementi quartæ, cognita erit, huius enim æqualis est proportio. p. n. ipsi. p. r. si leuata quoq; rationibus nota erit proportio. p. r. ad. p. n. quam obrem angulum. p. n. o. cognoscemus, qui alia etiam ratione cognosci posset, constituto. n. centro vnius circuli in 360. gradus diuisi. quartæ circuli quæ gradibus circumferentiæ prædictus angulus subijceretur. e. f. g. h. i. k.

Inuenis itaq; omnibus angulis. p. n. o. respondentibus singulis. 90. gradibus altitudinis poli, quadrarum mente concipi iubemus materiale. u. z. per spacium semicirculi. u. m. n. insertum, vt in eo volui possit horologium, prout necessitas postulauerit, & supposito centro. n. signari quartam. u. y. z. que extrinsecus in 90. gradus diuidatur, inchoando à puncto. n. intrinsecus vero iuxta correspondentiam anguli. p. n. o. elevationis poli, sumpto initio à puncto. u. Exempli gratia, si decem gradibus elevationis poli supra horizontem. i. 2. gradus anguli. p. n. o. respondeant, efficiemus vt interior duodecimus gradus recta centro. n. quartæ, & decimo circumferentiæ occurrat. Quare constituta. n. y. in centro. n. innotora, toto reliquo mobili, cum scire voluerimus quantum recessura sit ab. u. n. sub polo altitudinis graduum decem, si eius extremum. y. sub decimo gradu externo posuerimus, conspiciemus dictum angulum. n. futurum graduum. i. 2. quo viso, punctum. y. extremum horizontalis lineæ sub gradu duodecimo externo collocabitur, quare puncta. m. & f. meridianæ extrema, eorundem gradibus à priore situ recesserint, scilicet. i. 2. vt per se patet.

Prædicta verò in materia aliqua formatari, aliter duorum modorum prædictorum sequendus erit. Efficiemus enim vt circulus. f. m. u. n. in cauitate. u. m. n. mobilis sit, ita vt eo reuoluto, situs lineæ. c. n. parallelus sit. x. z. aut circum punctum. n. voluarur tanquam circa centrum, vt stante fixo arcu. u. c. angulo videlicet. u. n. c. prædictus circulus. f. a. m. n. volui possit, cum. c. n. & leuati ex parte ipsius. u. c. donec. c. n. parallela sit dictæ. x. z. Ad hæc interior circulus. z. d. k. ipse quoq; mobilis esse debet, quò circa centrum. p. volui possit, vt cum linea. n. y. angulum descripserit. u. n. y. idem quoq; circulus volui possit, ita vt punctum. s. 24. horæ collocetur in situ puncti. d. intersectionis gni. k. b. t. cū n. c. y. quare etiam oportebit omnes lineas horarias, & in punctis circumferentia.

restitit. *f. u. m. n.* immotas esse, & toto reliquo mobiles, quamobrem necesse erit dictas lineas horarias ex aliqua materia conficere filo aereo, aut ferro tenui, quarum vnaqueque per sibi respondens foramen circumferentia interioris circuli mobilis *k. d. t.* feratur.

His ita paratis, efficiemus, ut linea *x. z.* pro axi nobis seruiat, circa quam tota machina, & tolli, & deprimi possit, iuxta altitudinem aequatoris, figurat autem gnomon, *p. r.* equalis, *p. r.* meridiani perpendiculariter in centro *p.* qui ex utraque parte tantumdem sese proferat, aptatis prius lineis horarijs versutibus faciei circuli, *f. u. m. n.* etenim earum aliquae signis septentrionalibus, aliae australibus subseruiant.

Ita parato instrumento cum sua aca, ut in horologijs polaribus horarum communium fieri consuevit eo uti poterimus, ut est antedictum, mediante extre-

mo umbrae gnomonis ubique, praeterquam circa equinoctia: hoc

interim animaduerso lineas horarias esse debere con-

tiguas planis circuli. *f. u. m. n.* exactioris

effectus gratia, aut efficere, ut


pes gnomonis à

sua

plani imaginarij linearum hora-

riarum exordia-

tur.



De altitudine solis quolibet hora.

Cap. LXXXV.



CVM multos alij tradiderint modos cognoscende altitudinis solis medio calculorum, quas 6.ij. hora proposita, mihi tamen præter illos vultus occurrit. Quamobrem conseruamus scire velle nos quantum supra horizontem. 23. hora italica scilicet tollatur, dema in tropico primo sub polo. 43. graduum, & minus. 40. reperitur. Formabitur meridiansum Analema (sic enim appellatur.) n. b. p. d. in quo horizontalis sit. h. d. verticalis. n. p. axis mundi. q. u. diameter paralleli. si solis. m. l. diameter almicanarum. g. Equare. i. e. differentia erit sinus veri arcus semidiurni, à sinu verso distantie solis à meridiano in parallelo. Iam sinus versus arcus semidiurni, qui in proposito exemplo est. m. i. ita reperietur. Inuenimus primo dictum arcum semidiurnum propositæ diei (quæ ratione ab alijs scripta habuerit) qui in proposito exemplo erit graduum. 114. minu. 30. ex quo vnâ quartam detrahemus graduum. 90. cum sit minor quarta, vt pote septentrionalis (etenim si minor esset dictum arcum ex prædicta quarta detraheremus) residuum verò erit graduum. 24. minu. 30. cuius sinus factus partes habebit. 41469. eritq. linea. i. r. quæ coniuncta sinui totali. 100000. ipsi videlicet. m. r. in eam nobis dabit. m. l. sinum versus arcus semidiurni, vbi verò arcus minor quarta fuerit, subtrahemus. i. r. ex q. r. residuum verò erit. m. l. quo etiam codice dabimus operam, vt sinum verum. m. e. distantie solis à meridiano in parallelo cognoscamus. Cognitis autem. m. e. & m. l. eius differentiam. e. i. clarè nouerimus, vt in proposito exemplo. m. i. erit partium. 141469. velut. m. r. esse. 100000. constituitur, & m. e. 23. hora partiumq. 16505. eiusdem naturæ, quare subtrahendo. m. e. ex m. i. remanebit. e. i. cuiusmodi partium. 14964. verum quoniam opus est nosse. e. i. partium talis naturæ qualis sinus totalis cœli est. 100000. cuius. m. r. tanquàm sinus complementi declinationis habere reperitur. 91729. itaq. sic pronantibus sinus. s. m. r. 100000. quantur. 91729. quot equalibatur. e. i. 24964. inuenimus certè æquari. 22899. Ad hæc cogitanda est. e. t. parallelis verticali, quæ æqualis erit sinui altitudinis solis, quare habebimus triangulum orthogonum. e. t. i. cuius anguli. e. & i. cogniti sunt, cum angulus. r. oppositus sit angulo altitudinis poli supra horizontem in præfati exemplo, graduum. 43. minu. 40. & residuum vnus recti respondens angulo. h. a. b. graduum. 26. minu. 20. quare sinus anguli. e. i. t. erit partium. 72337. cuiusmodi esse. e. t. cum e. i. esset. 100000. sed cum. e. i. ad partes. 22899. reuocetur, diuisus si sit 0

100000.

10000. habemus 22899. quid oriatur loco. 7 2337. reuocabitur certe. e. i. ad. 16564. cuius arcus sinus, erit graduum. 9. in 32.


Neq; verò erit scitu inutile quod quoties. e. i. maior r. i. fuerit, parallellis inquam septentrionalibus, ipsa quoq; ex duobus rectis sinibus componetur, quorsu alteraqualis erit ipsi. r. i. cuius arcus ab oriente & communis sectione terminabitur circuli horarij sexte horæ cõmunis cum parallelo, qui idem est arcus prædictus in proposito exemplo graduum. 24. minu. 30. alter verò sinus erit arcus remanentis, prædicto detracto graduum. 24. minu. 30. eiusmodi inquam arcus erit differentia inter distantiam solis à meridiano & circulum horarium sextæ horæ communis prædictæ. Verbi gratia si nosse voluerimus altitudinem solis. 12. hora italica, in proposito casu, arcus parallellis inter centrũ solare, & orientẽ graduum erit. 30. minu. 0. quare hætenus animaduerti mus superare prædictum arcum inter dictam cõmunẽ sectionẽ & orientem, gradibus quinque minu. 30. cuius rectus sinus erit partium. 9585. tunc verò arcus prædicti, partium. 41469. hoc est. r. i. qui simul sumpti integrari efficiunt. e. i. partium. 51054. similitum. m. r. que partium est. 100000. quare si reuocata ad naturam, partium. m. r. cum fuerit, tanquam sinus complemẽti declinationis, nosq; opus prosequuti fuerimus, habebimus in proposito

Quod si arcus parallellis maior fuerit semidistans, exempli causa hora. 16. graduum. 120. diligenter considerandum est, quantum expedit, velut in casu proposito quinque gradibus. minu. 30. maior esset, quàm prædicto arcu senũ diurno detrahendi sunt & reliquo (ut est ante dictum) opus conficiendum, quare in proposito casu, eiusmodi reliquum esset graduum. 109. minu. 0. è duobus arcibus compositum, cum sit maior eo quod gradibus 24. minu. 30. consistat alterum graduum. 84. minu. 30. alterum. 24. minu. 30. prioris rectus sinus, erit partium. 99539. secundi verò. 41469. qui summi similitum dabunt integrans. e. i. partium. 141008. qualium.

nam. est. 100000. quæ vsq; prædictum est reuocabitur, & prædictum persequemur. Hic


resoluit speculatio, cum ex sibi scripta figura facillima sit, à nos præ-

ter transmittitur. I



87.

85.






Dem viatriangulorum sphericorum inueniri potest, præcipuè ex 11. propositione primi Copernici, cum cognitum fuerit complementum altitudinis solis ab horizonte hac ratione.

Cogitato inquam supra scripto triangulo. A.C.B. cuius latus. A.C. sit complementum altitudinis poli, pars meridiani, & A. sit polus, zenit. C. quare. A.C. in casu nostro, erit graduum. 46. minu. 20. alterum verò latus sit. A. B. complementum declinationis solis, & circuli horarij communis pars, graduum. 66. minu. 32. in exemplo proposito. Tertium postmodum latus sit. B.C. complementum altitudinis incognitæ, & pars a. circuli solis. Angulus tamen. A. complementum anguli semidiurni graduum. 99. minu. 30. deductis è prædicto arcu (vt in præsentis constituitur) gradibus. 13. minu. 0. perfecta deinde figura. A.D.E.F. B.C. modo in prædicta. 11. descripto, habebimus. A.D. altitudinem poli graduum. 43. minu. 40. & angulum. D.A.F. residuum duorum rectorum graduum. 80. minu. 30. Vltcrius verò progrediendo, ex 4. prædicti, inueniemus angulum. A.F. O. esse graduum. 44. minu. 29. cuius sinus erit partium. 7007. & latus. A.F. graduum. 80. minu. 10. cuius sinus partibus constabit. 98337. ex quo arcu, deducto arcu. A.B. graduum. 66. minu. 32. remanebit arcus. B.F. graduum. 13. minu. 38. quare habebimus triangulum orthogonum. B.F.E. ijs conditionibus quas prædicta. 4. proponit, cuius angulus. E. rectus est, & F. nobis cognitus cum latere. F.B. quare, regulas dictæ quartæ sequenti, habebimus latus. E.B. nouem graduum. minu. 30. qui præcipuè quærebatur.

Ecce quæ ratione dum cognitionem venatur. B.C. prius in cognitionem devenimus eius, quod cupiebamus.

De azimut solis que volueris hora.

Cap. LXXXVI.




T inuenturi azimut solis, hora proposita, inuentus cum fuerit arcus altitudinis, videlicet. d. f. statim angulus acutus inter azimut solis, & circulum verticalem comprehensus reperietur, qui angulus in almicantaræ pro sinu semper habet lineam æqualem ipsi. e. c. & hic in prædicto almicantaræ trianguli orthogoni angulus est, cuius basis est linea æqualis. e. c. communis scilicet azimut cum almicantaræ, & cuius vnum latus comprehendet angulum rectum prædictus sinus est æqualis. e. c.

Quamobrem si sumperimus. e. f. tanquam sinum complementi altitudinis solis (n. f.) partium. 98316. queremus nosse. e. c. hac ratione. In primis considerabimus quantum sit. i. a. æqualis sinui amplitudinis solis, vel modo à me


Bb a capite.

capite. 59. tradito, vel alia hac via. Cogitabimus inquam à punto. o. sursum, vel deorsum ferri lineam. o. l. perpendicularem orizontali, quæ sinus efficit altitudi nis poli & a. æqualis sinui complementi altitudinis eiusdem poli, partium. 72337. & quoniam triangulus. a. o. l. similis est triangulo. i. a. r. & latus. a. l. respondens lateri. a. r. & a. o. ipsi. a. i. sic pronuntiabimus, si. a. l. sinum totalem præbet. a. o. quid dabit. a. r. æqualis sinui declinationis solis partium. 398227 provenient certe partes. 55050. ex quaesita. a. i. attamen in proposito exemplo, citra ductum quemcumq; aut re, aut cogitatione lineæ. o. l. id præstare poteramus, & ita solum præferre si t. e. dat inuentam præcedenti capite. e. i. quid dabit. a. r. & habebimus intentum, nihilominus mediante linea. o. l. opus erit compendiosius. iam verò quaeremus hoc modo. i. u. dicemus inquam si. o. l. dat nobis. o. a. quid dabit. i. a. quare proveniet. u. i. partium. 79729. ex qua detracto in proposito exemplo. e. i. remanebit. u. e. partium. 55988. quod si e. i. maior esset. u. i. subtraheretur. u. i. ex. e. i. & in parallelis meridionalibus simul iungerentur, quare proveniret. u. e. si igitur. u. i. dat. i. a. aut brevius, si. a. o. dat. o. l. quid dabit. u. e. provenient partes. 38637. ipsius. c. e. quales sunt ipsius. c. f. partium. 98516. sumpto verò. c. f. tanquam sinu totali, ut in proposito necesse est, cum dixerimus si. 98516. dant. 38637. quid dabunt. 100000 inueniemus. c. e. partibus consistere, 39238. tantundem constabit sinus anguli quaesiti, cuius arcus erit graduum. 23. minu. 6. & quod primo proponebant. Presentis autem problematis effectio, triangulis sphericis in figura præcedentis capitis absoluti potestis progrediamur mediante quarta primi Copernici, in triangulo. A. F. D. cognoscemus enim latus. D. F. esse graduum. 76. minu. 23. in triangulo verò. B. F. E. latus. E. F. esse graduum. 9. minu. 50. quod de totali.

D. F. detractum, ut in proposito exemplo, remanebit arcus orizontalis. D. E. ànter azimuth. C. B. E. solis, & meridiana graduum. 66. minu. 33. quare distabit à verticali gradibus. 23. minu. 27.



87 • 86 •




Cordia



Ratia porro æquatoris dicemus si. a. k. dat sinum arcus. K. n. equalem altitudini poli supra horizonem, quid dabit. a. z. (quæ. i. e. proportionalis est) sinus arcus æquinoctialis inrer solem atq; horizonem ? erit certè. z. e. similtium partium. f. e. sinus complementi altitudinis solis. Denenturi autem in cognitionem anguli aziguralis, dicemus si. f. e. partium similtium tanquam sinus dicti dat. z. e. partium eiusdem naturæ, quid dabit idem. f. e. rat. quæ sinus totali præueniet certè. z. e. tanquam sinus anguli quaesiti.

De modo ab antiquis tradito altitudinis solis multiplicanda quoniam hora.

Cap. LXXXVII.




Odus à Petro Apiano. 34. propositione traditus, antiquis in vtu fuit, est autem eiusmodi. Exempli gratia, sub polo. 43. graduum minu. 40. scite velimus quantum super horizonem solis 2. hora attollatur, dum fuerit in tropico canceri, sumebant in prima antiqui sinu declinationis solis, id est. 39822. & cum sine totali multiplicabant, productum autem dividebant per sinum complementi altitudinis poli, quod est partium. 72337. & quod inde proueniebat videlicet. 35050. sinus erat altitudinis solis, vt ostendat, cuius sinus arcus erit graduum. 33. minu. 24. quod factò, differentiam ascensionalem solis hac latitudine inneniebant, sumebant sinum complementi amplitudinis solis. 83483. & sinum complementi declinationis eiusdem. 91723. minorem autem. 83483. in sine totali multiplicabant, ac productum per alium maiorem pertinebatur videlicet. 91723. quod verò proueniebat. 91018. pro arcu habebant graduum. 63. minu. 32. qui subiectus è gradibus. 90. remanebant. 248 gradus. 11. minu. 28. & hæc erat differentia ascensionalis quaesita, quo per archi sinum complementi declinationis per sinum differentie ascensionalis multiplicabant productumq; per sinum totalem pertinebant proueniebatq; in proposito exemplo sinus partium. 37987. quem iungebant cum sine complementi declinationis sole existente in signis septentrionalibus, aut ex eo detrahebant dum per Australia fertur, quare in casu proposito summa proueniet partium. 129710. quem numerum sinum integrum operatiuum appellabant, qui est sinus versus arcus semidiametri calium partium, qualium circuli semidiameter est. 100000. Huius paratis sumebant horam. 23. propositam, intuebanturq; quantum à meridiano supra terram eius circuli horarius communis distaret, qui in presenti exemplo gradibus.

99. minu. 45. remotus erit, porro sinum versum eiusmodi arcus sumebant, qui erit partium. 116933. talium qualium semidiameter paralleli est. 100000. hunc verò multiplicabant cum sinu complementi declinationis. 91723. productumq; partiebantur per. 100000. procedensq;. 107236. partium. talium qualium semidiameter cœli est. 100000. de sinu integro operatio. 129710. prædicto detrahebant, ad partes prædictas reducto, residuum verò. 22454. cum sinu complementi altitudinis poli. 72337. multiplicabât, productumq; per. 100000. partiebantur, proveniens autem. 16242. erat sinus altitudinis solis cuius arcus in proposito exemplo gradibus. 9. minu. 20. constaret.

Præcedentis cap. theoria.

Cap. LXXXVIII.



HÆC autem omnia quam rectè fierent demonstremus. Sic igitur subscripta figura meridiana. n. b. p. e. in qua sinus declinationis solis sit. r. a. & totalis. a. o. dimidiū axis mundi, sinus complementi altitudinis sit. o. f. sinus ampli tudinis solis. a. i. quare proportio ipsius. o. f. ad. o. a. trian guli. a. o. f. erit vt. a. r. ad. a. i. triāguli. a. r. i. quare cum. o. f. o. a. & a. r. cognitæ sint, erit quoq; cognita. a. i. Differentiæ ascensionalis solis sumendæ modus, problemate. 15. ab A piano notatus, ratione non caret. Sit itaq; seorsum meridianus. m. h. b. q. x. in quo dimidiū equatoris quasi prominens significetur, signatum literis. h. a. k. dimidiū pa ralleli. m. a. l. dimidiū orientis. b. a. d. dimidiū circuli horarij diem definiens. o. a. i. q. communis sectio paralleli cum circulo horario. r. a. quæ æqualis erit. m. r. sinui complementi declinationis, cum sit semidiameter paralleli.

Communis autem sectio dicti circuli horarij cum equatore sit. a. a. quare. r. a. & a. a. erunt inuicem parallellæ ex. 16. vndecimi Eucli. communis deinde sectio orientis, & paralleli sit. a. i. quare. a. i. meridiano perpendicularis erit, ex 19. eiusdem tum. a. a. sit communis sectio orientis cum æquatore, quæ perpen dicularis erit meridiano ex eadem. 19. cogitetur deinde. a. x. in equatore para lla erit. r. a. ex 9. prædicti, cum ex quarta. a. i. parallela sit. a. a. & a. x. parallela est iam. r. i. quam obrem triangulus. a. x. a. simili erit triāgulo. r. i. a. quare quod ab antiquis fiebat, recta ratione perfici potest, sinum videlicet complementi ampli tudinis solis. a. i. qui semper minor est. r. r. sinu complementi declinatio nis ex 18. primi Eucli. cum. a. a. sinu totali multiplicare, productumq; per. a. r. sinum prædictum partiri, quare proveniet. a. x. id præstante proportionalitate laterum duorum istorum triangulorum, qui cum sit sinus arcus. a. k. & hic ar-

cus detractus è sua quarta. & dabitur a. a. arcum quæritum. atq; ita. r. i. in pñ
 mo meridiano, erit partium. 41416. talium qualium. m. r. sinus totalis para-
 lli solis est. 100000. quæ ad partes reuocabant tales quales o. a. sinus totalis
 coeli est. 100000. dicebantq; sin. r. tanquam partium. 100000. dat. i. par-
 tium. 41416. quid dabit eadem. m. r. tanquam partium. 91723. & proueniebat.
 r. i. partium. 37987. qui iunctus. m. r. partium. 91723. insigni. septentriona-
 libus; aut detractus ex eo in meridionalibus, proueniebat. m. i. sinus versus ar-
 cus semidurni partium talium qualium. m. erat. 91723. hoc est. a. o. 100000.
 vt in casu proposito iam. m. i. habiturus sit, partes. 129710. quem vocabant
 sinum integrum operatum. Ego verò tam prolixè via id nunquam præstat-
 sem. Et enim si quantitatem. r. i. habere volebant in partibus quas. a. o. habet.
 100000. & m. r. 91723. multo breuius id illi. perfecerint si sinum. o. x. alti-
 tudinis poli cum sinu. a. r. declinationis solis multiplicassent, productumq;
 partel fuissent per. a. x. æqualem sinu. o. Complementi altitudinis poli quando-
 quidem ita se habet. a. r. ad. r. i. vt a. x. ad. x. o. ex triangulorum similitudine.
 Ad hæc inueniebant illi, quot partibus constaret. m. e. sinus versus illius ar-
 cus semidurni qui inter meridianum & circulum horarium communem in-
 terponebatur partibus inquam talis nature qualis. m. r. sinus totalis paralleli
 habet. 100000. quæ in proposito exemplo erant. 116933. hoc vero multi-
 plicabant cum sinu. m. r. tanquam partium. 91723. productumq; per eundem.
 m. r. partiebantur, tanquam. 100000. proueniebatq; m. e. partium. 107236. ta-
 lium qualium. m. r. erat. 91723. hoc est. a. o. 100000. quem sinum. m. e. de sinu
 verso. m. i. partium eiusdem nature. 129710. detrahebât, supererat. e. i. basis
 trianguli orthogoni. e. i. t. cuius latus. e. t. sinus est altitudinis solis, & quo-
 niam triangulus hic similis est triangulo. o. l. a. idcirco multiplica-

bant latus. e. i. cum. o. l. productumq; per 100000. par-
 tiebantur, hoc est. a. o. quasi dicerent, si. a.

o. dato. sc. i. dabit. e. t. partiã.

16142. cuius
 arcus.

s. d. erit graduum. 9.
 minu. 30.

De azimut azimut antiquarum methodum.

Cap. LXXXIX.



Inter ceteros modos inueniendi azimut solis ab antiquis usurpatos, qui à me nunc describetur vnus erat, vt patet ex 43. propositione Petri Apiani. In primis sinum illius arcus circuli maioris inueniebant, qui inter solem, & verum punctum orientis, aut occidentis interponitur, modo ab eodem Apiano. 39. propositione tradito. Sumebant inquam sinum horæ communis propositæ, ac sinum complementi de declinationis, quæ sinum multiplicabant, productumq; per sinum totalem cæli partiebantur, quod verò proueniebat sinus erat arcus prædicti circuli inter toleptæ & meridianum, reliquum verò ex 90. gradibus erat quæ situm. Huius autem rei ratio eiusmodi est.

Sit exempli gratia meridianas. b. f. κ . n. in quo dimidiam orizonis sit. f. p. n. dimidiū æquatoris. e. p. l. dimidiū circuli prædicti. c. p. κ . qui tres semi circuli communicant inuicem in p. δ . o. p. s. t. deinde circuli horarij dimidiū, qui per centrum solis. q. o. t. g. & parallelam eiusdem. d. o. m. ferunt, quare. o. a. prædicti circuli communis sectio cum parallelo, perpendicularis erit superficiæ meridianæ, ex 19. vnde dimidiū ex 18. eiusdem prædictus circulus perpendicularis quoq; sit eidem, & ita etiam parallelus, quæ. o. a. est quidam sinus quæ situs, tam ipsa. t. u. sinus est ipsius. t. e. qui ipse quoq; perpendicularis est meridianæ ex 8. prædicti tãquam parallelus ipsi. i. p. sed. t. i. parallelus est. o. t. ex 16. eiusdem, & ita. n. i. ipsi. a. r. eadem, quam obrem anguli. i. t. u. & r. o. a. ex 10. eiusdem inter se æquales sunt, itaq; proportio. o. r. ad o. a. erit vt q. i. ad t. u. rectè igitur multiplicari potest. o. r. semidiameter paralleli, hoc est sinus complementi de declinationis, cum sinu. r. u. arcus. t. e. distantie circuli horarij à


meridiano, productumq; partiri per. t. i. sinum totalem,

quasi obrem in cognitionem deuenimus arcus. o. c. qui de

quarta detractus

est

remanet arcus. o. p. quæ situs.



MO C tamen animaduerso, quod si arcus equatoris maior quarta fuerit inter meridianum supra terram, & circulum horarium, arcus eiusdem equatoris sumendus esset, inter dictum circulem, & meridianum infra terram sinum uel scilicet eiusmodi arcus, & id ipsum proueniret, ut in presenti figura iam explicata facillimè contemplari licet, supposito pñcto. t. inter. p. & k. & c. Exempli gratia si arcus. c. t. fuerit. 23. horà italica graduum. 99. minu. 45. effect arcus. t. l. graduum. 80. minu. 15. eius uerò sinus partium. 98556. sinus autem complementi declinationis, sole existente in principio Cancrì partium. 91723. quare multiplicatis simul his duobus sinus, diuisoq; producto per. 100000. proueniunt. 90398. pro sinu arcus interpositi inter meridianum supra terram, & centrum solare: graduum. 64. minu. 41. cuius residuum ex 90. gradibus constat. 25. minu. 19. arcus quæ sit, utendum tamen non erit, præterquam sinus arcus interpositi inter meridianum supra terram, & centrum solis, quare arcus residuus tunc quærendus non

Cc 2 erit.

erit. Iam verò hoc factò, sinum totalem multiplicabant cum sinu complementi distantie solis, à puncto verticali orientali hoc est cum sinu arcus postremo dicti, productumq; per sinum complementi altitudinis solis partabatur, proveniens autem, sinus erat distantie orientalis azimuth à meridiano, & reli dum à verticali, modo ut brevissimè, ita pulcherrimè.

Cuius rei hæc est ratio, sit sublevis meridians, in quo dimidium orizontis sit. *f. m. h.* dimidium almicantrat solis. *d. z. g.* dimidium azimuth. *b. a. y.* dimidium circuli mentientis distantiam solis à puncto verticali orientali sit. *p. a. q. & a. i.* sit communis sectio huius circuli cum almicantrat solis, quæ sunt erit arcus *a. p.* complementi distantie solis à puncto verticali orientali, qui sinus. *a. i.* in suprà posito exemplo erat partium. *90398.* & in precedenti figura vocabatur. *o. r.* sit de inde. *g. x.* semidiameter almicantrat, qui erit sinus complementi altitudinis solis, & *o. m.* communis sectio orientis, & azimuth, tum *x. a.* communis sectio almicantrat cum azimuth, quæ parallela erit. *o. m.* ex *16.* undecimi, & ita pariter. *x. g. i. p. l. o. h.* quare ex *16.* eiusdem angulus. *g. x. a.* erit æqualis angulo. *h. o. m.* Ad hæc in superficie almicantrat cogitetur. *g. u.* perpendicularis. *x. a.* quare ex *26.* primi Eucl. *g. u.* æqualis erit. *a. i.* dicta deinde cogitatione. *h. t.* in oriente sed perpendiculari. *o. m.* ex posita. *z. z.* habebimus triangulū. *g. x. u.* equi angulū triangulo. *h. o. x.* quò brè ex *4.* sexti, ita se habebit. *o. h.* ad *h. t.* ut *x. g.* ad *g. u.* uti rectè dicere licet si. *x. g.* prebet. *i. a. q.* æqualis est *u. g.* sinus totalis. *h. o.* dabit, *h. z.* sinum distantie azimuth à meridiano, dice

masq; in proposito exemplo si. *x. g.* partium. *98676.* dat. *i. a.* partium. *90398.* *h.* sinus totalis dabit. *h. z.* partium. *91616.*


cuius arcus *h. m.* erit graduum. *66.* min. *22.*

residuum verò unius quartæ

graduum. *23.* mi-

nu. *38.*

modo, & compendioso, &
per eleganti.



Querant nihilominus alia etiā hac via progredi, ut scilicet
 inuenio sinus a i. sinus complementi quartæ fuerint, qui
 erit æqualis q . i. & ex his quatuor, quæ scilicet a & x detra-
 herent, æqualem sinus altitudinis solis, & ex residuo radicem
 quadratam caperent, hæc si uellet x a que considerata ortho-
 gonē coniuncta extremitati g . x periclitōq; triangulo ortho-
 gono ipsa x i. angulo comprehensio inter uerticalem, & a uertice oppositur.
 Antiquorum tamen uia ut breuior ita pulchrior est.

Porro quatuor hæc problemata (quorum duo prima à me omnino inuen-
 ta, duo postrema tantum considerata fuerunt) ex alio meo volumine desumpti
 inscripto

inſcripto. Noua ſpeculatio problematum aſtronomiſcorum, quę cum diuerſa ratione quam antiqui fecerint ſpeculatus fuerim, in hunc locum referre placuit, vt pro libito cuiq; liceret cuiſcunq; orizonti propter horologia orizontalia tabulas formare altitudinum, & æquinoctii ſolis. Quę verò pro orizontibus tradita fuerūt, muralibus (cogned ſitu poli reſpectu muri) applicari poterant, ſi ijs quę. 80. capite diximus, vltus quĩ fuerit.

De fabricando horologio ſupra parietem orientati inclinatam.
Cap. XC.





Veneret forte aliquando, vt nos voluntas capiat horologii depingendi in muro, plano ad orizontem inclinante, vt in muris ciuitatis, aut turribus, quę e nobis optime modus capite. 80. aut 81. traditus gratia facienda pyramidis quadam aetę inferret, vetum quoniam niſi prius cognita quantitate inclinationis dicti muri ad orizontem eius modi opus perfici non poteſt, neq; citra declinationem

lineę orientalis à meridiano, aut verticali, idcirco oportuam iudicanti aliquid hoc loco tractare, conſtituto niſi hominibus, vt ea rectè quis intelligat, quę à me capite. 26. huius libri tradita fuerunt, talis namq; modus mihi præ ceteris, aut ab alijs, aut à me inueniſſi placet, neq; hoc dico, quod eius ſum auctor cum & alios multos, & quęcunq; ſepe in volumine trado ipſe excegerim.

Conſtituamus igitur murũ. g. e. aut ante murale, obliquũ orizonti, in quo primũ duci iubeo exactè ad libellam, lineam. b. e. orizontalem, in qua ſigetur ad libellam gnomon. a. d. parallelus orizonti, cogitetur deinde in ſitu lineę orientalis. b. e. ſuperficię plana. f. c. perpendicularis orizonti, quare ſuperficię. c. f. gnomonũ. a. d. perpendicularis erit. Tũ cum ſol murum propoſitum. g. e. radijs ſuis feriat, quolibet hora, noſtetur extremum umbre. e. a. ſumaturq; diſtantia. d. e. ab extremo gnomonis ad extremum umbre, ita vt mediantibus tribus lateribus trianguli. a. e. d. quibũ vnũ eſt gnomon. a. d. iam cogituri ſinus angulum. d. cuius ope, & anguli recti & a. d. formabimus triſangulum orthogonũ, quę erit & equalis triangulo. d. a. f. illi videlicet, qui eſt in ſuperficię. c. f. perpendiculari orizonti, deſcriptus, quiq; triangulus ſeorſum lit. k. h. m. Ad hæc ſe ceterus. k. m. in puncto. l. ita vt k. l. ſit æqualis. d. e. poſtmodũ à puncto. l. ad m. h. ducatur perpendiculariter. l. x. quę erit æqualis. e. u. occultę, ſuperficię. e. f. à puncto. e. perpendiculari cogitatz. Quo facto

facto à puncto e. mōri propofiti, horizontali, b. c. perpendicularis ducatur, e. i. quæ nobis erit cognita. Ad hæc diducatur circinus quantum postulat, e. i. v. noq; crure immobili in puncto l. trianguli feorfum d. fcripi fixo, altero aut x. h. aut x. m. quam voluerimus fecerimus, in puncto. y. quare habebimus latus x. y. æquale cogitato, u. i. in superficie. f. c. Iamfi ex h. x. æquali. u. a. & x. y. equali. u. i. & a. i. horizontali murali triangulum, h. x. r. formaerimus, habebimus angulum x. l. r. æqualem angulo occulto. u. a. i. tum fupra. m. h. femicirculo defcripto. m. p. h. protractaq; h. r. vſque ad p. an circumferentia, cum à giro fecta non fuerit, h. r. habebimus triangulum. h. p. m. fimilem, & æqualem omnino occulto. a. b. t. at K. m. equalis est. d. t. & distantia. d. ad b. cognita cum fit aperta, quam obre mtriangulus. b. d. t. nobis cognitus erit, qua ratione ope. 26. capituli cognituri fimus qua ex parte. b. c. à meridiana, & verticali fecetur, poſtmoq; angulus. l. y. x. æqualis est angulo. e. i. a. qui à duabus ſuperficiebus. g. c. & f. c. inter ſe deſcribitur, & angulus. x. l. y. ille est angulus, qui à muro propoſito cum horizonte efficitur quare citra

alterius rei adiumentum, ex doctrina. 80. aut 81. capituli propoſitum exequi poterimus.



De Cylindro curvato. Cap. XCI.

IST in Taurinensi arce fatis latus profundu-que pateus, ita patens, ut à mane in vesperam solis radijs toto anno illustretur. Quod cum animadvertentem, placuit littera ipsam horologij italici depingendi modum cogitare. Itaq; mente concipiebam duos ferreos diametros fati validos

lidius (ne tremere) collocandos esse, qui in centro oris putei sese ad angulos rectos interfecerent, quorum unus esset in situ meridianae horizontalis, alter verticalis subserviente interfecationis centro pro centro mundi, hoc est, ut umbra eius, horas notaret in superficie cylindrica concava putei. Cogitabam etiam signanda esse puncta horarum tropicorum, & alia necessaria, ope ipsorum azimut, & sinu altitudinis solis proportionatorum semidiametro oris putei penitus ut dicti sinus cœli, semidiametris almicanarum proportionantur hoc est, g. o. ad. o. z. in Analemate capitis. § 2. suo loco notatis in circupferentia putei, horis ortus solis. Verbi gratia. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. quibus hoc nostro horizonte oriri potest sol, que in tropico hyemali non sunt. Inuentis autem extremis punctis linearum horarum, cogitabam hanc lucas rectas ex aliqua materia, que poni tollne possent à cœtro oris putei ad extrema lineæ horariæ ductas, & aliam eiusdem rationis rectam lineam ab uno ad alterum extremum lineæ horariæ, tum his tribus lineis iam fixis, sumebam alteram rectam lineam superioris similem, & mobilem, que hærens prædicto centro, & tertio lateri trianguli, suo extremo lineam horariam signabit, que una semper erit portio giri axigoni elliptici, aut deficientis vulgo ouari dicti.

De hor. et refractibus radiorum.

Cap. XCII.



Escribi quoq; posset horologium in puteo cuius aqua os putei prolueret, ut aqua imminuta salum omnino monstraret, aqua verò labium contingente venum. Quamobrem prius seruatam oportebit quantitatem anguli refractionis radij, qui in aquam mergitur, singulis gradibus altitudinis solis, quod singulis anni diebus, vnus horæ spatio, aut breuiori etiam, facile hac ratione perficietur.

In primis cœca, aut aurica lœca rotiformabitur (in qua diameter latus sit ad mensuram pedis, & dimidij) illis rotis similis in quibus aliquod animal incedere potuit, duæ verò quartæ amplexus rotæ, inuicem oppositæ, singulæ in 90. parte æquales diuisentur, & quælibet diuisio sit transversalis vrima, que ex diametro respondenti sibi lineæ, atque numero occurrat, collocata deinde tota in vase aqua pleno ad solem, ita tamen ut dimidium eius exactè in aqua mergatur, vnæque quarta diuisa penitus emineat aquæ, altera penitus in aqua mergatur, postmodum dictum vas, ita ad solem situm sit, ut quarta indiuisa ad solem vergat, diuisa autem iam oppositam partem soli, etiam

intra solem, & rotam aliquid colloctur, quod obftet ne sol radijs suis rotam aquamue feriat, quo perfecto, sumatur tersissimum speculum, medianteq; so-
lis radio ab eo reflexo in singulos gradus per rimas dictus radius pertranseat,
recta ad axim, centrū verius, obserueturq; quo loco dicti axis umbra in quar-
ta diuisa in aquam merā cadat: quo loco, exactissimē cernerur quantum ra-
dius refractus in aqua declinet ab incidente per aerem quolibet gradu altitudi-
nis ab horizonte, ope vt predictum est speculi.

Signaturi autem lineas horarias in concauitate cylindrica putei, signandq;
nobis erunt in singulas horas singulis zodiaci signis eorūq; dimidijs præti-
e, vt sic in cylindris conuexis, hæc autem ratio huiusmodi cylindri concavi, ni-
hil omnino à priors capitis ratione differet, præterquam additione angulo-
rum refractionis respondentium altitudini solis ad angulus prædictæ altitudi-
nis. Quare habebimus propositum. Porro centrum oris putei ope binorū dia-
metrorum dictorum precedenti capite, umbra sua horas monstrabit, neq; erit
difficile hæc perficere, si quis dicta, in precedenti capite teneat, & quæ de mo-
do cōficiendorum anre cylindrorum conuexorum à plerisq; tradita fuerunt.

De horologijs ex reflexione, Cap. XCIII.



Vilo etiam negotio confici horologiū potest, in quo radius
solis reflexus à speculo, magnitudinis vagulæ hircularis di-
gitū, horas demonstrat. Haftenus enim de radio refracto lo-
quuti sumus. Sit igitur nobis voluntas eiusmodi horol-
i cōficiendi in muro exacte meridionali, Quamobrem præ-
dictum horologiū ē contrariū omnino describetur, & in

situ extremitatis gnomonis, sol intra lineas horarias erit, speculum parallelū
horizonti constituitur perfectūq; res erit.

Quod si murus ad quartam orientalem meridianam vergeret, cōsideretur
quot gradus ipsius quartæ murus intueatur, totidemq; gradibus occidentalis
meridianæ in muro proposito ē contrariū penitus horologium fabricetur: si-
toq; speculo in situ extremitatis gnomonis, & orientalis, habebimus inst-
rū.

Exempli gratia, constitutus gnomonem in muro situm (inferius tamen)
decimum gradum à meridiano remouam, orientem verius intueri iubeo ita-
que fieri horologium in superficie aliqua cuius superficiē gnomonā meri-
diano occidentem verius declinare cogitetur, quod sic descriptū solum horum
erigatur, & illi simile in muro proposito figatur. nam habebimus intentionem.
Idem de ceteris quartis, & sitibus orientalibus, & occidentalibus dico.

De horologio tympani forma.

Cap. XCIII.



Verus verò ad cylindros reuertentimilibi, considerari qua ratio ne cylindrus forma tympani facillime confitri posset, ita vt per foramen, lato solis radio, qui extrinsecus appareat (cylindri materia mediocriter densa constituta) horas demonstret medijs lineis horarum in superficie cylindri signatis.

Quamobrem supponamus superficiem cylindricam extensam in parallelogramo rectangulo. s. x. ita tamen vt proportio latitudinis. g. f. ipsius eã totali longitudine, sit vt 66642. ad 288290. hoc est longitudo cylindri ad eius diametrum, sit tanquam proportio sinus duplicati maxime declinationis ad sinum simplicem complementi eiusdem declinationis maximæ. sit autem dictum parallelogramum lineis apparentibus in 2. intervalla equalia diuisum, vt in figura subscripta cernitur, ceterum dicte diuisiones pro horis communibus subsistent tam predictum tympanum, aut cylindrus, suis basibus circulatibus occludatur: ceterumq; sitam eorundem intra vtrumq; tropicum, in situ axis mundi, ita vt predictus axis per idem gannino cum axi cylindri sit, sed in ipsius cylindri superficie illi parallela, foramine in situ centri mundi collocato, p quod solis radius intraturus est. ducturi aut lineas horarias ita licas penitus, ut motis est in cylindris docemus, arte tamen ab illis diuersa.

Exempli causa, notaturi simus punctum alicuius horæ arcus diurni tropici hyemalis inchoando à 24. In cuius gratiâ describi iubeo circulum. n. r. l. exactæ magnitudinis, & equalis vni basi cylindri, duplicatoq; diametro. n. l. q. sit æqualis. g. l. ducatur circulus. b. g. d. l. qui erit proportionatus. n. r. l. tanquam tropicus basi cylindri ex constitutis, cuius quidem tropici. b. g. d. l. sit arcus diurnus. b. g. d. & b. punctum. 24. horæ, ducatur deinde. b. n. r. à puncto. b. dicte horæ per centrum tropici, vsque ad girm circuli. a. r. l. & à puncto. n. d. d. a. sit. n. o. perpendicularis. n. b. r. equalis tamen sinui maxime declinationis, scilicet. g. m. aut. m. f. quo facto, à puncto. r. altera perpendicularis ducatur. r. a. ipsi. r. n. b. & à puncto. b. per. o. ducta sit linea. b. o. a. vsque ad concursum cum. r. a. quare hęc omnes lineę. b. n. r. n. o. r. a. & b. o. a. in uno circulo horario communi erunt; cylindrus deinde sumendus erit, & in basi inferiore à puncto. m. axis mundi, & centro tropici hyemalis, ducenda m. e. occulta, æqualis n. r. predictę, ex prima quarti Eucli. tanq; à puncto. c. ducenda. c. t. occulta æqualis lineę. r. a. & parallela axi mundi, aut cylindri signandamq; punctum. r. quod punctum erit horę quartę.

Cuius quidem rei speculatio tam est per se manifesta, vt de ea plura dicere superuacaneum existimem, supposito cylindro ex parte contraria

nostro hemisphærio sito, dum sol per hemisphærium nostri zenit voluitur terminatum à circulo horario sextę horę communis matutinę, & vespertinę. Ac verò dum per oppositam partem fertur hoc est per oppositum hemisphæriũ cogitandus est cylindrus cis dictum circulum horarium situs, quare illi foramen aliud primo oppositum necessarium est, ad cuius normam ductę sint lineę horarię matutinę vespertinę: quę duci parte ex ea possint. Quę omnia effectio ipsa, & opus declarabit.

Quod verò de vnus paralleli hora. idem de cæteris dictum volo, vnus autem eiu sicut; horę punctis in diuersis parallelis inuentis, ab vno in alterum ductis lineis, lineę horaria forerabitur, quę portio erit giri oxigoni, elliptici, aut deficientis, vt de puteis dictum est. Eadem ratione cursus diurnus per zodiaci signa, cęteraq; omnia notari possent. In Basibus autem

dicti cylindri horologia polaria designauit septentrio

nale vnum, australe alterum, dum tamen


axis cylindricus per centra ba-

sium, ex vtraq; par-

te

tantundem promi-

neret.



. 94 .


De horologio mirabili atq; exactissimo.

Cap. XCV.



IVS SV ferenis. Ducis Sabaudie, Clementis. Domini mei, Taurini in hypocaufti viridarii fenestra, quae tela abducta erat horologium horarum communium eiusmodi aliquando formari curavi. P ortionem feream circularis circumferentiae per tensem, fieri præcepi, longitudinis æqualis arcui diurno maximè dictanni, hoc Taurinensi

rinensi polo, in qua apponi iustitiam erunt. 1. 2. cum uno semidiametro, in cuius extremo, centro scilicet, apponi mandam ferrum rotundum ad angulos rectos cum semidiametro, perpendiculariter superhæret prædicti circuli, quod quidem ferrum, est instar axis mundi, & ex parte numeri. 1. 2. per prædictam circumferentiam addi numeros horarum vna ex parte antem meridiana, altera post meridianum suis, vt decet locis, per intervalla vigesimarum quartarum partium integri giri. extremum autem inferius dicti axis, qui est instar gnomonis, figi in tabella, ita obliquè, vt angulus inclinationis, æqualis sit angulo acuto ab æli mundi, & meridiana horizontali terminato, quam in dicta tabella signari dixi. Porro prædictam tabellam ad libellam fenestree extrinsecus collocari feci, eam tandem soluens, donec axis verticalis in suo situ effect parallelus æli mundi, quod factu facillimum est, recta signata in tabula linea, que cum æli angulum altitudinis poli terminet in situ meridiano orientalis, atq; ita collocato horologio solem fenestram telicam feriente, vmbraë numerorum horarum certantur vmbraque axis eadem hora, aut horæ parte, quam exactissimè. Eadem ratione cætera horologiorum genera perficientur, reliquaque gnomonica, ductis lineis, aut horarijs, aut alijs ex aliqua materia inuicem iunctis, mediante horizontali, aut meridiana, aut æquinoctiali, aut via hyperbolarum tropicorum. Harum namq; linearum vmbra cum ea que gnomonis, est opus in qualibet superficie præstabit dummodo eiusmodi machina in situ celi debito collocetur, eoq; pulchrior, & nescienti admirabilior effectus proveniet si obiecta superficies, in qua desinent vmbrae, curua, aut vndosa extiterit, & quo fieri potest amplius irregularis, pariterque mobilis.



De nova dispositione horologii circularis.

Cap. XCVI.



Memor horologii in circulari lamina describendi formæ, à me cap. 78. huius libri descriptæ, non tacebo aliud italicum simile, à priori non nihil diuersum. Quamobrem in lamina hæc argentæa, aut metallica, circulus ducatur, mediantibus duobus diametris, in partes quatuor æquales diuisus; quarum vnaqueque gradus. 90. contineat; ita tamen ut singulæ binæ quartæ, in principio, aut fine nomenclationis. 90. gradus concordent, eo loco quo mediantæ aliquo diametro communicant; tum alter circulus priori vicinus ducatur, inter quos duos circulos intervallum graduum diuidatur mediantibus lineolis centræ intuentibus. Tertio postea, & tertius circulus ducatur, à secundo aliquanto amplius distans, diuisus in 18. partes æquales, vnumquodque autem intervallum erit. 5. graduum tantum & alij duo circuli describantur, quorum intervallum numeris horarum signandis inscriuet, quo facto numeretur altitudo meridiana solis, cum fuerit in tropico æstiuo, idque in vna ex quartis, & in eius fine, in quinto giro punctum signetur, per quod atque centrum, girus circuli feratur, cuius centrum sit in semidiametro lato per vicinos gradus duarum quartarum contiguarum, ipseque girus in centro alteri diametro contiguus sit, in quo quidem circulo altitudines meridiane solis ope centræ vniuersalis horologii principiorum Iunij, Maij, Iulij, Aprilis, Augusti, Martij, Septembris, Octobris, signentur. Puncto deinde altitudinis meridiane solis principij Martij signatæ, centro regula immittatur, signeturque, in altera medietate quinti giri punctum per quod atque centrum, feratur alia pars giri circuli, ipsi diametro in centro contigui, cui girus alter contiguus ductus fuit, habeatque centrum in ea diametro, qua prior circulus, in hoc verò giro signabuntur altitudines meridiane solis principij Octobris, Februarij, Novembris, Ianuarij, Decembris, & tropici hyemalis, per hæc autem puncta totidem semicirculi concentrici in centro vniuersali horologii maximo ducuntur, quorum semidiameter ille sit, à quo numeri quartarum inchoantur, is autem contiguus est duobus giris meridianum significantibus, quibus alij duo paralleli notabuntur, ut in intervallis à tribus giris terminatis mensium nomina notari possint, semicirculi autem in diametro, contiguo meridianis, ducti principiorum mensium paralleli vocabuntur, in quibus singularum altitudinum horarum diurnarum puncta signabuntur, principij illius mensis, cuius est parallelus signandus. Quo factò quàm fieri poterit commodius præter eundem horum iungenda erunt lineis non nihil recuruis, quæ eruat horariæ.

At verò quoniam erunt nonnullæ, quæ ex una parte girosum meridiano sum, ex altera in extremo parallelo, terminabuntur, ut 17. 18. & 19. itaq; eiusmodi termini, altitudinibus meridianis eius temporis inveniuntur, cum meridies talibus horis exierit, atque item aliq; quæ cum altero extremorum in semidiametro orientali, & altera circumferentia horologij versus terminabuntur, ut 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, quarum linearum principia, facillimè inueniri poterunt mediis girosum parallelis occultis, à dicto semidiametro terminatis, qui in meridianis cum altitudine meridianæ solis, illis diebus reperitur, tali enim hora sol prædit ex oriente. Horum autem cognituri, breuis stylus à quo filium cum perpendicularo pendeat in centro figatur, ab eodem centro dependente filo, laminamq; uanu tenentes in situ ac inut solis eandem circundus a mas, circa centrum, donec styli umbra, supra diametrum in quo centra binorum arcuum sunt, meridianorum disforum, cadat. Tum intueamur quo loco filium parallelum mensis intersecet, aut eius interuallum, & usque ad lineas horarias in circumferentia laminæ progressi (in qua horæ descri-

ptæ sint) quamprimum seruetur hora. Ex altera ve-

rò laminæ parte quadrans fieri horarum

communium posset ab alijs


scriptus, modo ta-

men

prædicto pro italici horo-

logijs diuis-

lus.



De horali horologiorum rota forma.

Cap. XCVII.



INfiriter propemodum sunt quæ cogitari conficiq; possent horologiorum formæ, quæ licet multæ, ac variè inuestigatæ à me fuerint, difficilibus tamen prætermittis faciles scriptis mandari atq; inter cæteras hæc pro horis communibus diurnis, silentio inuoluenda non erit, tum quod elegantissimum habeat instrumentum, tum quod commodissimum.

Itaq; ex quavis materia, dummodo ne lignea, nec papyracea, nec facile commutabili

E e mutabili


mutabili, rota subscriptæ similis formatur, quantumlibet ampla, in qua. 24. veluti dentes promineant attamen crassa quantum distantia extrema vnus dentis ab altero requirit. Dentes autem sub designatis similes sint, ita vt ipsorum pars plana sit, & recta centrum versus, altera curua atque cylindrica, cuius cylindricæ curuitatis axis sit extrema linea dentes subsequatur, quæ curuitas, diuisa sit medijs quinque punctis, in quo numero, non computetur principium infernum dentis sequentis, hoc enim computato, sex erūt, quæ obrem quinque interualla terminata habebimus, quorum vnumquodque vigesima-quarta pars erit totius giri, primum autem punctum, quod principium est, aut pes inferior dentis sequentis, signetur intra rotam, numero suæ horæ, secundum verò, numero sequentis dentis, ac tertium, numero tertij, quartum, quartum, atque ita deinceps, à quibus punctis, totidem lineæ parallellæ per longitudinem cylindrorum ductæ sint.

Quo perfectò, rota hæc in situ æquatoris colloctur, ita vt linea meridiana. 1. 2. horæ sit indebito situ, apparebuntq; multis in locis horæ, quod spectantibus magnam voluptatem afferet. Is verò & alterū habebit horologiū qui axim mundi ex vtraque parte tantundem prominentē in cætro collocauerit.

Quinque aut vigesima-quartæ partes cuiusq; dentis, sumi poterunt ex paruo

circulo, centro rote proximo, cætæ amplitudinis quantam cuiuslibet dentis in orbem ducti est magnitudo, cuius dentis curuitas, totius circuli pars est, hoc est

vt sensidiameter dicti parui
circuli centro vicini
rectæ lineæ dentis
æqualis
sit.



VM hacufque deratione extruendorum horologiorum solarium, abique eo, quod aliquis à superioribus philo-
tophis rectè dictum in hunc locum translatum fuerit, satis amplè tractarim, mihi rationi consentaneum videtur, antequam ad vltiora conuertamus orationem, aliquem esse patefaciendum modum, quo possimus cognoscere, cum horologium iam depictum esset, an declinatio parte
ri. à meridiano, aut verticali, rectè desumpta fuerit, aut falso, ab eo, qui huiusmodi horologium construxit.

Serenissimus, & clementissimus Dominus meus Dux Sabaudię dā teneretur desiderio optime cognoscendi an paries in tali existat azimuth, qualis ei ascriptus fuerit ab eo qui horologium orientale construxerit, quemadmodum depingendum in Lucenti amenissimā eiusdem Ducis villa ē regione oppositum fenestř eiusdē cubiculi curavi. Quod ut sapientissimus hic Dux assequeretur, optimo sanē consilio deliberavit observare extremum umbrę gnomonis eo tempore, quo sol ab horizonte egrediens tanquam cœli oculus fulgentissimos sui luminis radios ubique spargebat, æque nullis obductus nubibus, serenus admodum esset, & purgatus: sciens autem prudentissimus hic Princeps, a tabulis arcuum semidiurnorum edoctus, qua nam hora in tali præscripta die sol ad orientem perueniat, vidensq; eundem in tali puncto, in sē gnomonis umbram projicere in eo situ linearum horariorum, quemadmodum in tali anni tēpore fieri debebat, horologium restitit, & in sē designatam fuisse cōgnovit, simili modo procedendum est cum horo. occidentali lineis horarum communium medianibus. Idem maximus hic Dux experiri posse in puncto meridiel, cum in linea meridiana notata fuissent puncta intersectionum hyperbolarum cœlestium signorum, aut puncta intersectionum linearum horariorum italicarum (quæ hæc poso sunt. 17. 18. 19.) his diebus, quibus sol in huiusmodi circulis, & huiusmodi hora potest domicilium habere, sicut ex cogitavit in dactylis.

Quod quidem experimentum tatisimum est. Quemadmodum, exempli gratia, si tempore æquinoctij perspicatur umbra gnomonis, terminum significare in meridiana, in puncto horę 18. aut æquatoris (quod idem est) hinc clarior patebit azimuth meridianam, habere pro communi sectione cum partibus lineam signatam pro meridiana, quia punctus dictę horę 18. in ea meridiana repertus, beneficio anguli acuti inter communem sectionem orientis, & meridiani, & aliam sectionem communem meridiani cum æquatore terminati, in quolibet alio azimuth, aut in maiorem altitudinem elevaretur, aut ad inferiorem suam deprimeretur in sic constructa linea, hoc meridiana desumpta. Idem de reliquis punctis in eadem linea existentibus intelligi eundem esse arbitror. Quantum ad præsens æquatoris exemplum attinet, omnibus innotescet, quod existentis angulorum citato, omnium eorum maximo, qui in alio azimuth, præterquam in meridiano fieri possit, & quolibet azimuth diversum angulum intra communem suam sectionem cum duobus circulis, orientis & æquatoris, comprehensum admittente; nemo roquam potest in dubium revocare, quin in huiusmodi constructam punctum, in varijs diversisq; azimuth, non sit futurus diversę distantię à linea orientali mutali.

Et si hoc accidit in æquatore, qui ex unica superficie plana confurgit, imaginatione comprehendamus id omne quod inde emergit sive extra ipsum æquatorum.

aequatorem cuncta suo radiante lumine, ubi linea quæ à mundi centro per primum luum centrum progreditur, motu suo diurno conicam superficiem gignit. Possit etiam validum experimentum esse hoc, quod tempore æstivi solstitij cernamus extremitatem umbræ moueri per extremitates linearum horariorum ab hyperbolæ restiua circumscriptarum, dummodo paries perfectè azimuthalis, idest horis perpendicularis existat. Quod præcauedum ad moneo.


Cap. XCVIII.



DE nocturnis horis, quamuis scitis superq; veteres loquuti fuerint, vt manifestè ex libris recentiorum patet, nihilominus scribere non desinam ea, quantumcumq; sint, quæ à me aliquando speculata fuerunt. Itaque huiusmodi operationem cogitanti mihi, occurrit futurum perelegantissimum instrumentum astrolabium vetus, siquis hac tamen ratione eo utatur. quo simul & noctis hora, & cæli situs respectu duodecim celestium domorum breuius cernatur, quam vtitur astrolabi vñs doceat. Igitur in lamina rotunda, tabula astrolabia loci conficiatur, ipsorum alnicantarar, azimuth, circularumq; celestium domorum, in qua tertium marginis super sit quantum sufficiat horis communibus. 24. ex vtraque parte. 12. signandis, atque gradibus. 360. quindecim in singulas partes, quæ ita aptata sit, vt capulum quipponi tolliq; possit habeat. erit enim commodior, postmodum in altera rotunda lamina, formetur rete magnitudini prioris lamine, aut tabulæ respondens, circa quod partiamur. 12. menses anni, mediantibus signis in zodiaco signatis, ex quo promineat ex eadem materia pars, vt in subcripta figura. a. b. c. dum tamen linea a. b. recta centro occurrat, & diei. 18. Februarii, quæ. 23. Augusti respondet, ipsaq; rete tabulæ iuncto, cum horam cognoscere voluerimus, capulum quilibet manu tenebimus, hocq; instrumento quo fieri melius poterit, parallello equatori sito, facie & parte designata ad septentrionem vergeate, (linea meridiana suo loco posita) circumductoq; indice. a. b. atq; ita sito, vt in restitudine. a. b. vñs maioris Dubæ, & Alrukaba stella polaris videatur, renobatoq; instrumento, hora ex opposito diei mensis cernetur, & zodiacus cum stellis fixis ipsius rete verissime situs: nadir autem solis quantum sub horizonte sit demonstrabit.

Hanc verò speculationem facillimam mediocriter introductis contemplandam relinquo, neq; tamen erit ab re (ne quid in dicto instrumento vacuè remaneat)

remanent) tabulæ huius dorsum antiquorum more signare, quod si signatis gradibus altitudinis, & motus solis (quamvis superfusæ per menses anni, cum in rete iam factum fuerit.) in spacio circulari dimidij dorsû, horologium diurnum, modo cap. 96. tradito designaretur, & in semicirculo inferio re marginis accommodata essent puncta scab; altimetæ (quod esset melius quam quadratis eam perficere) & ita vt perpendicularo à centro pendente, eo vti possemus, loco alidade instrumentum ipsam volueretur.



De horolo, lunari.

Cap. XCIX.




A vero si peculiari instrumento horis nocturnis cognoscendis accommodato, aliquis destitutus esset, haberetq; horologium solare, lucente luna, & umbras conficiente, is in horologio solari, mediante lumine lune, quæ horarum gnomon demonstrat inuenatur, eiusmodi autem horarum in præmo ordine horarum transfusæ salubriter tabulæ inueniat, diemq; longè in margine ex sinistra parte, quare in angulo communi horarum verarum proximè reperiet.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 ^o)	8	9	10	11	12	1	2	3	4
6 ^o)	9	10	11	12	1	2	3	4	5
7 ^o)	10	11	12	1	2	3	4	5	6
8 ^o)	11	12	1	2	3	4	5	6	7
9 ^o)	12	1	2	3	4	5	6	7	8
10 ^o)	1 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	
11 ^o)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 ^o)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 ^o)	2 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$
14 ^o)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 ^o)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 ^o)	5	6	7	8	9	10	11	12	1
17 ^o)	6	7	8	9	10	11	12	1	2
18 ^o)	6 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$
19 ^o)	7	8	9	10	11	12	1	2	3
20 ^o)	8	9	10	11	12	1	2	3	4
21 ^o)	9	10	11	12	1	2	3	4	5
22 ^o)	10	11	12	1	2	3	4	5	6
23 ^o)	11	12	1	2	3	4	5	6	7
24 ^o)	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$
25 ^o)	1	2	3	4	5	6	7	8	9

De errore Mufleri circa gnomonum umbras.

Cap. C.



Eque etiam ab re erit (cum de umbris gnomonum nostra sit tractatio) veritatis amicos admonere, quod à Muftero scriptum fuit, non omnino verum esse, accretionem scilicet, & detretionem rectarum, aut versarum gnomonis umbrarum meridianarum, nullo loco inuicem proportionari, ut umbrę meridianę rectę, aut versę proportio, cum sol verbigratia est in principio Cancrī, umbrę meridianę sole in principio Leonis, æquali nullo loco sit proportioni umbrę meridianę sole existente in principio Sagitarij umbrę meridianę cum sole in principio Capricorni. Hoc inquam verum non est, etenim ex scientię legibus demonstrabo predictas umbras sub polo. 45. minu. 0. esse quam proportionatissimas.

Sit itaque gnomon. q. b. plano horizontali. q. p. polo. 45. minu. 0. perpendicularis, cuius recta umbra meridianā, sole existente in æquatore sit. q. g. quę gnomoni. q. b. æqualis erit ex 3 2. & 6. primi Euclī. recta autem umbra meridianā, sole in principio Capricorni, sit. q. p. umbra versę. q. f. dum est in principio Cancrī, umbra. q. a. dum in principio Leonis, umbra. q. e. dum in principio Sagitarij, uel. q. a. dum in principio Virginis, & q. a. dum in principio Scorpionis, aut quibilibet alijs punctis ab æquatore equaliter remotis. Docebo enim eandem proportionem esse. q. p. ad q. e. quę est. q. a. ad q. f. Itaq; à puncto. h. totidem rectę lineę ducantur ad puncta. p. e. g. a. f. quare ex supposito habebimus angulos. g. b. e. in primis, & g. b. a. æquales inuicem, & ita angulos. g. b. p. & g. b. f. inuicem pariter æquales, quando quidem. b. c. centrū mundi esse constituitur. Quo factō, cōgitatione duco lineam. g. d. parallelam. b. p. habiturus angulum. d. g. b. æqualem angulo. g. b. p. ex 10. primi, quare angulus. d. g. b. æqualis erit angulo. g. b. f. at cum anguli (ut dictum est) q. g. b. & q. b. g. inter se æquales sint, illis deductis ex ijs, remanebunt ex communi conceptione. anguli. q. g. d. & q. b. f. inter se æquales, & ex 3 2. primi, anguli. q. d. g. & q. f. b. inter se quoque æquales erunt, & quoniam ut supra dictum fuit. q. g. æqualis est. q. b. itaque ex 26. primi consequetur. d. g. æqualem futuram. b. f. quare eadem erit proportio. b. p. ad b. f. quę est ad d. g. sed ut se habet. h. p. ad d. g. ita se habet. q. p. ad q. g. ex 4. sexti, & ita se habet. p. g. ad g. f. ut b. p. ad b. f. ex 3. sexti, quare. p. g. ita se habebit ad g. f. ut p. q. ad q. g. & ex euidem rationibus, ita se habebit. e. g. ad g. a. ut e. q. ad. g. q. Scimus nunc habere quinque quantitates. q. p. q. e. q. g. q. a. q. d. quas scorsim notabimus modo infra designato. See

antequam

antequam de distinctis quantitatibus sermonem faciamus, in copulatis prius animadvertendum est ex 19. quinti Eucli. q. g. mediam proportionalem esse inter q. p. & q. f. & ita inter q. e. & q. a. cum ita se habeat totum ad totum, ut pars ad partem, tñ ad distinctas devenientes, mediante 23. quinti, eisdem esse proportionem cognoscemus. q. p. ad q. a. quæ est q. e. ad q. f. quare vicissim ita se habebit. q. p. ad q. e. ut q. a. ad q. f. & e converso, quod erat propositum.

Hæc demonstratio in umbris versis uti poterimus, quibus nullum erit di-
serimen. Eiusmodi namque elevationi poli, ut umbra recta meridiana, ita
versa (æquinoctij temporibus) æqualis est suo gnomoni, ex prænotatis pro-

positionibus. Cuiuslibet autem aliæ elevationi, aliòq; anni tem-

pore, unus idemq; gnomon semper medius propor-

tionalis est, inter binas umbras, singulis

horis dici, quod vel medio-

critèr docto con-

tem-

plari li-

cet.

rini in ædibus Magnifici Domini Dominici Pipini generis mei . Nam
sub horologio maritimo: in ædium turri hoc hgnificichiam conferibit
mandati

Tempora sic fugiant pariter

Et in vespertino supra murum viridarij earundem ædium, alteram hgnificichij
partem hanc

Pariterq; sequantur. Ex Metamorphosi, Ouidij, desumpta

Pleraq; sunt huiusmodi alia, quæ ex varijs poetis excipienda non parum orna-
tus afferent, a scripta horologijs, quorum hic ego nonnulla leuaturus arti-
fices labore addam.

Et noua sunt semper nam quod fuit aste relictum est.

Forsq; quod haud fuerat

Momenta; cuncta nouantur.

Tempora labuntur

Tacitisq; senescimus annis.

Pt fugiant freno non remorante dies, ex Fastis.

Et fugit interea

Fugit irreparabile tempus. Ex georgia.

Stat sua cuiq; dies

Erræ, & irreparabile tempus. ab AENEIDA. sine

Labitur occultè

Palliq; volubilis ætas.

Cuncta fluunt, omnisq; vagans formatur imago

Ipsa quoque a se ideo labuntur tempora læta.

Eunt anni more fluentis aquæ

Nec que præterijt horæ redire potest.

Vitendum est etate

Cito pede labitur ætas.

Labitur occultè palliq; volubilis ætas. Vt supra deinde.

Et celer amissis labitur annus equis.

Vel ut ambiguus mobilis alis hora.

Senescimus effugit hora.

Nec reuocare potes qui perire dies.

Tempore dispensat vitus, & tempora cælus

Hæc homines, pecudes, hæc moderantur aues.

Tempus edax rerum, cuiq; inuidiosa ætastas

Omnia de stricis, vitasq; dentibus æni.

Præ: tim lena consumitis omnia morte.

Lentæ sunt tempore curæ.

Tabida confundit ferrum, lapidesq; vetustas :
 Nullaq; res maius tempore robur habet. aut
 Cuncta trahit secum vertitq; volubile tempus
 Quid non longa dies?
 Quid non confunditis anni?
 Longa dies homini docuit parere Leones
 Longa dies molli saxa peredit aqua. vel
 Quid non longa valebit permutare dies. aut
 Vixit memor lethi, fugit hora, hoc quo d liquor inde est. siue
 Gaudia non remanent, sed fugitiua volant. aut
 Non est (crede mihi) sapientis dicere viuum
 Serenissimam vitam, crastina, vixit hodie. siue
 Fortunę arbitrijs tempus dispensat vbique. vel
 Longius aut propius mors sua quęmq; manet. siue
 Serius aut citius sedem properamus ad vnam. aut
 Et pace, & bello, cunctis stat terminus vni
 Extremumq; diem primus tollit. aut
 Nil equidem durare diu sub imagine eadem
 Semper in assiduo motu res quęq; geruntur. aut
 Seris venit vsus ab anhis. aut
 Si numeres anno soles, & nubila toto
 Iuuenies nitidum sepius esse diem. siue
 Nascens moritur
 Finisq; ab origine pendet, vel
 Vrget diem nox
 Et dies noctem. siue
 Nemo tam diuos habuit fauentes
 Crastinum vt possit sibi polliceri
 In Pariete verò ubi aliquod gnomonicum celeste depictum fuerit quemad-
 modum signa zodiaci seu domus nostri hęmisphęrij, uel almicanarat ad
 sciendum altitudinem solis ab oriente in quolibet horę momento, siue
 ipsi aximur, aut aliquo d gnomonicum cap. 75. uel 76. Tunc posset aliquis
 ibi aliquem ex his uersibus poni,
 Hęc super imposuit liquidum, & grauitate carentem
 Aethera, nec quicquam terrę scis habentem. vel
 Astra tenent celeste solum somnq; deorum. seu
 Hac iter est superis admagni tecta tonantis.
 Regalemq; domum: dextra leuamq; Deorum.
 Hic locus est, quem si uerbis audacia detur

Haud tamen magni dixisse palatia caeli. *finis*
 Non est ad astra molis è terris uia. *uel*
 Haec summa uirtus, petitur hac corlam uia. *scilicet*
 Et uirtus locum habet inter astra. *scilicet*
 Fata regunt homines. *aut*
 Quicquid patimur mortale genus
 Quicquid facimus uenit ex alto. *uel*
 Regitur fati mortale genus. *aut*
 Fata regunt orbem, certa stant omnia lege
 Longa q; per certos signantur tempora curfus. *sive*
 Re petunt proprios quaque recurfus
 Redituq; suo singula gaudent. *uel*
 Nec manet vlli traditus ordo
 Nisi quod fini iunxerit ortum

NOVI INSTRUMENTI CONOIDALIS,

Ad praxim Sciothericam maximè necessarij
Descriptio & vltus.

EODEM IO. BAPTISTA BENEDICTO

Authore, & Inuatore.



ARTIS cuiusq; præcepta cognoscere propè inutile foret & supernacuum, nisi ad ipsas operationes aliquando deueniretur veruntamen cum operari sine instrumentis nemo possit, sæpe contingit, vt vel nihil profus, vel imperfectus aliquid in medium producant artifices instrumentorum inopia: aut summa cum difficultate, & ingenti iactura temporis id alijs medijs vsu præsertim, quòd confestim & facillimè si accommo datum haberent præ manibus instrumentum præstitissent. Hinc non minori laude dignos semper existimaui instrumentorum inuectores quam artium ipsarum constitutores, quando quidem per hoc quid fieri possit intelligimus, per illos factum videmus, quod mente concepimus. Atq; ideo cum ad Sciothericam disciplinam mentem aduertimus, & in ea nihil esse magis necessarium cognouerim ad alicuius operis perfectionem quàm vt multiplices conicæ scctiones describantur, quales sunt quas hyperbolicas, parabolicas, aut alijs nominibus vocant, nec tamen illas sine maximo incommodo, & varijs medijs designari posse probauerim. Hoc instrumentum excogitavi cuius typum subieci, quo vel dicto citius quisq; quolibet conicam figuram cuiusque proportionis describere valeat. Eius autem eius instrumenti fabricandi ratio huiusmodi.

Statuetur primum basis instrumenti conicæ (vel etiam circularis) figuræ, ex qualibet materia metallica, antèrius vacua, cum axe suo maiori in tantam longitudinem extenso, quantum girus ipsius basis complectitur, vt in subscrita figura appareat, in cuius axis medio in formam cardinis coniunctum sit manubrium, quod versus basim ad libitum, auxilio quartæ circularis assivæ in quodæto extremo ipsius axis deprimi possit, & à basi sursum versus, utolli, & cum quadam vite seu elica clavi ad firmandum manubrium in eo situ qui necessarius erit. Quarta autem circularis in 90. gradus dividetur, ab uno incipiendo, & habeat hoc manubrium per anum, quod in aliud quoddam manubrium

ingre-

ingrediaturs, ita vt circum pernum uolui positum cuius rimula uolo à summo in imum & e contra posse moueri, atollendum, & deprimendum medium quendam circulum cum sua clauis elica retro posita, pro eo sustinendo in quolibet situ, in cuius centro, & cum clauis coniuncto uolo vt confirmatur diame- ter mobilis in formam dioptræ, aut alidæ, cum duabus pinulis magnorum foraminum, per quos uirga seu baculus ex auriscalco factus, rectus, rotundus, ab altera parte acutus, & quanto magis uoluerimus, transeat.

Est animaduertendum tamen oportere unam ex brachijs dioptræ paulo lon- gius esse debere, & baculum in foraminibus pinularum refringi non debere, ut possit liberè excurrere, motus à proprio suo pendens & medium circulum dimidi in duas quartas quartæ quælibet graduum nonaginta, incipiendo à me- dietate id est à manubrio. Vnde instrumentum nostrum ad finem reductum erit, quantum materia ferre poterit, conius manubrium compositum, ex eo quod est in imo & ex bipartito axem conii significabit, qui auxilio quartæ cir- cularis, poterit ad libitum uersus orientem deprimi, baculus uero loco lateris conii ponetur, qui cum manubrio angulum constituet, quem ope graduum medijs circuli desiderabimus, excursus uero medijs circuli in sumum & in imum per manubrium, nobis insinuet ad terminandam longitudinem axis conii, prout rei necessitas postulat. Circumoluendo postea manubrium uolu- bile, dummodo stilus horizontali plano semper contiguus existat, huiusmodi circumuolutione mediante, & pondere illi, sectio conica gignetur.

Huius uero instrumenti nostra opera in lucem emerit usus admodum uti- lis erit nostræ sciothericæ, tam ad descriptionem itineris diurnarum umbrarum à gnomonibus profidentium super quoduis planum, quantum ad hyperboles ipsorum almicantaræ, & elipticæ ob ea loca in quibus hæc progignuntur, quemadmodum si exempli gratia uellemus hyperbolem cæcæ describere in plano horizontali, inclinarem primò huius nostri instrumeti manubrium, intercedente quarta circulari coniuncta basi ad tot gradus ad quot extolli- tur ab eius loci horizonte polus, quod manubrium firmatum cum fuerit (ne huc illuc ue oberret) clauis elica mediante, e collo caremus dioptra beneficio graduum vnus ex quartis cuiuslibet medijs circuli in tanta distantia à manu- brio, quanto distat cæcæ initium à polo septentrionali id est per gradus sexa- ginta sex cum dimidio: attolleremus deinde, vel deprimeremus medijs circuli centrum per tantam distantiam ab imo basis extremo, quantum mundi axis inter centrum & planum horologi (dato quod totam manubrij longitudine ea par sit) obtinebit. Firmarem deinde dioptra simul cum medio circulo in sic composito situ, mediante centri elica clauis à parte posteriori posita. Huius deinde instrumenti basi posita super planum, ubi describendæ est hyperbo- les, & circumoluendo superius manubrium circa suam pernum, dummodo
acumen

acumen filii contiguum sit perpetuo ipsius horologii plano (quod acumen laudo ex ijs conficiatur lapidibus nigris, uel fulco colore præditis, quibus uti sole mus uniuersi in signando) propositam rem assequemur. Innumeras penè easq; minutas circulantias hic omitto, quæ ad hoc negotium spectant, quia praxis ipsa rerum magistra, easmet sub omnium oculis proponet.

Sed ut propositorum axium, aut præscriptæ proportionis axium huius nostri instrumenti beneficio Ellipsim describamus, alio diuersoq; modo nos gerere debemus. Quamobrem ex conditiones quas mox subiiciam, confidende erunt.

Alla quoque instrumenta ad eandem perficienda inueni quorum

unum, ex 45. tertij Pergei, reliqua uerò, ex alijs theo-

rematibus ipsius Pergei speculatus sum


nihilominus tamen, omnium

præstantissimum

præ-

sentis existima-

ui.



Gg

Cap.



I nobis propositus fuerit conus rectus. a. b. g. qui à plano per axem. a. o. sectus sit, habebimus triangulum. z. b. g. æquicrurum, ex 3. primi Apollonij Pergæi,



VM prædictus conus, sectus fuerit à plano basi parallelo, sectio erit circularis ex 4. dicti.




VM verò prædictus conus, sectus fuerit à plano, cuius communis sectio, cum triangulo. d. a. e. faciat angulum. a. e. d. qui in ætuo angulo. d. a. e. minor sit duobus rectis, tunc. d. e. producta incidet cum a. g. in puncto. d. sectio verò conica erit illa, quæ ab antiquis vocabatur defectio ex. 9. & 13. Pergæi.



VM autem basi. d. e. intellecta seu imaginatione comprehensa fuerit. f. h. æquidistans, & per ipsam. f. h. planum æquidistans plano. e. l. g. i. quod sit. f. l. h. u. Tunc hanc secundam de sectionalem dico similem esse priori, quod ita demonstrabo, A puncto. e. imaginatione producta sit. e. z. ad rectos l. v. z. e. d. que quidem à Pergæo dicitur recta, ad quam possunt ductæ ad. e. d. ordinatæ, ductæq; sit. i. r. ad rectos lineæ. f. h. quemadmodum. e. z. unde ex 14. dicti, eadem proportio erit. f. h. ad. f. r. que. d. e. ad. g. t. cogitemus postea. e. d. maiorem diametrum prioris, cuius sit esse per æqualia in puncto. m. item. f. h. in puncto. i. consideremus etiam per punctum. m. transit. l. m. k. ad rectos cum. e. d. item. f. i. u. cum. f. h. per. i. unde ex 15. dicti, cognoscemus. l. k. mediam esse proportionalem inter. e. d. & e. t. Idem dico de. n. l. inter. f. h. & f. r. quæ propter eadem proportionem. i. t. e. d. maximi diametri ad. l. k. minimi, vt f. h. ad. i. u. secundæ sectionis. Nunc si duo maximi diametri. e. d. & f. h. secti fuerint in plures partes similes, & per puncta

puncta diuisionum ductæ faciunt tot parallela minimis diametris, Tunc omnes æquidistantes prioris sectionis, proportionales erunt omnibus secundæ sectionis, vnaqueque vnicaque sui relatæ quod ex 21. dicti facillè colligere est, quare similes inter se erunt due prædictæ sectiones.




Gg 3

Cp.



I duo conī recti quorum unus acutior reliquo sit, ab eodem plano obliquè secti fuerint, ita ut ipsorum axes eandem habeant ipsi plano inclinationem (minime ad rectos) Tunc dico ipsorum sectiones dissimiles inter se esse.

Sunt, uerbi causā, duo conī. a. b. g. & a. n. k. circa unum & eundem axem, sectiones uerò ab uno & eodem plano sicut. e. l. d. & f. h. quas dico esse dissimiles inter se. Cogite nunc. a. c. parallellam esse lineę. d. e. in plano triangulari per axem transcurrente, ut Pergaeus ipse supponit propositione. 13. primi. e. t. autem sic recta maioris sectionis. f. i. uerò minoris, nunc ex tertiadecima dicta, proportio. d. e. ad e. t. erit ut quadrati. a. c. ad id quod sit ex. b. c. in e. g. proportio uerò lineę. h. f. ad lineam. f. i. ut quadrati. a. c. ad id quod sit ex. n. c. in e. k. sed proportio quadrati. a. c. ad id quod sit ex. b. c. in e. g. maior est proportione ipsius quadrati. a. c. ad id quod sit ex. n. e. in e. k. cum id quod sit ex. b. c. in e. g. minus sit eo, quod sit ex. n. c. in e. k. quod quidem manifestè demonstrabitur, cum ex 6. secundi Eucl. quadratus. o. c. equalis sit aggregato ex quadrato. o. g. & ex eo quod sit ex. b. c. in e. g. sed idem quadratus. o. c. equalis est etiam quadrato. g. o. simul cum eo quod sit ex. n. c. in e. k. ex eadem, quapropter quadratus. o. g. sumptus cum eo quod sit ex. b. c. in e. g. equalis est aggregato ex quadrato. o. k. cum eo quod sit ex. n. e. in e. k. sed cum quadratus. o. g. maior sit quadrato. o. k. sequitur productum. b. c. in e. g. minorem esse productum. n. c. in e. k. ex communis scientia, unde proportio. e. l. ad e. t. maior erit proportione. h. f. ad f. i. quod idem dico de maioris, & minoris diametris, siue de axibus sectionum, ita ab antiquis uocatis (quod ex resolutionibus sectionum & sectionum circa ipsas, producebantur ipsi reides oblongi & prolati) dissimiles igitur erunt sectiones.






ED si idem conus sectus fuisset à duobus planis adinvicem declinantibus, sectiones dissimiles essent inter se.

Sint duæ sectiones quemadmodum in subscrita figura videre est, sic quæ a.k. æquidistans axi . f.h. secundæ sectionis, unde productum b.k. in k.g. minus erit producto b.c. in c.g. quapropter proportio, f/h. ad. f. r. maior erit proportione . e. d. ad. e. t. ita quoque se habebunt

inter se medietates huiusmodi proportionum, hoc est axium maiorum ad minores, quare dissimiles erunt ipsæ sectiones inter se.



Cap. VII.



I data nobis fuerit proportio axis maioris ad minorem alicuius defectionis conii cogniti, & voluerimus inuenire angulum acutum comprehensum ab axe maiore ipsius defectionis & axe ipsius conii, hac methodo procedendum erit.

Data nobis sit proportio. A. ad B. axis maioris ipsius defectionis ad minorem. Inueniatur primo. D. tertia in continua proportionalitate, quae quidem. D. inferuiet nobis pro recta, ab antiquis ita vocata, hoc est pro. e. t. praecedentis figurae, supposita cum fuerit. e. d. aequalis. A. & axis minor aequalis. B. defectionis. e. Ld. Proportio igitur. A. ad D. hoc est quadrati. a. c. ad id quod fit ex. b. c. in e. g. nobis cognita est, a. c. verò adhuc non est manifesta, nec. b. c. sed. b. g. a. o. & a. g. tantummodo ex hypothesi, sed quadratus. a. c. aequatur duobus quadratis, hoc est a. o. & o. c. ex penultima primi Euclii. quadratus uerò. o. c. aequatur quadrato. o. g. cum eo quod fit ex. o. c. in e. g. ex. b. c. secundi eiusdem quapropter quadratus. a. c. aequalis erit quadrato. a. o. cum quadrato. o. g. & cum eo quod fit ex. b. c. in e. g. Sed quadratus. a. g. aequatur quadrato. a. o. cum quadrato. o. g. unde quadratus. a. c. aequabitur quadrato. a. g. cum eo quod fit ex. b. c. in e. g. sed ex ijs omnibus, cognoscitur tantummodo quadratus. a. g. (cum linea. a. g. sit latus conii cogniti) & proportio quadrati. a. c. ad id quod fit ex. b. c. in e. g.

Cogitemus nunc quantitatem. m. n. esse quadratum lineae. a. c. & n. i. (eius pars) esse quadratum lineae. a. g. unde. m. i. aequabitur producto ex. b. c. in e. g. Nunc in hac. m. n. habebimus. n. i. cognita simul cum proportione. m. n. ad m. i. Cum autem nobis cognita sit proportio. m. n. ad. m. i. illico cognoscetur proportio. m. i. ad. i. n. ut cuiuslibet in diathesi uersato manifestè patebit, item cognita nobis erit proportio. n. i. ad. n. m. & cum cognita nobis sit quantitas. n. i. cognita etiam nobis erit. n. m. & m. i. cognitus ergo nobis erit quadratus. a. c. & ita. a. c. eius latus, productum quoque. b. c. in e. g. cognitum nobis eueniet. Nunc uerò duobus modis possumus in cognitionem uenire lineae. b. c. uel. o. c. uel. c. g. quorum primus erit mediante subtractione quadrati. a. o. cogniti (ex supposito) à quadrato. a. c. ubi nobis remanebit quadratum. o. c. cognitum, & sic eius latus. o. c. cognitum erit, à quo si dempta fuerit. o. g. cognita ut dimidia ipsius. b. g. remanebit. g. c. & per consequens tota. b. c. nobis manifesta erit.


Alter

Alter uerò modus est subducendo quadratum. a. g. à quadrato. a. c. ubi remanebit productum. b. c. in e. g. cognitum, quod quidem simul sumptum cum quadrato. o. g. cognito, manifestabit nobis quadratum. o. c. & o. c. eius latus.

Nunc uerò cum cognitus nobis sit triangulus. a. o. c. cognitus nobis erit angulus. o. a. c. angulo quaesito equalis, ex 27. primi uel i. quod erit propositum.

Fiat nunc tabula omnium angulorum acutorum declinationis correspondentium proportionibus axium.

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...
 5. Die ...



Cap. VIII.



ED si quis nobis daret axium proportionem simul cum angulo acuto ab axe maiori, & cono axe circumscripto, volerimusq; conum inuenire, hoc est, inuenire proportionem axis ipsius cono ad diametrum basis, siue anguli verticalis ipsius cono.

Consideremus figuram. 6. capitis, vbi proportio quadrati. a. et ad id quod fit ex. b. c. in e. g. nobis cognita erit, & proportio. a. c. ad. a. o. & a. c. ad. o. c. similiter nobis cognita, eo quod angulus. o. a. c. datus est, & angulus. a. o. c. rectus, vnde angulus. a. c. o. notus remanet, accipiamur nunc a. o. cuiusvis cognite longitudinis, hæc nobis occasio offeret cognoscendi longitudinem. a. c. o. c. eorumq; quadrata, quapropter cognoscemus proportionem quadrati. o. c. ad id quod fit ex. b. c. in e. g. & consequenter cognoscemus id quod fit ex. b. c. in e. g. quod quidem productum, demptum à quadrato. o. c. relinquet nobis conum quadratum. o. g. & ita o. g. linea cognoscetur, vnde. b. g. nobis cognita remanet, & angulus. b. a. g. quod erat questum.

Fiat similiter tabula angulorum verticalium conorum correspondentium proportionibus axium, vnius & eiusdem declinationis axis maioris sectionis cum axe cono.

Cap. IX.



VNC si quis daret, non tantummodo proportionem axium, sed ipsamet axes sectionis, & scire volerit, quo in loco, talis sectio, conum propositum secabit.

Sint axes propositi. A. & B. primo inuenietur (proportione axium mediante) angulum acutum ab axe maiori, & à cono terminatum ex facto capite, qui quidem in figura hic subscripta sit sectio. e. l. d. casu inuenta, cuius maior axis. e. d. fecerit axem. a. o. ipsius cono in puncto. c. faciaturq; angulum. a. c. e. At. e. d. fortasse non æquabitur axi maiori proposito. (A scilicet) quapropter ita incedendum erit, secemus seu producemus. a. d. & a. e. in puncto. o. h. & f. ita ut proportio. a. h. & a. f. ad A. sit vt. a. d. & a. e. ad. e. d. quo facto ducemus. f. h. quæ quidem æqualiserit, A. tunc si sectio procreata fuerit, axis minor, æquabitur B. ex rationibus quarto capite adductis.

Sed si aliamethodo volerimus idem perficere secabimus vel produce-


Cap. X.



Reposita quavis figura originis cum cono, possumus illico scire quo in puncto axis coni, secabit axis maior ipsius figure, ipsam coni axem.

Hoc problema et precedenti capite fuit, quare ut corollarium potius cap. precedentis possumus ipsam intelligere, quam separatim facere, et quoddam inuento situ axis maioris figure in cono dato, illico dabitur situs puncti. n. in axi dicto, inter. f. & h.

Cap. XI.



Et hoc modo, inuenta. D. tertia continua proportionalis (vt in 6. cap. diximus) supponatur hęc in subscripta figura esse. h. a. axē maiorē ipsius sectionis deflectionalis sine originis, in quo, sit exempli gratia, punctus. x. ita quod d. a. x æquetur. D. sexti capitis, descripta postea supra. b. a. portio (circuli) b. d. z. a. comprehendens angulum æqualem angulo verticis coni propositi (qui quidem in precedentibus erat. b. a. g.) ex 3. a. tertij

Euclidi. & diuiso arcu in puncto. d. per æqualia, protractaq; .d. a. & d. b. necnon x. o. æquidistanti. d. b. & à puncto. o. (communis. d. a. & x. o.) ducta. o. z. æquidistanti. b. a. ductis postea à puncto. z. communi (arcti. d. z. a. & o. z.)

duabus. z. a. & z. b. diuisoq; angulo. a. z. b. per æqualia.

z. u. mediante, habebimus intentionem ex

priori parte. 5. 4. primi Pergg.

à Memo traducti.

Hęc

etiam via vtilissima est ad soluta-

tionem. 7. & 9. cap. ac

exquisitor.

