





痔漏

痔之五種性痔腸痔血痔牝痔痔是也究其所因皆是素蘊熱毒

過食燒炙新酒久坐血脈不流或因七情之氣鬱射結于臟腑之間

其毒不歸消散發而為痔或藏於肛門之內或突出於外大者如蓮

花雞冠核桃之狀小者如牛疥雞心鼠尾櫻桃之類各其更其其尖

皆由臟毒所致致蘊毒深者其狀大蘊毒小者其形小或流膿水或

出鮮血行坐之間痛者殊為之苦久而不治血氣衰弱必成痔漏今

之治去多用刀線割別其痔雖有藥可以封固然其毒在內先由而

去必有再作之患否則成漏轉而為難治之証諸方多有服食敷貼

之藥令人用之少見有功效發其理其病既有形於外非服藥之能

愈必須用去毒消痔之藥點之俟其毒盡痔消方可為愈功不可用

此兩相等毒藥心致人奄忽慎之慎之又無痔者肛門左右別有一

竅流出膿液名為漏治之須用溫暖之藥補其內又以生肌肉之

藥敷於外其敷在皮膚者易愈膿附有損而生者未易治也

和脉方 方載諸血門治五種痔瘡遠近年日皆治之



槐白皮

揀實各五兩

赤小豆二合

挑七六十枚

當歸三兩

甘草

白芷各二兩

右爰咀以前煎成膏一斤微火煎至黃色藥可成膏以貼瘡

御藥院方治腸癰下血痔漏結核疼痛

茴香炒

搗糜子一个重七斤者酒炙和皮用

皂角刺燒存性

枯白九

枳殼去白炒

檉皮焙乾各半兩

白附子炮

乳香二斤半

蝟皮燒存性且平

右為末調糊糊同如梧桐子每服一匙大每服半圓空心溫酒下

瘡痛調研至圓塗患處

三因方治五種痔小問內外並宜服之

鱉魚甲治狂痔

蝟皮此痔

蜂房膠痔

蛇蛻氣痔

請左足懸喘甲治腸痔各等分

右燒存性隨證倍用

一分為末并花水調二水空心服時服

本事方

枳壳不拘多少

右為末每服二升水一大碗沙糖內煎白沸先以薑熟而後洗之

豬左懸痔

黃牛角腮

蝟皮不用上燒灰存性

付羊去芦

貫眾

槐角子炒

蟹甲醋煮火

枳壳去白生用

雞冠花

槐花炒

黃耆去芦

雷丸

黃連去頭

赤白芷

當歸去芦酒浸

油髮灰

玄參各半兩

射香另研半斤

右為末米糊丸如梧桐子大每服一百七空心米飲湯送下年高

并虛弱者不宜服

濟生方數等有效用過牛一技射香少許用小研合子成

先以方治臟腑一切瘡毒每發為痔瘡不問遠年近日

雖氣運花被挑牛乳或內或外並皆治之此方燕傳之瘡科劉振

果不試皆驗不取自秘



膏麥灰半十許  
荆柴  
老杉枝。

山白竹

煎柴

右以上四般柴竹截作二尺許長以斧劈破成片各取一束懸乾於火上燒過置罍內為灰防為風防化似燒灰却以水於罍內煮用炭汁又用酒蒲以布帛實其罍置罍於酒漏內以所煮四般炭汁淋之然後取汁於罍內慢熬汁約取一小碗候冷入石灰固則調和成膏以瓦瓶貯之上用石灰傳之面上不令去氣臨用時却去石灰以冷水調開冷病者以水洗七淨痔瘡仰臥捲起一尺先以濕紙於瘡四圍貼護却用竹篾挑藥塗痔上須臾痛息用紙指去藥再塗如此三四遍要痔瘡如墨綠黑方上以水洗淨每日常制冷水一盆以蒸陽和之日洗三五遍六七日後膿血出

黑丸

危氏方專治久年痔漏下血用之累驗

乾姜

百草霜

木饅頭

烏梅

賊液

柏葉

油髮各五寸

七

以上五味各燒灰存性却入後藥

桂心三錢

白芷五錢各不見火

右九味為末醋糊丸如梧桐子空心米飲下三十丸

右為夫起糊丸如梧桐子每服五十九空心米飲下

黃連

枳殼各等分

宜明論方治濕熱內甚因而飽食腸癖為諸痔久而成膿

木香

黃檗各三錢

枳殼去穢炒

厚朴各半兩

黃連一兩

蜆皮一箇燒灰

當歸四錢

荆芥穗三錢

右為末麪糊為丸始桐子大每服二三十丸溫水下食前日三服

黃芩各四兩半

生地黃焙

黃赤小豆花各四兩

赤芍藥

黃芩

當歸各七錢半

蜆皮一箇



填御

白蔘煎

皂角子仁炒各半兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九至三十九煎桑白皮湯下食前槐子煎湯下亦得

補黃一兩

血竭半兩

右為細末每用少許貼患處

釣腸疔 和刺方治久新諸痔上邊腫痛或生瘡痔時有膿血又治腸風下血反肛門脫出血服

枯樓二枚燒存性

蠟皮二箇燒存性燒內燒

胡椒仁取仁十五兩

不去油罐內燒存性

白朮微炒二兩

雞冠花微炒五兩

綠丸枯

白附子主用

天南星生用

枳殼去穢炒

附子去皮將生用

訶子煨去皮各二兩半姜二兩

黃連散 宣明方治腸風下血疾痔不止

雞冠花

黃連

貫眾

川大黃

烏梅各一兩

甘草上錢半

右為末每服二錢用溫米飲調下日三服不計時

枳殼炒六錢

枳子微炒黃色

荆芥穗各五錢

右為末服三錢薄粟米粥調下如人行一二里地并遊獻之空心日進二三服

治腸風腫毒 經驗方

治痔漏方 秘方

用完跟不以多少焙乾為末先用白丸水洗淨貼之

良妙藥子 秘方治痔漏等瘡

入言一錢

白丸二錢

蜜陀僧

辰砂各五分

右件先研入言細鋪鍋底次用九鋪入言上括烟盡為度次將陀僧辰砂研細白糕和作尖錠如小麦大每用一粒頂漏納瘡口上去賊肉盡後貼生肌



生肌散 秘方

寒水石煨一錢 龍骨煨五錢 乾胆脂三分  
輕粉一分

右件研末乾貼瘡斂水石干胆脂加龍腦瘡老止依方

辰砂膏 秘方 瓜蒂三錢末 蜜陀僧研二錢 朱砂半錢

片腦少許

右件為末乾律調貼濕乾貼

玉江散 秘方

白丸二兩 珠砂四錢

硃砂二兩先燒硃砂在鍋內次用白丸末在上括用及為度

右件為末敷痔乾用津唾調貼

七寶膏 秘方

枳殼一個去核六者

巴豆五錢去皮

右件將豆殼在枳殼內線縛確內成醋者乾枳殼曬乾研細用磁  
綿蘸濕展平敷痔根上去痔不用止用生肌散如頭漏日久不

用鹽調代骨敷瘡頭尖敗肉自去

秘方

右用全蠍不以多少或三二箇初發痔瘡用此燒薰

秘方

右用韭菜不以多少先燒熟湯以盆盛湯在內盆上用器具蓋之  
留一竅却以韭菜於湯內泡之以穀道坐數上令氣蒸馬候溫用  
韭菜輕輕洗瘡斂沉自然脫體

秘方

先用乾馬齒兒煎湯次用螺蛸活搗敷瘡瘡封口空心食前搗湯

調和散末版

烏玉粉 秘方治男子婦人久血腸風痔漏着床疼痒不可忍者服此

三四次見効初得此病或痒或疼或谷道周回多生硬核是痔破者果  
漏下血是凡皆因酒色過度即成此疾人多以外醫敷洗病在腸自  
有苦若不去根者其病難除

亂髮皂角水洗八兩

槐地六兩

雷丸四兩

敗撥八兩

牛角膠剉十一兩



苦棟根五兩

芝蔴四兩

右件剉碎用磁器內燒存性煨末入乳香二兩射香八錢研勻酒糊為丸桐子大服五十九細嚼胡桃一枚溫酒送下空心晚二服甚者二服已別藥房室醋魚雜者服後凡動氣毒物并坐濕地

秘方

靈靈子

蔓菁子

蘿蔔子

荆芥子

芫荽子

高荳子

蒼蓮子

葱子

右件等分用細魚不去鱗將杜持煨燥裝藥縫合銀石器內放上石器蓋之上下放火燻乾子放冷湯末每服三錢米飲下空心日進二服

合母婦苗疔疔毒秘方

草麻子帶殼

天南星

防風各半兩

右件益末盆內燒烟上用器其蓋之留一孔坐孔上薰之

四時聖惠方治鼠疥痔漏

靈靈子二錢

射香

片腦各半錢

銅綠一字

右件為末先用漿水洗拭乾敷

治瘡疾及疔毒秘方

枳殼半錢

朴硝二錢半

薄荷半兩

荆芥

乾連蓬各一兩

右件為麤末用一半水三椀煎至二大椀半乘熱熏洗

又方經驗方用冬瓜湯洗即愈

方經驗方腸風下血

乾薑根白皮

人參去芦

右件等分為末服二錢空心酒或藥飲送下忌油膩菓子等

治齒疔張子和方

槐花炒

枳殼去穢

右件等分炒黃存性為末醋糊為丸每服二十丸米飲湯下空心



○腸肛

肺與大腸為表裏故肺臟溫熱則肛門閉結肺臟虛寒則肛門脫此  
此三因之論又有婦人產育用力過多及小兒冬月後臟寒皆能使  
肛門空出治之必須溫肺臟補腸自久則自然收矣  
**和劑方治**內外諸痔及肛門腫痛或下膿或下血以致  
肛門脫出並宜服之

苡薏三个必存性

胡桃仁十三令不油者就雄內燒有性

綠九枯

白府子

雞冠花炒各五兩

枳殼去白麩炒

附子去皮米生

訶子必去核各二兩

白九枯

半兩

天南星各五兩

蜆皮两个錐內燒存性

右為末醋煮麩糊丸如梧桐子每服三十九空心溫酒下

**乳香**

和劑方治言痔并腸風下血肛邊或生結核腫痛或已成瘻

大便艱難肛腸脫出

枳殼去白麩炒半兩牡蠣煨半兩

乳香研

白丁香各二錢半 葷登茹

大黃蒸焙



鷓鴣炒

芫青去頭足搗米炒各半兩

右為米粟米糊元如梧桐子每服二十九腸風膿茶清下諸痔前  
確白湯下諸湯煎鐵屑湯並空心下

瘡皮

三因方治肛門或因洞漏或因用力太過脫出不收

烟皮一个燒存性 破石版

桂心各半兩

右為末每服二錢米飲空心調下用後方治入陰肛如骨頭一  
收燒灰研入

香附子

三因方治肛門脫出大入小兒悉皆治之

香附子

荆芥穗各等分

右為末每服三匙水一大塊煎干數沸熱酒洗

又方

三因方用玉倍子為末每用三錢入白丸一塊水二碗煎洗立  
効

又方

三因方

用木賊不以多少燒存性為細末糝肛門上按入即効

三因方

治小兒脫肛不收用得厚草不以多少杵為細末乾

將建膏

百一選方

以槐花服角各等分炒黃互采用半與鹽炙

食之以酒送下以猪膘去皮醃藥炙服亦可

草插

如泥先用相稍水洗淨肛門用芭蕉葉在入却用藥於醫下

貼坐自然收入

三因方

治久利腸胃虛肛門自下

龍骨

龍骨

木賊二錢半右存性

右為末

每服半錢乾搽候少時以粘上



○遺尿失禁

人之遺尿藉心腎二氣之所傳送蓋心與小腸為表裏腎與膀胱為表裏若心腎氣虧陽氣衰冷傳送失度則必有遺尿失禁之患故經云膀胱不利為癃不約為遺是也治之宜補心下元清心實腎欲又有遺尿木順致傷膀胱及小兒胞冷俱能令人遺尿失禁當隨証施治

三氣丸

和劑方治內虛裏寒膀胱積冷陽氣漸微小使不禁

硫黃細研

肉桂去皮為末各二子半

乾姜炮為末

朱砂研為衣各二子

附子一枚大者炮去皮臍為末半兩

右以麩糊為丸如梧桐子每服五十九鹽湯空心下

秘元丹

御藥院方治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨三兩

訶子十個去核

縮砂一兩去皮

靈砂二兩

右為末煮糯米粥丸如梧桐子每服五十九空心鹽酒下

家非子丸

二因方治大人小兒下元虛冷小便不禁或成白濁常



服補養元氣進美飲食

家莊子六兩炒

鹿茸四兩酥炙

從容酒浸

牛膠酒浸

熟地黄

當歸各二兩

巴戟去心

兔絲子酒浸各一兩半

杜仲去皮炒

石斛去苗

桂心各二兩

乾姜炮

右為末酒糊丸如梧桐子每服一百丸空心鹽湯溫酒任下小兒

頂小丸服之

茯苓丸

三因方治心腎俱虛神志不寧小便淋瀝不禁

赤茯苓

白茯苓各等分

右為末以新汲水接洗澄去新沫控干別取地黃汁與好酒同於

銀石器內熬成膏搜和丸如彈子大空心酒酒爵一丸

雞內金散

三因方治遺尿失禁

雞內金一具并腸淨洗燒為灰男用雄者女用雌者

右研為末每服二水酒飲調服

兜絲子丸

濟生方治小便多或致失禁

兜絲子淘淨蒸二兩

杜新散取粉

附子炮去皮

五味子

鹿茸酒炙各兩

肉蓯蓉酒浸二兩

雞內金炙

桑螵蛸酒炙各兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯溫酒任下

阿膠以珠子

杜新

鹿茸酒炙

桑螵蛸酒炙各等分

右為末糯米糊丸如梧桐子每服五十粒空心鹽酒下

解之有服以導不終劑而愈失能安神定志

桑螵蛸鹽水炙

遠志去心

首烏酒炙

龍骨

人參

茯苓

當歸

茯苓

右為末每服二錢忌卧時人參湯調服

小兒驚風

簡易方治思慮過度陰有相干小便白濁

益智仁酒醋炙二日

川草薈



石高昌蒲去皮毛

天台烏藥

加白茯苓去皮各一兩

甘草四錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓入鹽少許食前服

新刊神珍方大人主卷之三

○雜方附錄

百一選方 又名神殺丹 又名神山追毒丸  
能解一切毒如被狐狸毒鼠毒毒惡困河蛇毒食疫死牛馬肉毒  
或蛇犬惡蟲所傷又治癰疽發背及瘰癧瘡人多不識喚作癰  
疽致命殺人者及治諸風癱瘓亦腫痛等

文拾一名五倍子搗破洗焙淨拌三兩

射香研二兩

山慈菇去皮淨焙二兩

千金子去殼研去油取霜一兩

紅芽大戟去芦洗焙干一兩半

右除千金子射香外三味末却入二味研藥勻用糯米濃飲為劑  
拌干餘下分為四十粒每服一粒研生薑薄荷汁并華水研服乾  
薄荷曬煎湯冷磨服亦佳通利一兩行無妨只用溫酒正仕入合時  
宜端午七夕重陽日合或遇天德月德日亦佳合時要在淨室焚  
香至誠修製毋令婦人雞犬見之効驗不可莫述且珍藏之  
前良能靈局丞相傳此方以為濟世衛生之寶九人居家或出入  
不可無此藥若道官嶺表毒藥最多綿綿見意思不快便服之



即安二廣山谷間有草曰胡蔓草又名斷腸草若以毒人急水  
吞之急死緩水吞之緩死又取毒蛇殺之以草覆上以水灌之數  
日菌生其上取為末調酒以毒人始亦無患再飲酒即毒發立死  
其俗淫婦人多自配合此人與之情分相好多不肯放此人回陰  
必棄置食中地還即戒之曰子其年來若從其言即復以藥解之  
若過期不性必死矣名曰定年藥北人屆彼亦宜誌之若亮中毒  
四大不調即便服之立愈或於雞鰾魚羊鵝鴨等肉內下藥丙食  
此物即解其毒急服此藥一粒或吐或下隨手便差  
昔有一女子久患勞瘵命在且夕為血尸蟲所噬磨一粒服之一  
時問吐下小蟲千餘條一大者正為兩段後更服蘇合香丸半  
月遂愈

湯獲于後  
菌障瘋子金石砒毒喫死牛馬肉河魿魚毒時行瘟疫山嵐瘴氣  
急喉閉纏喉風脾病黃腫赤服瘡癩衝骨尖第熱毒海上攻自盛  
瀉水打折傷死但心頭微暖未隔宿者已上並用生薑艾葉水磨  
粒確之須更復懸○雞確發背未破魚肝諸般腫毒湯火折傷

百虫大鼠地傷已上並用東流水磨塗並服一粒良久竟死在  
消○打撲損傷打炒炒即酒磨下半粒仍以東流水磨酒○男  
子婦人節和鬼氣鬼胎煖酒磨下一粒可分二張有毒即江下白  
上

宋李詳方湯使不同卒銀于後

陰陽二毒復氣心則狂言記諸腦隔痺滯邪毒未及及虛交出  
瘡氣濕發風冷冰入薄荷一小葉同研下○急中及顛和芍叫却  
走用此鬼氣並用波無灰酒下○自經落水楚頭發者及散鳥死痛  
速死未隔宿者並冷冰磨准下○熱大蜈蚣傷並冷冰磨塗傷處  
○諸般瘡疾不同新久隨大眼時煎洗柳湯寒下○小兒急慢食食  
五疳五癩蜜水薄和小康同磨下○牙關緊急磨塗二瓦分作三  
服如丸小分作二服且大不與之○牙痛酒磨塗塗及含藥少許  
不○湯火傷東流水磨塗傷處○打撲傷損妙松即無灰酒下○  
年深日近頭疼太陽疼用酒入薄荷煎磨塗花貼太陽穴上○諸  
鈔圓表口面鳴針唇腫毒夜多睡此言諸毒在平中國口示牙



關緊急筋脈牽縮骨節風腫手腳疼痛行止艱辛應是風氣疼痛並用酒磨下。有孕婦不可服

易得效驗 秘方

丁香	木香	藿香
當歸	人參去土	白茯苓去皮
官桂去皮	大黃	白朮
乾姜炮	桔梗	從容為浸
采胡去芦	攪柳	黃連去芦
防風去芦	陳皮	車前子
吳東黃	皂角去灰燉炙	大附子
川烏炮	白仁	肉豆蔻炮
黃耆	防已	滋陰中醋炙
羌活	紫苑	川椒去目
巴豆去皮心炒	蓬義米	熟地黃
厚朴姜製	川芎	香附子
石膏白沸酒浸	射香少許	小茴香

桂單少許

以上各等分為細末陳蜜和勻棉子餘下油待最之用則煎丸如桐子大每服五九量中者實與之

傷寒汗後發寒寒厥皮湯下不止當歸湯下心汗後有熱杏仁湯下○熱多寒少艾湯下不止甘草湯下○乾濕乾吃三九○不得汗寒湯下又不汗行酒下○大小便不通竹葉湯下不止心湯下○頭眩用芍湯小○後脈脈沒下○戰并不止木香湯下○破傷風用弓反張抱用生薑湯下後不香湯下如疼乳香沒蒸湯下○傷寒結毒先用生薑湯下不止酒下再不止小柴胡加枳實生薑湯下○盜汗用陳廷麥湯下○左癱右患用木香溫下○骨節疼痛寒貼○寒濕脚氣用木香湯下骨寒貼助下刺痛生薑湯不後二日用滑石湯○酒積好酒下○氣積草豆湯下○陳皮湯下○飲食無味桂皮湯下○面上風瘡生薑湯下○脹惡用每煎墨炭然後用生薑湯下○及食病先用生薑湯進二服後用煎一湯父方用好醋一搗生薑七兩花銀一合同煮乾生薑汁同煎○風墜小四香湯下○慈子好酒下○湯







白芍散 神聖院方治飲酒令人不醉

葛花 小豆花各一兩

右件為末每服三錢飲服仍進葛汁及批把葉飲倍即飲酒又九月九日菊味臨飲服方寸又小豆花葉陰乾百目未服之

丁香

人參各五錢

白蓮 訶子 沉香 白木各三錢

右甘草膏子為丸兼豆大

沉香

木香各五錢

右甘草膏子為丸殊砂為衣

烏梅

神麩 麥糵

龜膠菜

右甘草膏子為丸

加豆

木香五兩 煉皮 藿香

細砂

右甘草膏子為丸殊砂為衣

砂仁七錢

甘松 益智各五錢

香附一兩

右甘草膏子為丸

細砂

細砂三錢 麝香半錢

薄荷葉二錢

右甘草膏子為丸殊砂為衣

赤豆

赤豆 葛粉等分

右為末未飲酒之前用冷水調一匙或二匙服之痛飲不醉效

石灰飛過一升 黃丹飛過一小升



右和勻入酒內

消酒毒

雞腔腫

干葛

右為末時分麩糊丸桐子大每服五十九酒逆下

又方

寒食麩

白牽牛麩二錢半一黑牽牛末三錢

右為末通作一服姜湯下

又方

右取山豆根葉洗淨搗細以無灰酒澆勻濾去渣燉服即愈

華地十件危病方

經胎方漢神醫華陀字元化嘗云人有危病急

如風雨命瀕不及須臾不救觀其橫天實可哀憐子因眼日選十件

危病處三十妙方以救橫天詳錄于後不可不知

一霍亂吐瀉始因飲冷或冒寒或失飢或大怒或乘舟車海動胃

虛冷人上吐吐不止令人下瀉吐瀉併作遂成霍亂頭旋眼昏

轉筋四肢逆冷用藥遲緩頃更不救

五葉菜

木瓜

食鹽各五錢

右三味同炒焦用磁瓶盛水三升煮令百沸却入前藥同煎至二

升已下傾一盞隨病人意冷熱服之藥入即醒如倉卒無藥用耕

白礬末每服一大錢百沸湯煎服如無白礬只用鹽一撮醋一盞

同煎入分溫服或盜梅鹹酸皆可煮服

二瀝候風疾閉其証先兩日胸膈氣緊取氣短提鼻然咽喉腫痛手

足厥冷氣閉不通頃刻不治

已五七粒三生四熟生者去殼生研熟者去殼灯上燒存性

雄精皂子大明者研

鐵釘金一不蛭壯者刮為末

右二味研每服半字茶調兩神如口藥咽塞用小竹管納藥吹痰

中煩史吐利即醒如無煎藥用川升麻四兩剉碎水四碗煎一椀

灌服又無升麻用皂用三定炮碎投水盡灌服或吐或不吐即安

三吐血下血其証皆因內損或因酒色勞損或心脾脈破血氣妄行

血如漢足中鼻衄出須臾不救

側柏葉蒸干

人參各一兩焙乾

右二味為末每服二錢入飛羅麵二錢新水調如稀稠服如無前

藥劑芥一椀燒過益地上要出火毒藥如粉陳米飲調下三錢不



過二服如無效不用益底墨研知粉服三錢米飲下連進三服  
四中砒霜毒其証頓好如狂心腸澆痛頭旋欲吐不吐面口清黑四  
肢逆冷命在須臾

黑鉛四兩磨水一椀權之如無前藥青藍兩椀研并水調一椀權  
之如無藍用精油二升許權腮其毒即解又無油極地用水作餅  
懷吃一二確土黃色好

五尸厥身証急然 死去四肢逆冷不省人事腹中氣走如雷鳴

烟硝五錢

硫黃三斤

右研烟粉作三服每服用好田酒一大盞煎氣消起傾於盞  
蓋着溫服如人行五里又一服不過二服即醒兼灸百會穴四十  
九壯臍下氣海丹田二百壯身溫止如無前藥用附子七錢重湯  
熟去皮臍為末分作二服每服用酒三盞煎三盞服又無附子生  
姜自然汁半盞酒一盞同煎令百沸併灌二服仍前灸

六中陰惡鬼氣其証暮夜或登廁或出如野或遊冷屋或人所不  
至之地忽然服見鬼物鼻口及舌着惡鬼氣驚然倒地四肢逆冷西  
程拳鼻口出清血狂命迷巡捕史不救此証與尸厥同但腹不鳴

順視瘦人中陰惡鬼氣者此切勿移重其友因令親戚送入門燒符  
燒符或燒香打香安息未許合香符木之類五猴醒証人等方可移歸

蘇角去五斤

香

蘇角各五斤

右為末每服二升水調下好无那藥用雄黃末服一升  
兼湯調離女无雄黃用故汗衣或衣汗衣者着在自上下多服勿  
遺汗者任隨衣者各等因衣概衣也婦用男衣男用婦衣廣在  
服二升百沸湯調下

七陽陽其証或因天吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不醒人妻或  
傷寒新差其証婦人參其証小腹痛者及腎虛而重氣以  
自出亦是陰陽証須更不救先以葱白麥草炒令熟下  
手一枚重一兩切下八片

白水

乾姜各五斤

木香二升半

右四藥各研末用水二椀煎八分脫攻冷灌服須更又進一服合  
濟所服如无前藥用生皮二兩好酒二升煎二升八作一服灌  
又无生皮用葱白連須三七根細碎少內研紙酒五升煮  
二升八作一服灌之陽

先用炒監射臍下氣海功令







乳香

沒藥各三錢 木香三錢

石將黃蜡浴開入衆藥和勻作一處杵千百下作一塊秤分一半  
藥亦忌雞犬婦人用油單紙心隨月疾九服十九如糖子湯使臣  
後○紅痢用甘草湯○白痢用乾姜湯○紅白痢草姜湯○赤痢  
猪根皮湯○禁口痢建肉山藥散○九蓮米湯○落馬新傷血腫酒  
○霍亂吐瀉乾姜湯○水瀉五苓散方身者門○一切凡候用并  
麻湯○咳嗽結痰杏仁湯○則魚腥濃行麥酒湯方裁利門加附  
子一斤○十白出治即湯○心支用酒○再痛腰痠肩肘湯○氣喘  
心下元虛並用酒○特氣并水○大小便不通木通柴湯○於  
下夜不寐湯○五勞七傷湯○一切癆瘵瘰癧湯○云痛瘡  
食不消血等姜湯○產後血氣當歸湯○小兒疳積凡黃散已湯○  
血几勞史君子湯○口吐清水河子湯○腹扁悉白湯○四虫咬  
心被刺湯○陽毒傷宗師守黃守湯○陰毒守黃守湯○湯○湯  
身壯執沙糖水○腫執沙糖水○湯○湯○湯○湯○湯○湯○湯○湯  
壯大商陽○神清家扁執西

柏香

零零一斤五兩八錢

辛夷

丁香

丹皮

獨活

大黃各三錢分

茅香七兩二錢

南木香一兩四錢

檀香四兩一錢

白芷十一兩

甘松五兩二錢

霍香八兩



諸虫

出鹿山 秘方

攢柳五两

以上三味為末

大黃八两

黑索半四两

皂角十定肥不姓者

苦練根皮一斤

右先以皂角苦練根皮二味用水二大碗熬成膏手一處搜和煎藥三味為丸如梧桐子大後用雷丸沉香各一两以上三味碾細末為衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三九四更時分用沙糖水送下

取十白虫 秘方

向陽石榴皮七片

紫攢柳十个

右水煎露一宿以下虫為度



○咽疾

咽疾者為一身之總要與胃相接呼吸之所從出若胸膈之間蘊積  
熱毒致生風痰壅滯不散發而為咽疾之病疾內生瘡或狀如肉腐  
為腫為痛窒塞不通吐熱不下甚則生出重舌治之尤宜先去風痰  
以通咽膈然後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝上上瞽  
而生瘡謂之懸癰及肺寒亦能令人咽閉吞吐不利臨病須詳審其  
證施以治法

甘桔湯

和劑方治風痰上壅咽疾腫痛吞吐如刺所礙

舌結梗一兩

甘草炒二兩

右吹咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服

聖藥

和劑方治咽疾急閉腮頰腫痛并單蛾双蛾結喉

重舌木舌並皆治之

硫黃細研

川芎

臘茶

薄荷去枝梗

川烏炮

硝石研

生地黃各二兩

右為末列生葱汁搜和為錠每服先用新汲水灌漱次壽生薄



苛五七葉却用藥一錢同膏極爛以井水蒸下甚者連進三服并  
以一錢安患處其病隨藥便消

**新黃湯** 和劑方方載損熱門治臟腑實熱咽喉腫痛大便秘結  
咽喉之證多是風熱上壅然後成之非實熱不可服

**五香散** 和劑方治咽喉腫痛毒氣結塞不通急宜服之  
沉香 雞古香

木香 麝香各二兩 麝香各三分別研  
右為末入麝香研勻每服二錢水一盞煎服不拘時

**現玉丸** 御藥院方治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或  
生瘡疔重舌木舌並宜服之  
青仁黑 盆硝 蒲黃

甘草末各一兩  
右同研勻用沙糖丸每兩作五十九每服一丸嚙比或用葛藤末  
搽齒痛內亦好

**軍射香白失砂丸** 御藥院方治咽喉腫閉或作瘡癰或舌根腫痛  
馬牙消生用七錢 鈇白霜二錢 鵬砂三兩

朱

龍腦三錢 燒寒水石揀淨者一斤

射香三錢 朱砂一兩半 甘草二兩熬成膏  
右研極細用甘草膏和丸如梧桐子朱砂為衣化一二丸

**心口散** 御藥院方治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊急  
雄黃細研 白丸飛過 藜蘆厚去皮去心

生用醫方大成云不可生用 猪牙皂角去皮炙  
蒲黃各等分

**王論題** 右為末用一字嚙入鼻內吐痰為愈  
三因方治風熱喉閉及纏喉風

煇消一兩半 鵬砂半兩 腦子一字  
白姜蚕二錢半

右研勻以竹管吹半錢許入喉中立愈  
**蜜附子** 三因方治附寒咽閉吞吐不利用大附子一隻去皮臍切

作大片蜜塗炙令黃含為津其味盡更以附子片塗蜜炙用  
**解毒雄黃丸** 三因方治纏喉風及上膈壅熱痰涎不利咽喉腫痛

肺



雄黃飛

壽金各二錢半 巴豆去皮出油二十个

右為未醋糊丸如菜豆大茶清下七丸吐出頑涎即愈

雄黃二錢半別研

蝎梢七枚

白蠟生研

麝香各二錢

猪牙皂角七錢

右為未每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎為愈

烏尾膏

簡易方治咽喉腫痛及一切結核爛喉道蟲纏喉閉喉

急喉飛系入喉重舌木舌生疔証

皂莢兩條槌碎用水三升浸一時久投汁去滓入瓦器內煎

令成膏

好酒一合

人參為末

百草霜研各一錢同皂角膏攪勻令稠

硃砂

煅硝

白梅霜各少許並研

入前膏中

右拌和前藥用鵝毛點少許於喉中以出盡頑涎為度却

甘草二寸煎汁吞津若木舌先以粗布蘸水指舌令軟次用

姜片擦之然後用藥

本事方治脾肺有熱虛煩上壅明疾生瘡

雞蘇葉

荆芥穗

防風

桔梗

人參

牛蒡子隔紙炒

甘草各一兩

右為末每服一錢沸湯點服如咽喉痛口瘡甚者加姜蚕二兩

濟生方治纏喉風急喉痺

鴨嘴膽各二錢半 白姜蚕炒去系嘴半兩

右為末每用少許以竹管吹入喉中或筋頭點

良方治纏喉風急喉痺

白丸三錢

巴豆三枚去殼分作六瓣

右將白丸於鉢內浸火熬化為水膏巴豆其內候乾去巴豆取

白丸研為末每用少許以竹管吹入喉中立愈本事方去巴

豆用烏雞子清調白丸灌入喉內

治咽喉腫痛燕物妨礙及口舌生瘡

龍腦半字

鴨砂二錢

珠砂三錢

馬牙硝半錢

寒水石二錢



右研勻每用一字參於舌上津燕之

**治咽喉腫痛**

一百一錢方以山豆根洗淨新汲水浸少時用一塊入

口中噙之其下苦汁未愈再用此方用甘草白朮為末每以

半錢許入口中津液蒸下

**牛蒡子湯**

治風熱上攻喉咽疾腫痛或生離瘡有如

肉齒

牛蒡子

玄參

升麻

桔梗去芦

犀角鎊

黃芩

去通去節

甘草各等分

右吹咀每服四錢水一盞姜三片煎八分溫服不拘時

**治喉痛**

設方大成用射干即扁竹根也旋取新者不拘多少

搗爛取汁吞下或動大腕即解或用醋同研取汁食引出來

更妙

**治喉腫痛方**

醫方大成用嫩艾葉旋取研汁逐時吞下

**治喉痛**

經方用該地草七牛膠以二味生搗爛取汁養下

灌鼻中待吐即為愈

**治喉痛**

經驗方用生烏桑即矮檉根以酸醋兩盞煎一盞先食

後煎吐白痰涎為愈

**治喉痛**

經驗方用巴豆去殼以紙包巴豆肉用竹管壓

出巴豆油在紙上以此紙作捻子點灯吹或以煙熏入鼻中即時

口鼻涎流牙關閉矣

**治喉痛**

按辨方治時氣經喉風漸入咽塞水鼓聚下牙關緊

急不省人事

杜黃細研

藜蘆生川

白礬飛

猪牙皂角去皮炙黃

右等分為細末每用二豆大鼻內留立効

**治赤馬回彈**

張子和方

右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透知左右

**喉散**

聖惠方治咽喉腫痛急慢喉閉懸雍乳鵝燕物不下

詞子一兩醋浸一宿去核晒干

黃芩醋浸一宿晒

膽礬一錢

明礬二錢半

牛蒡子生



甘草生

薄荷各五錢 一方有川百煎

右為末先用好生薑擦舌上每用藥半錢芦筒吹入喉中吐  
出涎痰便用熱茶熱下再次第二次便用熱粥二次并吹用  
熱茶或熱粥或熱食之加朴硝末少許如口舌生瘡用藥吹  
之口中立去痰涎為妙

秘方

猪牙皂角

黃芩

甘草

訶子米醋浸七日陰干

枯礬

去八連

膽礬

當歸梢

真荷葉

川百煎各一錢

片腦五分

右為細末少許夜前法用

又方

秘方婦人發頭油煎茶葉燒灰點之効

喉痺藥方

秘方

薄荷梗燒灰存性四兩

鵬砂

盆硝

膽礬各二錢

右為末以油二三點入水上調點患處

三花

秘方治咽喉痛大効

小豆根一兩

鵬砂二錢

龍腦少記

射香少記

右為末用青魚膽為丸如粟豆大每服三五丸噙化燕津

龍腦秘方治急喉風

白礬

姜豉炒去系

鵬砂

白礬

右等分為末少許吹喉中痰出瘡

三花

秘方治喉中痰出瘡

三小壯

秘方

黃

黃芩

黃連各二兩半

黃

白蓮子各兩半 山豆根

黃

若參各一兩

鵬砂二兩

京墨三錢

射香少許

片腦一錢半

冬加知母



古為末猪膽調雞醃內蒸藥三吹後入片射鵬為九且大醫化  
凡食後

**集命散** 秘方治候一切腫毒水舌双乳鵝喉痺等證

紫荷車 蜜陀僧各半兩 砂仁

管仲 姜蚕直者 烏魚骨

茯苓各一錢 射香少許

右為細末糊凡如彈子大陰干用一凡無根水浸一時頻飲一凡  
併一服神效

**射干花根** 秘方

射干花根

陰干為末吹候如神

**合天庫** 秘方

侯痺為急病須更命不通 急所新艾水 入口便和同

臘月無新艾 蛇床鹿內燒 其烟繞入口 此病即時消

**命頭散** 聖惠方治急候閉有喉腫借者塞氣不得通

死者

膽礬

草烏各四錢

綠礬六錢

惟黃二錢

右為末用一筋頭點上咽喉內急吐涎未立應次以大黃甘草等  
分俱為分筒末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓化乳香一粒溫  
服除去熱毒恐為再發乃加白礬二錢

**聖惠方** 治咽喉腫閉塞不通

胡椒

薑蚕

百藥煎

川芎各三錢

山豆根

益硝

薄荷

紫荷車各半功一青黛一錢

右為末相半錢小兒一字吹摻咽中水調亦可

**合喉痺** 秘方鳴脚草汁點之



○眼目

人之有眼，眼猶天之有兩，惟視萬物察纖毫，河所不至，日月有虧，  
 之精者，風寒濕熱之所致也。眼之失明者，四氣七情之為害也。大抵  
 肝主目，肝之精華一身之血，皆由五臟分五輪，八卦名八廓，五輪  
 者，肝屬木曰風輪，在眼為烏睛，心屬火曰血輪，在眼為二眵，脾屬土  
 曰肉輪，在眼為下胞，肺屬金曰氣輪，在眼為白睛，腎屬水曰水輪，在  
 眼為四子。肝之精華，無位有名，膽之精華，無位有名，肝之精華，無位有名，  
 門之精華，無位有名，脾之精華，無位有名，肺之精華，無位有名，腎之精華，無位有名，  
 大腸之腑為山廓，三焦之腑為澤廓，此雖為眼目之本根，而又藉血  
 為之包絡，五臟或榮精風熱，或有土情之氣，鬱結不散，上攻眼目，各  
 隨五臟所屬而見，或腫而痛，或澀多淚，或生瘡膜昏暗，失明其証，七  
 七有二治之須，究其所因，風則驅散之熱，則為磨之氣，結則調順之  
 切不可輕用針刀，起風偶得其愈，至乎僥倖當或不然，為終身之害  
 又且不可過用原劑，起水其血脈凝而不流，亦成固疾，當量入老少  
 氣，虛實用藥，又有齊虛者，亦能令人眼目無光，或生冷翳，皆當補  
 暖下元，滋其腎水，北方之人患眼最多，皆是日冒風沙，夜計熱，所二



氣交蒸使然治之多用涼藥北方稟受與南方不同故也疹豆之後  
毒氣鬱於心肝二經不能自已發於眼目傷于瞳人者素無治法  
常見黑睛當風多淚濕難開或生障翳婦人血風時行暴赤切  
眼疾並皆治之

大黃炮

牛蒡子炒

川芎

菊花去枝

白蒺藜妙去刺

細辛去苗

防風去苗

玄參去芦

山施去皮

苦苓去芦

甘草炙

蔓刺子去白

荆芥

木賊去根節各一兩

草決明一兩半

蒼朮米泔浸炒二兩

右為末每服二茶臨卧用酒調下

七寶丹

和劑方 方載積熱門治風痰壅滯心經積熱邪氣

上衝眼澁睛痛或腫或赤迎風多淚怕日羞明並皆治之

和劑方

和劑方治風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱道膠淚

薄荷去梗

當歸

羌活

防風各五錢

川芎

甘草

大黃各二兩

各二兩

右為末每服二錢食後熱水調下

和劑方治風氣攻注兩眼昏暗膠淚羞明并暴赤腫痛

蜜蒙花揀淨

杜蒺藜炒去火

木賊

石決明用鹽同東流水煮一伏時出研粉

羌活

菊花去枝各等分

右為末每服一錢膳茶清食後調下

和劑方蜜蒙花散料內加十分中取一分

茯苓八兩

甘草四兩

蓮荷二兩

川芎一兩

當歸一兩

砂仁二錢半

右為末每服二錢茶清調下日二服食後

和劑方治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚

枸杞子二兩

茯苓酒浸炒二兩

巴戟去心一兩

甘菊花揀四兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九粒溫酒蓋湯食後下揚氏



家歲方加五味子三兩

**消風散** 和劑方治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛怕日羞明一切風毒眼疾並皆治之

羌活

防風

柴胡

甘草炒各一斤

右為末每服二錢水一盞煎食後濕眼薄翳清調茶并菊花苗煎湯皆可服忌諸毒物

**消風散** 和劑方治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明一切風毒傷肝者並宜服之

谷精石去土

菊花去梗

蟬脫淨洗各等分

羌活

甘草炒

白蒺藜炒去刺

草決明炒

防風去芦

山梔子去皮

川芎不見火

蜜蒙花去枝

荆芥穗去梗

黃芩去土

蔓荊子去皮

木則淨洗各等分

右為末每服二錢食後用茶清調服或荆芥湯調亦可  
**消風散** 和劑方理肝受風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚流痛

菊苑去被六兩

羌活去芦

白蒺藜炒去尖

木賊去節

蟬脫去頭足翅各三兩

右為末每服二錢食後茶清調下

**消風散** 和劑方治大人小兒風毒傷肝或為氣攻一切眼目昏暗漸生翳膜及久患頭風牽搐兩眼漸細小連睛赤爛小兒瘡疹入眼白膜遮睛赤澁隱痛並皆治之

茯苓

甘草炙

防風去芦各四兩

不決明草水者研如粉

川芎

羌活

當歸洗焙各三兩

為藥赤者十三兩

疾惡炒去皮尖半斤

蛇蛻炙一兩

蟬退去頭足翅二兩

蒼朮去皮炒十二兩

右為末每服三錢食後米泔調服茶清亦得忌毒食等物

**消風散** 和劑方治男子婦人肝虛積熱上攻眼目翳膜遮睛羞澀多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘并治暴赤翳障

牛膝去芦酒浸三兩

石斛去毒

枳殼去白麩炒

杏仁去皮尖炒去油研細



防風去毒各四兩 生地黃

熟地黃洗焙各一斤

右為未煉蜜丸如梧桐子每服三十九食前溫湯溫酒任下

赤芍藥

當歸洗焙

黃連去須各等分

右為未每服錢用極滾湯泡乘熱洗冷即再溫日三五次

多淚

御藥院方去翳膜明眼目用川芒硝五兩取真白如雪者

置銷五銀鍋子內以新瓦蓋文用燒炭火用一小碎火內腐先燒

磚挑然後藥任禍磚上四面有火慢慢熬容良久鍋內有聲

去頂上火并瓦鍋中觀不沸顯清明汁以快鉗鉗出鍋須藥汁在

別器中凝潔如五色者方好研令極細入龍腦各等分用熱酒

膜或次入鼻中立有神効

御藥院方治遠視不明常見黑花又眼明目有効

言美窮

荆芥

日章各一兩 蒼朮二兩米泔浸

右為未煉蜜丸如梧桐子每服五十凡食後茶清下

御藥院方治肝經蘊熱眼目赤腫

荆芥德

當歸

赤芍藥各一兩半

右吹咀每服三錢水一盞煎三沸慮去滓洗病眼

御藥院方治眼目百歲可讀細書常服有功

神曲四兩

磁石二兩煨醋重淬

光明朱砂一兩

右為未煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食後米飲下

楊氏家藏方治久新病眼昏眩難開翳膜遮睛或成癆肉

或暴發赤眼腫痛並皆治之

神曲四兩

黃連七錢搥碎水一椀煮數沸濾去滓

以上先將炒甘石末入甘鍋內開口殺令外有霞色為度既將入

黃連朴硝水中浸飛過候乾又入黃連半錢水飛過再候乾次入

白礬二錢一半生用一半飛過 煨熟別研字



黃連末半兩

白丁香別研

銅青七錢

右為末同前件藥合和令勻每用少許點眼

**黃連散** 楊氏家藏方治肝受風熱眼紅赤爛

乳香一錢半別研

黃連去須半兩

荆芥六百糖

灯心一百茎

右改咀每用二錢水二盞煎至一盞濾去滓熱洗

**加減神效散** 簡易方治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

車前子炒二兩

熟地黃洗

枳實子無翳膜則勿用

當歸去須尾各五兩

五赤子

枸杞子各二兩

右為末蜜糊丸如梧相子大每服三十九食前溫酒送下

川椒炒出火毒各二兩

光明珠砂

羌活

桂心各半兩

**防風** 本事方治肝經風熱上攻眼目齒痛不可用補藥者

熟乾地黃一兩半 黃連

決明子各二兩

右為末蜜丸如梧相子大每服三十九食前熱水下

光明珠砂

羌活

桂心各半兩

**防風** 水候不亦不能上隆肝木致令眼目昏暗或赤或

澀痛痒先時本土方

川芎

荊芥

天麻

川烏

金釵石斛

牽牛

右為末煉蜜丸如豆大珠砂為衣每服五丸薄荷茶爵下

**天麻** 濟生方治月毒上攻眼目腫痛或卒生翳腫或赤澀

膏肉或痒或痛羞明多淚

黃芩

甘菊花去枝梗 木賊

決明子

石膏

赤芍藥

川芎

蔓菁子

石決明各一兩

右為末每服三木水一盞送五片煎至六分食右服

石決明各一兩

蔓菁子

石決明各一兩

蔓菁子

石決明各一兩

蔓菁子

石決明各一兩

蔓菁子

石決明各一兩



痛不息  
桑白皮散 濟生方治肺壅塞毒氣上攻眼目白睛腫脹日夜

玄參

桑白皮

枳殼去白麩炒

川升麻

杏仁去皮尖炒

旋覆花去梗

防風去芦

赤芍藥

黃芩

甘菊花去梗

甘草炙

甜葶藶炒各二兩

右以咀每服四升水一盞姜三片煎至八分去滓食右溫服

補遺 濟生方治腎氣不足眼目昏暗瞳人不明漸成內障

磁石煨醋淬七次水飛過

五味子

兔系子淘淨酒浸

肉苁蓉酒浸焙

枸杞子

熟地黃酒蒸焙

覆盆子酒浸

車前子酒浸

石斛去根各一兩

沉香別研半兩

青鹽別研半兩

右為末煉蜜九匙括桐子大每服七十九粒空心鹽湯下

美食 濟生方治肝血不足眼目昏花或生翳障

當歸去芦酒浸

車前子酒蒸焙

防風去芦

白芍藥

熟地黃酒蒸焙

川芎

枳殼各等分

右為末煉蜜九匙括桐子每服七十九粒熱水送下不拘時

濟生方治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羊肝一具生用

黃連去須別研為末

右先將羊肝去筋膜於沙盆內搗爛入黃連末研和丸如梧桐子大每服五十九丸用熱水送下不拘時和劑方用白羊子肝

黃連

淡竹葉各一兩

右以咀水二升煎五合稍冷用滴洗兩目爛處

白濁 平驗方用覆盆子葉不拘多少日乾搗爛如粉以

綿裹之須用男孩乳汁浸少時點服中

治鼻赤眼 平驗方用升麻葛根湯方見傷寒門三貼每貼加

揮斂七個作三服如未退用敗毒散方見傷寒門加大黃又不退

却用五膈寬中散方見醫門酒調下氣順則平矣

眼 眼



升眼目昏暗遠視不明漸成内障

白茯苓八兩去皮 真枸杞四兩酒浸蒸

當歸二兩酒洗 青鹽二兩別研 兔絲子酒浸蒸二兩

牛蒡子炒 榆子 槐子炒

生乾地黄 黃芩各等分

右為末食右交門冬湯調二升服

蜜蒙花去枝葉 羌活 菊花去枝葉

白茯苓去刺 粉草 草決明

車前子各炒 黃芩 龍膽草洗各等分

右為細末每服二升食右飯湯調服

右為細末每服二升食右飯湯調服

阿膠蜂粉炒 熟地黃洗各一兩白服於去皮半兩山藥

參明冬去心半兩 五味子炒各二兩具母母 柏子仁

後神去皮 遠志去苗取根去皮入參 百計

防風去芦各一兩 杜仲去皮二兩姜汁浸炒去絲

右為細末煉蜜丸如彈子大食前姜湯下

黃連膏宣明方治一切眼目瘵肉攀睛風痒淚落不止

黃連半斤 白丁香五升以水一既淘淨去土搗細用 朴硝一斗以水半既淘淨去土陰乾用

右取水入消香釜內熬至七分淘出令經宿水而淨牙者取出控

乾以紙袋手盛風中懸至風化時黃連細末熬清汁燕乾補用猪

羊膽和加密点之效矣

碧霞丹宣明方點一切惡眼風赤者

銅青各一朋砂二升

射香 桐砂各二升 沒藥 血竭 乳香

龍膽草洗各等分

龍膽草洗各等分

龍膽草洗各等分

龍膽草洗各等分

龍膽草洗各等分

龍膽草洗各等分

龍膽草洗各等分

龍膽草洗各等分

龍膽草洗各等分

龍膽草洗各等分

龍膽草洗各等分

龍膽草洗各等分



右為末滴水和丸如梧桐子大每用一丸新水化開點之立效  
草龍睛散至惠方治上焦受於風熱氣毒攻衝眼目暴赤發澁羞明  
腫痛多迎風有淚醫膜攀睛肉癢痛

龍睛草洗去牙 菊花去梗 木賊洗淨去印草淨明微炒  
甘草炙各一兩 香附子炒去毛川芎不見火各四兩  
右細為末每服三不用麥門冬煎水入此糖少許調食后或米泔調下  
又方和濟方治眼目暴赤腫痛風氣熱上衝情疼運睛赤爛  
肉侵睛時多熱淚及因斗怒損肝氣久勞暗視風沙塵入眼道  
致成內外障翳及障翳眼等疾

龍睛草 蕤蕤少去刺各六兩 耳草炙羌活各三兩  
茯苓去皮四兩 菊花去枝五兩 赤芍藥八兩防風去枝  
右細為末溫酒調二寸匙日食後服

換風膏秘方  
爐甘石 黃丹一兩 川烏七錢  
乳香 沒藥 硃砂  
青鹽 血竭 片腦半兩  
射香

淮仁各七升半 當歸二升半 黃連一升五升 密一片  
右件修合如法研細用白沙密十五升浸熬初沸下黃丹二沸下  
切甘石三沸下諸藥末不粘手為度用磁瓶內熱水泡開攤紙  
秘方治風物上墜眼目昏花迎風冷淚羞明赤爛

羚羊角 犀角各一升 牛黃五兩 黃連  
右朴各二升 黃芩 川芎 羌活  
蟬退 白芷各五升 蔚花 大黃  
防風 草決明 地膚子 滑石各一升

生地黃七升 熟地黃七升 牽牛八升半  
右為末煉密丸茶清下每服三五丸臨卧食后服  
蔓荊湯至惠方治勞心飲食不即內障眼疾此方立効安神  
黃耆 人參各一升 蔓荊子二升半 甘草炙八升

白芍藥二升 黃柏三升 酒浸即四次  
右取咀每服三五升二盞前至一盞去滓食后臨卧痛口服



助陽和血補氣陽衛生室監治眼疾右土劫白睛紅多淚戾无疼痛  
而癢流雜開此服苦寒藥大過而真氣不能通九竅也故服此花不  
明宜助陽和血補氣 柴胡五斤 當歸身半斤白芷五分升麻素

防風七分

黃耆二斤

甘草炙一斤 蔓荊子一斤

占吹且都作一服水一盞半煎至一盞去滓通口臨卧服忌風冬  
及食冷物

散熱飲子板粹方治眼暴赤暴腫 防風 羌活 黃芩 黃連

右等分水一盞半煎至八分去滓溫服食右如大便秘如太黃一斤  
痛甚加當歸地黃各一斤如煩燥不眠加梔子一斤

地黃湯援萃方治眼久病昏眩因勞而久不愈也

防風

羌活

黃芩

黃連

地黃

當歸

人參

茯苓

右等分為麤末水一盞半煎至八分去滓食右臨卧通口服  
**四勿忘醫** 援萃方治赤目暴發作雲翳疼痛不可忍者

當歸

川芎

地黃各三斤

芍藥

羌活三斤

草龍膽二斤

防風三斤

防已二斤

右取咀每服八分水一盞半煎至八分去滓食右通口服

**神藥院方治眼赤腫疼痛不定兼治瘡腫不消**

大黃五斤生

黃芩

黃柏各一斤

右為細末每用生密水調藥如糊攤在緙絹花子上隨目赤左右  
貼於太陽穴乾乾用溫水頻潤

**五黃膏** 神藥院方治赤目 黃柏 題黃連 黃芩 黃丹 大黃 枳五

右為細末每服

密水調成膏攤在緙絹花子上

隨目赤貼於太陽穴

治赤眼右生暴漏百一湯方曾用一日退及翳者不食草蜜鼻中宜連蠶  
當歸立効散 聖惠方治血定睛疼痛 乳香一斤 當歸 大黃各一斤

右吹咀每服八分水一盞半煎至八分去滓食右溫服

**聖餅子** 治眼昏花 木賊草 甘草 菊花 川芎 川椒 連翹

右等分為細末密丸如稗子大每服一丸細嚼清茶食右送下

**神效** 治眼目血瞶瞳人如大眼睛眼痛 槐花炒四斤 川芎

何首烏

當歸二斤 甘草少許 為末每服二斤米泔調下臨服

**治目不明**

蒼朮去皮三斤

石決明礬存性

右為末以猪肝切碎搽藥在內縛定磁罐內煮香薰服吃肝如



治眼疾用刺謂點三四次

家法內加茯苓五斤薄荷二十斤川芎十斤當歸十斤

砂仁二升半右為末每服二升清茶調下日二服

秘方 甘草三寸 紅杏仁十二个去皮尖分二

彰口淨將杏仁一分甘草一分凡醫用加呢紅於磁蓋內二分

俱如此醫所用銅青牙研極細与前藥和勻用新及水數口吐

於藥內如法損勾以星憑汗清於眼角點之立効勿令塵入藥內

藥膏 治一切眼疾 如白密一升紫清 黃丹四升

詞子八個水試洗淨 東南槐柳枝一握各四十九

右將詞子拍碎同槐枝柳水二籠煎三梳以下八分子密絹濾過

用長槐柳枝攪勻旋下丹至茶褐色稀稠乃所須在磁蓋內成之細絹密封

口於井水中浸一宿取出每服黍米大津化用銅筋點并花水洗眼亦可

點眼方 宣黃連四升 大艾葉二升

右以宣黃連艾葉火燒作灰二升合和以細生絹作師於蓋上

新汲水濾過如林及汁狀候乃一中蓋許除去滓以清汗蒸水

用銅蓋坐熱湯口通手洗臨臥點眼及皆

秘方

用土硝一味以乾淨碗成圓匙以百沸湯泡過用青京一片蓋碗

口至晚以井花水味口水洗連服后用青京裏醃藥水洗連服

類七洗之不須擡起所差青京泡好

秘方治一切暴眼

白丸一字 雄 銅綠一錢 乾姜三分

杏仁一錢 雄 甘草一錢

右件用生絹袋盛貯放於磁器內以沸湯浸用紙封蓋安待

冷臨臥洗之

秘方

雞小黃連 銅綠米餅 大艾葉

將黃連銅綠碾末用淨水調膏攤於磁蓋內却將艾葉軟為丸

燒艾烟熏蓋內藥乾用沸湯泡丁清以良藥煎藥點

秘方

石斛 母貝

右將細末已含水鼻內啞依左右



良方治諸眼疾

炒甘草二兩 木槿花條一握 揚柳枝一握

右將枝條剉碎末水一椀煎五分去相用汁將石山灰火煎洗

眼無睛

春雷膏 龍木論治肝今不足內受風熱上攻眼目氏暗產痛隱

龍木論治肝今不足內受風熱上攻眼目氏暗產痛隱

皆治之 龍木論治肝今不足內受風熱上攻眼目氏暗產痛隱

龍木論治肝今不足內受風熱上攻眼目氏暗產痛隱

龍木論治肝今不足內受風熱上攻眼目氏暗產痛隱

大角內黑五七遍看病大小用此膏與琥珀膏方並見片腦膏下  
秘方治暴赤眼腫痛隱障難開白日若明推助淚出視  
物不明每用且許點眼大角內少時連點數點大有神効令其藥  
味入頃

去精石一斤為雀巢 桂府滑石一斤為平

黃連十兩 養必十兩切細

龍膽草十兩 苦練根十兩 五倍子十兩

當歸五兩 赤芍藥五兩 大槐子五兩

杏仁五兩 藥仁五兩搗破 柳枝二斤切三寸許

柳枝二斤切三寸許

多精不至五倍子七味用大鍋盛水二大桶煎至一半去滓將

細生絹濾過藥器盛放又當歸至柳枝七味亦用水二桶煎至

一半去滓再將細生絹濾過亦用藥器盛放白沙蜜五斤先用

小油熬鍋內慢火煉蜜子色為度將前一次煎成藥水同煎

數沸再用生絹濾過再熬至一半入銅鍋內下鴨砂五兩猪膽

六者五个區火煎用紙封不住手預熬成稀膏除二片於磁





原件短缺



器內盛放一宿將土等片膠六錢研細入藥內攪勻用油紙封固一宿名為片膠膏。下瀝其石六兩黃丹六兩用水飛過研砂九錢甲鹽九錢每硝九錢銅礬九錢控粉三錢粉霜三錢俱研細用水一梳用細生絹濾過盡入前煎成三斤藥內將鐵不柱手攪慢火再熬成稀膏又除二斤半用磁器內盛放一宿中用七等片膠一錢麝香一錢研細入藥內攪勻將油紙封固一宿名為紫金膏。以稠細半兩為麝末用水一大梳煎數沸去滓不用入煎熬成稀膏半斤內又下炒其石二兩黃丹二兩用水飛過將鐵錘不住手攪前成稠膏下卜等斤膠一錢麝香一錢研細入藥內攪勻於磁器內盛放名為稠膏。

修煉渣并石黃丹之法

炒其石不拘多少研碎每須木炭火凍通亦用黃連水煎七次水飛淘丁為塵用之  
黃丹不拘多少鐵餅內炒赤色用水飛過淘丁為塵用之

五臟內外所因證治

人身之有形於外者必有諸內故五臟之受病於內而發於外者必見之於耳鼻舌口牙之間心經道熱則口舌生瘡唇口裂折脾與胃相通故受熱則噎氣臭穢腎受冷則耳不能聽或兼風則牙痛頰腫肝受風初則皮毛癢瘡積遺則眼為腫痛受病則目不能視髮乃此之餘焦枯者血不是也此皆病在內而應乎外也凡有其証必須考其源自來辨其冷熱虛實治之

積殼散

三因方治焦傷肝氣痛引兩脇

防風去苦

枳殼麩炒

乾薑一兩半

枳梗炒各四兩

細辛

甘草多二兩

右以咀每服四錢水三盞姜三片煎七分空心服

枳實散

三因方治肝氣不足兩脇疼痛

枳實一兩

人參各半兩

白芍藥炒

雀腦膏

右為末每服二錢姜湯酒任下



三因方治膽實執思寒腹滿腸下堅硬口苦咽乾  
半夏三兩湯洗七次

生地黃五兩 黃芩一兩 遠志去心姜汁合炒

茯苓各二兩 甘草多一兩

右父咀每服四錢水一盞炒糯米一捻姜七片煎服

三因方治心經實熱瘰癧滿發渴煩悶喘急

黃連去須二兩 半夏三兩湯洗七次

黃芩 甘草多 人參

乾姜炮各一兩

右父咀每服四錢水一盞棗三個煎七分服

三因方治肺氣虛寒兩脇脹滿

栝子仁炒 白芍藥 茯苓去木

防風去芦 桂心不見火 當歸去芦酒浸

芎藭 細辛兆去土葉 附子炮各二兩

甘草炙半兩

右父咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

三因方治肝氣實熱煩悶不睡

茯苓去木 酸棗仁炒去殼 遠志去心炒

栝子仁炒別研 防風去芦各一兩 生地黃

枳殼去白各半兩 青竹茹二錢半

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九不拘時熱水下

三因方治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏遇事多驚

茯苓去木 黃芩去芦 五味子

栝子仁炒各一兩 人參 酸棗仁炒

白芍藥 熟地黃洗 桂心不見火

甘草炙各半兩

右父咀每服四錢水一盞半姜五片煎八分服不拘時

三因方治肝氣實熱頭眩目眩服亦心煩

柴胡去芦 地骨皮去木 玄參

羚羊角鎊 甘菊花去梗 赤芍藥

黃芩各一兩 甘草炙半兩

右父咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時



玄參升麻湯 濟生方治心脾壅熱舌上生瘡頰頰腫痛

玄參

赤芍藥

升麻

犀角鎊

桔梗去芦

貫仲洗

黃芩

甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服

玄參湯 濟生方 方載喘急門治肺癰咳唾膿血喘急

五加皮去木 生地黃 玄參

黃芩

羚羊角

石膏

赤茯苓

通草

甘草炙

麥門冬去心各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分不拘時服

桔梗湯 濟生方 方載咳嗽門治肺癰咳唾膿血咽乾多渴

用細黃耆三兩生為末每服三錢水一盞煎溫服

積氣喘方 本事方治肝積氣滯在右脇下遇病作則右邊手

足頭四肢痛

乾葛

麻黃七錢半

側子一个

川芎

甘草

羌活

防風

枳實

芍藥

桂枝

當歸各四兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎五分熱服有汗

升麻湯 本事方治肺壅吐膿血作臭氣

升麻

桔梗

薏苡米

地榆

黃芩

牡丹皮

芍藥各五錢

甘草七錢半

右咬咀每服五錢水一盞煎七分日三服

心脾壅熱生疔古種脹 本事方

玄參

升麻

大黃

犀角各七錢半

甘草半兩

右為末每服三錢水一盞煎五分溫服

桂枝散 本事方治因發多傷肝兩脇疼痛



枳殼一兩

桂枝半兩

右為末每服一合姜棗湯調下

**後附石**

本事方治腎氣上攻頭項不能轉移

以大附子一枚炮去皮脐為末每用二錢以楮二十粒用白麵填

滿瓶口水蓋半姜七片前七分去皮入鹽空心點服

**治脾寒不可忍**

本事方

陳菜更一兩

粉炒赤

浮物各一兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服二十九溫酒塩湯任下

**治脾寒**

本事方用荔枝核為末每服一合熟醋湯調

**東京五先生治厚皮方**

本事方

巴豆九罌內炒青 杏仁炒青

牽牛各半兩

陳皮一兩去白

右為末醋細丸如粟豆大每服十九生薑湯下婦人血氣醋湯下

產後氣痛及瀉下五九酒食傷隨勿下

**東青膏**

本事方治肺積左右脇下大如作癢為痛症

陳皮

枯皮

右前二味為末入薑麻研勻煮棗內和丸如梧桐子每服五七

**桂枝散**

直指方治脾積氣痛

香附玉兩去毛

蓬木醋煮焙

良姜

桂花

甘草一兩

右為末每服一錢空心沸湯塩點服

**良姜散**

直和方治脾寒

良姜切片先用姜棗更慢火炒次入東洋向日壁土不經雨

者同炒再以米醋同炒至棗更黑為度

右只用良姜為末每服一合空心米飲調服

**葉氏清心丸**

簡易方治心受邪熱精神恍惚狂言叫呼睡卧不寧

人參

蝟梢

生地黃

天麻

天南星為末入黃牛

膽內令油丸當風吹乾臘月造要用旋取各等分

右為末湯浸蒸餅和丸如梧桐子每服二十九入參湯下

**桔梗散**

大全良方治心氣不足解勞倦益血



桔梗

甘草

黃耆

人參去芦

麥門冬各二兩

青皮五錢

右以咀每服一水水一盞半煎至八分去滓溫服食遠

**子火散**

聖惠方涼心肺解勞除熱便榮衛順血

黃耆二兩

白芍藥

子苓

人參

白茯苓

麥門冬

桔梗

生地黄各五錢

右用竹葉一握小麥七十粒姜三片水二盞煎麥半入藥五錢

煎食後服

**扶神散**

聖惠方治膽熱及腫神思昏悶

扶神去木

麥門冬去心

地骨皮

茯苓各二兩

一方用黃耆

酸棗仁生

沙參

甘草各半兩

白鮮皮半兩

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食遠溫服方有酸棗

角屑

○耳



