

薛立齋醫案全集

辛酉孟夏中游  
跋  
眼

婦人良方卷之四

臨川陳自明編

吳郡薛己註

○婦人血風肢體骨節疼痛方論第一

婦人血風由氣血不足腠理不密風冷乘之以致邪正相搏故骨節

愚按東垣先生云飲食失節脾胃虛弱乃血所生病故口中津液不行若火熱來乘土位故肢體發熱

作渴若肝經血熱用四物羌活黃芩黃柏肝經血虛用逍遙散山梔川芎風濕兼疫用四物南星半夏

羌活蒼朮風濕傷脾用羌活勝濕湯暑濕傷氣用清燥湯氣鬱肝脾用四君木香枳殼橘核胃氣受傷用補中益氣湯瘀血流注用四物桃仁紅花骨痛肋掌用當歸沒藥丸倦怠無力用補中益氣羌活川

附治驗

一婦人自汗盜汗發熱晡熱體倦少食月經不調吐痰甚多二年後遍身作痛陰雨益甚此氣虛而風寒所乘用小續命湯疼痛頓止用補中益氣加味歸脾三十餘劑諸症悉愈

一婦人月經不調且素有偏風遇勞必作用柴半童按痛稍止此氣血俱虛用十全大補加獨活而痛痊用六味丸逍遙散而經調

一婦人肢體作痛面色痿黃時或赤白發熱惡寒吐瀉食少腹痛腸脹月經不時或如崩漏或痰盛喘嗽頭目眩痛或五心煩熱口渴飲湯或健忘驚悸盜汗無寐等症卧床年許患屬肝脾虧損氣血不足所致用十全大補加味歸脾兼服月餘諸症悉痊

芎菊散

川芎 赤茯苓 赤芍藥 酸棗仁炒 桂心 當歸酒 木香

牛膝酒 羌活 枳殼炒 甘草各三 右水煎服

羚羊角散 治血風身體疼痛手足無力

新刻本草綱目

卷之四

羚羊角

酸棗仁炒

生地黃

擣柳絳

五加皮

防風

赤芍藥

當歸酒

骨碎補炒

海桐皮

川芎各五錢

甘草錢

右為末每服一錢溫酒調下

通靈丸 治血風手足疼痛不可忍者

白附子

殭蠶各一兩全蝎炒半兩

麝香一字

右為末煉蜜丸桐子大每服十九酒溫下日三服

當歸沒藥丸

治血風肢體刺痛肋攀骨痺或手足麻木

當歸

五靈脂各一兩炒半兩

右為末醋糊丸桐子大每服三十九薑湯下

虎骨散 治血風走痛或打撲作痛

虎骨

敗鰐板

當歸酒

桂心

牛膝

漏蘆

地龍

歲靈仙

立胡索

自然銅

右為末每服二錢熱酒調下

附方

羌活勝濕湯 治頭痛脊痛腰似折項似扳

羌活

獨活絡一錢

藁本

防風

甘草

蔓荆子

川芎各二錢

右水煎服如身重腰沈沈然

是濕熱也加黃柏一錢附子半錢蒼朮二錢

東垣清燥湯

後方見

四物湯

補中益氣湯

四君子湯

三方見一論

小續命湯

卷第十八論

逍遙散

加味歸脾湯

四卷第六論

十全大補湯

三方見二論

六味湯

卷第十一論

○婦人血風白虎歷節走疰方論第二

婦人血風白虎歷節由體虛風邪乘之隨血而行或浮溢皮膚或卒然掣痛走疰如虎嚙者加減小續命湯主之

愚按東垣云若人身體沈重走疰疼痛此濕熱相搏或風熱鬱而不得伸附著於有形也是症多因飲湯主之

食起居失節或因七情勞役失宜脾胃虧損腠理不密如邪所侵以致內熱晡熱自汗盜汗或經候不調飲食不甘治法濕熱腫滿者清燥湯兼痰佐以二陳湯肝火作痛者加味道遙散肝鬱作痛者加味歸脾湯血虛作痛者四物湯氣虛作痛者四君子湯氣血俱虛者八珍湯俱加羌活川芎月經先期而痛者加味道遙散頭眩倦怠而痛者補中益氣湯大抵按之痛甚者病氣實按之痛緩者元氣虛勞役而痛者亦元氣虛也飲食失宜而痛者脾氣虛也惱怒而痛者肝火盛也若晝輕而夜重者血分病也

與前兼用

### 附治驗

一婦人歷節發熱作渴飲食少思月經過期其脉舉之洪大按之微細用附子八物四劑而痛止用加味道遙散而元氣復用六味丸而月經調

一婦人體肥胖素有熱月經先期患痛風下體微腫痛甚則小便頻數身重脈緩此風濕血虛而有熱用羌活勝濕湯二劑腫痛漸愈用清燥湯數劑小便漸清用加味道遙散內熱漸愈又為飲食停滯發熱仍痛面目浮腫用六君加柴胡升麻而愈又因怒氣小腹痞悶寒熱嘔吐用前藥加山梔木香而安惟小腹下墜似欲去後此脾氣下陷用補中益氣而愈後因勞役怒氣作嘔吐痰遍身痛腫經行寒熱此肝木侮脾土用六君加柴胡山梔腫痛嘔吐悉退後用補中益氣而安

一婦人飲食少思畏風寒患痛風嘔吐寒熱脈弦緊用附子八物而四肢痛愈用獨活寄生而腰痛漸痊惟兩膝腫痛用大防風湯而痛漸愈用歸脾逍遙而元氣復

### 漏蘆散 治走症疼痛

漏蘆

當歸走

牛膝錢三

桂心

地龍去

防風

羌活

白芷

沒藥

甜瓜子各半兩

虎脰骨

敗龜板各一兩

右為末每服二錢熟酒調下

### 四生丸

治骨節作痛或渾身麻痺

白僵蠶炒去地龍土

白附子

五靈脂

草烏去皮大各等分

右為米糊丸桐子大每服二

十九茶清送下酒調服亦可

麝香丸 治歷節諸風走痛或如蟲行

大川烏三个去皮尖生用

全蝎二十一个黑豆二十粒

地龍五錢

麝香一字右為米糊丸菉豆大

每服十九溫酒下 許學士云于得此方凡歷節及不測疼痛一二服便瘥治一貴婦遍身走痛夜如蟲行三服而愈

附子八物湯 治歷節痛如鍼鋸

附子炮

乾薑炮

芍藥炒

茯苓

人參

甘草

桂心各五分

白朮 右水煎服一方去桂用熟地黃二錢

獨活寄生湯方見後

小續命湯方見後

一婦人兩踝作痛上行膝髀肩肘痛如鍼鋸至夜尤劇六脈皆緊一劑而愈又節安人夏月患此人迎脈虛此因暑而得用酒蒸黃連一服亦安

附方

東垣清燥湯 治元氣虛濕熱乘之遍身酸軟或肺金受邪絕寒水生化之源腎無所養小便赤少大便不調腿腰痠軟或口乾作渴體重麻木頭目眩暈飲食少思或自汗盜汗肢體倦怠胸滿氣促

黃芪一錢五分

五味子九粒

炒黃連炒

神麴炒

猪苓

柴胡

甘草候五分

蒼朮

白朮炒

麥門冬

法

陳皮炒

生地黃

澤瀉各五分

白朮

人參

當歸酒

丹麻各三

黃柏酒一分

右水煎服

二陳湯方見卷第五論

四十

四物湯

八珍湯

加味道遜散

加味歸脾湯方見卷第四論

四十

四物湯

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

六味丸

方月二十一論

羌活勝濕湯

方見前

大防風湯

方見二十四論

卷第九論

婦人血虛癰癧癰痒方論第三

婦人癰癧癰癧五心煩熱乃血風攻疰用參荆芥散消風散道遙散大抵因體虛風寒相搏亦屬血分而白屬氣分也經云汗出見濕乃生痤瘡凡人汗出不可露卧沐浴使人身振寒熱致生風癬也

愚按前症有身發疣瘡或如丹毒痒痛不常或濃水淋漓發熱煩渴或頭目昏眩日晡益甚或寒熱發熱月經不調皆肝經風熱血燥用加味小柴胡湯氣血俱虛八珍加柴胡丹皮若夜間發熱作渴譴語乃熱入血室用小柴胡火血燥用加味小柴胡後用加味道遙散調理若鬱結食少體倦內熱晡熱乃脾經血燥用加味加生地血虛四物合小柴胡後用加味道遙散調理若鬱結食少體倦內熱晡熱乃脾經血燥用加味歸脾湯寒熱加山梔熟地若遊走癰瘡乃血風走注用何首烏散血虛道遙散風熱消風散若專用風藥復傷陰血必致筋掣等症

附治驗

一婦人身發疣瘡或如丹毒痒痛不常搔碎成瘡濃水淋漓發熱煩渴頭目眩暈日晡益甚此血虛內熱之症以當歸飲加柴胡山梔治之而愈

一婦人患前症肢體疼痛頭目不清自汗盜汗月水不調肚腹作痛食少倦怠先用參荆芥散後用逍遙散治之而痊

一婦人因忿怒身發疣瘡憎寒發熱余謂肝火用小柴胡湯加山梔黃連治之而愈後口苦舌痛小便淋漓復用前藥全愈

一婦人患前症發熱夜間譴語此血分有熱以小柴胡湯加生地治之而安後用四物湯加柴胡山梔丹皮而熱退又用逍遙散全愈

一室安年十四天癸未至身發赤斑痒痛左關脈弦數此因肝火血熱以小柴胡湯加山梔生地丹皮治之而愈若因怒而致者亦宜治以前藥

治驗見二  
四卷血風門

何首烏散 治皮膚癩痒遊走無定

何首烏

防風

白葵藜炒

枳殼炮

天麻

僵蠶

胡麻炒

羌蔚子

蔓荆子各一錢

茵陳五分

右水煎服

附方

四物湯

四君子湯

二方見二  
四卷第六論

加味小柴胡湯

小柴胡湯

二方見二  
四卷第六論

八珍湯

四方見二  
四卷第二論

加味歸脾湯

加味逍遙散

方見二  
四卷第七論

逍遙散

四方見二  
四卷第四論

當歸飲

方見二  
四卷第六論

清風散

方見二  
四卷第七論

八參荊芥散

方見二  
四卷第三論

婦人虛風頭目眩暈方論第四

婦人頭眩由氣虛風入於腦循脉引於目系目系急而然也邪甚則必癲素問云頭痛癲疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙招搖目眩耳聾下實過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則暈徇蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀故肝厥頭痛不同也

愚按丹溪先生云眩者言其黑運旋轉其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟船之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也若風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重澀此四氣乘虛而眩暈也若鬱結生痰而暈暈者此七情虛火上逆也若淫慾過度而眩暈者此腎氣虛不歸源也若吐衄漏崩而眩暈者此肝虛不能攝血也有早起眩暈須臾自定者元氣虛也正元飲下黑錫丹傷濕頭運用腎著湯加川芎有痰用青州白丸子頭風風熱也久則目昏偏頭風相火也久則目翳便澁皆宜出血以開

表之。竊謂前症肝虛頭暈用釣藤散腎虛頭暈六味丸頭暈吐痰養正丹不應八味丸血虛四物參苓白朮不應當歸補血湯氣虛四君歸芪不應益氣湯肝木實濡青丸虛用地黃丸不應川芎散脾氣虛二陳參丸柴胡升麻不應益氣湯加茯苓半夏脾胃有痰半夏白朮天麻湯風痰上壅四神散發熱惡寒八物湯七情氣逆四七湯傷濕而暈除濕湯

附治驗

一婦人素頭暈不時而作月經遲而少此中氣虛弱不能上升而頭暈不能下化而經少用補中益氣湯而愈後因勞仆地月經如湧此勞傷火動用前湯加五味子一劑而愈前症雖云氣無所附實因脾氣虧損耳

一婦人內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下詳見六卷第十六論

養正丹 治虛風頭眩吐涎不已蓋此藥升降陰陽補接真氣非止頭眩而已

黑鉛 水銀 硫黃研 碎砂兩研 右用砂器鎔鉛下水銀攪勻離火少時入硫砂再攪候冷為末飯丸菉豆大每服三十九粒心服煎棗湯下

釣藤散 治肝厥頭暈

釣藤鉢

陳皮炒

半夏製

麥門冬法

茯苓

茯神去木

人參去蘆

甘菊花

防風各一

甘草炙三分

石膏煅二錢

右薑水煎

川芎散 治肝腎虛風頭目眩暈或頭痛耳鳴目赤緊急

小川芎

山藥

白茯神

甘菊花野菊不用

人參各半

山茱萸肉兩

右為末每服二錢

酒調日三服

三五七散 治八風五痺肢體不仁或風寒入腦頭痛目旋耳內蟬鳴

附子炮

細辛各三

乾薑炮

山茱萸各五

防風

山藥炒各七兩

右為末每服二錢溫

四神散 治血風眩暈頭痛寒熱唾液

菊花

當歸酒

旋覆花葉

去梗芥穗錢各一

右葱白三十茶末一錢水煎

門方 治血風頭旋或不知人事用喝起草嫩心陰乾為末酒服二錢其功甚效即前蒼耳散

治頭旋如天動地轉名曰心眩膽轉一兩細研用麵餅劑一個拌勻勒如骰子大瓦上焙乾每服一錢為末燈芯竹茹煎湯調下此去痰之法當審而用之

附方

正元飲 治下元虛敗痰氣上壅頭目眩暈臟腑滑泄時或自汗手足逆冷霍亂轉筋等症

紅豆

炒二錢

人參去蘿蔔三兩

附子炮去皮一兩

茯苓一兩

甘草炙各二兩

肉桂五錢

川芎

山藥

蜜汁炒

烏藥

乾葛各一兩

白朮二兩

乾薑炮三錢

黃芪炙半兩

右每服三錢蜜漬水

入鹽少許煎送黑錫丹

黑錫丹 治真陽虛敗痰氣壅塞心火炎熾或赤白帶下等症

肉桂

沈香

附子炮去皮臍

葫蘆巴酒浸破故紙炒

茴香炒

肉荳蔻炒

六味丸

陽起石

研水飛

金盞子

蒸去皮核

木香各一兩

硫黃

黑錫去灰各二兩

右將黑錫硫黃入铫內煉結砂

子傾出地上去火毒研細餘藥為末和勻再研至黑光色酒糊丸桐子大陰乾入布袋擦令光潤每服四十九

腎著湯

方見十五

卷第八論

青州白丸子

方見三卷

第四論

六味丸

八味丸

二方見二十四

卷第十一論

當歸補血湯

方見十六論

四物湯

卷第二十論

四君子湯

卷第二十一論

補中益氣湯

三方見二十

四卷第六論

二陳湯

方見二十四

卷第五論

瀉青丸

方見二十一

論第三論

卷第十四論

八物湯

方見二十四

卷第四論

四七湯

方見十七

論第七論

卷第十一論

瀉青丸

方見二十一

論第十二論

卷第十一論

瀉青丸

方見

婦人血風頭痛方論第五

許學士云婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車船之上蓋因肝經血虛而風邪襲之爾用川芎當歸散若頭痛連齒時發時止連年不已此風中腦謂之厥逆頭痛宜白附子散及灸曲鬚穴在耳掩前正穴上灸七壯左痛灸左右痛灸右

愚按東垣云足太陽頭痛脉浮緊惡風寒川芎羌活獨活麻黃為主手少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主足陽明頭痛身熱目疼鼻乾惡寒發熱脉浮緩而長升麻湯或石膏白芷為主手太陽頭痛有痰體重或腹痛為痰癰脉沈緩蒼朮半夏南星為主足少陰經頭痛足寒氣逆為寒厥脉沈細麻黃附子細辛湯為主足厥陰頭項痛或吐涎沫厥冷脉浮緩吳茱萸湯主之諸血虛頭痛當歸川芎為主諸氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣少加川芎蔓荆細辛痰厥頭痛半夏白朮天麻湯厥逆頭痛羌活附子湯如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治若脉雜亂而病見不一且補胃

附治驗

二婦人因勞耳鳴頭痛體倦用補中益氣加麥門五味而痊三年後得子因飲食勞倦前症益甚月經不調晡熱內熱自汗盜汗用六味地黃丸補中益氣湯頓愈經云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也故脾胃一虛耳目九竅皆為之病

一婦人兩眉棱痛後及太陽面青善怒此肝經風熱之症用蓮奇湯合逍遙散加山梔天麻黃芩半夏黃芩而愈此症失治多致傷目或兩耳出膿則危矣頭痛手掉身麻見一卷第五論

川芎當歸散

川芎	當歸	羌活	旋覆花	細辛	蔓荆子	防風
石膏	桂枝	藁本	荆芥穗	半夏麯	生地黃	甘草

白附子散 治風邪風痰頭痛遠齒不時舉發或遠年不愈

麻黃根節

烏頭炮去

南星炮各半兩

白附子炮一錢

金竭炒五兩

辰砂

麝香

白薑炮各一錢

右為末酒調服三分卧少時

川芎茶調散

治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛

薄荷八兩

川芎

荆芥各四兩

羌活

白芷

防風

甘草二兩

細辛一兩

右為末每服二錢食後茶清調

如聖餅子加細辛其效甚速

若頭痛筋繩手骨重少氣微噫腹滿咳嗽煩冤其脉擧之則弦按之石堅由腎

氣不足而逆上謂之腎厥頭痛宜玉真丸疏黃丸

疏黃丸

治頭風不間新久服此除根屢用犀效

硫黃二兩

硝石一兩

右為末滴水丸指頂大每服一丸空心細嚼茶清下

方用生菜菔汁仰卧注兩鼻數年之患一注即愈

方治風邪犯脣患頭痛不可忍不間年歲

硝石

人中白

腦子等

右為末用一字吹鼻中

都梁丸

治產前產後風邪所傷頭痛頭暈方見後

附方

調中益氣湯

治氣血俱虛而頭痛

芍藥二分

升麻二分

黃芪一錢

甘草五分

五味子七分

當歸

白朮

人參三分

柴胡

橘皮各二分

右水煎

半夏白朮天麻湯

半夏半錢

白朮

神麴炒各一錢

天麻

黃芪

人參

蒼朮

陳皮

澤鴻

桔芩分五

大麥蘖半  
乾薑分三

黃柏製分二

右每服半兩水煎

羌活附子湯

麻黃

黑附子炮

白芷

白僵蠶

黃柏各三

羌活

蒼朮各五

防風

甘草

升麻各五

黃芪分五

右水煎服

還奇湯 治風熱上壅眉棱骨痛或頭目眩暈

羌活

防風各三

甘草二錢夏生冬炒

黃芩酒製冬去之

右每服三錢水煎時服

吳茱萸湯

補中益氣湯

升麻湯

六味丸

麻黃附子細辛湯

逍遙散

方見二十四

卷第十四論

第十二論

卷第四論

頸項強痛方論第六

夫頸項屬足太陽膀胱足少陰腎二經相為表裏若感風寒濕氣則發熱惡寒頸項強急腰背反張癢飛口噤脉沈遲弦細新產血虛出汗多患此症若因鼾睡失枕而致用三五七散追風散若風邪所傷用都梁丸木瓜煎

愚按東垣云肩背痛不可回顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之竊謂前症若因肝木自旺用瀉青丸精血不足六味丸風熱溼肝加味逍散怒動肝火加味小柴胡湯肝經血虛加味四物湯腎不能生肝六味丸膀胱氣滯羌活勝濕湯大抵肝火旺則肝血虛而筋燥頸項強急或腰背反張或四肢拳攣或頭等處結核

附治驗

一婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口苦月經不調此肝膽經火兼傷脾胃用四君加柴胡升麻黃芩芍藥而愈後因勞役怒氣嘔吐脇脹用六君子湯加山楂柴胡而安一婦人因怒寒熱作渴左目緊小頭項動掉四肢抽搐遍身疼痛此血虛肝熱則生風也用加味道逍

加釣藤鉤數劑諸症漸愈又用八珍湯而痊

追風散 治風邪所乘頭目眩痛口眼歪斜牙關緊急或一百節疼痛鼻塞聲重項背拘急皮膚癢庠面若蟲行。

川烏炮去皮膚尖

石膏煅

川芎

甘草炙

荆芥穗

白僵蠶炒去殼

各一兩

天南星

羌活

地龍去土

白附子炮

全蝎去尾

白芷各半兩

草烏炮去皮膚尖

沒藥研

乳香研

雄黃研各一錢

右為末每服五分用清茶少許食後臨卧調下

都梁丸

治諸風項背不利頭目眩暉腰背作痛或產前產後傷風頭目暉重血風頭痛用白芷末蜜丸

殼子大每服一丸細嚼荆芥煎湯下

木瓜煎

木瓜不犯鐵器二個

沒藥研

乳香研

右以木瓜去核入二藥仍蓋合之飯上蒸爛研成膏每服三

匙生地黃汁半盞無灰酒和服有人患此自午發至夜方止余曰此足少陰經症發必先從足起蓋足少陰之經自足大指起至頭筋者肝之合也日中至夜天之陽陽中之陰又曰陽中之陰肺也自離至兑陰旺陽弱之時故靈寶畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣故發於是時余受此方三服而愈

附方

漏青丸方見二十四卷第三論

六味丸

方見二十一卷第十一論

八珍湯

加味道逍散二方見二十四卷第四論

加味小柴胡湯

方見二十四卷第二論

加味四物湯

四君子湯二方見二十四卷第六論

羌活勝濕湯

方見

婦人腰痛方論第七

夫腎主於腰若婦人腰痛由腎氣虛弱外感六氣內傷七情皆能致之如因風邪所乘用小續命湯加桃

仁杜仲如因寒濕所傷五積散腎經虛弱青娥丸如因氣血凝滯用牽牛茴香之類

愚按陳無擇先生云若形體虛羸面色黧黑腿足痿軟不能行立此失志所為也腹急脹脹目視睭睭宗筋弛縱白淫下注此鬱結所為也肌肉不仁飲食不化腸胃脹滿閉塞腰脇此憂思所為也皆屬於外因也竊謂前症失志腎虛熱者六味丸腎虛寒者八味丸鬱怒傷肝實用龍膽瀉肝湯虛用六味丸補肝散憂慮傷脾者歸脾湯道遙散腎着者寒則朮附湯虛則腎着湯腰膝痛者寄生湯養腎散瘀血滯者如神湯舒筋湯房勞腰痛者青娥丸十補丸

附治驗

一婦人腰痛三年矣每痛必面青頭暈目翳余以為肝脾氣虛用補肝散而愈三年後因勞役患頭痛兼惡心用補中益氣湯加茯苓半夏蔓荆子而愈

一婦人苦腰痛數年不愈余用白朮一味大劑服不三月而痊乃胃氣虛閉之症故用白朮也

如神湯 治男婦腰痛

延胡索 當歸 桂心等 右為末每服二錢溫酒調其者不過數服

獨活寄生湯 治足三陰虛風濕所侵脚膝蓋臍節作痛

獨活 桑寄生 續斷酒 杜仲薑汁 細辛

茯苓

白芍柴炒

桂心 續斷酒 杜仲薑汁 紆辛

川芎

細辛 牛膝 秦艽

當歸

粉草破洛

右水煎

當歸拌酒

粉草破洛

右水煎

舒筋湯 治風寒傷腎督作痛或因挫氣滯血瘀亦良

玄胡索炒

杜仲鹽汁

官桂皮

羌活

芍藥等

右為末每服二錢酒調

又方橘核炒木香研酒下

濟生丸附湯 治寒濕傷腎腰重冷痛小便自利或手足逆冷

附子炮

白朮各一兩

杜仲半兩

右每服四錢薑水煎

三因腎養湯 治腎虛為病身重腰冷如水洗狀不渴而小便自利飲食如故腰以下冷痛如帶數千錢

茯苓

白朮各四兩

乾薑炮

甘草二兩

右每服四錢水煎空心服

青娥丸 治腎虛腰痛或外邪所侵腰腿或筋骨作痛

胡桃仁一枚

蒜研膏四兩

破故紙八兩

酒浸炒

杜仲去皮一斤

薑浸炒

右為末。膏丸桐子大。每

服五十九空心醋湯下亦可

六味丸

十補丸

八味丸

三方見二十一論

龍膽瀉肝湯

方見二十四卷第六論

補肝散

方見十七卷

歸脾湯

逍遙散

方見二十卷第四論

養腎散

方見後

婦人腰脚疼痛方論第八

腎於腰脚女人胞絡係焉若勞傷損腎氣風冷客於脉絡故腰脚作痛也治當補元氣為主佐以祛邪之劑愚按前症若真陽衰敗寒邪乘襲手足俱冷頭痛惡寒或嘔吐腹痛等症宜用本方若氣血虛弱寒邪所感惡寒發熱頭痛作渴或嘔吐腹痛等症宜用五精散若元氣虛弱濕熱所傷兩脰腫痛寒熱身疼或嘔吐不食等症宜用慍蘇敗毒飲若元氣虛弱脾虛胃弱寒熱嘔吐發熱頭痛喘渴體倦等症宜用補中益氣湯若足三陰精血虧損陰火內動內熱喘熱作渴痰甚小便頻數等症宜用六味地黃丸若足三陰陽氣虛敗惡寒發熱手足俱冷吐痰不食二便滑數等症宜用八味地黃丸

附治驗

一婦人先腰脚作痛後兩腿亦痛全以為足三陰虛寒外加所傷用小續命湯及獨活寄生湯或作或

止所用飲食極熱腹中方快余曰邪氣去而元氣虛寒也。診其脈果沈細用養腎散漸愈又用十補丸而痊。

一婦人所患同前症但發熱作渴喜冷飲食脉洪數按之遲滯余以為血虛有熱用養胃散去檳榔加白朮茯苓散數劑更用加味道遙散而瘥。

一婦人患前症時或腿膝作痛脉浮數按之遲緩此元氣虛而風濕所乘用獨活寄生湯頓愈又用八珍湯而安。

一婦人因怒患前症寒熱往來口苦不食。晡熱內熱余以為肝火血虛先用小柴胡山梔頓愈又用加味道遙散而瘳。

一婦人患前症寒熱頭痛殊類傷寒此寒邪之症用檳蘇敗毒散而安。又補中益氣調補而愈。

骨碎補散 治陽氣虛弱外陽所侵腰腳疼痛腹脇拘急

骨碎補炒 藥薢酒炒 檳榔各五分 附子炮 川芎 桃仁去皮 大 桂心 當歸酒拌

養腎散 治腎經虛弱風寒所傷以致腰腳疼痛不能步履

蒼朮一兩 乾蝎錢 天麻 草烏頭炮去皮尖 黑附子炮去皮臍 各二錢

麻痺少時隨愈至婦勿服此治風寒傷腎膀胱虛寒之良藥用之得宜殊有神效。

附方

五積散方見後

卷第十一論

橫蘇敗毒散方見二十四

卷第十一論

十補丸

六味丸

八味丸三方見二十四

卷第十一論

小續命湯方見前

獨活寄生湯方見前

羚羊角散方見前

加味道遙散

八珍湯二方見四卷第四論

小柴胡湯方見二十四

婦人風邪腳氣方論第九

婦人脚氣乃肝脾三經或胞絡氣虛為風毒所搏腎而患蓋胞絡屬於腎主於腰脚三經絡脉起於足中指若風邪客於足從下而上動於氣數名腳氣皆由六淫七情或產後或經行風毒相搏其症或頭痛身熱肢節作痛或大便秘結小便不利或脚膝酸弱足脰腫滿或腰膝枯細忪憒嘔逆或小腹不仁舉體轉筋或胸滿氣急遍體酸痛用香蘇散加檀榔生薑若寒中三陽必冷用小續命湯若暑中三陰必熱用小續命湯去附子大躁者紫雪最良無紫雪以自合薄荷煎冷水調服大便秘用脾約丸麻仁丸三和散補藥淋洗皆大禁也。

愚按嚴用和先生云前症初患不覺因他病乃發先從脾起或緩弱痺痛不能行履或兩脰腫滿或足膝細小或心中怔忡或小腹不仁或舉體轉筋或見食作嘔或胸滿氣急遍體酸痛其脉浮而弦者因於風濡而弱者因於濕洪而數者因於熱運而濶者因於寒男子由於腎氣損虧女子血海虛弱用八味丸若飲食停滯脣脛瘦脹浮腫作痛此脾氣下陷用六君子少加柴胡升麻不應須用八味丸若發熱口渴月經不調兩腿無力此足三陰血虛火燥用六味八味二丸兼服前症西方之人多患之因素食乳絳脾胃壅滯脛足腫滿至於南方亦有因膏粱厚味濕熱下注而患者故古人謂之壅疾所用之方多疎通發散之劑然感於房勞過度虧損三經治法又當以固本為主故六物附子為元氣虛弱寒邪內侵之聖藥所屬各經等方附後。

附治驗

一婦人兩膝赤痛寒熱口苦嘔吐懶食面色青黃或赤此肝木乘脾土用小柴胡湯加山梔升麻桔芩二劑頓愈又用六君子湯加柴胡山梔全愈

一婦人飲食勞役兩膝兼腿疼痛或時寒熱余以為脾虛濕熱下陷用補中益氣湯加山梔茯苓半夏治之而痊後復作用六君子湯加柴胡山梔全愈

一婦人經行後寒熱頭熱內服作痛此肝經虛也用加味逍遙散加山梔治之而愈後因勞日暉內熱

骨脂二腊調補脾胃而漏止食進又用補中益氣湯升舉元氣而痊

大腹皮散 治腳氣肢節煩疼心神壅悶或頭暈喘噦不食

大腹皮

紫蘇

木通

桑白皮

羌活

荆芥

赤芍藥

青皮

木瓜

不犯鐵器

獨活各五分

枳殼

麸炒一錢

右薑水煎

半夏散

薑各五分

陳皮

人參

大腹皮

桂心各三分

檳榔

赤茯苓

桑白皮

炒

郁李仁去皮赤茯苓各一錢

木香

防己酒

大腹皮

紫蘇子炒

桑白皮散

治兩脚浮腫小便赤澁腹脹滿或喘嗽痰湧嘔吐不食

桑白皮

炒

郁李仁去皮赤茯苓各一錢

木香

防己酒

大腹皮

紫蘇子炒

附方

大黃左經湯 治四氣乘注足陽明經以致膝腿作痛或足脰赤腫嘔吐不食大小便祕結或惡食喘急

自汗等症

細辛

茯苓

羌活

大黃

煨

甘草

炙

前胡

枳殼炒

厚朴

薑

黃芩

炒

杏仁

去皮尖等分

右每服五錢

薑棗水煎

麻黃左經湯 治風寒暑濕乘注足太陽經以致腰足痙痙肢節重痛或憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡

風頭疼

麻黃

葛根

細辛

白朮

茯苓

防己酒

桂枝

羌活

甘草

防風 右每服半兩薑棗水煎服

半夏左經湯 治足少陽經為風寒暑濕乘注以致惡寒發熱腰腿疼痛或頭目眩暈嘔吐不食或熱悶心煩腿痺不隨

半夏

薑製

乾葛

細辛

白朮

麥門冬

芩

桂枝

防風

乾薑

黃芩

小草

甘草

柴胡

右每服半兩薑棗水煎熟

悶加竹懸喘急加杏仁桑白皮

六物附子湯 治四氣乘於足太陰經以致骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利或手足浮腫

附子

炮

桂

防己

錢各四

甘草

炙二錢

白朮

茯苓

各三錢

右每服半兩薑棗水煎

換腿丸 治足三陰經為風寒暑濕之氣所乘發為掌痺緩縱或上攻胸背下注脚膝疼痛發熱行步難

薏苡仁

南星

石楠果

石斛

檳榔

薑薢

川牛膝

浸酒拌

羌活

防風

木瓜

兩各四

黃芩

當歸

酒拌

天麻

續斷

酒炒各二兩

右為末酒糊丸如桐子大每服五十丸鹽湯下

五積散 治風寒所傷以致脚氣疼痛或寒熱拘急嘔吐不食等症

當歸

酒井

芍藥

炒

川芎

炮薑

人參

茯苓

陳皮

桔梗

炒

厚朴

薑製

白芷

蒼朮

半夏

薑

肉桂

麻黃

甘草

分合五

右薑棗水煎

當歸拈痛湯 治濕熱為病肢節煩疼肩背沈重胸膈不利或兼遍身作疼足脰腫痛不可忍者或濕熱流注下部瘡瘍赤腫

羌活

人參

苦參

酒製

升麻

乾葛

蒼朮

錢一

甘草

庚苓酒

當歸

茵陳

酒製

各方風

知母酒

澤瀉

諸苓

右水煎服

柴蘇子湯 治脚氣上攻陰陽爻錯清濁不分上重下虛中滿喘急嘔吐自汗無復紀律

柴蘇子微炒半夏  
二兩薑製各前胡

厚朴蓮

甘草炙

當歸酒拌各  
二兩桂心

皮陳 右每服四錢入薑姜煎服

還少丹方見二十三  
卷第四論

六味丸

八味丸

方見二十一  
卷第十一論

小柴胡湯方見二十四  
卷第二論

六君子湯

補中益氣湯

方見二十四  
卷第六論

加味逍遙散方見二十四  
卷四論

全書十六冊

# 新編駁案

這部書

司法官讀之……便是他的顧問官  
大律師讀之……便是他的老先生  
訴訟人讀之……便是他的辯護士  
受冤人讀之……便是他的救命軍

真正法界之明星

讞案之南鍼

訴訟之寶鑑

律例之秘笈

本編自前清乾隆元年起凡關於刑名上各宗駁案莫不廣為搜羅卒局復聘請法律專家將民國五六年間所有駁正案件擇要彙輯而成書中所載各案如·逆內·倫駁傷·蒸骨檢驗·爭產離婚·誣告陷人·圖財害命·監守自盜·毒藥迷人·劫財越貨·盜竊奸淫等事怪怪奇不勝枚舉處處根據法律事事援引條例平允周詳誠法學獨一無二極先備之善本也

臨川陳自明編

吳郡薛 己註

新都吳中珩校

婦人勞瘵各症方論第一

吳郡薛 己註

夫骨蒸瘈瘧復連尸疰勞疰蟲疰毒疰熱疰冷疰食疰鬼疰疰者注也。自上注下與前人相似故曰疰其變有二十二種或三十六種或九十九種令人沈沈默默寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁或腹中有塊或腦後兩邊有結核咳嗽膿血下利羸瘦死而傳疰甚至滅門更有蜚尸遺尸寒尸喪尸口注謂之五尸人為其疰者不自知所苦雖有裡骨獺肝天靈蓋等方未嘗見效唯崔氏灸法早用有濟若寒熱自汗面白目乾口苦神昏善恐不能獨卧傳在肝也若寒熱面黑鼻燥善忘大便祕滯口舌生瘡傳在心也若寒熱面青唇黃舌本硬強言語不出飲食無味羸瘦吐涎傳在脾也若寒熱面赤鼻白乾燥毛折咳嗽喘急吐涎膿血傳在肺也若寒熱面黃耳焦脚脣瘦痛小便白濁遺瀝腹痛傳在腎也。

愚按前症誠然有之故葛仙翁用獺肝一具陰乾杵末水下方寸七日三服未愈再作宋宣和間一法師善考訛鬼怪時一婦以疾投狀既而如有鬼祟所附曰非我為患乃病人命自衰耳凖今已成蟲食肺故令吐血聲嘶又屢惊聞彼所畏何物云以獺爪為末酒服之則去矣患者如其言得瘧獺爪即獺肝之類段玄珠云蟲療多有兄弟互相傳染甚至絕戶此乃冤牽相纏及風水所致雖有符文法水下蟲之方然蟲去而人亦亡若能平素保養亦可免矣竊究濟生微旨云益氣補肺益精補腎皆資真化源也蓋人之精血常不足加之數奪其真資化失常則胃氣不固精神滑脫不能上接陽氣故頭重或痛氣弱而食少元氣下陷脉即微弱外散欲絕而虛洪或見損脉此實元氣不足所致非有外感賊邪之病也

附治驗

一婦人素勤苦因喪子飲食少思忽吐血甚多而自止此後每勞則吐數口癥症已具形體甚倦午前

以補中益氣。午後以歸脾湯送地黃丸而愈。

一女子患前症。反其唇視有白點。此蟲蝕肺也。余曰。急尋懶肝治之。不信。果咳膿而死。後聞其兄弟三人皆死於此症。大凡久嗽當視其兩唇。若上唇有點。蟲蝕上部。下唇有點。蟲蝕下部。

二十四種蒸病論

附新

所謂勞蒸者。毛折髮焦肌膚甲錯。其蒸在皮。外熱肉寒身振肉瞞。其蒸在肉。髮焦鼻竅或復屎血。其蒸在血。身熱煩躁痛如針刺。其蒸在脉。爪甲焦枯。眼昏腸痛。其蒸在體。頭眩熱悶。涎濁眦淚。其蒸在腦。男子失精。女子白淫。其蒸在玉房。乍寒乍熱。中脘煩悶。其蒸在三焦。小便赤黃。凝濁如膏。其蒸在膀胱。大便秘泄。腹中雷鳴。其蒸在小腸。大腹隱痛。口舌乾痾。其蒸在大腸。口鼻乾燥。腹脹自汗。睡卧不安。其蒸在胃。口苦耳聾。兩脇下痛。其蒸在膽。裏急後重。肛門秘塞。其蒸在廣腸。小腹疼痛。蒸脈縱緩。陰氣自強。其蒸在宗筋。眩暈下。淚躁怒不常。其蒸在肝。舌黑氣短。煩悶澀浙。其蒸在心。唇乾口瘡。胸腹脹悶。畏寒不食。其蒸在脾。咳嗽喘滿。咯痰吐血。聲嘶音啞。其蒸在肺。耳輪焦枯。脚氣瘦痛。其蒸在腎。情想不寧。精物時下。其蒸在右腎。心膈噎塞。攻擊疼痛。仰煩冤。其蒸在膈。此症蟲多噬心肺。治當絕其根。

愚按醫林集要云。前痛若蒸肺。用天麥門冬桔梗紫苑烏梅肉。若蒸皮石膏桑白皮。若蒸氣喘。促鼻乾身熱不安。人參黃芩旋子。若蒸大腸。大黃芒硝。若蒸心。黃連生地黃當歸。若蒸脉熱血。皆用生地黃當歸。童子小便。若蒸小腸。赤茯苓木通生地黃。若蒸脾。芍藥木瓜苦參。若蒸肉弓藥。若蒸胃。石膏粳米大黃芒硝乾葛。若蒸膽。柴胡瓜蔞。若蒸三焦。石膏竹葉。若蒸肝。川芎當歸前胡。若蒸筋。川芎當歸。若蒸腎。生地黃石膏知母。寒水石蓼本。若蒸腸。生地黃防風。若蒸髓。天門冬當歸生地黃。若蒸骨。鱉甲地骨皮當歸牡丹皮生地黃。若蒸玉房。知母黃柏當歸芍藥。若蒸腰。澤瀉伏苓生地黃沈香滑石。若蒸膀胱。澤瀉滑石。凡此諸蒸虛勞熱病。食肉與油膩。房勞飲酒而成者。久蒸不除。變為疳症。即死亦有瘥疾。久而不愈。以致咳嗽失治。漸成骨蒸勞瘵之症。當確標本而治之。

崔氏灸骨蒸勞瘵用細繩一條男左女右從足大拇指指頭齊量起從腳板底當腳跟中心向後引繩循脚肚貼肉直上至曲脊中橫紋截斷。又令患人解髮分兩邊見頭縫自顙門平分至腦後乃平身正坐取前所截繩一頭從鼻端齊引繩向上直循頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引繩向下至純盡處當脊骨以黑點記此黑點不在此是矣別取一繩令患人合口將繩按於口上兩頭至吻却釣起繩中心至鼻端根下如人字樣齊兩吻繩斷將此繩展直於前在脊骨上黑點處取中橫量勿令高下於繩兩頭以白圈記之此是灸穴累及至百壯此名患門穴初灸此訖次令其人平身正坐稍縮臂膊取一繩繞項向前雙垂與鳩尾齊鳩尾是無是岐骨胸前兩岐骨骨間量取一寸即是鳩尾也即截斷却背翻繩頭項後以繩中停取心正令當喉嚨結骨上於第二次墨點處摺中橫量繩兩頭以白圈記之此是灸穴初灸至百壯又將第二次量口繩摺中當脊直上下暨停中心在第二次墨記上下繩頭盡處以白圈記之此是灸穴初灸七壯累及至百壯此縱橫四方凡四穴是名曰四花穴初灸各七壯若瘡愈其疾未效依法復灸故云累及至百壯凡灸時可用灸足三若婦人纏足短小難為量三取膏肓輸灸之上第四指下兩角各三十是穴次灸四花穴道軒用此法灸之無有不効者。

神仙秘法 取勞瘵須先擇良日焚香禱祝令病人面向福德方服神効。

青桑枝

楊柳枝

梅枝

桃枝俱各東春各七莖

葱白

青蒿一握如蕪以子代葉

阿魏錢

真安息香錢

右用童便一升半煎至一升入阿魏再煮數沸入硃砂半兩小桔榔半兩

雨麝香五錢五更并天明各進一服下白蟲尚可治以淡粥補之用藥調理二五月再服以除病根如蟲黑已入腎不可救矣。

治心胸痛引雨勝昏悶聲濁熱壅鼻竇或痰喘發熱。

桑白皮炒

枳殼炒

木通

子芩炒

生地黃白

白芍藥

甘草各五

右水煎服。

溫金散 治肺嗽惡寒發熱唾液皮毛焦燥。

甘草炒

黃芩炒

桑白皮炒

防風各一

杏仁二十七粒製

人參

茯神各半兩

麥門冬三錢

左前方味用米泔浸一宿曬乾入人參等三味每服三錢入蠟一豆大水煎

桔梗飲子治心氣不足解倦盪血或喘嗽痰甚

桔梗炒

甘草炒

黃芩炒

人參

麥門冬各一

青皮三分

右水煎服

治咽喉痛

百藥煎去黑砂

甘草

生白礐

右為末每服一二錢食後用米泔調細呷嚥之

含化丸

治肺間邪氣胸中積血作痛失音痰喘

白茯苓

人參

乾山藥

大靈蓋一片酥火

蛤蚧

一隻去足足尖

阿膠

麥門冬

細辛

甘草炒

生地黃

右為末蜜丸芡實大食後合化一丸

河車丸治一切勞瘵虛損骨蒸等疾

紫河車

一具初生男胎者尤良洗淨杵爛本草云人內治癆病胞衣主勞損面點皮黑諸疾瘦粹

白茯苓

人參

乾山藥

右為末麵糊和入河車加三味九梧子大每服三五十九空心米飲下

補肺湯治勞嗽五臟虧損喘熱發熱盜汗自汗吐痰咳嗽

桑白皮炒

熟地黃各一人參

紫苑

黃芩炒

五味子炒各

右水煎入蜜少許

食後服

養正膏治傳尸出汗取蟲辟邪

鱉甲兩

青蒿一握

苡豆炒七

葱白

安息分

桃柳桑枝

大靈蓋

用七五四大片酥火

桃仁四十九個去皮尖

右隔夜以水一升浸至五更煎至半升入童便半升煎取四合調楨柳麝香末各

一錢日高時傾服以衣覆十指汗出竊絲滴下如蟲狀甚者旬日再服

何夢九治勞嗽出血各加桑葉熱縮熱口渴盜汗

附膠炒

生地黃

卷柏葉

山藥炒

大蘿蔔

五味子

炒 雜蘇酪一

柏子仁炒

人參

防風

麥門冬去心半兩

右為末

煉蜜丸彈子大

每服一丸細嚼麥門

冬煎湯下

四君子湯加秦艽黃芩水煎服尤妙。治勞嗽咯血。

神授散 治傳尸蟲用川椒二斤去核并合口者炒為末每服一錢酒糊丸空心米飲下服盡見効。

蘇合香丸 治傳尸骨蒸勞瘵症并鬼氣心痛。方見一卷第四

附方

四君子湯方見二十一卷第五論

補中益氣湯方見二十四卷

歸脾湯方見二十四卷

六味地黃丸方見二十二卷第十二論

婦人骨蒸勞方論第二

夫骨蒸勞者由積熱附於骨而名也亦曰傳尸瘧。複連無爽其名不一此病皆由脾胃虧損所致其形羸瘦腹脹泄瀉肢體無力傳於腎則盜汗不止脾膝冷痛夢鬼交侵小便赤黃傳於心則心神忪悸喜怒不時煩唇赤色乍熱乍寒傳於肺則胸滿短氣咳嗽吐痰皮膚甲錯傳於肝則兩目昏暗腸下妨痛閉戶忿怒五臟既病則難治療。

愚按前症多因經行胎產或飲食起居七情而傷肝脾之所致又或失於調攝或過於攻伐而成東垣先生云發熱之症肺熱者輕手乃得微按全無日西尤甚乃皮毛之熱其症喘歎寒熱輕者用瀉白散重者涼膈散白虎湯地骨皮散心熱者微按之皮膚之下肌肉之上輕手乃得微按至皮毛則熱少加方按之則全不熱是熱在血脉也日中太甚其証煩心心痛掌中熱而歲用黃連瀉心湯導赤散殊砂安神丸脾熱者輕手按之不熱重手按至筋骨又不熱不輕不重在輕重之間此熱在肌肉遇夜尤甚其症怠惰嗜卧四肢不收無氣以動用瀉黃散肝熱者按之肌肉之下至骨之上寅卯時猶甚四肢滿

悶便難轉筋。多怒多驚筋筋痙不能起於床。用瀉青丸。柴胡散。腎熱者輕。手重按俱不熱。加重手按至骨分。其熱蒸手如火。其症骨蒸如蟲蝕。因熱不能於起床。用滋腎丸。此治實熱之法也。竊謂肺經虛熱者。用入參補肺湯。肺氣虛而不能生肺者。用六君子湯。肺熱遺於肺者。用三黃丸。心經虛熱者。用補心湯。命門火衰。不能生土者。用八味丸。肝虛不能生心者。用補肝散。腎剋心者。用附子理中湯。其脾經虛熱者。用入參黃芪散。上剋水者。用承氣湯。脾不能培肝者。用六君子湯。元氣下陷。及金不能生水者。俱用補中益氣湯。肺剋肝。及腎經虛熱。與腎不能養肝者。俱用六味丸。

### 附治驗

一婦人發熱。晡熱盜汗。自汗。殊畏風寒。飲食少思。或腹脹吞酸。或大便不實。此脾胃不足。諸經虧損。朝用補中益氣夕用八珍湯。倍用參苓白朮各二十餘劑。諸症漸愈。因喪母哀傷。患盜汗。便血。用加味歸脾湯數劑而止。仍用前二藥。又五十餘劑。尋愈。月經兩月而至。適因怒去血過多。發熱作渴。肢體酸倦。頭目暈痛。用逍遙散加味歸脾湯。二藥調補而痊。

一婦人盜汗自汗。遍身酸疼。五心發熱。夜間益甚。或咳嗽咽乾。或盜汗自汗。月經兩三月一至。用加味逍遙散。六味地黃丸兼服。臨卧又服陳皮丸。三月餘諸症悉愈。其經乃兩月一至。又服兩月而痊。康元九即

陳皮丸

一婦人患前症。食少倦急。肌肉消瘦。日晡發熱。至夜益甚。月水過期。漸至不通。時發渴躁。誤用通經之劑。熱倦愈重。飲食愈少。余用八珍湯。加升麻丹皮山梔柴胡。治之熱漸退。又用八珍丹皮軟柴胡。調理而愈。

一婦人飲食少。思胸膈不利。或胸中作痛。或大便作瀉。或小便不利。用逍遙散。加山梔茯神遠志木香而愈。後因怒寒。熱往來。倦急煩熱。以前藥加炒黑黃連三分。頓愈。用八珍湯調理而愈。後因怒。吐血躁渴。用入參五錢。茯朮當歸各三錢。陳皮甘草各一錢。治之而愈。

一婦人胸脇作痛。內熱。晡熱。月經不調。余謂鬱怒傷損肝脾。朝用歸脾湯。以解鬱結。生脾氣。夕用加味逍遙散。以生肝血。清肝火。半載而愈。後因飲食失調。兼有怒氣。月經如注。脈浮洪而數。用六君子。加芎歸炮薑一劑而止。用補中益氣加炮薑。茯苓。半夏治之。而元氣復。又用歸脾湯。逍遙散。調理而康。一婦人內熱口乾。頭暉吐痰。帶下體倦。飲食少思。余謂脾氣虛弱。而不能生肺金。用補中益氣湯。加茯苓。半夏。脾氣漸復。飲食漸進。諸症漸退。再用加味逍遙散治之。尋愈。

一婦人腹脹脇痛。內熱。晡熱。月經不調。不時吐痰。或用化痰行氣之劑。胸膈不利。余謂脾氣鬱結。肝經血虛。朝用歸脾湯。夕用加味逍遙散。百餘劑而諸症漸愈。又因飲食停滯。或用峻厲之劑。口乾體倦。余用七味白朮散。補中益氣。加茯苓。半夏。中氣漸愈。又以補中益氣及八珍湯。兼服而痊。

一婦人患前症將愈。因怒。胸膈不利。飲食少思。服消導利氣之藥。大便下血。余曰。此脾氣復損。不能攝血。歸源用補中益氣加茯苓。半夏。炮薑。血止。用八珍加柴胡炒梔。熟退。用八珍湯。逍遙散而痊。

一婦人肌體倦瘦。口乾內熱。盜汗如洗。日晡熱甚。用參芪歸朮。扶神遠志。棗仁麥門五味丹。皮龍眼肉。炙草。柴胡。升麻。治之獲痊。後因喪子。懷抱不舒。腹脹少寢。飲食少思。痰涎上湧。月經頻數。余謂鬱鬱傷脾。不能攝血。制涎。歸源耳。用補中益氣濟生歸脾漸愈。又用八珍湯。調理而痊。

一婦人發熱口乾。月經不調。肢體無力。腿痛體倦。二膝浮腫。余作足三陰經血虛。用六味丸。逍遙散。兼服兩月。形體漸健。飲食漸進。膝腫漸消而痊。

一婦人日晡熱甚。月經不調。飲食少思。大便不實。胸脇痞滿。頭目不清。肢體倦怠。發熱煩燥。余為七情肝脾虧損之症。用濟生歸脾湯。加味逍遙散。補中益氣湯。調治元氣漸復而愈。一婦人月經不調。晡熱。內熱。飲食少思。肌體消瘦。小便頻數。或用清熱生血之劑。月經不行。四肢浮腫。小腹悶墜。內熱。晡熱。飲食不加減。腎氣丸。夕用歸脾湯。漸愈。又用八珍湯。兩月而愈。一婦人胸脇滿。小腹悶墜。內熱。晡熱。飲食不甘。體倦。日晡則赤。灑淅惡寒。此脾肺氣虛。先用六君子。加川芎。當歸。諸症漸愈。又用補中益氣加

扶養半夏諸症全愈後飲食失節勞怒惡寒發熱不食。用加味小柴胡一劑而熱退。用逍遙散歸脾湯調理而康。

天靈蓋散 治骨蒸四肢無力。晡熱煩赤。食少心煩。

天靈蓋附熟 安息香 地骨皮 當歸 山梔仁 人參 貝母去

黃芩 桃仁去皮尖雙仁起炒黃 檳榔各一 鏡甲附熟 柴胡 生地黃

赤茯苓 麥門冬 阿魏 右每服五錢。桃柳枝各七寸。薑五片。葱白五十。童便煎

愚按醫學綱目云柴胡本經並無一字治勞熱。今治勞方鮮有不用者。誤世多矣。凡此症乃真臟虧損而虛熱。王海藏先生云苟無實熱而用柴胡不死何待。蓋柴胡乃肝膽之藥。雖能升胃氣下陷。每劑不過分許。而可多用。或產後氣血虛熱尤宜禁忌。

癩肝丸 治骨蒸勞熱或潮熱發熱體瘦煩疼不欲飲食。

癩肝具 鏡甲附熟 柴胡附半 砜砂另研 升麻 天靈蓋附熟 扉角附熟

桃仁去皮雙仁去皮炒黃 桔子仁炒 地骨皮 知母附半 黃芩炒 甘草附熟

麝香研末 右為末。煉蜜丸桐子大。每服三十丸。空心食。

治肝藏中風。心神煩熱。言語蹇澁。不得安卧。

竹瀝 荊瀝 葛根 生薑汁 白蜜合 一 右和匀。頻服之。

麻黃散 治心臟中風多汗。惡風善怒。心神顛倒。言語蹇澁。舌強口乾。面赤頭痛。第翕發熱。胸背拘急。手心熱甚。僵卧不側。忪悖恍惚。或寒顫心驚。悸口渴。冒昧好笑。

麻黃去節 白朮 防風 川芎 甘草炙 漢防己 當歸

人參附熟 一 羌活 遠志去核 藥神去木名 半升麻分 桂心五 右水薑煎入竹瀝半盞。再煎一二沸。

扶神散 治同前。或四肢沉重。精神不安。或瘦氣不利。

扶神丸

羌活

麻黃去節

龍齒研末

赤芍藥

甘草炙各二錢

蔓荆子

薏苡仁

麥門冬去皮

人參去蘆

防風去蘆

犀角屑各半

右薑水煎服

十全大補湯

治氣血虛熱。加柴胡地骨皮秦艽。

秦艽散 治五心煩熱。煩赤。

逍遙散 治血虛。五心煩熱。肢體疫病。頭目昏重。心忪煩赤。口燥咽乾。發熱盜汗。減食嗜卧。月水不調。臍

腹脹痛。寒熱如瘧。疫散朝熱。肌體羸瘦。漸成骨蒸。

方見二十四論

枳殼散

治婦人手足煩熱。盜汗。肌痺。經候不調。煩倦心胸滿悶。狀如勞氣。

枳殼炒去穰殼。半夏麴。

赤芍藥各一

柴胡

黃芩炒各一

右為末。

每服三錢。薑棗水煎服。

華陀解勞生肌進食活血養心石膏無服水和錢許。甚驗。

青蒿散 治體倦虛。疫勞熱。九月採青蒿去梗用童子小便浸三日曬為末。每服二錢。烏梅一個。煎湯服。

清心蓮子飲。參蘇飲。加黃芩麥門冬。並治五心煩熱。手足熱甚。

附方

加味小柴胡湯

方見二十四論

柴胡散 治肌熱積熱。或汗後餘熱。服洪實散數。

柴胡

人參

黃芩

芍藥

甘草

當歸

大黃

燉各二錢半

右薑水煎服。

瀉白散 治肺臟氣實。心胸壅悶。咳嗽煩喘。大便不利。

桔梗炒

地骨皮

甘草炙

瓜蔞仁

丹麻

半夏姜

桑白皮

杏仁搗破尖右每服四錢。薑水煎。

道赤散 治心虛體熱小便赤澁或成淋瀝口舌生瘡等症

生地黃 木通 甘草等分 右每服三錢竹葉水煎

渴黃散 治脾熱口臭咽乾或口舌生瘡發熱作渴

石膏 防風 薑香等分 甘草 山梔子炒 右每服三錢水煎

涼膈散 治上焦積熱煩躁作渴頭目昏曇咽喉腫痛便溺赤澁語言譫妄等症

朴硝 大黃 噎 甘草各二 連翹四 梔子仁炒 黃芩炒 藕荷葉各一

右為末每服二錢竹葉七片水煎溫服

白虎湯 治胃熱作渴暑熱尤效又治熱厥腹滿身難轉側面垢譫語遺溺手足厥冷自汗脈沈滑大便泄清水無度

知母 石膏各二 穀米半 右水煎服

附子理中湯 治脾胃虛寒手足厥冷飲食不入或腹鳴切痛嘔逆吐瀉

方見二十一卷第十八論

硃砂安神丸

方見三卷第十四論

地骨皮散

方見六卷第三論

黃連瀉心湯

用一味黃連為末

瀉青丸

方見二十一卷第三論

承氣湯

方見七卷第十論

滋腎丸

方見八卷第一論

人參補腎湯

方見十二論

補中益氣湯

六君子湯

方見二十一卷第六論

三黃丸

方見八卷第十八論

補心湯

方見三卷第十二論

六味丸

人參黃芩散

方見十三卷第十三論

八味丸

方見二十四卷第十一論

補肝散

方見七卷第十七論

加味歸脾湯

方見二十一卷第十九論

逍遙散

八珍湯

歸脾湯

方見五卷第四論

加味逍遙散

七味白朮散

方見二卷第二論

金匱加減腎氣丸

方見二十卷第十一論

婦人血風勞氣方論第三

婦人血風勞症。因氣血素虛或產後勞傷外邪所乘或內有宿冷以致腹中疼痛四肢酸倦發熱自汗。月水不調面黃肌瘦當調補肝脾潤血為主。

愚按東垣云。喜怒不節。起居不時。有所勞傷。皆損其氣。氣衰則火旺。火旺則乘其脾土。脾主四肢。故因熱懶言。動作喘乏。表熱自汗。心煩不安。當病之時。宜安心靜坐。存養真氣。以甘寒瀉其熱氣。以酸味收其散氣。以甘溫補其中氣。經言勞者溫之。損者溫之。要畧三平人脈大為勞。以黃芪建中湯治之。

### 附治驗

一婦人勞則足跟熱痛。余以為足三陰血虛。用聖愈湯而痊。後遍身搔癢。誤服風藥。發熱抽搐。肝脈洪數。此肝家血虛火盛而生風。以天竺膽星為丸。用四物參門五味芩連炙草山梔柴胡煎送而愈。一婦人素清苦。勤於女工。因感風邪。自用表散之劑。反朝寢暮熱。自汗盜汗。形氣虛甚。其脉或浮洪。或微細。其面或青白。或瘡黃。此邪去而血氣愈虛也。用十全大補湯三十餘劑。漸愈。又用加味道遙散。兼治半載而痊。

人參荆芥散 治遍身疼痛。頭昏目澁。心忪煩倦。寒熱盜汗。煩赤口乾。痰嗽胸滿。月水不調。腹痛癰塊。  
荆芥 人參 生地黃 柴胡 鱼甲醋 酸棗仁炒 枳殼炒  
羚羊角镑 白朮洛七 川芎 當歸酒 桂心 防風 甘草各五分  
右薑水煎。日二服。

### 地黃煎 治血虛心忪發熱

生地黃 熟地黃自製等分 右用薑汁和水拌杵丸桐子大。每服五十丸空心白湯下。日三服。若臟腑虛寒。早間先服八味丸一服。

愚按前方肝脾血虛。發熱內熱。晡熱盜汗作渴。體倦筋骨疼痛。筋脈拘攣。血虛發躁。虛熱生瘻。咳嗽之良劑。若因肝脾腎精血燥熱。生瘻。胸膈痞滿。喘咳作渴。及一切虛火症。必用六味丸為主。

乞力伽散 治血虛肌熱或脾虛蒸熱或內熱寒熱。

白朮

白茯苓

白芍藥

炒甘草 分五錢

石薑棗水煎

附方

黃芪建中湯

方見二十一卷第四論

聖愈湯

方見二十二卷第九論

四物湯

方見二十二卷第六論

六味丸

加味道遜散

方見二十二卷第四論

六君子湯

方見二十二卷第六論

補中益氣湯

二方見二十一卷第六論

歸脾湯

方見二十一卷第四論

十全大補湯

方見二十二卷第四論

人參養榮湯

方見二十一卷第三論

八味丸

方見二十一卷第十一論

婦人冷勞方論第五

婦人冷勞屬血氣不足。臟腑虛寒以致臍下冷痛。手足時寒月經失常。飲食不消或時嘔吐。惡寒發熱骨節痠疼。肌膚羸瘦。面色痿黃也。

愚按前症有內外真寒。然有內外真熱亦有內真熱而外假寒者。又有內真寒而外假熱者。若飲食難化大便不實。腸鳴腹痛。飲食畏寒。手足逆冷。即黃嘔吐。畏見風寒。此內外真寒之症也。宜用附子理中湯以回陽。八味丸以壯火。若飲如常。大便堅實。胸腹痞脹。飲食喜冷。手足煩熱。面赤嘔吐。不畏風寒。此內外真熱之症也。宜用黃連解毒湯以消陰。六味丸以壯水。若飲食如常。大便堅實。胸腹痞脹。便不實。吞酸嗳氣。胸腹痞滿。手足逆冷。面赤嘔吐。畏見風寒。此內真寒而外假熱也。亦用附子理中湯。與八味丸當求其屬而治之。經曰。益火之源。以消陰翳。壯水之主。以制陽光。使不知真水火之不足。泛以寒熱藥治之。則舊疾不去。新病復生矣。夫所謂屬者猶主也。謂心腎也。求其屬也者。言水火不足而求之於心腎也。火之源者。陽氣之根。即心是也。水之主者。陰氣之根。即腎是也。非謂火為心源。水為腎主。肺也。大抵寒亦抑心。熱亦強腎。在治者審之。

附治驗方藥

一婦人食少作嘔。口吐痰涎面黃腹痛。月經不調。手足逆冷。余謂此內外真寒之症。遂以六君子加附子木香治之而愈。

先太宜人忽嘔吐酸水。內熱作渴。飲食不進。惟喜冷水。面色青赤。投之以藥。入口即吐。此內外真熱之症。積十餘日。以黃連一味煎湯飲之。徐加白朮茯苓。仍加陳皮。當歸羌草。至月餘始進米飯。稀粥調理而愈。

一婦人內熱作渴。大便秘結。畏惡風寒。手足逆冷。余以為內真熱而外假寒。先用黃連解毒湯。後用六味丸而愈。

大方室趙氏。初患癢喘熱渴。醫以降火散氣治之。肌日削而氣日索。延至甲辰。木旺痰盛。身熱口腐。腹脹神昏。絕食幾死。先生診之云。此乃虛熱無火。投以壯水生土之劑。隨服隨効。得以不死。竊喜久安。忽值戊申夏初。坐則頭墜。不能起視。卧則背冷。覺風透體。煩熱暈眩。咳嗽痰湧。手足麻冷。病勢危殆。自分必死。得先生柱診之曰。此內真寒外假熱之症也。遂以大補姜附之劑飲之。不三四服而大勢已平。仍以前藥加減而愈。則其他以有餘之火治之。無怪乎其轉展增劇也。微先生則山妻不死於甲辰之春。難免於戊申之夏矣。大方感慨不已。援筆備述。求附卷末。庶幾衣者之不昧。病者之得全。先生之惠垂諸無窮。豈一世一人之幸哉。長洲沈大方頓首拜書。

八味丸

六味丸

二方見二十一論四

附子理中湯

方見二十一論二十

黃連解毒湯

方見六卷第十一論

六君子湯

方見二十一論四

人言不卷之五

六

婦人良方卷之六

臨川陳自明編 · 吳郡薛己註

新都閔道政校

婦人熱勞論第一

婦人熱勞。由心肺壅熱。傷於氣血。以致心神煩躁。煩赤頭疼。眼溢唇乾。口舌生瘡。神思昏倦。四肢壯熱。飲食無味。肢體酸疼。心怔盜汗。肌膚日瘦。或寒熱往來。當審其所因。調補氣血。其病自愈矣。

愚按前症乃壯火食氣虛火。前熬真陰之所致。王太僕云。如大寒而甚熱之不寒。是無水也。熱動復止。倘忽往來時動時止。是無水也。當助其腎。心盛則生熱。腎盛則生寒。腎虛則寒動於中心。虛則熱收於內。竊謂前症。若肝脾血虛。用四物參朮。肝脾鬱怒。小柴胡合四物湯。脾胃氣虛。補中益氣湯。肝脾血虛。加味道逍散。肝經風熱。加味小柴胡湯。心經血虛。天王補心丹。肺經氣虛。人參補肺湯。肝經血虛。加味四物湯。大抵午前熱屬氣分。用清心蓮子飲。午後熱屬血分。用四物參朮丹皮。熱從左邊起。肝火也。實則四物龍膽山梔虛則四物參朮。黃柏知母酒拌炒黑五味麥門肉桂。如不應急用。加減八味丸。及十全大補湯。加麥門五味主之。

附治驗

一婦人經行不調。飲食少思。日晡熱甚。余以為肝脾氣血俱虛。用十全大補。加山茱萸丹皮麥門五味。而愈。次年秋寒熱如瘧。仍用前藥而愈。○一婦人生育多胎。月經不調。兩足發熱。年餘。其身亦熱勞則足痠痛。又年許。唇腫裂痛。又半年唇裂。見血。形體瘦倦。飲食無味。月水不行。此氣血俱衰之症。彼誤用通經丸等藥。復傷氣血。遂致不起。惜哉。

黃芪散 治發熱羸瘦。心燥口乾。不欲飲食。或盜汗。晡熱。

人參

黃芩炒

當歸各三錢

柴胡五分

地骨皮

白茯苓

麥門冬

生地黃

芍藥炒各一錢

甘草炒三分

右水薑煎。

豬肚丸 治熱勞羸瘦。

柴胡

赤茯苓

人參

黃芪各一兩

黃連炒三兩

地骨皮

木香各半兩

桃仁去皮尖

鱉甲各一兩

右為末。用嫩猪肚一枚，入藥縫合蒸熟研爛丸桐子大。每服三五十丸，食

前米飯下。日二服。

附方

清心蓮子餌。治熱在氣分。口乾。小便白濁。夜間安靜。晝則發熱。又治口舌生瘡。或口苦咽乾。煩躁作渴。小便赤澀。下淋不止。或並中作痛。

黃芩炒

麥門冬

地骨皮

車前子炒

甘草各半錢

石蓮肉

茯苓

黃芪炒

柴胡去苗

人參

右每服五錢水煎。

補中益氣湯

加味四物湯

四物湯

三方見二十卷第六論

加味小柴胡湯

小柴胡湯

四方見二十卷第二論

十全大補湯

加味道遙散二方見二十卷第四論。除驚悸療咽乾育養心神。

人參去蘆

茯苓

玄參

丹參

桔梗

遠志各五錢

當歸酒浸

五味

麥門冬

天門冬

柏子仁

酸棗仁

炒各一兩

生地黃四兩

右為末。煉蜜丸桐

子大。用硃砂為衣。每服二三十九。臨卧竹葉煎湯送下。一方加石菖蒲熟地黃。杜仲百部。茯神甘草。此方內天麥門冬。玄參。生地。雖能降火。生血化痰。然其性沈寒。損傷脾胃。剋伐生氣。若人飲食少。思大便不實者。不宜用。

## 婦人客熱方論第二

婦人客熱由元氣虛而外熱乘之以致口燥心煩四肢壯熱肌肉消瘦治法當審其因而調補。

愚按前症若客邪所侵用補中益氣加川芎防風肝虛血少六味地黃丸胃火飲冷錢氏漏黃散胃虛用七味湯白朮散潮熱時熱八珍湯歸熱內熱消遙散發熱體倦補中益氣湯恚怒發熱小柴胡湯營怒發熱加味歸脾湯寅卯酉戌時熱升陽益陰湯。

## 附治驗

一婦人素有胃火服清胃散而安後因勞役躁渴內熱肌肉消瘦月經不行此胃火消燬陰血用逍遙散加丹皮炒施以清胃熱用八珍湯加茯神遠志以養脾血元氣充足而經自行矣。

麥門冬散 治四肢倦痛煩悶不食或寒熱往來

麥門冬去心  
生地黃  
甘草炒各  
柴胡  
赤茯苓  
羚羊角鱗  
赤芍藥  
桑白皮炒  
黃芩炒各

## 附方

補中益氣湯

方見二十二論

六味丸

方見二十二論

漏黃散

七味白朮散

方見二十二論

八珍湯

方見二十二論

加味歸脾湯

逍遙散

三方見二十二論

小柴胡湯

方見二十二論

升陽益胃湯

方見三卷第九論

清胃散

方見二十  
四卷首論

## 婦人寒熱方論第二

經曰陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒皆由勞傷氣血陰陽不調寒熱如瘡也當分氣血虛實而治之。

愚按前症若寸口脈微名曰陽不足。則陰氣上入於陽中。用補中益氣湯。若尺部脈弱名曰陰不足。則陽氣下陷入陰中。用益陰腎氣丸。若因氣血俱虛。用八珍湯。若因怒動肝火。用小柴胡湯。若陰陽俱不足。則氣血不歸其本部。以致寒熱交爭也。

附治驗

一婦人年六十有四。火鬱怒頭痛。寒熱。春間乳內時痛。服流氣飲之。類益甚。時有血如經行。又大驚恐。飲食不進。夜寐不寧。兩乳腫脹。兩脇妨痛。午後色赤。余以為肝脾鬱怒火燥。先以逍遙散加酒炒黑龍膽一錢。山梔一錢。五分服二劑。腫頓愈。又二劑全愈。再用歸脾湯。加炒梔貝母。諸症悉愈。

地骨皮散 治血風氣虛時作寒熱。或晡熱內熱。

柴胡

地骨皮

桑白皮

枳殼

前胡

黃芩

白茯苓

五加皮

人參

甘草

桂心

白芍藥

五分

白芍

柴胡散 治寒熱體痛。口乾心煩。飲食少。思。肌體消瘦。

柴胡

黃芩

赤芍藥

白朮

人參

白芍藥

各三

生地黃

苦梗

桑白皮

赤芍藥

各三

鱉甲

冬一錢

右薑水煎服

右薑水煎服

益陰腎氣丸 治諸臟虧損。發熱。肺熱潮熱。盜汗。或寒熱往來。五心煩熱。或口乾作渴。月經不調。或筋骨疲倦。飲食少。思。或頭目不清。痰氣上壅。咳嗽。晡甚。胸膈痞悶。或小便赤數。兩足熱痛。或腳足痿軟。肢體作痛等症。此壯水之主。以制陽光之劑也。

澤瀉

茯苓

牡丹皮

生地

酒拌

山藥

茱萸肉

當歸

五味子

炒熟

地自製

右為末

入二膏

加煉蜜

九桐子大

硃砂為衣

每服

五十九

空心

淡鹽湯

下

補中益氣湯

方見二十四

卷第六論

六味丸

方見二十四

卷第十二論

小柴胡湯

方見二十四

卷第十一論

寒婦寒熱如瘧方論第四、

倉公傳與諸氏論皆云師尼寡婦獨陰無陽。慾心崩而不遂是以懨懨成病以致乍寒乍熱而類瘧狀久則為勞。又有經閉白溼痰逆頭風隔氣痞悶面黑瘦瘠等證皆寡婦之病。診其脉獨肝脈弦出寸口而上魚際魚際皆血盛而致經二六。男子精盛則思室。女子血盛則懷胎。顧其精血思過半矣。

愚按前症若肝脈弦出魚際用生地黃丸血虛佐以四物湯。若兼怒動肝火而寒熱佐以加味逍遙散。若虧損元氣而寒熱佐以八珍湯。若虧損元氣而寒熱佐以補中益氣湯。若鬱傷脾氣而寒熱佐以濟生歸脾湯。

附治驗

一寡婦不時寒熱脈上魚際此血盛之症用小柴胡湯加生地黃治之而愈。但畏風寒此脾胃氣虛用加味歸脾湯補中益氣湯兼服而止。一婦人因夫久不出經而發寒熱月經旬日方止服降火涼血藥內熱益甚自汗盜汗月經頻數余曰內熱自汗脾氣虛弱也月經頻數乃血不歸脾也用歸脾湯六味丸而愈。一室女寒熱肝脈弦長而出寸口用小柴胡湯加生地烏梅治之而愈既嫁而諸症悉痊。一室女久患寒熱月經失期以小柴胡湯加生地治之少愈更以生地黃丸而愈。

生地黃丸 許學士云有一師尼惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩大小柴胡湯雜進其病益劇予診視之曰三部脈無寒邪但肝脈弦長而上魚際服此丸而愈。

大每服三十丸烏梅湯下日三服

附方

補中益氣湯

四物湯二方觀六論

加味道逍遙散

柴胡

秦艽

黃芩各半

生地黃二兩

酒膏

赤芍藥兩

右為末煉蜜丸桐子大

八珍湯

加味歸脾湯

歸脾湯四方觀四論

小柴胡湯

方見二十四卷第十二論

六味丸

方見二十四卷第十一論

婦人惡寒方論第五

婦人惡寒有陰陽二證。發熱而惡寒者。發於陽也。無熱而惡寒者。發於陰也。發於陽者。脈浮數宜解表。發於陰者。脈沈細宜溫裏。凡惡寒不可過覆衣被及近火熱。若寒熱相搏。令人寒甚。若寒氣入腹。血室結聚。最難治療。

愚按前症。若忘情嗜卧。洒淅惡寒。乃陽不能伸發。用升陽益胃湯。若勞傷形氣而惡寒。乃無陽以護衛。用補中益氣湯。若飲食傷脾胃而惡寒。乃元氣虛損。用六君子湯。若加煩躁妄言。或欲飲水。仍進前劑。但加薑桂。若體倦煩渴。頭痛自汗。用補中益氣加五味參門。東垣云。晝則發熱惡寒。是陰氣上溢於陽分也。夜則惡寒。是陰血自旺於陰分也。海藏云。六月大熱之氣反得大寒之症。當捲時從症治。以薑桂之類丹溪云。久病惡寒。乃飛鬱於脾。抑遏陽氣不得外泄。治當解鬱。

附方

升陽益胃湯

方見三卷

補中益氣湯

六君子湯

方見二十一卷第六論

婦人血風閼方論第六

婦人血風煩悶。由勞傷氣虛。而風邪乘之。血氣不和。以致肢節熱疼。口乾不卧。而煩悶也。當調補元氣。萬

愚按前症。多屬肝脾血虛。發熱。當參照前寒熱方論主治。

赤芍藥散 治煩悶。不食。體倦。頭眩。身體疼痛等症。

赤芍藥酒

白茯苓各一 甘草炒

柴胡各五

右薑棗水煎。

婦人血風攻脾不食方論第七

夫婦為中州意智之臟也。諸經皆賴其養。與胃為表裏。胃主司納。脾主腐化。若勞傷真氣。外邪乘之。生騎症

愚按經云胃乃脾之剛。脾乃胃之柔。傷胃則脾無所稟受。傷脾則不能為胃運化。是以脾胃為之表裏。藉飲食以滋養百脈者也。竊謂前症若飲食所傷。六君子湯。勞役所傷。補中益氣湯。風寒所傷。用參理中湯。木旺乘土。六君加柴胡。嘔吐腹痛。或大便不實。前湯加木香。胸膈虛痞。或肚腹不利。六君子湯。鬱怒傷損肝脾。歸脾湯。命門火衰。八味丸。仍審諸經錯雜之症而治之。假如不能食。而肌肉削。乃脾胃經本病。右關脈緩而弱。乃脾胃之本脈。若見弦緊。或四肢滿悶。淋洩。便難轉筋。此肝之脾胃病也。若兼洪大。或肌熱煩熱面赤。此心之脾胃病也。若兼浮盪。或氣短喘急。咳嗽痰盛。此肺之脾胃病也。若兼沈細。或喜恐善欠。此腎之脾胃病也。各當於本經藥中。加兼症之藥。此東垣先生之治法也。

#### 附治驗方藥

一婦人停食飽悶。或用人參養胃湯。木香橘核丸。而泄瀉吐痰。腹中成塊。又與二陳黃連厚朴。反加腹脹不食。余以為脾胃氣虛。不能消磨。用補中益氣加茯苓半夏。五十餘劑。脾胃健而諸症痊。一婦人飲食每用碗許。若稍加非。大便不實。心吞酸嗳腐。或用二陳黃連枳實。反加內熱作嘔。余曰。此未傳寒中。不信。仍作火治虛症。悉至月經不止。余用六君加炮薑木香。數劑。諸症漸退。又以補中益氣加炮薑木香芩苓半夏。繫劑全愈。後因飲食勞倦。兼以怒氣。飲食頓少。元氣頓怯。仍用前藥。更加發熱。脈洪大。按之而虛。兩尺如無。此命門火衰。用補中益氣加薑桂及八味丸。兼服兩月餘。諸症畢愈。此症若因中氣虛弱。用參理中湯。或六君子。加木香炮薑。不應用左金丸。或越鞠丸。虛寒加附子理中湯。無有不應。一婦人飲食後。或腹脹。或吞酸。自服枳朮丸。飲食日少。胸膈痞滿。腿內酸痛。畏見風寒。或用養胃湯。腿痛浮腫。益甚。月經不行。余以為鬱結所傷。脾虛濕熱下注。侵晨用四君子歸二陳。午後以前湯送越鞠丸。諸症漸愈。又用歸脾八珍二湯。兼服兩月餘而經行。一婦人胸滿少食。或腹脹吞酸。或經候不調。此中氣虛而不能旋化。也用補中益氣加砂仁。香附炮薑。而飲食進更以六君子歸月母桔梗。而經自行。一婦人年三十餘。忽不進食。日飲清茶水菓已三年餘矣。余謂脾氣鬱結。用歸脾加吳茱萸。

四劑遂飲食如常。若人脾胃虛而不飲食。當以四神丸治之。

一婦人不進飲食二年矣。日飲清茶藥。

品之類。肝脾二脈弦浮。按之微而結滯。余謂肝脾氣鬱。用六君子湯。香薷。吳茱萸。下痰積甚多。飲食漸進。形體始瘦。卧床月餘。仍服六君子之類而康。

越鞠丸 治鬱傷氣滯。以致胸膈痞悶。或肚腹膨脹。或咽喉不清。或痰氣不爽。或飲食少思。或吞酸嘔惡。宜用此藥清之。若人脾胃虛弱。用六君子湯為主。大凡中氣虛弱。變症百出。難以名狀。但用四君補其脾胃。元氣漸復。諸病自退。若用治病之藥。則誤矣。

香附

蒼朮炒

川芎

梔子炒

神曲炒

山楂各等

右為末。用神曲糊丸。

葛根大。每服六七十丸。食遠白湯送下。

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

三方見二十一卷第六論

八味丸

方見二十四卷第十一論

人參養胃湯

方見七卷第六論

二陳湯

方見二十五卷第五論

左金丸

方見七卷第十七論

人參理中湯

卷第六論

附子理中湯

二方見二十卷第六論

歸脾湯

八珍湯

二方見二十卷第四論

二神丸

四神丸

二方見八卷第八論

婦人夢與鬼交方論第八

人稟五行秀氣而生。承五臟神氣而養。若調理失節。血氣虛衰。則鬼邪干其正。隱避而不欲見人。時獨言笑。或時悲泣。是其候也。脈息遲緩。或如鳥喙。或緣緣而來。不知度數。面頰不變。亦其候也。愚接前症。多由七情虧損。心血神無所護。而然也。宜用安神定志等藥。則正氣復而神自安。若脈來乍大乍小。乍短乍長。亦為鬼祟也。宜灸鬼火穴。以患人兩手拇指相並。用線繫扎。當合掌處。半肉半甲間。灸神散。治妄有所見。言時雜亂。時昏昧。瘦熱。

桃仁丸 治與鬼魅交通

辰砂另研 檳榔

當歸

桃仁各三錢

水銀一個

肉桂一錢

麝香半錢

阿魏一錢  
煨熟 沈香各半兩

右為末

蜜煉丸桐子大。每服十九粒。心桃仁湯下。

辟瘟丹

虎頭骨二錢 硫砂

雄黃

雌黃

鬼白

皂莢

蕪荑仁

鬼箭羽

藜蘆兩

右為末。蜜煉丸彈子大。橐盛一丸。男左女右。緊臂上。及用一丸。當病人戶前

燒之。一切邪鬼不敢近。

妙香散 治心虛不足。精神恍惚。夢與鬼交。謠言錯亂。先服此以補氣血。鎮心安神。然後以前方治之。見十三卷第論

婦人傷寒傷風方論第九

傷寒之症。若氣口脈緊盛。即下之人。迎緊盛。即汗之。左關浮緊。亦當發其汗。若犯胃熱。譯語喜忘。小腹滿小便。自利用抵當湯。胃實譯語。用承氣湯。脈緊無汗。名傷寒。脈緩有汗。為傷風熱病。脈洪大。為中暑。用香薷飲。脈細弱。為中竭。用白虎湯。胃實用承氣湯。傷寒先服黃龍湯。不分男女。但妊娠用藥宜清淡。不可輕用桂枝半夏桃仁朴硝等類。凡用藥。病稍退則止。不可盡劑。此為大法。

愚按前症。當宗仲景先生治法。但胎前產後。須以安神補益為主。須臨症審之。

黃龍湯 即小柴胡湯。去半夏。

桂枝紅花湯 治傷寒發熱。口燥舌乾。經脈不來。

桂枝

芍藥

甘草

炒一錢

紅花二錢

右薑棗水煎服。

黃芩芍藥湯 治婦人內熱。口燥咽乾。腹滿不食。

黃芩炒

芍藥酒

白朮

熟地黃一錢

右水煎。寒加生薑。

當歸湯 治傷寒喘急煩燥或戰而作寒此陰陽俱虛不可下宜服此藥

柴胡

錢一錢

白朮

分七分

人參

甘草

炒一錢

赤芍藥

當歸

各五分

五味子

瀉心三黃湯

治傷寒六七日內有燥屎大便祕結譚語目亦毒氣閉塞

大黃

錢一錢

黃芩

炒一錢

黃連

炒一錢

右水煎服取微利如目赤睛疼加赤茯苓竹葉

燒裾散 治女子病新瘥與男子交者名曰陰易其証則裏急脇痛頭重不舉目中生花或頭面烘熱耳中似蟬鳴胸中煩悶甚者百節解一用男子淮葛根當刺期門穴下針病人五吸停針良久徐徐出針凡針期門穴必漏勿補肥病則以女人者如不應用參附湯

婦人熱入血室方論第十

婦人傷寒傷風發熱經水適來晝則安靜暮則譚語有如瘧狀此為熱入血室治者無犯胃氣及上二焦宜服小柴胡湯若脈遲身涼當刺期門穴下針病人五吸停針良久徐徐出針凡針期門穴必漏勿補肥人二十瘦人半寸也

愚按前症若因勞役或怒氣發熱適遇經行而患前症者亦用小柴胡加生地黃治之血虛用四物加柴胡若病既愈而熱未已或元氣素弱並用補中益氣湯脾氣素虧用濟生歸脾湯血氣素虛用十全大補湯

附治驗

一婦人經行感冒風邪晝則安靜夜則譚語此熱入血室也用小柴胡加生地治之慎安但內熱頭暉用補中益氣湯加蔓荆子而愈後因怒寒熱譚語胸脇脹痛小便頻數月經先期此肝火血熱妄行用加味逍遙散加生地黃而愈○一婦人因怒寒頭痛譚言妄語至夜甚月經暴至此怒動肝火用

涼之劑。前症益甚。月經不止。肚腹作痛。嘔吐不食。渴甚。自出。此熱入血室。而藥復傷胃也。用香砂六君子。

及歸脾而痊。

乾薑柴胡湯 治婦人傷寒。經脈方來。熱入血室。寒熱如瘡。或狂言。冒鬼。

柴胡

錢一錢

桂枝

三分

桔梗根

五分

牡礪

煅

乾薑

炮

甘草

三分

右水煎。汗出而愈。

海蛤散 治婦人傷寒。血結胸膈。宜服此藥。及針期門穴。

海蛤

滑石

水

甘草

各二分

芒硝

兩

右為末。每服二錢。用雞子清調下。小腸通利。其血

結自散。更用桂枝紅花湯。發其汗。則愈。

方見前

附方

小柴胡湯

方見二十四

四物湯

香砂六君子湯

補中益氣湯

三方見二十一

歸脾湯

十全大補湯

加味道遙散

三方見二十

四卷第四論

婦人咳嗽方論第十一

夫肺為四臟之華蓋。內統諸經之氣。外司腠理皮毛。若外邪入於肺中。故令咳嗽。當以脈息辨之。浮而弦者。起於風濁而弱者。起於濕洪而數者。起於熱。遲而澀者。起於寒。風者散之。濕者燥之。熱者涼之。寒者溫之。虛者補之。

愚按丹溪云。春是木氣上升。夏是火氣炎。上秋是濕熱傷肺。冬是風寒外來。當發散行痰。開腠理。用二陳湯。加麻黃。桔梗。杏仁。痰飲隨症加藥。勞嗽宜四物。加竹瀝。薑汁。乾咳嗽難治。此症乃痰鬱火邪也。用苦梗開之。夏用補陰降火。不已則成勞。上半日多嗽者。胃火也。用貝母。石膏。午後嗽者。陰虛也。用四物。加炒黑黃柏知母。黃芩散者。火氣浮於肺也。用五味子。五倍子。五更嗽者。飲食之火流於肺也。以貝母。軟石膏。肺脹而嗽。或左或右。不得眠。此痰挾瘀血。氣滯而病。宜養血疏肝。清痰用四物。加桃仁。阿魏。青

皮竹瀝之類嗽而脇下痛宜疏肝氣以青皮換痰實者白芥子之類血礙氣作嗽者桃仁大黃薑汁丸服治嗽多用生薑以其辛散故也。痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用清陰分之劑若嗽多用粟殼不必疑但要去病根此乃收後藥也。羸謂前症午前嗽屬胃火盛用竹葉石膏湯。胃氣虛用補中益氣加炒山梔午後嗽屬陰血虛用四物黃柏知母二味酒水腎水虛用六味地黃丸。黃昏嗽用四物五味麥門井前丸五更嗽用六君子不得眠及兩脇下痛用六味地黃補中益氣若因氣虛腰痺不密。六淫所侵當祛外邪而實脾土若因心火太過當伐肝木而滋肺金若因肺金氣虛當補脾土而生肺氣若因腎水虧損虛火炎上當補肺腎以滋化源大抵風邪冒火此實熱為患易治惟肺腎虧損此真臟為患最難調治。

### 附治驗

一婦人素勤苦冬初咳嗽發熱吐血盜汗通身作痛或寒熱往來用化痰降火之藥口噤筋掣此血本虛而藥復損之耳余用八味丸為主佐以補中益氣麥門五味山藥年餘而愈。○一婦人咳嗽發熱嘔吐痰涎日夜約五六碗喘咳胸痞燥渴不食崩血如湧此脾土虛寒用八味丸及附子理中湯而愈。全見女科撮要○一婦人不得於姑患嗽胸膈不利飲食無味此肺脾俱傷痰鬱於中也先用歸脾湯加山梔。橘皮貝母桔梗諸症漸愈後以六君加芍歸桔梗間服全愈。○一婦人咳嗽早間吐痰甚多夜間喘急不寐余謂早間多痰乃脾虛飲食所化夜間喘急乃脾虛陰火上衝用補中益氣加麥門五味而愈。○一婦人患咳嗽腸痛發熱日晡益甚余曰此肝脾虛熱而傷肺也用加味逍遙散加熟地治之而愈後因怒氣勞傷前症仍作嗽太陽痛或寒熱往來或咳嗽遺尿此肺氣虛而尿脬失制仍用前散及地黃丸而瘥。○一婦人久咳嗽面色萎黃或時吐白肢體倦怠飲食少思稍多則瀉此脾土虛而不能生肺金朝用補中益氣湯夕用六君子湯為主間佐以八珍湯三月餘漸愈後感寒邪喘嗽胸腹作脹飲食不心四肢逆冷此中氣尚虛不能充皮毛肥腠理司開闔之所致如遂用六君子加生薑桔梗而愈。

附方

法製清氣化痰丸 順食快脾化痰消食

半夏 南星皮大白礬

皂角

乾薑各四兩

先將白桂等三味用水五碗煎水

三碗却入半夏二味浸二日。再煮至半夏南星無白點為度。晒乾。

陳皮

青皮

紫蘇子炒

蘿蔔子炒研另

杏仁去皮去核葛根

神曲炒

麥蘖炒

山楂子

香附子

右煑末蒸餅丸桐子大

每服五七十丸臨卧茶湯任下

茯苓湯

治胸中有痰飲吐水心胸虛滿不能進食。

茯苓

人參

白朮三兩炒各

枳實兩炒各一

橘皮半兩

生薑四兩

右用水六升。煮取二升。

分三服。

加減小柴胡湯

治咳嗽寒熱往來。

柴胡

半夏

黃連一錢炒各

甘草炒

乾薑炮各五分

五味炒并三分

右水煎服。

黃連解毒湯

治一切實火喘咳脈洪大或狂言煩躁口乾飲冷喘急鄭聲目睛赤痛。

黃連

黃芩

桔梗炒各二錢

梔子炒各二錢

右水煎服。

梔子仁湯 治喘咳發熱潮熱發狂煩躁面赤咽痛。

梔子仁

赤芍藥

大青一錢

知母一錢

升麻

黃芩

石膏

右水煎服。

杏仁

二錢

柴胡二錢

豆豉百粒

右水煎服。

麥門冬湯 治火熱乘肺咳嗽有血胸膈脹滿五心煩熱。

麥門冬

七錢

桑白皮炒

生地黃一錢

半夏

紫菀

桔梗

淡竹葉

右水煎服。

麻黃

各七錢

五味子

一錢

甘草各五分

右水煎服。

二陳湯

竹葉石膏湯

方見十三

補中益氣湯

四物湯

六君子湯三方月四卷第六論

六味丸

八味丸二方月二十論

附子理中湯三方月二卷第八論

歸脾湯

加味道遙散

八珍湯三方月四卷第四論

經曰。微寒為濕寒。甚為腸澼。古人立方。多用乾薑桂心細辛之屬。若熱在上焦。而咳虛則為肺痿。實則為肺癰。或因氣血不足。或因酒色厚味。或因重亡津液。燥氣焚金。或脈數發熱。咳嗽有血。宜平溫建中之屬。若用柴胡葛根。冬芩。麻等藥。則誤矣。

愚按丹溪云。陰分嗽者多屬陰虛。肺脹不得眠者難治。肺痿專主補氣養血。清金肺氣有餘者宜瀉之。以桑白皮為主。半夏茯苓佐之。瀉其有餘。補其不足。肺燥者當潤之屬熱者。桔梗大力子知母雞子清。聲啞者屬寒。細辛半夏生薑。肺虛者。人參阿膠為主。陰不足者。六味地黃為要藥。或知母。茯苓湯。陰虛氣喘。四物加陳皮甘草。以降其氣。補其陰。竊謂前症嗽而鼻塞聲重。風邪傷肺也。用參蘇散。面赤喘嗽。火剋肺也。人參平肺散。寒熱交作。肝氣不和也。四君加知母。柴胡桔梗。咳喘短氣。肺虛也。人參補肺湯。體倦少食。脾虛也。參朮補脾湯。口乾咽燥。虛火上炎也。六味丸大凡發熱喘嗽。或咳唾膿血。飲食不入。急補脾肺。滋腎水。多有得生者。脈浮大而面赤者皆難治。脈浮短濶者可療。

參蘇飲。治外感風寒。咳嗽氣逆。而蘊上焦發熱。氣促。或咳血。或喘。或咳嗽不止。加黃芩。山梔。名加味參蘇飲。

人參

柴蘇葉去梗半夏薑汁

桔梗

陳皮桔

桔梗

葛根

前胡

枳殼一錢炒甘草各五分

右薑水煎服。

金沸草散

治肺金受風。頭目昏疼。咳嗽聲重。涕唾稠粘。

定喘湯 治痰喘胸滿坐卧不安聲重鼻塞頭昏

半夏麴

明阿膠炒

甘草炒各五分

薑藥殼製一錢

五味子炒各五分

桑白皮炒去節各五分

麻黃去節各五分

甘草炒去節各五分

麻黃去節各五分

人參各三分

右薑三片烏梅半個水煎臨卧服

金不換正氣散 治脾胃虛弱咳嗽不已喘滿涎盛

薑藥殼製一錢

杏仁炒去皮各五分

甘草

枳殼各五分

右生薑烏梅水煎

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽聲重胸膈煩滿頸目昏眩

蘇子炒

陳皮

赤茯苓

桑白皮炒

麻黃各一錢

甘草炒

續斷錢一錢

竹茹錢三錢

赤小豆撮

千金五味子湯 治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸脇疼痛

五味子炒

桔梗炒

紫苑

甘草炒

續斷錢一錢

竹茹錢三錢

赤小豆撮

生地黃

桑白皮各半兩

右水煎服

知母茯苓湯 治咳嗽不已往來寒熱自汗喘促或肺痿

知母

茯苓一兩

五味子杵

人參

薄荷

半夏

柴胡

白朮

款冬花

桔梗

麥門冬去心

黃芩半兩

川芎

阿膠

甘草炙各三錢

右每服一兩薑水煎

小青龍湯 治肺感寒咳嗽喘息加杏仁煎有汗去麻黃細辛發熱頭疼脈沈細或嘔或咳或利或噫或小便不利小腹滿脹喘嗽之聖藥

鴻白湯

人參補肺湯

桔梗湯

參术補脾湯

卷第十二論

人參平肺散

方見二十四

四

四物湯

四君子湯

卷第六論

人參平肺散

方見二十一

五

勞嗽方論第十三

經曰。感於寒微則為咳。甚則為泄。蓋肺主氣合於皮毛。邪傷皮毛則咳為肺病。傳於各臟。以時受邪。肺為嫩臟。邪易傷而難治。其嗽有肺心脾腎肝。風寒支飲膽之十證。亦有勞嗽者。華陀謂之邪嗽。孫真人謂之注嗽。此因酒色過度。勞傷肺經。重者咯唾膿血。輕者時發時瘥。或先嘔血而後嗽。或先咳嗽而吐血。此又挾邪傳症。孫真人用通氣丸。夢與鬼交用四滿丸。蛤蚧天靈。蓋桃柳枝安息香之類。若肺中有蟲入喉。咳嗽須以藥含化。其蟲即死。嗽即止。

愚按仲景先生云。咳而兩脇痛不能轉側。兩胠滿屬於肝臟。用小柴胡湯。咳而嘔苦水屬於膽腑。黃芩半夏生薑湯。咳而喉中如梗狀。甚則咽腫喉閉。屬於心臟。桔梗湯。咳而大便失氣。屬於小腸腑。芍藥甘草湯。咳而右胠痛。陰引肩背。甚則不可動。動則咳嗽劇。屬於脾臟。升麻湯。咳而嘔。嘔甚則出長蟲。屬於胃腑。烏梅丸。咳而喘息有聲。甚則唾血。屬於肺臟。升麻湯。咳而失尿。屬於大臟。膀胱黃附子細辛湯。咳而遺溺。屬於膀胱。茯苓半夏湯。咳而不止。三焦受之。其狀腹滿不食。涕唾。面目浮腫。氣逆。異功散用之。對証其效如神。仍參五卷看。

附治驗

一婦人患前症。晡熱內熱。寒熱往來。作渴盜汗。小便頻數。其經兩三月一行。此肝脾氣血虛損。用八珍湯六味丸。各六十餘劑。諸症漸愈。其經兩月一行。仍用前二藥。間以加味道遙散。各三十餘劑。後恚怒。通經行。去血過多。諸症悉至。飲食少。思腹脹。氣促。用十全大補湯。數劑漸愈。仍用前藥調補。漸愈。復因一婦人患前症。不時發熱。晝夜不眠。食少。口渴。盜汗。小便頻數。其經兩三月一行。此肝脾氣血虛損。用八珍湯六味丸。各六十餘劑。諸症漸愈。其經兩月一行。仍用前二藥。間以加味道遙散。各三十餘劑。後恚怒。通經行。去血過多。諸症悉至。飲食少。思腹脹。氣促。用十全大補湯。數劑漸愈。仍用前藥調補。漸愈。復因

或時寒熱或用清熱之劑其熱益甚盜汗口乾兩足如炙遍身皆熱昏憤如醉良久熱止方甦或晡熱至旦方止此陰血虛而陽氣弱也余朝用六味丸料夕用十全大補湯月餘諸症稍愈更兼以補中益氣湯兩月餘而愈

孫師四滿丸 治上氣嗽飲嗽燥嗽冷嗽邪嗽謂之五嗽

乾薑

炮

桂心

薌躅花

芸箭

紫苑

各二

芫花根皮

二

蜈蚣

一條去頭

人參

右藥各

米飯下

日三服未應加至七八分

細辛

甘草

炙

鬼督郵

人參

半夏

一錢

右藥未煉蜜丸大豆許每服五丸

肉連汁

煎

蜜丸

二

右藥與魚同煮熟取

生圓魚二

錢

溫金散

治勞嗽

喘悶咯痰中有血

方見前勞瘵類

阿膠丸

治勞嗽并嗽血咯血

方見前勞瘵類  
類下補遺

圉魚丸

治骨蒸勞嗽異效

貝母

前胡

知母

杏仁

柴胡

各等

生圓魚二

右藥

與魚同煮熟取

肉連汁

煎

蜜丸

二

肉連汁飲之將藥焙乾為末用骨髓煮汁一盞和藥丸梧子大每服二十九煎黃芪六一湯空心送下

病既安仍服黃芪六一湯調理

附方

地骨皮散

右薑水煎服

知母

炒

柴胡

甘草

炒

人參

地骨皮

茯苓

半夏

一錢

右薑水煎服

海藏紫苑散

治咳中有血虛勞肺癆

人參

紫苑

知母

炒

貝母

人參

桔梗

茯苓

阿膠

炒

五味子

分三

甘草

炙五

右薑水煎服

參朮調中湯 濕熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

黃芩

桑白皮

人參

炙甘草

青皮

白朮各三

五味子

分五

白朮

地骨皮

麥門冬

陳皮各五

右水煎服

二陳湯 治脾胃虛弱。中脘停痰或嘔吐惡心。或頭目不清。飲食少思。

方見二十五論

異功散

方見二十四論

六味丸

卷第十一論

八珍湯

加味道逍散

十全大補湯

加味歸脾湯

四方見二十論

補中益氣湯

方見二十六論

四卷第十四論

喘滿方論第十四

岐伯曰。夜行則喘。出於腎。浮氣病肺有所墮。恐喘出於肝。浮氣害脾有所驚。恐喘出於肺。浮氣傷心。度水跌仆。喘出於腎與骨。皆因外邪所感。而致太陽病。則脈浮無汗而喘。用麻黃湯。陽明病。則汗出腹滿喘而潮熱。承氣湯。表邪未解。喘促汗出。葛根黃芩湯。微喘。桂枝厚朴杏仁湯。汗出而喘。麻黃杏子甘草石膏湯。表邪未解。小青龍湯。去麻黃。加杏仁。感寒伏熱而喘。九寶湯。氣鬱痰盛喘促。四七湯。涎多而喘。千嬌湯。不得卧而喘。神祕湯。寒熱喘咳。棗膏丸。上氣喘促。神投湯。上盛下弱。各黑錫丹。若四肢逆冷。脈息沈細。或寸大尺小。胸脹冷汗。大便頻數。上氣喘促。此虛極挾寒之陰症。急用反陰湯。

愚按東垣云。肺金受邪。由脾胃虛弱。不能生肺。乃所生受病。故咳嗽氣短。氣上皮毛。不能禦寒。精神少而渴。情慘不樂。皆陽氣不足。陰氣有餘也。治法。若肺氣虛弱。用四君枳殼半夏。脾虛不能生肺。補中益氣湯。七情氣結。四七湯。脾經鬱結。歸脾湯。脾氣虛弱。人參補肺散。肺經火盛。人參平肺散。腎水敗濁。六味丸。真陽虛損。八味丸。或兼小便不利為害尤速。非二丸不能救。仍與前十一十二論互用。

附治驗

一婦人傷風寒作喘。或用表散愈而復寒。乃用前藥。其正益氣飲食少思。胸腹不利。此因肺脾氣虛也。

予先用六君子湯加桔梗津愈。又用補中益氣湯全愈。一婦人患寒凝屬命門火虛不能生脾土用補中益氣湯八味地黃丸而痊後復患其喘甚。用前藥不應。遂用黑錫丹二服喘止。仍用前二藥而諸症痊。凡屬邪氣有餘者。其症易識。治効亦速。其屬元氣不定者。變症不一。効非可以旦夕期也。

神秘湯 治水氣乘肺作喘。或支飲喘滿痰嗽不食。

陳皮去白皮 柴蘇葉 人參 生薑白皮 生薑錢各一 右水煎服

干縉湯

半夏炮製 姜角去皮 甘草寸一 生薑如指右薑水煎服

棗膏丸 治息竇在右脇下大如杯。令人灑淅寒熱喘咳。

甜葶藶 陳皮 苦梗各等 右為末。煮棗肉丸桐子大。每服數丸白湯下。許學士云。余常

停飲水積食已。必噎漸喘覺肺急。服此良驗。

神授湯 治上氣喘急不得卧。

橘紅 苦梗 柴蘇 人參各一 五味子三粒炒右薑水煎服

九寶湯 治伏熱咳嗽喘急虛勞自汗者不可服。

薄荷 柴蘇 大腹皮洗 甘草炒 杏仁去皮 陳皮各一 右薑十片。烏梅一个。

水煎

四磨湯 治七情鬱結。上氣喘滿悶痰涎上湧。

人參 桔梗 沈香 烏藥 右四味各濃磨白沸湯少許溫服。

五味子湯 治咳嗽皮膚乾燥。唾中有血。胸膈疼痛。

五味子炒 桔梗炒 柴苑 甘草炒 緣斷各五 竹茹錢 赤小豆撮

生地黃錢 桑白皮炒 二錢 右水煎服。

附方

六君子湯

四君子湯

補中益氣湯

三方見二卷第六論

四七湯

方見十卷第七論

歸脾湯

方見第二十四卷第四論

人參補脾散

人參平肺散

二方見二十四卷第十二論

八味丸

二方見二十一卷第十一論

黑錫丹

方見四卷第四論

六味丸

卷第十一論

婦人風痰積飲咳嗽方論第十五

婦人脾胃虛弱。風邪外侵。以致痰滯咳嗽。眼昏頭眩。經云九竅不利。腸胃之所生也。無擇云。凡屬風熱。三生飲化痰丸屬寒。冷金沸草散屬暑熱。消暑丸屬氣熱。四七湯在上。瓜蒂散吐之在下。控涎丹利之。仍觀人之勇怯。脈之虛實。

愚按前症。若肝經恚怒。用小柴胡湯。肝經風熱。用鈎藤散。肝腎氣虛。用川芎散。脾經鬱結。用濟生歸脾湯。鬱怒傷肝脾。用加味逍遙散。脾虛痰逆。用白朮半夏天麻湯。脾氣虛弱。用六君子益氣湯。肺氣鬱滯。用二味貝母桔梗陰虧水泛六味地黃。督虛陰火。加減八味丸。腎虛火不歸源。八味地黃丸。仍與前接互相用之。

附治驗

一婦人內熱口乾勞則頭暈。吐痰帶下。或用化痰理氣藥。前症益甚。肢體或麻。又用祛風化痰藥。肢體常麻手足或冷或熱。此脾土不能生肺金也。余用補中益氣。加茯苓半夏炮薑。二十餘劑漸愈。又用加味道逍遙散三十餘劑全愈。後因怒。吐痰胸痞。或用清氣化痰丸。食少瘦甚。胸膈脹滿。脈或浮大或微細。余以六君。倍用參朮。少加木香而康。一婦人咳嗽腹痛。或用清肺化痰降火等劑。久不愈。更加內熱。晡熱。若兩脅或小腹內熱。其咳益甚。小便自遺。余曰。此屬肝經血虛火動。用六味丸加五味子。滋腎水。以生津血。用補中益氣。生脾土。以滋肺金。而平愈。

旋覆花湯 治風痰噦逆。飲食不下頭目昏眩等症。

旋覆花 枇杷葉 川芎 細辛 赤茯苓 銘一前胡一錢 右水薑東煎

大半夏湯 治痰飲脾胃不和。咳嗽嘔吐飲食不入。

半夏 白茯苓 生薑各一錢 右薑水煎服。胃痞加陳皮。如不應四七湯亦善。

導痰湯 治痰涎壅盛。胸膈痞塞。或咳嗽惡心。飲食少思。

半夏錢 南星 枳實炒 茯苓 橘紅錢 甘草五分 右薑十片水煎。

附方

川芎散 治肝腎氣虛頭風眩運。

小川芎 山藥 白茯苓 甘菊花 人參各五分 山茱萸肉兩 在每服一兩食前

空心水煎服。或為末酒調日三服。

小柴胡湯 方見二十一卷

鈎藤散 方見四卷

歸脾湯

加味逍遙散 方見二十一卷

白朮半夏天麻湯 方見四卷

六君子湯

補中益氣湯 方見二十一卷

二陳湯 方見二十一卷

六味丸

加減八味丸

八味丸 三方見二十四卷

婦人心胸嘈雜方論第十六

婦人嘈雜。此脾胃鬱火痰滯。血液渙汗而成。用猪血炒食之。乃以血導血而使之歸源耳。旋覆花湯尤善。愚按前症。若因食鬱。用六君山楂山梔。若因胃熱。用二陳薑炒芩連。若因六鬱。用越鞠丸。若因氣滯。用四七湯。桔梗枳殼大抵此症屬病氣元氣俱不足。須用六君為主。少佐以治痰之藥。若以火治之。必變吞酸中滿。

附治驗

一婦人飲食少思。胸中嘈雜。頭暈吐痰。此中氣虛而有熱。用六君子湯加炒黑山梔桔梗而愈。後因勞碌。頭暈發熱。吐痰不食用。補中益氣加半夏茯苓天麻而痊。一婦人中脘嘈雜。口中辛辣或咳嗽吐痰。發喘。面色或白或赤。此脾氣虛而肺中伏火也。用六君子。加山梔桔梗柴胡及炒黑片芩治之。尋愈。一婦人嘈雜吞酸。飲食少思。大便不實。此脾氣虛寒而下陷。用補中益氣湯加茯苓半夏炮薑漸愈。又常服人參理中丸則安。一婦人飲食後。嘈雜吞酸。此食鬱為痰。用六君子湯送越鞠丸漸愈。又用加味歸脾湯而痊。後因怒。兩脇脹痛。中脘作酸。用四君子湯送左金丸漸安。仍用六君子湯送越鞠丸而瘥。

旋覆花湯

治脾胃虛寒。中脘停痰。江洋嘈雜。腸鳴多睡。嘔吐不食。脇肋脹痛。脈沈遲弦細。

旋覆花

細辛

橘紅

桂心

人參

甘草炒

苦梗

白芍藥

半夏五分

赤茯苓各三

右薑水煎服。

余治婦人心胸嘈雜。用茯苓補心湯治之而愈。方見前。

附方

補中益氣湯

四君子湯

六君子湯

三方見二十一卷第六論

二陳湯

越鞠丸

四七湯

四卷第七論

歸脾湯

卷第五論  
方見二十四

人參理中湯

卷第二十一  
方見二十  
論

臨川陳自明編

吳郡薛已註

新都閔道政校

婦人嘔吐方論第一

婦人嘔吐良由脾胃不調外邪乘之或胃中虛冷或胃口有熱或中脘停痰或胃經血弱治法胃冷者丁香散理中丸胃熱者小柴胡湯竹茹湯胃虛者藿香正氣散停痰者半夏茯苓湯二陳湯血虛者十全大補湯加陳皮半夏藿香。

愚按東垣先生云前症內有故寒與新穀俱入於胃新故真邪相攻氣併相逆復出於胃故為嘔補手太陰。渴足少陰又云胃因氣逆為嘔夫嘔吐者俱屬於胃以其氣血多少為異耳如嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物血氣俱病也仲景云嘔多雖有陽明症慎不可下孫真人云嘔家多服生薑為嘔家之聖藥也氣逆者必散之故以生薑為主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲為血病也有食入則吐以橘皮去白主之嘔者少陽也多氣少血故有聲無物乃氣病也以薑製半夏為主若脾胃虛弱寒邪所客飲食所傷也用六君子丁香藿香生薑之類若胃中有熱膈上有痰用二陳山梔黃連生薑若久病胃虛嘔而不納穀者用生薑麥冬黃芪香附之類亦有痰膈中焦食不得下者有氣逆而嘔者有氣鬱於胃口者有食滯於心肺之分而復出者有胃口有火與痰而嘔者右注船大吐渴飲水者即死童便飲之最妙前論云血不歸源而嘔用十全大補湯誠發前人之未發愚常用屢效此

與王安道先生疾迴集  
所論少異仍宜參看之

附治驗

太守陽山之內素善怒胸膈不利吐痰甚多。吞酸噯腐飲食少思手足發熱數年矣所服非苓連枳實必楣蘇厚朴左闊茲決右闊茲數此肝火血燥木乘土位朝用六味地黃丸以滋養肝木夕用六君歸芍以調補脾土而愈乙巳夏因大怒吞酸噯腐胸腹脹滿或用二陳石膏治之吐涎如湧外熱如灼脉

洪大按之如無余曰此脾胃虧損虛陽發越於外脾敗而涎泛出也用六君加薑桂一鍾即睡覺而諸症如失又數劑而康先太宜人飲食後聞外言忤意嘔吐酸水內熱作渴惟飲冷水氣口脹大而無倫面色青赤此肝脾鬱火投之以藥入口即吐第三日吐宿食第七日吐酸黃水十一日吐苦水脈亦洪大仍喜飲冷以黃連煎湯冷飲少許至二十日加白朮茯苓二十五日加陳皮三十七日加當歸火草至六十日始進米飲半盃漸進薄粥調理得痊○一婦人食後因怒患瘧嘔吐用藿香正氣散而愈後復怒吐痰疾狂言熱熾胸脇脹痛手按少得脈洪大無倫按之微細此屬肝脾二經血虛以加味道遙散加熟地川芎二劑脈症頓退再用十全大補湯而安矣附庠沈姬文母患脾虛中滿疾嗽發熱又食濕麵冷茶吞酸嘔吐絕食誤服芩連青皮等藥益加寒熱口乾流涎不收聞食則嘔數日矣迎治余曰脾主涎此脾虛不能約制也欲用人參安胃散恐於眾論以為胃經實火宿食治之病日增劇忽思冬瓜食如指甲一塊頗發嘔吐酸水不止乃服前藥愈則復邀視之則神脫脈絕瀕死矣惟目睛尚動余曰寒淫於內治以辛熱然藥不能下矣急用鹽父附子炒熟裹臍腹以散寒回陽又以口氣補接母口之氣又以附子作餅熱貼臍間時許神氣少甦以參朮附子為末仍以是藥加陳皮煎膏為丸如粟米大入五七粒干口隨津液嚥下即不嘔二日後加至十粒諸病少退甘涎不止五日後漸服前劑一二匙胃氣少復乃思粥飲後投以參朮等藥溫補脾胃五十餘劑而愈

丁香散 治脾胃氣弱嘔吐水穀不消。

丁香

白朮

縮砂

草菓各三錢

人參一兩

當歸

白朮炭

藿香

甘草各半  
三錢  
薑製

橘皮三分

神曲炒

阿子各半  
兩

右為末

每服二錢  
舊東湯調

竹茹湯 治胃熱嘔吐

乾薑二錢

半夏三錢

甘草五分

竹茹一錢  
子大

右薑粟水煎服

蘇學士先生云胃熱者于足心熱四肢和中一宗人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥食不下用丁香

藿香滑石等藥下咽即吐余曰此正汗後餘熱留胃腑正宜竹茹湯用之即愈  
許仁則半夏丸 治胃冷嘔逆不食

半夏洗去滑小麥麵丸 右水和丸如彈子大水煮熟初服二四丸二服加至十四五丸旋煮間服

七味人參丸 服前丸不應可服此藥。

人參兩 白朮各五 厚朴姜製兩 細辛各四 生薑 橘皮三兩 桂心二兩 右為末煉

蜜丸桐子大米飲下十九漸加至二十九

青金丸 治嘔吐不已

硫黃錢一錢 水銀一錢 右入銚內慢火化以木片攢炒成砂研至黑不見白星薑汁糊丸薑大每  
服二三十九米飲下。

附方

人參安胃散 治脾胃虛熱嘔吐泄濁或飲食不入

人參錢一錢

黃耆炒二錢

生甘草

炙甘草各五分

白芍藥六分

白茯苓四分

陳皮三分

黃連炒二分

右水煎服

六君子湯

加味逍遙散

十全大補湯二方見二十四卷第四論

六味丸方見二十一卷第十一論

藿香正氣散方見二十一卷第九論

婦人霍亂方論第二

論曰嘔吐而利者名霍亂也因腸胃虛弱飲食過度觸冒風冷清濁相干所致或先腹痛而吐或先吐而  
痛或吐利並作當分寒熱而治之飲冷者立令散飲湯者理中丸四肢逆冷脈微細者用通脈四逆湯加

猪膽汁。中暑霍亂煩渴飲冷轉筋者用香薷散脉浮洪者易治微遲者難治

愚按賈元良先生云暑者相火行令也夏月人感之白口齒而入傷心胞絡之經其症頭疼口乾面赤

自汗。倦急少氣。或背寒惡熱。長者迷悶不省。或霍亂吐利。嘔痰腹痛。或下血發黃。生班等症。治法清心大利小便為主。若自汗熱甚。用白虎湯。若頭痛惡寒。用十味杏薑散。泄瀉煩渴。飲水吐逆。用五苓散。熱甚煩渴。用益元散。清之若表鮮。裡熱甚者。用黃連解毒湯。脈微下利。作渴喜溫。或厥冷。不省人事。宜竹葉石膏湯。加熟附半枚。冷飲。次以來復丹。五苓散。治之。故東垣云。脾胃虛弱。遇夏月溼雨。身重氣短。甚則四肢痠軟。脚欹眼黑。當滋肺氣。以補水之源。是以五月常服五味子。人參麥冬之劑。為熱傷元氣。故耳。丹溪所謂夏月伏陰在內也。蓋人之腹屬地。已月六陽。盡出於地之上矣。是人之陽氣亦浮于肌表。散于皮毛。而腹中之陽虛矣。又加以涼臺水館。大扇風車。寒泉水。草水涼之物。自內及外。不用溫熱病所由生。陳無擇云。凡中暍切不得用冷藥。惟用溫養得冷。即死。道途無湯。即以熱土熨臍中。弱以熱尿。即甦。舉可見矣。內經曰。脈虛身熱得之傷暑。難經曰。傷暑得之為正邪火自病也。當惡臭。其病身熱而煩心痛。其脈浮大而散。傷寒論曰。太陽中暍者。身熱疼痛。而脈微弱。或發熱惡寒。而脈微細芤遲。大抵寒傷形。熱傷氣。蓋傷氣而不傷形。則氣消而脈虛弱。故先哲立法。夏月宜補。良有以也。前症若內有所積。外有所感。用二陳湯加減治之。或蘿蔔子搗碎。服而吐之。若飲米湯。即死云云。同前論。若轉筋不住。男子以手挽陰。女子以手牽乳。近兩邊。此千金妙法也。乾霍亂。不得升降。犯在湏兒。當以鹽湯吐之後。以二陳湯加川芎。蒼朮。防風。白芷。蔓荆煎服。若登圓而不通。加枳殼。若食瓜果。飲冷乘風。霍亂用六和湯。倍加藿香。凡中暑而亡者。皆因元氣虛弱。而暑熱乘之。以致泄瀉。陽氣暴脫。實為陰寒之症。宜急補其陽。庶得保生。緩則不救。其他孰為暑熱。投以寒藥。鮮不誤事。愚故以固陽固本之方。繼之於後。

### 附治驗

進士李通甫之內。冬間閑衣箱。其內衣裳乃夏月所晒者。開時覺暑氣所侵。良久患霍亂。足指足跟俱轉筋。甚惡。自分必死。用香薷飲一劑。急煎下咽。即愈。

人參

白术

乾薑

甘草

右為末，煉蜜杵勻，每兩作五丸，每服一丸，白湯化下。

嘔吐加枳實泄瀉乾嘔，加半夏、體冷微汗、腹寒加炮附子。水煎服。

四順附子湯 治霍亂吐利腹痛，手足厥冷，脈微絕。

方見八卷第十一論

四逆湯加豬膽汁名四逆猪膽汁湯。

甘草

二兩

乾薑

三兩

附子

一枚生

右每服五錢水煎入猪膽汁半合，合作二服。

香薷散 治吐利腹疼，發熱頭痛，或霍亂轉筋拘急。

香薷

二錢

白扁豆

厚朴

薑製一錢

茯苓

各三錢

右水煎冷服，連進二三劑，加黃連名黃連香薷飲。

十味香薷散 治伏暑身體倦怠，頭疼惡寒，或吐瀉等症。

香薷

一兩

人參

陳皮

白术

炒

茯苓

黃耆

炒

木瓜

不犯鐵器

升麻

錢一錢

人參

神曲

炒

陳皮

各五分

甘草

一錢

清暑益氣湯 治長夏濕熱所致四肢困倦，精神短少，懶於動作，胸滿氣促，支節作疼，或氣高而喘，身熱而煩，心下膨悶，小便黃數，大便溏瀉，或瀉痢作湯，不思飲食，自汗體重。

黃耆

炒

麥門冬

去心

當歸

各三錢

葛根

分

五味子

九粒

澤瀉

五分

青皮

二分

右水煎服。

白虎湯 治胃熱作渴，暑熱尤效，又治熱厥腹滿，身難轉側，面垢譫語，不時遺溺，手足厥冷，自汗，脈沉滑。

知母

錢一錢

石膏

各二錢

梗米

合

右水煎服。

人參白虎湯 治暑熱發渴，脈虛等症。

人參

一錢五分

知母

錢二錢

石膏

五錢

甘草

錢一錢

右入梗米一合，水煎服。

人參益氣湯 治暑熱傷氣，四肢困倦，嗜卧少食，兩手指麻木。

黃芪炒八錢

甘草七錢人參半錢

升麻二錢

白芍藥炒三錢

五味一百四十個

桔炒柴胡二錢

右咬咀分

作四服。

大順散 治胃暑伏熱引飲過多。脾胃受濕水穀不分。清濁相干。陰陽氣逆。霍亂嘔吐。臟腑不調。

甘草炒

乾薑炮

杏仁去皮大炒

桂枝

石為末每服二三錢湯點服。

消暑丸

治傷暑。發熱頭疼。或嘔吐泄瀉。二便不分。

半夏

甘草炒

茯苓各半

右為末生薑汁和九桐子大每五十丸水下易簡方。薑汁好醋

煮半夏末作糊丸服。

薑附湯 治霍亂轉筋。手足厥冷。汗出嘔逆。腹痛脈欲絕者。

乾薑炮一兩

附子生用一斤

右為末每服五錢水煎服。

通脈四逆湯

治霍亂惡寒腹痛身冷。自汗脈沉微如欲絕。

吳茱萸炒二兩

附子炮一兩

桂心

通草

細辛

白芍藥炒

甘草半兩

當歸三錢

右每服四錢水酒生薑煎。如不應更加倍服之以效為度。

半夏解毒湯

治一切暑熱毒。五心煩躁口舌咽乾。

黃柏炒

黃芩炒

山梔子炒

半夏等分

右每服五錢水煎。

六和湯

治胃暑伏熱煩悶霍亂轉筋。吐瀉寒熱交作。頭目昏痛。嗜卧倦怠。小便赤澀。不問胎產並服之。

縮砂

半夏湯炮上次

杏仁去皮大炒

人參

甘草一兩

赤茯苓

藿香

木瓜各二兩

白扁豆姜汁炒薌

厚朴姜製各四兩

右每服一兩薑蜜水煎服。

益元散 治中暑身熱小便不利或發熱體痛。口乾作渴。

滑石六兩

甘草微炒一兩

右為末每服三錢加蜜少許。湯水任下。

二陳湯

方見二十四

來復丹

五苓散二方見二十

婦人翻胃吐食方第三論 新增

愚按病機云前症有二。曰氣積寒也。皆從二焦論之上。焦吐者從於氣。氣者天之陽也。其脈浮而洪。食已暴吐渴欲飲水。大便燥結。氣上衝胸發痛。其治法當降氣和中。中焦吐者從於積。有陰有陽。食與氣相假為積而痛。其脈浮而濡。其症或先痛而後吐。或吐而後作痛。治法當以小毒藥去其積。橘柳木香行其氣。下焦吐者從於寒地之道也。其脈沉而遲。其症朝食暮吐。暮食朝吐。小便清。大便秘而不通。治法當以毒藥通其閉。塞溫其寒氣。大便漸通。復以中焦藥和之。不令大便秘結而自愈也。王大僕曰。食不得入。是有火也。食入反出。是無火也。又發明曰。噎者。六腑之所主。陽也。氣也。塞者。五臟之所主。陰也。血也。二者皆由陰中伏火而作也。劉宗厚先生曰。若三焦傳化失常所致。主於氣也。若血虧胃脫乾槁所致。因於血也。塞猶填塞不通之義。故發明有治幽門不通。噎塞不便。通幽湯例。蓋陽無陰不能通化陰之失位。而陽伏其中。傳化不變。而反上行矣。故前症或由飲食起居。七情虧損脾胃。痰飲停滯中氣不運。當以補中益氣湯為主。若鬱結傷脾。用歸脾湯。加枳殼桔梗。若恚怒傷肝。用小柴胡。加梔苓參木。脾氣虛弱。用六君加山梔枳殼。氣血俱虛。用八珍湯。加山梔半夏。若用行氣之藥。胸膈痞悶。用六君芎歸之類。若過用香燥之劑。而大便結燥。用四物參木之類。若飲食不能入。用六君山梔吳茱萸製黃連。若食入而反出。用六君炮薑白豆蔻黃連製吳茱萸。痰滯而食反出。六君枳殼桔梗。若飲食少思。大便不實。胸膈痞悶。吞酸噯腐。食反不化。是為脾胃虛寒。用東垣固真丸。或八味丸。若發熱類熱。身惡風寒。腹畏熱食。或手足俱冷。胸滿腹脹。是內真寒外假熱。用神效附子丸。或八味丸。若嘔吐善食喜飲冷水。是為有火。嘔吐少食。喜飲熱湯。是為無火。當審其因而治之。

附治驗

一婦人患前症。胸腹痞悶。得去後。或泄氣稍寬。余曰。此屬脾氣鬱結而虛弱也。當調補為善。不信。乃別

用二陳枳實黃連之類不應。又用香燥破氣前症益甚形氣愈虛。余用加味歸脾湯調治半載而痊。一婦人患前症。胸脇脹悶或小腹不利或時作痛。小便清滯。余曰此肝火血虛也。當清肝火。生肝血。養脾土。生肺金。以余言為迂。別服和氣化痰等劑。前症益劇。虛症益起。余用加味逍遙散加味歸脾湯。兼服尋愈。○一婦人患吐痰甚多。手足常冷。飲食少思。余曰此肝脾鬱怒兼命門火衰不信。另服化痰利氣之劑。胸腹愈張。又服峻利疏導之劑。余曰非其治也。必變脾虛發腫之症。急服全匱加減。督氣丸庶有可救。仍不信。反服沉香化氣等丸。果發腫而歿。

白堊散 治虛熱翻胃。用白堊土一斤。米醋一升。煅土赤入醋內。再煅丹火以醋乾為度。取土一兩。入炮薑一錢為末。每服一錢。米飲下。甚者二錢。須服四兩有效。

治實熱翻胃。用黃連五錢。生薑汁浸炒山楂三錢。保和丸三錢。同為末。糊丸麻子大。胭脂為衣。每服六十丸。煎人參湯竹瀝下之。

太倉丸 治胃弱翻胃。

肉荳蔻 砂仁各二兩 丁香一兩 陳倉米升 右為末。薑汁糊丸桐子大。每服六七十丸。薑湯下。  
青金丹 每服三十九。生薑陳皮煎湯送下。方見前  
嘔吐類

附方

東垣補真丸

肉蓯蓉 浸培 胡蘆巴少 附子 炮去皮 陽起石 煅 肉荳蔻 浸裹 兔絲子 洗淨酒浸蒸皮 川烏 炮去皮

沈香

五味子 各五錢 鹿茸 酒浸炒 巴戟 去心

鍾乳粉 各一兩 右為末。用羊腰子兩對。治如食法。

椒酒煮搗爛。入酒糊丸如梧子大。每服七十九。空心米飲鹽湯任下。

神效附子丸 治脾胃虛寒嘔吐。或翻胃膈噦。用黑附子童一兩四五錢。端正底平。火圓一枚。灰大炮皮裂入生薑自然汁內。浸潤晒乾。再入汁浸潤。仍晒再炮。用盡薑汁半碗為度。却去皮臍為丸。以人參煎

膏丸泰米大。每服數丸津唾嚥下。胃氣稍復。飲食稍進。投以溫補之劑。

六君子湯

補中益氣湯

四物湯

三方見二十一  
四卷第六論

歸脾湯

加味歸脾湯

八珍湯

加味道遙散

四方見二十  
四卷第四論

八味丸

方見二十一

卷第十一論

二陳湯

方見二十四  
卷第五論

金匱加減腎氣丸

九方見二十二  
卷第十二論

婦人血膈方論第四

愚按前症。若氣逆而血滞。用流氣飲。若恚怒而血逆。用小柴胡山梔丹皮。血虛用四物參。木柴胡山梔丹皮。若鬱結而血傷。用加味歸脾。兼加味道遙散。脾虛不能生血。用六君歸芍。胃虛不能生血。用益氣湯。若肝虛而不能藏血。用補肝散。如不應。兼以六味丸。若因肺虛。用補中益氣湯。如不應用。六君加芍歸。

附治驗

一婦人患前症。胸膈痞悶。余曰。此屬脾經血虛。遂用四君芍歸調補脾氣。尋愈。又因怒。兼兩脇痞悶。頭目不清。月經旬餘未竭。用加味道遙散。加鈎藤治之。復瘥。○一婦人患前症。胸膈作痛。面青目劄。小便頻數。或時寒熱。此肝氣滯而血凝。先用失笑散二服。痛止。又用加味道遙散而愈。○一婦人所患同前。泛用行氣破血之劑。以致不起。

神功散 治血滯胸腹作痛。

五靈脂炒一錢

莪朮

桂心

荳臺子炒各半兩

右每服二錢。酒水煎。

附方

流氣飲

三方見三卷  
第七論

加味道遙散

四卷第二十  
卷第四論

四物湯

小柴胡湯

方見二十一

卷第二論

加味歸脾湯

四君子湯

六君子湯  
四方見二十一卷第六論

補肝散  
方見本卷第十七論

六味丸  
方見二十一卷第十一論

失笑散  
方見二十一卷第五論

製吳茱萸黃連法用二味等分用熱湯拌濕和勻重湯頓服使氣相通同炒焦各棟出聽用。

婦人鼻血方論第五

婦人氣血調和則循環經絡若勞傷元氣陰虛火動氣逆於肺則血隨鼻而衄產後尤不可治陳無擇曰亦有因怒氣而得者趙葵人鼻衄先用蘇合香丸四粒次用五苓散濃煎白芍花湯調服即止又用芍歸湯調理而安一富男鼻血六脈洪數訊之云曾服丹藥遂用芩連大黃為末水調服解之而愈。

愚按前症若熱鬱於胃經用犀角地黃湯若伏暑於內用黃連香薷飲若大怒血蓄於上用小柴胡湯若脾損不能攝血歸源用歸脾湯大凡雜症見血多因陰分鬱熱或內有所傷皆屬五志所動經曰諸見血身熱脈大者難治是大邪勝也身涼脈靜者易治是正氣復也仍與後症同用。

附治驗

一婦人經素不調因怒衄血此肝火熾盛用加味小柴胡加紅花二劑血止又用加味逍遙散入珍湯煎服三十餘劑經行如期○一婦人鬱結而患前症用加味歸脾湯其血漸止飲食漸進用加味逍遙散元氣漸復寒熱漸止後因怒乃衄寒熱往來用小柴胡湯加芍歸丹皮而愈○一婦人因勞衄血服涼血之劑更致便血或以血下為順仍用治血余曰此因脾氣下陷而血從之當升補脾氣庶使血歸其經不信果血益甚余朝用補中益氣湯夕用加味歸脾湯而愈此症用寒涼止血不補脾胃而死者多矣。

刺創散 治血熱鼻衄。

刺創

生地黃各二錢

桑耳

亂髮灰

父葉炒各一錢

蒲黃五分

右水煎服

犀角地黃湯  
方見後

又方用白茅根汁一合飲之即止

又方用生葱心塞鼻中血即止若刀斧所傷

用之亦血亦止。四物湯加側柏生地黃治虛熱吐血甚效。若脾經血虛須用四君加芍藥。若脾經氣虛須用歸脾湯。若肝腎虧損須用六味丸。若氣血俱虛須用十全大補湯。

附方

濟生犀角地黃湯 治熱鬱不解泛行經絡或流腸胃隨氣湧泄以致衄血吐血或為便血並背治之。

犀角銹如無升麻代生地黃 白芍藥 牡丹皮各一 右每服四五錢水煎若實熱熾甚加炒黃芩。若

去血過多或肺脾之氣虧損不能攝血歸源者急用四君子湯懷抱鬱結者用歸脾湯。

枇杷葉湯 治暑毒攻心衄血嘔血或吐瀉作渴。

香薷錢二錢 厚朴薑製一錢半 甘草炙 麥門冬去心 木瓜不見鐵器 白茅根各一 枇杷葉

陳皮 丁香各半錢 右末每服三五錢薑水煎

黃連杏薷飲 治伏暑衄血便血不拘四時

第一見本卷

小柴胡湯

加味小柴胡湯二方見二十

歸脾湯

加味道遥散

八珍湯

加味歸脾湯四方見二十

補中益氣湯

方見二十一  
四卷第六

婦人吐血方論第六

婦人吐血者由臟腑傷損所致夫氣血外行於經絡內榮於臟腑若六淫七情飲食起居有所損傷行失常道逆則吐血也。

愚按前症若脾經鬱熱用犀角地黃湯。脾胃伏暑用黃連杏薷飲心脾鬱熱用生地黃湯心氣耗損用茯苓補心湯。肺氣勞傷用雞蘇散。思慮傷脾用歸脾湯。暴怒肝火用加味小柴胡湯。父怒肝傷六味地黃丸。脾肺虛熱用麥門冬飲。肝腎虛熱用六味地黃丸。氣血俱虛用十全大補湯。經云肺朝百脈之氣。肝統諸經之血必用甘溫之劑補其陽氣使血各歸其經如大吐血病毋論其脈急用獨參湯救之。若

潮熱咳嗽而脈數者。元氣虛而假熱之脈也。皆由脾胃先損須用人參之類。本草云人參治脾胃不足。補中溢中。濕脾肺中火。東垣先生云脾胃虛者心火亢甚而乘土位。肺氣受邪須用黃芪最多。人參甘草次之。脾胃一虛肺氣先絕。故用黃芪以益皮毛而閉腠理。嘗治氣血虛弱用十全大補最善。右用寒涼止血胃氣反傷無不致禍。

附治驗

一老婦每作先飲食不進或胸膈不利或中脫作痛或大便作瀉或小便不利余以為肝脾之症用逍遙散加山梔茯神遠志木香而愈後鬱結吐紫血每作先倦急煩熱以前藥加炒黑黃連三分吳茱萸二分頓愈復因怒吐赤血甚多燥渴垂死此血脫也法當補氣乃用人參一兩。芩木當歸各三錢陳皮炮黑乾薑各二錢。炙甘草木香各一錢一劑頓止又用加味歸脾湯調理而痊。○一女子懷抱素體胸滿食少吐血面赤用六味丸及歸脾加川梔貝母芍藥而愈。○一婦人為哭母吐血咳嗽發熱盜汗經水不行此悲傷肺思傷脾朝服補中益氣加桔梗貝母知母夕用歸脾湯送六味丸而愈。

柔脾湯 治虛熱吐血衄血汗出。

甘草炒

白芍藥炒

黃耆各半

熟地黃白製一兩五錢

右每服五錢水酒煎。

一婦人月經不利忽妄行嘔血察其形脈如常用四生丸即安。一女子絕食負重而吐血用前湯及青餅子而愈世治吐血並用竹茹地黃藕汁亦不可拘泥如陽乘於陰血得熱則流散經水沸溢理宜涼解。大黃犀角之類如陰乘於陽所謂天寒地凍水凝成冰須當溫散乾薑肉桂之類。

四生丸 治陽乘於陰以致吐血

生荷葉

生父葉

生柏葉

生地黃各一

右研九雞子大每服一丸水煎服。陳日華云先

公嘗遊靈石寺主僧留飯設泉一僧見卓不穩急俯穩之舉首即嘔血明年到寺問舊嘔血者何如。主僧言服得四生丸遂愈自得此方屢次有效。愚意前症乃內熱暴患用之有效。若人病久本元不足須

補脾以滋化源。否則虛火上炎。金反受剋。獲生解矣。

犀角地黃湯

方見前

薑草湯

右陰乘於陽寒而嘔血。

甘草炒

乾薑各

右水煎服。理中湯亦妙。

花益石散

治療血積於內。以致大小便不通或血蓄於上。而吐不止。一婦人若吐血。百藥不效。童便酒

調不數服而愈。

方見胎衣不下

卷催生

如聖散

治吐血不已。每服二錢。米飲下。

方見十七卷催生

附方

濟生雞蘇散

治勞傷肺經。痰中有血咽喉不利。

雞蘇葉

黃芪炒

生地黃

阿膠炒

貝母

白茅根各

一錢

桔梗炒

麥門冬去心

蒲黃炒

甘草炒各

右薑水煎服

生地黃散

治鬱熱血咯血。吐血陰虛而不能愈者。

枸杞子

柴胡

黃連炒

地骨皮

天明冬

甘草炒

白芍藥炒

炒黃芩

黃芪炒

生地黃

熟地黃

自製各

右水煎下。血加地榆。

三因茯苓補心湯

治面色黃瘁。五心煩熱。咳嗽吐血。

半夏

前胡

紫蘇

茯苓

人參

枳殼

麵炒

桔梗炒

甘草炒

乾葛各五錢

當歸一錢

川芎

陳皮

白芍藥

各一錢

熟地黃

自製一錢

右薑水煎服

麥門冬飲子

治氣虛吐血。或氣虛不能攝血者。

五味子

根十枝

麥門冬去心

黃芪一錢

當歸身

人參

生地黃

各半錢

右水煎服

十全大補湯 治胃氣虛弱。吐血衄血。便血不止。以致外症惡寒發熱。自汗盜汗。食少體倦。或寒熱作渴。頭疼眩暉。而似中風。或氣血俱虛。胸腹脇痛。或骨節作痛。經候不調。或寒熱往來。發熱晡熱。或五心發熱。咽乾舌燥。或痰嗽喘促。胸膈虛痞。或嘔吐泄瀉。手足冷熱等症。

歸脾湯

加味逍遙散

二方見二十四卷第四論

加味小柴胡湯

方見二十一卷第二論

六味丸

八味丸

二方見二十一卷第六論

獨參湯

方見三卷第十一論

補中益氣湯

方見二十一卷第六論

黃連香薷飲

杞杞葉散

二方見本卷前

婦人痃癖諸氣方論第七

婦人痃癖。因元氣虛弱。而邪氣積聚。蓋痃者在腹內。近臍左右。有筋脉急痛。如臂如指如絃之狀。癖者。僻在兩肋之間。有時而痛。皆陰陽不和。經絡痞膈。飲食停滞。冷氣固結而成也。

愚按前症。因飲食起居。七情失宜。虧損臟腑。氣血並違。陰絡受傷。循行失度所致。羅謙甫先生曰。養正邪自除。必先調養。使榮衛充實。若不消散。方可議下。但除之不以漸。則必有顛覆之害。若不守禁忌。縱嗜慾。其有不喪身者鮮矣。

附治驗

一婦人內熱作渴。飲食少。思腹內初如雞卵。漸大四寸許。經水三月一至。肢體消瘦。齒頰似瘡。脈洪數而虛。左關尤甚。此肝脾鬱結之症。外貼阿魏膏。午前用補中益氣湯。午後用加味歸脾湯。兩月許。肝火少退。脾土少健。用前以補中益氣。下六味丸。午後以逍遙散。下歸脾丸。又月餘。日用蘆薈丸二服。空心以逍遙散。下歸脾湯。喜其謹疾。調理年餘而愈。一婦人腹內一塊。不時上攻。或作痛。有聲。或吞酸痞悶。月經不調。小便不利。一年餘矣。面色青黃。余以為肝脾氣滯。以六君加芎歸柴胡芍炒連木香吳茱各少許。二劑。却與歸脾湯。下蘆薈丸。三月餘。肝脾和。而諸症退。又與調中益氣加茯苓丹處中氣健。而經自調。一婦人性多鬱善怒。勤於女工。小腹內結一塊。或作痛。或痞悶。月經不調。常服伐肝

之劑內熱寒熱。胸膈不利。飲食不甘。形體日瘦。牙齦蝕爛。此脾土不能生肺金。肺金不能生腎水。腎水不能生肝木。當滋化源用補中益氣六味地黃。至仲春而愈。

松江太守何恭人性善怒。腹結一塊。年餘上脇鍼透。血氣虛極。時季冬。肝脈洪數。按之弦緊。或用伐肝木清胃火之藥。余曰。真氣虛而邪氣實也。恐伐肝木。至春不能發生耳。用八珍湯以生氣血。用地黃九以滋腎水。肝脈頓退。因大怒耳。內出血。肝脈仍大。煩熱作渴。此無根之火也。仍以前藥加肉桂二錢。服飲熱退復。因大怒果卒於季冬辛巳日。乃金克木故也。○一婦人經候過期。發熱倦怠。或用四物。首連之類。反兩月一度。且少而成塊。又用峻藥通之。兩目如帛所敝。余曰。脾為諸陰之首。目為血脉之宗。此脾傷五臟皆為失所。不能歸於目也。遂用補中益氣濟生歸脾二湯。專主脾胃。年餘而愈。

麝香丸 治瘡癬冷氣心腹作痛。

麝香

二錢  
另研

五靈脂

炒

阿魏

五錢蜜裹

桃仁

三稜

各二兩

光花

醋炒

檳榔

各一兩

當歸

各五錢

右為末。飯九桐子大。每服十九丸。淡醋

湯下。

莪茂

醋製

桂心

沒藥

木香

當歸

各五錢

右為末。飯九桐子大。每服十九丸。淡醋

治瘡癬神效。以積猪肝一具重十餘兩。用巴豆仁五十枚入肝內。用釀醋三碗。慢火熬乾研爛。量入三稜末九桐子大。每服五丸。食前熱酒下。

羅安人每經行臍腹痛甚。以桃仁桂枝湯一劑而瘥。

方見第一卷第十二論

治經來腹先痛。用局方七氣湯送來復丹。局方積氣丸。瘡癬痕諸氣亦効。

附方

蘆薈丸 治瘡癬。肌肉消瘦。發熱潮熱。飲食少。思口乾作渴。或肝疳食積。口鼻生瘡。牙齦蝕爛等症。

蘆薈

胡首連

黃連

少焦

木香

炒七錢

甘草

炒七錢

右為末。米糊丸。桐子大。每服七八十九。米湯下。

茯苓

陳皮

各一兩

五錢

甘草

炒七錢

右為末。米糊丸。桐子大。每服七八十九。米湯下。

阿魏膏 治一切痞塊更服胡連丸

羌活

獨活

官桂

赤芍藥

穿山甲

生地黃

兩頭尖

大黃

白芷

天麻各五錢

槐柳枝各三錢

紅花四錢

木鼈壳一枚

亂髮如雞子

一圓

右用香油二斤四兩煎黑去相入髮煎髮化仍去相徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿

魏蘇合油

乳香沒藥各五錢麝香三錢

調勻即成膏矣摊貼患處內服九藥黃丹須用真正者效。凡貼

膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥有是

肝積加蘆薈末同熨。

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十六卷第六論

八珍湯

加味歸脾湯

歸脾湯

二方見二十一卷第十一論

六味丸

方見二十一卷第十一論

調中益氣湯

方見四十五卷第五論

婦人疝瘕方論第八

婦人疝瘕之病由飲食不調氣血勞傷或胎產經行風冷相搏所致。益疝者痛也。瘕者假也。脈弦急者生虛弱者死。尺脈濤浮牢為血實虛氣腹痛逆氣上行為胞中有惡血久則結成瘕也。愚按子和先生云遺溺閉癃陰痿浮脾精滑白淫皆男子之疝也若血涸月事不行行後小腹有塊或時動移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕。

附治驗

一婦人小腹痞脹小便時下白帶水淋瀝此肝經濕熱下注用龍膽瀉肝湯而愈。一婦人小腹脹痛小水不利或胸乳作痛或脇肋作脹或氣逆心悶余以為用火而血傷脾用四物柴胡青皮玄胡索木香而愈。一婦人小腹痞悶小便不利內熱體倦懶食用八珍湯加柴胡山梔龍膽草治之而安。乾糞散 疝瘕脇肋疼痛。

乾漆  
烟盡

木香

芫花  
醋炒

赤芍藥  
桂心

當歸

川芎

琥珀  
雨各半

大黃  
炒二兩

牛膝  
一兩

桃仁  
去皮一兩另包

麝香  
一錢

右為末每服一錢溫酒調下

蟠苓散

治別症屬寒氣不能疼痛甚

丸方見二十八論

附方

寶鑑疾利方

治陰疝小腹作痛小便不利手足逆冷或脇腹悶痛。

蒺藜  
去刺

附子  
炮

梔子  
去皮各半兩

右為末每三錢水煎食前溫服。

丹溪定痛散

治寒疝疼痛速效

枳殼  
個十五

山梔子  
炒

唐慈子

吳茱萸  
過炒

荔枝核  
等分炮各

右末用長流水調下一二錢空心服。

三四失笑散

治小腸疝氣痛或血疝肚腹作痛

方見二十一論  
卷第六論

龍膽瀉肝湯

方見二十一論  
卷第八論

四物湯

方見二十四  
卷第六論

八珍湯

方見二十四  
卷第四論

婦人八瘕方論第九

婦人臟腑調和經脈循環則月水以時故能生子而無病若乘外邪而合陰陽則小腹胸脇腰背相引而痛月事不調陰中腫脹小便淋瀝面色黃黑則瘕生矣入瘕者黃青燥血脂瘀蛇蠶是也千金外臺言之詳矣。

愚按經曰氣主嘘之血主濡之若血不流則凝而為瘕也瘕者中雖硬而忽聚忽散多因六淫七情飲食起居動傷臟腑而成當於症瘕諸症治同慎不可復傷元氣。

桃仁煎  
治血瘕

桃仁

大黃  
炒一兩

蟲蠅  
炒黑

朴硝  
一兩

右為末以醇醋一鍾石器中煮三分下前三味不住手櫬煎至可九下朴硝九桐子大不吃晚食五更初溫酒下五丸日午下穀物如未見丹服仍以調氣血藥補之向在毗陵一婦人小便不通臍腹脹甚予診之曰此血瘕也用前藥一服腹痛下血塊

血水即愈此藥猛烈大峻氣血虛者斟酌與之。

大硝石九 治癰癥入癰當用此藥去之不令人困。

硝石三

大黃四兩

人參一錢

甘草八分

右為末苦酒一升石器中先入大黃煎膏入餘藥

九梧子大每服三十九米飲下三日一服宜下食物。

婦人腹中瘀血方論第十

婦人腹中瘀血者由月經閉積或產後瘀血未盡或風寒滯瘀久而不消則為積聚癰瘕矣。

愚按前症若鬱結傷脾用加味歸脾湯若恚怒傷肝用加味逍遙散若產後惡露用失笑散若肝脾虧損用六君柴胡以補元氣為主胃氣虛弱用益氣湯加茯苓半夏為主大凡腹中作痛畏手按者此內有瘀血若形體如常屬病氣元氣俱實用桃仁承氣湯直下之若痛而肢體倦怠飲食少恐此脾胃受傷屬病氣有餘元氣不足用當歸散調和之若痛而喜手按腹形體倦怠飲食少思此形氣病氣俱不足用六君炮薑辛歸純補之若痛而大便不實飲食難化此脾胃虛寒用六君炮薑肉果溫補之若痛而作嘔少食此脾胃虛弱用六君炮薑藿香石痛而嘔吐不食泄瀉用六君加薑桂若兼手足逆冷自汗更加附子此症多有因攻伐而致者。

附治驗

一婦人耳下腫赤寒熱口苦月經不調小腹內一塊此肝火氣滯而血凝也用小柴胡加山梔川芎丹皮治之諸症悉退一婦人久患腹痛去瘀血方止而腹大痛諸藥不納予以脾胃之氣虛寒用參术炮薑丸如黍每用數粒津喚下後以二味濃煎漸呷而愈。

桃仁九 治瘀血不利小水不調發熱作渴心腹滿急或肚腹中作痛。

桃仁

大黃四兩

蟲蟲炒去足

水蛭四十枚

右為末煉蜜丸桐子大每服五六丸空心熱酒下

附方

桃仁承氣湯 治瘀血小腹急痛。大便不利或譫語口乾渴水不嚥遍身黃色。小便自利或血結胸中。手不敢近腹或寒熱昏迷其人如狂。

桃仁半兩 大黃炒一錢 甘草二錢 肉桂一錢 右薑水煎每日五更服。

附方

加味歸脾湯 治瘀血已去或脾經失血。小腹作痛無寐發熱盜汗。或脾傷不能攝血或心脾傷痛嗜卧少食或憂思傷脾。血虛發熱或肢體腫痛。大便不調或經候不准。晡熱內熱。

加味逍遙散二方見二十四論

失笑散方見二十五論

六君子湯

補中益氣湯二方見二十一論

當歸散方見後卷第五論

小柴胡湯方見二十四論

婦人癰癧方論第十一

婦人癰癧由飲食失節。脾胃虧損邪正相搏積于腹中。牢固不動故名曰癰。得冷則作痛。冷入子藏則不孕。入胞絡則月水不通。

愚按前症若脾胃虛弱用六君子加芍。若肝脾虛弱用補中益氣。及歸脾湯。若肝火鬱滯佐以蘆薈地黃二丸外貼阿魏膏。患者須慎七情六淫飲食起居。治者不時審察病機而藥之庶幾有效。

附方

山甲散 治癰瘡瘀血心腹作痛。

穿山甲炙炒

鱗甲醋炙

赤芍藥

大黃炒

乾漆炒令

桂心各一

川芎

羌活醋炒

當歸尾各五錢

麝香一錢

右為末每服一錢酒調下。

六君子湯

卷第十二論

六味地黃丸見二十四論

阿魏膏二方見本

卷第十七論

蘆薈丸

卷第十七論

六君子湯

卷第十六論

六味地黃丸見二十四論

阿魏膏二方見本

卷第十七論

蘆薈丸

卷第十七論

六君子湯

卷第十七論

六君子湯

卷第十七論

六君子湯

卷第十七論

六君子湯

卷第十七論

六君子湯

卷第十七論

婦人食癰方論第十二

婦人食癥由臟腑虛弱。經行不順。生冷飲食。或勞傷元氣所致。陳無擇云。經不行者。宜先導之。然後固元氣為主。

愚按前症。若形氣虛弱。須先調理補脾胃為主。而佐以消導。若形氣充實。當先充導為主。而佐以補脾胃。若氣壅血滯而不行者。宜用烏藥散。散而行之。若脾氣虛而血不行者。宜用四君芳歸補而行之。若脾氣鬱而血不行者。宜用歸脾湯。解而行之。若肝脾血燥而不行者。宜用加味道遙散清而行之。大抵食積痞塊之症。為有形。益邪氣勝則實。真氣奪則虛。當養正。闢邪而積自除矣。雖然堅者削之。客者除之。胃氣未虛。或可少用。若病久虛乏者。不宜輕用。

### 烏藥散

方見後

### 婦人積年血癥方論第十三

婦人積年血癥。由寒溫失節。脾胃虛弱。月經不通。相結盤牢。久則腹脇苦痛。宜用三棱煎主之。

愚按前症。多兼七情虧損。五臟氣血乖違而致。蓋氣主虛之血。主濡之脾。統血。肝藏血。故鬱結傷脾。恚怒傷肝者。多患之。腹脇作痛。正屬肝脾二經症也。竊謂羅謙甫先生云。養正積自除。東垣先生云。人以胃氣為本。治法宜固元氣為主。而佐以攻伐之劑。當以歲月求之。若欲速效。投以峻劑。反致有誤。右七症方藥。當互相參用。

### 附方

#### 三棱煎 治血癥血癥食積痰滯。

莪朶醋浸炒 三棱各三兩 青皮去白 半夏 麥芽炒各一兩 右用好醋一鍾。煮乾焙為末。醋糊丸桐子大。每服三四十九。淡醋湯下。痰積薑湯下。

#### 婦人血氣心痛方論第十四

婦人血氣心痛。由臟腑虛弱。風冷所乘。益心為諸藏之主。若心受傷。名真心痛。朝發夕死。夕發旦死。若心

傷故痛發乍輕乍甚而成斯症也

愚按前症若寒邪所傷溫散之飲食停滯消導之肝火妄動。辛平之脾氣鬱結和解之。仍與後六症方藥同用。

附治驗

一婦人久患心痛飲食少思諸藥到口即吐。予以為脾土虛弱用白朮一味同黃土炒去土每服一兩以米泔煎濃徐服少許數日餘自能大飲用三觔餘而安。上舍陳履學長子室素怯弱產後患疥瘡年餘不愈因執喪旬月每欲肢仆一日感氣忽患心脾高腫作疼手不可擰而嘔吐不止六脈微細或見其形質設認諸痛不可補氣乃用青皮木香五味吳茱萸等藥而愈繼復患瘧且墮胎又投理氣行血之藥病雖去元氣轉脫再投參芪補劑不應矣六脈如絲欲絕迎予至診之曰形雖實而脈虛極反用理氣之劑損其真氣故也連投參芪歸木附子薑桂二劑間用八味丸五日寢食漸甘六脈全復此症若心脾疼痛時即服此等藥瘧亦不作了。

附方

烏藥散 治血氣壅滯心腹作痛。

烏藥  
莪茂炒浸  
桂心  
當歸  
桃仁  
青皮  
木香各三  
右為末每服二錢熱酒調下。

靈苑方 用生五靈脂為末每服一錢沸湯下日三服。

八味丸方見二十一論

婦人血氣心腹疼痛方論第十五

婦人血氣心腹疼痛由臟腑虛弱風邪乘之真邪相搏隨氣上下故心腹作痛也愚按此症若氣滞血瘀用沒藥散勞傷之氣用益氣湯肝脾鬱結用四七湯怒動肝火用小柴胡湯。肝

脾血虛用四物湯。脾肺氣虛用四君子湯。中氣虛弱用補中益氣湯。氣血俱虛用八珍湯。

附治驗

一婦人每怒心腹作痛。久而不愈。此肝火傷脾氣也。用炒山梔一兩。生薑五片。煎服而痛止。更以二陳加山梔桔梗乃不發。一婦人懷抱鬱結。不時心腹作痛。諸藥不應用歸脾湯。倍加炒山梔而愈。陳湖陸小村母。久患心腹疼痛。每作必胸滿。嘔吐。手足俱冷。面亦昏麻。咽乾舌燥。寒熱不時。月餘竟夕不安。其脈洪大。眾以痰火治之。屢作。迨乙巳春。發頻而甚。仍用前藥。反劇。此涼寒損真之故。內真寒而外假熱也。且脈息洪弦而有怪狀。乃脾氣虧損。肝木乘之。而然當溫補胃氣。遂用補中益氣湯。加半夏茯苓。吳茱萸。木香一服。熱寐微曉。洪脈頓斂。怪脈除。諸症釋然。

附方

琥珀散 治氣滯心腹。撮痛或月經不行。小腹疼痛。

烏藥

義茂醋浸炒各二兩

當歸一兩

右為末。每服二錢。溫酒調下。

鑑痛散

治血氣刺痛。

荔枝核

燒存性五錢

香附子一兩

右為末。每服二錢。鹽酒調下。

菖蒲丸

治血積心脾作疼。

續添六德

右為末。每服二錢。溫酒調下。

九節菖蒲

六味茶。吳茱萸炒各二兩。

香附子各四兩

右為末。醋調神麃糊桐子大。每服四五十九。淡薑湯調下。

沒藥散

治血氣不行。心腹作痛。或行注疼痛。或月經不調。發熱。補熱並宜用之。

紅花

沒藥

當歸

立胡索炒各等分

右為末。每服二錢。童便酒調下。

木香枳术丸

破滯氣。消飲食。

開胃進食。消化痰涎。

木香

枳實炒各一兩。

白朮一兩

右每服五錢。薑棗水煎服。

木香化滯湯

治脾胃虛弱。

飲食停滯。腹脹作痛。或心下痞滿。不思飲食。若憂怒飲食而致者。尤宜用之。

木香

紅花各三錢

橘皮

當歸梢二錢 柴胡四錢 草豆蔻

甘草各五錢

半夏一兩

枳實炒二錢

右每服三五錢。薑水煎服。

補中益氣湯

四君子湯

四物湯

三方見二十一論

四七湯

方見十一  
卷第七論

小柴胡湯

方見二十四  
卷第二論

八珍湯

三方見二十一論

歸脾湯

四方見二十  
卷第四論

二陳湯

方見二十四  
卷第五論

婦人血氣小腹疼痛

方論第十六

附治驗

婦人小腹疼痛。由胞絡受冷。搏於血氣。結於小腹。因虛發動。故病也。

愚按前症。若氣寒血結。用威靈仙散。氣滯血凝。用當歸散。肝經血虛。用四物湯。加參。木柴胡。肝經濕熱。用龍膽瀉肝湯。肝脾氣虛。用六君子湯。加柴胡芍藥。肝脾虛寒。用六君子湯。加柴胡肉桂。若兼嘔吐。加木香。四肢逆冷。再加炮薑。

附治驗

通府張孟威云。其妹小腹痛。服附子理中湯。附子服過八十餘枚。此乃沉寒痼冷之甚。不多有者。

附方

威靈仙散 凡冷氣滯血。小腹疼痛。或經行遇怒。腹脹痛。宜用之。

威靈仙一兩

當歸

沒藥

木香

桂心各半

右為末。每服一錢。熱酒調。

當歸散 凡血積。小腹疼痛。或因氣逆。月經不行。肚腹作痛。

當歸炒

赤芍藥

劉寄生

沒藥

枳殼炒

玄胡索等分

右為末。每服一錢。熱

酒調下。

四物湯

附子理中湯

方見二十一  
卷第九論

六君子湯

四方見二十  
卷第六論

龍膽瀉肝湯

方見二十一  
卷第八論

婦人兩脇脹痛方論第十七

婦人兩脇脹痛。因臟腑虛弱。氣血不調。風冷客於胞絡。相搏壅塞故也。

愚按東垣先生云。胸膈作痛。口苦舌乾。寒熱往來。發嘔發吐。四肢滿悶。淋溲便難。腹中急痛。此肝木之妄行也。竊謂前症若暴怒傷血。用小柴胡等歸山梔氣虛。用四物參木柴梔。若久怒傷氣。用六君等歸山梔。若氣血俱虛。用六味地黃丸。若經行腹痛。寒熱。或月經不調。發熱痰咳。少食嗜卧。體痛用八珍柴胡丹皮。若脇脹發熱。口渴唾痰。或小便淋瀝。頸項結核。或盜汗。便血。諸血失音。用六味丸。若兩脇作脹。視物不明。或筋脈拘急。面色青。小腹痛。或小便不調。用補肝散。若娶用香燥之劑。反傷清和之氣。則血無所生。諸症作焉。丹溪先生云。右脇痛。用推氣散。小龍會丸。當歸龍會丸。控涎丹。柳青丸。十乘湯。皆病氣元氣俱實之劑。用者審之。

附治驗

一婦人性急。吐血發熱。兩脇脹痛。日晡益甚。此怒氣傷肝。氣血俱虛也。朝用逍遙散。倍加炒黑山梔。黃柏。貝母。桔梗。麥門冬。夕以歸脾湯送地黃丸而愈。一婦婦內熱。晡熱。肢體瘦麻。不時嘔痰。或用清氣化痰藥。喉間不利。白帶腹脹。用行氣散血藥。胸膈不利。肢體時麻。此鬱怒傷肝脾。而藥亦甚也。予則朝用歸脾湯。以解脾鬱。生脾氣。夕用加味逍遙散。以清肝火。生肝血。百餘劑而愈。後因怒飲食日少。肢體時麻。此乃肝火侮土。用補中益氣加山梔茯苓半夏而痊。又飲食失調。兼有怒氣。肢體麻甚。月經如注。脈浮洪而數。此脾受肝傷。不能統血。而致崩。肝氣虧損陰血而脈大。繼用六君加芍歸炮薑。而血崩止。又用補中益氣加炮薑茯苓半夏。而元氣復。更用歸脾湯。逍遙散。調理而康。

附方

歲靈仙散 治冷氣血滯。兩脇作痛。方見前

人參紫荆皮散 治心腹刺痛。胸膈飽滿。不進飲食。

紫荆皮 蒼朮

石菖蒲各一兩

人參五錢 木香三錢

右為末米糊丸桐子大

每服三十九食後薑湯下。

左金丸

一名四金丸

治肝火胸膈脹痛或發寒熱或頭目作痛或大便不實或小便淋秘或小腹疼痛及一切

肝火之症。

黃連

炒六兩

吳茱萸

一兩湯煎片時用

右為末粥丸白术陳皮湯下。

當歸龍鬚丸

治肝經實火胸膈脹痛或大便祕結小便澁滿凡屬用經實火皆官用之。

當歸

龍膽草

炒焦

梔子仁

炒

黃連

炒

黃芩

炒各一兩

大黃

炒五錢

蘆薈

青黛

各五錢

木香

二五分

麝香

另研五分

右為末用神麃糊丸桐子大每服二十九薑湯下。

補肝散

治肝腎二經氣血虧損胸脹作痛或脅脹頭暉寒熱發熱或遍身作痛經候不調。

山茱萸肉

當歸

五味子

炒杵

山藥

黃芪

炒

川芎

各五錢

木瓜

各五錢

熟地黃

自製

白朮

炒各一錢

獨活

酸棗仁

炒各四兩

右為末每服五錢東水煎服

小柴胡湯

三方見二十一卷第二論

四物湯

卷第十一論

補中益氣湯

六君子湯

三方見二十一卷第六論

六味九

方見二十四卷第十一論

八珍湯

逍遙散

卷第二十

歸脾湯

卷第十四論

加味逍遙散

四方見二十卷第四論

婦人心腹脹滿方論第十八

婦人心腹脹滿由心脾虛損邪氣乘之此足少陰腎經之脈起於足小指損腎絡膀胱入肝肺出絡於心若邪搏三經狃結於脾脾虛則心腹脹滿矣。

愚按前症脾胃虛痞用六君子湯脾胃虛寒者用人參理中湯鬱結氣滯者用歸脾湯肝侮脾土用六君柴芩脾氣壅滯用平胃散肺氣壅滯用紫蘇飲宿食壅滯用養胃湯脾血虛痞用四物參木

當互相用

一婦人胸膈不利。飲食少。思腹脹吞酸。或用疎利之藥。反致中滿不食。予以為脾土虛而肝木勝。用補中益氣湯加砂仁香附煨薑。又以六君子加芍歸桔梗而愈。吳江史立年母父病之後。遇事拂意。忽胸腹脹滿。面目微腫。兩腿重喘。氣逆上升。言語喘促。所服皆清氣之劑。不效。予曰。此脾肺虛寒也。先用六君子湯一劑。病勢頓減。後用補中益氣加茯苓半夏乾薑二劑。形體頓安。後以七情失調。夜間腹脹。乃以十全大補加木香治之而痊。

附方

白术散 治脾胃氣滯心腹脹滿不欲飲食

白术 炒

草果

诃子

茯苓

檳榔

桂心

陳皮

厚朴

姜製

人參各一錢

甘草

炒三分

右薑裹水煎服。

愚按前方治胸膈氣滯。飲食內停之良劑。若脾血虛痞。須用四物參。脾氣虛痞。須用四君芳歸。補遺治心腹脹滿。子嘗獨用厚朴薑汁炒。每服五錢。薑七片。水煎溫服。不拘時候。間服沈香降氣湯得效。此病氣元氣壅實之治法也。