

清·葉廷薦·撰

救急備用經驗彙方



救急備用經驗彙方·解題

清·葉廷薦撰。成書於嘉慶六年（公元一八〇一年）。

葉廷薦，號鳳梧。涇川（今屬甘肅）人。

此部分內容引自該書卷三，記述了解食物及藥物中毒的九十二種解毒法，每一種解毒法少則附二、三方，多則幾十方，這些解毒方大都以單味藥組成。

今據清·嘉慶六年（公元一八〇一年）刻本影

印。

（王味味）

救急備用經驗方

卷三 統治門

夏

解中飲食毒 一覺腹中不快。卽以生黃豆嚼之。不

聞腥氣。此中毒也。或嚼生礬一塊。覺甜而不澀者。

亦中毒也。急以升麻煎濃連飲。以手搥吐。卽愈。或

急用苦參三兩。若酒卽米一升半。煮半流。陸續飲

之。吐食出。卽瘥。水煮亦得。犀角湯亦可解。或薤菀

生甘草各二兩。剉細水煎。停冷去渣。分三服。加蜜

少許。同煎亦妙。

解毒藥汁不可熱食。諸毒病得熱更甚。宜冷飲之。

解中六畜肉毒 犀角磨濃汁一碗服之。黃柏末

灶心土末 赤小豆燒末 東壁土末 頭垢

一錢 扁豆豉汁 並水服

一方水煎牆上黃土二錢飲之。卽解。

解中自死六畜肉毒 黃柏末二三錢水調服。不解

再服或壁上黃土水調服二錢或雄鼠屎兩頭尖

十四枚研末水和服或食人乳一升愈。

解中馬肉毒 薑根汁 嚼杏仁 甘草汁 飲美酒 食酸馬肉不飲酒則殺人。

一方香豉兩杏仁兩蒸一食頃熟杵之服日再服。

解中馬肝毒 猪骨灰 雄鼠屎 豆豉 狗屎灰

人頭垢 並水服。

解中牛肉毒 烏柏樹根皮酒煎同熱酒服或菊花

連根搗汁酒服 猪脂化湯服 甘草煎湯 猪

牙灰水服 飲人乳汁一升立愈 米泔洗頭垢

救急備用經方

卷三 統治門

星

飲一升愈。

解中獨肝牛毒 人乳服之

解中牛馬生疔毒 澤蘭根搗水服 生薑蒲搗酒

猪牙灰水服 甘菊根搗水 甘草煎湯

解剝死牛馬毒 開剝死牛馬中毒遍身生紫疱俱

潰叫痛急服紫金錠見分治門狗吐瀉即愈

解中猪肉毒 杏仁研汁 韭菜汁 朴硝煎汁

猪骨灰調水 大黃煎湯 猪羊肉以桑楮柴煮

炙食之生寸白疔。

一方猪牙燒爲末一錢水送下。

解中狗肉毒 杏仁研末水服 煮蘆根取汁飲之
解中羊肉毒 甘草煎湯服

解食鬱肉漏脯毒 凡肉盛密器蓋之隔宿者名爲
鬱肉又茅屋漏水滴濕脯名爲漏脯皆有毒害人

人乳汁 飲生韭菜汁三升 燒犬屎酒服方
寸七 又燒人屎和酒服 黑豆濃煎汁飲數升

解食黍米中藏乾脯毒 大豆濃煮汁飲之數升即

解亦治狸肉漏脯等毒

解食烏獸肉毒 大豆汁或鹽汁服之

解食六畜鳥獸肝毒 水浸豆豉絞取汁服數升愈

救急備用經驗靈方

卷三 救治門

重

中毒在胃故用豆豉涌吐其毒 如肝色青黯腎
色紫黑俱不可食

解白死鳥獸肝毒 取人頭垢一錢熱湯化服

解中藥毒肉毒 大豆煎汁 鹽湯狸骨燒灰和水
服

又黑豆汁盪汁飲之

一方雄黃末敷之沸汗出愈

解食肉過傷 本畜骨灰水服 生韭汁 芫荽煎
汁

解多食生膾不消胸膈不快 瓜蒂散吐之瓜蒂煎



赤小豆各等分爲末。每二錢溫環水調下。取吐爲度。或欲再汁卽消。若日久成癥病。

大黃、朴硝、陳皮各三錢。水煮頓服下之。

又方取水中石子數十枚燒赤。投五升水中七次卽熟飲之。三五度當利出瘕。

又狗糞燒存性爲末。和酒服二錢。日三。癥結卽出。

解食鴉鴨肉毒。糯米泔或溫酒飲之。

又蒜米水研取汁飲一盞。

一方猪蕪燒爲末。每一錢水送下。

解食婢凶毒。吐下。用犀角末和水服一錢。或以水

救急備用經驗靈方

卷三 統治門

翼

濃磨取汁飲

解食斑鳩毒。葛粉二合。水調服。葛湯調服亦解。

解黃蠟炒鴉毒。青菜湯。冬葵子湯。大蘇子汁。

波菱菜湯。俱可解。若未解下時止。可飲清水。

斷不可食有質有味之物。

解食鴉子毒。好醋飲之。卽愈。未愈再服。

解食魚毒。覺胸腹煩亂。陳皮濃煎汁冷服之。卽解。

飲冬瓜汁最驗。又海獺皮煮汁飲之。又鮫魚皮燒

灰和水服之。檳榔搗汁服亦佳。

魚無腸膽。戒食。

解中蠶毒 飲藍汁數碗或靛青水亦可

食蟹肉誤食芫菜成蟹腹脹速飲白馬尿一碗卽化。

解中蟹毒 紫蘇葉濃煮汁飲之或紫蘇子汁飲之

或搗藕汁或搗蒜汁飲之或冬瓜汁或食冬瓜俱可又黑豆汁豉汁並解之

蟹有獨熬蟹目相向足斑目赤不可食未遇霜不可食。

解食鱗魚鱧魛蝦蟇自死禽獸等毒 淡豆豉一合

新汲水煎濃溫服之 食鮮中毒食蟹解之

救急備用經驗靈方

卷三 統治門

重

解食鱸魚鱖魚毒 蘆根煮汁飲一二升生汁亦可

解黃鱔魚毒 食此犯荆芥能害人服地漿水解之

又食蠓解之

解食河豚毒 五倍子 白礬等爲細末水調服之

或鮮蘆柴根搗汁飲之乾者煎汁溫飲之卽解如

倉卒無藥急以清油多灌之使毒盡吐出卽愈

忌見芎灰多服金汁卽解如難得于地上挖一潭

用水和泥稍定服一二碗卽解或紫金錠見分治

辟更妙急取熱鴨血灌救入喉卽活橄欖汁或

白茅根搗汁冷飲亦愈

又羊蹄葉搗取汁飲之其子尤毒慎不可食

或香油一碗灌之吐出亦愈

或入糞汁多灌吐出即愈

解飲食中蜈蚣等毒 舌頭張腫以鷄冠血生飲之

傷損則用血塗上

祛蜈蚣法 凡人家多蜈蚣以頭髮常燒烟或床

下或廚房聞之入土三尺

解食物中蛇虫百脚遊過毒 甘草煎湯灌下吐十

餘次愈

一方以蒼耳草嫩葉取汁灌之

救急備用經驗彙方

卷三 統治門

夏夏

毒入腸者一方以兩刀相磨取磨下之汁服

一方用益母草煎服

解中蚯蚓毒 形如大麻風鬚眉皆落一方用石灰

泡熱水候涼洗患處浸之良久愈

解食小蝦蟇毒 小蝦蟇有毒食之令人小便秘澀

臍下悶痛有至死者

一方以生豉一合投新汲水半盞浸濃汁頓飲之

即愈

解食螞蝗 嗜芹菜者多此疾空心時食地泥少許

自下

解中豆腐毒 過食豆腐腹脹氣塞欲死 煎滾水

多飲卽安若飲酒卽死中豆腐毒令人生瘡噎氣
遺精白濁蘿蔔煎湯飲之

又杏仁水研取汁飲之

解中麩毒 以蘿蔔生啖之或搗汁服之麥麩大熬

惟蘿蔔能解其性或大蒜嚼食之亦善解麩毒又
地骨皮煮取汁飲之又赤小豆末和水服卽愈

解鹽鹵毒 服鹽瀝將常用擦桌布洗水灌之使吐

卽解急取活鴨或鷄斬去頭將頸塞口中以熱血
灌之可解若齒多者必數隻方足盡收其鹹毒

救急備用經驗良方

卷三 統治門

夏

一方豆腐漿瀉之或肥皂水皆能合嘔吐切不可
飲熱湯飲治羊血尤妙

一方黃豆入水搗汁灌之或用生大黃一兩搗碎
再用生豆腐漿一碗同搗數十下服後瀉數遍卽
效

解中酒毒 經日不醒謂之中酒黑豆一升煮汁溫

服一盞不過三盞卽愈或鍋蓋上氣水一杯灌下
卽醒或白蘿蔔汁或熱尿瀉俱效

一方葛花錢五赤小豆 棗豆粉 柿霜各三錢 白豆

棗二錢生薑汁同煎服合汚泥搭麝前藥卽再搭自

愈

過飲燒酒中毒。則面青口燥。昏迷不醒。初覺便脫衣推身滾轉之無數。吐之即甦。若灌冷水即死。又葛根搗取汁灌口中。漸愈而醒。

鮮烟毒 砂糖調水服。

鮮中砒霜毒 一方砒霜服下未久者。取鷄蛋一二十個。打入碗內攪勻。入明礬末三錢。灌之。吐則再灌。吐盡便愈。但服久。砒已入腹。則不能吐出。急用黑鉛四兩重一塊。用井水于石上磨出黑汁。旋磨旋灌。盡則愈。即先吐出之後。亦宜再鉛水服之。以

救急備用經驗藥方

卷三 救治門

夏

盡餘毒方無後患。

癘狂心腹絞痛。頭眩嘔吐。面色青黑。四肢逆冷。六脈洪數。飲食中得者為易愈。若空心酒醋服者。難救。地漿水頰服。若吐出又服。所謂洗淨腹中毒。全憑地上漿是也。其法掘地成坑。以水灌注。攪成混水飲之。謂之地漿。

又方蠶清灌之亦解。

又方豆豉濃煎湯飲之可解。

又方熟豆磨漿灌之亦效。

一方雞鷄血熱飲止愈。

一方萊豆半升搗粉入新汲水攪和去渣取汁飲之解砒毒第一。

一方白洋糖、旋花、淡豆豉、甘草等分研勻冷水調灌卽甦。

一方新鮮羊血鴨血飲之皆可解。

一方甘草同藍汁飲之卽愈。

一方急用密陀僧一兩或二兩研細冷井水飛徐徐灌下或吐或瀉則砒信裏在藥末內出矣神效無比。或外再以井底泥塗胸前或以生蟹或用因搗塗磨四旁更妙。

救急備用經驗靈方

卷三 統治門

裏

一方白蠟三錢研末調鷄子清三五枚入口卽愈。解人信毒用藜蘆根、青黛、皂莢、膽礬、若瓜、滯滑、生甘草、生菘豆各等分搗末涼水調灌。凡中砒毒心腹絞痛欲吐不吐面青肢冷用防風四兩煎湯飲之卽解。

一方桐樹葉搗爛沖生白酒飲之卽解。

一方楊梅樹皮煎湯二三碗飲之卽愈。

一方紫蝴蝶花根搗汁一碗灌下立愈。

一方生桐油灌之得吐卽解。

一方冬青樹苗汁與水相半灌下無苗時用老葉。

帶水搗取汁

一方用甘草湯、萊豆湯、夏枯草汁、或鷄子五六枚打碎和勻灌下。總以吐盡毒爲度。醒後仍顛者以萊豆湯飲之。毒盡自愈。

一方用白礬三錢。新汲水化下。吐出卽愈。

一方或香油一二升灌服。又扁豆、青黛、甘草各一錢。巴豆去殼一箇。一云半箇爲末。砂糖大一塊。水化調。一盞飲之。毒隨利下。又稻稗灰和水淋取汁。冷服一碗。毒隨利下。又藍根砂糖搗和水服。

一方醬調水服。若在胸中作楚。急用膽礬研水灌

救急備用經驗方

卷三 統治門

毒

之。或用真菜油灌之立解。

一方防風一兩。研爲末。水調服之。與前方分兩服法小異

解食胡粉毒。一方上號絮白糖、旋花、淡豆豉、甘草

等分研勻。冷水調灌卽甦。

一方砂糖調水服。

一方肥皂搗爛。取汁灌下。皆效。

一方急用大黃、枳實、土茯苓、陳醬、水煎。加焙乾雄

猪屎入藥中服。

一方飴糖四兩、硫黃五錢研末。入猪腸中。兩頭紮

紮。用好陳酒并水放瓦罐中。火煮一時。取出再煎。

餽精與硫黃和勻爲丸如梧子大每服二十九溫
水或甘草湯下。若有香油調鉛粉服者肥皂水下
一方生甘草四兩。豨豆二升。湯煎濃。時時服之。

一方木瓜煎水飲之。

一方生蠶菊汁食之。

服水粉牙根腐爛出血不止。一方管仲名貫黃連

各五爲末。水一鍾煎四五沸。入水片少許攪勻。漱

口。每日一次。忌豬腥油膩一月。

一方麻油和蜜糖食之。亦能解水粉毒。

鮮礬石毒 一方黑豆煎汁飲之。

救急備用經驗靈方 卷三 統治門

臺

鮮服丹毒 一方地漿服之爲上。

一方蚌肉食之良。

鮮食輕粉毒 一方用黑鉛五斤。打壺一把。盛燒酒

十五斤。納土茯苓要白色粉半斤。乳香三錢。封固。重湯

煮一日。夜埋土中。出火毒。每日早晚任飲數盃。溺

時以瓦盤接之。當有粉出。服至筋骨不痛乃已。

五寶湯 紫草 山慈菇各一 乳香

沒藥各五 新汲水六碗。好陳酒五碗。煎至六七碗。

空心溫服。取汗不可見風。一二服。其毒從大小便

湧出。

一方輟豬頭骨槌碎土茯苓春碎金銀花各一斤
水煎服卽愈。

解中冰片毒 飲以新汲冷水可解。

解硫黃毒 令人心悶一方取豬羊熱血飲之。又宿

冷豬肉及鴨肉羹冷食之。又黑錫煎取汁飲之。

解礪砂毒 一方生棗豆研取汁一二升飲之。

解中巴豆毒 下利不止口乾兩臉赤五心熱 炮

薑 川連炒各等 每服二錢水調服如人行五里

許再服或者菜豆湯冷服之。或川連甘草煎汁涼

飲之。或芭蕉葉根搗汁飲之。或以大豆一升煮汁

救急備用經驗集方 卷三 統治門

薑

飲之。又巴豆畏大黃黃連蘆筍蕪筍黎蘆各煎冷
服皆能止瀉。

一方冷粥一碗喫下卽解。

一方黃連黃柏煎湯冷服。又黑豆煮取汁飲之。又

寒水石磨水服之。又菖蒲或葛根搗取汁飲之。更

以冷水浸手足忌食熱物。又藍根砂糖搗爛和水

服。

解食桐油嘔吐不止 將乾柿餅食之立解 急飲

熱酒卽解。

解食閉口椒毒 口吐白沫氣閉欲絕冷水飲之解。

地漿水更妙。或食蒜。或肉桂煎汁飲之。或者瀝豆
豉飲之。或喫大棗三枚解之。又濃煎黑豆汁飲之。
又人屎飲之。或飲醋解之。

鮮食葷中毒。忍冬、花葉赤名、金銀花葉、生咬之。愈。
或煎濃汁飲之。或人糞汁飲一升。或地漿飲一二
升尤效。或大豆濃煮汁飲。服吐利藥並解。飲地漿
水三四碗。地漿能解百毒。真神方也。又馬蘭根葉
搗取汁服之。又人頭垢和水服。以吐爲度。又六畜
及鴛鴨之屬。刺取熱血飲之。又油煎甘草冷飲。只
多飲香油亦可。中葷毒吐下不止。細芽茶爲末。漸
救急備用經驗靈方

卷三 救治門

重

汲水調服神效。又荷葉搗爛和水服。鯨頭煮汁飲
卽愈。

凡菌葷如夜中有光者。欲爛無虫者。若不熟者。
汁照人無影者。上有毛。下無紋者。仰捲赤色者。俱
毒殺人。

六一散。滑石六錢。甘草一錢。研勻。每服二錢。水
調服。皆效。

鮮食芹菜毒。蛇疔。人中其毒。手背腹滿。痛不可
忍。用米糖二三斤。日兩度服之。吐出如蜥蜴三五
枚。瘥。

一方田中泥土爲丸服之治食芥菜蝸蝗入腹作痛。

解食椒菌毒 令人笑不休 一方飲地漿卽解。

一方飲冬瓜蔓汁解之。

一方苦菜白礬新汲水服之。

一方飲葦汁亦可解。

一方採生金銀花嚼之可解。

解中野芋毒 食之令人小便秘澀 臍下悶痛 有至死者。

一方以生豉一合投新汲水半碗浸濃 頓飲之卽

救急備用經驗藥方

卷三 統治門

五

愈。

解中英雄毒 一方甘草黑豆濃煎飲汁。又防風甘

草湯冷飲之。又棗肉飴糖服之並解。又乾薑煮汁

冷飲之。又多飲井水。大吐瀉卽愈。

解食芥子毒 頭腫唇裂血流。或見內熱諸證。急用

菘豆黑豆搗汁常飲。或大豆汁飴糖菘湯並解之。

或用螺搗碎絞汁。水調飲之。

解中烏頭草烏毒 令人麻痺暈悶。甘草煎濃湯服

之。或飴糖黑豆冷水解之。或米醋調砂糖亦可。甘

豆湯飲之。生薑汁飲之。又童尿飲之。又黃連湯飲

之。

江左山南有草烏頭。其汁煎之名射罔。俱大有熱毒而射罔更烈。塗破損處立能殺人。用甘草汁、藍汁、或小豆葉、浮萍、薺菜汁冷水解之。

解食鈎吻毒俗名新。生池旁與芹菜相似。惟莖有毛。

以此別之。誤食殺人。

一方用薺菜八兩水六升。煮取二升。溫分二服。

一方先用鴨蛋三個。將服毒人扶正。撬開牙關。剝開蛋殼成個。灌下三個。待蛋入胃。裹住毒草。次用猪膏溶化。溫和灌下一飯碗。後又用黃豆一小升。

救急備用經方

卷三 統治門

五

笋雞一隻。不論雌雄。連毛帶腸同豆搗爛。用清水一飯碗。泡入雞內。布袋濾去渣。取汁灌下。其毒即吐。如不吐。即用芋苗探喉。或用女人頭髮。髮子探喉。鴨翎亦可。毒吐即愈。其毒在胃者可治。入腸者難治。

一方即取雞卵未成雛者。研爛。和麻油灌吐。出毒物可生。遲則死也。

一方急以升麻湯探吐亦好。

一方人尿汁。或白鴨白鵝斷頭滴血入口中。或羊血灌之亦好。

一方葱汁薤菜汁葛汁鷄蛋清咸可

解大戟毒 泄瀉不禁一方煎薺荒汁飲之

一方菖蒲搗取汁飲之

解芫花毒 一方柑皮煮汁飲又甘草或防風煎汁

服

解食鼠藥毒 一方黑豆汁可解

一方用枯蓮房殼帶蒂裊陰乾咬咀煎水二三碗

灌之如無用荷葉中心蒂或用藕節煎湯一碗溫

冷灌之毒即散

解食真若毒 一方用甘草汁或藍青汁飲之即愈

救急備用經驗集方

卷三 統治門

百葉

若服藥卽刺菘豆汁飲之甘草薺荒汁飲之又犀

角磨水服之又蟹汁服之又甘豆湯濃煎服之

解中胡蔓草毒 將糞汁灌之可解或飲浸草毒水

百葉潰血急取抱卵不出之鷄蛋研細和麻油開

口灌之吐出可救或用韭菜汁灌下亦可

解苦棟毒 服苦棟根湯不止飲冷粥止之

解半夏毒 有中此毒口不能言倒地將死者速用

薑汁灌之須臾自甦又乾薑煮汁服

解斑蝥毒 青毒中其毒者必腹痛嘔吐煩躁欲死

一方用猪膏大豆汁或鹽薑汁飲之又或用大小

黑豆汁服之並瘥。或用肥皂水灌下。鵝翎探吐絞喉數次。令吐卽活。

一方生鷄鴨卵開孔。灌入口中。連灌五六枚。得吐卽活。止痛而愈。倘閉以箸抉開灌入。又急用菜豆。或黑豆。或糯米。和水研取汁服之。又藍汁飲之。又猪腸服之。又澤蘭葉接取汁飲。

解黍蘆毒 吐逆不止。一方雜黃芩末。溫酒調服一袋。

一方煮葱汁服。又香油灌之。又溫湯飲之。

解雄黃毒 一方漢防已煎湯飲之。有用雄黃搽瘡。

救急備用經驗靈方

卷三 統治門

臺

或薰陰囊瘡受毒者。防已煎湯洗數次愈。

解食桃得病 一方取桃梟燒爲末。和水服之。卽愈。

解苦杏仁毒 一方用杏樹皮煎湯飲之。雖迷亂將

死者亦可救。

一方藍葉汁飲之。

一方藍子研水服則解。

一方香油多飲吐之。又地漿藍汁。甘藍汁飲之。杏

子饅仁者有毒。人誤食必死。若中其毒。用此解之。

急取吐可解。

解艾毒 艾葉久服亦有毒。毒發則熱氣冲上。狂躁

不能禁止攻眼有瘡出血者甘豆湯冷服之藍葉汁菜豆汁飲之。

解甘遂毒 一方黑豆煎汁飲之。

解狼毒毒 一方杏仁研水和取汁服之。

一方藍葉汁飲之。

一方白欬爲末和水服。

解犀角毒 多服則令人煩。一方麝香一字調水飲之。

解躑躅毒 一方梔子煎取汁飲之。

解海菜毒 凡海中菜多食損人令腹痛發氣吐白

救急備用經驗藥方

卷三 統治門

夏

沫。一方飲熱醋卽安。凡海菜傷皆同此法。

解食蒿菜毒 一方生薑汁飲之。

解食諸菜毒 猪骨燒灰和水服。又桂皮濃煎取汁

飲之。又服瓜蒂散吐之卽愈。見上解多食生膈不消

發狂煩悶或吐下葛根濃煎汁服。生汁尤佳。又烏

雞屎燒爲末和水服。香油多飲之。又人乳汁。或小

兒尿服二升卽愈。

蕩菜魚肉毒苦參到三兩苦酒卽醋一升煎服吐

出卽愈。

解中白菜毒 小兒食之過多腹悶欲死急用白

煎頭煎湯類類灌之少頃自定

解食雜瓜菓子過多腹脹氣急 一方桂心爲末飯

丸煮豆大以水吞下十九未愈再服

又方持心末五錢麝香一錢飯丸菘豆大白湯下十五

丸卽效

解諸真毒 一方麝香一分煎湯服

一方猪骨燒灰水調服

解食炭毒 一方石首魚炙食或煮汁服自消

解苦瓠毒 食苦瓠吐利不止一方飲黍穰灰汁解

之

救急備用經驗靈方

卷三

統治門

異

解漆毒 紅疔爛瘡一方取生蟹黃塗之不數次卽

愈

一方杉木煎洗之

解煤薰毒 一時暈倒不救殺人飲冷水可解或薰

葡萄汁灌口鼻移向風吹便能醒或用鹹菜水灌

之卽愈

解石藥毒 人參煮汁服又白鴨屎爲末和水服之

解信毒併銀匠爐中硫子毒 錫灰一錢雞子七個將一

味攪勻喫下卽愈

按錫灰卽白鐵消後鍋內所遺渣垢也再連錫燒

紅卽化成灰。研爲細末。每服二錢。若服毒過多。加倍用神效。

解毒銀鎔毒 將黃泥水服二三茶杯卽愈。

又方。每日用飴糖四兩。搗成小丸。不時以真芝麻油吞下。

一方生羊血。灌之。吐盡卽愈。

解誤服水銀毒 在背陰處掘地二三尺。取泥爲丸。

如梧子大。以冷井水下。腹中卽消。水銀隨下矣。入

耳以黃金枕耳邊。則自出。若水銀入肉。令人筋攣。

以金物熨之。水銀乃出。蝕金其病卽瘥。

救急備用經驗彙方

卷三 統治門

毒

本草。戴荷葉、松葉、殺精、脂、萱草、瓦松、夏枯草、水茨、落雁、來紅、馬蹄香、煎湯服。皆解毒。一方肥猪肉煮冷食之。又猪脂服之。