




*Elm*

*1777*

8<sup>o</sup> T 26  
33  
B







DÉPOT LÉGAL  
Indre-et-Loire  
N° 777  
1920

PETIT  
DICTIONNAIRE DE MÉDECINE

8.  
T<sup>26</sup>  
33  
B

---

Tous droits réservés

---

Tous droits de reproduction et de traduction  
réservés pour tous pays.

Published, 10 Août 1908.

Privilege of Copyright in the United States  
reserved under the Act approved March 3, 1905  
by PER LAMM, Paris.

D<sup>r</sup> D'ESPIC

---

PETIT DICTIONNAIRE  
DE  
MÉDECINE



ÉDITIONS NILSSON

8, RUE HALÉVY, 8

PARIS





## PETIT

# DICIONNAIRE DE MÉDECINE



**Abcès.** — *Collection de pus.* — **Sig.** : La peau, à l'endroit de l'abcès, est rouge, chaude, gonflée, douloureuse.

**TRAIT.** : Mettre en permanence des compresses chaudes de sublimé ou bien appliquer de l'onguent mercuriel. L'abcès mûr, l'ouvrir au bistouri, le presser pour en faire sortir le pus, et mettre dessus des pansements humides.

**Accouchement.** — *Action de mettre un enfant au monde.* — Devra toujours être fait par un médecin ou une sage-femme. Préparer du fil et des ciseaux

pour sectionner et lier le cordon.

*Objets nécessaires à l'enfant.* — 1 baignoire d'eau à 36°; 2 boules d'eau chaudes; de la poudre de talc.

*Objets nécessaires à la mère.* — 1 canule et un bock à injection, 1 canule à lavement. Plusieurs litres d'eau bouillie, 1 kilo de ouate hydrophile, 1 toile cirée pour mettre entre le drap de lit et le matelas.

*Soins à donner à une accouchée.* — Laver 6 fois par jour les organes génitaux; la personne chargée de ce soin devra au préalable se passer les mains

## 2 ACCOUCHEMENT. — AGE CRITIQUE

dans un antiseptique (eau additionnée de sublimé).

*Alimentation.* — L'accouchée doit manger à sa faim.

*Constipation.* — Si au bout de 2 jours l'accouchée n'est pas allée à la selle, lui donner une très légère purgation.

*Température.* — La prendre, matin et soir, sous l'aisselle. La présence de fièvre indique ou de l'infection ou une rétention des membranes ou placenta.

*Séjour au lit.* — Doit être de 18 à 25 jours.

**Acnés.** — Inflammation des petites glandes annexées aux poils.

**Acné ponctuée,** caractérisée par la présence de points noirs, surtout au visage, ailes du nez, menton, front, et dans le dos.

**TRAIT.:** Expulser les points noirs par pression, laver avec eau très chaude, ou

à l'alcool, savonner ensuite avec un savon à l'ichtyol.

**Acné pustuleuse,** caractérisée par de petits boutons purulents.

**RÉGIME:** Interdit: poisson, conserves, viande, salaisons, alcool, café, thé; éviter la constipation, prendre à jeun une cuillerée à café d'huile de ricin ou de magnésie. Hydrothérapie.

**TRAIT. LOCAL:** Même traitement que pour l'acné ponctuée.

**Age critique.** — Époque de la cessation des règles chez la femme. — De 40 à 60 ans, est précédé des symptômes suivants :

Règles irrégulières, rougeurs au visage, vertiges, sueurs. Oppression, maux de tête, névralgies, digestions difficiles. Douleurs dans le ventre, troubles nerveux.

**TRAIT. :** Bains fréquents,

Alimentation légère. Frictions, purgation tous les 25 jours.

**Albuminurie.** — État caractérisé par la présence de l'albumine. (Substance analogue au blanc d'œuf. dans les urines.)

**TRAIT. :** Régime lacté pendant la période de crise, frictions sèches, massage, régime déchloruré, c'est-à-dire suppression complète du sel dans les aliments.

*Comment rechercher l'albumine.* — Mettre de l'urine dans une cuillère ou dans un tube de verre spécial en vente chez les pharmaciens), et la chauffer. S'il se forme un trouble blanchâtre, qui augmente quand on verse quelques gouttes de vinaigre ou d'acide acétique, il y a de l'albumine dans l'urine.

**Anémie.** — Appauvrissement du sang. — **SIG. :**

Pâleur, décoloration des gencives. Palpitations, oppressions, vertiges.

**TRAIT. :** Vie au grand air, exercice, hydrothérapie, nourriture fortifiante, quina, fer, arsenic.

**Anémie cérébrale.** — (V. Cerveau.)

**Angine couenneuse.**

— *Inflammation de la gorge (pharynx)*, caractérisée par la présence de membranes blanc jaunâtre au fond de la gorge, amygdales gonflées, couvertes de taches blanches qui se reforment aussitôt qu'on les fait disparaître, fièvre peu intense. Si l'infection gagne le larynx, le malade est atteint du croup, faire l'examen bactériologique. Injections de sérum. (V. *Diphthérie.*)

**TRAIT. :** Gargarismes avec eau boriquée, grands lavages.

**Angine.** — *Inflammation de la gorge.* — SIG. : Gorge rouge, points blanchâtres sur les amygdales et au fond de la gorge. Difficulté très grande à avaler, fièvre intense.

TRAIT. : Gargarismes fréquents au jus de citron ou à l'eau boriquée. Appliquer des compresses chaudes sur le cou, purgation. Pour combattre la fièvre, cachet.

Antipyrine. . . } ou 0 gr. 40 par  
Quinine . . . } cachet.

Comme alimentation : bouillon, lait, grogs.

En cas d'abcès, faire appeler de suite un médecin.

**Angine de poitrine.** — (V. *Maladies de cœur*, p. 11.)

**Anthrax.** — *Réunion de furoncles.* — SIG. : La peau devient rouge, gonflée, douloureuse. Fièvre élevée, troubles gastriques.

TRAIT. : 4 à 6 cuillerées à

café par jour de levure de bière. Au début, mettre de la teinture d'iode sur les petits points enflammés. Pulvérisations nombreuses d'eau très chaude.

Pansements humides à l'eau oxygénée.

La guérison ne commence que lorsque les bourbillons (petites masses verdâtres) sont expulsés.

Voir si les urines contiennent du sucre.

**Aphtes.** — *Petits ulcères qui viennent dans la bouche.*

— SIG. : Taches rouges apparaissant dans l'intérieur de la bouche. Fièvre peu élevée. Haleine mauvaise.

TRAIT. : Pastilles chlorate de potasse. Gargarisme avec de l'eau de chaux. Attouchement sur chaque aphte avec de l'éther ou avec la pierre infernale ; purgation.

**Apoplexie.** — (Attaque)

**Épanchement de sang au cerveau.**

Perte absolue et soudaine du sentiment et du mouvement, suivie d'une paralysie partielle ou complète du corps.

**TRAIT.** : Exposer le malade à l'air, l'étendre sur un lit en lui élevant la tête, enlever col, corset, corsetage, donner immédiatement un lavement purgatif (30 grammes de sel de cuisine, 500 grammes d'eau tiède). Appliquer des sinapismes sur les jambes, mettre sur la tête des compresses d'eau glacée. Saignées anales.

**Appendicite.** — *Inflammation de l'appendice.* — **SIG.** : Douleur très violente dans le côté droit du ventre entre l'ombilic et l'angle supérieur du bassin. Cette douleur peu à peu s'étend sur tout le ventre, et est accompagnée de vomisse-

ments. Fièvre élevée. Appeler immédiatement le médecin.

Cesser toute alimentation; ne boire que de l'eau glacée par cuillerée à café tous les quarts d'heure; couvrir le ventre de glace ou de compresses d'eau froide. Ni lavements ni purgatifs.

**Artério - sclérose.** —

*Durcissement des artères.* —

**SIG.** : Les artères sont dures et flexueuses; circulation mauvaise, fourmillements, crampes; gêne à respirer, bourdonnements d'oreilles.

**TRAIT.** : Vie tranquille, alimentation légère, suppression de tout excitant. Hygiène, vie en plein air, marches.

*Iodure de potassium ou de sodium, 50 centigr. par jour.*

**Asphyxie par manque d'air.** (*Charbon, acide carbonique, oxyde de carbone*). — Mettre l'asphyxié

à l'air, faire respirer des sels, pratiquer les tractions rythmées de la langue (V. *Inhalations d'oxygène*, p. 84).

**Asphyxie par gaz d'éclairage.** — TRAIT. : Faire respirer de l'ammoniaque, mettre des sinapismes sur les jambes; lavement de café noir. Tractions rythmées de la langue (V. p. 85) et inhalations d'oxygène.

**Asphyxie des pendus.** — Faire respirer de l'air; tractions rythmées de la langue et respiration artificielle (V. p. 84).

**Asphyxie des noyés.** — Coucher le noyé, lui retirer ses vêtements. et provoquer les vomissements en mettant un doigt dans la bouche, faire les tractions de la langue et la respiration artificielle, qui doit être continuée pendant 1 heure (V. p. 84).

Lorsque le noyé est re-

venu à lui, le coucher en l'entourant de boules d'eau chaude et lui administrer une cuillerée à café d'alcool; s'il a tendance à dormir, mettre des sinapismes aux jambes et faire des tractions rythmées de la langue.

**Asthme.** — *Spasme des conduits aériens (trachée, bronches).* — SIG. : Étouffements que le malade éprouve généralement dans le milieu de la nuit, le visage devient bleuté, l'accès dure un quart d'heure, puis l'oppression diminue, il se met à tousser et expectore des crachats grisâtres. Ces crises se répètent fréquemment.

TRAIT. DE LA CRISE : Inhalations de *térébenthine*, d'*éther* ou de chloroforme. Fumigations avec des poudres nitrées à base de *catura stramonium*, respirer dix gouttes de *pyridin* sur un mouchoir. Ventouses

sèches sur le thorax, poudre antiasthmaticque.

<i>Poudre de feuilles de Stramoine . . . .</i>	30 gr.
<i>Poudre de feuilles de Belladone . . . .</i>	30 gr.
<i>Poudre de nitrate de potasse. . . .</i>	5 gr.
<i>Poudre d'opium. . .</i>	2 gr.

(D<sup>r</sup> G. SÉE.)

**TRAIT. ENTRE LES CRISES :**  
*Iodure de sodium* 1 gr.  
par jour, continuer pendant longtemps, avec arrêt de 12 jours tous les mois. Saison aux Eaux-Bonnes, ou à La Bourboule. L'arsenic agit sur l'oppression.

**Avarie.** — (V. *Syphilis*.)

**Blennorrhagie.** — Maladie contagieuse. — **SIG. :** Écoulement purulent par l'urètre chez l'homme et par le vagin chez la femme.

**TRAIT. :** Éviter les excitations sexuelles. Pas d'alcool, d'excitants. Empêcher la constipation, lavages fréquents; injections de per-

manganate. Prendre du santal à dose progressive (5 à 6 gr.).

**Bras cassé.** — (V. *Fracture*.)

**Bronchite aiguë.** — *Inflammation des bronches.* — **SIG. :** Respiration difficile. Oppression. Quintes de toux et expectoration de crachats, fièvre 38-39°.

**TRAIT. :** Sinapismes entre les deux épaules. Ventouses sèches. Applications de teinture d'iode. Provoquer la sueur abondante par des tisanes de bourrache.

**Bronchite chronique** (*très souvent tuberculeuse*). — *Quintes de toux le matin et le soir avec expectoration de crachats épais, verdâtres, surtout l'hiver.* — **TRAIT. :** Capsules de terpine, sthénogénine, vin créosoté. Applications de ventouses, pointes de feu.

**Broncho-pneumonie.**

— *Inflammation des bronches et des vésicules pulmonaires.*

— **SIG.** : Toux douloureuse par quintes, oppression progressive, fièvre élevée. Les lèvres sont violacées.

**TRAIT.** : Enveloppement froid. Poser des ventouses, des vésicatoires et donner des boissons à base d'alcool. Injections sous-cutanées de caféine et de strychnine.

**Brûlures.** — *Lésions produites par l'action du feu sur la peau.*

**SIG.** : Il y a plusieurs degrés.

1<sup>er</sup> degré : Rougeur vive, douleur, cuisson aiguë.

2<sup>e</sup> degré : Rougeur avec cloque contenant un liquide jaunâtre, douleur vive.

3<sup>e</sup> degré : La peau brûlée est moite et blanchâtre sur sa surface, il y a une cloque contenant un liquide roussâtre.

4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> degré : La peau

brûlée est jaunâtre ou noire et est insensible.

**TRAIT.** : Ouvrir les cloques à leur partie inférieure avec une aiguille passée d'abord à la flamme.

*Brûlure par la chaleur.* — Nettoyer les plaies avec de l'eau bouillie et les recouvrir d'un mélange de blanc d'œuf et d'huile d'olive.

*Brûlure par les acides.* — Laver avec de l'eau savonneuse ou de l'eau de chaux.

*Brûlure par les alcools.* — Laver avec de l'eau vinaigrée.

**POMMADE POUR LES BRÛLURES**, qui calme instantanément la douleur et qui aide en même temps à la cicatrisation.

Étendre avec un couteau 2 fois par jour, sur une toile antiseptique, la pommade suivante :

Lanoline . . . . .	120 gr
Eau de chaux . . . . .	80 —

<i>Thiol liquide.</i>	. . . . .	20 gr. »
<i>Microcidine.</i>	. . . . .	0 gr. 50
<i>Antipyrine.</i>	. . . . .	5 gr. »
<i>Cocaïne</i>	. . . . .	} 0 gr. 50
<i>Stovalne</i>	. . . . .	

(D<sup>r</sup> GUIBERT.)

**Cataracte.** — Opacité du cristallin.

**SIG. :** Maladie qui atteint les gens âgés, survient aussi à la suite d'une plaie profonde de l'œil (coup de couteau, plume, corps étrangers). La vue faiblit, et la vision s'améliore à mesure que la lumière s'atténue.

**TRAIT. :** Opération.

**Cerveau.** — Masse de substance nerveuse contenue dans le crâne.

**Cerveau (Maladies du).**

**Congestion cérébrale.** —

*Forme légère :* Douleurs dans la tête, face rouge, battement dans les artères du cou et des tempes.

*Forme grave :* Insomnie,

délire, face et yeux rouges.

*Forme apoplectique :* Perte des mouvements pendant quelques instants, quelques heures, quelques jours, laissant une paralysie des muscles, des membres ou de la face.

**Anémie cérébrale.** —

**Causes :** anémie, maladies nerveuses.

**SIG. :** *Forme lente :* Insomnie, palpitations, troubles de la vue.

*Forme rapide :* Vertiges, pâleur extrême, évanouissements.

**TRAIT. :** Étendre le malade la tête plus basse que le corps, faire respirer 15 gouttes de nitrite d'amyle sur un mouchoir. Faire la respiration artificielle.

**Hémorragie cérébrale.**

— *Forme apoplectique :* Le malade s'affaisse brusquement et perd connaissance. S'il ne succombe pas dans

la crise, le malade revient à la vie souvent avec un côté paralysé. Ces attaques hémorragiques ont des tendances à se reproduire et entraînent la mort à plus ou moins longue échéance.

TRAIT. : En élevant la tête, la couvrir de compresses glacées, appliquer des sinapismes aux mollets, sangsues, saignée.

Administrer une purgation (30 grammes d'eau-de-vie allemande).

Mettre deux sangsues derrière chaque oreille.

**Champignon.**—(V. *Empoisonnement.*)

**Chlorose.** — Maladie connue vulgairement sous « pâles couleurs ». Pâleur verdâtre du visage, palpitations, bouffées de chaleur.

Grande faiblesse, hémorragies fréquentes par le nez, la bouche, manque

d'appétit, caractère triste.

TRAIT. : Garder pendant deux semaines le lit. Veiller sur la constipation (1 cuillerée à café d'huile de ricin tous les matins).

Hydrothérapie, bains salins chauds, frictions à l'alcool, préparations arsenicales.

*Sirop de Bouchut :*

*Sirop de quinquina.* 300 gr.

*Arséniat de soude.* 0,10

RÉGIME : Viandes rouges, légumes secs, bière.

Médication, injections sous-cutanées de cacodylate de fer. Séjour à la mer.

**Choléra.** — Maladie épidémique, contagieuse, caractérisée par une diarrhée incessante ressemblant à du blanc d'œuf, des crampes d'estomac nombreuses et des vomissements.

TRAIT. : Contre les vomissements, prendre du champagne, du rhum; contre la

diarrhée, prendre du *salicylate de bismuth*, s'entourer le ventre de flanelle, frictionner les parties du corps.

**Choléra infantile.** — Maladie épidémique chez les enfants élevés au biberon, et due au mauvais lait

**SIG.:** Vomissements, diarrhée verte.

**TRAIT.:** Cesser toute alimentation, donner toutes les demi-heures une cuillerée d'eau bouillie sucrée. Potion eau de chaux.

*Potion à l'acide lactique*  
3 gr. p. 100. 1 cuillère à café toutes les heures.  
(D<sup>r</sup> HAYEM.)

Bains et lavements chauds, cataplasmes laudanisés sur le ventre, frictions avec de l'huile de camomille camphrée.

**Cils collés.** — (V. *Yeux.*)

**Cirrhose alcoolique.** — (V. *Maladies du foie.* p. 25).

### Cœur (Maladies de).

**Endocardite.** — Inflammation de la membrane qui tapisse l'intérieur du cœur.

— Endocardite venant à la suite de maladies, le plus souvent du rhumatisme ou bien à la suite de variole, diphtérie, scarlatine, pneumonie ou de grossesse.

**SIG.:** Étouffements, palpitations, crachements sanglants, enflure des chevilles et des jambes. Insomnie.

**TRAIT.:** Régime lacté, exercice modéré. Boire de l'eau Vittel, prendre de la digitale ou de l'iodure. Il est nécessaire de consulter le médecin.

**Myocardite.** — Inflammation de la substance musculaire du cœur. Battements irréguliers et affaiblis du cœur, essoufflements.

**TRAIT.:** Digitale. Spartéine. Caféine. Iodure de potassium.

**Palpitations.** — Battements précipités du cœur. Sensation douloureuse, angoissante. La voix s'altère, le visage devient blême.

Causes : Anémie, alcoolisme, neurasthénie, hystérie.

TRAIT. : Application sur le cœur d'une vessie de glace. Médicaments : Valérianate, digitale, bromure de potassium.

**Angine de poitrine.** — *Néuralgie des nerfs du cœur.* — Douleur brusque et atroce en avant du cœur et au bras gauche ; on a la sensation qu'on va mourir. La crise ne dure que quelques secondes.

TRAIT. DE L'ACCÈS : Assoir le malade, faire le calme absolu autour de lui, aérer et appeler de suite un médecin. Faire respirer du *nitrite d'amyle*, 5 à 10 gouttes sur un mouchoir.

Hygiène et régime : Éviter les émotions, les fati-

gues. Repas légers, pas d'excitants, d'alcool, de tabac. Badigeonnages d'iode sur le cœur tous les 3 jours.

**Coliques.** — Douleurs causées par la contraction d'un organe creux qui a expulsé son contenu.

**Colique néphrétique.** — (V. *Reins.*)

**Colique hépatique** — (V. *Foie.*)

Pour colique à l'époque des règles (V. *Règles.*)

**Coliques de plomb.** — *Colique des peintres empoisonnés par les sels de plomb.*

SIG. : La peau est jaune, la soif très vive, l'haleine fétide, coliques au creux de l'estomac, constipation intense.

TRAIT : Cataplasmes sur le ventre, vomitifs. Prendre 15 grammes de sulfate de magnésie délayés dans du lait. Grands lavages de

l'intestin (V. p. 79). Iodure de potassium.

**Colonne vertébrale (Déviations de la)** — Déviations des vertèbres d'origine quelquefois tuberculeuse.

**TRAIT.**: Gymnastique suédoise. Vie au bord de la mer. Immobilité parfois absolue durant des mois. Consulter un médecin dès le début de la maladie.

**Compère Lorient ou Orgelet.** — Bouton dur ressemblant à un grain d'orge, qui vient au bord de la paupière.

Ce bouton blanchit au bout de cinq jours, et laisse couler du pus.

**TRAIT. abortif** : Appliquer un pansement en permanence d'eau boriquée.

**TRAIT. curatif** : Faire sortir le pus en ouvrant l'orgelet, et mettre des pansements humides.

**TRAIT. préventif** : Lotions très chaudes avec de l'eau boriquée.

**Congestion.** — Accumulation du sang à une des parties du corps : *congestion cérébrale, pulmonaire* (V. *Cerveau, poumon, foie*).

**Conjonctivite.** — Inflammation de la muqueuse des yeux. (V. *Yeux*.)

**Constipation.** — Impossibilité d'aller régulièrement à la selle.

**TRAIT.** : Exercice, marche au grand air, lavements, suppositoires à la glycérine, massage du ventre.

**Contagion.** — Transmission d'une maladie.

*Maladies contagieuses.* — Rougeole, fièvre typhoïde, scarlatine, diphtérie, variole, choléra, oreillons, dysenterie, coqueluche.

**Contusion.** — Meurtrissure produite par un choc.

**TRAIT.** : Compresse d'eau froide, pansement, massage.

**Convulsions des enfants.** — Contraction violente et involontaire des muscles.

**SIG.** : Vomissements, pâleur, perte de connaissance; l'enfant est agité par des contractions violentes, la figure et les lèvres bleuissent et grimacent, les yeux dilatés sont fixes, le corps se raidit tandis que la tête va d'un côté à l'autre.

**TRAIT.** : Mettre l'enfant dévêtu à l'air, puis le rouler dans un drap mouillé, mettre des compresses froides sur la tête, et lui faire prendre, en deux ou trois fois, une cuillerée de *sirop d'éther*.

Donner un lavement d'eau tiède. Bains tièdes salés très fréquents.

**Coqueluche.** — Maladie contagieuse.

**Toux convulsive** par quintes atteignant surtout les enfants.

Dans la maladie, trois périodes :

Première : durée de cinq à quinze jours. Fièvre avec toux forte.

Deuxième : durée de deux à six semaines. La toux devient convulsive. L'enfant a la face violette, les yeux rouges. Durant les quintes il vomit. La fièvre est élevée.

Troisième : les quintes deviennent de moins en moins fréquentes.

**TRAIT.** : Donner du chloral ou de la quinine. Garder la chambre durant les première et deuxième périodes, changement d'air et promenades au grand air durant la troisième période. Repas légers.

**Cor.** — Durillon sur les orteils.

**TRAIT.** : Enlever le cor après un bain de pied et mettre pendant quelques soirs de l'éther ou de l'iode.

Même traitement pour l'œil de perdrix.

**Coryza.** — (V. *Nez.*)

**Coup de chaleur.** — (V. *Insolation.*)

**Coup de fouet.** — Rupture de fibres musculaires dans le mollet, à la suite d'une contraction énergique.

**Sig.** : Douleur vive, ecchymose au mollet, impossibilité de se servir de sa jambe.

**TRAIT.** : Repos au lit, application compresses chaudes, massage et électrisation.

**Coxalgie.** — Maladie très grave, tumeur blanche de l'articulation qui unit la cuisse au bassin.

**Sig.** : Douleur siégeant dans la hanche et le genou

et qui devient plus intense à la fatigue. Attitude vicieuse de la cuisse, qui se replie de plus en plus. La cuisse et la jambe s'atrophient progressivement.

Il y a cambrure de la colonne vertébrale, raccourcissement de la jambe et finalement formation d'abcès qui prennent jour d'eux-mêmes, laissant échapper du pus.

**TRAIT.** : Le repos, l'immobilisation dans la gouttière de Bonnet, il est préférable de faire l'extension, c'est-à-dire de mettre au pied un poids assez fort qui tire sur le membre malade.

Cure maritime.

**Crampe.** — Contractions douloureuses et spasmodiques des muscles, de la jambe ou des mains, le plus souvent.

**Crampe d'estomac.** — (V. *Estomac.*)

**Crampe professionnelle** (écrivain, pianiste). — Cesser de travailler de la main malade. Repos, massage, électricité.

**Crevasse** (gerçure). — Fentes de la peau.

*Aux lèvres.* TRAIT. : Passer pendant plusieurs jours, matin et soir, de la pommade rosat ou mieux du glycérolé d'amidon.

*Aux mains.* TRAIT. : Enduire les mains de glycérine tous les soirs avant de se coucher.

*Aux seins.* TRAIT. : Lavage avec l'eau-de-vie pour prévenir des crevasses.

Application sur les crevasses d'eau de chaux et d'huile d'amandes douces mélangées à parties égales.

**Croup et diphtérie laryngée.** — Maladie contagieuse des voies respiratoires.

SIG. : Peaux blanches adhérentes dans le pharynx

et le larynx. La voix devient rauque, puis éteinte.

Respiration de plus en plus difficile, appeler un médecin.

TRAIT. : Injection de sérum antidiphtérique. Lavages fréquents.

*Précautions à prendre.* — La garde malade devra se gargariser souvent avec de l'eau oxygénée, se laver les mains dans le sublimé après avoir touché la gorge du diphtérique.

Après la maladie, désinfecter.

**Danse de Saint-Guy.** — Maladie caractérisée par des mouvements convulsifs et involontaires.

Deux périodes : durée de deux à trois mois.

1<sup>re</sup> Impossibilité de faire coordonner les mouvements avec la volonté.

2<sup>e</sup> Contractions, contorsions, grimaces, difficultés à causer et à manger.

TRAIT. : Gymnastique, douches froides, massage. Médicaments : antipyrine, chloral, arsenic, bromure de potassium.

**Delirium tremens.** — *Délire avec agitation et tremblements des membres, particulier aux alcooliques.* — SIG. : Délire, cris, tremblements. La fièvre est élevée de 39 à 41°. Une crise peut durer plusieurs jours.

TRAIT. : Supprimer toutes boissons, enfermer le malade dans une chambre, tout en veillant sur lui. Faire boire du lait en grande quantité, bains fréquents.

TRAIT. : Inhalation d'oxygène, poser des ventouses sèches ou scarifiées, prendre pour le cœur qui est fatigué de la digitale ou de la caféine.

**Démangeaisons.** — Picotements de la peau, pro-

voqués par des maladies de la peau ou par la piqure d'un insecte, tel que :

*Puce.* — TRAIT. : Lavage avec de l'eau vinaigrée.

*Punaise.* — TRAIT. : Appliquer de l'huile phéniquée.

*Acide phénique.* . . . 50 centigr.


*Huile* . . . . . 50 gr.

*Cousin et moustique.* — TRAIT. : Lavage avec eau ammoniacale, application pommade d'oxyde de zinc. Pour toutes ces piqures appliquer un peu de teinture d'iode au point lésé.

**Dent (Maux de).** — Cachets de pyramidon (0 gr. 40).

*Accidents de la première dentition.* — TRAIT. : Frotter les gencives avec le doigt couvert de glycérine et faire sucer un bâton de guimauve.

**Désinfection.** — Durant la maladie la chambre



ne doit pas être balayée, mais essuyée avec un linge humide. Les vomissements, crachats et matière fécale doivent être recueillis dans un vase contenant de l'eau phéniquée. Le vider chaque fois promptement.

La maladie terminée, avertir le service des étuves municipales.

**Diabète.** — Maladie caractérisée par une excrétion très abondante d'urine contenant une matière sucrée.

**Sig.** : Soif vive amaigrissement, inflammation des gencives, chute des dents, affaiblissement de la vue, troubles nerveux, lassitude, diminution de la mémoire, altération de l'haleine.

**Régime** : Suppression de pain ordinaire, d'aliments féculents et sucrés. Les fruits sont interdits ainsi que les boissons : bière, cidre, champagne et toutes les liqueurs.

**TRAIT.** : Exercice modéré, frictions au gant de crin sur tout le corps. Éviter les voyages, les fatigues, les ennuis.

**Médicaments** : *Antipyrine* de 1 à 3 grammes.

Saison à Vichy ou à Contrexéville.

**Diarrhée.** — Flux de ventre. — **TRAIT.** : Purgatif léger. Prendre du *bismuth*, 2 paquets par jour, de 3 grammes.

Prendre des constipants, riz, coing.

**Dilatation d'estomac.** — (V. *Estomac.*)

**Diphthérie.** — Maladie très contagieuse, caractérisée par la présence d'un microbe spécial qui amène la production de membranes blanches recouvrant le pharynx (V. *Angine*), le larynx (V. *Croup*), les bronches (V. *Bronchite diphtérique*) et l'intérieur des na-

rines (V. *Coryza diphtérique*).

TRAIT. : Appeler de suite un médecin. (V. *Angine*.)

**Dyspepsie.** — Digestion laborieuse (V. *Maladies d'estomac*).

**Éblouissement.** — Trouble momentané de la vue.

**Ecrouelles.** — Plaies résultant de tuberculose ganglionnaire suppurée (V. *Scrofule*).

**Eczéma.** — Maladie de peau, consistant en vésicules rapprochées qui causent des démangeaisons violentes (V. *Peau*).

**Embarras gastrique.** — (V. *Estomac*.)

**Emphysème.** — Gonflement des vésicules pulmonaires.

SIG. : Toux fréquente, crachats purulents le ma-

tin. Cause très fréquente de bronchite chronique.

TRAIT. : Iodure de potassium, 25 centigrammes par jour. *Eucalyptol*, 10 à 20 gouttes par jour.

Hydrothérapie, douches tièdes ou écossaises.

**Empoisonnements.** — Absorption de substances nuisibles à l'organisme. Appeler dans tous les empoisonnements de suite un médecin.

**Empoisonnement par les médicaments.**

*Laudanum, morphine, pavot.* — SIG. : Excitation, palpitations de cœur, soif ardente et torpeur.

TRAIT. : Vomitif avec de l'ipéca (1 gr. 50) et réchauffer le malade.

*Chloral.* — SIG. : Sommeil lourd, diminution de température, blancheur de la face.

TRAIT. : Provoquer des vomissements, café noir, réchauffer le malade.

*Belladone.* — SIG. : Sécheresse de la bouche, pupilles très dilatées, délire.

TRAIT. : Vomitif, administrer du café noir très fort et réchauffer le malade.

*Cocaïne.* — Troubles de la vue, angoisse, respiration difficile, chaleur au visage, tendance à l'évanouissement.

TRAIT. : Faire vomir, donner du café fort.

*Arsenic.* — Vomissements, coliques.

TRAIT. : Vomitif avec l'ipéca. Frictions, stimulants.

### **Empoisonnement par les aliments.**

*Moules.* — Vomissements, coliques.

TRAIT. : Vomitif avec de l'ipéca. Prendre café, eau-de-vie, cataplasmes sur le ventre. Frictions.

*Champignons.* — Vomissements, coliques.

TRAIT. : Vomitif. Frictions sèches, café noir.

*Viandes.* — Vomissements, coliques.

TRAIT. : Vomitif. Purgation.

### **Empoisonnement chronique par le tabac.**

SIG. Perte de la mémoire, tremblement, irritation de la gorge, palpitations et troubles de la vision des couleurs.

TRAIT. : Suppression du tabac.

**Engelures.** — Crevasses aux pieds et aux mains causées par le froid.

TRAIT. : Application d'huile vierge, éloigner du feu les mains ou les pieds atteints. Glycéro d'amidon.

**Entérite.** — Inflammation de l'intestin (V. *Intestin.*)

**Entorse** — Extension violente des ligaments et en général des parties molles voisines d'une articulation. — SIG. Douleurs vio-

lentes avec gonflement, s'exagérant par les mouvements de l'articulation.

TRAIT. : Repos, massage, bains chauds, bandage serré.

**Épilepsie.** — Maladie nerveuse dans laquelle le malade tombe subitement sans connaissance, avec convulsions.

*Grande attaque.* — Le malade pousse un cri, devient très pâle et tombe n'importe où il se trouve. Les mâchoires sont serrées, les yeux sont révulsés, la respiration est bruyante, la figure est violacée, il y a un spasme des muscles de la face. Le malade urine sous lui. Puis suit la période comateuse, qui dure généralement plusieurs heures, durant lesquelles les membres deviennent inertes. Peu à peu le malade revient à lui, n'ayant nullement le souvenir de ce qui vient de lui arriver.

La *petite attaque* se manifeste, ou par un *vertige* momentané, ou une *absence*, ou un *délire*, ou une *course* sans but ni raison.

TRAIT. : Pendant l'attaque coucher le malade, défaire ses vêtements, appliquer une compresse d'eau très froide sur la tête et le laisser tranquille durant la crise.

TRAIT. GÉNÉRAL : Bromure à haute dose, bains fréquents.

**Érysipèle.** — *Inflammation superficielle de la peau, accompagnée de tension et de douleur.* — Maladie contagieuse siégeant surtout au visage. — SIG. : Période d'incubation, quelques heures à trois jours. Frisson, fièvre, vomissements. Une plaque rouge douloureuse couvre le nez, les paupières jusqu'à l'oreille.

TRAIT. : En permanence, des pansements humides ;

avec de l'eau boriquée. Appeler un médecin.

**Estomac.** — Viscère musculo-membraneux dont la muqueuse sécrète un suc digestif pour certains aliments.

**Dilatation d'estomac.** — SIG. : Estomac gonflé, vomissements fréquents, manque d'appétit, fatigue, maigreur.

La cause de la dilatation d'estomac vient de la surcharge en aliment ou en boisson que l'on impose à cet organe.

Régime : Repas légers, viandes grillées, purée de légumes, légumes verts, œufs. Pas de potage, ni de sauce.

Comme boisson, un verre tout au plus par repas.

Ni café, ni liqueur, ni alcool.

TRAIT. : Purgatifs légers. Massage. Suppression du corset.

**Dyspepsie.** — Digestion difficile. Il y a plusieurs sortes de dyspepsies.

**Dyspepsie par gaz.** — SIG. : Estomac gonflé.

TRAIT. et régime : Exercice, massage. Légumes secs, pain grillé, pas d'oseille, de tomate. Lait très recommandé.

Pas de sauces, de mets épicés, les purées sont excellentes.

**Dyspepsie hyperchlorhydrique.** — Mêmes signes que dans la précédente; de plus, renvois acides, vomissements.

Même traitement que dans l'autre dyspepsie.

**Dyspepsie avec troubles nerveux, vertiges** — TRAIT. : Même que dans les précédentes, sauf le lait.

**Dyspepsie douloureuse.** — TRAIT. : Com-

presses d'eau chaude sur l'estomac après les repas.

*Dyspepsie alcoolique.* — RÉGIME : Suppression des alcools.

*Embarras gastrique.* — État toxique qui se traduit de différentes façons.

*Embarras gastrique simple.* — SIG. : Manque d'appétit, mal de tête.

TRAIT. : Purgation, diète.

*Embarras gastrique fébrile.* — Les mêmes signes accompagnés de fièvre de 38° à 40°, est fréquemment le début d'une fièvre typhoïde.

TRAIT. : Cachet de quinine, lavement.

*Gastralgie.* — *Néuralgie de l'estomac.* — SIG. : Pâleur du visage, douleurs très vives au creux de l'estomac avec parfois irradiation entre les deux épaules.

TRAIT. : Hydrothérapie, application de compresses d'eau très chaude sur l'estomac.

*Cancer de l'estomac.* — SIG. : Douleurs atroces, vomissements bruns, striés de sang. Gonflement des jambes, des pieds, des mains, amaigrissement très rapide, teinte jaune paille de la peau. Survient habituellement après 50 ans.

TRAIT. : Régime lacté. Lavages d'estomac. Contre les vomissements de sang, piqûres de morphine et d'ergotine.

*Ulcère de l'estomac.* — SIG. : Sensation de brûlure à l'estomac, vomissements glaireux et parfois sanguins, amaigrissement considérable.

TRAIT. : Régime lacté, puis reprendre, lorsque le malade est guéri, une alimentation surtout composée de féculents.

**Évanouissement.** —  
Perte de connaissance.

TRAIT. : Étendre le malade, défaire les vêtements, faire respirer des sels et jeter de l'eau fraîche au visage.

**Fièvre.** — État maladif caractérisé par l'accélération du pouls et par une chaleur générale se manifestant par une élévation de la température, constatée à l'aide d'un thermomètre placé soit sous le bras, soit dans le rectum.

La température normale est de 35°,5 à 37°,5.

Les pulsations normales chez les adultes sont de 60 à 75 par minute. Chez les enfants et les vieillards, les pulsations sont plus rapides.

**Fièvre typhoïde.** —  
(V. *Typhoïde.*)

**Fièvre rougeole.** — (V. *Rougeole.*)

**Fièvre scarlatine.** — (V. *Scarlatine.*)

**Fièvre muqueuse.** —  
Forme légère de la fièvre typhoïde. — SIG. : Langue blanche, vomissements, diarrhée ou constipation. Maux de tête. Sur le ventre apparition de taches rosées.

TRAIT. : Bains tièdes; alimentation, lait, bouillon, limonade.

**Fièvre puerpérale.** —  
Infection qui atteint les femmes à la suite de couches, généralement 3 ou 4 jours après l'accouchement. — SIG. : Température élevée, bas ventre très douloureux, frissons, vomissements verts, respiration haletante. La malade peut guérir, mais la mort survient souvent du 2<sup>e</sup> au 5<sup>e</sup> jour de maladie.

TRAIT. : Injections sous-cutané es de collargol.

**Flueurs blanches** (*Leucorrhée*). — Ecoulement blanc produit par les glandes de la muqueuse du vagin.

**TRAIT. GÉNÉRAL** : Exercice modéré, frictions à l'alcool. Médicaments : fer, arsenic, quinquina, quassia.

**TRAIT. LOCAL** : Injections avec une canule (femme), avec une sonde molle de caoutchouc (jeune fille), de 2 litres d'eau bouillie très chaude ou d'une décoction de feuilles de noyer.

**Fluxion.** — Gonflement douloureux.

**Fluxion dentaire.** — Gonflement de la joue provoquée par une inflammation dentaire, le plus souvent un abcès dentaire au début.

**TRAIT.** : Lavage de la bouche avec de l'eau bouillie ; faire soigner la dent malade.

**Fluxion de poitrine.** — (V. *Poumons*.)

**Foie.** — Organe sécréteur de la bile et du fiel.

**Foie (Maladies du).**

**Colique hépatique.** — Pierres (calculs) se formant dans la vésicule biliaire.

**SIG.** : Douleur très vive dans le côté droit au niveau du foie, elle se propage vers l'estomac, l'ombilic et à l'épaule droite. Des vomissements accompagnent la crise. Les urines sont foncées, les selles sont claires, le visage est jaune.

**TRAIT. préventif** : Prendre le matin à jeun 50 gr d'huile d'olive ou de Haartem.

Pendant l'accès : Bains chauds, application d'eau bouillante sur le foie, piquère de morphine, lavements très froids.

**Régime.** : Supprimer les

aliments acides, la viande, les salades, les boissons gazeuses, l'alcool. Éviter la constipation. Faire de l'exercice.

**Jaunisse (Ictère).** — Maladie causée par la bile qui se répand dans le sang et jaunit la peau.

SIG. Bouche amère, teinte jaune des yeux, mal de tête, courbature, perte d'appétit, saignements de nez, vomissements, diarrhée.

TRAIT. : Purgation. Régime lacté.

**Congestion du foie.** — SIG. : Douleur au foie, manque d'appétit, vomissements de bile.

TRAIT. : Lavement. Régime lacté (lait coupé d'eau de Vichy.)

**Kyste du foie.** — Tumeur provoquée par le développement, dans le tissu du foie, des œufs du ténia echinococcus, dont le vers

habite l'intestin du chien

SIG. : Au début, dégoût pour les aliments gras. Douleur dans l'épaule droite. Saignements de nez. La tumeur devient apparente assez rapidement. L'appétit diminue, amaigrissement considérable, hémorragies.

TRAIT. préventif : Ne pas se faire lécher par les chiens.

TRAIT. : Opération chirurgicale.

**Cancer du foie.** — Douleur au foie, jaunisse, vomissements sanguins, selles noires. Foie gros, ventre enflé.

TRAIT. : Opération.

**Fracture.** — Rupture d'un os ou d'un cartilage.

SIG. : Douleur très violente au niveau de la brisure. Déformation du membre avant l'enflure. Impossibilité de s'en servir.

**TRAIT.** : Immobilisation absolue du membre atteint jusqu'à l'arrivée du médecin.

*Comment transporter quelqu'un atteint de fracture.*

*Le bras est cassé.* — Mettre le bras sur une planche et le lier fortement afin de l'immobiliser.

*La jambe est cassée.* — Mettre la jambe sur une planche et l'attacher afin qu'elle ne remue pas.

Pour toutes les fractures, fractures de la clavicule, des côtes, du crâne, de la jambe, du bras, du pied, de la main, il faudra le plus vite possible quérir un médecin.

**Furonculose.** — Apparition par série de *clous*, ou furoncles.

**TRAIT.** général : Purgatifs, levure de bière, cachets benzo-naphtol, de 0 gr. 50, 4 par jour.

**TRAIT.** local : Appliquer de l'iode sur le clou (au début).

S'il n'avorte pas, mettre en permanence des *ouata-plasmes Langlebert*.

**Gastralgie.** — (V. *Maladies d'estomac.*)

**Gercures.** — (V. *Crevasse.*)

**Gorge.** — (V. *Angine.*)

**Grippe.** — Maladie épidémique contagieuse.

**SIG.** Brusquement courbature générale, mal de tête, rhume de cerveau, toux, manque d'appétit, fièvre élevée.

*Forme grave.* — Signes précédents augmentés.

*Forme nerveuse.* — Maux de tête, névralgies dans dents et les oreilles, vomissements.

*Forme gastro-intestinale.* — Vomissements, diarrhée avec coliques, fièvre élevée, prostration extrême.

**TRAIT.** : Garder le lit, prendre de la quinine à

haute dose. Lavements tièdes. — Boissons chaudes (tisanes, grogs). Diète.

Lavages du nez et de la gorge à l'eau boriquée

**Grossesse.** — État d'une femme enceinte.

SIG. probables. : Suppression ou irrégularité des règles, gonflements des seins, vomissements le matin, dégoût pour certains aliments, changement de caractère, fatigue extrême, évanouissements.

SIG. certains : Mouvements de l'enfant.

*Hygiène.* — Éviter les fatigues, les voyages, les secousses de toutes sortes. — Tous les huit jours prendre un bain tiède, aller régulièrement à la selle, prendre des laxatifs et non des purgatifs, nourriture pas épicée, faire analyser tous les mois les urines.

**Haleine fétide.** — Se

laver plusieurs fois la bouche avec de l'eau chaude additionnée avec quelques gouttes de :

<i>Acide phénique . . .</i>	<i>3 gr. »</i>
<i>Essence de citron. .</i>	<i>2 gr. 50</i>
<i>Ess. de menthe. . .</i>	<i>5 gr. »</i>
<i>Alcool à 60° . . . .</i>	<i>1 lit. »</i>

**Hémiplégie.** — Paralyse qui atteint la moitié du corps.

TRAIT. : Appliquer le traitement de l'apoplexie (V. *Apoplexie*).

**Hémorragie.** — Perte de sang, interne ou externe.

**Hémorragie cérébrale**  
— (V. *Cerveau*)

**Hémorragie pulmonaire.** — Crachements de sang pendant une quinte de toux.

TRAIT. : Ne pas faire parler le malade, le mettre dans une chambre aérée,

boissons glacées par petites gorgées.

Appliquer des sinapismes aux jambes, lavements chauds (45° à 50°).

**Hémorragie** (*veine, artère*). — Agir prestement avant l'arrivée du médecin.

Comprimer fortement au niveau de l'hémorragie avec une toile, pliée plusieurs fois afin de donner de l'épaisseur, puis serrer avec une bande. En cas d'hémorragie artérielle, le sang sort en jets saccadés ; mettre le doigt dans la plaie pour arrêter le sang et envoyer chercher d'urgence un médecin.

**Hémorroïdes**. — Tumeurs variqueuses qui se forment autour de l'anus, dues souvent à la constipation.

**Sig.** : Souffrance en marchant et en allant à la selle. Perte de sang dans les matières fécales.

Les hémorroïdes sont internes ou externes. Externes, elles sortent à l'anus et sont très douloureuses.

**TRAIT.** : Combattre la constipation. Lavages et lavements très chauds.

### **Hépatique.** — (V. Foie.)

**Hernie**. — Tumeur molle formée par la sortie, totale ou partielle, d'une portion de l'intestin à travers la paroi de l'abdomen.

**Sig.** : Apparition d'une tumeur plus ou moins développée au niveau de l'aîne ou de l'ombilic. Cette tumeur est indolore et réductible, c'est-à-dire qu'elle diminue de volume sous l'influence de la pression des doigts et augmente lorsque le hernieux tousse.

La hernie provoque des douleurs et coliques, des tiraillements d'estomac, de mauvaises digestions.

**TRAIT.** : Porter un ban-

dage spécial ; s'il est mal toléré, opération.

**Hernie étranglée.** —

**Sig.** : Hernie ancienne transformée subitement en une tumeur dure, douloureuse, recouverte d'une peau rouge, gonflée. La constipation et l'arrêt des gaz sont absolus. Le ventre est gros. Vomissements, perte de forces, diminution du pouls.

**TRAIT.** : Appliquer de la glace sur le ventre, appeler de suite un médecin.

**Herpès.** — *Maladie de la peau, contagieuse.* Éruption consistant en vésicules réunies en groupes sur une base enflammée.

**Sig.** : Plaque rouge sur laquelle on aperçoit des petites vésicules rapprochées ; au bout de quelques jours, ces vésicules se rompent et il se forme une croûte. Sensation de brûlure. Démangeaisons.

**TRAIT.** : Application de vaseline boriquée. Purgation.

**Hydropisie.** — Accumulation de sérosité dans quelque partie du corps.

*Formes d'hydropisie les plus courantes :*

*Dans le ventre* (provoquée par des maladies du foie, du cœur).

*Sur la face* (provoquée par une maladie des reins, néphrite).

*Dans les jambes et les pieds* (provoquée par une maladie de cœur).

**TRAIT.** : Diurétiques, frictions sèches. Purgatifs.

**Hystérie.** — Maladie de nerfs se manifestant le plus souvent par la crise de nerfs banale.

*Pelite attaque d'hystérie.* — **Sig.** : Sensation d'étouffement provoquée par une boule qui monte de l'estomac et s'arrête à la gorge.

Chute du corps. Convulsions avec mouvements désordonnés, perte de connaissance. La crise se termine par des pleurs ou par un rire nerveux.

*Grande attaque d'hystérie.*  
— **SIG.** : Ressemble beaucoup aux crises d'épilepsie.

Il arrive, au cours de ces crises, des paralysies, la perte de sensibilité (anesthésie), de l'exagération de la sensibilité (hyperesthésie), des troubles de la vue, de l'ouïe, du goût, de l'odorat.

**TRAIT. GÉNÉRAL** : Vie à la campagne très calme, hydrothérapie, massage, électricité.

**Traitement pendant l'attaque** : Asperger le visage d'eau très froide, compression des ovaires, faire respirer de l'éther.

**Incontinence d'urine.**  
— (V. *Urine.*)

**Indigestion.** — (V. *Estomac. Embarras gastrique.*)

**Influenza.** — Grippe en italien. Grippe à caractère épidémique plus marqué.

**Infusion.** — (V. p. 88.)

**Insolation.** — Maladie provoquée par l'exposition à un soleil ardent. Perte de connaissance.

*Comment éviter l'insolation.* — Porter des coiffures légères, des vêtements larges, prendre fréquemment du thé, du café, éviter la constipation.

**TRAIT.** : Étendre le malade dans un endroit frais et aéré, ouvrir ses vêtements et lui passer un linge mouillé sur le corps, compresse glacée sur la tête, friction des membres à l'alcool camphré, faire boire du café léger, administrer un lavement.

**Intestins.** — Conduits membraneux allant de l'estomac à l'anus.

**Intestin (Maladies de l').**

**Entérite aiguë.** — Inflammation des intestins.

**SIG. :** Coliques suivies de selles liquides jaunâtres, manque d'appétit, soif vive.

**TRAIT. :** Purgations légères. Régime lacté.

**Entérite chronique.** — **SIG. :** Coliques, diarrhée jaunâtre avec membranes blanchâtres (entérite membraneuse). Amaigrissement très rapide.

**TRAIT. :** Lavages d'intestins très chauds, tous les matins. Massage, hydrothérapie. Régime sec, purée de légumes, viande crue hachée dans du bouillon. Suppression de l'alcool.

Contre la diarrhée, *élixir parégorique* ou *potion de bismuth*.

**Cancer de l'intestin.** — **SIG. :** Douleurs violentes dans le ventre, alternatives de constipation et de diarrhée, hémorragies.

**TRAIT. :** Opération.

**Intoxication.** — Introduction d'un poison dans l'organisme (V. *Mercure.* — V. *Coliques de plomb.*)

**Jaunisse.** — (V. *Foie.*)

**Larynx.** — Organe situé entre le pharynx et la trachée, et dans lequel se produit la voix.

**Laryngite.** — Inflammation du larynx.

**Laryngite aiguë.** — **SIG. :** Voix enrouée, toux sèche, douloureuse, provoquée par une sensation de chatouillement dans le fond de la gorge. Fièvre.

**TRAIT. :** Compresses d'eau chaude au-devant du cou

Parler très peu. Inhalations, tisanes, gargarismes très chauds.

**Laryngite chronique.** — SIG. : Altération constante de la voix.

TRAIT. : Suppression du tabac, des alcools. Parler le moins possible.

Saison à La Bourboule, aux Eaux-Bonnes, à Cauterets. Se faire examiner la gorge par un spécialiste.

**Laryngite striduleuse ou faux croup.** — Maladie particulière à l'enfance.

Laryngite aiguë accompagnée d'étouffements nocturnes. — Toux rauque par quintes, congestion du visage, fièvre plus ou moins élevée.

La crise dure d'une demi-heure à une heure, puis la respiration redevient calme.

TRAIT : Inhalations d'eau bouillante, compresses, sur

le devant du cou. d'eau très chaude.

**Lavement.** — Injection d'un liquide dans le gros intestin (V. p. 79). Différents lavements, comment les prendre (V. p. 82).

**Lumbago.** — Rhumatisme dans les reins.

TRAIT. : Ventouses sèches, frictions, bains sulfureux.

**Mal blanc.** — (V. *Parnaris*.)

**Mal de mer.** — SIG. : Vomissements, maux de tête.

TRAIT. : S'étendre, enlever les vêtements, prendre de l'eau chloroformée.

**Mal des montagnes.** —

SIG. : Malaise que l'on éprouve arrivé à une certaine hauteur (3 000 mètres). Bourdonnements d'oreilles,

palpitations, maux de tête, envie invincible de dormir.

TRAIT. : Secouer à tout prix la torpeur, descendre aussitôt pour gagner une altitude moins élevée.

Mal de reins. — (V. *Lumbago*. — V. *Reins*.)

Matrice ou utérus. — Organe de la femme où se développe l'embryon.

*Descente de matrice*. — Abaissement de la matrice dans le vagin. — Sig. : Tiraillements avec pesanteur dans le bas-ventre, marche difficile, pénible, flueurs blanches, constipation, besoins fréquents d'uriner. Cette maladie survient généralement chez les femmes qui ont eu plusieurs enfants et qui se sont levées trop tôt après leur accouchement.

TRAIT. préventif : Ne se le-

ver que le vingt et unième jour après l'accouchement.

TRAIT. curatif : Porter des pessaires, consulter un chirurgien.

**Méningite**. — Inflammation des membranes enveloppant le cerveau.

Il y a deux sortes de méningites.

**Méningite cérébrale aiguë**. — Dans cette maladie trois périodes.

*Première période dite d'invasion*. — Frissons, fièvre, vertige, maux de tête, envie de vomir.

*Deuxième période dite d'excitation*. — Maux de tête terribles, cris plaintifs, vomissements, constipation persistante, le ventre est creusé, délire, mouvements convulsifs. Les muscles de la face sont contractés, les yeux hagards louchent, la peau est très sensible.

*Troisième période dite de*

*dépression.* — Les signes précédents s'accroissent avec la différence que la période d'excitation a fait place à une prostration extrême. Le pouls devient faible, les membres sont paralysés.

TRAIT. : Le médecin seul pourra peut-être guérir le malade.

**Méningite tuberculeuse.** — (Maladie qui atteint surtout les enfants de 2 à 7 ans) quatre périodes.

*Première période, dite d'invasion.* — L'enfant devient taciturne, le caractère devient très irritable. Amaigrissement, fièvre, apparition de ganglions au cou et dans les aines.

*Deuxième période, dite d'excitation.* — Mêmes signes que dans la méningite cérébrale. Les nerfs de la muque sont contractés, l'insomnie est persistante, les maux de tête sont horrible-

ment douloureux. Période qui peut durer de quatre à quinze jours.

*Troisième période, dite de dépression.* — Prostration extrême. Le pouls est faible, la fièvre tombe, la face est alternativement rouge et pâle, la peau est irritable.

*Quatrième période dite paralytique.* — La fièvre est très élevée. Le ventre est ballonné, perte de connaissance.

TRAIT. : Glace sur la tête.

**Métrite.** — Inflammation de la matrice.

**Métrite aiguë.** — SIG. : Pesanteur et douleur dans le bas-ventre, maux de reins, envies fréquentes d'uriner et d'aller à la selle, écoulement d'un liquide jaunâtre et parfois sanguinolent.

TRAIT. : Repos au lit, injections très chaudes avec solution faible de perman-

ganate. En cas de douleur, lavements de laudanum. Tampons glycélinés.

**Métrite chronique.** —  
**Sig.** : Pertes blanches, règles irrégulières, très douloureuses avec expulsion de lambeaux de membranes. Constipation, besoins fréquents d'uriner, manque d'appétit, mauvaise digestion, amaigrissement, migraines, névralgies.

**TRAIT.** : Repos au lit, injections très chaudes à faible pression de 4 litres d'eau à 45°, additionnée de 0 gr. 25 de permanganate. Ovules et tampons à la glycérine.

**Mercure (Intoxication par le — Forme aiguë —**  
**Sig.** : Goût désagréable de métal dans la bouche, salivation continuelle, les dents sont branlantes, les gencives sanguinolentes. Fièvre, palpitations, diarrhées.

**Forme chronique.** — Les

mêmes signes précédents, de plus tremblements dans les jambes, les bras et la tête.

**TRAIT.** : Bains, hydrothérapie, propreté excessive de la bouche. Iodure de potassium.

**Migraine.** — Douleur qui n'affecte qu'un côté de la tête.

**TRAIT.** : Repos dans l'obscurité. Prendre un cachet d'antipyrine ou de sulfate de quinine.

**Morsure.** — Plaie, meurtrissure faite par les dents d'un animal.

**Cheval.** — Laver la plaie immédiatement avec de l'eau boriquée et étendre dessus un pansement humide, en attendant l'arrivée du médecin.

**Chien.** — (V. Rage.) Lavage de la plaie à l'eau phéniquée.

Le malade devra se ren-

dre le plus vite possible à l'Institut Pasteur.

*Chat.* — (V. *Rage.*) Même traitement que le précédent.

*Serpents.* — Lier fortement le membre atteint et faire saigner abondamment la plaie.

Lavage avec la solution suivante :

<i>Chlorure de chaux</i>	.		.	1 gr.
<i>Eau distillée</i>	.	.	.	60 gr.

Appeler le plus vite possible un médecin.

*Moules.* — (V. *Empoisonnement.*)

*Moustiques.* — (V. *Piqûres.*)

*Muguet.* — Inflammation de la bouche qui se produit surtout chez les nouveau-nés, due à des troubles digestifs graves. — *Sig.* : Plaques blanchâtres sur la langue, le voile du palais, les amygdales, le

pharynx. Appeler un médecin, en raison du mauvais état général de l'enfant dont le muguet n'est qu'une manifestation.

*TRAIT.* : Nettoyer la bouche avec de la glycérine boratée. Lavages fréquents avec de l'eau de Vichy.

*Néphrite.* — (V. *Reins.*)

*Neurasthénie.* — Maladie du système nerveux qui amène les troubles suivants :

*Troubles de la tête.* — Maux de tête se localisant dans le haut de la tête et apparaissant surtout au réveil et après les repas. Diminution la nuit.

*Troubles digestifs.* — Somnolence après les repas, constipation.

*Troubles respiratoires.* — Palpitations, oppression, troubles nerveux, manque de mémoire, insomnie, tristesse sans cause, affaiblis-

sement de la volonté. Peurs injustifiées.

TRAIT. : Repos absolu, Éviter tout surmenage intellectuel, remonter le moral du malade, vie au grand air, bains chauds (35 à 39°), hydrothérapie chaude, massage, électricité.

Médication : Piqure de cacodylate de soude, bromure, fer, arsenic.

**Névralgie.** — Douleur des nerfs.

TRAIT. : Application de compresses d'eau chaude sur l'endroit douloureux, pulvérisation de chlorure d'éthyle.

**Nez (Maladies du).** — Organe de l'odorat.

**Coryza aigu ou rhume.** — SIG. : Mal de tête frontal, fièvre, courbature générale, larmoiement, diminution ou suppression de l'odorat, écoulement cons-

tant d'abord incolore, puis après jaune verdâtre, épais

TRAIT. : Enduire l'intérieur du nez de vaseline boriquée ou mentholée, badigeonnage avec une solution de cocaïne à 1 p. 100

**Coryza chronique.** — Inflammation chronique de la muqueuse nasale.

SIG. : Respiration par la bouche, voix nasonnée, maux de tête fréquents.

TRAIT. : Lavage à l'eau boriquée ou salée.

**Saignement de nez.** — Introduire dans les narines un tampon d'ouate imbibé d'antipyrine (1 gramme d'antipyrine pour 10 grammes d'eau) ou quelques gouttes de solution d'adrénaline à 1 p. 1000.

**Odeur fétide du nez.** — Lavage avec de l'eau tiède, dans laquelle on mettra une cuillerée à café de

sel, pour un demi-litre d'eau.

*Points noirs du nez.* — Presser sur les points afin de les faire sortir, les laver avec de l'eau de Cologne et faire une pulvérisation se composant :

Borate de soude. . . . 25 gr.  
Eau simple bouillie. . . 800 gr.

**Obésité.** — Surcharge de graisse.

*Traitement énergique pour maigrir.* — Grande marche, régime lacté exclusif, hydrothérapie, massage, purgatifs.

*Régime continu.* — Marche progressive, massage, hydrothérapie. Repas légers, boire très peu, ne pas dormir plus de sept à huit heures sur vingt-quatre.

**Œil.** — (V. *Yeux.*)

**Œil-de perdrix.** — (V. *Cor*)

**Onanisme.** — Excitation artificielle des organes génitaux. Cette perversion amène des troubles très grands au point de vue intellectuel, abrutissement, manque de mémoire. Au point de vue physique, lymphatisme, nervosité, étouffements, palpitations, vertiges.

**TRAIT.** : Bains, exercices au grand air, bromure.

**Ongle.** — Partie cornée qui recouvre l'extrémité des doigts de la main et du pied.

**Ongle incarné.** — *Pénétration du bord de l'ongle dans les chairs.* — **SIG.** : Rougeur, gonflement et parfois abcès de la peau qui ourle l'ongle du gros orteil, provoqués par des chaussures trop étroites ou par la façon de se couper l'ongle (on doit toujours se couper les ongles

des pieds en carré et non en rond ou en pointu).

TRAIT. : Mettre entre l'ongle et la chair un morceau d'amadou.

**Onglée.** — Engourdissement douloureux du bout des doigts provoqué par un grand froid.

TRAIT. : Ne pas se laver les mains avec de l'eau chaude, frictions avec de l'eau glacée.

**Orchite.** — (V. *Testicules.*)

**Oreille** — Organe de l'ouïe.

**Oreille (Maladies de).**

*L'oreille est obstruée par du cérumen* (matière jaunâtre épaisse).

TRAIT. : Se nettoyer tous les jours minutieusement les oreilles avec un linge fin imbibé d'eau chaude.

Le soir en se couchant, introduction dans les oreil-

les de quelques gouttes d'eau oxygénée, puis injection d'eau tiède.

*Le conduit auditif est obstrué par un corps étranger dur.* — Verser quelques gouttes de glycérine dans l'oreille bouchée, puis faire un lavage à l'eau savonneuse.

*Le corps est un insecte.* — Injecter de l'huile phéniquée (1 gramme d'acide phénique pour 30 grammes d'huile).

*Le corps est mou.* — Injection d'eau tiède savonneuse.

*Inflammation du tympan.* — Douleur violente au fond de l'oreille, bourdonnements.

TRAIT. : Bains d'oreille avec de la décoction de pavot.

*Déchirure du tympan.*

— Surdit , douleur. h morrhagie par l'oreille.

TRAIT. : Mettre un tampon de ouate hydrophile.

**Oreillons.** — Maladie contagieuse, inflammation et gonflement des glandes salivaires, principalement de la parotide, glande voisine de l'oreille.

SIG. : Gonflement du cou tr s douloureux. Fi vre.

TRAIT. : Garder la chambre. Application de baume tranquille. Entourer le cou de ouate.

Purgatifs l gers, cachets d'antipyrine contre la douleur.

**Otite moyenne.** — Inflammation de la caisse du tympan,

*Forme b nigne.* — Douleurs, bourdonnements, surdit .

TRAIT. : Introduire dans l'oreille un tampon de glyc rine. Lavages chauds.

*Forme purulente.* — M mes signes, en plus  coulement de pus.

TRAIT. : Op ration chirurgicale si l' coulement ne se fait pas assez rapidement. puis lavages antiseptiques.

*Bourdonnements d'oreille.* — Dus   des causes multiples (an mie, chlorose, congestion c r brale, catarrhe nasal).

**Oxyures.** — (V. Vers.)

**Panaris.** — Inflammation qui si ge au bout des doigts.

SIG. : Rougeur, d mangeaisons, douleurs insupportables provoqu es par la formation du pus. Fi vre.

TRAIT. : Plonger plusieurs fois par jour le doigt malade dans des bains antiseptiques tr s chauds (45   50 ) durant une demi-heure.

Apr s ces lavages, entourer le doigt d'une com-

presse de gaze antiseptique imbibée d'eau boriquée, puis recouvrir de ouate et de taffetas gommé. Le panaris doit être ouvert le plus tôt possible, par le médecin, afin d'éviter sa propagation à tout le doigt.

**Paralysie générale.** — V. Cerveau.)

**Peau (Maladies les plus communes de la).**

**Eczémas** (maladie non contagieuse).

Il y a plusieurs eczémas :

Rougeur simplement de la peau, *eczéma érythémateux*, éruption de boutons, *eczéma papuleux*, boutons laissant suinter un liquide jaunâtre, *eczéma humide*, boutons suintant et séchant laissant ainsi une croûte jaune, *eczéma croûteux*.

Tous ces eczémas provoquent d'horribles démangeaisons.

**TRAIT. :** Pour les démangeaisons, applications de poudre de talc ou de riz et lotions tous les deux jours, et compresses d'eau boriquée.

**TRAIT. :** De l'eczéma sec, application de pommade à l'oxyde de zinc.

L'eczéma humide, application de compresses d'eau boriquée sous une toile caoutchoutée vulcanisée, laver le caoutchouc avant chaque pansement.

**TRAIT. général :** Pour les arthritiques, pas d'excitants, ni café, ni thé, ni alcool (saison aux eaux).

Pour les lymphatiques, l'arsenic, l'huile de foie de morue, le fer, sont particulièrement recommandés. Bains fréquents (saison aux eaux).

Villes thermales recommandées pour l'eczéma sec, Luchon, La Bourboule, Uriage. Royat; pour l'eczéma humide, Salies-de-Béarn, Cauterets.

**Teigne.** — (Très contagieuse). Sorte de gale plate et sèche qui se tient généralement sur le cuir chevelu, provoquée par la malpropreté et causée par la végétation de certains champignons. On distingue suivant le germe qui les produit une teigne favreuse ou favus et une teigne ton-surante.

**SIG.** : Mauvaise odeur du cuir chevelu, apparition de plaques rondes épaisses, d'abord jaunes puis, après, blanches, démangeaisons, chute des cheveux.

**TRAIT.** : Applications sur le cuir chevelu, durant deux semaines, tous les jours, de vaseline phéniquée (1 gramme p. 100). Lavages, également quotidiens, à la solution de sublimé 1 p. 1.000.

Après ce traitement faire des applications sur les parties atteintes, tous les deux jours, de teinture d'iode.

Ce traitement devra durer au moins de neuf à dix mois. Dans la teigne favreuse, le meilleur traitement consiste dans l'application de rayons X qui amènent l'épilation.

**Gale.** — (Très contagieuse). Inflammation de la peau provoquée par un animalcule, est caractérisée par une éruption de boutons purulents, et accompagnée de vives démangeaisons, surtout nocturnes. Maladie qui attaque de préférence les gens malpropres.

**TRAIT.** : Brossages avec une brosse dure écorchant l'épiderme, suivis de frictions à la pommade soufrée. Bains sulfureux.

**Pelade.** — Maladie contagieuse qui amène une chute des cheveux et des poils, provoquée par un parasite.

**SIG.** : Plaques rondes dépourvues de cheveux.

#### 44 PÉRITONITE. — PIEDS (TRANSPIRATION DES)

**TRAIT.** : Frictions à la liqueur de Van Swieten, massage des plaques. Applications de teinture d'iode.

**Péritonite.** — Inflammation du péritoine.

**TRAIT.** : Application de glace sur le ventre. Traitement suivant la cause très variable de cette affection, maladie très grave; appeler de suite un médecin.

**Pertes blanches.** — (V. *Flueurs blanches.*)

**Pertes rouges.** — (V. *Règles.*)

**Petite vérole.** — (V. *Variole.*)

**Petite vérole volante.** — (V. *Varicelle.*)

**Pharyngite.** — (V. *Angine.*)

**Phlébite.** — Inflammation des veines. Siège gé-

néralement aux membres inférieurs.

**SIG.** : Douleurs dans la jambe, gonflement et cordons durs formés par les veines enflammées. Fièvre.

**TRAIT.** : Repos absolu au lit. La jambe doit être immobilisée dans une gouttière. Applications de pommade de cocaïne contre les douleurs trop intenses.

**Phlegmon.** — Inflammation du tissu cellulaire (aisselle, cou).

**SIG** : Gonflement, rougeur, douleurs avec élancements, fièvre intense. Suppuration au bout de cinq à six jours.

**TRAIT.** : Applications en permanence de compresses bouillantes imbibées d'eau de Van Swieten, et recouvertes de taffetas et de ouate gommés.

**Pieds (Transpiration**

des). — Bains quotidiens avec de l'eau blanche, badigeonnage avec la solution de formol, 1 p. 30. Changer souvent de bas ou de chaussettes.

**Bains de pieds.** — (Différentes sortes.)

**Bains de pieds chauds.** — Employés pour faire affluer le sang aux extrémités inférieures du corps, ordonnés pour congestion de la face, maux de tête, retard dans les règles, rhume.

*Comment on doit le préparer et le prendre.* — Mettre les deux pieds dans de l'eau assez chaude puis verser progressivement de l'eau plus chaude.

Durée du bain de dix à quinze minutes tout au plus.

**Bains de pieds sinapisés.** — Employés également pour les cas précédents. Bains plus actifs et plus efficaces.

*Comment on doit le préparer et le prendre.* — Jeter dans de l'eau tiède une demi-livre de farine de moutarde pour deux litres d'eau.

**Piqûres.** — Légère blessure produite par un instrument aigu ou par certains insectes.

Piqûres par : *cousin, abeille, guêpe, araignée, chenilles, taons.*

SIG. : Peau rouge avec un petit point central gonflée, démangeaison, cuisson.

TRAIT. : Lavage à l'eau vinaigrée.

Application de quelques gouttes d'ammoniaque ou de teinture d'iode.

Ne pas se gratter surtout.

**Piqûre de scorpion.** — Arachnide venimeuse, dont le venin se communique au moyen d'un crochet dont sa queue est armée. Apparition d'un bouton

rouge qui se transforme en cloque.

**TRAIT.** : Enlever l'aiguillon de la plaie avec une pince. Injection de sérum antivenimeux du docteur Calmettes.

*Piqûre de vive.* — Poisson d'eau de mer qui vit surtout dans le sable.

**SIG.** : Douleur aiguë immédiatement après la piqûre, enflure.

**TRAIT.** : Faire saigner la piqûre.

*Piqûre de puce, punaises.* — Lavages avec de l'eau vinaigrée.

**Plaie.** — Coup, meurtrissure sur une partie du corps.

*Comment panser une plaie.* — Désinfecter d'abord les instruments et objets nécessaires à un pansement (ciseaux, pinces, brosses), en les faisant bouillir dans de l'eau durant dix minutes.

Se laver et savonner les

mains minutieusement immédiatement avant de faire le pansement.

Laver la plaie avec des tampons de ouate hydrophile imbibés d'une solution de sublimé (0 gr. 50 sublimé pour un litre d'eau bouillie) afin de retirer toutes les saletés de la plaie. Cela est de très grande importance (si la plaie contient de la terre, des graviers, la broser et la laver avec de l'eau savonneuse bouillie afin d'éviter le *tétanos*. (V. *Tétanos*.)

Le lavage terminé, appliquer un carré de toile antiseptique trempée dans une solution de sublimé, puis mettre dessus de la tarlatane et de la ouate hydrophile, et entourer le pansement de bandes Velpeau. (V. *Comment faire un bandage*, p. 83).

**Poumons (Maladies des).** — Organes de la respi-

ration renfermés dans la poitrine.

**Congestion pulmonaire.** — Congestion du poumon.

SIG. : Grande difficulté à respirer. Point de côté très douloureux. Congestion de la face. Toux. Crachats striés de sang. Fièvre.

TRAIT. : Applications de ventouses. Diète lactée.

**Pleurésie simple.** — Inflammation de la plèvre (enveloppe du poumon).

SIG. : Toux sèche, fièvre élevée (39° à 40°), respiration très difficile, point de côté au niveau du sein. Lorsqu'il y a formation de liquide, le malade se couche toujours du côté du poumon atteint.

TRAIT. : Garder le lit. Application de ventouses sèches ou scarifiées. Régime exclusivement lacté. Veiller à la constipation.

**Pleurésie purulente.** — Inflammation de la plèvre avec formation de pus.

SIG. : Signes précédents plus aigus. Prostration extrême, grande pâleur du visage. Vomissements de pus. Fièvre plus élevée le soir que le matin.

TRAIT. : Cette maladie étant très grave, un médecin seul pourra juger, suivant le cas, du traitement à appliquer.

**Pneumonie.** — Inflammation du poumon.

SIG. : Courbature, maux de tête, point de côté. Fièvre élevée (39° à 40°), frisson. Toux d'abord sèche, expectoration de crachats jaunâtres, puis roussâtres. Sécheresse de la langue. Urines foncées.

TRAIT. : Ventouses, quinine. Boissons à l'alcool, café, pour combattre le sommeil chez les vieillards. Application sur l'envelop-

pement du thorax avec des compresses froides. Régime lacté.

**Fluxion de poitrine.** — Atteinte légère de congestion pulmonaire localisée.

**SIG.** : Mêmes signes atténués que dans la pleuro-pneumonie.

**TRAIT.** : Ventouses, quinine. Boissons à l'alcool.

**Poux de tête.** — Insectes grisâtres, dont les piqûres provoquent des démangeaisons intolérables du cuir chevelu.

**TRAIT.** : Applications de pommade mercurielle sur toute la tête. Lavages à l'eau de Van Swieten.

**Poux de corps.** — Même affection causée par une autre espèce d'insecte de la même famille.

**TRAIT.** : Bains sulfureux. (Désinfection des vêtements à l'étuve)

**Poux du pubis.** — Parasite d'une espèce voisine ne se fixant qu'aux poils du pubis, de l'aisselle, de la barbe, ou même des sourcils, à l'exclusion des cheveux.

**TRAIT.** : Pommade mercurielle. Lavages à l'eau de Van Swieten.

**Puerpérale (Fièvre).** — (V. Fièvre.)

**Pyélo-néphrite.** — (V. Reins.)

**Rachitisme.** — Ramollissement et déformation des os, principalement de la colonne vertébrale (maladie de la première enfance).

**SIG.** : Débute vers un an. Troubles digestifs et intestinaux. Fièvre Douleurs dans les os, gonflements des articulations, difficulté très grande et appréhension pour l'enfant de se tenir debout, déformation

des jambes, des bras. Grossesse anormale de la tête. Aplatissement de la poitrine, ballonnement du ventre.

TRAIT. : Vie au grand air, de préférence au bord de la mer (bains salins). Frictions à l'alcool. Huile de foie de morue, phosphates, iodure.

**Rage.** — (V. *Morsure.*) — Maladie provoquée par la morsure d'un animal enragé.

*Période d'incubation.* — Très variable, de un à deux mois.

*Période de début.* — Changement de caractère, grande gaieté ou tristesse profonde. Douleur au niveau de la morsure.

*Période d'excitation.* — Le malade ne mange plus et ne boit surtout pas. l'excitation est très grande avec crise de folie. Délire. Douleurs violentes, suffocation. Salivation exagérée.

Rarement l'enragé a envie de mordre.

*Période paralytique.* — Le corps est recouvert de sueur. Le cœur faiblit et l'enragé tombe dans le coma.

TRAIT. : Immédiatement après la morsure, lavage de la plaie et traitement pastorien

**Règles.** — Afflux de sang mensuels se produisant chez les femmes (de douze à cinquante ans, en moyenne).

*Coliques à l'époque des règles.* — SIG. : Douleurs siégeant au bas du ventre, maux de cœur, vomissements.

TRAIT. : Repos au lit, applications de cataplasmes très chauds sur le ventre, prendre des infusions chaudes de tilleul, d'armoise avec un cachet d'antipyrine.

Si les douleurs sont par trop fortes, prendre un petit lavement tiède avec quinze à vingt gouttes de laudanum.

*Hémorragie ou règles trop abondantes.* — Repos absolu au lit, tête basse.

Injections à 45°.

*Retard dans les règles.* — Bains très chauds. Capsules d'apiol.

**Reins.** — Viscère double placé de chaque côté des deux premières vertèbres lombaires et qui secrète l'urine.

**Reins (Maladies des).**

*Colique néphrétique.* — Douleur extrêmement vive sur le trajet des uretères, occasionnée par l'irritation que fait une pierre (calcul) ou caillot sanglant, ou purulent, en descendant du rein à la vessie.

**Sig.** : Débute par une douleur qui part du rein, contourne la taille et descend obliquement par la vessie. Chez la femme, la douleur s'étend aux grandes lèvres. Chez l'homme, aux testicules. Le malade pendant la crise vomit et se courbe en deux.

**Trait.** : Calmants, chloral, piqûre de morphine, bains tièdes.

**Régime** : Pas d'acides, tomate, oseille, asperges, pas d'alcool, de bière, de vin. Pas de viandes faisandées. Boire de l'eau de Vittel, de Contrexéville ou d'Évian.

*Néphrite aiguë.* — Inflammation d'un ou des deux reins. Bien souvent, presque toujours, se déclarant à la suite d'une maladie (fièvre typhoïde, scarlatine, rougeole, diphtérie, grippe et dans certains cas de grossesse)

**SIG.** : Frissons, fièvre. Douleur dans la taille. Vomissements. Urine évacuée en très petite quantité, d'une couleur brunâtre.

**TRAIT.** : Repos absolu, ventouses sur les reins. Régime lacté. Boire en grande quantité de l'eau de Vittel ou de Contrexéville.

*Néphrite chronique ou mal de Bright.* — **SIG.** : Besoins douloureux et fréquents d'uriner. Bourdonnements d'oreilles. Vertiges. Enflure (œdème) du visage, des jambes et grandes lèvres (chez la femme). Troubles digestifs. Vomissements, diarrhées. Hémorragies.

**TRAIT.** : Éviter le froid. Régime lacté. Friction matin et soir dans la région lombaire, massage. Régime déchloruré. (Abstinence d'aliments salés).

*Pyélo-néphrite.* — Inflammation du bassinet et du rein

**SIG.** : Fièvre élevée intermittente. Grands frissons. Souffrance à l'état latent dans les reins. Vomissements. Besoins d'uriner fréquents avec cuisson (les urines contenant du pus).

**TRAIT.** : Repos absolu. Lavages fréquents à l'eau de pavot ou de guimauve. Régime lacté. Boire de l'eau de Vittel, d'Évian, des tisanes de queues de cerises en grande quantité. Applications de compresses bouillantes ou de cataplasmes sur les reins. Cachets d'urotropine, 50 centigrammes.

*Reins flottants.* — Sensation de déplacement d'un organe, tiraillements, troubles digestifs.

**TRAIT.** : Bandage. Opération chirurgicale.

*Rhumatisme.* — Douleur dans les articulations et dans les muscles.

**Rhumatisme articulaire aigu.** — Fièvre élevée (39° à 40°). Les articulations des chevilles, genoux, poignets, coudes, épaules, sont gonflées et horriblement douloureuses. Sueurs abondantes.

**TRAIT.** : Repos au lit. Les articulations seront entourées de ouate, sous laquelle on placera une compresse imbibée de solution saturée de salicylate de méthyle, protégée par une toile imperméable. Régime lacté.

**Rhumatisme chronique.** — **TRAIT.** : Éviter le froid. Bains sulfureux, bains de vapeur, bains de boues, de sable chaud, massage, iodure de potassium.

**Rhume.** — Enduire l'intérieur du nez de vaseline boriquée. Inhalations. Priser du menthol. Boire fréquemment des tisanes de bourrache, de mauve, de gui-

mauve. (V. Bronchite, Nez.)

**Rougeole.** — *Maladie contagieuse*, qui provoque une éruption, très fréquente chez les enfants.

*Période d'incubation*, dix à douze jours.

*Période d'invasion.* — **SIG.** : Frissons, fièvre, maux de tête, saignements de nez, les yeux et le nez coulent abondamment, perte d'appétit. Tels sont les signes pour la période d'invasion, puis viennent la toux, la fièvre élevée et l'éruption de taches rouges, réunies en demi-cercle : *période d'éruption*, puis la chute de l'épiderme, *période de desquamation*.

*Durée de la maladie* : de vingt à vingt-cinq jours.

**TRAIT.** : Tenir l'enfant au chaud. Chambre bien aérée. Séjour au lit. Lavages fréquents des yeux, de la bouche, des oreilles, à l'eau boriquée ou

l'eau oxygénée. Une cuillerée à bouche pour un verre d'eau bouillie.

Lavement quotidien ; s'il y a de la diarrhée, lavements laudanisés. Alimentation, lait et bouillon.

**Saignement de nez.** — (V. Nez.)

**Sang** (V. Hémorragie).

**Perte de sang** : : 1° Appliquer une compresse de gaze antiseptique et comprimer fortement la veine au-dessous de la coupure avec un lien ou simplement avec le pouce, en attendant l'arrivée du médecin.

2° *Par une artère.* — Faire rapidement la compression avec le doigt, au niveau du vaisseau, en attendant le médecin.

**Scarlatine.** — *Maladie contagieuse* caractérisée par des taches d'un rouge écarlate (séjour à la chambre six semaines).

**SIG. :** *Période d'incubation* dure de un à huit jours.

*Période d'invasion* dure quelques heures. Frissons fièvre. Maux de gorge, gonflement des amygdales.

*Période d'éruption* dure cinq jours. Le corps (sauf la figure) est couvert de plaques d'un rouge écarlate.

*Période de desquamation.* — La peau tombe par écailles.

**TRAIT. :** Chambre bien ventilée, gargarismes oxygénés. Lavages des muqueuses à l'eau boriquée. Éviter surtout le froid. Régime lacté absolu, puis régime déchloruré (absence de sel dans les aliments). Rechercher fréquemment l'albumine dans les urines. Combattre la constipation par des lavements huileux. Contre les démangeaisons, saupoudrez les plaques de poudre de talc. Après la maladie, frictions à la vaseline, pour éviter la dis-

persion des squames contagieuses. Bain tiède.

**Sciastique.** — Névralgie horriblement douloureuse du nerf sciatique partant de la hanche et descendant le long de la partie postérieure de la cuisse jusqu'à la cheville.

**TRAIT.** : Repos au lit, ventouses scarifiées, vésicatoires, injections de morphine. pointes de feu, pulvérisations de chlorure de méthyle. Bains de vapeur.

**Scorpion.** — (V. *Piqûres.*)

**Scrofule** ou *tuberculose atténuée de la première enfance.*

**SIG.** : Ganglions au cou se faisant jour et laissant échapper du pus.

Eczéma, bronchite chronique, rhume de cerveau persistant.

**TRAIT.** : Air salin, bains de mer, frictions, exercices au grand air, huile de foie

de morue, quinquina, fer, arsenic. Teinture d'iode de une à dix gouttes dans du lait. (V. *Tuberculose.*)

**Seins ou mamelles.** — Glandes situées en avant de la cage thoracique.

**Crevasses et gerçures aux seins.** — (V. *Crevasses.*)

**Abcès aux seins.** — Compresses d'eau bouillante. Ouverture de l'abcès d'un coup de bistouri.

Hygiène des seins, ablutions et lavage tous les jours à l'eau froide et à l'alcool (eau de Cologne):

**Selles.** — (V. *Intestins.*)

**Sevrage.** — Suppression définitive de l'allaitement naturel.

Le sevrage doit se faire graduellement du onzième au seizième mois.

Pour sevrer, il faut espacer les tétés et les remplacer par du lait stérilisé

ou pasteurisé, des petites bouillies de farines d'orge, de froment ou de riz.

Pour déshabituer l'enfant de téter, appliquer sur les seins une substance amère à base de quinquina.

La mère se purgera lorsqu'elle aura fini de nourrir. Application sur les seins d'un pansement serré compressif d'ouate

**Sueurs nocturnes.** — Lotions avec solution de chloral au trentième sur tout le corps, puis poudrer avec mélange de :

Talc de Venise. 100 gr.  
Tannin. . . . . 5 gr.  
Essence de thym. 10 gouttes.

(NICOLAÏ.)

Prendre à l'intérieur pilules d'agaric blanc de 0,15 centigr., 2 à 3 pilules le soir avant de se coucher.

**Sueurs des pieds.** — (V. Pieds.) Badigeonner

avec solution d'acide chromique à 10 p. 100 ou même de bichromate de potasse à la même dose, de préférence de solution de formol à 1 p. 20.

**Syncope.** — Perte de connaissance.

TRAIT. : Aérer immédiatement l'endroit où se trouve le malade, l'étendre et desserrer ses vêtements. Aspersions d'eau froide au visage, flagellation du corps, inhalations de sel d'ammoniaque.

Faire boire par cuillerées à café du rhum ou de la chartreuse.

**Syphilis ou avarie,** maladie très contagieuse provoquée par un microbe, le tréponème pâle.

SIG. : Accident primitif : Le chancre.

Gros bouton rouge, dur. 2 ou 3 semaines après le contact virulent, apparaît le

chancre, qui s'accompagne de tuméfaction, gonflement des ganglions correspondant dans l'aîne si le chancre se trouve dans les régions génitales, au cou, à l'angle de la mâchoire, survient aux lèvres ou dans la bouche. Le chancre guérit spontanément au bout d'un laps de temps variant de quelques jours à 1 mois. Il passe même parfois inaperçu, tant sa durée est éphémère.

*Deuxième période.* — Accidents secondaires. Maux de tête très violents, surtout la nuit. Apparition sur le corps (excepté à la figure et au cou), de taches rosées formant une éruption appelée *roséole*. Puis se montrent des plaques légèrement ulcérées sur les muqueuses de la bouche, des régions génitales (gland chez l'homme, grandes et petites lèvres chez la femme) et sur la muqueuse de

l'anūs. Parfois, chute partielle, en touffe, des cheveux.

*Troisième période.* — Accidents tertiaires, représentés, pour la plupart, par des tumeurs dures, puis ramollies, laissant échapper un liquide analogue à de la gomme, d'où leur nom. Nombreux accidents, surtout d'origine nerveuse : perte de la vision, ataxie locomotrice, inflammation des méninges et du cerveau provoquant des paralysies ou des tremblements des lèvres, de la langue et des membres.

TRAIT. : Pas d'excès. Éviter les veilles, les fatigues. Pas d'alcool. Pas de tabac.

Frictions, 2 à 4 grammes d'onguent mercuriel pendant quinze jours, puis repos de quinze jours, puis reprise des frictions ainsi de suite durant dix mois ; hygiène de la bouche, hy-

giène générale, séjour à la campagne ou au bord de la mer.

Au bout des dix mois, frictions mercurielles pendant dix jours seulement tous les mois, cela jusqu'à la fin de la deuxième année. Sudorifiques, quelques purgatifs.

Pendant la deuxième année, tous les trois mois durant dix jours, revenir aux frictions mercurielles suivies pendant vingt jours de l'administration de iode de potassium.

A partir de la troisième et quatrième année, répéter le traitement mixte deux fois seulement dans l'année. Éviter tout rapport sexuel. Hydrothérapie, massage, bains tièdes.

*Médicaments pour la première période.* — Faire des injections avec la solution concentrée de chlorate de potasse entre le prépuce et le gland.

*Traitement mixte:* Iodure de potassium aux repas, à des doses variant de 1 à 10 et même 12 gr. par jour.

*Traitement mercuriel* par frictions ou même par injections intra-musculaires d'huile grise ou de calomel ou encore de sels mercuriels solubles.

*Deuxième période.* — Frictions de 2 à 4 grammes d'onguent mercuriel.

*Troisième période.* — Frictions d'onguent mercuriel. Reconstituant, fer, quinquina, arsenic, eau sulfureuse qui favorisent la diffusion du mercure (Uriage).

**Teigne.** — (V. *Maladies de peau.*)

**Ténia.** — Nom scientifique du ver solitaire.

**Sig. :** Grand appétit, maigreur extrême, vertiges, vomissements, troubles intestinaux, constipation, diarrhée

**TRAIT.** : Ténifuge variable suivant l'espèce de ténia auquel on a affaire; le parasite provenant de la viande du porc (ténia solium) étant plus tenace que le ténia du bœuf (ténia inermis). Diète la veille, ténifuge se composant de :

*Chloroforme* . . . . . 4 gr.  
*En recette, sirop de sucre* 35 gr.  
 (FORT.)

A prendre en trois fois: la première à 7 heures du matin, la deuxième à 9 heures, et la troisième à 11 heures. A midi, avaler 35 grammes d'huile de ricin. On peut donner aussi, soit de l'extract étheré de fougère mâle, soit, dans le cas de ténia solium, du pelliérine, extrait de racine de grenadier, médicament très actif mais à surveiller. Ces médicaments doivent toujours être suivis d'un purgatif.

Expulsion du ténia une heure et demie environ après le purgatif.

**Testicules.** — Glandes génitales enfermées dans une enveloppe fibro-cutanée appelée scrotum ou bourses.

**Testicules (Maladies des).**

**Orchites.** -- Gonflement, augmentation considérable de volume des testicules.

**SIG.** : Douleurs et rougeurs des testicules, fièvre élevée.

**TRAIT.** : Repos absolu au lit, grands bains chauds, cataplasmes. Purgatif salin.

**Orchite chronique.** — **SIG.** précédents, les testicules restent gonflés mais sans douleur.

**TRAIT.** : Variable selon la cause; en cas de syphilis, iodure de potassium et frictions mercurielles; en cas de tuberculose, repos à la campagne, suralimentation.

**TRAIT. GÉNÉRAL:** Huile de foie de morue, arsenic, etc

**Tétanos.** — Maladie infectieuse, due à un microbe se développant sur les plaies irrégulières anfractueuses, et dont les poisons déterminent des contractures d'abord des muscles de la mâchoire et de la nuque, puis s'étendant à tout le reste du corps.

**Sig.** du début: Difficulté à mâcher, raideur de la nuque.

**Période d'état:** Impossibilité de desserrer les mâchoires du tétanique. Les jambes et les cuisses sont raides. Les contractions d'abord intermittentes augmentent peu à peu et deviennent de plus en plus rapprochées. Souffrances horribles. Température atteint 41°, 42° et 43°.

**TRAIT. préventif:** On éviterait le tétanos, si les plaies étaient toujours nettoyées bien proprement.

**TRAIT. curatif:** Injection de sérum antitétanique.

Débrider les plaies, les laver au sublimé et les panser à la ouate à l'iodeforme. Chloral à haute dose. Calme absolu, isolément. Placer le malade dans une gouttière ouatée.

**Tête (Mal de).** — Demimigraine. (V. Migraine.)

**Torticolis.** — Douleur rhumatismale qui a son siège dans les muscles du cou.

**TRAIT. :** Chaleur. Contre les douleurs cachets de pyramidon, 0 gr. 30, trois par jour.

**Tuberculose osseuse.** — (V. Coxalgie, Rachitisme, Scrofule.)

**Tuberculose pulmonaire.** — Maladie contagieuse due au microbe de Koch.

**Période du début.** — **Sig. :** Diminution de l'appétit,

amaigrissement, fatigue fréquente, oppression en marchant, en dansant; la toux, sèche d'abord, devient grasse. Les crachats sont blancs et quelquefois teints de sang. Fièvre à l'état latent. Chez les femmes, les règles deviennent irrégulières, et parfois moins abondantes, le sang en est pâle, une hémorragie alors se produit du côté du poumon. Le malade éprouve un besoin de cracher, un vomissement de sang survient.

*Deuxième période, dite de ramollissement.* — L'oppression augmente, les quintes de toux deviennent de plus en plus proches, les crachats expectorés sont jaunâtres et épais. Grand amaigrissement.

*Troisième période, dite des cavernes.* — Fièvre extrême, étouffements, crachements considérables. Amaigrissement affaiblissement, vo-

missements de sang causés par la rupture d'un vaisseau artériel dans une caverne.

TRAIT. : Pointes de feu, vésicatoires sur la poitrine.

Galacol, de 50 centigr. à 1 gr. en pilule, vin, injections hypodermiques, en frictions.

1 à 2 gr. par jour, eucalyptol, térébenthine.

Nourriture très fortifiante, viande crue, surtout du cheval, bœuf, lait, beurre, poissons, bière. Cure d'air, sanatorium dans le midi.

*Contre la fièvre.* — Bromhydrate de quinine, antipyrine.

*Contre les crachements de sang.* — Faire avaler des petits morceaux de glace.

**Typhoïde (Fièvre).** — Appelée aussi typhus abdominal, maladie infectieuse, contagieuse, épidémique, caractérisée par la pré-

sence d'abcès dans l'intestin grêle. Cette affection est due à la culture dans l'intestin d'un microbe particulier spécifique, le bacille d'Eberth. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de désinfecter les selles et les vomissements des malades qui en sont frappés.

*Première période d'incubation.* — Durée de 2 à 15 jours suivant les épidémies. Le malade se plaint de lassitude, de courbature générale, pas d'appétit, parfois des saignements de nez. Puis survient la *deuxième période d'ascension*, qui dure de 4 à 6 jours. La fièvre s'allume et s'élève progressivement de jour en jour, jusqu'à atteindre 40° le soir. La maladie débute parfois brusquement par des frissons. Bronchite et congestion pulmonaire. Embarras gastrique. Tendance aux vomissements. Douleurs de ventre. Cons-

tipation ou quelquefois diarrhée. Maux de tête très violents. Insomnie ou somnolences troublées par des cauchemars.

*Troisième période d'état.* — 15 jours, pendant lesquels la fièvre demeure très élevée. Le début de cette période est signalée habituellement par l'éruption de quelques petites taches rosées sur l'abdomen, les flancs et la poitrine. Insomnie persistante, souvent compliquée de délire. état d'abattement profond, de prostration. La bouche est sèche, la langue comme rotie, fendillée, recouverte d'un enduit grisâtre desséchée, vomissements fréquents. Urines rares, albuminurie. Diarrhée abondante, jaune, fétide. Congestion pulmonaire avec toux, oppression. Pouls très rapide, faible.

Parfois la mort survient, soit subitement par arrêt

du cœur, soit en quelques heures par suite d'hémorragie intestinale ou par perforation de l'intestin, donnant naissance à une péritonite aiguë.

*Période de déclin.* — Dure 2 semaines environ. La fièvre diminue peu à peu de jour en jour. Le sommeil revient. La langue se dépouille. Le pouls redevient plus fort et le malade entre en convalescence. Cette convalescence est particulièrement longue et l'alimentation doit être surveillée, car les rechutes sont très fréquentes et très graves. Le malade ne se remet que très lentement. On voit parfois se produire la chute des cheveux.

**TRAIT.** : Chlorhydrate neutre de quinine, 1 gr. par jour (à prendre par cachets de 0 gr. 25).

Pyramidon, même dose. Purgatifs salins au début seulement.

Si la fièvre est très élevée, bains tièdes à 30° ou froids (18° à 24°), 2 à 6 bains par jour de 10 minutes suivant le degré de la fièvre.

Régime lacté absolu, 1 à 2 litres de lait par jour. Le régime alimentaire a une importance considérable dans le traitement de cette maladie, les déchets alimentaires pouvant déterminer, par irritation, une perforation intestinale et presque fatalement mortelle.

Désinfecter avec soin les matières vomies et les selles en les recueillant dans un vase à demi plein d'un mélange de :

<i>Crésyl ou huile lourde</i>	
<i>de houille.</i>	1 partie
<i>Eau.</i>	3 —

Les personnes de l'entourage du typhique devront changer de vêtements et se laver soigneusement

le visage et les mains avant chaque repas.

**Ulcère.** — Plaie rongeante, suppurante et n'ayant pas de tendance à la cicatrisation.

**Ulcère variqueux.** — Siégeant à la jambe. A la suite d'une blessure ou d'une écorchure, une varice s'enflamme, la peau devient dure puis s'ouvre et l'ulcération s'établit.

**TRAIT.** : Repos au lit indispensable. Compresses d'eau bouillante (1 gramme de permanganate pour 500 grammes d'eau). Cautérisation des bourgeons soit au nitrate d'argent ou au thermo-cautère.

Pommade Paul Reclus pour l'ulcère variqueux:

Vaseline. . . . .	40 gr.
Acide borique. . . . .	5 gr.
Antipyrine. . . . .	3 gr.

Appliquer cette pommade

matin et soir, puis appliquer dessus une couche de ouate hydrophile maintenue par des bandes.

**Urine.** — Liquide jaune composé d'eau et de déchets éliminés par le rein. L'urine s'accumule dans la partie des reins appelée bassinnet et s'écoule par l'uretère dans la vessie, d'où elle est expulsée à l'extérieur par le canal de l'urètre.

**Troubles urinaires.**

**Rétention d'urine complète.** — Impossibilité d'uriner.

**SIG.** : Envies fréquentes d'uriner sans pouvoir y arriver. Douleurs atroces dans le bas-ventre s'étendant à la région des reins et aux parties génitales.

**Rétention incomplète.** — Les besoins d'uriner sont fréquents surtout la nuit. L'urine est expulsée en très

petite quantité et avec une grande difficulté.

**TRAIT.** : Cataplasmes très chauds sur le ventre, lavements chauds avec 10 à 15 gouttes de laudanum. Grands bains, sondage fait par le médecin.

**Incontinence d'urine** — Écoulement involontaire de l'urine fréquente chez les enfants nerveux et la femme durant la grossesse.

**TRAIT.** : Douches.

Durant la grossesse, porter une ceinture abdominale pour empêcher la matrice de comprimer la vessie.

**Urticaire**. — Éruption cutanée (non contagieuse), semblable à celle que produit le contact de l'ortie.

**SIG.** : Fièvre, frissons, mal de tête, démangeaisons et apparition de petites ampoules blanches.

**TRAIT.** : Purgatifs. Au

repas, boisson d'eau alcaline (Eau de Vals.)

**RÉGIME** : Exclure du régime les aliments excitants, poissons, huîtres, fruits (fraises), café, thé, alcool.

**Urticaire chronique**.

— Arséniate de soude, 1 centigramme par jour. (L. Labbé.)

**Vaccine**. — Inoculation du vaccin pour préserver de la petite vérole.

**Varicelle**. — Maladie contagieuse ressemblant à la variole, mais beaucoup plus bénigne, c'est la moins grave de toutes les fièvres éruptives.

**SIG.** : Fièvre. Éruption sur tout le corps de petites tâches rosées, qui se transforment le lendemain en petits boutons pleins d'un liquide clair, et se dessèchent vers le troisième jour en laissant alors une croûte

brun foncé, se détachant vers le huitième jour.

TRAIT. : Garder le lit. Poudre d'amidon sur l'éruption. Bain tiède alcalin vers le sixième jour.

**Varices.** — Tumeur produite par la dilatation des parois d'une veine, taches bleutées, violacées sur la jambe ou à la cuisse, au pied. Les varices des veines de l'anus portent le nom d'hémorroïdes.

SIG. : Veines gonflées, lourdeur, pesanteur dans le mollet, marche pénible, douleurs lorsque les jambes restent un certain temps debout.

TRAIT. : Bas à varices, massages légers.

**Variole.** — Maladie contagieuse, épidémique, évitée par la vaccination.

SIG. : *Première période.* — Fièvre, vomissements, maux de tête.

*Deuxième période d'éruption.* — Apparition, sur tout le corps et sur la figure, de taches rouges, qui deviennent des boutons purulents.

*Troisième période, dessiccation.* — Les croûtes formées par le pus se détachent peu à peu, en laissant des cicatrices gaufrées indélébiles.

TRAIT. : Isolement rigoureux du malade. Bains tièdes antiseptiques. Tenir le malade au chaud. Tendre la pièce de rouge, les rideaux également doivent être rouges. Cette couleur aurait pour action d'empêcher ou d'atténuer la suppuration des boutons.

**Veines.** — (V. *Hémorragie, Varices.*)

**Vénéériennes (Maladies).** — (V. *Blennorragie Syphilis.*)

**Ver.** — *Oxyures ermicu-*

*lares*, petits vers blancs (particuliers à l'enfance), ressemblant à des petits bouts de fil, que l'on trouve autour de l'anus

SIG. : Démangeaisons à l'anus, surtout le soir.

TRAIT. : Lavements d'eau tiède salée (30 grammes de gros sel pour 250 grammes d'eau).

Lavages matin et soir avec de l'eau de Van Swieten.

*Ascaris lombricoïdes*. — Vers rouges, ressemblant à des vers de terre, vivant dans l'intestin grêle. Ces vers doivent être rejetés soit dans les selles ou par la bouche, dans des efforts de vomissements.

TRAIT. : *Pilules composées de :*

*Santonine* . . . . 1 centigr.  
*Valomel* . . . . 10 centigr.

A prendre 2 à 5 pilules à jeun pour les enfants et de 5 à 10 pour les adultes.

**Ver solitaire.** — (V. *Ténia*.)

**Vérole (Petite).** — (V. *Variole*.)

**Verrues.** — Petite excroissance de chair qui vient surtout au visage et aux mains.

TRAIT. : Déposer une goutte d'acide azotique sur la verrue.

Pour éviter que ce caustique bave sur la peau, entourer chaque verrue de vaseline.

**Vertiges.** — Étourdissement.

TRAIT. préventif. : — Purgatif.

**Vésicatoire.** — (V. p. 76.)

**Vessie.** — Sac musculo-membraneux dans lequel vient s'accumuler l'urine.

**Vessie (maladies de la)**

**Calculs ou pierres.** — Concrétion de sels insolubles dans la vessie.

**SIG.** : Besoins d'uriner fréquents et douloureux, les urines contiennent du sable et des graviers. Pissements de sang, surtout après fatigue en voiture ou en chemin de fer.

**TRAIT.** : Saison à Contrexéville ou à Vichy. Opération chirurgicale.

**Cystite aiguë.** — Envies fréquentes d'uriner et d'aller à la selle. Élimination en très petite quantité d'urine. Douleur dans le bas-ventre. Vomissements.

**TRAIT.** : Grands bains chauds. Cataplasmes très chauds sur le bas du ventre. Lavements laudanisés, 10 à 15 gouttes de laudanum.

Boire en grande quantité du lait et des tisanes de queues de cerises. Térébenthine en capsules, cachets d'urotropine de 50 centigr., 3 à 4 par jour.

**RÉGIME** : Pas d'alcool, de

café, de thé, pas de mets épicés.

**Cystite chronique.** —

**SIG.** : précédents moins violents.

**TRAIT.** : Éviter les refroidissements, bains fréquents, térébenthine en capsules. Suivre le même régime que dans la cystite aiguë.

**Vipère.** — (V. *Morsure.*)

**Vomir.** — Rejet avec effort par la bouche du contenu de l'estomac.

**Vomissements durant la grossesse.** — Injections sous-cutanées de cocaïne (Fraipont).

Eau chloroformée, une cuillerée à bouche.

**Yeux.** — Organes de la vue

**Yeux (Maladies des).**

**Compère lorient.** — Bou-

ton douloureux qui siège au bord de la paupière. D'abord rouge, il blanchit environ au bout de 5 jours.

**TRAIT.** abortif : Attouchements légers avec de la teinture d'iode. Application de compresses bouillantes d'eau boriquée.

**TRAIT.** curatif — **Ouverture** au bistouri puis pansements humides.

**Blépharite simple.** — **Sig. :** Le bord des paupières est rouge. Les cils sont collés et s'arrachent facilement.

**TRAIT. :** Lavages très chauds à l'eau boriquée ou avec des infusions de thé. Cataplasmes émollients. Éviter la grande lumière et les poussières. Porter des verres fumés.

**Blépharite ulcéreuse contagieuse.** — Les yeux sont à moitié ouverts, ne pouvant supporter la lu-

mière. Le bord des paupières est gonflé, les cils sont collés et raides, ayant à leur racine des croûtes de pus. Ces croûtes en tombant entraînent la chute des cils et le bord ciliaire apparaît alors saignant.

**TRAIT. :** Cette maladie est due à un microbe ; pour éviter la contagion, brûler tout ce qui a touché les yeux et bien se laver les mains après chaque pansement. Le malade devra éviter les poussières, la lumière du soir, et porter des verres fumés. Retourner les paupières et les badigeonner avec du nitrate d'argent.

Nitrate d'argent .	0 gr. 50
Eau distillée	50 gr. »

Lavages antiseptiques, séjour à la campagne.

**Chute des cils.** — Pomme contre la chute des cils du docteur A. Trousseau.

Vaseline . . . . . 5 gr.  
 Huile de ricin . . . . . 2 gr.  
 Acide gallique . . . . . 50 centgr.  
 Ess. de lavande. . . . . 4 gouttes

**Poussières ou corps étrangers dans l'œil. —**

TRAIT.: Soulever la paupière, souffler et enlever avec un linge fin. Ne pas frotter l'œil. Lavage à l'eau fraîche.

**Conjunctive. —** Membrane muqueuse qui tapisse intérieurement le globe de l'œil.

**Conjunctivite simple** (contagieuse). — Inflammation de la conjunctive.

SIG.: Sensation d'un corps étranger dans l'œil, démangeaisons. Le bord des paupières est rouge et humide.

TRAIT.: Lavages et compresses antiseptiques très chauds. Collyre au sulfate de zinc.

**Conjunctivite purulente** (contagieuse), très fréquente chez les nouveau-nés, provoquée par la leucorrhée ou pertes blanches de la mère. Cette maladie est aussi très répandue dans les pays chauds, elle y est transmise par les mouches.

SIG.: Les bords des paupières sont rouges, il s'en écoule une sécrétion abondante qui, d'abord claire, se trouble et devient du pus. Les paupières sont gonflées, mi-closes et cuisent horriblement.

TRAIT.: Soulever les paupières pour laisser écouler le pus, puis les laver avec de l'eau van Swieten et les couvrir de compresses chaudes d'eau boriquée. Toutes les 12 heures, cauterisation de l'œil et des paupières au nitrate d'argent 1/50 qu'on fait ensuite plus faible. Neutraliser l'effet du nitrate d'argent

par des badigeonnages d'eau salée.

*Se laver surtout très minutieusement les mains après chaque pansement.*

S'il n'y a qu'un œil atteint, préserver l'autre en appliquant sur l'œil qui suppure un bandeau. Contre les granulations de la conjonctive, maladie surtout répandue en Orient, cautérisation avec un crayon de sulfate de cuivre (vitriol bleu).


**Zona.** — Maladie de la peau qui affecte une des

moitiés du corps (Durée, 18 à 20 jours).

**SIG. :** Éruption de petites vésicules entourées d'un cercle rougeâtre. Ces cloques, au bout de quelques jours, se rompent et laissent écouler un liquide qui forme une croûte. Cette croûte elle-même, au bout de quelques jours, tombe et à sa place apparaît alors une tache brunâtre. Fièvre. Douleurs névralgiques.

**TRAIT. :** Purgatifs. Lavages à l'eau boriquée très froide. Injections de morphine.

## CE QU'IL FAUT SAVOIR FAIRE



### Comment préparer des bains.

**Bain d'amidon.** — Pour un enfant, délayez 500 grammes d'amidon dans un litre d'eau et verser dans la baignoire.

Pour un adulte, délayez 2 kilogrammes d'amidon et procédez de la même façon précédente

**Bain de mercure.** — Mélangez 10 grammes de sublimé avec 20 grammes de chlorhydrate d'ammoniaque. Versez ce mélange dans l'eau du bain (la baignoire devra être émaillée).

**Bain de moutarde.** — Mettre 1 kilogramme de farine de moutarde dans un sac de toile. — Le mettre dans le bain et, lorsque la farine sera bien mouillée, presser le sac à plusieurs reprises afin d'en exprimer le contenu.

**Bain de son (1 kilogr. de son).** — Se prépare de la même façon que le bain précédent.

**Bain sulfureux.** — Mettre dans le bain un flacon de sulfureux Pouillet, couvrir la baignoire d'un drap, pour éviter que les vapeurs détériorent tout ce qui se trouve dans la pièce.

### Manière de faire des cataplasmes.

Délayez dans de l'eau bouillante farines ou poudres, laissez cuire un moment, afin d'avoir une pâte épaisse. Puis étalez rapidement, sur une tarlatane pliée en deux, le cataplasme et repliez l'autre partie de l'étoffe. Mettre le tout sur une serviette pliée en quatre.

**Cataplasme émollient ordinaire.** — Mettre 50 grammes de sel dans un demi-litre d'eau, faire bouillir et délayer après la farine de lin ou fécule de pomme de terre, chaleur 30 à 35°.

**Cataplasme antiseptique.** — Employer, au lieu de l'eau simple, de l'eau boriquée.

**Cataplasme de farine de moutarde.** — Après avoir fait le cataplasme, saupoudrer de farine de moutarde la partie du cataplasme qui sera appliquée sur le malade.

### Purgations.

**Les purgatifs les plus employés et les plus efficaces.** — Huile de ricin, rhubarbe, grains de Vals, magnésie anglaise, limonade purgative, eau-de-vie allemande, calomel, les

eaux minérales de Rubinat, Sedlitz, Carabnat, Montmirail, Hunyadi Janos.

Les doses purgatives. Comment les  
prendre.

**Huile de ricin.** — Se prend liquide ou en capsules. Enfants de 2 mois à 1 an, 1 cuiller à dessert ; de 1 à 5 ans, 1 cuiller à bouche. Adultes, 30 à 40 grammes ou 4 à 6 capsules.

Exprimez dans un verre le jus d'une orange. Versez la moitié de ce jus dans un autre verre, et dessus, versez l'huile de ricin, puis sur l'huile versez ce qui vous reste du jus de l'orange, de cette façon l'huile sera entre deux jus. Boire rapidement, le goût de l'huile sera ainsi complètement neutralisé par le jus de l'orange.

**Rhubarbe.** — En poudre, 4 grammes ; en pilules, 1 gr. 50 (2 par jour).

**Grains de Vals.** — Laxatif, 1 grain ; purgatif, 2 à 4. Ils peuvent être pris avant chaque repas ou le soir en se couchant.

**Magnésie.** — Laxatif, 1 à 2 cuillères à café le matin à jeun ; purgatif, 3 à 4 cuillères à bouche le matin à jeun, à prendre par quart d'heure.

Faire dissoudre chaque cuillère dans un demi-verre d'eau, en remuant pour que la solution devienne limpide.

**Limonade purgative.** — Le matin à jeun, prendre 3 ou 4 verres à bordeaux avec un quart d'heure d'intervalle.

**Eau-de-vie allemande.** — (Purgation très violente), 20 grammes, à prendre en deux fois le matin à jeun.

**Calomel.** — 0 gr. 15 calomel, 0 gr. 15 bicarbonate de soude.

Prendre 3 paquets.

1 paquet toutes les heures dans du lait coupé d'eau de Vichy.

(Ne pas manger, le jour où on a pris cette purgation, d'aliments salés.)

Eaux minérales purgatives, 2 grands verres avec une demi-heure d'intervalle.

#### Alimentation (un jour de purgation).

Des tasses de thé ou de bouillon aux herbes (poireaux, cerfeuil, oseille) devront être bues assez fréquemment durant que la purgation fera effet. On ne doit commencer à manger que lorsque la purgation aura agi suffisamment.

L'alimentation aux repas doit être excessivement légère.

### Comment poser une sangsue.

Laver l'endroit de la peau où sera mise la sangsue avec du vin sucré. Mettre la sangsue dans un petit verre à liqueur et l'appliquer directement sur la peau. Retirer le verre peu à peu lorsque l'on s'apercevra que la sangsue commence à mordre. Ne plus la toucher après. la laisser tomber d'elle-même (la succion dure 1 ou 2 heures).

Pour arrêter l'écoulement de sang, on appliquera sur la place un morceau d'amadou.

Une sangsue peut resservir pour une autre succion, mais pour cela il faut la faire dégorger.

### Comment faire dégorger une sangsue.

Après la succion, mettre la sangsue dans un verre rempli d'eau à deux tiers, ayant bien soin de fermer l'ouverture du verre par un couvercle

### Comment placer des ventouses.

(Verres à ventouses en vente chez tous les pharmaciens.)

**Ventouses sèches.** — Introduire rapidement dans le verre à ventouse un morceau d'ouate hydrophile enflammé et l'appliquer immédiatement sur la peau. La flamme s'éteint de suite dès que la ventouse est mise sur la chair, et l'on aperçoit alors dans le verre un boursoufflement violet de la peau. Les ventouses doivent rester en moyenne de 10 à 15 minutes.

**Ventouses scarifiées.** — Même manière de procéder que dans les ventouses sèches. Une fois le verre retiré, faire des incisions avec le scarificateur sur chaque ventouse, puis remettre le verre à ventouse. Pour arrêter l'écoulement du sang, appliquez des carrés d'ama-dou.

### Comment poser un vésicatoire.

Tout d'abord poser un vésicatoire promptement et dans une pièce chauffée afin d'éviter un refroidissement.

Pour poser un vésicatoire, il faut :

1° Laver l'endroit de peau où sera appliqué l'emplâtre ;

2° L'appliquer en le maintenant durant quelques secondes avec la main afin qu'il adhère ;

3° Le recouvrir d'une couche de ouate hydrophile ;

4° Maintenir le tout avec une serviette ;

5° Laisser le vésicatoire de 4 à 8 heures tout au plus ;

6° Retirer délicatement et appliquer de suite sur la cloque qui s'est formée un cataplasme chaud de fécule de pomme de terre, qui devra rester 1 heure :

7° Laver avec de l'eau boriquée chaude ;

8° Avec une aiguille passée à la flamme, il faut percer la cloque dans sa partie la plus inférieure ;

9° Laisser le liquide s'écouler dans un morceau de ouate ;

10° Appliquer sur la cloque vidée un papier spécial que vous enduirez de vaseline ;

11° Mettre sur le papier une couche de ouate hydrophile.

**Comment donner ou prendre**  
**une injection.**

Le bock (ou récipient où est contenue l'eau) doit être flambé, la canule et le caoutchouc bouillis.

Le bock devra être placé à une hauteur de 50 centimètres du lit, faire d'abord couler un peu du liquide, puis introduire la canule doucement sur les deux tiers de sa longueur.

Donner ou prendre l'injection très lentement. Retirer doucement la canule avant l'écoulement complet de l'injection.

**Injection après couches.** — Eau bouillie, 2 litres, chaleur à 40°.

Une injection devra être prise matin et soir. Surtout que les injections soient prises d'une façon très antiseptique.

Il est préférable, si l'on ne veut pas s'astreindre à flamber le bock et à faire bouillir le caoutchouc et la canule, à faire bouillir l'eau, de ne pas prendre d'injection, car sans quoi l'infection serait à craindre.

**Injection pour arrêter les hémorragies.**  
— Eau bouillie, chaleur à 45°. A prendre couchée.  
Bock placé à une hauteur de 1 mètre du lit.

**Injection contre les flueurs blanches.**—

Eau de feuilles de noyer, chaleur à 45°.

**Injection de propreté.** — Tous les jours  
2 litres d'eau bouillie, chaleur 35°.

A prendre couchée et lentement.

**Injection au permanganate de potasse.**

— Cachet de 0 gr. 25 pour 2 litres d'eau bouillie ou, en liquide, 1 cuillerée à bouche également pour 2 litres. Prendre les injections dans un bock en faïence, l'acide atteignant l'émail.

Bien faire attention, en mettant en retirant la canule, au linge (chemise, drap), qui pourrait être taché. Ces taches ne peuvent être enlevées.

**Comment prendre un lavage d'intestin.**

1° Prendre une canule molle rectale (longueur de 25 à 30 cm.);

2° L'adapter au caoutchouc d'un bock;

3° Remplir le bock de 2 litres d'eau bouillie;

4° Mettre le bock à une hauteur de 40 centimètres tout au plus au-dessus du plan du lit;

5° L'eau devra avoir une température de 40 à 44°;

6° Prendre le lavage couché.

Après avoir enduit la canule de vaseline, l'introduire doucement et peu à peu. Une fois la canule introduite, on ouvrira le robinet. Si l'eau ne coulait pas, retirer légèrement la canule de 1 à 2 centimètres afin d'éviter l'obstacle s'opposant à l'écoulement.

**Quantité de lavages.** — Ne pas dépasser surtout 2 par semaine.

### Comment faire un lavage d'estomac

Ne peut être fait que sur l'avis d'un médecin.

Ordonné dans les empoisonnements et pour la dilatation d'estomac.

Prendre un appareil spécial se composant d'un récipient en verre où est adapté un tube de caoutchouc de 1 m. 50 de long et de 8 à 10 millimètres de diamètre.

Une marque, à une longueur environ de 40 centimètres sur le tube, indique jusqu'à quelle longueur il devra être avalé.

Introduire dans la bouche le tube, après l'avoir enduit d'huile.

Le pousser peu à peu pour faciliter le glissement.

Lorsqu'il aura été avalé jusqu'à la marque,

verser dans le récipient (eau bouillie, eau Vichy); lorsque le liquide a presque fini de couler, retourner le récipient.

Ce qui sera contenu dans l'estomac se videra alors.

### Lavements.

**Lavements médicamenteux.** — Huile, glycérine, laudanum, sel, nutritifs.

**A l'huile.** — (500 gr. d'huile). A prendre avec un bock. Lavement ordonné pour la grande constipation et pour les coliques hépatiques.

**Au laudanum.** — (10 à 15 gouttes pour un verre d'eau tiède). A prendre avec une poire à lavement.

Lavement ordonné pour calmer les douleurs violentes (coliques néphrétiques, maux de ventre).

**Au sel.** — (1 cuillère de gros sel pour un verre d'eau). A prendre avec une poire.

Lavement ordonné contre les vers intestinaux.

**Lavements nutritifs.** — Bouillon de viande 125 grammes ; jaune d'œuf, 1.

### Différentes sortes de lavements.

Le grand lavement est de 1 litre.

Le lavement entier est de 1/2 litre.

Le demi-lavement est de 1/4 de litre.

Le petit lavement est de 1/8 de litre.

*Le lavement se prend tiède, très chaud et froid.*

Le lavement tiède (35°) est ordonné pour la constipation.

Le lavement très chaud (45° à 55°) est ordonné pour les douleurs violentes occasionnées par les maladies (vessie, utérus, ovaires) et dans les hémorragies de l'intestin.

### Comment prendre un lavement.

Enduire la canule de vaseline. Incliner le corps légèrement sur le côté et l'introduire doucement dans le rectum.

### Combien de temps doit-on garder un lavement.

Pour un lavement simple, court, la durée est de 10 minutes environ. Pour les lavements médicamenteux prolongés, la durée est de un quart d'heure à une demi-heure.

Lavements qui doivent être conservés (laudanum et autres calmants).

### Comment faire les bandages.

Les bandages ont pour but de maintenir un pansement sur une plaie, ou d'exercer une compression sur un membre.

Les meilleures bandes à employer sont les bandes élastiques, qui se moulent sur la région et épousent les contours des membres.

Sur chaque bandage, on place de la ouate ou du coton pour mieux répartir sa pression.

Afin que le bandage tienne bien, il est bon de fixer, par un double tour, l'extrémité de la bande.

Si l'on a affaire à une région conique (avant-bras, jambe, cuisse), il est de règle de commencer par la partie inférieure : fixer la bande à la partie déclive, puis, remontant par un ou deux tours en hélice, recouvrir ensuite en redescendant par des tours bien rapprochés, chevauchant sur un tiers de la largeur de la bande, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à recouvrir le premier tour de bande ; on fixe alors avec une épingle.

Dans les articulations (genou, coude, hanche), recouvrir la région par des tours de bande en X (bandages croisés).

N'employer à cet effet que des bandes élastiques (bandes de crêpe Velpeau) ou bandes de gaze (en ce dernier cas, les mouiller légèrement afin qu'elles se moulent mieux sur la partie à recouvrir).

### Comment faire la respiration artificielle

#### Les tractions rythmées de la langue

#### Les inhalations d'oxygène.

Opération qui a pour but de remplacer momentanément la respiration, suspendue par inhibition des centres nerveux causée soit par une anémie du bulbe (dans le cas de strangulation), soit par une intoxication (asphyxie à la suite d'un choc électrique, d'un choc ordinaire, coup sur la tête, et d'une asphyxie par l'eau).

On pratique la respiration artificielle en élevant les bras de chaque côté de la tête.

Pour cela, le malade est couché sur le dos, les vêtements déboutonnés, le cou libre.

L'opérateur se place du côté de la tête, sai-

sit les bras du patient par les coudes et, dans son premier temps, les élève doucement, jusqu'à ce qu'ils viennent au contact des oreilles.

Il les maintient dans cette position pendant deux secondes, puis les abaisse le long du corps en comprimant les parois du thorax.

Ce second temps doit prendre deux secondes.

L'ensemble de ces manœuvres doit être rythmé et durer quatre secondes, de façon à obtenir le nombre de respirations normal, soit 25 respirations par minute.

La respiration artificielle doit être complétée par des tractions rythmées de la langue sur un rythme analogue de quatre secondes.

On prend la langue du patient avec un linge, un mouchoir par exemple, et on la tire hors de la bouche durant deux secondes, puis on la laisse revenir en arrière pendant les deux secondes suivantes.

On doit continuer les manœuvres combinées jusqu'à ce que la respiration naturelle soit parfaitement revenue, ce qu'on constate aux mouvements spontanés du diaphragme rendus sensibles par l'élévation et l'abaissement de l'abdomen.

Enfin, dans le cas d'asphyxie par les gaz délétères, il est nécessaire de joindre à ces deux procédés les inhalations d'oxygène pur (prof. Gréhant).

Il suffit, pour cela, d'appliquer entre les lèvres du malade ou d'introduire dans ses narines un tube de caoutchouc relié à un ballon d'oxygène.

La compression du ballon d'oxygène assure l'introduction du gaz régénérateur dans les voies respiratoires et les poumons. de l'asphyxié.

---

# MÉDICAMENTS INDISPENSABLES

*A avoir chez Soi.*



## Médicaments externes.

Eau oxygénée,  
Eau sédative,  
Farine de lin,  
Farine de moutarde,  
Acide borique,  
Acide picrique (pour les brûlures),  
Sublimé (paquets de),  
Teinture d'iode,  
Alcool camphré,  
Ammoniaque (pour les piqûres d'insectes),  
1 boîte de sinapismes,  
Vaseline boriquée,  
Glycérine,  
Poudre d'amidon,  
Poudre de talc.

Médicaments internes.

Eau chloroformée (contre les vomissements)  
Éther (calmant pour les nerfs),  
Laudanum (calmant les douleurs, coliques)  
Antipyrine (contre les maux de tête, les névralgies, cachets de 1 gramme),  
Quinine (pour combattre la fièvre),  
Bismuth (pour enrayer la diarrhée),  
Bicarbonate de soude (maux d'estomac),  
1 flacon de capsules d'Apiol (pour les règles difficiles),  
Eau de mélisse (pour les digestions difficiles)  
Chloral (calmant contre l'insomnie),  
Bromure de potassium (calmant).  
Ipéca (vomitif pour les empoisonnements),  
Morphine (calmant).

**Tisanes de :**

Camomille (pour faciliter les digestions difficiles),  
4 fleurs (pour les rhumes),  
bourrache (pour les rhumes),  
tilleul (calmant),  
fleurs d'oranger (calmant),  
d'armoise (pour retard dans les règles).


Pour les pansements.

Ouate hydrophile (plusieurs paquets),  
Bandes Velpeau,  
Tarlalane,  
Une paire de ciseaux.


Instruments et récipients nécessaires.

Thermomètre (pour prendre la fièvre),  
Une seringue de Pravaz pour injections  
sous-cutanées,  
Un bock à injections,  
1 canule à injections,  
1 canule à lavement,  
1 vessie pour contenir la glace,  
1 bassin,  
1 bocal gradué (pour les urines).





Pour vivre en bonne santé faire chaque jour  
quelques minutes d'exercice sans appareil



SPÉCIMENS TRÈS RÉDUITS DES ILLUSTRATIONS

## LA GYMNASTIQUE

### POUR TOUS

PAR L.-G. KUMLIEN

*Ouvrage adopté par le Ministère de l'Instruction publique*

Le renommé professeur M. L.-G. KUMLIEN indique, dans la **Gymnastique pour tous**, trois séries d'exercices admirablement choisis :

- 1° Pour les enfants des deux sexes ;
- 2° Pour les jeunes filles et femmes de tout âge ;
- 3° Pour les jeunes gens et hommes de tout âge .


Les 80 illustrations d'après nature présentées d'une façon nouvelle, donnent photographiquement la décomposition de chaque mouvement ; elles sont répétées en trois tableaux qui peuvent se détacher du livre, ce qui permet de suivre chacune des séries d'exercices.


En vente chez tous les libraires. Prix **2.75.**


---

4795. — TOURS, IMP. E. ARRAULT ET C<sup>ie</sup>

---







BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE



3 7531 00411782 7