

皇正濟總錄

十八

庫文閣内

函架 300 二

内閣文庫

番號 漢 12609

冊數 200 (23)

函號 300 212



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak 2007 TM: Kodak



大學東
校典藉
局之印

大德重校聖濟總錄卷第一十八
諸風門

癰瘍風

白駮

白癩風

紫癩風

惡風

大風眉須墮落

大風出蟲

大風癩病

烏癩

白癩

同書

白熟

白熟

大風山嵐

大風山嵐

煎加

大風山嵐

白熟風

藥風

藥風

白熟

大風山嵐

癱瘍風

論曰癱瘍之病其狀斑駁點點相連而圓大槩似白駁而稍微也皆由風邪熱氣搏於脾肺經流散肌肉使然也

治癱瘍風頸面斑駁烏蛇散方

烏蛇

酒浸去骨炙貳兩

秦艽

去苗土

芎藭

各壹兩半

桂

去麤皮

羌活

去蘆頭

人參

山梔子

枳殼

去麤殼炒

丹參

沙參

玄參

犀角

各壹兩

升麻

防風

去

木通

剉



白鮮皮

黃芩去黑心

蒺藜子炒去角各壹兩貳錢

苦參貳兩

右一十九味搗羅為散每日溫酒調下三錢匕食後

臨卧服

治癰瘍風面頰頸項忽生斑駁其狀如癬雄黃散塗方

雄黃

硫黃

白礬並研如粉各壹分

右三味合研令勻以鍊成豬脂調和塗瘡上

治癰瘍風及赤白癩風硫黃散塗方

硫黃研半兩

砒霜研

膩粉各壹分

蒼耳實壹合為末

右四味細研入生薑汁半合調令勻少少塗之勿令

近口

治癰瘍風身體斑駁附子散塗方

附子

壹枚大者去皮生用 硫黃研半兩

蒼耳苗壹握乾者

右三味搗研為末以米醋調先以布巾揩瘍上即以

藥塗之乾更塗

治癰瘍風狀似白癩烏蛇散方一合服一百日

烏蛇壹條酒浸去皮骨炙

右一味搗羅為散炒黑豆半合以無灰酒浸去滓取

豆酒調服三錢匕空心食前服

治癰瘍風油麻酒方

油麻不拘多少
淨擇生用

右一味取半合生細嚼用熱酒三合至五合下每空

心午時夜卧各一服漸加至一合服一百日疾愈

治癰瘍風面頰頸項忽生斑駁如癬巴豆塗方

巴豆去皮生用壹分 醋壹分

右二味先以新布揩令赤於故沙盆內用醋磨巴豆

如稀膏塗於患上

治癰瘍徧身斑駁女萎膏摩方

女萎壹分 附子壹枚去皮生用 雞舌香兩研半

木香兩半 白芷壹分

右五味搗研極細和勻以臘月豬膏七合於微火上

煎鎔去滓投前藥末煎三四沸入研麝香壹分攪調

復煎三上三下膏成瓷器收貯每用少許摩之

治癰瘍風硫黃塗方

硫黃壹兩半 雄黃兩半 硃砂研

附子生各壹兩

右四味搗研為細末以苦酒調塗之乾即易

白駁

論曰白駁之病其狀斑駁如癬過於癰瘍但不成瘡爾

皆出風熱搏於膚腠脾肺二經不利也

治白駁舉體斑白經年不差菖蒲醞酒方

菖蒲

九節者去須節米泔浸切壹斤

天門冬

去心壹斤

天雄

炮裂去皮臍參兩

麻子仁

壹升生用

茵芋

去麤莖壹兩

乾漆

炒煙出

生乾地黄

焙切

遠志

去心各參兩

露蜂房

微炒壹兩

苦參

壹斤

黃耆

炙剉別兩

獨活

去蘆頭

石斛

去根各伍兩

栝子仁

生用貳升

蛇蛻皮

長參尺微炙

天蓼木

剉貳兩

右一十六味麤擣篩以水二石五斗煮菖蒲等取汁一石以釀一石二斗秫米蒸醞如常法用六月六日

細麴於七月七日釀酒酒成去糟取清收於淨器中

密覆每溫服四合至五合日二夜一更重煮菖蒲并

藥滓取湯淋洗所患處佳

治風頭項及面上白駁漸長如癬但白紅色白歛散方

白歛

炮日

當歸

焙切

附子

炮裂去皮臍各半兩

黃芩

去黑心

乾薑

炮

天雄

炮裂去皮臍各壹兩

羊躑躅

半兩蒸熟炒乾

右七味擣羅為散每服半錢至一錢七酒調下日三

治白駁傳方

雌黃

石硫黃

各壹兩研如粉

蛇蛻皮

壹條大者燒灰

右三味同研勻細用醋調成膏先以巴豆一粒中截以平處磨令皮起然後傅藥三兩徧即差

治頭項及面上白駮漸長如癬但不成瘡宜用此傳方

桂去麤皮壹兩

右一味搗羅為末每用半錢或一錢匕以津唾和傳

於白駮上日三

治面項身體白駮傳方

鮎魚壹頭約重半斤去腸肚淨洗後壹依鮎法用鹽椒葱粳米飯勻拌即用青荷葉裹作三包

各用蒲片繫

右一味更用荷葉重裹令大臭爛先以布拭白駮令

赤次炙鮎包熱熨令汗出以綿衣包無令風冷所傷

治周身白駮漸長似癬但不成瘡蛇蛻皮方

蛇蛻皮膏條大者

右一味炒熱按摩白駮上時時喫唾數百徧棄之田

野草中差

治面項身體白駮風塗淋方

生木樹腔中汁柳樹為上

右一味淨鍋煎熱洗淋之仍便搗桂牡蠣末津唾調

塗日三夜一隔日淋洗

治頭項及面上白駮浸淫漸長如癬狀但即無瘡鰻

魚塗方 又而土白如對其油其收藥水其油無後效驗

鱧魚壹頭肥者 右一味炙令脂出先洗白皴用物揩拭之令小痛然後用熟魚脂塗

治白皴礬石塗方 石硫黃各壹分 右二味同研如麵用好醋調和如膏塗之

治面項身體白皴風大蛇皮塗方 蛇蛻皮壹條大者燒作灰用 石硫黃研 檫皮燒作灰各貳錢

右三味研令極細以清熟漆調和勿令稠鞭薄塗白皴處欲塗藥時先以巴豆一粒中截用平處摩令皮微起然後傅藥

白癩風 論曰白癩風之狀皮膚皴起生白斑點是也由肺藏壅熱風邪乘之風熱相并傳流榮衛壅滯肌肉久不消散故成此也

治白癩風身體癢麻烏蛇散方 烏蛇酒浸去皮骨炙參兩 白殭蠶微炒 胡麻子 獨活去蘆頭 天麻各貳兩 烏頭炮裂去皮臍

烏蛇 白殭蠶 胡麻子 獨活 天麻 烏頭

烏蛇 白殭蠶 胡麻子 獨活 天麻 烏頭

烏蛇 白殭蠶 胡麻子 獨活 天麻 烏頭

烏蛇 白殭蠶 胡麻子 獨活 天麻 烏頭

烏蛇 白殭蠶 胡麻子 獨活 天麻 烏頭

烏蛇 白殭蠶 胡麻子 獨活 天麻 烏頭

細辛去苗葉

防風去義

桂去麤皮

枳實去麤炒

蟬蛻去土

白附子炮各半兩

天南星炮壹分

右一十三味搗羅為細散每服溫酒調下二錢匕不計時候

計時候

治肺藏久積風毒皮膚生白癩苦參散方

苦參剉

烏蛇酒浸去皮骨炙各參兩

露蜂房微炙

松脂

附子炮裂去皮臍

梔子人

木蘭皮各貳兩

右七味搗羅為細散每服溫酒調下二錢匕不計時

候

治風熱熏蒸皮膚白癩防風湯方

防風去

地骨皮

王不留行

山梔子人微炒

荆芥穗

惡實炒各壹兩

甘草炙參分

人參

生乾地黄焙各半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入惡實根二寸

同煎至七分去滓溫服不計時候

治白癩風玉粉膏方

白礬

石硫黃各半兩

右二味研為末米醋調為膏塗患處

治白癩風方

杏人去雙人不去皮尖生用

右一味每日早晨爛嚼二七粒於白點處揩夜卧再用

治白癩風方

雞子兩枚和殼以米醋參升浸米日取白

石硫黃研半兩

附子去皮臍生用壹枚重半兩者

粟米貳錢

右四味將後三味搗羅為末以前雞子白調如稀糊臨用藥先以葛布揩患處令赤塗之

治白癩風皮膚斑白毛髮亦變石硫黃膏方

石硫黃各壹兩半

右二味搗研為細末先以布揩患處令赤醋調藥成膏塗之若作瘡差後再塗

治白癩風苦參膏方

苦參各壹分

右二味搗羅為末先以酒一升煎至四合入藥二味攪勻慢火再煎成膏每用先以生布揩患處令赤塗之

紫癩風

論曰紫癩風之狀皮膚生紫點搔之皮起而不痒痛是

也此由風邪挾濕客在腠理榮衛壅滯不得宣流蘊於皮膚致令色紫故名紫癩風

治紫癩風大効酸石榴丸方

酸石榴拾顆去皮以瓷盆盛飯上蒸爛絞取汁梨貳拾顆去皮核研絞取汁

羌活去蘆頭人參 防風去叉

乾薄荷葉各壹兩芫蔚子 白附子炮

苦參 犀角鎊 烏喙炮裂去皮臍各半兩

右一十一味除二味汁外搗羅爲末將汁熬成膏和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下不拘時

治紫癩風白花蛇散方

白花蛇酒浸去皮骨炙貳兩 麻黃去根節

天麻 何首烏去黑皮 天南星炮

白附子炮 桂去麤皮 萆薢

白鮮皮 羌活去蘆頭 蔓荊實去皮

白僵蠶炒 防風去叉 犀角鎊各半兩

磁石煨醋淬研壹兩 原蠶蛾炒壹分

右一十六味將一十五味搗羅爲散入磁石研勻每服二錢匕食前溫酒調下

治瘡麻紫癩風烏蛇散方

烏蛇酒浸去皮骨炙 防風去叉 羌活去蘆頭

人參

玄參

沙參

苦參

丹參

白附子炮

蒺藜子炒去角各壹兩

右一十味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下

治紫癩風除風散方

防風去

蠹梢炒各壹兩

白花蛇頭貳枚酒浸炙

右三味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下

治紫癩風硫黃膏方

石硫黃不拘多少

右一味研末用生薑自然汁同煎成膏每浴罷以藥

搯之令熱

治紫癩風點點相連五倍子膏方

五倍子壹分搗為細末膩粉貳錢七

砒霜研細半錢七

右三味同研勻細以醋調為膏盛以瓷合每浴罷勻

搯患處速著衣慎風仍便洗手

治紫癩風斑點附子硫黃散方

附子生用壹枚去皮石硫黃別研半兩

右二味搗研為細散入胡粉一分膩粉少許同繁柳

汁和勻臨卧搯三五徧早晨溫漿洗去不過三五夜

差

治紫癩風牡蠣散方

牡蠣

膽礬各半

右二味生用為散醃醋調摩患處

治紫癩風并白癩風胡桃塗方

初結青胡桃

殼取
外皮用

石硫黃

壹昆子許
研如粉

右二味先取胡桃皮切研如膏入硫黃末和勻塗之

治紫癩風灰藿塗方

灰藿

不拘多少燒灰用紙襯淋
取汁煉令如膏約兩匙許

雄黃

丹砂

膩粉

麝香

蝦蟇灰

石硫黃

礬石灰

各壹錢

右八味將七味同研如粉與鍊了灰藿濃汁攪煎如

膏塗之乾即易膏鞭以醋潤之

治紫癩風羊蹄根塗方

羊蹄根

搗絞自然
汁半合

生薑

研絞自然
汁半合

石硫黃

肆錢研
如粉

右三味將二汁與硫黃末同研令黏塗患處一日不

得洗不過兩上差

惡風

論曰惡風者皆五風厲氣所致也風有青白赤黑黃之

異其毒中人五藏則生蟲亦有五種蟲生息滋蔓入於骨髓五藏內傷形貌外應故食肝則省睫墮落食肺則鼻柱倒塌食脾則語聲變散食腎則耳鳴如雷鼓之聲心不受食食心則為不可治是故謂之惡風治惡風無問新久四肢不仁一身盡痛頭目眩倒口面喎僻白朮散方

白朮微炒

人參

秦艽去苗土

當歸切焙

天雄炮裂去皮臍各參分附子炮裂去皮臍

烏頭炮裂去皮臍各貳兩乾薑炮裂壹兩

蜀椒去目并閉口者炒出汗壹兩

防風又去

桂去皮

防已剉

萆薢炒

白歛

桔梗去蘆頭炒黃耆細剉各貳兩

山茱萸

麻黃去根節先煮掠去沫焙乾用

茵芋去莖

甘草炙各參分細辛去苗葉半兩

右二十二味擣羅為散每服二錢七溫酒調下空心午時各一服未効漸加服之覺口唇瘡痺即減服之

治惡風殊聖散方

天麻

菖蒲以節者米泔浸焙乾何首烏

乳香研

菊花 蔓荊實

威靈仙土去

地骨皮

仙人骨

胡麻

防風去叉

枳殼去炒

益母草

烏蛇酒浸去皮骨炙

小荆子

蒼耳

苦參

丹參

沙參

人參

玄參

紫參

荆芥各半兩

右二十三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下食前

後各一服隔宿先喫豬脰一枚早晨併服三服

治惡風胡麻散方

胡麻

壹斤去浮者壹半煮熟壹半生用

天麻

乳香

研

何首烏

蒼耳

松花

角蒿

欵冬花

克頗草

菖蒲

人參

苦參

玄參

沙參

丹參

威靈仙

去土各貳兩

甘菊花

蔓荆實

紫參

貳兩

右一十九味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下如病

深漸加至三錢七服至旬餘若覺徧身疼痛是効

治惡風五參散方

人參

沙參

丹參

玄參

苦參

木通

剉

菟藟子炒去

烏蛇酒浸去皮骨

乾蠍去土

天麻

赤箭

何首烏去黑皮

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

黃芩去黑心半兩

原蠶蠶分壹

右一十五味並生用搗羅為散每服三錢匕熱茶調下服及半料即減服二錢七初服三日後先覺頭項

脊脊身上疼痛乃藥力與病相擊也當安卧兩復時許即無事如或身上有瘡腫服藥一日後便覺漸減

治惡風天麻散方

天麻

防風去叉

細辛去苗葉

附子炮裂去皮臍去

藁本去苗

烏蛇酒炙用肉

羌活去蘆頭

芎藭

菊花未開者良

桂去蘆皮

麻黃去根節先煎掠去沫焙乾

乾薑炮裂

獨活去蘆頭

甘草炙

阿膠炙令燥

白鮮皮各半兩

右一十六味搗羅為散每日空腹溫酒調服二錢七漸加至三錢七日二春夏煎當歸酒調下秋冬煎蒲

黃酒調下

治脾肺風并惡風等疾何首烏丸方

何首烏

石菖蒲

荆芥穗

蒼耳

胡麻炒各壹兩

玄參

沙參

苦參

白花蛇

酒浸去皮骨炙

烏蛇

酒浸去皮骨炙各半兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服十九

茶酒任下如要作散每服三錢七溫酒調下不計時

服

治惡風豆蒸丸方

原蠶蛾

全者貳拾捌枚炒

羊靨

貳拾捌枚批開炙乾

豬靨

貳拾捌枚如前炙

安息香

犀角屑

沒藥

研

人參

甘草

炙

何首烏

大黃

剉

遠志

去心各壹兩

角蒿

蒲公英

蒼耳

地錦

益母草

土馬驤

枸杞

自角蒿以下柒味各壹兩事治淨用黑豆蒸覆甑中蒸令黑豆軟熟不用黑豆將藥暴乾

右一十八味搗羅為末入鵝梨汁並鍊蜜同和丸如

櫻桃大每服一九不以時米飲嚼下

治惡風白花蛇散方

白花蛇

壹條酒浸炙取肉用參兩

露蜂房

微炙

苦參

剉

防風

去義

丹參

梔子人

山芋

各貳兩半

秦艽

去苗土壹兩壹分

右八味搗羅為散每日空心用溫酒調下二錢七至三錢七日再

治惡風威靈仙散方

威靈仙去土 丹參陸 羌活去蘆頭

獨活去蘆頭 蒼耳兩肆 仙靈脾

玄參 人參 沙參各貳

紫參壹兩 甘草壹兩 黃芩去黑心

右一十二味搗羅為散食後臨臥用溫熱水調下三錢七若身體無瘡眼瞳人不斷鼻梁不塌服之一月可差

治肺藏風毒發作如癩變成惡風證蔓荆實散方

蔓荆實揉去白皮 胡麻搗為末炒

天麻貳兩 菊花未開者良 天南星炮裂

枸杞肆兩 苦參搗取粉

右七味搗羅為散每服溫酒調下二錢七日三夜一每服宜去食前後稍遠恐藥食相犯

治惡風天蓼散方

天蓼葉焙乾 天麻參 何首烏去黑皮

王不留行微炒各

右四味搗羅為散每服二錢匕以熱漿水調服日三

不計時

治惡風玉粉丸方

礬石壹兩
研細

生炊餅劑壹枚

右二味和勻却作炊餅蒸熟乘熱丸如梧桐子每服三十九食後茶清下

治惡風并藥諸風勝玉散方

角蒿

五月採者去根
九蒸九暴為末

胡麻

九蒸九
暴為末

右二味每一料用角蒿末一升胡麻末半斤更入乳香一兩別研為細末拌和令勻每服一錢或三錢七茶酒隨意調下

治惡風烏蛇膽汁方

烏蛇膽壹枚

冬瓜

壹枚截作伍
寸許去瓢用

梨壹枚

右三味掘地可深三尺掃拭令淨潔以物盛冬瓜置其中次安烏蛇膽梨於其上以物隔之用土蓋覆三七日一看冬瓜未甚壞則候七七日看蛇膽梨渾化為汁在冬瓜皮內即取汁每服溫一茶脚許小可風疾以匙頭濕過攪酒喫三兩服愈

治惡風乳香散方

乳香研參
錢

胡麻

水淘去浮者拌
壹斤文火炒香

天麻 慢火炙令黃色參兩

右三味搗羅為散每服三錢匕飯後先抄着口內煎荆芥茶旋呷旋嚥服五七日後覺徧身無力昏悶時勿怪乃藥力也即於腰眼兩邊相去量病人一寸半許各灸二七壯如麥粒大若鼻塌者用林黍枝子去皮中心通作眼安在鼻中身上有腫處自消常服即鍊蜜搜和為丸如梧桐子大溫酒下三五丸

治惡風如聖散方

胡麻 貳斤玖蒸玖暴

天麻 壹兩

乳香 研

松脂 研

款冬花

旋復花

蒼耳

人參

玄參

沙參

苦參

紫參

丹參

松花

白茯苓 去黑皮各半兩

木香

丁香

胡麻子花 各壹分

右一十八味搗羅為散和勻每服三錢匕薄茶調下日三四服不計時服藥五日徧身及百骨節疼痛起止不得乃見効也兩三日後却得安及一月身體黑瘦方漸平復

治惡風癩病防風酒方

防風 去又剉碎壹斤

天麻 剉碎伍兩

黍米 壹碩

枸杞根刮去皺皮去心

好麩麩拾伍斤

右五味將防風天麻枸杞根三味用水六斗煮取三斗去滓置於不津器中將黍米依造酒蒸饋蒸訖入麩末拌分三酸如常法又取槐白皮一斤細剉并用三年純黑貓兒一箇去皮腸肚外爛煮同剉槐白皮相和入酒酒熟壓去糟每服溫飲三四合至五合日二夜一

大風脊須墮落

論曰大風脊須墮落者蓋癩病也皆由惡風染著榮氣不清風濕毒氣浸漬肌肉致淫邪散溢痒癢成瘡皮膚

蕩潰鼻柱倒塌須脊墮落

治大風癩病脊髮墮落熱毒風入五藏身體頭面生瘡

枳殼散方

枳殼去麩炒 黃耆炙

蒼耳炒

白朮微炒 蒟藳剉

白蒺藜炒

防風去叉生用 升麻生用

梔子人分

漏蘆去蘆頭 黃連去須

人參

天門冬去心焙 防已

乾薑炮

芎藭去苗 丹參去苗

麻黃去根節煎

白芷微炒 甘草炙

葛根剉各半兩

玄參

堅者參兩

烏蛇

酒浸去皮骨炙壹兩

右二十三味搗羅為散溫酒調下二錢匕加至三錢

七空心夜臥服

治大風惡疾或二年三年脊須墮落手足疼悶骨節煩

腫面色黑皮肉漸變白蒺藜散方

白蒺藜

炒

芎藭

各貳兩

山梔子

皮去

防風

去叉各壹兩參分

草薺

炒

羌活

去蘆頭

白芷

炒

升麻

各貳兩

白茯苓

去黑皮貳兩半

遠志

去心

菖蒲

九節者米泔浸切焙乾

蔓荆實

細辛

去苗葉輕炒

茵芋

去麤莖

芍藥

麻黃

去根節煎掠去沫焙乾

龍骨

刮去土

人參

當歸

切

桂

去蠶皮各壹兩壹分

白朮

微炒壹兩

附子

炮裂去臍皮貳枚

甘草

炙

桔梗

切焙各壹兩半

右二十四味搗羅為散每用溫酒調下二錢匕至三

錢匕空心午食前各一服如口乾舌澀喉裏烟生鼻

中辛痛是佳應也甚即煎少許甘豆湯解之

治大風脊須墮落等疾皂莢丸方

大皂莢

貳斤不艸者酥炙過銀銅器中人水揉碎煎成膏入後藥

羌活

去蘆頭參兩

木香

葶藶

各貳兩

附子炮裂去皮臍半兩 白牽牛炒 郁李人去皮尖研

獨活去蘆 檳榔用雞心者煨 大黃炒

青橘皮去白焙 何首烏去黑皮各貳兩

右一十二味搗羅十一味為末入皂莢膏揆和勻搗

二千杵丸如梧桐子大暴乾常服生薑湯下二十九

加至三十九丸病甚者稍增之

治風氣留滯皮膚不仁須眉墮落多生瘡癬身體瘙痒

等何首烏丸方

何首烏刮去黑皮拾貳兩

白牽牛揀

乾薄荷各參兩

肥皂莢參斤壹斤去皮子椎碎用法酒參升浸兩宿揅濃汁

去滓銀石器中熬成膏壹斤炭火燒令烟盡收放濕紙上盆覆之候冷用壹斤去皮酥炙令焦搗羅

未為

右四味搗羅三味為末用皂莢膏和劑使膏盡為度

熟搗丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九不計

時候溫酒下日三服

治大風眉須墮落退皮去爪甲換骨蘇木煎丸方

蘇枋木參兩椎碎以法酒壹斗煎至壹椀去滓 附子壹枚炮裂去皮臍

烏頭壹枚炮裂去皮臍 天麻酒浸焙壹兩 草烏頭半兩用鹽水浸

乾蠍去土酒壹分 乳香研 沒藥研各半兩

雄黃水飛過半兩

右九味除蘇枋木外搗羅為末將蘇枋木酒和藥末為丸如黑豆大每服五丸至七丸用淡豉湯下衣被蓋出汗婦人用紅花酒下

治大風疾須着墮落皮肉已爛成瘡者白花蛇散方

白花蛇去皮骨酒炙 烏蛇去皮骨酒炙 乾蠍全者去土炒

白殭蠶炒各壹兩 地龍去土炒半兩 雄黃醋熬研壹分

蜈蚣拾伍條赤全者炒 蠍虎拾伍枚全者炒 蜜蜂炒壹分

丹砂研壹兩 黃蜂炒壹分 胡蜂炒壹分

龍腦研半錢

右一十三味搗羅為散每服一錢匕溫蜜水調下日

三五服

治大風癩並癰疽疥癩骨肉疽敗百節煩疼脊髮凋落身體苦痒皆爛耳聾風疔齩齒茵芋散方

茵芋去麤莖 附子炮裂去皮臍 天雄炮裂去皮臍

躑躅花炒微黃色 細辛去苗葉輕炒 烏頭炮裂去皮臍

石南灑酒微炒 乾薑炮各半兩 獨活去蘆頭壹兩半

白朮灰炒 防風去叉 菖蒲九節者用米泔浸後切焙

乾 蜀椒去目及閉口者炒出汗各壹兩

右一十三味搗羅為散每用溫酒調一錢匕日二夜一心腹稍空時服勿更增唇麻痺甚啜少許溫甘豆

湯止之

治大風癩疾者須墮落徧身瘡痹手足攣縮山梔子散

方

山梔子

去皮貳兩半

芎藭

壹兩

藁本

去苗土參分

當歸

切焙

蔓荊實

各壹兩

桔梗

剉炒壹兩參分

羌活

去蘆頭

白蒺藜

炒

白茯苓

去黑皮

防風

去叉各壹兩壹分

側子

炮裂去皮臍

天麻

各半兩

右一十二味搗羅爲散每日空腹溫酒調下二錢七

加至三錢七夜卧時再服服至一料者須再生

治大風癩徧身癢疹如爛桃李大作瘡經年不愈重者

毛髮脫落苦參丸方

苦參

拾陸兩剉搗取粉捌兩

生乾地黄

焙乾搗末伍兩

半

乳香

半兩炒輒放冷研再與丹砂末同研

丹砂

研壹兩壹分

右四味研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每日空腹夜卧

以溫水下二十九漸加三十九

治大風癩者須墮落及身面瘙痒腹中煩熱身上癢疹

起如棗核疼痛生瘡防已散方

防已

剉壹兩半

烏蛇

酒浸去皮炙參兩獨活頭去蘆

秦艽

去苗土

黃耆

炙

丹參

去苗土微炙

烏頭炮裂去皮

松脂鍊過放冷研

人參

苦參剉

白朮炒

桂去麤皮

芍藥各壹兩壹分

芎藭

黃連去須

蒺藜子炒去角

白茯苓去黑皮

天門冬去心焙

葛根剉各壹兩半

乾薑炮

蜀椒炒出汗去閉口者并子各

壹兩

玄參剉兩

右二十二味搗羅為散每空心食前夜臥溫酒調下

二錢匕漸加至三錢匕

治大風癩身上生瘡並面部浮腫眉鬢墮落四肢癢痺

羚羊角飲方

羚羊角鎊

甘草剉各參分

獨活去蘆頭

山梔子人兩各壹兩半

防風去叉壹兩

枳殼去瓢炒

黃耆剉炙

蒺藜子炒

丹參去苗土微炙

大玄參

木通剉各壹兩壹分

右一十一味麤搗篩每服五錢匕以水一盞煎取七

分去滓溫服每日早食後及夜臥各一服

治大風癩身體成瘡眉鬢墮落痞癩搔痒搔之黃水出

者漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

烏蛇去皮骨酒炙

獨活去蘆頭

黃耆炙

白欬

白茯苓去黑皮

生薑切炒

大黃剉碎醋炒

升麻生用

麻黃

去根節煎

枳實

去瓤炒

芍藥

防己

玄參

甘草炙

附子

炮裂去皮臍

梔子

人壹兩

石膏

碎壹兩半

右一十八味剉如麻豆每服五錢七以水一盞半煎

取一盞去滓溫服要利空心臨臥各併二服煎取小

治大風癩脊須墮落身上有瘡手足脹悶瘡癬攣縮鼻

梁未壞者側子丸方

側子

炮裂去皮臍壹兩參分

白芷

微炒

附子

炮裂去皮臍

天麻

酒浸切焙

龍骨

防風

去叉製各壹兩壹分

蔓荊實

壹兩半

白蒺藜

炒貳兩

白朮

炒壹兩

人參

山芋

生乾地黄

焙

當歸

切焙各參分

右一十三味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下三十九日再服漸加至五十九丸唇舌微痺為効慎避外風

乳香

炒候冷研

人參

紫參

去土

沙參

去土

玄參

去土

苦參

剉搗取粉

天麻

酒浸切焙

菊花

未開者

枳殼

去瓢麩炒各半兩

右九味擣羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大食後酒下二十九日二夜一百日內差六十日內兩鼻中出血是候也

治大風癩令生鬚鬣側柏丸方

側柏葉不計多少

右一味九蒸九暴搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空心食前夜臥各一服熟水下五十九百日毛生治大風疾耆毛脫落法製蓖麻方

蓖麻子不計多少去皮黃連水浸七日每服四粒空心用黃連水下服至一月覺四肢腫用鍼刺出

水再服一月永除根本

治大風癩生髮堅眉鬚栢脂醞酒方

人鍊成栢脂

拾斤研爲末如松脂法

糯米壹石

細麴拾伍斤

石灰壹石

右四味先炒石灰以木札著灰中試之火出爲度以地骨皮剉五斗以水一石五斗煮取九斗半去滓以淋石灰三遍澄以灰汁和麴與栢脂粉拌米用汁米麴栢脂粉多少一如常醞法仍兩酸者麴米汁粉在內密封四七日開壓去滓取清酒每服五合至七合常令酒氣相接取効忌觸外風冷其米泔及糟不得

令豕畜食之

治大風癩皮膚瘙癢搔之落如麩片宜安府藏去胃中
伏熱解咽乾舌澀除風痺虛羸治脊須墮落久服輕身
延年不老松脂醞酒方

松脂

貳斗伍升太山
川谷者六月採

黍米
貳斗伍升

本細麴

壹拾伍斤半

糯米

斗伍

右四味以水一石煎松脂浮上掠取入冷水中却減
入湯如此四五十度每五度煮即須換湯暴乾擣研
作粉得一斗一升二合半用鍊松脂初法用度水四
斗浸麴麴發黍米一斗五升以松脂粉拌飯一如常

醞法相次成料每麴隨常醞法入更炊一斗黍米拌
松粉下第一料又相次更炊糯米三斗入松粉和答
酸又相次更炊糯米二斗同松粉拌和勻取其松脂
粉並須和飯用盡每一斗米入松脂粉一升五合相
拌入酸後壓去滓取清酒每服五合細飲日夜可四
五服漸漸加至一升溫溫任性飲之常令醞醞酒勢
相接又一方加杏人五升去皮及雙人者隨料均分
湯退去皮搗破研如膏入之佳

大風出蟲

論曰蟲動物也皆風之所化風入五藏化生五蟲則成

五癩入肝其蟲青入心其蟲赤入脾其蟲黃入肺其蟲白入腎其蟲黑四蟲皆可治惟黑蟲為難藥或所傷未深專意治之亦有差者

治大風疾五藏生五蟲五蟲者各隨五藏之色惟黑蟲為難治當先服藥出蟲以驗其色阿魏雷丸散方

阿魏生研壹分

雷丸生用參分

雄黃研半兩

丹砂研

滑石研

石膽研各壹分

消石研半兩

白欬剉

犀角鎊各壹分

牛黃研半兩

斑猫

芫青各貳拾枚與糯米同炒去

翅足不用米

紫石英研半兩

右一十三味擣羅為散每服一錢七空腹溫酒調下
饑即食小豆羹飯為良慎勿多食但半飽即止常宜
覺飢若食飽蟲出遲也日晡腹空時更服一錢若覺
小便似淋痛不問早晚即更服一錢大飢即食若覺
欲小便似痛澀即就一器中尿尿出看之其蟲或如
爛筋狀各逐其藏辨蟲色也

治大風癩於瘡內取風毒涎殺諸癩蟲塗傅雄黃散方

雄黃

白礬

紫石英

白石英

馬牙消

大陰玄精石

金星石

銀星石各壹兩

以上八味同搗研為細末入瓷合中用白土紙筋泥固濟火燒通赤以濕土蓋罨來日取出於淨濕地上用紙襯盆合出毒三復時時灑地土令濕

麥飯石

陽起石

禹餘糧石

紅皮石

蜜陀僧

不灰木

各壹兩

蒲黃

微炒

石灰

風化者

定州細瓷末

各半兩

砒霜

壹錢

鉛丹

研

青鹽

研

亂髮灰

各壹兩

水銀

膩粉

各參錢

右二十三味同研令細以不見水銀星子為度每以生麻油調塗患上有風毒膠涎出為度不過一月効

治大風癩熏出蟲熟艾方

艾葉

別揀令熟

砒霜

研

水銀

與雄黃同研

膩粉

研

硫黃

研

丹砂

研

阿魏

酒化去沙石麩和作餅炙

附子

炮裂去皮臍搗

雄黃

研細入水銀黥醋再研令星子盡始入膩粉研霜硫黃丹砂同研各壹兩

麝香

研半兩

豬牙皂莢

壹斤去皮別為末

右一十一味除艾葉皂莢別搗為末外並合和細研用紙四張先布艾次糝皂莢末又次糝諸藥末卷刀切如餅燄著碗內燒以小木甑子籠碗以衣襯四邊坐於上熏以衣被遮壅定不令透出氣熱悶即俯伏

治大風癩出五蟲獨活散方

獨活去蘆頭 雄黃研半 青黛研壹分

麻黃去節先煎掠去 水銀壹分與丹砂

研以水銀星 阿魏生研入 雷丸炮

丹砂研 滑石搗研各半 石膽研

牛黃研 紫石英研各壹分 斑猫肆拾枚與糯

足米不用 芫青肆拾枚與糯米同炒

右一十四味搗研為細散每服一錢匕空心溫酒調下不得飽食晚更服當有蟲從小便中出或當日或三四日至十日方出若瀉出赤蟲如爛櫻桃或如豆

麥或瀉出黃蟲似黃涕青蟲似青菜汁白蟲似馬尾蟲遇藥氣即死或隨大便下唯黑蟲如豆豉汁此為

難治

治大風癩疾下癩蟲黑虎丸方

天靈蓋塗酥炙 蝦蟇去腹中物炙乾

麝香研壹分 桃人湯去皮尖雙

雄黃研貳兩 人中白研貳兩 杏人湯去皮尖雙

右七味搗研為末再研勻鍊蜜為丸如梧桐子大空心日午用蕪荑湯下二十九至三十九

治大風癩疾凡是鼻梁未折服之蟲出無不愈通神散

方人... 大黃

皂莢樹上獨生刺無叔牙者大黃剉

右二味生用等分搗羅為細散每臨卧冷酒調服三錢匕候來晨令病人於淨地上登溷當取下黑身赤頭蟲次服溫補風藥候氣完復再依前法更進直候無蟲即病根已除不須服也服藥時慎勿語病人能取蟲若知之則無驗

大風癩病

論曰癩者內經為厲厲者榮氣熱其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰其證不同其始則乍寒乍熱滕

理壅塞血氣精髓耗竭久而不治令人瘠痺汗不流泄手足痠疼面目習習奕奕胸頸間狀如蟲行身體徧痒搔之成瘡或身體錐刺不痛青赤黃黑如腐木形或痛無常處流移非一或似繩縛拘急不可俛仰眼目浮腫小便黃赤餘瀝心神恍惚而善忘也日月浸久其風化生毒蟲蟲既變動外先食氣血膚革不澤甚則內食五藏食肝則睂睫墮落食肺則鼻柱損壞食脾則語聲散亂食腎則耳聞雷鼓之音食心則死推是癩病率皆風與蟲之為害也

治大風癩疾羚羊角散方

大羚羊角 鎊 羊犀角 鎊

吳茱萸 湯洗焙乾 炒各壹分

羌活 去蘆頭 獨活 去蘆頭 各半兩

麻黃 去根節煎 掠去沫焙

烏蛇 酒浸去皮 蔓荊實 去白皮

當歸 切焙

黃耆 剉 防風 去 附子 炮裂去

杏仁 湯浸去尖 雙人皮 炒 蒺藜子 炒去角 各半兩

小右一十四味 搗羅為散 每服二錢七空 心食前溫酒

調下

治大風癩疾若眼脉斷指節零落脚下有瘡語聲喎為不可治如未有此證宜服烏蛇丸方

烏蛇 壹條 酒浸去皮 骨頭尾取參兩 檀香 剉

丁香 茜根 剉 紫葛 剉

防風 去 苦參 獨活 去蘆頭

沙參 去蘆頭 梔子 人 酸棗 人 用

槐子 炒 白芷 附子 炮裂去皮臍

藁本 去苗 羚羊角 鎊 蒼朮 剉 醋

犀角 鎊 殺羊角 鎊 防已

桃膠 生 葶藶 生 葶藶 炒 蕪荑 人 炒

栝樓根 剉 秦艽 去苗 烏藥 剉 各

桑根白皮 剉 參 木通 剉 壹

右二十八味 搗羅為末 鍊蜜丸如赤小豆大 每服空

心溫酒下十九至十五九日二不飲酒薄荷槐白皮湯下如要速差宜用後湯下藥

治大風癩疾下藥桑枝湯方

桑枝

柳枝

槐枝

枸杞根

黃荆根

羚羊角鎊各壹兩

右六味並生用剉如麻豆大每用藥五錢匕以水一盞半煎取七分去滓下前丸藥服一月必覺四體皮膚痒痛不可忍但宜飲酒睡不得搔抓仍頻飯食避外風如有汗必腥臭及有蟲從皮膚中出如麩塵或如馬尾頭髮尖或如線絲尖或如麩片頭黑身白形

色不定但痒之後子細看之或從小便中出或從泄利中出者大効此疾稍退終身禁房室及忌動風物時以苦參湯洗浴須換新衣其舊衣并床薦等並焚之

治大風癩黑龍丹方

石硫黃別研

雄黃別研

丹砂別研

曾青別研

白石英別研

紫石英別研

水銀柒味各半兩將丹砂硫黃雄黃末點醋與水銀同研令水銀星盡

金薄柒味拾片與前

太陰玄精石

消石人細桑枝三寸同熬為汁冷用

馬牙消熬乾用

白礬

燒令盡

鉛丹

胡粉

自玄精石以下至此同研

各半兩以上一十四味入藥餅內依後法燒

天南星

酒煮切炒

白花蛇

酒浸去皮骨炙

白附子

酒炙切炒

白殭蠶

炒

蠟

稍炒

天竺黃

別研

天麻

酒煮切焙

麻黃

去根節煎掠去沫焙

鹿胎

虎骨

酥炙

敗龜

醋炙

蟬蛻

微炙

羚羊角

鎊

犀角

鎊

木香

麴

炒

麥蘖

炒

輕粉

麝香

研各半兩

右三十三味除天南星以下一十九味擣羅為末外前硫黃以下十四味用燒藥瓷罐子一枚六一泥固

濟火乾以先研玄精石至胡粉六味末平分一半布在罐子內次入硫黃至金薄八味在中又盡玄精石等未在上別入金薄二十片藥上蓋定後以六一泥固濟留半寸許不要泥合縫就淨室中掘地坑面廣二尺二寸深如藥罐子二寸又於爐中心掘一孔入一大罐滿著水坐藥罐在上不得令水蘸濕用火一斤去餅五寸垂胎養三復時畢出藥方始泥合縫又加火至三斤仍舊去罐遠近亦三復時至滿日平明用火五斤簇藥罐子燒令通赤一食頃便去火用灰培罐子上次用濕土罍蓋令實至來日平明取出藥

細研用重熟帛帶濕包裹藥置於淨新濕土內培罨
三復時每日夜三次細灑水於土上常以大盆合蓋
俟出火毒日足別密縫一夾絹袋貯藥於銀石器中
用水二斗甘草一斤搗為末上垂藥袋不得到底煮
一復時取出焙乾再研如粉與後十九味草藥末同
研勻用蒸棗肉丸如櫻桃大每服一丸用苦參黃連
浸酒三合磨下治一切毒風豆淋酒下半丸日二夜
一其煮藥甘草水有瘡癢疥癬風熱毒聚淋洗即差
應攤緩角弓反張身有痛痺急風渾身瘙痒走注疼
痛破傷等風服訖蓋覆出汗徧身痛腫不散樺皮灰

酒驚癇煎金銀湯腸風瀉血煎荊芥湯小兒天癆煎
薄荷湯酒相解磨一丸分五服小兒夜啼驚悸研丹
砂水磨一丸分八服仍以半丸緋帶子男左女右繫
在臂上唐新錄云天台老人付此方於金仙道士進
明皇帝至咸通時始傳於世

治大風癩神効桑柳煎丸方

東引桑枝十二月採東引柳枝正月採

乾槐子十月採壹斤各

右三味用童子小便二斗春秋夏浸經兩日冬浸七
日別用長流水五斗泉水二斗同煎至一斗絞取汁

更煎至五升入白蜜五合又煎如稠餈以瓷合盛經一宿後服餘藥滓陰乾入熟絹袋收取桃人吳茱萸各二兩生用與藥滓三兩半同入鍋內炒黃乘熱入瓷餅重紙蓋口緊緊一復時擇去桃人茱萸不用只用煎滓三兩却加原蠶沙乾白樵仙靈脾牛膝防風各三兩同搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服取前煎三錢至五錢七用熱酒五合調化下二十九空心食前夜臥各一服別更入紅雪或經火朴消尤佳

治大風惡疾滑泄精氣麋角散方

麋角

半斤先用桑柴灰貳斗煎湯淋取汁參斗次截麋角入灰汁中慢火煮盡汁為度候乾取

肆兩

盧會

赤箭

蠍稍酒炒

麝香研

附子

炮裂去皮臍各半兩

乾薑炮壹分

右七味搗研為散每用五錢匕入好臘茶末七錢匕和勻凡患此疾鼻梁未倒語聲未轉精氣滑泄者取藥末一錢匕用荆芥薄荷湯如茶點熱服覺藥力緊每點入鹽少許要出汗即熱服厚衣覆出汗慎外風治大風疾四肢不收不能反覆兩脅中疼痛身重腦急筋攣不可行履時發寒熱足踣似錐刀所刺此皆飲酒露卧傷於風濕從下上衝腹背強直癢痺榮衛不足精

氣虛弱血脈壅塞怵惕不樂囊下冷濕石斛散方

石斛兩去根貳 萆薢炒 柏子人各參

附子炮裂去皮 石龍芮炙 杜仲去麤皮炙

澤瀉 牛膝去苗酒 芍藥

雲母粉 防風去 山茱萸

細辛去苗葉 菟絲子酒浸別搗

桂去麤皮 壹兩半

右一十五味搗羅為散每服一錢至二錢匕空腹食
前用溫酒調下

治大風癩天麻丸方

天麻 白茯苓去黑皮 白附子炮壹兩半

白芷 芎藭各貳兩 附子炮裂去皮

防風去又 細辛去苗葉 獨活去蘆

白僵蠶炒 桔梗炒 馬牙消研各壹兩

丹砂研參 白龍骨壹兩 牛黃研壹分

麝香研半兩

右一十六味除研外搗羅為末次將別研藥和勻鍊
蜜為丸如梧桐子大每服七丸至十九丸溫酒下空心
日午臨臥服治一切風要出汗即炒豆淋酒下厚衣

蓋覆

治大風癩面上生瘡身多盜汗腹痛黃耆丸方

黃耆剉 防風去 丹參去

白朮 白茯苓去 芎藭

枳殼去 山梔子去 蒺藜子炒

赤芍藥 知母焙 地骨皮

黃芩去 芫胡去 苦參

生乾地黄焙

右一十六味擣羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心日午夜臥用溫水下

治大風癩白殭蠶丸方

白殭蠶炒 蛇蛻燒 皂莢刺

蝦蟇燒 防風去 薄荷根剉

茵陳根剉 蘭香根剉 蜥蜴炙

腰帶皮灰 皮巾子灰各半

右一十一味除為灰五味外擣羅為末拌和令勻用烏蛇卵為丸如梧桐子大每服二十九空腹酒下無蛇卵用烏蛇肉為末酒煎如糊為丸亦得

治大風癩病烏麻子丸方

烏麻子壹斗九蒸 天麻去

丁香 乳香別 蘇枋木

黃櫨木

各伍兩內黃櫨木細剉以新汲水壹斗瓷

右六味搗研為末拌勻用赤黍米一升淨淘以浸木

水煮為稠粥研膏熟杵為丸如梧桐子大每服二十

丸至三十九食後用漿水下日二夜一

治大風耳穴鼻梁倒壞還肌煎方二十六

杜落崖

壹秤亦名

無灰酒伍

右二味和根莖葉細剉置鍋內旋入酒煮令稠濾去

滓再熬成膏入新瓷器盛更取桑東南根汁別收之

有患者與前膏各一匙許以無灰熱酒調下厚衣被

蓋出汗仍於密室內服藥至醉醒後以溫桑枝水洗

其壞肉著綿衣勿令當風

治大風癩及熱毒風癢瘡疥癩苦參丸方

苦參

於九月末旬掘取根去

枳殼去瓢麩

右二味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十

丸患冷者以溫酒下餘以粟米飲或淡漿水下食後

服日二夜一若苦參根皮薄者即連皮用但細剉搗

取粉弃滓不可用

治大風癩疾胡麻續肌散方

胡麻

半

天麻

貳

乳香

參分

右三味搗羅二味為細散入乳香和勻每服二錢匕

用荆芥臘茶調下慎房室鹽酒一百日服藥半月後
兩腰眼中灸二七壯次常服補藥

治大風癩病神虎丸方

烏頭生去皮 芎藭子 吳茱萸湯洗

黑豆生去皮

右四味搗羅為末滴水為丸如梧桐子大每服十五
丸冷水下日三如瘡膿血潰爛甚者更用後藥蛇床

子散

治大風癩病蛇床子散洗方

蛇床子 芎藭子等分

右二味擣羅為散每量多少濃煎汁洗瘡逐日服神
虎丸十日瘡漸乾半月後須看漸生如風癩眼不見
物病退更服後千金散

治大風癩病千金散方

皂莢刺燒 大黃九蒸九

右二味各為散每用大黃末一錢七以水七分煎令
沸調皂莢刺灰二錢七食後臨臥服日三鼻壞指落

者亦治

治大風癩鬣魚膽散方

鬣魚膽 白礬 綠礬各生用

膩粉

水銀

麝香各半兩

右六味一處細研時點少許水研水銀星盡為度每服一錢至二錢七井華水空心調下至午時未動腹空更一服後教出稠黏涕唾或瀉下五色毒涎為効一月內可三度服若牙疼齒縫中涎出乃愈更量入虛實用之

治大風癩疾黑豆方

黑豆

貳升細粒者

天雄

去皮臍生用伍兩

烏頭

去臍皮生用柒兩

右三味剉烏頭天雄如豆粒大用水二斗慢火煎至七升去滓浸黑豆二升一復時漉出暴乾更浸更暴

以滲盡汁為度暴取乾每服三枚至七枚空心食前用酒下日二服唇口不痛即夜深更一服

治大風癩病身體面目俱有瘡癢惡汁自出艾蒿溫酒

方

白艾蒿

拾束每束如升許大淨擇水洗細剉

右一味煮取濃汁拌麴米一如常醞法酒熟去糟取清酒稍稍飲之令常醞醞然

治大風癩病天門冬丸方

天門冬

去心生用伍斗研絞取汁

右一味內瓷器中密蓋口以蠟封勿走藥氣於淨室

中經一年取開其色赤如沙糖卽入少苦參粉及乾地黃末爲丸如梧桐子大每服十九溫熟水下食後服

治大風癩疾百花煎方

白蜜貳拾兩

石榴柴類甜者并皮用

生薑去皮細切捌兩

右三味先研生薑石榴絞取自然汁更瀘令淨入蜜盛於瓷瓶以蠟紙封口勿令通氣垂繫於釜中勿到底以重湯煎一復時成煎空心酒調二錢匕漸加至三錢七日二夜一旬日內有惡物隨便而出是病根散矣

治大風癩病面赤疹起手足攣急身發瘡癩及指節已落者黃精煎方

黃精生者拾貳斤

白蜜伍斤

生地黄肥者伍斤

右三味先將黃精生地黄洗淨細剉以木石杵臼搗熟復研爛入水三斗絞取汁置銀銅器中和蜜攪勻煎之成稠煎爲度每用溫酒調化二錢匕至三錢匕日三夜一久服風癩痊平面如童子延年不老治大風疾鼻壞者神効方

蓖麻子去皮切爲兩片

黃連去須剉各伍兩

右二味用水一處浸七宿後空心日午臨臥只用浸

藥水吞下苾麻一片子水盡旋添勿令乾
治大風癩疾聖効散淋煤方

治大馬棘葉參

右一味搗為細末夏月取馬棘青葉與乾末同搗捏
作餅子暴乾再為細末每用三兩水十五椀煎取沸
瀘入大盆淋燂徧身及偏煤肉損爛處日三次不過
半月肌體復完

治大風疾取五色蟲諸石丸方

金星石

銀星石

雲母石

禹餘糧石

滑石

自然銅

磁石

生乾地黄

龍仙石

出齊州又
名龍涎石

陽起石

蜜陀僧

凝水石

各壹
兩

右一十二味搗碎以罐子盛用炭火十斤煨以火盡
為度取出搗研為末醋煮麩糊為丸如小豆大每服
十五丸用後補藥下

補藥茯苓散方

白茯苓

去黑
皮

人參

天麻苗

木香

枸杞根

狗脊去
毛

天麻

芎藭

蓬莪茂

景天

護火草
是也

青箱子

海桐皮

各壹
兩

右一十二味各生用擣羅為散每服二錢七白花蛇酒調下前丸藥日三服忌雞豬魚蒜一百日當見大

効

治大風疾愈風丸方

白牽牛半生半炒

虎骨炙醋淬各壹兩

山梔子人

甘菊花

當歸切焙

骨碎補

白芥子各半兩

草烏頭參兩內壹兩童子小便浸參日餘貳兩以桑柴燒為

地龍去土

灰

硃砂研各壹分

牛膝酒浸切焙

肉苁蓉酒浸切焙

麻黃去根節

自然銅煨醋淬柴徧

葶藶

地骨皮各壹兩

烏頭炮裂去皮臍去

楓香脂炒

胡蘆巴炒各半兩

右一十九味搗研為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大

每服三十九溫酒下空心日中臨卧各一服加至五

十九第三日用淋煤藥

淋煤藥方

乾茄子莖日黍穰

艾葉各壹兩

右三味細剉濃煎湯淋煤三日一次并常服墜涎丸

墜涎丸方

水銀兩半

膩粉柒錢

巴豆去皮膜出油貳柒枚

硃砂研壹分

半夏湯洗柴徧

白礬井半夏用生壹貳兩壹處

搗爛陰乾用各壹兩五靈脂各壹兩羌活去蘆頭半兩

木鼈子去殼大黃煨熟剉各壹兩茆香壹分

馬牙消研貳兩丹砂研壹錢

右二十三味搗研為末水浸蒸餅丸如菘豆大每服

五七丸茶酒下日三服

治癩病六神散方

螻蛄壹枚去肚腸蜜蜂柴枚貳味用泥半指厚裹編以熟火壹斤濕煨候泥乾通

紅去火放冷取出於乳鉢內細研不羅商陸根汁半盞

生薑汁參分生蜜參分菘豆末壹錢

右六味一處和勻更用溫酒調下只作一服約半日

許發動惡心涕唾汗出仍吐出涎渴時頻與溫米湯

喫若是吐多瀉多或更有血勿疑是病出也切忌出

風中如吐瀉後腹痛取下一塊大小如雞子有諸般

顏色者此是病根也如不思食以甘草二寸黃連二

條水一盞煎至半盞溫喫其藥即不以老少強弱都

作一服若是半日已來未發動即更服樟柳根等汁

投之尙未覺更與喫無妨面上如有紫瘡癩未銷者

用乾斑貓末以生油調成膏傅患上約半日許瘡癩

脹起以輒帛子揩拭去藥以棘鍼挑破近下令水出

自乾即不得剥其瘡皮斑貓不得令入口眼若面土

有小尖痞癩子者不用斑貓却以熟艾入膽礬少許
紙杵作釵股大小艾炷灸之每箇灸一炷如手脚上
下有瘡未較煎甘草熱湯淋洗更以白藥子三兩甘
草一分荆芥十穗一處擣羅爲末乾貼如澡豆使之
亦好切忌房室事動風發氣鹽醋料物等物只得喫
淡粥過一百日

治大風疾塗傳方

磁石煨醋

玄精石研

禹餘糧煨醋

陽起石研

礬石研

代赭煨

金星石研

銀星石研

研各壹兩以上搗味再用鹽泥固濟以肆斤熟火簇

定候通赤取出去泥乘熱杵碎爲末

水銀

膩粉

貳味同於漆椀內研令無星子各半兩

右一十味每用前藥末二錢七及水銀膩粉二錢七
研大麻子三合麻油一兩半生絹取汁調塗身體以
藥末盡爲度鋪油單襯臥以被覆出汗及轉下惡物
爲度未轉再塗轉卽服補藥在後

治大風癩病凝水石塗方

凝水石

研爲細末肆兩

膩粉壹兩

右三味滴水研如薄泥卧病人於密室先將一半藥
徧身塗之除咽喉心上不塗以兩手摩令極熱次夜

更將餘藥准前塗摩或當夜或次日藏府取下惡物
 但喫溫補藥忌一切動風物一月皮膚復舊兩月眉
 睫生甚者半歲必再發准前用藥則永安也
 治大風疾塗藥轉後服補藥異功散方

天麻酒漬 赤箭 松黃

鬼白 安息香研 羌活去蘆

欵冬花 楓香脂研 天蓼花

側柏葉 蒼耳各壹兩 苦參壹兩

何首烏炮去黑皮 細辛去苗 防風去

蔓荆實去浮皮 藁本去苗 牛膝焙切

地骨皮去土 甘草炙 乳香研
 天門冬去心 麥門冬去心 丹砂研
 萹薺 木香 虎骨酒炙
 當歸焙切 天南星炮 乾蠍炒
 烏蛇酒浸去皮 白花蛇酒浸去皮 麻黃去節
 雄黃研 附子炮裂去皮臍 芎藭
 白僵蠶直者炒 桂去麤皮 雞舌香研各半兩

右三十九味搗研為散入雲母粉六兩研和勻每服
 一盞半七臘茶或米飲調下日三服

治大風癩病婁金丸方

金薄片伍拾 牛黃研 麝香研

龍腦研 白附子炮 天竺黃各半

人參 白芷 細辛去苗

芎藭 天南星生用各 天麻

白花蛇酒浸取肉炙 防風去叉各 黃耆剉

白僵蠶 藁本去苗 羌活去蘆

麻黃去節 白茯苓去黑 犀角錯

羚羊角錯 芍藥 甘草炙各

甘菊兩

右二十五味搗研為細末別用生地黃自然汁二升

蜜半斤酒一升酥三分慢火同煎成膏放冷和藥末令勻丸如雞頭大每服三丸細嚼茶酒任下

治諸癩膿潰體虛氣熱榮衛不清風鼓於脉茯苓丸方

白茯苓去黑 石斛各壹 人參

蒺藜子炒去 羚羊角鎊 枳殼去麩

五加皮各壹 酸棗人 五味子各壹

菟絲子酒浸壹宿別 雲母粉兩

黃耆剉 防風去 細辛去苗

獨活去蘆 杜仲去麩皮炙 鹿角膠炙燥

檳榔煨剉 天雄炮裂去皮 續斷剉焙

澤瀉兩 當歸剉焙壹兩半 熟乾地黄焙參兩

甘草炙壹兩 肉苁蓉酒浸去皺皮壹兩半

右二十五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三

十九空腹煎聚湯下日二服

治大風疾及諸風疾神應酒方

茵芋炙 附子炙 天雄並生用去皮臍

丹參 蜀椒去目並閉口炒出汗 躑躅花

甘草炙 石菖蒲去麤皮 桂去麤皮

乾薑生用 烏頭生用去皮臍 獨活去蘆頭

地骨皮 秦艽去苗土 防風去義

芎藭 人參 當歸

白芷 藁本去苗土 生乾地黄各貳兩

白鮮皮 藥荆炙各貳兩

右二十三味並細剉以無灰酒二斗密器中浸經七日成每日空腹飲半盞漸漸加飲每飲了以飯三兩是壓之每飲一盞即添一盞浸藥藥味盡即止忌熱肉麩雞魚牛肉油膩果子陳梟歧汁等物

治脾肺風毒攻頭面皮膚生瘡成大風疾紫參散方

紫參 防風去義 藿香子微炒

苦參 何首烏炒去黑皮 威靈仙去苗土

天麻各壹兩

烏蛇

白花蛇同酒浸

骨炙用各參兩

丹參

卷柏各壹兩

蒼朮去皮炒參斤

右一十二味擣羅為散更用胡麻子不計多少先蒸

熟後入鍋炒焦為末每胡麻子末一斤入藥末三兩

一處拌勻每服三錢七溫蜜水調下日三服喫藥三

日後覺渾身疼是効及起止不得為驗仍不得住藥

日三服

治一切大風瘡化為水犀角丸方

烏犀角屑壹兩

升麻

黃芩去黑心

防風去叉

人參

當歸切焙

黃耆剉

乾薑炮

黃連去須

甘草剉

梔子人各半兩

大黃煨剉兩

巴豆去皮心炒研參拾壹枚

右一十三味擣研為末鍊蜜和杵二三百下丸如梧

桐子大每服三丸溫湯下以利三兩行為度不利以

意加之

治癩疾神効丸方

芎藭

羌活去蘆頭各貳兩

豬牙皂莢伍挺半生炙

何首烏炒去黑皮肆兩

杏人湯浸去尖雙人和皮研伍拾枚

右五味除杏人外擣羅為末膩粉半兩

此粉須是得銀真粉則

効尋常賣者多是礬粉

與杏人同研極細用白羯羊肉四兩薄

切作大片先鋪線子次鋪肉將上件藥裹了用線緊

繫定入銀器內煮

不可犯鐵器

約用水一大碗於藥四面

各餘兩指許水方可用碗合定煮候泣盡水去線子

不用和肉杵三五下丸如梧桐子大每服五丸黑

參湯下日三服初服五丸後逐日每服加五丸加至

五十丸却逐日每服減五丸減至五丸止次服補藥

初服藥至第五七日頭痛牙縫中出涎是効服藥後

只得喫淡粥候服補藥以次喫淡飯須是忌房室半

年

補藥地骨皮散方

地骨皮去土

白茯苓炒

苦參

蒼耳

原蠶沙微炒

人參

細辛去苗

白茯苓去黑皮

山梔子炒

山茱萸湯浸去淨者微炒

小荊子各半

卷柏壹兩

蔓荊實壹兩

丁香錢參

木香錢參

右一十五味搗羅為散每服一錢匕煎水調下如人

行十里一服欲治此病須先擇密室不透風者然後

服此藥服至五七日頭不痛無動靜者不可療若服此藥頭痛以次渾身疼痛則必愈之兆以次齒縫中涎出則牙齒俱動須是服粥不可食鞭物至四十五日可全愈也若涎出則從足小指病退漸漸至身俱病退如是涎出大便必秘秘則可服大黃之類藥疎之也其補藥若服盡一料可更服一料無妨既服藥亦須令人常看人性急嫌牙縫中涎濁妨飲食及渾身疼痛不能忍耐乃自殘者也欲治此病必須自九月已後二月已前可也

治大風癩疾癰疽骨肉疽敗百節疼脊落身體瘡瘡痛

痒目痛煩躁耳聾齒齲痔瘻天雄散方

天雄炮裂去皮臍去

細辛去苗

烏頭炮裂去皮臍去

莽草炙

乾薑炮各

石南炙

菖蒲

防風去叉各

白朮

獨活去蘆頭各參兩

右一十味搗羅為散空腹溫酒調下三錢匕日一服

治一切癩病黃靈先生天真百畏丸方

丹砂研

水銀

桂末

乾薑末

烏頭末

菖蒲末

蜀椒末

藜蘆末

柏子人研膏各壹兩

右九味再同研勻先用醇酒二升於銅器中熬令減半次下諸藥末并膏更添醇酒二升攪令得所丸如梧桐子大每服三十九薄荷茶下日三服漸加丸數三十日看毛復生又三十日復本也

治一切癩病風瘙瘡癬遍身瘙痒百節疼痛看毛墮落皆爛耳聾四肢痛痺百神散方

天雄炮裂去皮臍 附子炮裂去皮臍 茵芋炙

躑躅 細辛去苗 烏頭炮裂去皮臍

乾薑炮 菖蒲 甘草炙

石南葉各青兩 防風去 白朮

獨活去蘆頭各貳兩

右一十三味搗羅為散每日空心溫酒下四錢七日

再服

治大風癩疾黃耆丸方

黃耆剉 防風去 丹參

白朮 白茯苓去黑皮 芎藭

山梔子 赤芍藥 枳殼去瓢炒

細辛去苗葉各壹兩半 大腹剉壹兩參分 升麻

秦艽去苗土各貳兩 蒺藜子炒去角 獨活去蘆頭

苦參各參兩

右一十六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹煎枳殼湯下二十九日再

治大風癩疾丹參散方

丹參剉炒令黑黃陸兩 蒼耳剉肆兩 威靈仙去苗土

仙靈脾 玄參 人參各貳兩

沙參 紫參 甘草壹兩生剉

羌活去蘆頭參分 獨活去蘆頭各壹兩 黃芩去黑心半兩

右一十二味搗羅為散食後溫熱水調服三錢七臨臥時再服若五心無瘡口不斷瞳人在鼻梁不塌服之一月便差

治榮氣不清久風入脉因而成癩鼻壞色敗皮膚痒潰服黃精法

黃精根去皮洗淨貳斤

右一味日中暴令輒內粟米飯甑中同蒸之二斗米熟為度不拘時服

治大風疾苧麻煎丸方

苧麻子去皮拾兩 黃連去須伍兩貳味細剉以水煮斗同煮令水盡控乾不用黃

連將苧麻子細研為膏 九節菖蒲兩 白附子壹兩

右四味除前膏外搗羅為末入苧麻膏中拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九薄荷茶下日三服

治風疾差後肌肉痛痺徧體瘡癬或癰疔瘙痒摩風膏

方

防風去羌活去芎藭

白欬去細辛去蜀椒去白及

當歸焙切躑躅花各白及

丹參去苦參 玄參

桂去附子去烏頭去

杏仁去皂莢去莽草各

右一十八味細剉以米醋一升拌勻三宿後以火微炒令乾用臘月豬脂二斤再以文武火煎一日常小

沸莫令火急以綿濾去滓於瓷餅內盛勿令水汚如

臘月前可留十年每用以少許點於手上於患處摩

令熱透

治一切熱毒風惡瘡徧體膿水臭爛漸成大風浸洗方

生地黄剉黃連剉苦參剉

甘草剉

右四味於大鍋內用水七石煎取四石去滓以浴斛盛周回以煨灰火煖莫令冷從朝服治風丸散及飽飯後入斛內渾身浸之至日晚即出洗身上瘡膿水令淨纔出便須以摩風膏措摩甚者只一兩度浸差

治大風疾洗浴方

浮萍草內取食者之至日銀項出武長土煮煎水
右一味濃煎湯洗浴日再

又方葛藤蔓一束許濃煮汁洗

烏癩

論曰烏癩初覺皮膚變異肌腠之間滌淫躍躍如蟲行
動眼前有物如絲懸布時發驚恐言語錯亂皮肉癩疹
如桃李實或赤或黑手足痛痺不知痛所或脚下痛不
可踐地身體生瘡兩肘如縛此名黑癩皆由惡風日漸

傷損血氣不榮所致也

治烏癩蝟皮丸方

蝟皮 壹枚炙

海蛤 壹枚大

蚌蛇頭 壹枚

蝟蟲 伍枚去

蟻螬 貳枚

鮫鯉甲 伍

葛上亭長 拾伍枚

水蛭 伍枚

斑貓 拾伍枚將水蛭亭長斑貓蝟蟲四件共

蜈蚣 壹枚去

附子 炮裂去皮 蜘蛛 大者炙

雷丸 拾伍

巴豆 柒枚去皮 大黃 劉如半栗

水銀 半兩與丹砂同研點

丹砂 半兩

桂 半兩去蠹皮

射罔 兩半

黃連 半兩去須

石膏研壹兩

蜀椒去合口者并目炒半兩

芒硝生用別研壹兩

龍骨別研半兩

滑石別研壹分

礬石枯研壹兩

甘遂壹分與脂麻同炒麻熟為度棄麻不用

右二十七味搗羅及別研同拌和令勻鍊蜜丸如梧桐子大每服熟水下一丸至二丸空心臨臥各一服未効加一丸如小便時莖中覺痛是蟲已化如涕下也痛多即止一丸痛少即加至三丸

治烏癩馬先蒿散方

馬先蒿不計多少一名馬矢蒿一名爛石草細切焙乾用

右一味搗羅為散每服一錢匕用荆芥薄荷湯調下

治烏癩浸酒方

苦參根白皮伍斤

右一味細剉如麻豆生絹袋貯好酒三斗冬浸七日夏浸四日每溫飲二合至三合日三夜一漸加至五七合

治烏癩露蜂房酒方

露蜂房伍兩 苦參肆斤

右二味剉細用水三斗煮取一斗五升去滓浸麩四斤半炊黍米二斗如常醞法酒熟每服三合至五合日二夜一稍增無妨

治烏癩葛律草浴方

葛律草

貳秤剉細海

益母草

壹秤剉細海

右二味葛律取籬垣上者益母取近屋者用水二石五斗煮取一石五斗漉去滓盆甕中浸浴一時辰久方出著舊布袍用被衣覆之又再煖令熱復浸浴一時辰久方出入溫室著舊布袍被衣蓋覆汗出勿令見風明日復作如入湯後舉身瘙痒不可忍令傍人捉手不令搔動食頃漸定後隔三日一浴其藥水經浴兩次即棄之

治烏癩雌黃散塗方

雌黃

半兩研

右一味以米醋和雞子清如膏塗瘡上乾即更塗

治烏癩大腹子膏傳方

大腹

生者貳枚如無生者乾者亦得

右一味用皮全者勿令傷動以酒一升浸緩火熬令酒盡藥乾擣羅為末鍊臘月豬膏調和如膏傳之

白癩

論曰白癩之候語聲嘶啞目視不明四肢痛痺關節熱痛如火燔灼脊脊拘急肉如刀劈手足緩弱身體癭胗鼻生息肉目生白珠肉色斑白故謂之白癩也

治白癩蝮蛇頭丸方

蝮蛇頭焦炙

蝟皮焦炙

魃蛤炙

蝮蛇頭生用各壹枚

水蛭生用

蝮蟲去翅足生用

葛上亭長去翅足生用各柒枚

蜈蚣炙貳枚

大蜘蛛炒參壹枚

廣蟲炙肆枚

雷丸炮肆拾枚

附子炮裂去皮臍參枚

水銀

丹砂各壹兩

消石壹分與水銀星盡滴醋炒

滑石研如粉

大黃剉

桂去麤皮

滑石研如粉

甘遂與脂麻同炒不用脂麻

射罔各壹兩

石膏研如粉貳兩

蜀椒去目并閉口者炒出汗

芒消研如粉各半兩

巴豆去皮心炒拾伍粒

龍骨研參分

礬石枯研如粉

黃連去須各壹分

鮫鯉甲炙用柒片

右二十八味搗研極細同羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服二丸空心臨臥溫酒下加至三丸未覺小

便澁痛更加一丸至二丸以知為度

治白癩風天麻煎方

天麻生用壹斤半

天蓼木生用參斤

右二味剉如大豆粒用水三斗五升煎至一斗壓去

滓於銀石器中慢火煎如稠錫每服半匙荆芥薄荷

酒調下不拘時日二夜一月見効

治白癩苦參酒方

苦參

去土皮心
剉貳斤

露蜂房

剉伍兩

右三味用水三斗煮取一斗五升去滓浸法麴三斤
經三宿炊黍米二斗醞如常法酒熟每食後飲一合
日二夜一加至三合以差為度

治徧身白點搔之屑落或痒或痛色白漸展世呼白癩
苦參酒方

苦參

去土皮心
剉伍斤

露蜂房

剉伍兩

蝟皮

剉壹具

右三味用水六斗煮取三斗去滓浸細麴四斤半炊
黍米三斗醞如常法酒熟每飲三合至五合日二夜
一以差為度

治白癩大風眉鬚墮落八風十二痺筋脉拘急肢節緩
弱手足痺瘡商陸酒方

商陸根

剉去皮剉
貳拾伍斤

右一味用水一石五斗煮取八斗去滓浸細麴十五
斤炊黍米一石醞如常法酒熟每溫飲三合至五合
日二夜一重者服至三斗稍輕者至二斗若得藥發
吐下為佳唯宜食鹿肉羹

治白癩艾葉酒方

乾艾葉

濃煮取汁每壹斗
米麴用艾葉伍兩

右一味隨麴米多少用煎濃汁拌浸醞如常法酒熟

治白癩塗方

不拘時稍稍飲之常令酒勢相接醱醱然

葛上亭長肆柒枚去翅足與糯米同炒米熟為度不用米

乾蟻蛇壹枚頭尾全者炙黃去鱗及腹中物

右二味搗羅生絹袋貯以酒五升瓷瓶中慢火煨煮酒及一升以下將綿囊蘸藥汁摩塗癩上日三夜合如不急痛日夜可五七次塗之

治白癩語聲嘶敗四肢瘡痺瘙痒生瘡烏蛇散方

烏蛇酒浸去皮骨炙 葛根剉各壹兩壹分 苦參

紫參 沙參 人參

芎藭 天麻酒浸切焙 黃芩去黑心

木通剉 地骨皮 防風去叉

防已 莽草葉 白朮

蒟藿 木蘭皮去麤皮 黃連去須

附子炮裂去皮臍 烏頭炮裂去皮臍 牛膝去苗

檳榔煨剉 熟乾地黃焙切 萎蕤

芍藥 桂去麤皮 玄參堅者

龍骨研 石膏研如粉 升麻

菊花未開者微炒 蒺藜子炒去角 秦艽去苗土

細辛去苗葉 天雄炮裂去皮臍各壹兩 當歸焙切

甘草炙

遠志去心

巴戟天去心

蒼耳花參炒乾各分

吳茱萸湯洗焙炒

麝香研各半兩

右四十二味搗研細羅為散每服二錢七空腹溫酒調下漸加至三錢七晡時再服

治白癩語聲嘶啞目視不明四肢癢痺關節熱痛身體癢疹鼻生息肉白花蛇散方

白花蛇酒浸去皮骨炙貳兩

天麻

槐子微炒

羌活去蘆頭

防風去叉

晚蠶沙微炒

蔓荆實

白鮮皮

威靈仙土去

枳殼去瓤麩炒各壹兩

甘草炙剉半兩

大右一十一味搗羅為散每服一錢七溫酒調下不計時候

大徳重校聖濟總録卷第一十八

一 監製 萬年不替



