


幼科準繩


卷九下



漢書門	一	二	三	四	五	六	七	八
類	九	〇	一	二	三	四	五	六
號	七	八	九	〇	一	二	三	四
函	五	六	七	八	九	〇	一	二
架	三	四	五	六	七	八	九	〇
冊	一	二	三	四	五	六	七	八

漢書	一	二	三	四	五	六	七	八
類	九	〇	一	二	三	四	五	六
號	七	八	九	〇	一	二	三	四
冊	五	六	七	八	九	〇	一	二
架	三	四	五	六	七	八	九	〇
函	一	二	三	四	五	六	七	八

內閣文庫	
番號	漢 12549
冊數	78 (66)
函號	301 62



綴じ部(喉部分)の文字等が開きが不鮮明な場所あり

解顱

顱不合

初虞世云父精不足則解顱眼白多。錢解顱生下

而顱不合腎氣不成故也長必少笑更有目白睛多

眇白色瘦者多愁少喜也餘見腎虛。湯解顱者顱

大頭縫不合如開解故曰解顱此由腎氣不成故也

云云見前總論凡得此者不過千日其間亦有數歲者乃廢

人也人之無腦髓如木無根古人雖有良方吾所以

不錄者勞而無功也亦不可束手待斃宜依錢氏補

腎萬一有可生之理錢氏補腎如地黃。曾凡得此

解顱

力

二

解頤
候不及十日之內聞有數歲者偶因他疾攻激遂成
廢人若氣色精明能飲食者多服調元散補腎地黃
丸旬月內頗見效者次第調理或有可治若投藥後
如按亦難療矣。田解頤治法宜用生地散。冊小
兒解頤乃是母氣血虛與熱多耳用四君子四物有
熱加酒炒黃連生甘草煎服外以絲束緊用白欬末
傅之

錢氏地黃丸 見前并
鶴節修

天南星散 治頤開不合鼻塞不通天南星大者微
泡去皮為細末米醋塗調緋帛上貼頤上炙手頻

熨之立効

調元散 主稟受元氣不足顛頤開解肌肉消瘦腹
大如腫致語遲行遲手足如筒神色昏慢齒生遲
服之効

乾山藥 去黑皮
伍錢 人參 去蘆 白茯苓 去皮

茯神 去木 白朮 白芍藥

熟地黃 酒洗 當歸 酒洗 黃芪 蜜水炙各
貳錢半

川芎 甘草 炙貳味
各叁錢 石菖蒲 貳錢

右碎每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無
時溫服如嬰兒幼嫩與乳母同服

張渙玉乳丹

治嬰兒頭骨應合而不合頭縫開解

鍾乳粉

依古法製煉者

栢子仁

研

熟乾地黄

依法蒸焙者

當歸

洗焙乾各半兩

防風

剉

補骨脂

淨揀微炒各壹分

或加黃耆茯苓

右件除別研者碾為細末次入鍾乳粉等拌勻煉

蜜和如黍米大每服十粒煎茵香湯下乳食前

嬰孺方狗腦丸

治小兒腦長喜搖頭解顛

狗腦

壹箇

豺漆

即五加皮

甘草

炙

白朮

防風

鍾乳石

乾地黄

各壹分

牛黃

貳分

右以狗腦丸小豆大一歲飲下二九日再未知加

之又云兒顛常令煖冷即病死

小兒錮顛藥

芍藥粉

右取黃雌雞臨兒顛上刺其冠以血滴顛上血止

以芍藥粉傅之使血不見一日立差

治小兒解顛虎骨方

虎骨

敗龜板

不灰木

乳香

各半兩

右為末用生豬血於手心內調塗在頭縫開處以

解頤
舊繇子包裹七日第八日以葱湯水洗去前藥再用此藥塗之經年者已減一分又歇三日方再用藥塗之又服參苓散

人參

茯苓

白附子

炮

羌活

甘草

芍藥

白朮

水煮各壹分

犀角屑

京芎

藿香

後叁味咸半

右為末每服半錢水一盞用少金銀同薄荷三葉煎至三分溫服通驚氣

千金治小兒頤開不合方

防風

壹兩半

栝子仁

白芫

各壹兩

右三味末之以乳和傅頤上十日知二十日愈日

莊氏家傳方治腦縫不合

山茵陳

壹兩

車前子

百合

各半兩

右為末用烏牛乳汁調塗脚及腦縫上用帛子裹頭三日一換五上必效

王氏封頤散

治頤開不合頭縫開張頤開崎陷咳

嗽鼻塞

栝子仁

防風

天南星

各肆兩

解頤

力斗乙

百三

右為細末每用一錢以豬膽汁調勻稀稠得所攤
一在緋絹帛上看頤子大小剪貼一日一換不得令
乾時時以湯潤動

三辛散因治小兒骨應合而不合頭骨開也名曰解
顱

細辛

桂心各半

乾薑柴錢半

右為末以薑汁和傅顱上貼之兒面赤即愈

又方用蛇蛻炒焦為末用猪頰車中髓調傅頂上日

三四度曾有人作頭巾裹遮護之久而自合亦良
法也

灸法臍上臍下各五分各灸三壯灸瘡未發先合

白附

巢氏云小兒臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血

氣虛弱不能上充腦髓故頤陷如死不能平滿也

濟用當歸散方見地黃丸

曾頤陷者虛之極也胃氣虛寒則頤陷曼驚中有之

胃寒脾困吐瀉者為虛極急以金夜丹固真湯

及諸救元等藥治之外則貼以烏附膏有後

者其證尤重治法以頤陷藥回不效亦為難察此大

一在緝絹帛上看頤子大小剪出一日一夜不得令
乾時時以湯潤動

三辛散正治小兒骨應合而不合頭骨開也名曰解

虛

細辛

桂心

乾薑

右為末以薑汁和傅頤上貼之兒面赤即愈

又方用蛇蛻炒焦為末用猪頰車中髓調傅頂上日

三四度曾有人作頤中果應設之久而自合亦良

灸悲觀上瀨下谷正谷灸三壯灸奪未幾去合

頤陷

巢氏云小兒臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血
氣虛弱不能上充腦髓故頤陷如坑不能平滿也聖

濟用當歸散

方見

地黃丸

見前

留頤陷者虛之極也胃氣虛寒則頤陷慢驚中有之

胃寒脾困吐瀉者為虛極急以金液丹固真湯

俱慢驚

及諸救元等藥治之外則貼以烏附膏。有後枕陷
者其證尤重治法以頤陷藥同不效亦為難療此大

虛極百無一活耳

烏附膏 理頤門陷

綿川烏

生用

綿附子

生用各伍錢

雄黃

貳錢

右件為末用生蔥和根葉細切爛杵入前藥末同煎空心作成膏貼陷處

聖惠生乾地黃散 治小兒臟腑壅熱氣血不榮致

頤陷不平者

生乾地黃

貳兩

烏雞骨

壹兩酥塗炙令黃

右搗細羅為末不計時候以粥飲調下半錢

又治小兒頤陷方

右取豬牙車骨髓煎如膏塗頤上良

又方以狗頭骨炙令黃搗羅為末以雞子清調塗

又方以天靈蓋炙令黃搗羅為末以生油調塗

千金小兒頤陷灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足

太陰各一壯

填脹頤突而高如物堆起白汗出毛髮黃而足也
若寒氣上衝則年物如物堆起白汗出毛髮黃而足也
輒又小兒脇下有積者咳且喘而氣上逆有聲
其氣未定因而乳之者用氣厥厥下衝者皆能
頤填當一審其因而治之太者瀉之挑之氣

綿川烏生用 綿附子生用

右件為末用生葱和根葉細切爛杵入煎藥中同

煎空心作成膏貼陷處

聖惠生乾地黃散 治小兒臟腑癰熱氣血不榮致

頤陷不平者

本藥各一升 黃 武 烏雞骨 一 一 一

于金小兒醜削炙糊土可谷半升文獸鼠骨散又只

及女以末覆蓋灸令黃黹縣末以生山開全

及女以末覆蓋灸令黃黹縣末以生山開全

頤填

頤填者頤門腫起也脾主肌肉乳哺不常饑飽無度

或寒或熱乘於脾家致使臟腑不調其氣上衝為之

填脹頤突而高如物堆起自汗出毛髮黃而短是也

若寒氣上衝則年鞞音昂 履頭也 腫熱氣上衝即柔

軟又小兒脇下有積者咳且啼而氣上逆者啼甚久

其氣未定因而乳之者肝氣盛風熱上衝者皆能令

頤填當一一審其因而治之寒者溫之熱者涼之氣

上逆者和而降之肝氣盛者瀉青為主熱證裏多大

連翹湯表多柴胡散虛者以補中益氣湯送下地黃
丸神而明之存乎其人言不盡意。曾世言頤腫皆
以爲熱殊不知有陰陽二證切宜詳辨堅硬爲陰紅
軟爲陽故嬰孩寶書云寒氣上衝則牢鞫熱氣上衝
則柔軟正此之謂若陰證以勻氣散理中湯主之陽
證用玉露飲當歸散防風湯爲治。玉環集歌曰頤
門腫起定爲風此候應須也不中或若加坳如盞足
七日之間命必終。石壁經歌曰積聚脾中熱不通
致令面赤口唇紅曾高夜嗽多腹脹休使流傳肺有
風痰裏作聲涎上壅頤門腫起熱來衝但教涼膈安
靈腑能使三朝速有功。積有冷熱皆能作腫冷則
糞白或酸臭氣衝人亦有蟲出其食物皆不能化腹
脹滿而多困喉中亦鳴也熱則使多渴其糞赤面色
亦黃赤口內臭氣亦蟲出各看其證候調治且須分
水穀去積并調氣冷則溫脾胃熱則去其熱化涎止
渴頤隱則冷也腫則熱也。積熱頤虛腫宜將時氣
門中三十六種除濕散濃煎桑白皮湯下。形證論
云肺熱生風涎鳴頤腫將白丁香膏一二服或南星
花一二服便退。祕要指迷論方凡小兒生下一月
日內或頤門腫此乃受胎熱氣卽用黃檗膏塗於足

心湧泉穴如陷即用半夏膏塗手心此乃嬰兒腎流受冷氣邪干心致令病生黃藥半夏皆為末苦冷水調貼

四中三十五

其應熱明令也即以此熱也蘇燕能氣宜泚和康

木蟻去蘇并隨康令眼溫眼胃熱俱去其熱少或出

亦黃赤口內臭尿亦熱出谷沫其益難聞也且尿食

艱澀而多困熱中亦熱也熱俱去多感其養赤面出

白如麵其尿漸入亦赤熱出其食少皆不消少則

難消對三障熱本也蘇首令燕皆消於觀令眼

行遲

續虛則溫之

集兒自變蒸至能言隨日數血脉骨節備顛骨成即

能行骨是髓養稟生氣血不足者髓不充強故骨不

成數歲不能行。張凡兒生至周歲三百六十日膝

骨成乃能行近世小兒多因父母氣血虛弱故令胎

氣不強骨氣軟弱筋脉無力不能行步麝茸丹主之

曾經大效

湯小兒稟受血氣不足者則髓不滿骨故軟弱而不

能行腎主髓治法當用錢氏補腎地黃丸加鹿茸五

加皮麝香則隨生而骨強自然行矣外甥黃知錄之
子三歲不能行遂合此方服之有驗

張麝茸丹 治數歲不能行

麝香

別研

茄茸

酥炙黃

生乾地黄

虎脛骨

酥塗炙黃

當歸

洗焙乾

黃芪

剉

右件各壹兩為細末用羊髓肆兩煮爛和成膏如黍米大每服十粒摩沉香湯下乳食前日三服

錢

羚羊角丸

治小兒腎虛或病後筋骨弱五六歲不能行宜補益肝腎

不能行宜補益肝腎

羚羊角

尖細而節密者錯取末

虎脛骨

敲破全酥炙黃

生乾地黄

焙

酸棗仁

去皮秤炒

白茯苓

各半兩

桂

去皮取有味處不見火

防風

去蘆頭切焙

當歸

同上

黃芪

切焙各貳錢半

右同為細末煉蜜和成劑每服一阜子大兒大者加之食前溫水化下日三四服又服取效

聖惠生乾地黄丸 治兒十歲不行

生地黄

當歸

焙

防風

酸棗仁

微炒

赤茯苓

黃芪

芎藭

羚羊角

羌活

甘草

炙微赤

桂心

各等分

行

卷

九

三

右壽羅蜜丸如菜豆大食前温酒下十九丸量兒加

減

虎骨散

虎脛骨

酒炙

生乾地黄

酸棗仁

酒浸去皮炒香

辣桂

去皮

白茯苓

去皮

防風

去蘆義

當歸

去蘆

川芎

牛膝

酒浸去蘆各等分

右為極細末每服壹錢半以粥飲調次入好酒二滴再調食前服日二一方用煉蜜丸如黍米大木瓜湯下

三因五加皮散治小兒三歲不能行者由受氣不足

體力虛怯腰脊脚膝筋骨軟足故不能行用真五加皮為末粥飲調次入好酒少許每服一栗殼許日三服効一方五加皮貳錢半木瓜壹錢貳分半為極細末用粥飲入酒二滴調服

寶鑑兒骨熱肺脉寒長不能行顧頤兒自小傷抱

脚纖細無力行立不得或骨熱疳勞肌肉消瘦宜服

柴胡飲

柴胡

鼈甲

米醋塗炙黃

知母

桔梗

枳殼

去穰麩炒

玄參

升麻

骨熱則解之

右件各等分細剉三歲已下藥半兩水五合煎二
合分二服空心食前後忌毒物服後澡浴

澡浴方

苦參

茯苓皮

蒼朮

桑白皮

白礬各半兩

蔥白少許

右剉沸水二升浸藥一兩通與兒浴溫處避風

千金治數歲不行方

葬家未開戶盜食與哺日三便行翼云未開戶與

寶鑑灸兩足踝各三壯

良方左經丸

治筋骨諸疾手足不隨不能行步

動

草烏頭生肉白者

去皮臍

木鼈去殼

白膠香

五靈脂各參兩半

當歸

壹兩

蟹螯去翅足壹兩

攷少醋煮熟

右為末黑豆去皮生杵粉一斤醋糊丸雞頭實大

酒磨下一丸不曾針灸傷筋絡者四五丸必效十

歲兒一丸分三服此藥能通榮衛導經絡專治心

腎肝三經服後小便少淋瀝乃其驗也按此方

非內有汚血痼積不宜用

丁時發治大人小兒剉骨行步艱難脚無力續命丹

防風

乳香

蔓荊子

牛膝

麻黃

羚羊角

酸棗仁

草烏頭

去皮

沒藥

白朮

茯苓

各貳錢半

天麻

酒煮

胡麻

當歸

續斷

各半兩

川烏頭

去皮

黃芪

各肆錢

蒺藜

壹錢貳分半

若為細末蜜丸小彈大每服一九煎酒細嚼一月三五服用後洗藥服藥三日方洗

草烏頭

當歸

地龍

木鼈子

紫貝艸

椒目

葱鬚

荊芥

各壹兩

為末煎湯露脚指甲從上淋洗次用熏法

熏藥方

齒者柴胡所終而備草烏頭也小兒赤小豆氣不足

不能吳茱萸制虛不羌活於骨又安晚蠶沙各壹兩

不末黑豆三升熱水泡少頃去黑豆入前藥煮益盛

尤熏劉閃處令出骨中汗服此丸不應余曰此略

虛疝證也蓋肥兒丸脾胃經之藥又服則腎益虛其

疝益甚不信牙髮漸落余用此黃丸加鹿茸五味子

半載而元氣壯健小兒體瘦眼細行步艱辛齒

藥仁

烏頭

沒藥

白米

茯苓

天麻

胡麻

當歸

續斷

熏陸閃燄令出骨中

朱黑豆三枚燻水碎少煎去黑豆入煎藥蒸益烈

一契萊葉後洗藥部三日方洗即灑心

柴貼頭

草烏頭

決小豆

熏藥式

紫貝州

椒目

為末煎藥靈卍甲鈴山林表大用熏水

齒遲

齒者骨之所終而髓之所養也小兒稟受腎氣不足不能上營而髓虛不能充於骨又安能及齒故齒久不生也地黃丸主之。一小兒三歲言步未能齒髮尤少體瘦艱立發熱作渴服肥兒丸不應余曰此腎虛疳證也蓋肥兒丸脾胃經之藥久服則腎益虛其疳益甚不信牙髮漸落余用地黃丸加鹿茸五味子半載而元氣壯健。一小兒體瘦腿細行步艱辛齒不堅固髮稀短少用六味地黃丸補中益氣湯年餘

諸證悉愈形體壯實

張漢香附丹 治齒不生

大香附子 揀淨刮去皮

沉香 各壹兩

雄鼠糞 燒灰 乾蟾 燒灰

檳榔 各半兩

右件搗羅為細末用羊髓四兩煮爛和成膏如黍米大每服十粒麝香湯下量兒大小加減

湯氏芩黃散 治小兒齒不生

大川芎 生地黄 各半兩 山藥

當歸 甘草 各壹分

右焙為末熱湯調服或時以藥末擦齒齦

千金翼方 溺坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗

之即生

外臺小品又方為取雌鼠屎三七枚以一枚拭齒根

陰處盡此止二十一日齒當生雌鼠屎頭尖是也千

不金同楊氏產乳方用三十枚仍云雌糞用兩頭圓

巨者是

聖惠治小兒齒不生或因落不生方

右取牛糞中黑豆三七枚小開去頭上皮以此豆

頭開處注齒根上時時用之當效也

煎開去其齒上油用之當咬也

古用半糞中黑豆二小升小開去腹去皮以出豆

望惠命小兒齒不生因茶不生衣

昔具

金同髮丹華丹用三十升以云此藥用兩煎圓

與盡出也二十一日齒當生

收臺小品又云 煎地鼠氣二小升以一二升對齒

女鳴坐

千金翼衣 木質中作木生小兒齒不生五日活坐

髮遲

巢氏云足少陰為腎之經其華在髮小兒有稟性少陰之血氣不足即髮疎薄不生亦有因頭瘡而禿落不生者皆由傷損其血血氣損少不能榮於髮也

芎勝丹方 治髮不生

當歸洗焙乾 生乾地黄 芍藥各壹兩

已上搗羅為細末次用

芎勝壹合研 胡粉半兩細研

右件同研勻煉蜜和如黍米大每服十粒煎黑豆

湯下兼化塗搽頭上無妨量兒大小加減

手金箔少小頭不生髮以楸葉搗取汁傳頭上立生

又方 燒鯽魚灰末以醬汁和傳

干金翼治髮薄不生方

先以醋泔清洗禿處以生布指令火熱臘月豬脂

并細研鐵生煎三沸塗之日三遍

本草醜氣水主長毛髮以物於炊飯時承取沫頭

令髮長密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺

有益好

小兒白禿髮不生搗榆皮末苦酒調塗

聖惠生髮神效黑豆膏 治小兒腦疳頭髮連根作

穗子脫落不生兼瘡白禿髮不生者並用生髮

黑豆

苣勝 各叁合

訶黎勒皮 壹兩

右件藥搗羅為末以水拌令勻內於竹筒中以亂

髮塞口用塘灰內煨取油貯於瓷器中先以米泔

皁莢湯洗頭拭乾塗之日再用十日髮生

又方

葛根末

豬脂

羊脂 各貳兩

右件藥入銚子內以慢火熬成膏收於瓷合中每

取一錢塗摩頭上日再用不過五七度效

香膏煎 治小兒白禿不生髮燥痛

陳香膏 貳兩 胡粉 壹兩 豬脂 半兩

右件藥以水一大盞煎香膏取汁三分去滓入胡粉豬脂相和令勻塗於頭上日再用之

聖惠治小兒頭禿不生髮苦痒蔓菁散

右取蔓菁子搗為末以豬脂調塗於禿處佳

又方貫眾燒灰細研油調傅

又方麻子一升熬黑壓取脂傅頭上良

又方鹽湯洗過生油和蒲葦灰傅之 鴈脂 熊白

桃葉汁皆可塗 鷄子黃熬取汁塗

髮及黃

巢氏云足少陰腎經其血氣華於髮若血氣不足則不能潤悅於髮故髮黃也。錢氏曰小兒長大不行行則脚細齒久不生則不固髮久不生則不黑皆屬氣血虛也宜大劑補之

千金翼髮黃方

臘月豬脂和羊屎灰蒲灰等分傅之三日一為取黑止

又方 以醋煮大豆爛去豆煎令稠塗髮

髮黃

又方 熊脂塗髮梳之散頭牀底伏地一食頃即出形盡當黑用之不過一升

安師傳治小兒髮黃極妙方

破故紙不計多少銀石器中慢火炒熟為細末用地黃汁煎成膏和為丸葉豆大每服十五二十九鹽湯送下食前

藥方云凡小兒食積其血氣華於髮黃者宜服此方

髮黃

齒

齒痛清胃散 治胃火牙痛或連頭面

升麻伍分 生地黃 牡丹皮

黃連炒 當歸各叁分

右水煎服加柴胡山梔即加味清胃散。愚按前方治脾胃實火作渴口舌生瘡或唇口腫痛齒齦潰爛焮連頭面或惡寒發熱或重舌馬牙吐舌流涎等證子母並宜服之若因脾胃氣虛寒涼尅伐或虛熱上行口舌生瘡弄舌發熱飲食少思或嘔

力斗九

百九

吐困睡大便不實流涎齟爛者用五味異功散

張漢藁本散 治卒齒痛

藁本 白附子 川芎

莽草 各半兩並搗羅為細末大用 青黛

麝香 各壹錢研細

右件都再研勻每用一字塗指患處

雄黃丸 治小兒牙齒黑蛙氣息疼痛

雄黃 貳錢 麝香 半錢

右為細末軟飯和為挺子安在牙內

外臺肘後用蚘蛭糞水和作團以火燒令

極赤末之如粉以臘月豬脂和傅齒齦上日三即

差

茅先生治小兒牙宣齒縫出血方

苦參 末壹兩 白礬 灰壹錢

右為末一日三次揩牙上立驗也

張銳雞峰方 治齒間血出

右以苦竹葉不以多少水濃煎取汁入鹽少許寒

温得所含之冷即吐了

又方 右用童子小便半升分為三兩次含之冷即

吐了

莊氏麝香散 治小兒唇口臭爛齒斷宜露

麝香

雄黃 生

蘆薈

白龍骨

各壹錢

蜜陀僧

貳錢

石膽

半兩

乾蟾

壹枚重半兩者入餅燒存

右合研令極勻細先用酒

方頭上以鹽擦之藥

水輕輕洗過然後上藥

齒齦腫痛千金翼方

生地黄

獨活

各叁兩

右二味切以酒漬一宿含之

又方 常以白鹽末封齒斷上日三夜二

又方 扣齒三百下日一夜二即終身不發至老不

病齒

又治齒牙根搖欲落方

右以生地黄大者一寸綿裹着牙上嚼燕汁汁盡

去之日三即愈可十日含之更不發也

又齒根腫方

松葉

壹握

鹽

壹合

好酒

叁升

右三味煎取一升含之

治齒根空腫痛困斃無聊賴方

獨活

肆兩

酒

叁升

右二味於器中漬之。燂火煨之。令暖稍稍沸。得半去滓。熱含之。不過四五度。

又方 燒松柏槐枝令熟。往病齒孔。須臾蟲緣枝出。又治牙斷疼痛方

杏仁 壹百枚。去皮尖及雙仁者。

鹽末 方寸七。

右二味以水一升煮。令沫出。含之。味盡吐。却更含。不過再三差。

養生必用治小兒牙方

牛蒡子 炒香壹分。 乳香 壹錢。

右為末入白麵少許。溫水調塗。

又方 用大鵬砂研細。水化雞羽掃。

齩齒 巢氏云。手陽明足太陽之脉。並入於齒。風氣入其經脉。與血氣相搏。齒即腫痛。膿汁出。謂之風齩。

千金翼治齒齩方

右切白馬懸蹄。可孔塞之。不過三度。聖惠方。用夜眼。

聖惠蝦蟆散 治小兒齒痛。風齩連頤微腫。

乾蝦蟆 壹枚。 青黛 細研。 柑子皮

細辛 白雞糞 薰黃 已上各壹分。

麝香 細研。 乾薑 炮裂剉。各半分。

石件藥。搗細羅為散。都研令勻。以薄綿裹少許內。

齒齲齒孔中日一易之

又方

白附子

藁本

細辛

芫蕪

莽草

已上各壹兩

右件藥擣細羅為散以薄縣裹少許着齲齒上

治小兒齲齒風疼及蟲蝕疼痛方

乾蝦蟇壹枚燒灰

青黛壹分

蘆薈半分

右件藥同研令細以生地黄熬作膏塗於齒上

治小兒風齲齒痛及蟲蝕疼痛黑爛方

青黛細研

雞糞白燒灰

藁本

細辛

雄黃細研各壹分

麝香少許細研

右件藥擣羅令細同研令勻旋取少許傅於齒上

又方以郁李根白皮五兩剉以水一大盞半煎取

一盞熱含冷吐之當吐蟲出

又方以皂莢炙去皮子擣末取少許着齒痛上差

又方以松栢脂捏銳如錐柱齲孔內須更齲蟲緣

松脂出即差

又方以雞舌香半兩以水一中盞煎至六分去滓

熱含冷吐

○ 齲齒千金翼治蟲蝕齒疼痛方

右閉氣細書曰南方赤頭蟲飛來入某姓名裂齒裏今得蝎蟲孔安置耐居上急急如律令小牋紙內着屋柱北邊蝎蟲孔中取水一杯禹步如禁法還誦上文以水沃孔以淨黃土泥之勿令泄氣永愈

又治蟲蝕齒根肉黑方

右燒腐棘取諸塗之十遍雄黃末傅即愈若齒黑者以松木灰搯之細末雄黃塗斷百日日再塗之七日慎油猪肉神效

又治齒疔方

右以檐一枚令病人蹲坐橫檐於膝上引兩手尋使極住手伸中指灸中指頭檐上三壯兩頭一時下火病人口誦呪曰噉牙蟲名字鵲莫噉牙莫噉骨炎人亦念之

又治裂齒方

右以腐棘針二百枚以水二升煮取一升含漱之日四五差止

又方取死曲蟾末傅痛處即止

日華子治小兒風疔牙方

右濃煎郁李仁水含之

聚寶黃龍散 治齒斷疳蝕有竅子不合者

龍寶 龍骨中有之深黃或淡黃土蝸色緊掬人舌者是 白礬 灰

蝸牛殼 南粉 牛黃 各壹錢

右五味為末每用少許貼竅子內時時用之

齒落久不生 千金方

右以牛屎中大豆二七枚小開豆頭以注齒根處數度即生

經驗方 治小兒大人多年牙齒不生

右用黑豆三十粒牛糞火內燒令煙盡細研入麝香少許一處研勻先以針挑不生齒處令血出用末少許搯不得見風忌酸鹹物

聖惠治齒落久不生方

右取路傍遺却稻粒於齒落處點三七下其齒自生神效

靈苑治大人小兒生齒神驗方

右用雄雌雞糞各十四顆焙乾同研如粉入麝香少許仍先以針挑破損齒脚下血出將散子傅之年高者不過二十日生年少者十日不計傷損及少自退落並再生

千金治失欠頰車蹉閃不合方

右用一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾出指恐誤嚙傷人指也

又方 消蠟和水傅之

又方治牙車急口眼根引舌不轉方

牡蠣熬

伏龍肝

附子炮去皮

礬石燒

右四味等分末之以白酒和為泥傅其上乾則易之取差止

千金灸法失欠頰車蹉灸背第五椎一日二七壯滿三日未差灸氣衝二百壯曾前喉下甲骨中是亦

名氣堂

又灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯三報

此三陰交穴也

治由風入於腦停積於手太陽之

脈則令耳聾風與濕相搏則兩耳生瘡又見稍大見

月初生以手指之則耳下生瘡者名月蝕瘡又乳母

與兒洗浴候令水入耳中水濕停積搏於血氣蘊結

成膿謂之聾耳。聾耳者心腎之竅肝膽之經也心

腎主肉症精血不足肝膽上下外證風熱有餘或聲嘶

或虛鳴者稟賦虛也或脹痛或膿痒者邪氣客也稟

當疾出指恐誤傷人指也

又方 消蠟和水燻之

又方 治牙車急口眼根引舌不轉方

牡蠣

伏龍肝

附子炮去皮

磁石

右

乾則易

此藥有寒性也

反養其肉則生三下藥中短三下五分百其三羅

藥

氣血二百廿四日初發下中骨中是公

耳

張 小兒耳中諸病由風入於腦停積於手太陽之

脉則令耳聾風與濕相搏則兩耳生瘡又兒稍大見

月初生以手指之則耳下生瘡者名月蝕瘡又乳母

與兒洗浴悞令水入耳中水濕停積搏於血氣蘊結

成膿謂之聾耳。薛耳者心腎之竅肝膽之經也心

腎主內症精血不足肝膽主外證風熱有餘或聾聵

或虛鳴者稟賦虛也或脹痛或膿痒者邪氣客也稟

賦不足宜用六味地黃丸腎肝經風熱宜用柴胡清

功耳也

三

肝散若因血燥用梔子清肝散發熱未應佐以六味

丸瀉若因腎肝疳熱用六味丸

多用蘆薈丸若因食積內熱用四味肥兒丸瀉若因

乳母膏梁積熱而致者宜加味清胃散齒痛脾經鬱

結而致者加味歸脾湯驚悸肝經怒火而致者加味道

遙散虛執皆令乳母服之兼與其兒少許不可專於

治外不惟閉塞耳竅抑亦變生他證延留日久遂成

終身之贖矣慎之。寶鑑歌云太陽入耳損聽聰氣

滯時多耳必聾鳴是風并氣相繫痛應腦戶有邪風

腎熱鬱蒸聾耳患日深疼痛出稠膿不有稠膿非此

患只因滴水入其中。

耳聾巢氏云手太陽之經入於耳內頭腦有風入乘

其脉與氣相搏故令耳聾。

聖惠治小兒風熱兩耳聾鳴方

遠志去心 甘草炙微 柴胡去苗

菖蒲各壹分 磁石叁分搗碎水

麥門冬去心焙

右搗細羅為散每服以葱白湯調下半錢日二服
量兒大小以意加減

張洎通鳴散 治耳聾

力半丸

百

菖蒲 壹寸 玖節者

遠志 去心 各壹兩

柴胡 去苗

麥門冬 去心

防風 各壹兩

細辛

甜葶藶 各壹分

已上搗羅並為細末次入

磁石 壹分 搗碎 水淘去赤汁

杏仁 貳柒箇 湯浸 去皮尖 研

右件都研勻每服半錢煎蔥白湯調下日三乳後

聖惠細辛膏 治小兒耳聾或因腦熱或因水入或因吹着並宜用此

因吹着並宜用此

細辛

防風 去蘆

川大黃 剉散 炒

黃芩 各壹分

川椒 去目 拾粒

蠟 半兩

右件藥細剉用清麻油三合煎藥紫色濾過下蠟

候消為膏每日三度用一大豆大點於耳中

聖惠治小兒耳聾不差方

甜葶藶

杏仁 湯浸 去皮

鹽 各等分

右件藥搗研如膏以少許豬脂和合煎令稠以綿

裹如鞋核大塞耳中日一易之

又方

松脂

菖蒲 末

烏油麻 各半兩

右件藥相和搗熟綿裹如一紅豆大塞耳日一易

又方

菖蒲 末 壹分

杏仁 湯浸 去皮尖 研如泥 半兩

力斗丸

百七

右相和研令乳入每用少許綿裹內耳中日一易

又方

右取葱白於煨灰中煨令熟以葱白頭內耳中日

三易

又方

蓖麻子去皮拾枚棗肉同搗如膏每取麩核大綿裹

少許塞耳中日一易

又方

右搗芥子令爛以人乳和綿裹少許塞耳中日一

易之

麝香散 治沉耳

麝香

少許

白礬

壹錢 火煨

五倍子

貳錢

右件為末紙撚子點入耳中少許

耳鳴巢氏云邪氣與正氣相搏故令耳鳴又即邪氣

停滯遂成聾也

喜鳥散 治小兒耳自鳴日夜不止

菖蒲

烏頭

各肆分

右為末綿裹內耳中日再

耳痛

千金翼治耳疼痛方

耳

方十九

耳

附子 炮去波 菖蒲

右二味等分裏塞之

耳瘡 證治見心部瘡瘍條

耳 巢氏云耳宗脉之所聚腎氣之所通小兒腎藏盛而有熱者熱氣上衝于耳津液壅結即生膿汁亦有因沐浴水入耳內而不傾瀝令盡水濕停積搏於血氣蘊結成熱亦令膿汁出皆為之聾耳久不差即變成聾也

張漁紅藍花散 治聾耳久不差

紅藍花 洗焙 黃蘗 剉各壹兩 烏魚骨

黃芩 各半兩 已上搗羅為細末次用

雄黃 水磨細 麝香 壹分研細

右件都研勻細以絲纏搵藥塞耳中日再換

田氏紅玉散 治小兒膿耳

枯白礬 乾臙脂 麝香 各壹錢

右同研勻先以綿裹杖子擦淨搽之

湯氏龍黃散 治小兒停耳汁出不止

枯白礬 龍骨末 黃丹 炒各半兩

麝香 壹錢

右同研細先以綿杖子擦膿水盡用散一字半分

為兩處吹入耳內日二次

耳停耳硫黃末傅之日一夜一妙

秘要用蚰蟻灰末吹入立效有瘡者傅之

孫真人方同

薛氏云諸外治方但可治腑證之輕者若係肝經風熱血燥等證必依前方論內服合宜之藥外用此以收膿濕亦無不可若專泥攻而失內治誤矣

耳詳見雜病準繩

黃芩 小醫論 日十餘...

五軟

五軟者頭軟項軟手軟脚軟肌肉軟口軟是也無故不舉頭腎疳之病項脉軟而難收治雖暫瘥他年必再發手軟則手垂四肢無力亦懶擡眉若得聲圓還進飲食乃慢脾風候也尚堪醫治肌肉軟則肉少皮寬自離喫食不長肌肉可服錢氏橘連丸虛羸莫教瀉利頻併却難治療脚軟者五歲兒不能行虛羸脚軟細小不妨榮衛但服參耆等藥併服錢氏地黃丸腎長大自然肌肉充滿口軟則虛舌出口陽盛更須隄

力耳九

百廿二

防必須治膈却無妨唇青氣喘則難調治也。薛夫
頭軟者臟腑骨脉皆虛諸陽之氣不足也乃天柱骨
弱腎主骨足少陰太陽經虛也手足軟者脾主四肢
乃中州之氣不足不能營養四肢故肉少皮寬飲食
不爲肌膚也口軟者口爲脾之竅上下齟齬手足陽
明陽明主胃脾胃氣虛舌不能藏而常舒出也夫心
主血肝主筋脾主肉肺主氣腎主骨此五者皆因稟
五臟之氣虛弱不能滋養充達故骨脉不強肢體痿
弱原其要總歸於胃蓋胃水穀之海爲五臟之本六
腑之大源也治法必先以脾胃爲主俱用補中益氣
湯以滋化源頭項手足三軟兼服地黃丸凡此證必
須多服二藥仍令壯年乳母飲之兼慎風寒調飲食
多能全形。曾戴氏論五軟證名曰胎怯良由父精
不足母血素衰而得誠哉是言以愚推之有因母血
海久冷用藥強補有孕者有受胎而母多疾者或其
父好色貪酒氣體虛弱或年事已邁而後見子有日
月不足而生者或投墮胎之劑不去而竟成孕者徒
爾耗傷真氣苟或有生譬諸陰地淺土之草雖有發
生而暢茂者少又如培植樹木動搖其根而成者鮮
矣由是論之嬰孩怯弱不耐寒暑縱使成人亦多有

疾爰自降生之後精髓不充筋骨痿弱肌肉虛瘦神色昏慢才為六淫所侵便致頭項手足身軟是名五軟治法用調元散補腎地黄丸漸次調養日久乃安若投藥不效亦為廢人○有小兒體肥容壯不為瘦瘁忽然項軟傾倒此名下窳皆因肝腎氣虛客邪侵襲風府傳於筋骨故成斯疾蓋肝主乎筋腎主乎骨筋骨俱弱則項軟垂下無力又名天柱倒與五軟相類不遠治同前藥○吳江史萬湖子七歲患吐瀉顛目頓陷天柱骨倒兼面赤色先用補中益氣湯加附子一劑吐瀉止而諸證愈又用錢氏地黄丸料煎服頓安○一小兒七歲夏間過食生冷之物早間患吐瀉面赤作渴手足並熱項軟顛陷午後面色頓白手足並冷脉微欲絕急以六君子湯加附子一劑諸證頓退顛頂頓起而安小兒元氣易虛易實故雖危證若能速用對病之藥亦可回生者○一小兒九歲因吐瀉後項軟面白手足並冷脉微細飲食喜熱余先用六君子湯加肉桂五劑未應更加炮薑四劑諸證稍愈面色未復八脉未起佐以八味丸月餘面色微黃稍有胃氣矣再用前藥又月餘飲食略增熱亦大減乃朝用補中益氣湯食前用八味丸又月餘元氣

漸復飲食舉首如常又月餘而肌肉充盛諸病悉愈
。一。小兒十二歲瘧疾後項軟手足冷飲食少思粥
湯稍離火食之即腹中覺冷用六君子湯加肉桂乾
薑飲食漸加每飲食中加茴香胡椒之類月餘粥食
稍可離火又用前藥百劑飲食如常手足不冷又月
餘其首能舉後飲食停滯患吐瀉項仍痿軟朝用補
中益氣湯夕用六君子湯及加減八味丸兩月餘而
項復舉畢姻後眼目昏花項骨無力頭自覺大用八
味丸補中益氣湯三月餘元氣復而諸證退後每入
房勞役形氣殊倦盜汗發熱服後二藥即愈。一。小
兒十五歲手足痿軟齒不能嚼堅物內熱補熱小便
澀滯如淋服分利之劑小便如淋服滋陰之劑內熱
益甚服燥濕之劑大便重墜余謂此稟腎氣不足早
犯色慾所致故精血篇云男子精木滿而御女以通
其精五臟有不满之處異日有難狀之疾老人陰已
痿而思色以降其精則精不出而內敗小便澀痛如
淋若陰已耗而復竭之則大小便牽痛愈痛則愈復
愈便則愈痛正謂此也遂朝用補中益氣湯夕用六
味丸加五味子煎服各三十餘劑諸證漸愈後夢遺
諸證復作手足時冷痰氣上急用十全大補湯加減

八味丸料各八劑。二便稍利手足稍溫仍用前二藥三月餘元氣漸復飲食如常又飲食停滯吐瀉腹痛按之不疼此脾胃受傷也用六君子湯加木香肉豆蔻治之其吐未已左尺右關二脉輕診浮大按之如無經云腎開竅于二陰用五味子散四服大便頓止後又傷食噯酸作瀉大便重墜朝用補中益氣湯夕用六君子湯加木香乾薑而痊。一老年得子四肢痿軟而惡風寒見日則喜余令乳母日服加減八味丸三次并食大補湯一劑兼與其子年餘肢體漸強至二週而能行。一小兒五歲稟父腿軟不便於行早喪天真年至十七畢姻後腿軟頭顛自覺開大喜其自謹寓居道舍遂朝服補中益氣湯夕用地黃丸料加五味子鹿茸煎服年餘而健。一小兒項軟服前二藥而愈畢姻後患解顛作渴發熱以二藥作大劑煎熟代茶恣飲兩月餘而渴熱減年餘而顛頤合又年餘而肢體強若非慎疾雖藥不起。

天柱倒王先生云小兒父患疴疾體虛久不進飲食患來日久諸候退只是天柱骨倒醫者不識謂之五軟候須進金靈散生筋散。形證論歌天柱纔倒道難醫筭來此病非心脾若患先須因吐瀉不曾調氣

至疋羸大患傷寒無汗脉却被傷寒無浮脉此一句云定應妙藥療他遲無此卒然生此患又兼不辨四肢肥身軟難堪頭似石面紅唇赤臉如緋此病多應傷腎熱後來因熱病相隨此兩句在風髓經即云此患只肝受熱風天柱倒但將涼藥與維持貼須性熱筋方緩立見温和請莫疑吐瀉項軟唯調氣傷寒柱倒不須醫。此或傷寒或吐或瀉乘虛邪毒透入肝脉熱邪所侵是致令筋軟長或手足軟而不解舉或項頸軟而不解舉若有前證即須涼膈若吐瀉則先調胃氣貼項并服涼肝膽藥不可太熱亦恐過冷

金靈散

右用白僵蠶不拘多少直者去絲炒為末每服半錢一錢薄荷酒調下一日三服更須用生筋散貼之

生筋散

木鼈子

參箇

蓖麻子

參拾箇

右各取肉同研每用一錢許津唾調貼急抱指項上令熱貼之

四十八候貼項藥方

川烏頭

白芷

地龍

五更天柱倒

力斗九

百廿七

五靈脂

赤小豆 各等分

右末生薑自然汁與酒同調貼在項上更服竹茹散

竹茹散

菊花 叁錢

黃芩

人參 各壹錢

大黃 半兩

甘草 貳錢

右為末竹葉煎湯下

三十六種貼項藥方

草烏頭

赤小豆 各等分

右為末薑汁調攤帛上貼經宿項立起

貼頭起項膏 治小兒肝熱膽冷頭項軟倒

川烏 末

肉桂 末

芸薹子

天南星

蓖麻子 各壹錢

黃丹 炒壹錢七

右大蒜一頭煨熟去皮乳鉢內研和藥細每用一

錢入米醋和勻貼項上一日許

狼毒丸 治小兒膽熱肝風天柱倒折宜服此藥更

用前起頭貼項藥

狼毒 酒浸焙

白附子

大附子 尖

天麻

防風

羌活 已上各壹分

朱砂

地龍 去土各壹錢

麝香 半字

右為細末法酒煮糊為丸如小豆大每服七丸至十五丸用黑豆薄荷湯入酒下

田前豉煎黃連

身毒武胡命小兒煎燕用風天林固蘇宜類此藥更

趁人米醋味臣胡更上一日信

古大蒜一煎熟去皮厚檢肉和藥味用一

天南星

煎和十

黃乳

以魚木

肉桂木

共薑干

胡更豉煎膏切臣小兒煎燕用風天林固蘇宜類此藥更

五鞭

五鞭者仰頭取氣難以動搖氣壅作痛連於胸膈脚
手心冷而鞭此陽氣不營於四末也經曰脾主四肢
又曰脾主諸陰今手足冷而硬者獨陰無陽也故難
治若肚筋青急者木乘土位也急用六君子湯加炮
薑肉桂柴胡升麻以復其真氣若係風邪當參驚風
治之此證從肝脾二臟受患當補脾平肝仍參急慢
驚風門治之。百問云如審係風證依中風治之必
有回生之理小續命湯加減

五鞭

九十九

一百九

小續命湯 治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃 去節 人參 黃芩

川芎 芍藥 甘草 炙

杏仁 去皮尖炒 漢防已 官桂 去皮 各半兩

防風 柴錢半 附子 炮去皮臍 柴錢半

右除附子杏仁外擣為麤末次入二味夾和每一

錢薑棗煎食前服有熱去附子官桂減半

經云諸暴強直皆屬於風故收此方非的風證勿

用

寒熱往來

凡寒熱往來無定期其有定期者瘧也。巢氏曰風邪外客於皮膚而痰飲內漬於腑臟致令血氣不和陰陽更相乘剋陽勝則熱陰勝則寒陰陽之氣為邪所乘邪與正相干陰陽交爭時發時止則寒熱往來也。全生指迷論曰若其人翁翁如熱淅淅如寒無有時度支節如解手足酸疼頭目昏暈此由榮衛虛弱外為風邪相乘搏於陽則發熱搏於陰則發寒久不治成勞宜荆芥散。又曰若寒熱如瘧不以時度

三六

腸滿膨脹起則頭暈大便不通或時腹痛胸膈痞悶
此由宿穀停留不化結於腸間氣道不舒陰陽交亂
宜備急丸。經曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則
外熱陰盛則內寒寒熱往來此乃陰陽相勝也故寒
氣并於陰則發寒陽氣并於陽則發熱寸口脉微為
陽不足陰氣上入陽中則惡寒尺脉弱為陰不足陽
氣下入陰中則發熱陽不足則先寒後熱陰不足則
先熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭也又上盛則
發熱下盛則發寒陽盛則乍熱陰盛則乍寒陰陽相
勝虛實不調故邪氣更作而寒熱往來或乍寒乍熱
也少陽膽者肝之府界乎太陽陽明之間半表半裏
之分陰陽之氣易於相乘故寒熱多主肝膽經證以
小柴胡湯加減調之若祇見寒熱起居如常久而不
愈及大病後元氣未復悉屬陰虛生熱陽虛生寒宜
用八珍湯虛補之甚者十全大補湯汗有食積為病
亦令寒熱用保和丸宿消之若兼嘔吐泄瀉用六君
子湯瀉厥冷飲熱人參理中丸瀉作渴不止七味白
朮散渴食積既消而寒熱尚作者肝邪乘脾所勝侮
所不勝也用異功散吐加柴胡山梔其瘧證寒熱詳
見瘧門

瘧門

湯食積寒熱如瘧渴瀉氣急要合地臥此候先當取
 下積只用平胃散次常服進食丸平胃散見不乳食進食丸見積
 錢曹宜德子三歲面黃時發寒熱不欲食而飲水及
 乳不止眾醫以為潮熱用牛黃丸不愈及以止渴乾
 葛散服之反吐錢曰當以白餅子下之後補脾乃以
 消積丸磨之此乃解也後果愈何以故不食但飲水
 者食伏於脾內不能消化致令發寒熱用止渴藥吐
 者藥衝脾故也故下之即愈

子和高巡檢子八歲病熱醫者皆為傷冷治之以熱
 藥欲飲水水禁而不與內水涸竭煩躁轉生前後皆
 閉口鼻俱乾寒熱往來咳嗽時作遍身無汗又欲灸
 之適遇戴人戴人責其母曰重裋厚被煖炕紅爐兒
 已不勝其熱尚可灸乎其母謝以不明戴人令先服
 人參柴胡飲子遂連進數服下爛魚腸之類臭氣異
 常渴欲飲水聽其所欲水雪冷水連進數杯節次又
 下三四十行大熱方去又與通膈丸牛黃丸復下十
 餘行兒方大痊前後約五十餘行略計所用冰雪水
 飲計一斛向灸之當何如哉

太醫局小柴胡湯 治大人小兒傷寒溫熱病身熱
 惡風頸項強急胃滿脇痛嘔噦煩渴寒熱往來身

面皆黃小便不利大便秘鞭或過經未解或潮熱不除及差後勞復發熱頭痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作有時及產後傷風頭痛煩熱並宜服之

柴胡去蘆頭 秤半斤 黃芩 人參去蘆頭 秤

甘草炙各 參兩 半夏湯洗 柴次焙 乾秤 貳兩半

右五味同為麤末每服三大錢以水一盞半入生薑五片棗壹枚擘破同煎至七分濾去滓稍熱服不拘時小兒分作二服更量大小加減

張漢秦芫湯 治小兒寒熱往來

秦芫去苗 醃炙 微黃 去 鼈甲羸爛 各壹兩

川大黃剉碎 微炒 麻黃去根節 各半兩 竹茹

甘草炙各 壹分

右件擣羅為麤散每服一錢水一盞入蔥白二寸同煎至五分去滓溫服量兒大小加減

人參前胡散

人參去蘆頭 前胡 柴胡去苗 各 壹兩

桔梗 地骨皮 甘草炙

半夏湯洗 柴遍焙 乾各半兩

右件擣羅為細末每服一大錢水一小盞入生薑

二片煎至半盞去滓放溫服量兒大小加減

芍藥湯

赤芍藥 壹兩

黃芩

當歸 剉焙

柴胡 各半

肉桂

甘草 炙各壹分

右件搗羅為細末每服一錢水八分一盞入生薑

二片棗一枚同煎至五分去滓溫服量兒加減

王氏手集柴胡人參湯 治小兒脾熱生風往來寒

孰和柴胡飲子有黃芩

柴胡

人參

芍藥

茯苓

甘草 炙各等分

右每服二錢水一盞入生薑三片煎至四分溫服

金生指迷荆芥散

荆芥穗

人參

白朮

當歸 切洗

黃耆

芍藥

桂 去粗皮 各壹兩

柴胡 去苗 貳兩

甘草 炙半兩

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

金生指迷備急丸

大黃 濕紙裏煨

巴豆 去皮心

乾薑 去皮各等分

右為細末煉蜜和丸如豌豆大每服一丸米飲下

羸人服一丸如棗豆大以大便快利為度

○

千金治小兒生一月至五月乍寒乍熱方

右細切柳枝煮取汁洗兒若渴絞冬瓜汁飲之

○ 水鑑孩子百日內忽有寒熱何以治之與冷藥喫即

乳寒嘔逆若與熱藥治之其病加甚無神法聖術因

循喪兒之命博覽石室秘方用之應妙歌云

桃花廕末一錢餘甘草衝湯力更殊藍花只消一

兩字陰灌之入口立消除右三味為末每服半

錢湯調灌之

○ 莊氏家傳療少小卒寒熱不佳不能服藥李葉浴兒

方

右用李葉不拘多少煮湯浴兒又白芷又苦參

○ 玉訣云先調氣次解虛熱熱不去下真珠丸取

真珠丸治小兒寒熱虛積五臟煩滿及下風涎積

滯驚食疳積

南星

半夏

滑石各末貳錢

輕粉肆錢七

巴豆貳柒粒去心油

右末之麵糊丸芥子大每服十五二十九煎葱湯

吞下

○ 嬰孺六味湯治少小寒熱進退啼呼腹痛

地黃

桂心各捌分

芍藥

○

○

○

寒水石

黃芩炙

甘草炙各

右切細以水三升煮一升半一歲兒二合至三合量與服之

大黃丸 療小兒寒熱食不生肌肉

大黃壹兩蒸之 桂心貳斗米下

乾薑炮各貳分

巴豆伍拾粒去皮心熬 消石叁分熬無者以芒硝代之

右五味擣篩四味別擣巴豆令如泥合和以蜜更擣二千杵丸如梧子每一丸湯服之但熱在臍上當吐在臍下當利預作粥如服已吐下丸法服藥兩食頃不吐下以熱飲動之若不得吐下可更服

一丸半能藥壯人可二丸此藥優於他下藥丸故

宜大小下多冷粥解之若有瘡綿挺如指蜜和一

丸塗挺頭且內瘡中噉出之不差更作溫病不得

大便服之得下佳宿食不消亦服之飛尸遁尸漿

服半丸日一應須更止心腹脹滿痛服一丸瘡者

依發日宿勿食清晨服一丸丁壯人服二丸得吐

下忍飢過發時乃食婦人產後血結中奔走起上

下或絕產無子或月經不調面目青黃服半丸小

兒淋瀝寒熱臍脹大腹不欲食食不生肌三四歲

如麻子大一丸日一服六七歲兒服二丸比三十

日心腹諸病差兒小半之愈大良忌野豬肉蘆筍
生蔥。按病兒若無實積或有積而虛皆不宜用

此若疳勞一路自當求之肥兒之屬

聖惠柴胡散 治小兒寒熱往來乳食不下四肢無

力心腹脹滿上焦痰壅漸漸羸瘦

柴胡 去苗

鼈甲 塗醋炙令黃色
去羣爛各壹兩

人參

前胡

桔梗

訶梨勒皮

地骨皮

赤芍藥

杏仁

湯浸去皮尖雙
仁炒微黃

甘草

炙微赤

陳橘皮

湯浸去白焙
各半兩

右件藥擣篩為散每服一錢水一小盞煎至五分

去滓不計時候溫服量兒大小加減

五味子散 治小兒寒熱往來不欲乳食羸瘦心脹

五味子

當歸 剉碎
微炒

人參

桔梗

前胡 名去
蘆頭

白朮

赤茯苓

黃芩 各用
壹分

甘草

半分炙
微赤剉

麥門冬

半兩去
心焙

右件藥擣麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至

五分去滓溫服日三四服更量兒大小以意加減

人參散 治小兒寒熱往來食少羸瘦

人參 去蘆頭

黃芪 剉

柴胡 去苗

白茯苓

鼈甲 塗醋炙令黃去棗爛

木香 各半

甘草 炙微

白朮

桃仁 湯浸去皮尖雙仁

炒微黃

訶梨勒皮 參分

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調下半錢量兒大小加減服之

黃芪丸 治小兒往來寒熱多汗心煩小便赤黃不

欲乳食四肢羸瘦

黃芪 剉

麥門冬 去心

赤茯苓

白朮

子芩

甘草 各壹分

柴胡 去苗

鼈甲 塗醋炙令黃去棗爛各半兩

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如棗豆大每服以粥

飲下五丸日三四服量兒大小加減

張漢香甲散 治寒熱往來肌瘦

鼈甲 炙黃

木香 各壹

川大黃 微炒

陳橘皮 去白

當歸 洗焙

柴胡 去苗

知母

甘草 炙各半兩

檳榔 參枚

右件搗羅為麤散每服一錢水一小盞入生薑二片煎至六分去滓溫服量兒大小加減

盛則陽虛故先寒戰慄腰背頭項骨節皆痛陽氣獨
勝則陰虛故先熱發時不嗜食善嘔頭疼腰痛小便
不利陰盛陽虛則內外皆寒陽盛陰虛則內外俱熱
此外感六淫或內傷七情蘊積痰飲病氣與衛氣併
居故病日作衛氣晝行於陽夜行於陰得陽而外出
得陰而內薄內薄五臟病氣深入不能與衛氣俱出
則間日而作當衛氣所至病氣所在則發在陽則熱
在陰則寒經曰亢則害極乃反俟陰陽各衰衛氣與
病氣相離則病休陰陽相搏衛氣與病氣再集則病
復各隨其衛氣之所在與所中邪氣相合而然也先
寒後熱者先傷寒而後傷風名曰寒瘧先熱後寒者
先傷風而後傷寒名曰溫瘧但熱不寒者名曰瘧瘧
身重寒熱骨節痛腹脹滿自汗善嘔名曰濕瘧但寒
不熱者名曰牝瘧蓋瘧之為病為證非一故處方之
制隨其陰陽虛實脈病證治汗吐下溫對證施治以
平為期然百病中人必因其正氣之虛感受邪氣留
而不去其病為實自表傳裏先汗後下古今不易故
治瘧之法必須先表用百解散驚水薑葱煎投次小
柴胡湯往來寒熱加桂水薑棗煎服以和解表裏之邪自
然作效。若表裏實用當歸散潮熱五和湯裏熱或烏犀

病

外和九

此積六聖丸積下之勻氣散痼止補後以藿香飲

食加草菓良薑水薑棗煎投正胃氣去寒邪則自平

復如解表後寒熱往來以二仙飲本條截之寒熱既

除用平胃散不乳食加茴香湯腹痛和勻鹽湯空心調服

溫胃燥脾進美飲食使中州之士既實則外邪不戰

而自屈此為明論有寒多熱少經久不愈致脾胃

弱飲食減神色變薑丸木條及清脾湯木條為治。醒

經曰夏傷於暑秋必痲瘧其證先起於毫毛伸欠乃

作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破

渴欲冷飲蓋邪氣并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰

勝則寒陽勝則熱陰陽上下交爭虛實更作故寒

間發也有一日一發二日一發三日一發有間一日

連二日發有日與夜各發有上半日發下半日發及

發於夜者有有汗有無汗此其略也以詳言之當分

六經五臟及痰食勞暑鬼瘴之不同六經五藏瘴詳見雜病準繩

痰瘴者胸膈先有停痰因而成瘴令人心下脹滿氣

逆煩嘔是也食瘴者是飲食傷脾其人噫氣吞酸胸

膈不和是也勞瘴者久而不瘥表裏俱虛客邪未散

真氣不復故疾雖間遇勞即發是也暑瘴者其人面

垢口渴雖熱已退亦常有汗是也鬼瘴者進退無時

瘴

外和九

百三

是也。瘧瘧者感山嵐瘴氣其狀寒熱休作有時是也。久而不愈名曰瘧瘧。瘧瘧老瘧也。老瘧不愈結癖於兩脇之間名曰瘧母。此先失於解散或復外感風寒肉傷飲食故纏綿不已也。治法風暑之邪從外而入宜解散之。解表後即宜扶持胃氣故丹溪曰無汗要有汗散邪為主。有汗要無汗固正氣為主。驟發之瘧宜解表。久發之瘧宜補脾。寒瘧宜溫。溫瘧宜和。瘧瘧宜清。挾痰則行痰。兼食則消食。勞瘧宜安。暑瘧宜解。鬼瘧宜祛。瘧瘧宜散。此亦其略也。更以詳言之。則熱多寒少者小柴胡湯。寒多熱少者清脾飲。子無汗者桂枝麻黃各半湯。有汗者柴胡桂枝湯。汗多渴者白虎湯。渴而小便不利者五苓散。小便赤熱多而渴者小柴胡湯。熱多汗出腹滿便悶者大柴胡湯。渴加葛根。痰瘧者二陳湯。痰加柴胡黃芩。甚者加枳實。食瘧者先用大安丸。宿食次用異功散。瀉吐勞瘧瘧瘧並用補中益氣湯。熱暑瘧者十味香薷飲。鬼瘧者鬼哭散。瘧瘧者四獸飲。瘧母者鱉甲飲。凡脾胃虛而患瘧者不拘有汗無汗三陰六經悉以六君子湯為主。熱多加柴胡山梔。寒多加乾薑肉桂。有汗加黃芪浮麥。無汗加蒼朮葛根。元氣下陷及肝木乘脾並加升麻柴胡。

為善若用青皮草果常山等藥以為攻截良法正氣益虛邪氣益深是多延綿不止而為勞熱者有矣若乳母七情六欲飲食不調或寒熱似瘧肝火熾盛致兒為患者又當治其乳母斯無誤矣

金生指迷論曰寒熱之病或寒已而熱或熱已而寒若寒熱戰慄頭痛如破身體拘急數欠渴欲飲冷或先寒而後熱或先熱而後寒或晡時而發或間日而作至其時便發發已如常此謂之瘧瘧脈自弦弦數多熱弦遲多寒此皆得之於冬中風寒之氣藏於骨髓之中至春陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑而後與邪氣相合而發寒多者宜溫之與薑桂湯熱多者宜解之與栝蒌湯寒熱等者宜調之與鼈甲湯大人小兒瘧疾若寒從背起冷大如手不甚戰慄似欲發熱而汗出或即頭痛嘔吐時作其脈遲小此由脾胃素弱因氣寒而收聚水穀不能剋化變而成痰伏痰在內陰上乘陽陽為陰所乘所以作寒逼而成汗宜服旋覆花丸半硫丸

金生指迷

小柴胡湯

往來寒熱

金生指迷

詠藪根

肆兩

柴胡

去苗捌兩

人參

痛

黃芩

甘草

炙各參兩

右為麤末每服五錢水二盞生薑三片棗一枚擘

破煎至一盞去滓溫服

寒多於熱

清脾飲子 治瘧瘧脉弦數但寒不熱或

寒多熱少膈滿不食口苦舌乾煩渴小便黃赤大

腸不利

青皮

炒

厚朴

薑製

白朮

草果

柴胡

茯苓

半夏

湯泡柒次

黃芩

甘草

炙各等分

右每服貳錢水煎

在生指迷薑桂湯

乾薑

牡蠣

火煨通赤

甘草

炙各貳兩

桂

去粗皮取心參兩

柴胡

捌兩

蘇蘇根

肆兩

黃芩

貳兩活人書用參兩

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

不拘時候

草果飲

治寒多熱少手足厥冷遍身浮腫肚暗收疼

痛

厚朴

薑製

青皮

草菓

藿香

甘草

丁皮

痛

効斗九

百五五

神麩

良薑

半夏麩

右等分咬咀薑棗煎空心服

清脾湯 治諸瘧久不瘥者脾胃虛弱形容憔悴

厚朴

去粗皮薑汁拌勻

烏梅

打破去仁

半夏

湯煮透瀉

良薑

坐用東

青皮

去白各半兩

甘草

炙卷錢

草菓

炮去殼取仁貳錢半

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分未發

前併三服仍忌生冷油膩疴果毒物

一薑丸 治瘧疾往來寒熱經久不瘳者

良薑

壹兩剉片白薑壹兩剉片巴豆豉粒去

右為細末用豬膽汁和水煮麵糊丸麻仁大送帶潤以朱砂為衣熱多用溫湯早晨面北空心送下寒多亦於清旦用溫酒面南空心嚥服若寒熱相停用陰陽湯以一半冷水一半熱湯參和是也不拘向南北投服

寒熱相

胡黃連散

治小兒瘧

人參

胡黃連

草菓

檳榔

甘草

柴胡

各等分

右剉散水一盞煎三分服

張漢桃仁湯

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

鼈甲

酥炙微黃去棗爛各壹兩

桂心

黃芩

赤茯苓

川升麻

各半兩

右為麤散每服壹錢水壹小盞煎至伍分去滓溫

服量兒大小加減

金生指迷鼈甲湯

鼈甲

湯浸刮淨醋炙黃

白朮

桂

去皮

常山

柴胡

去苗各壹兩

牡蠣

半兩火煅赤

右為麤散每服伍錢水貳盞煎至壹盞去滓溫服

張漢烏梅丹 治小兒發寒瘧甚者

烏梅肉 炒乾

母丁香

乾漆

微炒

當歸

桂心

各半兩羅為粗散

已上搗

麝香

貳錢半細研

右件拌勻煉蜜和丸如黍米大每服拾粒粥飲下

量兒大小加減

金生指迷旋復花丸

旋覆花

桂心

枳實

麩炒

人參

各伍分

乾薑

芍藥

白朮

各陸分

茯苓

狼毒

烏頭

炮去皮

礞石

火煨壹伏時各捌分

細辛

二苗

力斗丸

厚朴

大黃

濕紙裏煨

黃芩

葶藶

炒

厚朴

去粗皮
薑汁炙

吳茱萸

炒

芫花

炒

橘皮

洗各
肆分

甘遂

叁分
炒

右為細末煉蜜和丸如梧子大米飲下三丸未知
加至七丸小兒黃米大二丸

半硫丸

半夏

湯洗柒
次叁兩

硫黃

貳兩研飛

右為末生薑汁煮麵糊丸如桐子大每服三十丸
米飲下不拘時候小兒黍米大二五丸

熱而不寒湯治瘰癧但熱不寒方田黃丹煨通紅臨

發蜜湯調下能飲酒用酒調一法專服小柴胡湯

次服人參前胡湯

張漢知母丹 治小兒發熱瘧甚者

知母

微炒

鼈甲

酥炙去
殼爛

川大黃

細剉
微炒

赤茯苓

朱砂

細研水飛
各壹兩

川芒硝

川升麻

各半
兩

龍腦

壹錢研

右件同拌勻煉蜜和丸如黍米大每服五粒至七
粒生薑湯下大便利下即愈量兒大小加減

活人書治瘧疾但熱不寒者

知母

陸兩

甘草

貳兩

石膏

壹斤

瘧

桂去皮秤

粳米貳合

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至八分去滓服

外散風暑之邪

桂枝麻黃各半湯 治發熱自汗或

無汗

桂枝

白芍藥

生薑

甘草炙

麻黃各壹錢

杏仁拾粒湯泡去皮尖

右水壹鍾大棗貳枚煎四分食遠服

知母麻黃湯 治傷寒或十數日或半月二十日終

不惺惺常昏沉以上皆神言語錯謬之無寒熱醫

或作鬼祟或作風疰多服治之不瘳或朝夕潮熱

頰赤或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心胞

絡間所致

知母

麻黃去節

甘艸炙

芍藥

黃芩各半兩

桂枝去麤皮半兩盛暑者可

半

右剉散每三錢水一盞煎七分去滓溫服令微汗

若心煩不眠欲飲水當稍稍與之令胃氣和即愈

未汗再服大小加減

柴胡桂枝湯

治瘧身熱多汗

功科九

百五十八

柴胡 捌錢

黃芩

桂枝

芍藥

甘草 各叁錢

半夏 貳錢半

右每服二三錢薑棗水煎

白虎加桂湯 治小兒瘧疾發渴

石膏 伍錢碎

知母 壹錢

甘草 伍分

桂枝 伍分

右水壹盞粳米壹撮煎服

十味香薷散

香薷 壹兩

人參

白朮

黃耆

橘紅

白扁豆

乾木瓜

厚朴 薑製

白茯苓

甘艸 炙各半兩

右為細末每服壹錢不拘熱湯或冷水調下

高麗參 治小兒或風寒內傷生冷濕中快

高麗能辟山嵐瘴氣寒瘧脾胃虛寒

厚朴 薑汁炙

蒼朮 米泔浸去皮剉炒

半夏 湯泡各壹兩

藿香

草果仁

茯苓

人參 各半兩

甘草 炙

橘紅 各貳錢半

右剉散每服叁錢水壹盞薑棗片烏梅壹箇煎陸

分去滓熱服煎治冷飲傷脾發為瘧疾或中脘虛

寒嘔逆惡心寒瘧加桂

又方

陳皮湯浸去白甘草參錢半

厚朴薑製

半夏各參錢人參

草果各貳錢

白茯苓肆錢

藿香洗柴錢

青皮去穢

三稜煨

蓬茂煨

大腹皮各壹錢半

蒼朮

烏梅各伍錢

右剉散每服參錢薑棗水煎

四獸飲 治陰陽相勝結聚涎飲為瘧兼治瘴瘧

半夏

茯苓

人參

白朮

草菓

橘紅各壹分

甘草減半

右用烏梅薑棗濕紙裏煨香熟焙乾入藥每服三錢水煎服

鬼疰鬼哭散 止瘧疾

常山

大腹皮

白茯苓

鼈甲醋炙

甘艸各等分

右除甘草鼈甲炙外三味不得見火用桃柳枝各七寸同煎臨發略吐涎不妨只用常山白茯苓甘

草亦効

癰

千金大五補湯 治大人小兒時行後變成瘡

瘡

桂心 壹兩貳錢半

遠志

桔梗

川芎 各貳兩

茯苓

芍藥

人參

白朮

熟地黃

當歸

黃耆

甘艸 各叁兩

竹葉 伍兩

半夏

麥門冬 去心 各壹斤

生枸杞根

生薑 各壹斤

大棗 貳拾枚

右十八味以水三斗煮竹葉枸杞取二斗內諸藥煮取六升分六服一日一夜令盡之小兒量大小加減以一合至二合漸服至一升止

聖惠犀角散 治小兒熱瘡氣為瘡

犀角屑

甘草 炙微赤 剉

川大黃 剉碎 微炒

知母 各半兩

鼈甲 壹兩 塗醋炙 黃去裙襴

柴胡

常山 各柒錢半

右擣羅為麤散每服壹錢以水壹小盞煎至伍分去滓溫服日三四服量兒大小加減

截瘡 三聖丸 治諸瘡不拘遠近

穿山甲 湯浸透取甲碎剉同熟灰 鎰內慢火焙令焦黃色

雞骨常山

雞心檳榔 貳味各壹兩 薄剉曬乾

方科

百五

右件再晒為末水煮糯米粉為糊丸棗豆大就帶潤以紅丹為衣陰乾每服參拾丸至伍拾丸未發前隔晚用酒空心投一服重者二服經久不瘥下

祛瘧丹

二仙飲 治同前

青蒿

去梗五月五日採晒乾用貳兩

桂枝

去粗皮半兩二味俱剉焙為細末

右每服壹錢寒熱未發前用涼酒調服或先隔晚以酒調下加香薷葉鹹好茶芽兩合研成末又名新那飲治證同法療暑瘧尤勝服法同前服

祛瘧丹 治瘧經久不瘥

常山

細生貳兩

烏梅

種核壹兩海州

紅丹

好者半兩

右除烏梅屋瓦別焙常山或晒或焙仍同烏梅紅丹研為細末糯米粉煮糊丸麻仁大每服三十九至五十九丸未發前涼酒空心送下或隔晚酒下重者二服輕則一服忌雞麵羊生冷飲食毒物

瘧

瘧甲飲子

治瘧久不愈腹中結為癥瘕名曰瘧母

鼈甲

醋炙

白朮

黃芩

草果

檳榔

芫蕘

橘紅

甘草

厚朴

力斗丸

厚朴

白芍藥各等分

右為咬咀水壹鍾薑參片棗壹枚煎服

經効瘡丹 治瘡母結癬寒熱無已

真阿魏 雄黃各貳錢半 硃砂壹錢半

右沸湯泡阿魏研散雄朱和之稀麵糊丸梧桐子大每服壹丸人參湯候冷空心服瘡瘡桃枝湯冷服臨發磨壹丸傅鼻頭口畔

瘡母丸

鼈甲醋炙 三稜 義茂各醋浸透

右為細末神麴糊丸如菜豆大每服貳拾丸白湯下量兒大小加減 癬消一半即止

消癬丸

芫花陳久者良好醋煮十數沸去醋以水浸壹宿晒乾 朱砂另研水飛

右為末蜜丸二百日兒黍米大貳丸日二服不知稍加之

瘡後浮腫 大腹皮湯 治小兒瘡疾用藥太早退熱

變作浮腫外腎腫大飲食不進

大腹皮 檳榔 三稜

蓬莪茂各伍錢 蒼朮 枳殼各貳兩

甘草叁錢

右劉散每服三錢生薑皮蘿蔔子椒目同煎

青皮湯 治小兒瘧後浮腫兼寒熱不退飲食不進

白朮 茯苓 厚朴 青皮

陳皮 半夏 大腹皮 檳榔

三稜 蓬莪茂 木通 甘艸各等分

右咬咀每服三錢薑水煎

按上方皆尅泄元氣之藥若病久脾虛而作腫者當以錢氏異攻散為主少佐以五皮湯方見雜病水腫誤用此必至不救

尅病

尅音奇小鬼也乳下嬰兒未能行而母更有娠其兒病

微微下利寒熱去來毛髮鬢鬢以為有惡鬼神導其

腹中胎妬嫉而為此故名曰尅病也以他人相近亦

能相繼亦曰繼病妊娠婦人不必悉能致尅亦時有

此爾女子氣血上為乳汁下為經水小兒飲交乳且

病况其大分已榮于胎而乳汁之漓可知能無使兒

病乎則又何鬼神之咎為也千金灸伏翼熟嚼哺兒

而懷妊者帶伯勞鳥毛白馬眼不能滋榮氣血乃徒

剝裂禽獸。○海藏云生者為相繼死者為傳尸有脉而無氣謂之尸厥有氣而無脉謂之行尸。○丁奚露哺客忤無辜四異病也。○陽易陰易百合狐惑四奇病也。

龍膽湯 治嬰兒出腹血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣吐乳者若已能進哺中滿食不消壯熱及變蒸不解中客入鬼氣并諸驚癇方悉主之。

龍膽草

柴胡

黃芩

桔梗

釣藤皮

甘艸

茯苓

芍藥冬貳錢半 蜣螂貳枚

大黃

右為剝散以水一升煮取五合為一劑十歲已下小兒皆可服若兒生一日至七日分一合為三服八日至十五日分一合半為三服十六日至二十日分二合為三服二十日至三十日分三合為三服皆以得下為止此劑為出腹嬰兒所作若日月長大者亦依此為例必知客忤及有魘氣者可加人參當歸各貳錢半一百日兒加一錢一字二百日兒加二錢半一歲加半兩餘藥皆倣此

聖惠甘草散

治小兒中魘面色白赤而復變青者

如醉色故復發作面赤若青黑色繞口不治覺病候晚者死覺之早者所中邪氣未入臟腑又微引乳者可服此

甘草 炙微赤

龍骨

赤茯苓

牡礪 燒為粉

生乾地黃

黃芩

桂心 各壹分

當歸 半兩剉

右件藥擣麤羅為散每服一錢以水一小盞入淡竹葉七片煎至五分去滓入白蜜一錢更煎一兩沸量兒大小以意加減溫服日三四服

大黃丸 治小兒中魅挾實

川大黃 坐碎

白鮮皮

甘草 炙微赤

犀角屑

黃芩

赤茯苓

赤芍藥 各壹分

右件藥擣麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小加減日三四服

張漁虎骨丹 治被魅病

虎頭骨 微炙

鬼臼 去手

草龍膽

鬼箭 各壹兩

琥珀

白膠香 各半兩

右件擣羅為細末煉蜜和在如黍米大每服十粒乳香湯下量兒大小加減

越病

力斗丸

百藥

古書書解為味未與香味或黍米大母煎十粒

東海 各壹兩

黃芩

白粳香

各半兩

武庫骨

康白

草薺

非與武骨共

宗姪

黃芩

正合去辛量良大小瓜越日三四瓶

古抄藥書蠶羅魚精并煎

雞以水一小盞煎至

赤芍藥

各壹分

軍用酒

黃芩

赤芍藥

大黃

各壹分

白糲支

什草

各半兩

客忤

巢氏云小兒中客忤者是小兒神氣軟弱忽有非常之物或未經識見之人觸之與兒神氣相忤而發病謂之客忤也亦名中客又名中人其狀吐下青黃白色水穀解離腹痛反倒天矯面變易五色其狀似癇但眼不上插耳其脉弦急數者是也若失時不治久則難治若乳母飲酒過度醉及房勞喘後乳者最劇能殺兒也其脉急數者宜與龍膽湯下之加人參當歸各如龍膽秤分等多少也千金論少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之

客忤

力斗九

百七

三七五

一名中人是爲客忤也。雖是家人或別房異戶，雖是乳母及父母，或從外還衣服經履，鬼神羸惡暴氣，或牛馬之氣，皆爲忤也。執作喘息，乳氣未定者，皆爲客忤。凡小兒衣布帛綿中，不得有頭髮履中，亦爾。自來青帶青衣白帶，皆令中忤。凡非常人及諸物從外來，亦驚小兒致病。欲防之法，諸有從外來人及異物入戶，當將兒避之，勿令見。若不避者，燒牛屎令常有煙氣，置戶前則善。小兒中客爲病者，無時不有此病也。而秋初一切兒皆病者，豈一切兒悉中客邪？切兒所以春冬少病，秋夏多病者，秋夏小兒陽氣在外，血脈嫩弱。秋初夏末晨夕時有暴冷，小兒嫩弱，其外則易傷暴冷，折其陽陽結則壯熱，胃冷則下痢。故夏末秋初小兒多壯熱而下痢，未必悉是中客及魃也。若治少小法，夏末秋初宜候天氣溫涼，有暴寒卒冷者，其少小則多患壯熱而下痢也。慎不可先下之，皆先殺毒後下之耳。小兒中客急視其口中懸癰，左右當有青黑腫脈核如麻豆大，或赤或白或青如。此便宜用針速刺潰去之，亦可爪摘決之，并以綿纏釵頭拭去血也。少小中客之病，吐下青黃赤白汁腹中痛及反倒偃側，喘似瀉狀，但目不上插，少睡耳面。

變五色其脉弦急若失時不治小久則難治矣欲療之方用豉數合水拌令濕擣熟丸如雞子大以摩兒額上足心各五六遍畢以丸摩兒心及臍上下行轉摩之食頃破視其中當有細毛卽擲丸道中痛卽止真珠散 治客忤驚風鬼疰驚邪痰熱心舍不寧精神不定心常怔忡睡中驚跳時或咬牙五心煩熱有汗兼喘面赤舌白呵欠煩渴小便赤瀉或吐利黃沫常服辟邪安神

真珠

海螵蛸

滑石

各壹錢

白茯苓

八參

白附子

甘草

全蝎

麝香

腦子

另研各伍錢

生珠

另研壹錢

金箔

叁拾片

銀箔

貳拾片

右末和勻半錢煎燈心麥門冬湯入蜜少許調服日午臨卧各一

譚氏殊聖治客忤方

忽爾連連哭不休渾身壯熱脉如鈎驚啼不得寃神鬼客忤傷心不自由犀角雄黃相共搗桃符煎水看稀稠人參茯苓車前子丸喫三服請不憂

安神丸

客忤

幼科

百病

生犀末

半錢

雄黃

研

人參

茯苓

車前子

各壹分

右為末取桃白皮一兩桃符一兩二味以水三升同煎至一升去滓更煎成膏和前藥丸如麻子大每服三丸芍藥湯下

又方 小兒哽氣築心連喘息多愁胃口涎唯有此疾宜早治為緣客忤氣相煎看看病狀醫難效速取真珠散半錢龍腦生犀香附子小兒餐了保身安

真珠散

真珠末

肆錢

生犀末

貳錢

香附子末

錢

龍腦

半字

右同研每服一字桃仁湯調下乳母忌生冷油膩一切毒物半月

張渙辟邪膏 嬰兒血氣未實皆神氣軟弱除父母及乳養之常照管外不可令見生人及抱往別房異戶及不可見牛馬獸畜等其父母家人之類自外及寅夜行歸家亦不可見兒恐經履鬼神粗惡暴氣若犯人令兒吐下青黃赤白水穀解離其狀似發癩者但眼不上戴眊不弦急名曰客忤凡斷乳小

兒亦有中惡卒暴者亦宜服此藥立至蘇省

降真香

白膠香

沉香

虎頭骨

鬼臼

草龍膽

人參

白茯苓

看伴各半兩擣羅為細末次入水磨雄黃半兩細

研水飛次研麝香一錢都拌勻鍊蜜和如雞頭大

每服壹粒煎乳香湯化下及別丸如彈子大用綠

絹袋子盛令兒衣服上帶之仍卧內常燒神妙

田客忤因而驚忤者治法用甯中黃土研二兩雞子

一枚去殼二件相和入少許水調先以桃柳枝湯浴

兒後將此藥塗五心及頂門上

無擣法用甯中黃土

法塗之

治卒客忤噤口不能言細辛桂心等分納口中効

元和紀用經療小兒客忤擣菖蒲汁內口中又

生艾汁納口中又磨刀水三四滴妙又用好墨

擣篩和水溫服半錢匕

申人恠茅先生小兒生下犯人禁候面青黑合兩眼

閉吐逆不下乳此候因生下來不免外人看問或有

腋氣或因婦人月假不淨或外人帶邪神觸着生下

來夾故乳哺使觸異氣之物氣血未就又被風邪擊

客忤

九種丸

百三

致此所治者先用朱砂膏方見驚積明中乳上吮下後用鎮

心丸驚夾腥脾散與服即愈如見不下乳眼視

壯硬死候犬凡初生下兒子家中人不可便與

外人入房看問人家各有神祇又恐婦人腋氣及月

假不淨觸着恐中客忤此即是養兒之法

千金方剪取驢前膊脾上旋毛犬如彈子大以乳汁

煎之令毛消藥成著乳頭上飲之下喉即瘉又燒

母衣帶三寸并髮合乳汁服之又取牛鼻津服之

又取牛口沫傳乳頭飲之

台少不見人來不佳腹中正史云寸毛多

月向來不人函上書一書

細末和乳飲兒即愈

中馬忤千金論曰凡諸乘馬行得馬汗氣臭未盥洗

易衣裝而便向兒邊令兒中馬客忤兒卒見馬來及

聞馬鳴驚及馬上衣物馬氣皆令小兒中馬客忤慎

護之特重一歲兒也其狀腹痛吐下青黃白色水

穀解離甚者致天

千金治小兒中馬客忤法中客中人皆可用

用粉為丸如鼓法摩兒手足心及心頭臍上下行

轉摩之呪曰摩家公摩家母摩家子兒苦客忤從

百三

百三

我始扁鵲雖良不如善唾良呪訖棄龙道中

又法

取一刀橫竈上解兒衣發其心腹訖翼發作撥取刀持

向兒呪之唾輒以刀擬向心腹啡啡音非出煌煌

日出東方背陰向陽葛公葛公不知何公翼云葛公葛母

不知子來不視去不顧過與生人忤梁上塵天之

神戶下土鬼所經大刀環犀對竈君二七唾客愈

一兒驚唾啡啡每唾以刀擬之呪當三遍乃畢用豉

丸亦如上法五六遍訖取此丸破視其中有毛葉

丸道中人馬客忤即愈矣

簡要濟衆治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面前燒

令兒嚥烟氣日燒之差為度

又方取馬口角沫塗兒口中效

大小若喉鳴順理榮衛平則神守強則邪不干正行
精氣衰弱則鬼毒惡氣中之其狀先無他病卒然心
腹刺痛悶亂欲死是也凡此等症大面滿赤紫大而
浮者死緊細而微者生餘勢不盡停滯臟腑之開更
發後變為疰也治法先下餘合香丸末醒以皂角
末搗鼻末服沉香降氣湯加人參茯苓又能辟邪容

取之乃橫竈上解其衣公其心腹訖作發取刀持
向兒呪之唾輒以刀擬向心腹咩咩咩咩咩
日出東方背陰向陽為公為公不知何公
何物于來不視之不顧也與人背梁上座天之
下七鬼所居大刀環屏
天衣如黑口前赤傘良口中慘
今良燕臥床日熱之甚為變此九破視其中有毛
聞要齊眾亦小良中黑毒容件姐黑草於良面前熱

中惡

巢氏云小兒中惡者是鬼邪之氣卒中於人也無問
大小若陰陽順理榮衛平調神守強則邪不干正若
精氣衰弱則鬼毒惡氣中之其狀先無他病卒然心
腹刺痛悶亂欲死是也凡中惡腹大而滿脉緊大而
浮者死緊細而微者生餘勢不盡停滯臟腑之間更
發後變為疰也。治法先下蘇合香丸未醒以皂角
末搐鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓又能辟邪客
忤亦宜服

蘇合香丸

治傳屍骨蒸諸項勞瘵順氣化痰卒暴

心痛鬼魅瘧疾霍亂吐瀉赤白下痢小兒驚搐

蘇合香油伍錢人安安息香壹兩另為末用無

丁香

青木香

白檀香

沉香

藁撥

香附米

訶子煨取肉

烏犀鎊屑

硃砂研水飛

薰陸香

片腦研各伍錢

麝香柒錢半

右為細末用安息香膏入煉蜜和劑圓如芡實大

空心用沸湯化下小兒一丸老人四丸酒下亦可

用蠟紙裹一丸彈子大用緋絹袋盛常帶之一切

邪神不敢近去腦名麝香蘇合丸治一切邪神及

胸膈噎塞腸中虛鳴宿食不消餘證並同

沉香降氣湯

降真香

沉香

白膠香

虎脛骨酥炙

人參

鬼箭

草龍膽各伍錢

右為末次入雄黃五錢麝香壹錢煉蜜丸乳香湯

化下又令兒帶及燒卧內尤妙

葛氏肘後救卒死或先病痛或常居寢卧奄然而絕

皆是中惡救之方

右取葱黃心刺其鼻男左女右入七八寸小兒量
度之若使目中血出佳扁鵲法同是後吹耳條中
萬言此云刺鼻故別為一法

又方 右令二人以衣塞口吹其兩耳極則易人可
以筒吹之並捧其肩土側身遠之莫臨死人上

又方 右以葱葉刺耳耳中鼻中血出者莫恠無血
難治有血是候時當捧兩手忽放之須臾死人目
當舉手撈人言痛乃止又男刺左鼻女刺右鼻中
令人七八寸餘大效小兒量度之亦治自縊死此
與扁鵲方同

又方 右以繩浸酒中須臾置死人鼻中手按令
汁入鼻中并持其手足莫令驚

又方 右視其上唇裏弦有兒如黍米大以針決去
之

又方 右以小便灌其面數迴即能語此扁鵲法也

又方 右末皂莢如大豆吹其兩鼻中嚏則氣通矣

又方 右割雄雞頸取血以塗其面乾復塗并以灰
營死人一周

又方 以管吹下部令數人互吹之氣通則活

千金治卒忤方 此病即今人所謂中惡者與卒死

鬼擊亦相類為治皆參取而用之

右鹽八合以水三升煮取一升半二服得吐即愈
備急方云治鬼擊若小便不通筆頭七枚燒作灰
末和服之即通

聖惠桃奴散 治小兒中惡心腹堅脹疼痛顏色青

黑大便不通

桃奴 伍枚

甘草 壹分炙

麝香 細研 壹錢

杏仁 貳拾枚湯浸去皮

桔梗 去蘆頭

赤芍藥

黃芩

柴胡 去苗

川升麻

川大黃 剉微炒

鬼臼 去毛烙 半兩

右件藥擣麤羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至

五分去滓不計時候溫服以利為度量兒大小以

意加減

聖惠鬼箭羽散 治小兒中惡心堅強卒痛欲困

鬼箭羽

真珠 末各壹分

羚羊角 屑

桔梗 去蘆頭

川朴硝

川升麻

赤芍藥

柴胡 去苗

黃芩 各半兩

桃仁 拾枚湯浸去皮尖

川大黃 壹兩剉

右製服法同前

聖惠雄黃丸 治小兒中惡心痛辟除邪氣

雄黃

細研

真珠

末各半兩

麝香

牛黃

各細研壹錢

巴豆

貳拾粒去皮膜心研紙裏壓出油

右件藥都研令勻入棗瓢及鍊蜜和圓如粟米大每服以薄荷湯下三丸量兒大小加減服之

嬰孺鬼箭羽湯

治小兒中惡心腹堅強卒痛欲困

鬼箭羽

叁分

朱砂

壹分

羚羊角

屑

桔梗

鬼臼

朴硝

湯成下各半分

升麻

芍藥

柴胡

各壹分

黃芩

陸分

大黃

捌分

桃仁

肆拾玖箇炒去皮尖

大小與服之

葛氏肘後灸法以繩圍其死人肘腕男左女右畢伸繩從背上大椎度以下又從此灸橫行各半繩此法三灸各三即起又令爪其病人人中取醒不起者捲其手灸下文頭隨年壯又灸鼻中三壯也又灸頤下宛宛中各承漿穴十壯大効又灸兩足大指爪甲聚毛中七壯此華陀法一云三七壯又灸臍中百壯也

子中子推此華到孝一三三小推又炎觀中百推也
家家中各本幾穴十推大咬又炎兩足大推爪甲舉
其手及下文而翻手推又炎鼻中三推也又炎測下
三灸各三咱跌又令爪其入入中艱難不跌者推
蘇丹背土大推更以可又并北炎對汗谷半蘇北去
傳刃相對炎者以蘇圍其爪入相測畏法古文古畢中
大小與別文

卒死

巢氏云小兒卒死者是三虛而遇賊風故無病倉卒
而死也三虛者乘年之衰一也逢月之空二也失時
之和三也有人因此三虛復為賊風所傷使陰氣偏
竭于內陽氣阻隔于外而氣壅閉陰陽不通故暴絕
而歿也若肺臟未竭良久乃蘇亦有兼挾鬼神氣者
者須邪退乃生也凡中客忤及中惡卒死而邪氣不
盡停蓄心腹又乃發動多變成症也
茅先生卒死候眼合齧齒遍身如綿軟面青黑口鼻

此候因本生下而遍身熱或因有驚患醫人一向退熱不曾下得驚積及疳積遂積聚被邪氣至此

右前件三箇候都來一般只是要辨元初受患根源治之急下奪命散與吐下風涎醒後便下勻

氣散二服補除後下朱砂膏鎮心丸與服

如有伏熱來時卽下大附散與調理二三日安

樂前件三箇形候只是此一般調理上件疾見鷓聲上啼偏搐汗如珠不得睡眠障淚出死候不

治

要路治小兒卒死而吐利不知是何病方

右以... 取汁灌之無濕者水煮乾者有乾汁

葛氏肘後救卒死而壯熱者

右用礬石半斤水一升半煮消以漬脚令沒踝

又方救卒死而目閉者

右用騎牛臨面擣薤汁灌之耳中

又方救卒死而四肢不收屎便者

右取牛洞一升溫酒灌口中洞者稀糞也

千金卒死無脉無他形候陰陽俱竭故也

右用牽牛臨鼻上二百息牛舐必差牛不肯舐着

鹽汁塗面上即牛肯舐

又方 右炙熨斗熨兩脇下

備急方云 又治尸厥

治魘死不自覺者方

右用慎燈火勿令人手動牽牛臨其上即覺若卒不能語取東門上雞頭末之以酒服

治卒魘死方

右搗韭汁灌鼻孔中劇者灌兩耳

張仲

景云灌口中

治鬼魘不悟方 右末伏龍肝吹鼻中

又方 右末皂莢如大豆許吹鼻中嚏則氣通起死

人集驗方云 治中惡

聖惠治小兒卒死方

右取女青末半錢用牛乳汁調服之

又方 右燒積豬糞水解取汁服之

又方 右以苦參醋煮汁少許內口中即蘇水煮亦

得又酒煮爛棺木板取汁服少許

又方 右煎鹽湯令極鹹以物拗口開灌之令入腹

即活

又方 以熱湯和灰厚擁身上逡巡即蘇

嬰孺治小兒不知所病便死絕方

右取雄雞冠臨兒口上割血滴入口下即活

肘後灸法 卒死而四肢不收屎便者灸心下一寸
臍上三寸臍下四寸各一百壯兒小者隨年

千金治卒死 針間使各百餘息

又灸鼻下人中一名鬼客廳肘後方云
又治尸厥

昇又歌蕭關詩木对短少精

又云 古以苦參調黃代少精口中嚼蘇木為衣

又云 古熱瘧瘧毒木雜短少精

又云短少青末半錢用半升水調服之則氣通也

聖惠小兒卒死法

鬼持

巢氏云小兒神氣軟弱精爽微羸而神魂被鬼所持
錄其狀不覺有餘疾直爾痿黃多大啼喚口氣常臭
是也 嬰童寶鑑小兒鬼持歌云小兒氣弱命中衰
魂魄多應被鬼持其候痿黃多哭地不須用藥可求
師 鬼氣歌云 鬼氣皮膚裏相傳臟腑間腫虛如
水病瘳癢似驚癩熱發渾身澀心攣痛所攢小兒還
有此服藥急須看

圖經治鬼持方 右用虎睛爪并指骨毛以繫小兒

臂上辟惡鬼

外臺深師五邪丸

療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不

識人此為鬼忤當得殺鬼丸方

丹砂

雄黃 各別研

龍骨

馬目毒公

鬼箭 各伍兩

鬼臼 貳兩

赤小豆 參兩

芫青 壹枚

桃仁 百枚 去皮尖熬別研

右九味擣下篩細絹篩合諸藥并令勻調後內蠟和之犬如彈丸絳囊盛之繫臂左女右小兒繫頭谷藥勿令婦人鷄犬見之所服蜜和圓如梧子大一服三丸日三服忌五辛生血物

疰病

尸疰 蟲疰

巢氏云疰之言住也謂其風邪鬼氣留人身內也人無問大小若血氣虛衰則陰陽失守風邪鬼氣因而客之留住肌肉之間連滯腑藏之內或皮膚掣動遊易無常或心腹刺痛或體熱皮腫沉滯至死死又疰易傍人故為疰也小兒不能觸冒風邪多因乳母解脫之時不避溫涼暑濕或抱持出入早晚其神魂軟弱而為鬼氣所傷故病也

千金治小兒疰方

疰病

疰病

疰病

右用竈中灰鹽等分相和熬熨之

千金太乙備急散 主卒中惡客忤五尸入腹鬼刺

鬼非及中蠱疰吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒

陰毒病六七日方

雄黃

芫花

桂心

各貳兩

丹砂

蜀椒

藜蘆

各壹兩

巴豆

各壹分

附子

炮裂去皮臍伍分

野葛

叁分

右九味巴豆別治如脂餘合治下篩以巴豆合和更搗令勻調以銅器中密貯之勿泄有急疾水服

吐在臍下利在四肢當汗止之尸

湯沃雪手下皆愈祕之非賢不傳

千金治疰病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病方

獺肝

壹具

雄黃

莽草

丹砂

鬼白

犀角

巴豆

各壹兩

麝香

貳分

大黃

牛黃

各壹兩

蜈蚣

壹條

右十一味末之蜜圓空腹服如麻子大二圓加至三圓以知為度

尸疰

巢氏云尸疰者是五尸之中一尸疰也人無問小大
腹內皆有尸蟲尸蟲為性忌惡多接引外邪共為患
害小兒血氣衰弱者精神亦羸故尸疰因而為病其
狀沉嘿不的知病之處或寒熱淋漓涉引歲月遂至
於死死又疰易傷人故名之為尸疰也。張漢論小
兒亦有疰病與大人所病無異久後疰易傷人傳染
骨肉如尸疰蠱毒之類是也。

外臺張仲景治大人小兒飛尸走馬湯方

巴豆去心皮 杏仁去尖各貳枚

右二味取綿纏槌令極碎投熱湯二合捻取白汁

服之須臾差未差更一服老小量之通療鬼疰有

尸疰者常蓄此藥用驗心野豬肉蘆筍備急同

聖惠木香散 治小兒尸疰心腹滿脹疼痛不可忍

木香 鬼箭羽 桔梗去蘆頭

當歸剉微炒 紫蘇至葉 檳榔各半

右件藥搗羅為粗散每服壹錢以水壹小盞入生

薑少許煎至五分去滓不計時候溫服更量兒大

小加減服之

犀角散 治小兒尸疰及中惡諸病皆主之

犀角屑 川升麻 木香

川大黃

對碎微炒

桑根白皮

剉

檳榔

各半兩

麝香

壹錢細研

桃仁

貳柒枚湯浸去皮尖雙仁麝炒微黃

右件藥搗細羅為散每服以溫水調下半錢日四

五服更量兒大小加減服之

張漢雌黃丹 治尸疰病

雌黃

雄黃

各細研

川大黃

慢火炮

鬼臼

去毛各壹兩

桃仁

各拾箇湯浸去皮尖研

白頭翁

半兩已上並為細末次用

麝香

壹分另研

巴豆

拾粒去皮心膜細裏壓去油

上兩藥和諸藥成膏服如

黍米大三粒至五粒煎湯冷下量兒大小加減

立効湯

川大黃

炮剉

乾桃

柳葉

洗焙乾

梔子仁

赤芍藥

各半兩

已上搗羅為細末次用

朱砂

細研水飛壹兩

麝香

別研

雄黃

別研各壹分

右件都拌勻每服壹錢蜜湯調下量兒大小加減

蟲疰

巢氏云人聚蛇蟲雜類以器皿盛之令相噉食餘一存者即名為蟲能變化或隨飲食入腹食人五臟小兒有中者病狀與大人老子無異則心腹刺痛懊悶

急者即死。緩者涉歷歲月。漸深羸困。食心藏。盡利血。心藏爛。乃至死死。又疰易傷人。故為蠱症也。
外臺注療大人小兒蠱症百病。癥瘕積聚。瘦削骨。肉。大小便不利。卒忤遇惡風。臏脹腹滿。淋水轉相。注。殫門盡戶。延及男女外孫。醫所不能療。更生汁。七物紫參丸方。

紫參

人參

半夏

湯洗

藜蘆

代赭石

桔梗

白薇

肉苁蓉

石膏

大黃

牡蠣

丹參

各壹分

蝦蟆

燒灰

烏頭

炮各肆分

狼毒

柒分

附子

炮伍分

巴豆

柒拾枚去心皮熬

右件藥。搗篩蜜和為圓。以飲下。如小豆壹丸。日叁服。老小以意減之。蜂蠆所螫。以塗其上。神良。忌豬羊肉冷水。一方無蝦蟆。有乾薑四分。
聖惠殺羊角散。治小兒中蠱腹內堅如石。面目青黃。小便淋瀝。變易無常。

殺羊角

屑

蘘荷

各壹兩

梔子仁

柒枚

赤芍藥

牡丹皮

黃連

去鬚各壹分

犀角

屑半兩

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至五分去滓溫服日三四服更量兒大小加減

又方

敗鼓皮

參分炙

苦參

剉

蘘荷根

各壹兩

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至五分去滓溫服日三四服更量兒大小加減服之

升麻散 治小兒初中蠱毒

川升麻

桔梗去蘆

蘇蘇根各半兩

右搗羅為麤散每服壹錢以水壹小盞煎至五分去滓溫服日四五服更量兒大小加減

雄黃散 治小兒飛蠱狀如鬼氣者宜服

雄黃

麝香

各細研

犀角

末各半兩

右件藥都研令勻每服以溫水調下半錢匕日四五服量兒大小加減

治小兒五種蠱毒悉主之方

右搗馬兜鈴根細羅為散每服壹錢以水壹小盞煎五分去滓空腹頓服當時隨吐蠱出未快吐即

再服

又方 右用敗鼓皮壹片燒灰細研為粉空心以粥飲調服壹錢病人須臾當呼蠱主姓名病便愈

又方 右用薺芫壹兩擣羅爲末以粥飲調下壹錢
甚効量兒大小加減服之

治小兒畏忌中蠱欲死方

右用甘草半兩生剉以水一中盞煎至五分去滓
分爲二服當吐蠱出若平生預防蠱者宜熟炙甘草
草煮汗服之卽內消不吐神効

治小兒中蠱毒令腹內堅痛面目青黃淋露骨立病
變無常方 右用桃株寄生貳兩擣細羅爲散如
茶點服之日四五服

又方 右用麝香半錢細研空腹以溫水調服卽吐
出蠱毒未効再服

治小兒中蠱下血欲死方

右取生赤雌雞翅下血服之立効

又方 右擣青藍汁頻頻與半合服

嬰孺雄黃丸 治小兒疰病諸蠱魅精氣入心入腹

刺痛黃瘦骨立

雄黃

雌黃

丹砂

野丈人

徐長卿

大黃

麝香

羚羊角

右爲末以青羊脂和丸百日兒酒服黍大三九日

進二服或豆大亦可

張漢雄麝散 專治蠱毒病

雄黃 水磨者 細研 麝香 別研 殺羊角 屑

赤芍藥 敗鼓皮 炙黃各壹兩 馬兜鈴根

薺苳 鬼臼 去毛各半兩已上除雄黃麝香外擣羅為細末

右件八味都一處拌勻研細每服半錢濃煎甘草湯調下食前

麝犀湯

犀角屑 鬼箭 安息香

水磨雄黃 細研各壹兩 苦參

牡丹皮 各半兩 已上搗羅為細末次用

麝香 半兩 細研

右件都拌勻每服壹錢水壹大盞煎至五公去滓放溫時時服

元祐辛未六月十一日午後採來

右幻科全部合二十冊五月小畫十七日期起

至今今日合三十四日終休未切執中梅而酷暑

病身從來懶惰尚以不堪起坐故摩引云

野出射方十一翁於危陽城下御園町

西類射書之 文乙五

幼利證治準繩集之九終

