

治準

六之一



漢	書	門	類
1110	1110	1110	1110
冊	架	函	號

內	閣	文	庫
漢	書	類	號
1110	1110	1110	1110
冊	架	函	號

內閣文庫			
番號	漢	13010	
冊數	120 (28)		
函號	301	64	



證治準繩第六冊目錄

大
小腑門

泄瀉滯下總論

滯下 卽痢疾

大小便不通

大便不通

閉癰遺尿總論

小便不通

淋 胞痺


小便數

小便不禁

小便黃赤

遺精

赤白濁



前陰諸疾

陰縮 陰縱 陰痿 陰汗 臊臭 陰冷 陰痒 陰吹

陰腫痛

疝

交腸

腸鳴

脫肛

穀道痒痛

痔

證治準繩第六冊

金壇王肯堂輯

泄瀉滯下總論

泄瀉之證水穀或化或不化並無努責惟覺困倦若滯下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相雜雖有痛不痛之異然皆裡急後重逼迫憊人
潔古論曰藏府瀉利其證多種大抵從風濕熱論之是知寒少熱多寒則不能久也故曰暴泄

非陰久泄非陽論云春宜緩形形緩動則肝木
乃榮反靜密則是行秋令金能制木風氣內藏
夏至則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕
則餐泄身熱脉洪穀不能化重則下利膿血稠
粘裏急後重故曰諸泄稠粘皆屬於火經曰溲
而便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是
為重劑黃芩芍藥湯是為輕劑是實則泄其子
木能自虛而脾土實矣故經曰春傷於風夏為
餐泄此逆四時之氣人所自為也

此一節熱泄所謂滯下也

有自太陰脾經受濕而為水泄虛滑身重微滿
不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜泄之法
云宜補宜泄宜和宜止和則芍藥湯止則訶子
湯久則防變而為膿血是脾經傳受於腎謂之
賊邪故難愈也若先利而後滑謂之微邪故易
安也此皆脾土受濕天之所為也雖聖智不能
逃口食味鼻食氣從鼻而入留積於脾而為水
泄也

此一節濕泄所謂泄瀉也

有厥陰經動下利不止其脉
沉而遲手足厥逆膿血稠粘此為難治宜麻黃

湯小續命湯汗之法云謂有表邪縮於內當散
表邪而自愈此一節風泄也有暴下無聲身冷自
汗小便清利大便不禁氣難布息脉微嘔吐急
以重藥温之漿水散是也此一節寒泄也故法曰
後重者宜下腹痛者宜和身重者宜除濕脉弦
者去風膿血稠粘者以重藥竭之身冷自汗者
以毒藥温之風邪內縮者宜汗之則愈驚澹為
利宜温之而已又曰在表者發之在裏者下之
在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小

便澀者分利之又曰盛者和之去者送之過者
止之兵法曰避其來銳擊其惰歸此之謂也
凡病泄而惡寒太陰傳少陰為土來尅水也用
除濕白朮茯苓安脾芍藥桂枝黃連破血火邪
不能勝水太陰經不能傳少陰而反助火邪上
乘肺經而痢必白膿也加當歸芍藥之類是已
又裏急後重脉大而洪實為裏實證而痛甚
是有物結墜也宜下之若脉浮大慎不可下
雖裏急後重脉沉細而弱者謂寒邪在內而氣

散也可溫養而自安。裏急後重閉者大腸氣
不宣通也宜加檳榔木香宣通其氣若四肢慵
倦小便少或不利大便走沉困飲食減少宜調
胃去濕白朮芍藥茯苓三味水煎服白朮除脾
胃之濕芍藥除胃之濕熱四肢困倦茯苓能通
水道走濕。如發熱惡寒腹不痛加黃芩為主
如未見膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連
為主桂枝佐之如腹痛甚加當歸倍芍藥如見
血加黃連為主桂枝當歸佐之。如煩燥或先

便白膿後血或發熱或惡寒非黃連不能止上
部血也如惡寒脈沉先血後便非地榆不能除
下部血也如惡寒脈沉或腰痛或臍下痛非黃
芩不能除中部血也如便膿血相雜而脈浮大
慎勿以_レ大黃下之_レ下之_レ必死_レ謂氣下竭也而陽
無所收_レ凡陰陽不和_レ惟以_レ分陰陽之法_レ治之_レ
又曰暴泄非陰久泄非陽有熱者脈疾身動聲
亮暴注下迫此陽也寒者脈沉而細身困鼻息
微者薑附湯主之身重不舉木附湯主之。渴

引飲者是熱在膈上水多入則自胸膈入胃中
胃本無熱因不勝其水胃受水攻故水穀一時
下此證當灸大椎三五壯立已乃督脉瀉也如
用藥使車前子雷丸白米茯苓之類五苓散亦
可又有寒泄者大腹滿而泄又有驚澹者是
寒泄也驚者鴨也大便如水其中有少結糞者
是也如此者當用天麻附子乾薑之類又法
曰泄有虛實寒熱虛則無力不及括衣未便已
泄出謂不能禁固也實則數至圍而不便俗云

虛坐努責是也裏急後重皆依前法進退大承

氣湯主之太陽病為挾熱利涼膈散主之

誤下因而下利陽明為痼瘕進退大承氣湯

不止為挾熱利主之太陰濕勝濡瀉不可下而可溫四逆湯

主之少陰蟄風不動禁固可瀉赤石脂丸乾

薑湯主之厥陰風泄以風治宜小續命湯消

風湯主之少陽風氣自動大柴胡湯主之

胃泄飲食不化色黃承氣湯脾泄腹脹滿泄注

食即嘔吐逆建中湯大腸泄食已窘迫大便

色白腸鳴切痛乾薑附子湯大小腸泄澉而便膿血

少腹痛承氣湯大瘕泄裏急後重數至圜而不

能便莖中痛五泄之病胃小腸大瘕三證皆

以清涼飲子主之其泄自止厥陰證加甘草以

緩之少陰證裏急後重加大黃又有太陰陽明

二證當進退大承氣湯主之太陰證不能食是

也當先補而後泄之乃進藥法也先前厚朴半

兩製水煎二三服後未已謂有宿食未消又加

枳實二錢同煎二三服泄又未已如稍進食尚

有熱毒又加大黃三錢推過泄止住藥如泄未

已為腸胃有久塵垢滑粘加芒硝半合宿垢去

盡則愈也陽明證能食是也當先泄而後補謂

退藥法也先用大承氣湯五錢水煎服如利過

泄未止去芒硝後稍熱退減大黃一半再煎兩

服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃與枳

實厚朴湯又煎三兩服如腹滿退泄亦自愈後

服厚朴湯數服則已按進退承氣法須審之

脈證的知有積熱及形病俱實而後可下此已

上雖出潔古家珍東垣活法機要而多出於劉
 河間保命集之文故其用藥於踈蕩為多觀者
 會其意毋泥其辭可矣 東垣云胃氣和平飲
 食入胃精氣則輸於脾上歸於肺行於百脉而
 養榮衛也若飲食一傷起居不時損其胃氣則
 上升精華之氣反下降是為餐泄久則太陰傳
 少陰而為腸澼假令傷寒冷飲食臏滿而脹傳
 為餐泄者宜溫熱之劑以消導之傷濕熱之物
 而成膿血者宜苦寒之劑以內疎之風邪下陷

者升舉之濕氣內盛者分利之裏急者下之後
 重者調之腹痛者和之洞泄腸鳴無力不及粘
 衣其脉細微而弱者溫之收之膿血稠粘數至
 圓而不能便其脉洪大而有方者下之寒之大
 抵治病當求其所因察何氣之勝取相尅之藥
 平之隨其所利而利之以平為期此治之大法
 也 瀉利久不止或暴下者皆太陰受病不可
 離甘草芍藥若不受濕則不利故須用白朮是
 以聖人立法若四時下利於芍藥白朮內春加

防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附然更詳外
證寒熱處之如裏急後重須加大黃如身困倦
須用白朮若自汗逆冷氣息微加桂附以溫之
如或後重膿血稠粘雖在盛冬於溫藥內亦加
大黃

診 胃脉虛則泄 脉滑按之虛絕者其人必
下利 肺脉小甚為泄 小者氣血皆虛 腎脉小甚為
洞泄 小者氣血皆少無以閉藏故泄 尺寒脉細
謂之後泄 尺膚寒其脉小者泄少氣 下利

脉沉弦者下重 下利寸口反浮數尺中自濇
者必清膿 溲病若腹大而泄者脉當細微而
濇反緊大而滑者死 泄而脉大者難治 病
泄脉洪大是逆也 泄注脉緩時小結者生浮
大數者死 下利脉大為不止 下利日十餘
行脉反實者死 大便赤辦餐泄脉小者手足
寒難已餐泄脉小手足溫易已 腹鳴而滿四
肢清泄其脉大是逆也如是者不過十五日死
矣 腹大脹四末清脫形泄甚是逆也如是者

不及一時死矣。下利手足厥冷無脈者，灸之。不溫若脈不還，反微喘者死。下利後脈絕，手足厥冷，晬時脈還，手足溫者生。脈不還者死。病者痿黃，燥而不渴，胸中寒而利不止者死。假令下利，寸口關上尺中悉不見脈，然尺中時一小見脈，再舉頭者，腎氣也。若見損脈來為難治。下利如魚腦者，半死。半生。下利如塵腐色者死。純血者死。如屋漏汁者死。下利如竹筒注者不可治。脈細皮寒氣少泄利前

後飲食不入，此謂五虛不治。若用參朮膏，早救之，亦有生者。下則泄瀉，上則吐痰，皆不巳為上下俱脫死。

泄瀉

金匱下利病脉證并治及夫六府氣絕於外者
手足寒上氣脚縮五藏氣絕於內者利不禁甚
者手足不仁下利脉沉弦者下重脉大者為
未止脉微弱數為欲自止雖發熱不死下利
手足厥冷無脉者灸之不温若脉不還反微喘
者死少陰負跌陽者為順也下利有微熱而
渴脉弱者當自愈下利脉數有微熱汗出今
當自愈設脉數為未解下利脉數而渴者當

世高

卷六

自愈設必清膿血以有熱也清古下利脉反
弦發熱身汗者自愈下利氣者當利小便
下利寸脉反浮數尺中自濇者必清膿血下
利清穀不可攻其表汗出必脹滿下利脉沉
而遲其人面少赤身微熱下利清穀者必鬱
冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽
下虛故也下利後脉絕手足厥冷晬時脉還
手足溫者生脉不還者死下利腹脹滿身體
疼痛者必溫其裏後攻其表溫裏宜四逆湯攻

美宜桂枝湯下利三部皆平按之心下堅者
急下之宜大承氣湯下利脉遲而滑者實也
利未欲止急下之宜大承氣湯下利脉反滑
者當有所去下乃愈宜大承氣湯下利已瘥
至半月日時復發者以病不盡故也當下之大
承氣湯以上數承氣湯本虛者當別議下利譏語者有燥矢
故也小承氣湯主之下利便膿血者桃花湯
主之熱利下重者白頭翁湯主之下利後
更煩按之心下濡者為虛煩也梔子豉湯主之

世為

桂枝湯

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之。下利腹痛紫參湯主之。乾嘔下利黃芩湯主之。右此下利一章後世名醫諸書皆以為法古之所謂下利即今之所謂泄瀉也。內有治傷寒數方仲景用治雜病今全錄之使後人知云治傷寒有法治雜病有方者非也傷寒雜病同一法矣。丹溪云有濕有氣虛有痰有食積戴復菴云瀉水腹不痛者濕也飲食入胃輒後之

完穀不化者氣虛也腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣者火也或瀉或不瀉或多或少者痰也腹痛甚而瀉瀉後痛減者食積也。戴云餐泄者水穀不化而完出濕兼風也澹泄者漸下污積粘垢濕兼熱也驚泄者所下澄徹清冷小便清白濕兼寒也濡泄者體重軟弱泄下多水濕自甚也滑泄者久下不能禁固濕勝氣脫也。濕瀉脈濡細乃太陰經脾土受濕洩水虛滑身重微滿不知穀味口不渴久雨泉

溢河溢或運氣濕土司令之時多有此疾宜除
濕湯吞戊巳丸佐以胃苓湯重者木附湯東
垣云予病脾胃久衰視聽半失此陰盛乘陽加
之氣短精神不足此由弦脉令虛多言之過也
皆陽氣衰弱不得舒伸伏匿於陰中耳癸卯歲
未七月間淫雨陰寒踰月不止時人多病泄利
一日予體重肢節疼痛大便泄并下者二而小
便閉塞思其治法按內經標本論大小不利無
問標本先利小便又云在下者引而竭之亦是

先利小便也又云諸泄利小便不利先分別之
又云治濕不利小便非其治也皆言當利小便
必用淡味滲泄之劑以利之是其法也噫聖人
之法雖布在方策其不盡者可以意求耳今客
邪寒濕之淫從外而入裏以暴加之若從已上
法度用淡滲之劑以除之病雖即已其降之又
降是復益其陰而重竭其陽則陽氣愈削而精
神愈短矣是陰重強陽重衰反助其邪之謂也
故必用升陽風藥即痿以羌活獨活柴胡升麻

各一錢防風根半錢炙甘草半錢同炒咀水二
 鍾煎至一盞去渣稍熱服大法云濕寒之勝助
 風以平之又曰下者舉之得陽氣升騰而去矣
 又法云客者除之是因曲而為之直也夫聖人
 之法可以類推舉一而知百者也若不達升降
 浮沈之理而一槩施治其愈者幸也 濕兼寒
 瀉內經曰濕勝則濡泄甲乙經云寒氣客於下
 焦傳為濡泄夫脾者五藏之至陰其性惡寒濕
 今寒濕之氣內客於脾故不能裨助胃氣腐熟

水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄
 如水隨氣而下謂之濡泄法當除濕利小便也
 治之以對金飲子 濕兼熱瀉益元散參萸丸
 濕兼風見餐泄條 寒瀉脉沉細或弦遲身
 冷口不渴小便清白或腹中綿綿作疼宜理中
 湯附子温中湯漿水散 暴泄如水周身汗出
 一身盡冷脉沉而弱氣少而不能語甚者加吐
 此謂緊病宜以漿水散治之 若太陽經傷動
 傳太陰下利為鶩溏太腸不能禁固卒然而下

中有硬物欲起而又下欲了而又不了小便多
清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯
理中湯治泄瀉加橘紅茯苓各一兩名補中湯
若溏泄不已者於補中湯內加附子一兩不喜
飲食水穀不化者再加砂仁一兩共成八味
仲景云下利不止醫以理中與之利益甚理中
者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之
用此加法則能理下焦矣 戴云寒瀉寒氣在
腹攻刺作痛洞下清水腹內雷鳴米飲不化者

理中湯或附子補中湯吞大巴寒丸或附子桂
香丸畏食者八味丸元是冷瀉因瀉而煩躁引
飲轉飲轉瀉者參附湯連理湯 如寒瀉服上
藥未効宜木香湯或薑附湯六柱湯吞震靈丹
養氣丹手足厥逆者兼進硃砂丹藥食方入口
而卽下者名曰直腸難治如瀉已愈而精神未
復舊者宜十補飲寒瀉腹中大疼服前藥外兼
進乳荳丸服諸熱藥以溫中並不見効登園不
迭穢物隨出此屬下焦宜桃花丸二十五粒訶梨

世寫

進通六

三二

泄瀉
勒丸以澀之。按戴方多過於左熱用者審之。
熱瀉脉數疾或洪大口乾燥身多動音聲響
亮暴注下迫益元散加苓連燈心淡竹葉之屬。
泄而身熱小便不利口渴者益元五苓若火
多四苓加木通黃芩。泄而困倦不使者及脉
數虛熱者宜參朮滑石苓通。泄而脉滑堅者
實熱宜大承氣湯。戴云熱瀉糞色赤黃彈響
作疼糞門焦痛糞出穀道猶如湯熱煩渴小便
不利宜五苓散吞香連丸。凡瀉津液既去口

必渴小便多是赤澀未可便作熱論的知熱瀉
方用冷劑不然勿妄投以致增劇。玉龍丸治
一切伏暑泄瀉神效。理中湯加茯苓黃連名
連理湯用之多有奇功且如今當暑月若的知
暑瀉自合用暑藥的知冷瀉自合用熱藥中間
有一等盛暑又復內傷生冷非連理湯不可下
泄無度泄後却彈過響肛門熱小便赤澀心下
煩渴且又喜冷此藥為宜若元是暑瀉經久下
元虛甚日夜頻併暑毒之勢已然而瀉不已復

用暑藥則決不能取効便用薑附輩又似難施
疑似之間尤宜用此氣瀉腸鳴氣走胸膈痞
悶腹急而痛瀉則腹下稍可須臾又急亦有腹
急氣塞而不通者此由中脘停滯氣不流轉水
穀不分所致戴法用大七香丸入米煎服久而
不愈者五膈寬中散吞震靈丹仍佐以米飲調
香附末調氣散金匱訶梨勒散治氣利
氣虛瀉用四君子湯加麴蘖升柴吞二神加木
香丸積滯泄瀉腹必耕痛方泄者是也或肚

腹滿按之堅者亦是也受病淺者宜神麴之類
消導之病深而頑者必用進退承氣之類下之
方安傷食瀉因飲食過多脾胃之氣不足以
運化而瀉其人必噫氣如敗卵臭宜治中湯加
砂仁半錢麴蘖枳朮丸或七香丸紅丸子雜服
食積腹疼而瀉不可遽用治中兜住宜先用消
導推蕩之藥或因食一物過傷而瀉後復食之
卽瀉者以脾爲所傷未復而然宜大建脾湯者
可仍燒所傷之物存性爲末三五錢重調服

因食冷物停滯傷脾脾氣不暖所食之物不能
消化瀉出而食物如故宜治中湯加乾葛吞酒
煮黃連丸有脾氣久虛不受飲食者食畢卽
賜鳴腹急盡下所食之物方快不食則無事俗
名錄食瀉經年累月宜快脾丸因傷於酒每
晨起必瀉者宜理中湯加乾葛吞酒煮黃連丸
或葛花解醒湯吞之因傷麪而瀉者養胃湯
加萊菔子炒研一錢痛者更加木香五分瀉甚
者去藿香加炮薑如其數痰瀉二陳湯海石

青黛黃芩神麴薑汁竹瀝爲丸每服三五十丸
少者必用吐法吐之方愈一男子夜數如廁
或教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各三
十枚水一升磁瓶中慢火燒爲熟水時時呷之
數日便已每日五更卽泄瀉有酒積有寒積
有食積有腎虛俗呼脾腎泄有人每早須大
瀉一行或腹痛或不腹痛空心服熱藥亦無効
有人教以夜食前又進熱藥一服遂安後如此
常服愈蓋暖藥雖平且服之至夜力已盡無以

泄瀉
敵一夜陰氣之故也。有人每五更將天明時必溏利一次有人云此名腎泄服五味子散頓愈。有人久泄早必泄一二行泄後便輕快脉滑而少弱先與厚朴和中丸五十九丸大下之後以白朮為君枳殼半夏茯苓為臣厚朴炙甘草芩連川芎滑石為佐吳茱萸十餘粒為使生薑煎服十餘貼而愈。戴云有每日五更初洞瀉服止瀉藥並無効米飲下五味丸或專以北五味煎飲雖節省飲食大段忌口但得日間上半

夜無事近五更其瀉復作此病在腎分水飲下二神丸及椒朴丸或平胃散下小茴香丸二神丸合五味子散名為四神丸治瀉尤妙。小便不利而泄若津液偏滲於大腸大便瀉而小便少者用胃苓散分利之若陰陽已分而小便短少此脾肺氣虛不能生水也宜補中益氣湯加麥門五味陰火上炎而小便赤少此肺氣受傷不能生水也用六味地黃丸加麥門五味腎經陰虛陽無所生而小便短少者用滋腎丸腎

氣丸腎經陽虛陰無所化而小便短少者用益
氣湯六味丸若誤用滲泄分利復傷陽氣陰無
所生而小便益不利則腫脹之證作而疾危矣
凡大便泄服理中湯小便不利大便反泄不
知氣化之過本肺不傳化以純熱之藥治之是
以轉泄少服則不止多服則愈熱所以不分若
以青皮陳皮之類治之則可經云膀胱者州都
之官津液藏焉氣化則能出矣 泄而口渴引
飲此為津液內亡用錢氏白朮散或補中益氣

湯腎水不足之人患泄或過服分利之劑而渴
者加減八味丸失治必變小便不利水腫脹滿
等危証矣 水漬入胃名為溢飲滑泄渴能飲
水水下復泄泄而大渴此無藥證當灸大顛在
一推下滑瀉東垣云中焦氣弱脾胃受寒冷
陷中 大便滑泄腹中雷鳴或因悞下末傳寒中復遇
時寒四肢厥逆心胃絞痛冷汗不止此腎之脾
胃虛也沉香溫胃丸治之薛氏曰前證若脾胃
虛寒下陷者用補中益氣湯加木香肉苳菟補

世為
三
泄瀉
骨脂若脾氣虛寒不禁者用六君子湯加炮薑
肉桂若命門火衰脾土虛寒者用八味丸若脾
腎氣血俱虛者用十全大補湯送四神丸若大
便滑利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰為脾
胃虧損宜金匱加減腎氣丸 保命集云虛滑
久而不止者多傳變為利太陰傳少陰是為鬼
邪先以厚朴枳實湯防其傳變按此法實者用

之虛者不若四神丸實腎之為得也 收澀之
劑固腸丸訶子散皆治熱滑扶脾丸桃花丸訶
子丸赤石脂禹餘糧湯皆治寒滑 瀉已愈至
明年此月日時復發者有積故也脾主信故至
期復發熱積大承氣湯寒積感應丸虛者以保
和丸加三稜蓬朮之屬投之 趙以德云昔聞
先生言泄瀉之病其類多端得於六淫五邪飲
食所傷之外復有雜合之邪似難執法而治乃
見先生治氣暴脫而虛頓瀉不知人口眼俱閉

呼吸微甚殆欲絕者急灸氣海飲人參膏十餘斤而愈治陰虛而腎不能司禁固之權者峻補其腎治積痰在肺致其所合大腸之氣不固者湧出上焦之痰則肺氣下降而大腸之虛自復矣治憂思太過脾氣結而不能升舉陷入下焦而成泄瀉者開其鬱結補其脾胃使穀氣升發也凡此之類不可枚舉因問先生治病何其神也先生曰無他圓機活法具在內經熟之自得矣

餐泄 水穀不化而完出是也史記倉公傳迴風卽此經云清氣在下則生餐泄又曰久風入中則爲腸風餐泄夫脾胃土也氣沖和以化爲事今清氣下降而不升則風邪久而于胃是木賊土也故沖和之氣不能化而令物完出謂之餐泄或飲食太過腸胃所傷亦致米穀不化此俗呼水穀利也法當下者舉之而消尅之也以加減木香散主之東垣云清氣在下者乃人之脾胃氣衰不能升發陽氣故用升麻柴胡

助甘辛之味以引元氣之升不令下陷爲餐泄也。又云凡泄則水穀不化謂之餐泄是清氣在下乃胃氣不升上古聖人皆以升浮藥扶持胃氣一服而愈知病在中焦脾胃也脉訣曰濕多成五泄濕者胃之別名也病本在胃真氣弱真氣者穀氣也不能剋化飲食乃濕盛故也以此論之正以脾胃之弱故也初病奪食或絕不食一二日使胃氣日勝泄不作也今已成大泄矣經云治濕不利小便非其治也又云下焦如

瀆又云在下者引而竭之惟此證不宜此論其病得之於胃氣下流清氣不升陽道不行宜升宜舉不宜利小便靈樞云頭有疾取之足謂陽病在陰也足有疾取之上謂陰病在陽也中有疾傍取之傍者少陽甲膽是也中者脾胃也脾胃有疾取之足少陽甲膽者甲風是也東方春也胃中穀氣者便是風化也作一體而認故曰胃中濕勝而成泄瀉宜助甲膽風勝以克之又是我陽助清氣上行之法也又一說中焦元氣

不足溲便爲之變腸爲之苦鳴亦緣胃氣不升
故令甲氣上行又云風勝濕也大抵此證本胃
氣弱不能化食奪食則一日而可止夫奪食之
理爲胃弱不能尅化食則爲泄如食不下何以
作泄更當以藥滋養元氣令和候泄止漸與食
胃勝則安矣若食不化者於升陽風藥內加炒
麴同煎兼食入頓至心頭者胃之上口也必口
沃沫或食入反出皆胃土停寒其右手關脈中
弦按之洪緩是風熱濕相合穀氣不行滯氣不

升爲弦脈之寒所隔故不下也麴之熱亦能去
之若反胃者更加半夏生薑入於風藥內同煎
奪食少食欲使胃氣強盛也若藥劑大則胃不
勝藥泄亦不止當漸漸與之今病既久已至衰
弱當以常法治之不可多服餌也人之肉如地
之土豈可入而無肉故肉消盡則死矣消瘦之
人有必死者八內經有七外經有一又病肌肉
去盡勿治之天命也如肌肉不至瘦盡當急療
之宜先奪食而益胃氣便與升陽先助真氣次

用風藥勝濕以助升騰之氣病可已矣餘皆勿論此治之上法也治用升陽除濕湯之類是也春傷於風夏生餐泄木在時為春在人為肝在天為風風者無形之清氣也當春之時發為溫令反為寒折是三春之月行三冬之令也以是知水為太過矣水既太過金肅愈嚴是所勝者乘之而妄行也所勝者乘之則木虛明矣故經曰從後來者為虛邪木氣既虛火令不及是所生者受病也故所不勝者侮之是以土來木之分變而為

餐泄也故經曰清氣在下則生餐泄以其濕令當權故餐泄之候發之於夏也若當春之時木不發生溫令未顯止行冬令是謂傷衛以其陽氣不出地之外也當以麻黃湯發之麻黃味苦味之薄者乃陰中之陽也故從水中補木而瀉水發出津液為汗也若春木既生溫令已顯陽氣出於地之上寒再至而復折之當以輕發之謂已得少陽之氣不必用麻黃也春傷於風夏生餐泄所以病發於夏者以木絕於夏而土旺

於長夏濕本有下行之體故餐泄於夏也不病於春者以其春時風雖有傷木實當權故餐泄不病於木之時而發於濕之分也經曰至而不至是為不及所勝妄行所不勝者薄之所生者受病此之謂也 仲景法下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之 河間法餐泄風冷入中泄利不止脈虛而細日夜數行口乾腹痛不已白朮湯主之 東垣云洩利餐泄身熱脈弦腹痛而渴及頭痛微汗宜防風芍藥湯

東垣所云內動之風也經云春傷於風夏生餐泄又云久風為餐泄又云虛邪之中人也始於皮膚留而不去傳舍於絡脈留而不去傳舍於經留而不去傳舍於輸留而不去傳舍於伏衝之脈留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時貫響腹脹多寒則腸鳴餐泄食不化則非內動之風也潔古云大渴引飲多致水穀一時下者宜灸大椎二五壯或用車前子雷丸白朮茯苓及五苓散等藥浸之又如久風為餐泄者則不飲

水而穀完出治法當以宣風散導之後服蒼朮
防風湯餐泄以風為根風非汗不出有病此
者腹中雷鳴泄注水穀不分小便瀦滯皆以脾
胃虛寒故耳服荳蔻烏梅粟殼乾薑附子曾無
一効中脘臍下炎已數千燥熱轉甚津液涸竭
瘦削無力飲食減少延予視之予以應象論曰
熱氣在下水穀不分化生餐泄寒氣在上則生
臘脹而氣不散何也陰靜而陽動故也診其脉
兩手皆浮大而長身表微熱用桂枝麻黃湯以

薑棗煎大劑連進三服汗出終日至且而愈次
以胃風湯和其藏府調養陰陽食進而愈經
云脾虛則腹滿腸鳴泄食不化又云餐泄取三
陰三陰者太陰也宜補中益氣湯以白芍藥代
當歸主之又云腎藏志志有餘腹脹餐泄瀉
然筋血又云肝足厥陰之脉所生病者胸滿
嘔逆餐泄視盛虛寒熱陷下施法此皆內因
無風者也

已行血則便血自愈調氣則後重自除 李從
脾胃病者而論則曰上逆於肺為白下傳於陰
為赤 衛生寶鑑因謂大陰主瀉傳於少陰為
痢由泄亡津液而火就燥腎惡燥居下焦血分
也其受邪者故便膿血然亦赤黃為熱青白為
寒 丹溪謂滯下因火熱下迫而致裏急後重
用劉氏之治濕熱李氏之保脾土更復一一較
量氣血虛實以施治 三家皆發前代之未發
而舉其要也予嘗因是而研究之自其五色分

五藏者言則可見濕熱之中具有五邪之相扶
自其上逆下傳氣血者言則可見五藏六府十
二經脉之氣血諸邪皆得傷之而為痢之赤白
本自其濕熱為病者言則可見由來致成濕熱
之故非一端自其分痢有虛實者言則可見凡
在痢病者中所有之證如煩躁者咽乾舌黑者
噦噫後重者腹痛者脹滿者脚痛腫弱之類悉
有虛實之殊是故予於痢證直斷之種種為邪
入胃以成濕熱經經受傷其氣傷則病於肺血

傷則傳於心。心肺者氣血之主也。氣血所行之方既病，安得不歸所主之藏乎？而大小腸者，心肺之合也。出納水穀，糟粕轉輸之官。胃乃大小腸之總司，又是五藏六府十二經脈稟氣之海。苟有內外之邪，凡損傷於經藏者，或移其邪入胃，胃屬土，濕之化。胃受邪則濕氣不化，怫鬱而成濕熱矣。或心肺移氣血之病，傳之於合，大腸獨受其病，則氣凝注而成白痢。小腸獨受其病，則血凝注而成赤痢。大小腸通受其病，則赤白

相混而下。胃之濕熱淫於大小腸者，亦如之。其色兼黃若色之黑者，有二。如色之焦黑，此極熱兼水化之黑也。如黑之光若漆者，此瘀血也。或曰：治利從腸胃，世人所守之法也。今乃復求其初感之邪與初受之經，將何為哉？曰：病在腸胃者，是其標也。所感之邪與初受之經者，是其本也。且內經於治標本，各有所宜施之先後。況所傳變之法，又與傷寒表裏無異，何可不求之乎？豈止此而已。至若腸胃自感而病，亦當以邪正

分或正氣先虛而受邪或因邪而致虛則以先
者為本後者為標與夫積之新舊亦如之舊積
者停食結痰所化之積也新積者舊積去後而
氣血復鬱所生者也舊積當先下之新積則不
宜下其故何哉蓋腸胃之腐熟水穀轉輸糟粕
者皆榮衛灑陳六府之功今腸胃有邪則榮衛
運行至此其機為之阻不能施化故衛氣鬱而
不舒榮血泣而不行於是飲食結痰停於胃糟
粕留於腸與所鬱氣泣血之積相挾成滯下病

矣如是者必當下之以通壅塞利榮衛之行至
於升降仍不行衛氣復鬱榮血復泣又成新積
故病如初若是者不必求邪以治但理衛氣以
開通腠理和榮血以調順陰陽陰陽調腠理開
則升降之道行其積不治而自消矣然而舊積
亦有不可下者先因榮衛之虛不能轉輸其食
積必當先補榮衛資腸胃之真氣充溢然後下
之庶無失矣予數見俗方惟守十數方治利不
過攻之澀之而已矣安知攻病之藥皆是耗氣

損血之劑用之不已甚至於氣散血亡五藏空
虛精憊神去而死其固澀之又皆足以增其氣
鬱血泣之病轉生腹脹下為足腫上為喘呼諸
疾作焉世人之法何足守乎

丹溪云痢初得之必用調胃承氣及大小承氣
有男子五十餘下利晝有積淡紅色夜無積食
自進先喫小胃丹兩服再與四十九次六十九
去積却與斷下按此惟實者宜之虛者以芍
藥湯益元散保和丸之類盪積芍藥湯治下

血調氣經曰溲而便膿血知氣行而血止也行
血則便自安調氣則後重自除益元散治身
發熱下痢赤白小便不利湯胃中積聚下痢
勢惡頻併窘痛或久不愈諸藥不止須吐下之
以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行者宜玄
青丸逐之玄珠利積丸亦可玄珠云下痢
赤白腹滿脹痛裏急上渴引飲小水赤瀝此積
滯也宜泄其熱中用清腸丸導氣丸推其積滯
而利自止矣凡治積聚之證輕則溫而利之清

腸丸是也重者天真散舟車丸下之下後勿便
補之其或力倦自覺氣少惡食此為挾虛證宜
加白朮當歸身尾甚者加人參若又十分重者
止用此藥加陳皮補之虛回而痢自止矣丹
溪治葉先生患滯下後甚逼迫正合承氣證但
氣口虛形雖實而面黃積白此必平昔食過飽
而胃受傷寧忍二三日辛苦遂與參朮陳皮芍
藥等補藥十餘貼至二日後胃氣稍完與承氣
二貼而安苟不先補完胃氣之傷而遽行承氣

寧免後患乎以上戴云痢疾古名滯下以氣
滯成積積成痢治法當以順氣為先須當開胃
故謂無飽死痢疾也凡痢初發不問赤白裏
急後重頻欲登圜及去而所下無多既起而腹
內復急宜用藿香正氣散加木香半錢吞感應
丸或蘇合香丸吞感應丸以上赤痢血色鮮
紅或如蛇蟲形而間有血鮮者此屬熱痢宜藿
香正氣散加黑荳三十粒五苓散加木香半錢
粟米少許下黃連丸或黃連阿膠丸茶梅丸熱

甚服上項藥未効宜白頭翁湯 赤痢發熱者
敗毒散加陳倉米一撮煎 若血色黯如瘀服
涼藥而所下愈多去愈頻者當作冷痢宜理中
湯或四君子湯加肉果一錢木香半錢 加減
平胃散青六丸治血痢佳 諸血痢不止宜多
用地榆 易簡方云血痢當服胃風湯膠艾湯
之類 心經伏熱下純血鮮色必紅用犀角生磨汁
半鐘朱砂飛研二錢牛黃三分人參末三錢和
丸如麻子大燈心龍眼肉煎湯下六七分 脾

經受濕下血痢用蒼朮地榆湯 血痢久不正
腹中不痛不裏急後重槐花丸 乾薑於火上
燒黑不令成灰磁碗合放冷為末每服一錢米
飲調下治血痢神効仲景云小腸有寒者其人
下重便血可以此治之赤痢以上 東垣云大便後
有白膿或只便白膿因勞倦氣虛傷大腸也以
黃芪人參補之如裏急頻見汚衣者血虛也宜
加當歸 如便白膿少有滑頻見汚衣者氣脫
加附子皮甚則加御米殼如氣瀦者只以甘藥

卷之六
雜論
三十四

補氣當安卧不言以養其氣。戴云白痢下如凍膠或如鼻涕此屬冷痢先宜多飲除濕湯加木香一錢吞感應丸繼進理中湯亦有下如鮫色或如臘茶色者亦宜用前白痢藥。白蠟治後重白膿以上白痢。若感暑氣而成痢疾者其人自汗發熱面垢嘔逆渴欲引飲腹內攻刺小便不通痢血頻併宜香薷飲加黃連一錢佐以五苓散益元散白湯調服不愈則用蜜水調。感暑成痢疼甚食不進六和湯藿香正氣散各半。

貼名木香交加散以上暑痢。老人深秋患痢發呢逆嘔者黃蘗炒燥研末陳米飯為丸小碗豈大每服三十九人參白朮茯苓三味濃煎湯下連服三劑即愈切不可下丁香等熱藥。治冷利腹中不能食肉苳蔻去皮醋麩裹煨熟搗末粥飲下一錢匕。世俗治夏中暑痢疾用黃連香薷飲加甘草芍藥生薑神効者蓋夏月之痢多屬於暑潔古治處暑後秋冬間下痢用厚朴丸大効者蓋秋之痢多屬於寒積經所謂必先歲

卷六
三十五

氣無伐天和者也以上秋痢 金匱下痢腹痛紫參

湯主之潔古云厚朴九治處暑後秋冬間腹

痛下痢大効丹溪曰初下痢腹痛不可用參

木然氣虛胃虛者可用初得之亦可用大承氣

調胃承氣下之看其氣病血病然後加減用藥

腹痛者肺經之氣鬱在太腸之間者以苦梗

發之然後用治痢藥氣用氣藥血用血藥其或

痢後糟粕未實或食粥稍多或饑甚方食肚中

作疼切不可驚恐當以白朮陳皮各半煎湯和

之自安 粥多及食肉作痛者宜奪食奪食者

減其粥食絕其肉味也 因傷冷水瀉變作赤

白痢腹痛減食熱燥四肢困倦無力宜茯苓湯

下痢之後小便利而腹中滿痛不可忍此名

陰陽反錯不和之甚也越桃散主之 治痢止

痛如神方棟淨川連片一兩淨枳殼片一兩槐

花三二兩用水浸片時漉淨同川連先炒老黃

色次入枳殼再炒待燥棟出槐花不用止將黃

連五錢枳殼五錢作一服水煎七分去渣調乳

世下 卷之三 三

香沒藥淨末各七分五釐服之次照前方再服
一劑腹痛即止痢即稀神效此方有服之如醉
者乃藥力行也不妨仲景建中湯治痢不分
赤白久新但腹中大痛者神效其脉弦急或澹
浮大按之空虛或舉按皆無力者是也 下利
膿血稠粘腹痛後重身熱久不愈脉洪疾者芍
藥黃芩湯 膿血痢無度小便不通腹中痛當
歸導氣湯以上腹痛 下利赤白裏急後重香連丸
亦可用連二錢薑半錢為末和勻溫酒下 仲

景云熱利下重者白頭翁湯主之 下利膿血
裏急後重日夜無度宜導氣湯 太瘦泄者裏
急後重數至圍而不能便莖中痛用清涼飲子
主之其泄自止莖中痛者屬厥陰加甘草稍裏
急後重多者屬少陰加大黃令急推去舊物則
輕矣內經曰因其重而減之又云在下者引而
竭之 裏急後重數至圍而不能便皆宜進退
大承氣湯主之 下利赤白後重遲澹宜感應
丸 或曰治後重疎通之劑羅謙甫水煮木香

膏東垣白朮安胃散等方已盡矣又有用御米
殼等固澀之劑亦愈者何也曰後重本因邪壓
大腸墜下故大腸不能升上而重是以用大黃
檳榔輩瀉其所壓之邪今邪已瀉其重仍在者
知大腸虛滑不能自收而重是以用御米殼等
瀉劑固其滑收其氣用亦愈也然大腸為邪墜
下之重其重至圍後不減大腸虛滑不收之重
其重至圍後隨減以此辨之百不失一也 其
或下墜異常積中有紫黑色而又痛甚此為死

血證法當用桃仁泥滑石粉行之或口渴及大
便口燥辣是名挾熱即加黃芩或口不渴身不
熱喜熱手熨盪是名挾寒即加乾薑 後重積
與氣墜下服升消藥不愈者用秦艽皂角子煨
大黃當歸桃仁枳殼黃連等劑若大腸風盛可
作丸服 其或下墜在血活之後此為氣滯證
宜前藥加檳榔一枚 後重當和氣積與氣墜
下者當兼升兼消升謂升麻之類消謂木香檳
榔之類 金匱方泄利下重者以水五升煮薤

白三升至二升去渣以四逆散方寸七分湯中
煮取一升半分溫再服 凡用諸承氣等藥挨
積之後仍後重者乃陽不升也藥中當加升麻
升其陽其重自去也 東垣云裏急後重數至
圓而不能便或少有白膿或少血者慎勿利之
宜升陽除濕防風湯以上裏急後重 其或氣行血和
積少但虛坐努責此為亡血證倍用當歸身尾
却以生地黄生芍藥生桃仁佐之復以陳皮和
之血生自安 虛坐而不得大便皆因血虛也

血虛則裏急加當歸身 凡後重逼迫而得大
便者為有物而然今虛坐努責而不得大便知
其血虛也故用當歸為君生血藥佐之以上虛坐努責
內經膿血稠粘皆屬相火夫太陰主瀉少陰
主痢是先泄亡津液而火就燥腎惡燥居下焦
血分其受邪者故便膿血然赤黃為熱青白為
寒治須兩審治熱以堅中丸荳蔻丸香連丸治
寒白膠香散或多熱少寒水煮木香膏虛滑頻
數宜止宜瀉宜養藏湯 溲而便膿血者小腸

泄也脉得立至已上洪大者宜七宣丸脉平和者立秋至春分宜香連丸春分至立秋宜芍藥皮丸四時皆宜加減平胃散如有七宣丸證者亦宜服此藥去其餘邪兼平胃氣以上膿血稠粘其或纏滯退減十之七八穢積未盡糟粕未實當以炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然固腸丸性燥恐尚有滯氣未盡行者但當卑飲此湯固腸丸未宜遽用蓋固腸丸者雖有去濕實腸之功其或久痢體虛氣

弱滑泄不止又當以訶子肉苣菘白礬半夏等藥澀之甚者添牡蠣可擇用之然須以陳皮為佐恐太澀亦能作痰又甚者灸天樞氣海此二穴大能止泄仲景云下利便膿血者桃花湯主之丹溪云桃花湯主病屬下焦血虛且寒非乾薑之溫石脂之澀且重不能止血用粳米之甘引入腸胃水煮木香膏易簡斷下湯白朮安胃散養藏湯五倍子為丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下各十九烏梅二箇煎

湯 石榴一箇燒灰用酸石榴一箇煎湯調二
 錢以上 東垣治一老僕脫肛日久近復下利
 裏急後重白多赤少不任其苦此非肉食膏粱
 者也必多蔬食或飲食不節天氣已寒衣蓋又
 薄寒侵形體不禁而腸頭脫下者寒也滑也真
 氣不禁形質不收乃血脫也此乃寒滑氣泄不
 固故形質下脫也當以澀去其脫而除其滑以
 大熱之劑除寒補陽以補氣之藥升陽益氣以
 微酸之味固氣止收名之曰訶子皮散一服減

半再服全愈 養藏湯 地榆芍藥湯 戴云
 脫肛一證最難為藥熱則肛門閉寒則肛門脫
 內用磁石研末每二錢食前米飲調下外用鐵
 鏞磨湯溫洗以上 滯下大便不禁其大孔開
 如空洞不閉者用葱和花椒末搗爛塞穀道中
 併服酸澀固腸之劑收之如御米殼訶子皮之
 類是也神效大孔 痢久大孔痛亦有寒熱者
 熟艾黃蠟訶子燒熏之 因熱而痛檳榔木香
 黃連黃芩加乾薑 因寒而痛炒鹽熨之灸枳

實熨之丹溪用瓦片敲圓如銅錢狀燒紅投童子小便中急取起令乾紙裹安痛處因時寒恐外寒乘虛而入也以人參當歸陳皮作濃湯飲之食淡味自安大孔痛痢疾不納食或湯藥入口隨即吐出者俗名噤口有因邪留胃氣伏而不宣脾氣澀而不布故嘔逆而食不得入者有陽氣不足胃中宿食因之未消則噫而食卒不下者有肝乘脾胃發嘔飲食不入縱入亦反出者有水飲所停氣急而嘔穀不得入者有火氣

炎熾內格嘔逆而食不得入者有胃氣虛冷食入反出者有胃中邪熱不欲食者有脾胃虛弱不欲食者有穢積在下惡氣熏蒸而嘔逆食不得入者當各從其所因以為治以脉證辨之如脾胃不弱問而知其頭疼心煩手足溫熱未嘗多服涼藥者此乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食宜用敗毒散每服四錢陳倉米一百粒薑三片棗一枚水一盞半煎八分溫服若其脉微弱或心腹膨脹手足厥冷初病則不嘔因服鴛

粟殼烏梅苦澀涼藥太過以致聞食先嘔者此
 乃脾胃虛弱用山藥一味剉如小荳大一半入
 銀瓦鉢內炒熟一半生用同為末飯飲調下
 又方用石蓮槌去殼留心併肉碾為末每服二
 錢陳米飲調下此疾蓋是毒氣上衝心肺借此
 以通心氣便覺思食効 丹溪用人參黃連薑
 炒濃煎汁終日細細呷之如吐再喫但一呷下
 咽便開痢亦自止神効 楊仁齋用參苓白朮
 散加石菖蒲末以道地粳米飲乘熱調下或用

人參茯苓石蓮子肉入些菖蒲與之 戴復菴
 用治中湯加水香半錢或縮砂一錢以上禁
 其或在下則纏滯在上則嘔食此為毒積未化
 胃氣未平證當認其寒則溫之熱則清之虛則
 用參朮補之毒解積下食自進矣 泄痢久不
 安膿血稠粘裏急後重日夜無度宜大黃湯用
 大黃一兩剉用好酒兩大盞浸半日同煮至一
 盞半去渣分為一次頓服之痢止停服未止再
 服以利為度又服芍藥湯以和之所以徹其毒

也服前藥痢已除宜以白朮黃芩湯和之
丹溪治一人患痢百餘日百法不効六脉促急
沉弦細弱乾左手爲甚晝夜十行視之穢物甚
少雖下清涕中有紫黑血絲食全不進此非痢
也宜作瘀血治之以桃仁乳香沒藥滑石佐以
檳榔木香神麴糊爲丸米飲下百餘粒至夜半
不動又依前法下二百粒至天明下穢如爛魚
腸者二升半困頓終日漸與粥食而安按此
方恐當有大黃無則難下又治族叔年七十

稟壯形瘦夏末患泄痢至秋百方不應視之病
雖久而神不瘳小便澀少而不赤兩手脉俱澹
而頗弦自言胸微悶食亦減因悟此必多年沉
積癖在腸胃詢其平生喜食何物曰喜食鯉魚
三年無日不用此積痰在肺肺爲大腸之藏宜
大腸之不固也當與澄其源而流自清以茱萸
陳皮青葱鹿首根生薑煎濃湯和以砂糖飲一
碗許自以指探喉中至半時吐痰半升如膠其
夜減半次早又服又吐半升而痢自止又與平

胃散加白朮黃連旬日而安。收澀用木香散
訶黎勒丸_{久痢}。休息痢多因堯住太早積不盡
除或因痢愈而不善調理以致時止時作宜四
君子湯加陳皮一錢木香半錢吞駐車丸只綠
堯住積滯遂成休息再投去積却用堯劑。張
文仲用虎骨灸焦搗末調服日三匙效。久痢
休息痢虛滑甚者用椿根白皮東南行者長流
水內漂三日去黃皮切片每一兩配人參一兩
入煨木香二錢粳米一撮煎湯飲之_{休息}。勞

痢因痢久不愈耗損精血致腸胃空虛變生他
證或五心發熱如勞之狀宜藟蓮飲赤多倍蓮
肉白多倍山藥痢後調補宜四君子湯加陳皮
一錢半卽異攻散或七珍散惡甜者生料平胃
散加人參茯苓各半錢。諸病壞證久下膿血
或如死猪肝色或五色雜下頻出無禁有類滯
下俗名刮腸此乃藏府俱虛脾氣欲絕故腸胃
下脫若投痢藥則誤矣六柱飲去附子加益智
仁白芍藥或可冀其萬一。痢後風因痢後下

清一
虛不善調將或多行或房勞或感外邪致兩脚
痿軟若痛若痺遂成風痲獨活寄生湯吞虎骨
四斤丸或用大防風湯或多以骨碎補三分之
一同研取汁酒解服外以杜牛膝杉木節白芷
南星草薺煎湯熏洗丹溪云痲後風係血入
藏府下未盡復還經絡不得行故也松明節一
兩以乳香二錢炒焦存性蒼朮黃蘗各一兩紫
葳一兩半甘草半兩桃仁去皮不去尖一兩俱
爲末每服三錢生薑同杵細水盪起一二沸服

隣人鮑子年二十餘因患血痲用澀藥取効
後患痛風號叫撼隣里予視之曰此惡血入經
絡證血受濕熱久爲凝濁所下未盡留滯隧道
所以作痛經久不治恐成枯細遂與四物湯桃
仁紅花牛膝黃芩陳皮甘草煎生薑汁研潛行
散入少酒飲之數十貼又與刺委中出黑血近
三合而安寶鑑云且如瀉痢止脾胃虛難任
飲食不可一槩用剋伐之劑若補養其脾胃氣
足自然能飲食宜錢氏方中異攻散設或喜嗜

飲食太過有傷脾胃而心腹痞滿嘔逆惡心則
 不拘此例當權用橘皮枳實丸一服得快勿再
 服若飲食調節無傷則胃氣和平矣

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

(The reverse side of the page is mostly blank with some faint markings and a small mark at the bottom left corner.)

