

午32
7

胎產集要

同治辛未重刊

古今圖書集成

板存懷水堂如有樂善印施即
向常熟縣南街毛文彬刻字店
刷印言定每部工料錢拾文

序
胎產之道易事也而或苦其難生機也而或瀕於死
是欲免於難以成其易遠於死以安其生則保護之
調劑之不可無其術矣鶴湘黃君所輯胎產集要三
卷幼科撮要一卷其書本達生編而附益之胎前產
後及一切難產之症皆有治之之法可謂詳且備矣
北方本無是刻余師鷺客先生自吳中攜以入都
余閱而愛之問之則南方刊板已漫漶而無存余惜
其法之備而傳未廣也將浸久而并失其傳也且憂

人之無以成其易安其生也因請於師復付剞劂以
廣其傳庶幾家置一編猝遇難產之症可以有恃而
無恐則亦仁術之一助也云爾

道光十有九年冬十月宗室惠林識

胎產集要上卷

增訂達生編

保產機要總論

贊育編難產七因

一因安逸

一因奉養

一因淫慾

一因憂疑

一因嬌怯

一因倉皇

一因乏力

胎產護生篇胎前禁忌

一忌食諸物有毒傷胎

一忌洗浴

達生編保胎

孕婦禁忌

懷孕八九月忽然聲啞

胎前節養六條

一除惱怒

二禁房勞

三戒生冷

四慎寒溫

五服藥餌

六宜靜養

保產機要受胎保護

達生編小產當慎

經驗胎養良方

竹茹湯治惡阻

清燥湯治便難

固真飲治白帶

安胎飲治血噉

安胎丸

繡閣保生書懷姪一月安胎飲大安胎飲

懷姪二月陳皮大半夏湯

懷姪三月抑青丸

懷姪四月安胎和氣飲

懷姪五月養胎飲

懷姪六月大安胎如勝飲

懷姪七月清胎萬全飲

懷姪八月束胎調氣飲

懷姪九月順胎和氣飲

懷姪十月滑胎飲猪肚方

醫方考胎前要法

條芩白朮考

砂仁葱白湯治腹痛

犀角散治子煩

四物加連夏湯治子癟

紫蘇飲治胎上逼心

膠艾湯治胎漏

冬葵子湯治子淋

木通散治子腫

三合湯治轉胞

束胎飲

達生散

催生諸藥考

黑神散

食藥忌

胎前上卷

鶴湖黃惕齋輯

保產機要總論

湯處士

婦人胎產造化自然之理本古今常事時至則生不必驚疑而人人不免驚疑者爲未明乎自然之理也造化原不令人難生人多不善調攝因而難生造化原不令人逆生人多倉皇無主因而逆生或難或逆性命攸關可不慎歟至於穩婆產時不可不用亦不可輕易聽從蓋此輩無書傳授偏執已見胡做亂爲往往誤事尤爲夫君者宜於平日家中講談令婦女熟聞懷孕知調攝

臨產有主張。并誠穩婆安靜以待之。自無難逆之患。以懷孕後論。雖未能如古人胎教。但所當禁忌者。亦宜省悟。以臨產時論。胎至十個月。形完氣充。手足必動。子動母腹必痛。痛急胞衣必破。胞破子必出。胞而下。若不任其自然。見其腹痛半日一日不產。便欲用藥催生。不知胞衣未破。子猶未出。胞衣一催之間。爲害非小。所以臨產切不可驚疑。卽或兩三四五日不下。須要寬心忍痛。任其自然分娩。

贊育編難產七因

一因安逸。婦人懷胎。血以養之。氣以護之。宜當時行動。

令氣血周流。胞胎舒展。若久坐久臥。氣血凝滯。則必難產。常見田家勞苦之婦。其產甚易。可證也。

一因奉養胎之肥瘦。氣通於母。恣食厚味。多致胎肥難產。常見貧家婦。容易生產。可證也。故產母調攝須以白飯香蔬。畧用肉食爲妙。承養血之藥。歸聖東說。

一因淫慾。古者婦人有孕。卽居側室。不共夫寢。若有孕而犯之。三月以前。常致胎動小產。三月以後。一則胞衣太厚而難產。二則子身有白濁物而不壽。三則多患瘡毒。出痘細密難起。以致死亡。皆由父母慾火所結耳。

一因憂疑今人不講生產之理或問禍福於鬼神或用
禱求於卜筮或里中有產厄者孕婦聞之則懼懼則
氣怯故亦難產

一因嬌怯如少婦初產子戶未開卽便腰曲不伸展轉
傾側以致兒不得出又中年婦人生育既多氣血虛
損產亦艱難須胎前服補氣養血之藥調理康健則
臨產無虞婦人稟體素弱者亦同此例

一因倉皇將產之際有等愚蠢穩婆不審正產與轉胎
但見腹痛遽令努力催生產婦聽從以致橫生倒生
子母有傷

一因乏力臨產用力太早及兒欲出母力已乏停住艱難服人參湯接力卽產若兒已下地產婦切不可服參用童便最妙

胎產護生篇胎前禁忌

一忌食諸物有毒傷胎牛犬羊驢馬兔鱠鱈鯉魚鱠魚無鱗魚雞肉鷄子鴨子雀肉水雞猪頭猪腳猪心猪腦猪腦肝腸諸血胡椒子薑葱蒜茨菰香蘭苡仁梅子杏子地栗茄子萐苣冰漿

漿水粥 生冷油麵等物 豆醬不可與藿同食

一忌洗浴

不可洗頭不可洗足不可洗身臨月尤宜禁戒關係
非小

達生編保胎

吳琢峯

婦人懷孕夜睡須左右轉換不可偏睡一邊使小兒亦
左舒右展肢體活動臨產自然快便矣

飲食宜淡泊不宜濃厚宜清虛不宜重濁宜和平不宜
辛熱但富貴之家肥甘悅口抑令宗儉勢必不能酌
其所宜開列於後

蓮心

松子

熟藕

山藥

芡實

鴨

鯽魚

鱸魚

鰻鱺

海參

豬膾

多用

筍

少用

麻油

腐

衣

莧菜

勿多飲酒

勿亂服藥

孕婦禁忌 一切宰殺兇惡之事不宜看 修造立木

動土不宜看 龜 兔 俱不可見

懷孕八九月忽然聲啞此因胞之絡脉絕也蓋胞絡繫於腎少陰之脉貫腎繫舌本絕則舌強難言不必驚惶不必醫治當十月自平復切勿著急亂投方藥

胎前節養六條

每見產後絕症隨產隨脫無計可施。有一種氣虛欲脫，瘀血猶滯於中。汗出神昏，上吐下瀉，或面青肢冷，或氣喘直視，危急異常。因於瘀滯者，用川芎當歸各參錢，桃仁去皮尖拾貳粒，甘草伍分，炮姜灰壹錢，名生化湯。或芎歸湯先通其瘀，卽補其原。因於虛脫者，用獨參湯，童便，或參附湯，先保其原，再和其血。又有一種元氣又真虛瘀血又壅滯，欲補其原，瘀卽上攻，欲消其瘀，原卽隨脫。雖有攻補兼施之法，如人參蘇木飲，人參生化湯之類，亦未見効。此名絕症，只因胎前失於檢點，及至臨

益欲救不能追悔何及謹列胎前節養六條預爲調理
指引孕婦皆登壽域

一除惱怒 凡受胎後切不可打罵人蓋氣調則胎
安氣逆則胎病惱怒則否塞不順肝氣上沖則嘔吐
衄血肺脾受傷肝氣下注則血崩帶下滑胎小產欲
生好子者必須先養其氣氣得其養則生子性情和
順有孝友之心無乖戾之習所謂和氣致祥一門有
慶無不由胎教得之

二禁房勞 保產以絕慾爲第一要事試觀猫犬至
微尙知有孕不復交合何況人爲萬物之靈豈反不

如猫犬所以婦人懷孕只宜分床獨宿清心靜養則
臨盆易生易育得子少病而多壽倘或房勞不慎必
致陰虛火旺半產滑胎可不謹歟

三戒生冷 胎前喜食生冷只因懷孕以後多惱多
氣不慎房勞以致火旺口渴殊不知生冷等物豈能
退血分之熱徒使脾胃受傷瘧疾痢疾嘔吐泄瀉諸
病皆由此起病則消耗精液口渴愈甚惟戒惱怒慎
房勞服健脾補血之藥調理本原可保平復否則臨
產之虛脫產後之絕症斷不免也

四慎寒溫 胎前感冒外邪或染傷寒時症鬱熱不

解小產墮胎攸關性命要知起居飲食最宜調和夏
不登樓宜著地氣夜不露坐宜緩背腹古人有言不
受寒自不發熱不傷風自不咳嗽此爲胎前緊要關
頭

五服藥餌 胎前產後藥能起死回生有等不明醫
道者訛言胎產不必服藥迷亂世人意見以致失於
調補雖有十分苦楚惟株守含忍勉強臨盆諸症蜂
起若知接養之方則不惑於醫藥隨時調補母子安
全太平無事

六宜靜養 胎前靜養乃第一妙法不較是非則氣

不傷矣。不爭得失，則神不勞矣。心無嫉妒，則血自充矣。情無淫蕩，則精自足矣。安閒靜養，即是胎教紹宗祧之重。承舅姑之歡，叶琴瑟之和，衍螽斯之慶，所以古人心先靜養，無子者遵之，卽能懷孕。懷孕者遵之，卽易生育。靜養所關，豈不大哉。

保產機要受胎保護

一、受胎後不可看戲及鬼怪形像。

二、受胎後不可升高處，恐傾跌有損，亦不可舉手向高處取物，恐傷胎。而子鳴腹中如鐘聲，亦有治法。但令曲身片時卽安，蓋胞內有疙瘩，兒含口中，因母舉手，

向高處脫出兒口是以啼也又法散錢於地令母拾取亦效

一受胎後三五箇月常要緊束其身勿令胎放
二受胎六七箇月或八九箇月胎忽亂動兩三日間或
痛或止或有水下但腰不甚痛胎未離經名曰弄胎
又曰試胎胎水有無俱不妨但直身坐臥行立不可
驚憂逼迫以致悞事二者俱非正產必因觸犯致此

達生編小產當慎

三月五月而墮者爲小產七月而墮者爲半產

小產者因胎臟損傷胞繫腐爛以致墮胎比之大產

用度集要
更重視爲輕忽而殞命者有之必須倍加將息宜
服補血養氣生新去瘀之劑世有服墮胎藥者害
莫大焉

大抵半產者除跌撲損傷外有無故而忽墮者多在
三五七月若前次受胎此月曾墮者後至此月必
復應期而墮蓋三月乃手厥陰心包絡所養五月
乃足太陰脾經所養七月乃手太陰肺經所養
心包絡名相火內屬於心代君火行事其經多血少
氣若悲哀思慮驚動而神氣內虛則墮

脾爲五臟之本生化之源其經多氣少血若飲食失

宜起居不慎脾土受傷不能化血養胎則墮

肺主一身之氣所以流行血脉舉載胎元是經亦多氣少血若大勞大哭頻沐頻浴多犯寒涼氣血虧損不能內固則墮凡此三經關係最大此月經虛不能任養而墮後至此月經益虛故復墮必須用對症之藥先期半月服十餘劑調補防過此月則胎自固矣三月前用芎歸補中湯或茯神湯五月前用安中湯或五味異功散加芎歸麥冬阿膠如吐嘔用六君子加砂仁山藥扁豆生薑大棗七月前用補中益氣湯倍加當歸川芎砂仁棗仁薑

棗如有別症，更加斟酌。此月防過尤宜慎之。

經驗胎養良方

懷孕五十日，四肢軟倦，背惡寒、眩暈、恶心、嘔吐痰涎，思食酸物，爲惡阻之症，宜用竹茹湯五六劑。

熟半夏

陳皮

蘇梗

廣藿

條芩

黑山梔

枳殼

白芍

各壹錢
酒炒

白荅

壹錢
伍分

加青竹茹

參分
連伍分

河水

煎

如火旺吐甚者，加酒炒川連

伍分

黑山梔

壹錢

麥冬

貳錢
去心

胃虛者加白朮

壹錢
土炒

金石斛

貳錢

氣

滯者加香附

參錢
酒炒

懷孕六七十日，大便燥結，腹滿，努力難解，無故悲泣，謂

之臟燥宜用清燥湯六七劑

歸身

白芍

酒

瓜蔞仁

各壹錢伍分

生地

麥

冬法

麻仁

各貳錢炒

甘草

肆分

枳殼

麸炒

條芩

各壹錢

加松子仁

參錢

河水煎調白蜜十匙服

懷孕三四月內熱體倦腰腿酸痛白帶淋漓小便頻數飲食少思謂之子淋宜服固真飲

白术

土炒

條芩

續斷

鹽水炒

白蓮鬚

芡實

廣

皮錢

各壹

杜仲

鹽水炒

山藥

各壹錢

伍分

麥冬

貳錢去心

加建蓮

伍枚

不去心打碎

天泉煎

懷孕四五月咳嗽惡心煩熱胎動不安或痰血或鼻衄

皆因火旺上冲肺經謂之子嗽宜用安胎飲六七劑

生地

參

歸身

麥冬

各壹錢伍分去心

白芍

貳錢酒炒

真阿膠

杜仲

鹽水炒

續斷

鹽水炒

條芩

焙

枳殼

各壹錢炒

加炒砂仁末

參分

河水煎

懷孕三月惡心懶倦已退臟燥已潤宜服四五六七八

逐月安胎丸一料和中保胎養血調氣健脾進食功

效無比

生地

肆兩加砂仁末壹兩水酒煮爛杵

歸身

酒洗蒸

白芍

酒炒

於术

各參

兩米泔浸切片飯上蒸晒五次土拌炒焦

陳皮

條芩

酒炒

川斷

鹽水炒

杜仲

鹽水炒斷絲

麥冬

各貳兩去心水浸搗

共搗烘乾磨末煉

蜜爲丸每朝砂仁湯送下參肆錢如脾虛多瀉者

加山藥

免絲餅

各參兩

如元氣大虛者加人參

貳兩

如血虛者加真阿膠

貳兩

繡閣保生書保產良方

懷姪一月不須服藥如有不安卽當調治宜服安胎飲

白朮

貳錢微炒養胃清痰

條芩

壹錢伍分微炒清肺中熱降火消痰

水一鍾

煎服或爲細末以清米湯調服一匙如血不足加

歸身

壹錢伍分

大安胎飲

當歸

貳錢

人參

甘草

炙

荆芥穗

各伍分

桑寄生

砂仁

炒不
去殼

川芎

白术

白芍

煨
炒

續斷

鹽水

條芩

炒

熟地

各壹錢
酒洗

水煎服

如覺氣

不順而喘加蘇梗

壹錢

懷姪二月胎氣始盛逆動冒氣惡阻嘔吐飲食少進用

陳皮大半夏湯

陳皮

去白鹽
水拌晒

茯苓

各壹錢

子芩

以薑
汁炒

枳殼

麸
炒

紫蘇

各捌分

甘草

伍分
炙

製半夏

貳錢
伍分

薑片

壹
錢

水

鍾半煎七分食遠服

懷姪三月惡阻不止飲食少進前方爲主煎湯下抑清

川黃連

薑汁炒
三次

研末米糊爲丸如菉豆大不拘多

少服之。

懷姪四月如覺倦臥不安或口苦頭痛腳弱及腫急服安胎和氣飲。

歸身

酒洗

白术

各壹錢伍分土炒

白芍

壹錢炒

陳皮

貳錢去白

黃芩

炒

茯苓

香附

白芍

鹽水炒

甘草

炙

川芎

各伍分

水煎服熟多加山梔

壹錢

懷姪五月覺胎長腹重睡臥不寧服養胎飲。

白术

壹錢伍分炒

白芍

酒炒

歸身

酒洗

澤瀉

各壹錢

川芎

芎

黃芩炒

枳殼

各捌分炒

甘草

肆分炙

水煎服

懷姪六月或腹痛或脹悶或胎動不安服大安胎如勝
飲

當歸貳

白术壹錢

茯苓

子芩

白芍酒

炒

砂

仁炒去衣

桑寄生各壹錢

甘草伍分

水煎服

懷姪七月覺胎氣不安或損傷漏血或腹大重墜急服

清胎萬全散

當歸

白术炒

續斷

各壹錢伍分酒洗

子芩

酒炒

白芍

酒

熟地

酒洗

桑寄生

真阿膠

各壹錢蛤粉炒

茯苓

荆芥

各捌分炒

甘草

五分

水煎服

懷姪八月覺胎氣不安氣逆氣喘不問有無外感宜服

束胎調氣飲七八日一服

陳皮

貳錢

子芩

壹錢五分

枳殼

炒

蘇梗

白芩

白

术

各壹錢炒

甘草

叁分

水煎服

懷姪九月雖無他症亦宜順氣和中扶脾安胃使無難
產之患宜服順胎和氣飲八日一服

當歸

貳錢

白术

壹錢伍分炒

子芩

滑石研

蘇梗

新會皮

白芍

各壹錢酒炒

大腹皮

捌分豆汁浸水洗四次淨

水

煎服

懷姪十月宜服滑胎飲二三日一服

當歸

壹錢伍分

白芍

貳錢酒炒

川芎

陸分

白术

炒

陳皮

香附各壹錢
黃芩炒

蘇梗各伍分

甘草參分

水

煎服氣虛者加人參壹錢

胎肥者加枳殼壹錢

猪膽方

人參壹錢

蓮肉壹兩去心

白穉豆

貳兩去皮

用雄豬膽一

個洗淨將人參等裝入用線紮口將大砂鍋一箇用碎碗片鋪底防著鍋煮焦之患扣水慢火燉熟孕婦七八個月每月吃二三個連湯藥吃完大補脾胃精神健旺可免崩暈諸症

醫方考胎前要法

黃芩白朮考

白术益脾能培萬物之母黃芩瀉火能滋子戶之陰

故曰安胎聖藥

砂仁葱白湯

砂仁

壹錢
炒去
衣研末

連鬚葱白

參
根

煎湯服

妊娠腹

痛此方主之腹痛者氣血滯滯不通之故用砂仁順氣於下葱白順氣於中氣行血利其痛自止倘別有他故而痛者宜隨症以治之

犀角散

犀角

伍分
鎊

地骨皮

麥冬

各貳錢
去心

赤茯神

壹錢
伍分

條芩

壹錢

甘草

伍分

子煩者懷妊而煩悶也此方

主之煩悶者。因心肺有熱也。用犀角涼心。骨皮退熱。
條芩瀉火。麥冬清金。茯神導赤。甘草和中。

四物加芩連姜夏湯

當歸貳錢

川芎陸分

熟地參錢

白芍酒炒

黃芩各壹錢伍

黃連伍分

酒炒

半夏壹錢

生姜壹片

子癟者懷孕

而癟仆也。由陰虛火亢。痰氣厥逆。故令暈倒。作羊犬
之聲。方用四物以養血。芩連以降火。姜夏以破逆。

紫蘇飲

蘇梗

人參

陳皮

各壹錢

大腹皮

豆汁浸水洗四次淨

當歸各貳錢

川芎捌分

甘草伍分

白芍壹錢伍分

白芍壹錢伍分

白芍壹錢伍分

白芍壹錢伍分

白芍壹錢伍分

子

懸者胎氣不和湊上心腹腹滿閉悶氣塞欲死此因
下焦氣實大氣舉胎上逼於心故以蘇梗腹皮陳皮
川芎流其氣當歸芍藥利其血氣流血利則胎自安
科矣又用人參甘草者邪之所湊其氣必虛流氣之
藥推其陳補氣之藥致其新耳

膠艾湯

熟地

貳錢

艾葉

當歸

各壹錢

川芎

甘草

炙

真

阿膠

各伍分粉炒成珠

黃芪

貳分伍厘

胎漏者懷胎而點滴
下血也此係陰虛不足以濟火氣虛不足以固血故
有此症方用阿膠熟地當歸川芎益血藥也黃芪甘

草艾葉固氣藥也。血以養之。氣以固之。止漏安胎之道畢矣。

冬葵子湯

冬葵子

貳錢
畧炒

柴胡

伍分
炒

桑白皮

炒

白茯神

歸身

各壹錢
伍分

白芍

壹錢
酒炒

子淋

本於濕熱此方滑

以去著故用冬葵子清升則濁自降故用柴胡氣化
則便自出故用桑皮辛利則能潤竅故用當歸茯神
芍藥取其入血而利丙丁也又方單用地膚子四
兩水煎分作三次服能祛濕熱此亦良方也。

木通

蘇葉

香茅

桑白皮

枳殼

炒

檳榔

條芩

各伍分

調子皮

木香

各參分

妊娠氣

血失調營衛滯滯故令身體浮腫四肢脹急而小便不利也此方紫蘇流氣于表桑皮枳殼木香木通檳榔流氣於裏香茅木流氣中之濕條芩流氣中之熱調子流氣中之涼服藥之後營衛流行氣血健運則浮腫諸疾可得而愈矣

三合湯探吐法

人參

壹錢

白朮

土炒

白芍

各壹錢伍分酒炒

茯苓

生地

當歸

各貳錢

川芎

捌分

半夏

陳皮

各壹錢

甘草

伍

妊娠轉胞不得小便者此方主之 胞非轉也
由孕婦中氣怯弱不能舉胎胎壓其胞故小便不通
耳方用二陳四物四君子三方合煎服而探吐之所
以升提其氣上竅通而下竅自利也

束胎飲

白朮

貳兩
炒

茯神

柒錢
伍分

陳皮

黃芩

各壹
兩

妊娠

七八月服此胎氣斂束令人易產 凡患難產者多
由內熱灼其胞液以致臨盆之時乾澀難產或脾氣
怯弱不能運化精微而令胞液不足亦難產之道也
故用白朮茯神益其脾土而培萬物之母黃芩清其

胎熱瀉火而存胞液陳皮取其辛利能流動中氣化
其肥甘使胎氣不滯兒身弗肥此束胎之義也

達生散

大腹皮

參錢豆汁浸水洗四次淨曬乾

人參

陳皮

紫蘇

歸

身白芍

酒炒

白术

各壹錢

甘草

伍分炙

葱根

黃

楊樹頭

染枝

春加川芎

夏加黃芩

秋冬加砂仁

枳殼

妊娠臨月服之易產

達小羊也羊子易

生而無留難故名達生

難產之故多是氣血虛弱營

衛滯滯使然此方人參白术

甘草益其氣當歸芍藥

益其血紫蘇大腹陳皮

流其滯氣血不虛不滯則其

產子猶達生矣。

催生諸藥考

生不必催也。催之非但無益而反害之矣。古方有用
兎腦者。有用豬脂者。有用油蜜葱白者。有用冬葵子
者。有用牛乳榆皮滑石者。有用金鳳子者。又有用弩
牙灰者。有用石榴枝者。有用筆頭灰者。有用百草霜
者。有用伏龍肝者。有用鑿頭灰者。有握石燕者。有用
蓖麻子貼於足心者。用之不驗。徒增繁擾噫。平時失
於調理。臨產艱難。頻以雜藥催之皆惑也。

黑神散

熟地

當歸

白芍

各貳錢

蒲黃

壹錢

乾姜

黑炒

桂心

各伍錢

甘草

參炒錢

黑豆

貳合半

共爲細

末每服貳錢童便和酒調下。胎死腹中此方主之。
胎死者難產多日而胎死也視產婦舌色青黑爲驗。
方用蒲黃逐敗血熟地芍藥當歸養新血乾姜肉桂
引新血去敗血甘草黑豆調正氣除戾氣並治胞衣
不下產難血暈餘血奔心兒枕疼痛乍見鬼神等症
此皆瘀血爲患故並治之

通鑑 卷之二十一 反對之文

人主之謂也。故曰：「知彼者勝，不知彼者敗。」此皆兵家之法。夫兵者，非所以輕舉也。豈可與無謀者同處乎？故曰：「將軍當識其勢，而將士當識其情。」則將軍者，當識其勢；將士者，當識其情。未嘗無有變動，而敵臨于前，則將士當識其情。故曰：「將士當識其情。」

卦

易

卦

爻

卦

爻

卦

爻

卦

爻

繫辭

當體

白卦

配心

各

質

上

龍

黃

壹

當體

易

卦

爻

卦

爻

卦

爻

卦

懷孕食忌

食雞子糯米令子生寸白蟲。食羊肝令子多疾。食鯉魚令子成疳。食犬肉令子無聲。食兎肉令子缺唇。食鱉令子項短。食鴨子令子心寒。食螃蟹多致橫生。食雀肉令子好淫。食豆醬令子發喙。食野獸肉令子多怪疾。食生薑令子多指。食水雞鱣魚令子生癩。食驥馬肉延月難產。

懷孕藥忌

烏頭附子與天雄。牛黃巴豆並桃仁。芒硝大黃牡丹桂。牛膝藜蘆茅茜根。槐角紅花朴皂角。三棱

莪朶薏苡仁 乾漆蘭茹瞿麥穗 半夏南星通草同

乾薑大蒜馬刀豆 延胡常山麝莫聞 此係婦人

胎前忌 常須記念在心胸

右藥皆在禁例餘如斑蝥水蛭蛇蛻蜈蚣水銀信砒
等類非恒用之品姑置不論

考昔人安胎止嘔有用半夏者娠孕熱病有用大黃
妊娠中寒有用乾薑桂附者乃非常危證必醫者具
十二分識力十二分膽氣庶可權宜暫用此岐伯所
謂有故無殞亦無殞也之旨切勿輕率妄施草菅生

命慎之慎之

胎產集要中卷

增訂達生編

臨產六字真言

橫生

倒生

偏產

礙產

坐產

盤腸產

凍產

熱產

驚產

胞破產難

血滯產難

臨產暈絕

交骨不開

胎死腹中

胞衣不下

臨產宜忌

紫酒

保產無憂方

佛手散

加味芎歸湯

又加味芎歸湯

催生神杵飲

又方急救交骨不開

保胎神效方

千金牡丹方

催生神驗方

臨期中卷

鶴湖黃惕齋輯

達生編

六字真言 睡 忍痛 慢臨盆

初覺腹痛自己先立定主意生育乃自然之理天地
間極容易事不必驚慌但看痛一陣不住連痛三
五七陣漸痛漸緊知是大產方與人說知以便伺
候若痛得慢此爲試胎且自安眠穩食寬心靜養
此時是最要緊關頭不可認錯如兒身未轉胞漿
未破卽便坐草臨盆豈不有悞慎之慎之

臨期第一要忍痛。不問試胎與正產。忍住痛照常眠食。痛陣漸急。自然易生。看其繫慢方辨得清。千萬不可輕易臨盆。至囑至囑。或問忍痛過久。恐有不妙。曰。最妙。從未聞有私胎而難產者。蓋私胎怕人知覺。只得極力忍痛。忍到沒奈何時。子自脫然而下。此理甚明。有何疑慮。

將產時須要調養。心神愛惜力氣。若能上床閉目安睡。片時最好。若不能睡。暫時起身。或扶人緩行。或扶桌站立。痛若稍緩。又上床安睡。總以睡爲第一妙法。但宜仰睡。使腹中寬舒。小兒易於轉動。且大

人睡下小兒亦睡下轉身更不費力。

將產時切不可輕易臨盆倘若聽信穩婆說孩兒頭已在此以致用力太早誤盡大事此乃天地自然之理若當其時小兒自會鑽出何須著急從來瓜熟蒂落水到渠成自然而然不待勉強及至生下即產母亦不知其所以然也。

或謂大便亦須用力如何生產不須用力要知大便是呆物必須人力小兒自會運動不但不必用力却又切忌用力蓋小兒在母腹中要聽其慢慢轉身尋到產門頭向下脚向上倒懸而出若小兒未

曾轉身用力一逼則腳先出轉身未定時用力一逼則橫臥腹中一手先出卽或轉身向下生路未正用力畧早亦偏在一邊不得出種種弊病皆是時候未到誤於用力之故卽如大便未到糞門縱然用力亦不能出而況於生產乎

或問如何方是用力之時答曰若小兒逼到產門則產母交骨分開胸中陷下腰腹重墜異常大小便一齊俱急目中金花亂閃真其時矣當於此時用力一迸小兒誕生便稱恭喜矣
或曰早一時斷不可動矣不知遲了一時可不妨否

答曰不妨若果當其時必無不出之理卽或有不出者此是小兒力乏不能卽出但令產婦上床安睡使小兒在腹中亦得安睡歇力片刻自然生矣或問臨期有經驗丸丹亦可用否曰不用大丸生產自有時候時至自生何消用藥未到時候切不可早用催藥強其速生使兒不能轉胞反致橫生倒生如欲服藥須待腰腹痛急胞水與血俱下真正是將產時候始可用藥順勢推之藥亦只須用加味芎歸湯佛手散蓋胎前要血足血一足如舟得水何患不行特恐產母血少又或胞漿早破以致

乾澁耳今二方俱大用芎歸使宿血頓去新血驟生隨手見效且使產時快便則產後無病其餘耗氣損血等藥雖極靈應總之無益昔陳氏妻生產九日不下僅存一息叩醫求死腦丸問之曰頭逼產門不得出醫令安臥卽與加味芎歸湯明日生下母子兩全設與催藥反或有悞按此係產母用力太早逼令橫在腹中耳豈有倒懸十日而尙得生者乎

或曰穩婆總究該用否曰旣有此輩亦不可不用但要全憑自家作主不可聽命於彼耳大抵此等人

多愚蠢不明道理。一進門來不問遲早便令坐草
用力必定說孩兒頭已在此或採腰擦肚或手入
產門探摸多致損命更有狡惡之輩不肯安靜故
作哎訝之聲以逞其能欲索重謝以致產母驚疑
害尤不可言矣。接吳越間謂之穩婆江淮間謂之
收生婆徽寧間謂之接生婆因其年老慣熟使之
接兒落地收兒上床耳原非要他動手也每見富
貴之家預將穩婆留住及到臨時稍不快便前門
後戶引到無數紛紛攘攘鬧成一片所謂天下本
無事庸人自擾之昔張氏妻年輕體壯每孕必

八個月而產每產必數日而下生女必過而死一
醫曰日後臨產可相聞明年又八個月而產三日
不下僅存殘喘忽憶醫言飛輿相召診之脉未離
經穩婆在旁曰兒頭已抵產門不得出耳醫急令
安臥且戒勿擾與安胎藥明晨主人出謝醫曰夜
來若何主人曰想是試胎今已安好後百二十日
計十二月足生男且少病多壽始知從前皆生生
取出因產婦體壯年輕幸得保全性命耳

或曰催藥不可亂投穩婆不可輕信已問教矣若先
時誤於用力以致橫生倒產奈何曰急令安睡用

大劑加味芎歸湯服之畧用手法自然生矣

橫生者因兒身方轉產母用力太早以致兒身未順先露手臂但令母仰臥穩婆以手徐推兒臂令上復以中指摸其肩勿使臍帶絆繫待兒身轉頭正卽生倒生者因兒未及轉身產母努力一迸故先露足亦令母仰臥穩婆以手徐推足入靜候片時俟兒身轉正近門卽生但見兒手足畧有出意卽令母寬心仰臥輕輕送入勿令多出蓋出少則易入未久則易入如出多而久則手足青硬子必受傷難以扶入又切不可聽充惡穩婆用刀斷兒手足手足一斷則必亂

攬腹中兩命俱傷矣。昔一產婦兒手出不得入，穩婆礪刃以須醫見而惻然急令安臥，與大劑芎歸湯徐徐托之手入，明早生下母子皆安。右臂紫黑數月始消，有以鹽半分塗小兒手心，以香油抹之，輕輕推入，益鹽主收縮，且鱉人痛，兒手得鹽痛則縮進，自然轉身生下，足先出者亦如之。

偏產者，因兒生路未正，被母用力一逼，兒偏在左右，不得下。令母仰臥，穩婆輕手扶兒頭頂，中正卽生。又有兒頂後骨偏住，穀道旁露其額者，穩婆以綿衣烘溫裹手於穀道外邊，輕輕推兒頭令正卽生。

癱產者因兒轉身時母用力太早臍帶絆其肩也令母仰臥穩婆輕輕推兒向上以中指輕按兒肩撥下臍帶候兒正順卽生

四種難產總由產母曲腰坐臥用力太早所致四種手法必厯練有分曉者方可用之切勿輕試

坐產者因兒將產其母疲倦久坐椅褥抵其生路須用手巾一條拴繫高處令母以手攀之輕輕屈足作坐狀產戶舒開兒卽生下

盤腸產者因產母平日氣虛及臨產時用力弩換周身氣血下注以致腸隨兒下一次如此下次路熟亦必

如此治法急以潔淨漆器盛之。待兒胞衣俱下產母仰臥自己吸氣上升。穩婆以香油塗手。徐徐送入。一法以生半夏爲末。搐鼻中其腸自上。又法以醋半盞水七分調和噀產母面。每噴一綻三噴盡收。又法濃煎黃芪湯浸之卽上。

或問橫生倒產。此皆用力太早之故。世間亦有未曾用力而多難產者。何也。答曰。或因母體本弱。血氣虛損。胎養不足。或因母病傷寒之後。熱毒傷胎。亦或孕後不戒房事。以致慾火傷胎。又或多食椒姜煎炒等物。熱毒傷胎。以及跌撲損傷等症。皆致產難。藥用加

味芎歸湯佛手散復有凍產熱產驚產詳載於後

凍產者冬月嚴寒被衾單薄下部受凍以致血冷凝滯骨骱產戶堅收兒不能卽生速以芎歸湯加炮姜或肉桂與服一法以紫蘇煎湯薰洗大抵嚴寒時月產久傷冷氣血必凝用薰洗之法甚妙坐草太早去被良久常有此患慎之慎之

熱產者夏月酷暑產室人多熱氣逼蒸使產母熱傷氣分頭疼面赤昏昏如醉氣乏不能產下六一散主之驚產者或因少婦初次生產或因向來難產臨期恐懼以致氣結不行兒不卽下紫蘇飲最妙或用紫蘇錢

當歸參錢長流水煎服名舒鬱湯

胞破難產

胞衣先破其故有二一因母弱氣血虛胞衣薄兒身轉動隨觸而破一因兒身未轉坐草早用力狠以致胞破胞破久水血乾產路澁兒難下急用大劑加味芎歸湯加熟蜜壹兩助氣而兼滑胎自當順下又法

濃煎葱湯薰洗產戶卽下或以黃芪當歸飭許以大金煎之使藥氣充滿一室產母口鼻俱受其氣亦良法也又有胞水先破被風所吹以致產戶腫脹乾澁狹小者亦莫妙於濃煎葱湯薰洗再服加味芎歸湯

又有狡猾穩婆意欲害人私以手指掐破胞衣者

極要關防

血滯產難

臨期難產。敗血凝滯不能生下者。芎歸湯加牛膝瞿麥
服之卽產。一醫宿客店。值店婦生產數日不下。下

體甚冷。急以椒橙茱萸等煎湯薰洗臍腹產門等處
氣溫血行遂產。

產期未至不可令扶產人早抱腰恐兒難轉身。

臨產暈絕

臨產兒未生下忽然暈絕者。此因痛極氣悶急用生半

夏爲末飯丸好豆大納鼻中卽醒

此扁鵲法

交骨不開

臨產交骨不開因元氣素弱胎前又失於調養以致氣血不能運達而然也用加味芎歸湯無不立驗或神柏飲

胎死腹中

臨產腹中胎死或觸損傷或犯禁忌或因胎氣薄弱不成而殞至於臨盆太早胞漿先破胎血乾涸而死者更多只宜佛手散加味芎歸湯服之自下若不下再用當歸壹兩厚朴陳皮各貳錢酒水各半煎好加朴

硝壹錢能令化下極易。如或不便服藥，但令產母不要慌忙逼迫，亦遲遲生下，定不傷母。慎勿亂用奇方，並聽冤惡穩婆致傷兩命。

或問何以知其胎死？曰：面赤舌青，母活子死；面青舌赤，口中沫出，子活母亡。面舌俱青，口邊沫出，子母俱死。且死胎冷墜，脹痛，或爲嘔惡，或穢氣上衝，與好胎不同。薛立齋云：下死胎平胃散加朴硝、竇妙厚朴蒼术、陳皮各貳錢，甘草伍分，朴硝伍錢，水煎服。

胞衣不下

胞衣不下，亦是臨盆太早之故。當產時骨節開張，壯者

數日而合。怯者彌月而合。今不待其開。而強出之。故胎出而骨眼隨閉。以致胞出不及耳。如遇此症。用佛手散加牛膝瞿麥各貳錢。滑石壹錢。水煎服。自下若敗血流入胞中。胞卽脹大。不得下。治之稍緩。脹滿腹中。上衝心胞。疼痛喘急。宜急斷臍帶。使其子血脉不潮入胞中。但此帶極脆。宜以軟絹裹之。用心拿定。然後斷之。否則胞上掩心。立至危殆。宜急服牛膝湯。或佛手散。遂去胞中敗血。卽時墜下。只要產母安心。自無患害。切不可輕信穩婆妄用手法。多致死亡。兒既脫胞帶。必下墜。胞在腹中。形如仰葉。仰則盛聚血。

水脹礙難出惟得老成有識穩婆以手指頂其胞底使血不留聚或以指摸上口扳開一角使惡露傾瀉則中空自落矣

其有氣血疲弱不能傳送而不出者產母但覺乏力別無脹痛又當補氣助血宜加味芎歸湯不可亂投方藥或將產母頭髮弔起急以髮稍探母喉中一嘔卽下

臨產宜忌

臨產時只宜老成二三人安靜伺候切不可多人一切親族婦女勿令入房若多一人卽多一時遲延孝服

穢濁人尤當避忌。夏月更不宜多人。熱氣擁盛。能令產母煩躁發暉。其害非小。

穩婆只宜一人入房。不可多喚。反致混鬧。有誤。凡用穩婆。須擇老成忠厚者。預先囑託。及至臨盆。務必從容寧靜。千金曰。夜半覺痛。日中則生。可知時至自然分娩。不得用法催逼。

在房伺候者。總宜安靜。不可多言。令產婦穩睡爲妙。第一要勸其安心忍痛歇息。切忌在房中大驚小怪。交頭接耳。咨嗟嘆息。及求神許愿。皆能令產母憂疑擾亂。以致悞事。

卷之二

最忌曲身眠臥。蓋產母畏痛，不肯直身行動，以致胎轉不順，將到產門，被母曲腰遮閉，再轉再閉，兒必無力，而不能動，決定難產。人見其不動，卽謂胎死，實因無力非死也。此時在有妙藥，亦不能助兒有力而動，只要產母心安氣和，息養片時，自然生下。

切戒驚憂躁急。蓋驚則氣亂，憂則氣結，躁急則氣逆，惡血上冲，多致悶絕。

天時寒冷，產母衣裳宜厚，被褥宜溫，背心更宜和緩。房中宜多設火盆，辟除寒冷，否則氣血凝滯，兒難速下。盛暑之月，產室須要清涼，熱甚則產母頭疼面赤，必致

胎產錄要
昏暈宜多貯井水以收熱氣須頻頻換之若遇疾風
陰雨又當謹避

或有兒生不順與雙胎難出以及怪胎不必驚慌自然
生下總要穩婆多方安慰能不令產母聞知更妙倘
若驚慌則愈難生下

臨產以進食爲本此時心內憂疑腹內疼痛甚至精神
疲倦口中失味全要美味調養倘不能食雞鴨賸肺
清湯宜頻頻與之宜時食稠膩米粥令勿饑渴以致
乏力更不宜食硬冷難化之物

產時捏產母中指若中節跳動方是大產之時

臨產腰痛甚急兒逼產門方可坐草

臨產方藥

紫酒 治孕婦腰痛如折

黑料豆貳合炒焦 白酒壹碗

煎至柒分空心服如不善

飲酒者水煎服服藥後畧飲酒壹貳口以助藥力

保產無憂方

川芎參分

白芍壹錢伍分酒炒

冬月減半

黃芪壹錢蜜炙

歸身貳錢

酒炒

羌活陸分

枳殼柒分

炒

伍分打碎

兎絲子酒炒

厚朴伍分姜炒

汁炒

大棗貳錢

香附壹錢

加砂

醋拌炒

伍分打碎

仁末伍分炒去衣

大棗貳錢

煎服

懷胎至六個月每

月卽用貳參劑至彌月候加川貝

貳錢去心研

臨產時加

人參

錢許如無人參倍用黃芪

免絲子不特易產可免

產後諸病

佛手散 姕娠六七月後或跌撲傷胎或胎死腹中疼

痛不已口噤昏悶或心腹飽滿血上衝心者服之生

胎卽安死胎卽下又治橫生倒生及產後腹痛發熱

頭疼逐敗血生新血并除諸病

當歸

伍錢

川芎

空錢

水半分酒參分煎服

加味芎歸湯 治一應難產及交骨不開其效如神

當歸

壹兩

川芎

空錢

龜板

于大一片醋

水打

碎白敗者尤妙

打

妙

婦人

頭髮

如雞子大一團
沈淨燒灰存性

白水二碗煎一碗服卽生如死

胎卽下

龜板滋陰以益腎髮灰補血而消瘀更加

芎歸以調和營衛行而不竄補而不壅服之能令氣血充足而無阻滯之患保產第一方也

又方

本名加味
芎歸湯

臨盆將產服此最妙屢試屢效

當歸

壹兩

黃芪

伍錢

川芎

益母各參

益母

各參錢

枳殼

壹錢炒

催生神杵飲

方出濟陰綱目保產機要

婦人臨產服之活血逐瘀可保萬全不拘橫生倒生

胎爛腹中脹悶及少婦交骨不開用之屢效

生梓枝

貳兩洗淨剉

甘草

伍錢

水二碗煎一碗服

又方急救交骨不開

少婦初產交骨不開或因臨盆太早用力催逼兒橫

腹內諸藥無效此方百發百中

生梓枝

洗剉

益母草

各壹兩

川芎

當歸

各伍錢

加

人參

參分

水二碗煎一碗溫服

產婦須仰臥片時

待藥力到時交骨自開兒身順正然後扶起產母臨

盆脫然而生全不費力矣

方用梓枝取其滑澤益

母動血活血芎歸養血調氣人參接養母力更兼安

心靜臥使藥力通達自必脫然而產矣

保胎神效方

依達生編增入

此方保產神效凡

小產之患併無雜症侵擾臨產時服一劑可以杜絕血量血脫血塊無乳等症。

當歸

壹錢伍分

川芎

壹錢叁分

厚朴

柒分

薑汁炒

陸分

枳殼

陸分

兔絲

子

貳錢酒分

斷艾

伍分

川羌活

伍分

貝母

壹錢

去心研

荆芥

捌分

炙黃耆

柒分

白芍

壹錢貳分

酒炒

伍分

甘草

伍分

水二鐘薑三片煎至八分溫服

醫學心悟云凡新孕婦火胎氣完固腹皮緊窄氣血裏其胞胎最難轉動此方用擰法焉當歸川芎白芍養血活血者厚朴去瘀血者也用之擰開血脉俾惡露不致填塞羌活荆芥疏通太陽將背後

一擰太陽經脉最長太陽治而諸經皆治枳殼疏
通結氣將向前一擰俾胎氣歛抑而無阻滯之虞
艾葉溫暖子宮擰動子宮則胞胎靈動川貝兔絲
最能運胎順產將胎氣全體一擰加黃耆者擰扶
元氣則轉運有力也生薑通神明去穢惡散寒止
嘔擰扶元氣而安胃氣也甘草協和諸藥俾其左
右咸宜全其擰法之神者也臨產先服一二劑自
然易生或遇橫生倒產甚至連日不生速服一二
劑應手取效

千金不易牡丹方

治產後十三症

依達生編增

當歸 壹錢 川芎 壹錢伍分

生地黃

壹錢伍分

澤蘭葉

壹錢伍分

香附 壹錢伍分 醋炒 延胡索

壹錢伍分

益母草

壹錢伍分

產婦冒風加防風

壹錢伍分

天麻

壹錢伍分

血暈加五靈脂

壹錢醋炒

芥穗

壹錢炒黑

三四朝發熱 加炮薑

壹錢炒黑

人參

壹錢黃耆

壹錢

心膈迷悶加陳皮

壹錢枳殼

壹錢砂仁

壹錢

血崩加地榆

壹錢黑山梔

壹錢桔梗

壹錢丹皮

壹錢

咳嗽加杏仁

壹錢桑皮

壹錢桔梗

壹錢丹皮

壹錢

死血不行腹硬加紅花

壹錢枳實

壹錢桃仁

壹錢

壹錢

飲食不進加山楂 壹錢
麥芽 壹錢

脾胃作脹加白朮 壹錢
蒼朮 壴錢
茯苓 壴錢
厚朴 壴

錢陳皮 壴錢
砂仁 壴錢
枳殼 壴錢

心神恍惚加茯苓 壴錢
遠志 壴錢

胎衣不下加朴硝 叁錢

催生神驗方

里婦坐草三日不生人事昏憒忽遇異

人授以此方卽如法服之出戶未久俄聞兒啼則已生矣婦醒詢曰我憒中不知以何物灌我甫入腹便覺一夾板推兒下亦不甚困苦予屢以此授人百發百中服者勿疑

茉莉花

七菜花開時摘下夾書本中勿令泄氣臨時取用輕者更佳

芝蔴一撮

先將茉莉花盛潔淨碗中次將芝蔴入銅杓內炒香用水一茶盃傾入芝蔴中煮一二滾連芝蔴傾入茉莉花碗中少蓋片時浸出花味與產婦服之氣壯者連芝麻茉莉花食下氣弱者只吃湯亦可

立時有效未足月者服之傷人慎之

桔梗水

桑葉煎大艾頭中藥

交趾草根節

胎產集要下卷

增訂達生編

產後宜忌

發喘

血暈氣脫

中風發瘓

惡露不下

產門不閉

子宮不收

產後不語

狂言譫語

浮腫

霍亂

血虛發熱

乳少

產後方藥

用法集要
生化湯

牛膝湯

參蘇飲

增損四物湯

清魂散

華陀愈風湯

人參乾姜湯

補中益氣湯

當歸補血湯

補心丸

補脬飲

通脈湯

產後虛汗不止

產後瘧疾

產後痢疾

奇病症治七條

回生丹方論

敗血流經神效方

治產傷產門

女人產後用藥宜忌

產後下卷

問渠水長流

鶴湖黃惕齋輯

達生編

產後宜忌

小兒出戶扶產人卽以兩手輕抱產母胸前產母亦自以兩手緊抱肚臍令胎衣下墜宜以手從心下輕輕按摩至臍日三四次使惡露不留

宜厚鋪裯褥高枕靠墊勿令睡下宜仰臥不宜側睡宜
睡膝不宜伸足宜閉目靜養切忌大喜大怒亦勿令熟睡恐倦極熟睡血氣上壅因而眩暈亦不宜高聲

急叫以致驚恐。

四壁遮圍使無空隙庶免受風。

房中宜燒舊漆器或用鐵秤錘燒紅入醋中或以醋沃炭火上令醋氣入鼻以免血暈且收斂神氣又能解穢

穢

或用炒黑山楂煎湯紅沙糖調服或熟酒童便沖服一

杯

不問有病無病有病無病服生化湯或佛手散一二劑以防諸疾

初產時不可問是男是女恐因言語而泄氣或以愛憎

而動氣皆能致病。倘若連胎生女，此亦人事之常。凡爲翁姑與丈夫者，只宜好言寬慰，切不可咨嗟歎息。更將婦抱怨，令其氣苦，未免致病傷生。慎之慎之。

滿月後方可梳頭洗足，否則手足腰腿必患酸痛等症。不可獨宿，恐致虛驚。不可刮舌，恐傷心氣。不可刷齒，恐致血逆。須氣血平復，方可照常理事。

迎音發喘

產後喘急者多死，蓋因營血暴竭，中氣無主，而上竄故。令喘也最爲危候，惟大補氣血，十活一二。若惡血冲肺，而喘急者，服參蘇飲之類，血去則喘自定。若感冒

風寒外邪入肺而喘急者必氣粗腹脹或多咳嗽治當疎散兼補爲主。

血暈氣脫

或有惡露不行惡血沖心心下滿急神昏口噤不省人事者切勿放倒急與生化湯或佛手散一法用韭菜一把切碎放有嘴瓶內以熟醋一大盞灌入紮口以瓶嘴向鼻遠遠薰之。

或有平素虛弱臨產復用力勞傷去血過多亦致昏暈不醒微虛者少頃卽甦大虛者脫竭卽死但察其面白眼閉口開自汗手足厥冷六脉微極是氣脫症也

生死判於頃刻切勿放倒令一人挽住頭髮急與大劑芎歸參附等回其陽或增損四物湯煎濃徐徐灌之但得下咽即可救活若認作血暈而以行血藥授之益速其斃

若氣血虛弱又感風邪忽然昏暈不知人者清魂散最佳

子方生下母卽昏暈不省此時藥不及備遲則不救急用紬絹舊衣謹閉產戶令知事婦女曲膝抵住勿使下面氣洩又令人一手挽住髮一手摶住口勿使上面氣洩俟其稍轉方用湯藥

中風發痙

產後爲風邪所中。角弓反張。口噤不開。名曰蓐風。用藥不得大發汗。并忌轉瀉吐利。必死無疑。華陀愈風散最妙。

若臨產努逼勞傷陽氣。陽氣虧極。無以養筋。爲風邪所感。以致牙關緊閉。四肢痙強。或腰背反張。肢體抽搐。名曰瘡症。當大補氣血。畧兼驅風之品。如荆芥。蔓荆。一二味。若專治風邪。誤矣。

惡露不下

產後惡露不下。或腹有宿冷。或復感新寒。血得寒則壅。

滯不行。其症或腹痛往來寒熱。或小腹痛引腰脊。生化湯最妙。佛手散亦可。若惡露淋瀝不絕。因腹中敗血不盡也。治法倣此。

產門不閉

產畢產門不閉。乃氣血虛也。服加味芎歸湯。總以大補氣血爲主。

子宮不收

臨產坐草太早。勞力努嚥致陰下脫。若脫肛狀及陰挺出逼迫。腫痛舉重房勞。卽便復發。清水流注。小便淋漓。宜人參乾姜湯。或補中益氣湯。加醋炒白芍。外以

五味子爲末泡湯洗又用藥敷之。一法以猪大腸
劙許煎湯下五倍子末伍錢用細軟絹片溫洗頻頓
托上。一法用血竭伍分人參參分藥珠壹分冰片
貳厘共研末摻之。

產後不語

母素虛弱臨產勞傷以致血氣上壅心竅心開竅於舌
竅閉則舌本強矣故令不語宜芎歸湯加石菖蒲之
類。

狂言譖語

產後語言顛倒如見鬼神者其源不一一則心虛中風

精神恍惚言語錯亂宜芎歸合華陀愈風湯二則敗
血迷亂心經顛狂悶疊同血暈治法三則感冒風寒
惡露不行增寒發熱如瘧晝日明了暮則譖語如見
鬼神宜芎歸湯加驅風寒藥一二味四則產傷氣血
心氣大虛以致心神驚悸不寧時見鬼神言語顛倒
宜芎歸湯吞補心丸得臥卽安

浮腫

產後敗血停積以致營衛阻滯運行失度面目四肢浮
腫宜芎歸湯加髮灰荆芥牛膝瞿麥之類血行則腫
自消若作水氣治產後既虛又以藥虛之是謂重虛

多致厥枉。凡水氣必發暎。小便數。若小便如常。不
發暎。但覺手足寒。乃氣血塞而不通也。若因氣血虛
而腫者。又當調補。

霍亂

產後勞傷氣血。脾胃虛弱。或多食煎炒厚味。不能運化。
又或風寒外侵。陰陽隔絕。輕則上吐下瀉。重則遍體
轉筋。腹痛。手足厥冷。命在頃刻。急用葛歸湯加人參。
白朮。炙草。乾姜之類。以溫其中。

血虛發熱

不論正產與小產。數日後忽然渾身大熱。面紅眼赤。口

大渴欲飲涼水晝夜不息此血虛之症宜用當歸補
血湯以補其血若認作傷寒而用石膏芩連等寒涼
之藥則誤矣

乳少

乳少者血虛之故產時去血過多或產前有病以及貧
苦之家僕婢下人產後失於調養血脉枯槁又或年
至四十血氣漸衰皆能無乳但服通脈湯自能有乳
若用穿山甲王不留行等物勉強催逼乳汁清薄令
兒不壽且損傷氣血產後多病不久便乾反爲不美
惟壯健婦人痰氣壅盛乳滯不來者畧用疎利之藥

一婦乳汁不通已十餘日遇有人送赤豆壹斗煮粥食之當夜乳脈即通也

乳汁乃血氣所化產後不可多食鹽不獨少乳且發嗽

產後方藥

生化湯 治產後兒枕痛及惡露不行腹痛等症

當歸

伍錢

川芎

壹錢

桃仁

米粒去皮尖雙仁者研

炮姜

參分

甘草

伍分炙

水煎溫服

產後本屬血虛然陰亡則

陽孤氣亦受病如太補則氣血易滯若失調則諸邪易襲此方去瘀生新扶陽益血行中有補化中有生

初產後服一二劑可免後患

牛膝湯 胞衣不出。臍腹堅脹急痛。危在旦夕。服此胞

卽爛下。并下死胎。

牛膝

瞿麥各參錢

當歸伍錢

通草

滑石各壹錢

伍分研

葵子

壹錢

水煎服

參蘇飲

治產後血入於肺。面黑發喘欲死。

人參

壹錢

蘇木

貳錢

水煎服

增損四物湯

治產後下血過多血暈

當歸

參錢

川芎

白芍酒炒

人參各壹錢

人參錢冲

炮姜

叁分

甘草

伍分炙

水煎冲入童便一小盃溫服

清魂散 治產後氣血虛弱外感風邪昏暈不省

當歸

貳錢

川芎

伍分

人參

壹錢

甘草

三分

荆芥

荆分
炒黑

爲末酒調溫服煎湯亦可 氣血虛弱故以

芎歸補其血 參甘補其氣 外感風邪故又以荆芥疎

其風

華陀愈風散

治產後中風口噤手足抽掣及角弓反

張或血暈不省人事四肢強直或心頭倒築吐瀉欲

死

荆芥穗

去梗焙乾爲末

每服參錢童便調下口噤則

挑牙灌之或將荆芥以童便煎灌入鼻中其效如神

人參乾姜湯

治子宮下脫

人參另煎冲

白芍酒炒

山藥各壹錢

歸身貳錢

炮姜

甘草

各伍分炙

水煎服

參甘炮姜以補氣歸身白

芍以補血血氣充足子宮自收山藥益腎強陰故以

爲佐

補中益氣湯

黃芪

壹錢伍分蜜炙

人參另煎冲

甘草各壹錢炙

白朮土炒

陳皮

歸身各伍分

升麻

柴胡各叁錢分

加姜棗煎

表虛者多汗升麻用蜜水炒

當歸補血湯 大補陰血治血虛發熱如神

黃芪

壹兩

當歸伍錢

水煎服立愈

補心丸

黃芪

蜜炙

棗仁

遠志

去木甘草湯泡焙

茯苓

各貳錢

生

地錢

伍分

人參

壹錢

菖蒲

柒分

其爲細末大棗和丸疎

砂爲衣

補脬飲

治婦人臨產損破脬胞小便不禁

黃絲絹

天生黃者參尺用炭灰淋汁煮爛以清水漂潔淨

黃蠟

伍錢

白蜜

壹兩馬屁勃

茅根

各貳錢

水貳盞煎至壹盞空心

服眼時須歛氣不得作聲如作聲無效

通脈湯 治乳少或無乳

生黃芪

兩

當歸

伍錢

白芷

壹錢

通草

貳錢

用七孔

豬蹄一對煮湯吹去浮油煎藥一大碗服之以被覆面而睡卽有乳或未效再一服無不通矣。新產無乳者不用猪蹄只用水酒各半煎服體壯者加好紅花三五分以消惡露。

產後虛汗不止乃因陰虛又遇風邪發爲此症用黃

芪湯

黃芪蜜炙熟地各參錢炒白术土茯苓各壹錢
鱣粉錢防風染麥冬貳錢去心紅棗貳枚水煎溫

服

產後癟疾

柴胡

伍分

當歸

白芍

酒炒

白术

各貳錢土炒

茯苓

壹錢

伍分

甘草

參分

川芎

各壹錢炒

青皮

各壹錢

姜一片

水煎服

產後痢疾

當歸

貳錢

白术

土炒

陳皮

川芎各壹錢

白芍

酒炒

查炭

各壹錢伍分

香附

參錢炒

甘草

參分

砂仁

炒去衣研

木香

乾姜各伍分

水煎服

產後奇病症治

一婦產子舌不能收，周子固以硃砂敷其舌，仍命作產子狀，令兩人按之，乃於壁外潛累破，益墜地，作碎聲，婦聞其聲，舌卽收矣。

一婦產後兩乳或長細如腸垂過小腹痛不可忍名曰
乳懸將川芎當歸各一觔以半觔剉散入瓦器內用
水濃煎不拘多少頻服復以半觔切塊於房內燒烟
令婦將口鼻吸烟如或未愈再製一料更以草麻子
肉壹粒研碎塗其頂心俟愈急將草麻洗去

一婦產後用力產戶垂出肉線長三四尺觸之痛引心
腹遇一道人令買老姜三觔連皮搗爛入麻油貳觔
拌勻炒乾先以熟絹五尺摺作方結令人輕輕盛起
肉線使之屈曲分作三團納入產戶再以絹袋盛姜
就近薰之冷則更換薰一日夜收入大半二日收盡

但肉線切不可斷，斷則不可治矣。

一婦產後忽生蟲一對，長寸餘，置地能行。以後月生一

對，用苦參加入去蟲藥爲丸服之。又生一對，埋于土

中，過數日發而視之，暴大如拳，名子母蟲，從此絕根

苦參

用米泔浸一宿蒸熟晒乾

一婦產戶下，忽有一物，如帕有尖約重觔許，急用黃芪、白朮、升麻各伍分，人參當歸各壹錢，水煎服三劑而愈。

一婦產後腸癢難忍，或以平日所用針線袋，或以箭箘及鏃，置所臥褥下，勿令產婦及他人知之，其癢自止。

一婦產後日食黍粥二十餘碗。一月後其身冷處有數塊。以指按其冷處。其冷卽從指下上應於心。如是者二年。諸治不效。以八物湯去地黃。加橘紅入姜汁竹瀝。一鍾不十劑。而冷處皆煥。

大抵產後病症有三。血虛火動。宜補養新血。敗血妄行。宜祛瘀生新。飲食停傷。宜消食和胃。智者能調。必不受累。其症變幻。有七十二種。要當審病察脉。方可施治。今畧陳數款。皆一定之病。用一定之藥。至若臨時斟酌加減。惟貴圓通而無拘執。

保產回生丹

柯集菴曰。回生丹保產之仙方也。臨產服一丸快便殊
甚。卽有橫逆難產者。無不立下。但製藥時。必先虔心齋
戒擇一靜室。如法修合。發願濟人。分文不取。陰功莫大
於此。列方於左。

錦紋大黃

淨末壹錢每料須用勑半刮去筋皮水洗卽忙取起晒乾磨細秤準

大黑

豆皮

用豆參升水浸煨一夜熟透取皮晒乾約陸兩外去豆瀉汁待用

蘇木

參兩打碎

河水五碗先浸片時煎汁參碗待用

元紅花

參兩炒黃色入好酒肆碗先浸片時煎參肆滾

取汁待用

米醋

玖勑陳者佳忌貯銅器內

將大黃末壹勑入鐵鍋內。下米醋參勑。調和文火
熬之。鍋用大者。防其火泛。以粗梅條并箇竹鎗。多

用人手不住攬之成膏再加醋參勑熬之又加參
勑次第加畢然後下黑豆汁參碗再熬次下蘇木
汁次下紅花汁不住手攬之大黃膏須一日內熬
成以瓦盆盛之有鍋巴亦鏟下晒乾留用

人參

貳兩減半亦可研細加入其參必須頂高油熟
每枝重壹錢者愈見其效切勿吝惜轉致悞人

切
蠣

馬鞭草

伍錢

桃仁

壹兩

水洗去皮尖揀去黑黃

色者踹布石上踹貳參次去

油淨白
如麵

五靈脂

伍錢醋浸一日隔水煮竹筋攪

去粗脚瓦盆盛之微火上烘焙

益母草

貳兩夏間自收新

乳香

貳錢

沒藥

貳錢熨斗炙炒

俱要出
汗去油

以上七味逐一磨細秤准黑豆皮并鍋巴亦磨細

當歸 壹兩去泥
陳酒洗切

川芎 壹兩
酒洗

細香附 壹兩去毛醋
炒至粉紅色

切碎 玄胡索 壹兩醋
浸一夜炒

蒼术 壹兩濃米泔
浸一夜炒

蒲黃 壹兩

炒隔紙 白茯苓 壹兩
蒸

川牛膝 伍錢
酒洗

甘草 伍錢
炙

地榆 伍錢
酒洗切

川羌活 伍錢
酒洗

薄廣橘紅 伍
錢

酒洗切片炒 木瓜 參錢
去穰

青皮 參錢去
穰炒

白术 參
米泔浸

一夜炒 嫩烏藥 貳兩伍
錢去皮

良姜 肆
錢

廣木香 肆
錢臨時切磨

恐走氣 秋葵子 參
錢

懷生地 壹兩酒煮拌炒
仁末參錢九蒸晒

山

萸肉 伍錢醋
煮焙乾

三稜 去皮淨伍錢醋
浸二日紙裹稻

柴火煨粉紅色爲度自者不用

共磨細末與前味重篩和勻入石臼內先下煉熟右二十三味晒乾每兩約加壹錢以備藥頭耗拆

白蜜壹觔次下大黃膏共搗千餘杵取起爲大丸
約重貳錢柒捌分計參百陸拾餘丸靜室陰乾須
二十餘日不可日晒不可火烘乾後重貳錢有零
鎔蠟爲殼護之每料蠟用肆觔內加白占伍兩所
謂蠟丸也用時去蠟殼調服其湯各有所宜開列
於左

凡合圓生舟藥料寧使有餘逐件如法製就然後秤
准配合各味須加三製淨纔合分兩如桃仁烏藥益
母須加倍逐味揀料刷淨頭脚不用酒者用水少許
洗之

用西集要
一臨產用參湯服一丸則分娩全不費力如無參用淡
淡炒鹽湯論曰凡胎已成子食母血月足血成塊謂
之兒枕將產兒枕先破血暴其子故難產服此丹逐
去敗血須臾自生亦有因氣血虛損難產者宜多
用人參

一子死腹中因產母染熱病所致用車前子壹錢煎湯
調服壹丸或貳丸無不下者若因血下太早子死用
人參車前子各壹錢煎湯服如無參用陳酒少許煎

車前湯

一胎衣不下用炒鹽少許泡湯調服壹丸或貳參丸即

一產畢血暈用薄荷湯調服壹丸卽醒

以上四條乃臨產緊要關頭卽有名醫措手不及
起死回生此丹必須預備

一產後三日血氣未定還走五臟奔冲於肝血暈起止
不得眼見黑花以滾水調服卽愈

一產後七日血氣未定因食物與敗血結聚胸中口乾
心悶煩渴滾水下此丹愈

一產後虛羸血入於心肺熱入於脾胃寒熱似瘡實非
瘡也滾水下此丹愈

一產後敗血走注五臟轉滿四肢停留化爲浮腫口渴
四肢覺冷乃血腫非水腫也服此丹愈

一產後敗血熱極中心煩躁言語癲狂非風邪也滾水
服此丹愈

一產後敗血流入心孔閉塞失音用乾菊花參分桔梗
貳分煎湯調服

一產未滿月悞食酸寒堅硬之物與血相搏流入大腸
不得傳化泄痢膿血用炒山楂煎湯調服

一生產時百節開張血入經絡停留日久虛脹酸疼非
濕症也用蘇梗參分煎湯調服

一產後月中飲食不得應時兼致怒氣餘血流入小腸
閉却水道小便澀結溺血似鷄肝用木通肆分煎湯
調服又或流入大腸閉却肛門大便澀難有瘀血成
塊如鷄肝者用廣皮參分煎湯調服

一產後惡露未淨飲食寒煖不調以致崩漏形如肝色
潮熱煩悶背膊拘急用白朮參廣皮貳分煎湯調服

一產後惡血停於脾胃脹滿嘔吐非翻胃也用陳皮煎
湯服

一產後敗血入五臟六腑并走肌膚四肢面黃口乾鼻
中流血徧身斑點危症也陳酒化服此丹可愈

一產後小便澁大便閉。乍寒乍熱。如醉如癱。滾水調服。
以上十三條皆產後敗血爲害也。此丹最有奇功。
產後一切異症。有醫所不識。人所未經者。但服此
丹。或壹丸。或貳參丸。無不立效。胎前常服此丹。
壯氣養胎。滋陰順產。調和臟腑。平理陰陽。最爲神
妙。室女經閉。月水不調。諸症並效。

如有滑胎病者。忌大黃流動。胎前切不可服。若產後
瘀血。有因於寒凝者。雖服此丹。而瘀血未下。大便反
瀉者。宜用生化湯加肉桂炮姜爲妥。

治敗血流經神效方

用三年陳醬茄子一隻拭淨不可落水置碗內取出
醬油冲酒溫服卽患病日久下體潰爛者連服三次
無不愈

治產傷產門

取蚌瓦灰存性鋪於紙坐上立愈

婦女人產後用藥宜忌

從來女人生產無論正產半產總以逐去惡露爲要惡
露卽是敗血停滯腹中新血遇之亦變爲瘀血故去之
不可不速初用益母草逐去惡露也次用香附子逐去
惡露也後用山楂炭逐去惡露也間有惡露難去者必

用桃仁蒲黃紅花蘇木澤蘭等消瘀之品務在去之必盡以杜後患若使惡露未淨悞服參芪等味則惡露因補定而不下悞服芩連等味則惡露因寒凝而不下悞服薑桂等味則惡露因熱極而驟下於是乎有血暈血昇者有血崩血脫者又或有敗血流入經絡以致潰爛不堪者推原禍本只因惡露未淨貽害無窮不可復救也要知女人產後元氣大虛最難調治必須避風日慎起居戒惱怒節飲食深悉夫藥有宜忌切勿妄投則可以安心靜養康健倍常此爲保產第二良方也

惕齋補

附幼科摘要

兒生不啼名悶臍生

兒生欲絕用艾炙法

斷臍勿使血外泄

裹臍用礬灰法

初生哺甘草生姜法

兒白泡馬牙黃治法

兒臍濕用藥法

臍風撮口法

鐵器致冷法

兒患乳蕈牙疳論

兒兩腮腫硬

忌鼻風吹顙門

初生兩乳搃一把

哺兒乳食不相併

小兒不可過於飽煖

小兒初生嗽口法

初生浴法

藏胞衣法

著舊衣

晒衣

剃頭

養子真訣

小兒稀痘神方

仙傳稀痘丹

小兒節食論

急慢驚風

瘧疾

口瘡

蝦蟆瘻

初生脫皮

兩足趾俱向後

去

達生編保嬰稀痘治驚

寒劑用營知毒
黃芩去

福幼編保嬰慢驚治法

誤生胎齡用艾灸去

幼科摘要附刻

一兒生下不啼。因糞門有一膜閉住兒氣故不能出聲。
名曰悶臍。生以銀簪脚輕輕挑破其膜。卽能出聲。
一兒初生氣欲絕不能啼者。或臨產勞傷胎氣。或天時
寒冷所致。未可遽斷臍帶。急以綿裹抱懷中離胞寸
許。用苧皮紮緊。將大紙條蘸麻油點火於臍帶上。遠
遠薰之。使緩氣入臍。俟氣回能啼方可剪斷。或用蘄
艾灸臍帶上亦可。

一將斷臍帶先以手握帶向臍。捋三四次令胞血貫滿
臍穴。離胞寸許絲弦紮緊。更以磁鋒割斷勿使臍血

外泄則兒血旺易育。

一裹臍須將臍帶盤作一團用枯礬末摻於帶上以綿紙軟絹裹束日日須要照看勿令兒尿浸濕預防臍風此第一緊要事。

一兒初生宜以生甘草少許沸湯泡用軟絹蘸汁徧拭口中去其穢濁隨用胡桃肉去皮嚼爛以稀紗包如

小囊繩兒口中使吮其汁非獨和中且能養臟若母

體素虛小兒清弱者以淡姜湯拭口能除穢惡去胃寒可免吐瀉之患

一兒生兩三日看口中上腭如有白泡子卽以銀簪脚

輕輕挑去將泡內白屑取出勿令落人喉中以京墨
搽之如不卽挑泡老難破又有馬牙在牙齦處亦須
挑破取出以京墨搽之

一兒臍帶落後臍不卽乾用枯礬五分龍骨冬丹各一
分麝香少許爲末敷之或亂髮燒灰研敷亦妙如潰
爛出血或水出不止赤石脂研末敷之一法以油胭
脂作膏藥貼之立愈或斷臍之後爲水濕風寒所
侵因致臍腫面赤喘急多啼不乳卽成臍風可用蘄
艾燒灰填於臍中若聚唇撮口眼閉口噤啼聲如
鴉或聲不能出或喉痰潮響或氣息喘急卽名臍風

看齒齦上有小泡如粟米狀急以青色軟帛裹指蘸苦茶擦破待口既開用直白殼蚕去絲及嘴畧烘爲末蜜調搽口內或以艾灸臍穴甚者發搗舌強面青腹痛臍邊青黑多不可治凡兒初生七日內若有臍風小腹必發青筋一道行至肚生兩丫父若行至心便不治急以艾圓炙其青筋頭上並兩丫父盡處青筋消去便活

凡斷臍不盈尺或束縛不緊或風濕入臍或斷臍用鐵器致冷氣內侵恒有此患慎之

一兒口中患乳蕈及牙疳等症不能吃乳急以直殼蚕

三條去絲嘴人中白肆分冰片少許研細擦患處畧停片刻用絹蘸苦茶洗淨再擦三四次自愈如未愈用殼蚕三條硼砂血竭人中白青黛各參分兒茶分半藥珠冰片各壹分共研極細擦之用絹蘸茶洗淨再擦無不愈者壹法以馬齒莧根卽板頭醫瓦上焙乾少加雄黃研末吹之滿口纏徧延及喉間無從敷藥者俗名鵝口瘡用鵝口水一小鍾作數次服立愈一兒初生兩腮腫硬有核或在一邊名曰痄腮兒面必黃鼻端起黑癟啼哭不乳用蟷蚰一條銀硃錢許同研爛搽腫硬處勿令擦去卽消一法用桑柴灰少許

入雄鷄冠血貳參滴再加鹽滷一匙和勻頻擦患處亦消

一小兒同母睡時切忌鼻風吹兒顙門恐成風疾面心
一小兒初生兩乳必有餅子須時常揉撮捏去乳汁以散爲度否則腫硬成毒如初生洗浴時卽將兩乳頭各捏一把便無此患

一凡哺兒乳後不可與食食後不可與乳食相併難以尅化大者成癖小者成積

一小兒初生湊理未密宜用舊絮護其背但不可太暖致令出汗恐表虛易受外邪乳哺亦不宜過飽

云若要小兒安須帶參分餳與寒又須令乳母不食
炙燄厚味則乳汁清寧兒不染疾

兒初出胎口中原有污物初啼一聲卽喫人腹因此多
病且生瘡疾當預備甘草黃連各參分滾湯泡俟兒
出胎入硃砂末少許令穩婆左手托肩背右手提雙
足令兒倒啼一聲吐出口中污物以綿包指蘸甘草
黃連汁拭口中令淨日後出痘稀少百病俱無小
兒未開乳前用大黃參分煎湯少許以綿蘸吮之逐
去腸中汚血較之黃連甘草湯更妙

浴法 北方生兒多不洗浴但以舊綿拭淨故兒多壯

實又一說天寒嚴冽則不必洗又有三朝洗浴謂之
洗三南方俗尙用益母草或白露日收香苦草煎湯
洗兒不犯生水

藏胎衣 胎衣以清水浴過又以清酒浴之入錢壹文
於衣內盛以新瓶青布裹口待滿月後擇天德月空
之辰於向陽高燥處掘地三尺埋之須堅築勿令有
損俾兒康健不可不慎

著衣 初生時用父母舊衣服裹之一期之內衣服只
宜舊綿帛不宜過煖恐生熱症兒生雙滿月後若遇
晴和天氣令乳母抱兒出見風日則肌膚纏密可耐

風露若厚衣煖被深居密室如陰地草木忽受風霜
則不能堪矣

晒衣 小兒有無辜疾病患啼叫書云天上有飛星惡
鳥不可干犯因晒衣席未收在外過夜小兒染著戾
氣故有此病衣席須以醋炭烘之此病卽痊

剃頭 彌月剃胎髮須就和煖避風處剃後用杏仁參
枚薄荷三葉同研蘇油調和擦兒頭上以護風邪不
生瘡癩其後亦然

養子真訣 初生三四月只與乳吃六個月以後方與
稀粥週歲以前切不可吃葷并忌生冷之物若待一

二歲腸胃稍厚畧與葷腥爲妙訣云吃熟莫吃冷吃
軟莫吃硬吃少莫吃多遵行日久自然無恙

小兒稀痘神方屢試屢驗慎勿以平淡忽之

羌活

生地

黃柏

酒浸

防風

升麻

各伍分

麻黃

甘草

黃連

歸身

各參分

川芎

藁本

柴胡

乾葛

黃芩

酒浸

紅花

細辛

丹皮

白朮

各貳分

分

吳茱萸

連翹

各半分

藥味逐件秤准每逢立

春立夏立秋立冬日用水二鍾煎八分將細紗一方
覆於碗口露一夜次朝溫服一年之內必服四次不

可欠缺永不出痘卽出亦必稀少如一時不能服完

分二三次服亦可四立是氣血轉關之候乘此時而驅其胎毒獲效甚速。

仙傳稀痘丹

草麻子

肆拾玖粒去殼揀肥白者

硃砂

伍

射香

伍厘

粽子尖

柒枚

五月五日午時將四味研爛搽兒頭項心前心

背心兩手心兩手彎兩腋兩足心兩腿彎共十三處

約一文錢厚頭頂不可悞搽額門如兒髮長分開塗之搽過一年者不出痘不過數粒二年三年者不出痘神效無比必須正午時爲妙每料只塗一兒

小兒腸胃甚薄若粘膩乾硬酸鹹辛辣一切魚肉水菓

小濕麵燒炙煨炒煎燙俱是發熱難化之物皆宜禁絕
婦人畏其啼哭無所不與積成痼疾追悔何及語云
惜兒須惜食慎之慎之

急慢驚風外治法

白胡椒

柒粒

生山梔

柒個

共研細末加入飛麵一撮

用鷄子青調和攤青布上貼於心胸釣出青色卽愈
又小兒驚風當手足轉掉時切不可懷抱恐閉塞經
絡病愈後手足或成廢疾謹之慎之

瘧疾外治法 吕祖仙方名一枝梅

巴豆

壹粒

研細飯和爲丸硃砂爲衣用小膏藥貼印

堂穴起泡卽愈

口瘡外治法

尖檳榔

參錢

細香附

參錢

雄黃

壹錢

共研細末鷄子

青調塗兩足心卽愈

蝦蟆瘧外治法

小兒胸腹忽如水晶色臟腑俱見此染蝦蟆瘧也用大蝦蟆六隻將四足紮起以蝦蟆肚皮在水晶色處撫摩幾次置於小兒臍上再用第二隻亦如前法更換六隻其病卽痊但蝦蟆眼內有蟾酥須防其迸出射人宜以絹遮其眼外治畢將蝦蟆放去

初生脫皮

一兒生下遍身無皮。因其母受胎以後久處高樓不沾地氣。故有此異事也。用純黃土研細。盛於軟絹袋內。在兒身上輕輕撲之。俟生皮即止。

兩足趾俱向後

一兒初生兩足趾俱向後。因其母懷姪時兩足患瘡不能行步。日惟盤膝而坐。兒在母腹一氣相通。形隨氣化。故亦如是。由此觀之。則知胎前調養固不可不慎也。

達生編保嬰

小兒疾病甚多惟驚風尤猛有頃刻之危固屬驚熱風痰而成亦由愛惜太過所致今以護嬰作歌

十月嬰兒初孕育

肌膚未實陰未足

正當生下未啼時

口中拭去胎液毒

黃連甘草硃蜜佳

免使斑瘡夭死速

五六日間臍未乾

縱然炎熱休頻浴

但將故絮遮其身

下體單寒常露足

見些風日有何妨

月裡頻啼纔是福

胎熱胎毒得以舒

熱氣隨啼無蘊蓄

勿令過愛時懷抱

莫與新棉重被覆

昧者重棉尙恐寒

乳哺不離猶恐哭

但見微風愁感寒

纔聞音響便驚愕

做成疾病不可言

惜兒悞兒多命促

人能依此遵行之

何患無兒不易鞠

劉氏云小兒方纔降生莫令落在地恐賊風衝吹嬰兒
故也

凡小兒月內月外兩足紅赤游風流火如足至小腹手
至胸膛多致不救用馬蘭頭不拘多少冬季取根水洗去泥搗爛
絞汁以雞毛蘸搽燥則再換如頸項腿肋縫中潰爛即

以汁調飛淨六一散搽之卽愈。

凡小兒月內月外兩目紅赤澁閉腫爛不開用蚯蚓泥
搗塗顱門乾則再換二三次卽愈

初生大小便不通腹脹欲絕者急令人以溫水嗽口吸
咂兒前心後心并臍下手足心共七處以紅赤色爲度
卽通

初生小兒兩腮有腫塊不能吮乳者名螳螂子俗名肉
老鼠是也用鮮生地壹兩麝香壹分共搗作餅貼兒湧
泉穴即脚底心男左女右自消 又方巴豆一粒分三塊置
膏藥上貼印堂及左右兩頤三處起泡毒洩自愈不可

妄割

初生胎毒燒橄欖核存性研末硃砂伍分生芝藤及口涎調和安兒口中能解

兒生月餘卽有驚恐名曰胎驚推拿所不能施以犀黃

貳厘麝香

壹厘

研末用猪乳或人乳調服

小兒瘡癬氣血未足皮膚脆嫩止宜金銀花湯內服外洗鮮其瘡毒不可用水銀硫黃信石木鱉之類瘡雖頃刻可愈而毒氣內攻必成變症

兒能飲食不可任性多食有等愚夫愚婦一見兒哭卽取物與食以致傷脾泄瀉食疳多至不救醫家有雞肝

散肥兒丸等藥俱治小兒食積之藥並無治小兒餓壞之藥世之求醫治小兒者大半是飲食所傷從無小兒餓壞求醫之人諺云若要小兒安常帶三分飢與寒願爲父母者思之

稀痘方

此方傳自蘇州沈竹香家已數世不出天花矣

青橄欖

壹枚

生甘草

壹寸

右水煎間日服服至第五次大便有黑物解下其毒已去再服一二次重者輕輕者不出

黑龍丸

治急驚風極效垂死之兒壹服卽瘥

膩粉

壹錢伍分

金墨 飛麵

蘆薈

炙各壹錢

麝香

龍腦

牛黃 青黛 使君子

去殼麵裏煨熟各伍分

拔驚方 治慢脾風肢體逆冷痰滯咽喉如牽鋸
狀層黑面青口鼻氣微昏眩露睛者是

胡椒

丁香

各七粒

生梔子

葱頭

各七個

飛麵

壹撮

右研末用雞蛋白少許調攢青布貼小兒臍上一晝夜除去了青黑色卽愈如未愈再貼一個愈後當服補脾藥

治急慢驚風

大蝦蟆胆

伍个刺破入碗中

硃砂

壹錢

犀牛黃

壹分

麝香

伍厘

右同入碗內陰乾每服貳分人乳調立效

節抄莊在田福幼編

乳母乳兒最宜節慎。節則調養脾胃，否則脾胃損傷。百病蠅生。夏忌熱乳，冬忌冷乳，皆宜捏去而後與之。以喜乳與兒，令兒痰喘成驚。以怒乳與兒，令兒疝氣腹脹。以寒乳與兒，則便青而乳不化。以熱乳與兒，則面黃而嘔吐不食。以病乳與兒，則黃瘦骨蒸，虛羸盜汗。以駁乳謂有孕者與兒，則夜啼泄瀉，胸背皆熱。以醉乳與兒，則恍惚多驚癇，如鴟聲。食後不可與乳，乳後不可與食，乳食並進，難於消化。初則成積，久則成癥，成瘕故曰忍三分。寒吃七分飽，多揉腹，少洗澡，吃熱吃軟吃少，則不病。吃冷吃

硬吃多則生病矣。

凡兒臍背下部宜煖頭向心胸宜涼解脫不可當風坐臥不宜着地

春天勿與護頸裹足以致陽氣不舒因多發熱等症

兒生六十日後瞳子成而笑認人切忌生人持抱及見

非常之物若夫愛護太過日捧懷抱不令見風日不令

着地氣以致筋骨柔弱數歲不行偶少失護疾病便生

此皆保育太過不及之咎也嬉戲之物不可聽其恣意

久弄亦能傷腎至刀劍兇器勿令持玩會坐勿令久會

行勿令驟睡臥須有節要令常起早飲食休過美要令

常嫌少夜莫停燈晝莫說鬼睡莫當風坐莫近水笑極

與和哭極與喜哭笑之後莫卽與乳。

凡兒生後必有變蒸之期變者變生五臟而易其情態蒸者蒸養六腑而長其骨節其種種現象與病無異若誤認爲疾輕投藥餌或致蒸長之氣俱消無疾而成疾亦足誤事今列其期於左以備參考。

凡三十二日爲一變六十四日爲一蒸自生下之日起至三十二日爲一變

生癸腎臟氣

屬足少陰經

六十四日則

二變一蒸

生壬膀胱腑氣

屬足太陽經

九十六日則三變

生丁心臟氣

屬心包經

手少陰經

一百二十八日則四變二蒸

生丙小腸腑氣

屬手太陽經

一

百六十日則五變

生乙肝臟氣

屬足厥陰經

一百九十二日則六

變三蒸

生甲胆腑氣屬足少陽經

二百二十四日則七變

生辛臟肺

氣屬手太陰經

二百五十六日則八變四蒸

生庚大腸腑氣屬手陽明經

二百八十八日則九變

屬足太陰經

三百二十日則十變五蒸

生戊胃腑氣屬足陽明經

至心包絡爲臟手厥陰經三焦爲腑屬手少陽經二者俱無形象故不蒸亦不蒸

至十變五蒸既足則共三百二十日矣

復有三大蒸焉

六十四日爲一變蒸積至一百九十二日爲一大變蒸歷三大變蒸後其五百七十六日變蒸方定寸脈乃生可以胗視

凡變始自一日以至七日上唇中心必有白珠泡子

子形如魚目身熱而耳與尻冷若身與耳尻皆熱者
則又兼犯他症其變兼蒸者必上唇微腫如臥蚕
類自始得之一日至十三日方無所苦

其三大蒸者七日之內有病但數呵其頸門俱不宜
輕遽服藥然亦有不驚不熱者無他症者是受胎壯
實而暗變也

辨痘法

小孩發熱五指稍及中指冷是痘疹

中指熱是傷寒

看耳法

耳後紅筋痘必輕紫筋起處重沉沉兼青帶黑尤難治

用藥精詳也得生。

附採莊在田慈幼編治慢驚風心得神方。

慢驚之症緣小兒吐瀉得之爲最多或久瘧久痢或痘後疹後或因風寒飲食積滯過用攻伐傷脾或秉賦本虛或誤服涼藥或因急驚而用藥攻降太甚或失于調理皆致此症其症神昏氣喘或大熱不退眼開驚搐或乍寒乍熱或三陽晦昏或面色淡白青黃或大小便清白或口脣雖開裂出血而口中氣冷或瀉利水汎或完穀不化或四肢冰冷並至腹中氣響喉內痰鳴角弓反張目光昏暗此虛症也亦危症也俗謂之天吊風虛風慢

驚風慢脾風皆此症也若再用涼藥再行消導或用胆
星抱龍以除痰或用天麻全蝎以驅風或用知柏黃連
以清火或用巴豆大黃以去積殺人如反掌甚可畏也
若治風而風無可治治驚而驚亦無可治此實因脾胃
虛寒孤陽外越元氣無根陰寒至極風之所由動也治
宜先用辛熱再加溫補蓋補土所以敵木治本卽所以
治標凡小兒一經吐瀉交作卽是最危之症若其屢作
不止無論痘後疹後病後不拘何因皆當急用參朮以
救胃氣姜桂參熟等藥以救腎氣不惟傷食當急救之
卽傷寒傷暑亦當急救之蓋其先雖有寒暑實邪一經

吐瀉業已全除脾胃空虛倉廩空乏若不急救恐虛痰
上湧命在頃刻庸醫誤指爲熱爲食投以清火去積涼
藥立時告變爲之奈何與其失之寒涼斷難生活不若
失之溫補猶可救療今將慢驚辨症臚列於後

一慢驚吐瀉脾胃虛寒也

一慢驚身冷陽氣抑遏不出也

誤服涼藥往往致此

一慢驚鼻孔煽動真陰失守虛火燦肺也

一慢驚面白青黃及白氣血兩虛也

一慢驚口鼻中氣冷中寒也

一慢驚大小便清白腎與大腸全無火也

一慢驚昏睡露睛神氣不足也。

一慢驚手足抽掣血不行於四肢也。

一慢驚角弓反張血虛筋急也。

一慢驚乍熱乍涼陰血虛少陰陽錯亂也。

一慢驚汗出如洗陽虛而表不固也。

一慢驚手足瘺癓血不足以養筋也。

一慢驚顛門下陷虛至極也。

一慢驚身雖發熱口唇焦裂出血却不喜飲食冷茶水進以寒涼愈增危篤及所吐之乳所瀉之物皆不甚消化脾胃無火可知唇之焦黑乃真陰之不足也。

大抵因發熱不退及吐瀉而成者總屬陰虛陽越必成慢驚並非感冒風寒發熱可比故不宜發散治宜培元救本加薑桂以引火歸源必先用辛熱冲開寒痰再進溫補方爲得法經驗二方列後

逐寒蕩驚湯 此方藥性溫緩耑治小兒氣體本虛或久病不愈或痘後疹後或悞服寒涼泄瀉嘔吐轉爲慢驚清熱散風愈治愈危速宜服此能開寒痰寬胸膈止嘔吐蕩驚邪回元氣於無何有之鄉一二劑後嘔吐漸止卽其驗也認明但係虛寒卽宜服之

胡椒壹錢炮薑壹錢肉桂壹錢丁香拾粒

右四味研爲細末以灶心土三兩煮水澄極清煎藥
大半茶杯頻灌之接服後方定見奇效。

加味理中地黃湯 此方助氣補血却病回陽耑治小兒精神已虧氣血大壞形狀狼狽瘦弱至極皆可挽回如法濃煎頻頻與服參天救本之功難可盡述

熟地 伍錢

當歸 貳錢

萸肉 壹錢

枸杞 貳錢

棗仁 貳錢炒

肉桂

壹錢

故紙 貳錢

炙芪 貳錢

白朮 參錢

炮薑 研

黨參

貳錢

炙甘草

壹錢

加生薑叁片紅棗叁枚胡桃貳箇打碎爲引仍用灶心土貳兩煮水煎藥取濃汁一茶杯加附子五分煮水攪

大量兒大小分數次灌之如咳嗽不止加荅殼壹錢

金櫻子

壹錢

如大熱不退加白芍壹錢泄瀉不止加

丁香

六分

只服一劑卽去附子止用丁香七粒隔二三

日只用附子二三分

蓋因附子太熱中病卽宜去之

也如用附子太多則小便閉塞不出如不用附子則

沉寒臟腑固結不開如不用丁香則泄瀉不止若小

兒虛寒至極附子又不訪用至一二錢神而明之存

乎其人用者審之此方乃救陰固本之要藥治小兒

慢驚稱爲神劑若小兒吐瀉不至已甚或微見驚搐

胃中尙可受藥喫乳便利者不必服逐寒蕩驚易只

服此藥一劑而風定神清矣如小兒尙未成驚不過
昏睡發熱不退或時熱時止或日間安靜夜間發熱
以及午後發熱等症總屬陰虛均宜服之若新病壯
實之小兒眼紅口渴者乃實火之症方以清解
但果係實火必大便閉結氣壯聲洪且喜飲冷茶水
若吐瀉交作則非實火可知此方補造化所不足實
有回生起死之神功倘大虛之後服一劑無效必大
劑多服爲妙

續文題寫

本固主歸派之順逆而大體之變則一體皆

各指歸交音與其賓人曰敬也於無能也不

時與猶實火以火勢相緣故也，此實火命火

實之本火明誠曰斯亦代實火文誠

曰火生火火燒燒然火體而火之根也

智勤矣火木榮遇謂燒燒也如火而火者

雖火而火氣無火氣者火也火氣者火之體

重刊捐贊姓氏

會君明瑟 靜 捐英洋各貳元

西渠屋

捐錢伍千文

蔣石楓

捐本洋貳元

歸君亮

捐錢貳千文

管少溪

捐本洋貳元

陸懋修

捐票貳千文

管鏡仁

捐本洋壹元

瞿秋亭

捐錢貳千文

周靜卿

捐本洋壹元

潘幼南

捐票壹千文

仲卿和

捐本洋壹元

方恂卿

捐錢壹千文

姚湘漁

捐錢壹千文

夏秉齋

捐票壹千文

龐雲槎

捐錢壹千文

李玉洲

捐票壹千文

葉敏齋

捐錢壹千文

邵曼如

捐票壹千文

桑硯華 捐票壹千文

陶慢雲 捐票壹千文

陳君脩 捐票柒百念

李簡廷 捐錢伍百文

曹小卿

捐票
英洋壹元
錢陸百

夏秉德 捐票壹千文

以上共捐

洋拾貳元
英洋壹元

內
英洋叁元
票拾千叁百念

計核共捐錢叁拾捌千肆百拾

票壹千文

管刻資共核錢叁拾叁千零伍拾

票千文

管刻費餘錢伍千叁百陸拾文

印送捌拾部
千文

李蓉村印送六十部

印送捌拾部
千文

王雅琴印送念部

印送捌拾部
千文

周吉人印送拾部

常熟縣南街跨塘橋北
毛文彬齋刻字局鑄