


KODAK Gray Scale
LICENCED PRODUCT



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

誠
門
第
九
卷

赤水玄珠第九卷目錄


喘門

氣短 氣促 少氣 產後喘

哮門

善悲 肺痿 肺癰

赤水玄珠第九卷



新安生生子孫一奎著輯

喘門

岐伯曰不得卧而息有音者是陽道之逆也足三陽者下行今逆上行故息有音也陽明者胃肺

也胃者六府之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得卧也下經曰胃不和則卧不安逆調論又曰夫不得卧則喘者是水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水臟主津液主卧與喘也

東垣曰肺脹膨脹而喘咳腃膈滿壅盛而上奔者於隨詮用藥方中多加五味子人參次之麥門冬又次之黃連少許如甚則交兩手而督者

真氣大虛也若氣短加黃耆五味子人參氣虛去五味子人參加黃芩荆芥穗冬月去荆芥穗

加草莖蕤仁

丹溪曰哮喘未發以扶正為要已發以攻邪為主陰虛自少腹下火起衝於上而喘者宜降心火補陰有陰虛挟痰喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火上氣喘而躁者為肺脹欲作風水症宜發汗則愈諸喘不止者用川椒目研極細一二錢生姜湯調下却乏氣虛不用又

法用蘿蔔子蒸為君，皂角燒灰等分為末，姜汁加煉蜜為丸，小者大，每噙化五七十丸，却止之。後因痰治痰，因火治火，氣虛者用人參蜜炙黃柏、麥冬、地骨皮之類。氣實人因服參耆，過多而喘者用三拗湯。喘甚者須用阿膠，若久病氣虛而發喘者宜阿膠入參五味補之。新病氣實而喘者宜桑白皮苦草、蘆根湯之。

凡喘正發時無痰，將愈時却吐痰者乃痰于正發之時，閉塞不通故喘甚，當于其時開其痰路，則

喘易安也。宜桔梗湯及枳殼瓜薑實杏仁薑前胡等引出其痰，候痰出喘退，却調其虛實虛者補以參耆歸木實者瀉以沉香滾痰丸之類，是也。

肺虛則少氣而喘，經曰：秋脉者肺也，秋脉不及，則喘。呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音，治則人參五味門冬之屬，是也。

肺痺肺積，則久喘而不已，經云：肺氣喘息，痺聚在肺，又云肺痺者煩滿喘而嘔，是肺痺而喘治法。

或表之或吐之使氣宣通而愈也

難經云肺之積名息貴在右脇下如杯久不已令入喘咳發肺癰治法則息貴丸是也

胃喘則身熱而煩經云胃為氣逆又云犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六腑入六腑則身熱不得卧上為喘呼又云陽明厥則喘而啶啶則惡人或喘而死者或喘而生者何也厥逆連臟則死連經則生是也啟玄子註曰啶謂熱內鬱而煩冗此胃喘治法加減白虎湯之類是也

腎喘則嘔咳經云少陰所謂嘔咳上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故咳上氣喘也東垣治以瀉白散是也

亢喘不得卧其脉浮按之虛而濇者為陰虛去死不遠慎勿下之下之必死宜四物加童便竹瀝

青黛門冬五味枳殼蘇葉服之

東垣曰病機云諸痿喘嘔皆屬於上辨云傷寒家論喘嘔以為火熱者是明有餘之邪中于外寒變而為熱心火太旺攻肺故屬於上又云膏梁

之人奉養太過及過愛小兒亦能積熱于上而為喘咳宜以甘寒之劑治之肺經又云肺盛有餘則咳嗽上氣喘渴煩心胷滿短氣皆衝脉之火行于胷中而作係在下焦非屬上也蓋雜病不足之邪起于有餘病機之邪自是標本病傳飲食勞役喜怒不節水穀之寒熱感則害入六府皆由中氣不足其膜脹腹滿咳嗽喘嘔食皆以大甘辛熱之劑治之立已今立熱喘寒喘二方熱用人參平肺散寒用參蘇溫肺湯

三因論曰 尺寸陰脉實者、肺實也。肺必脹上氣。
喘逆、咽中塞、如嘔狀。自汗皆肺實之証。右寸陰
脉虛者、肺虛也。必咽乾無津少氣不足以息。
喘有寒有熱有水病寒喘遇寒則發熱喘發于夏
而不發于冬。水病者小便澁、胃膈滿、悶脚微腫。
是也。熱喘宜蛤蚧丸、寒喘宜煮肺散。水病宜當
中分冷熱虛而冷者紫金丹實而熱者防已丸。
戴元禮曰：有瘻喘、有氣急喘、有胃虛喘、有火炎上
喘、痰喘者。一喘便有瘻声、氣急喘者呼吸急促。

而無痰声有胃氣虛喘者擡肩擗項喘而不休火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則喘太熙胃中有實火膈上有稠痰得食入咽墜下稠痰喘則止稍久食已入胃反助其火炎再升上喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也葉都督患此諸醫作胃虛治之不愈後以導水丸利五亦次而安

又心法附錄曰凡此証脉滑而手足溫者生脈瀋而四肢寒者死傷寒必上氣急不得卧喉中

時一服減半再服喘愈只有胸膈不利煩熱口乾時時咳嗽耳與加減鴻白散

桑白皮

一兩

地骨皮

知母

橘紅

青皮

去白

桔梗

去芦各

黃芩

炙甘草

各三錢

每服五錢

水二大盞煎至一大盞去渣溫服食後數服良愈華佗云盛則為喘減則為枯活人云發喘者氣有餘也凡者文字雖要會得本意盛而為喘者非肺氣盛也言肺中之火盛也喘為氣有餘者亦非肺氣有餘也言肺中之火有

餘也故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺也瀉肺中之火實補肺也不可不知

陰虛者補之

丹溪治一人家豐好內厚味每年到四月九月內必發氣喘擡肩吐痰脉沉澁而細數諸醫用平肺之藥數年不愈用人參生地黃柏天門冬牛膝肉蕤子五味子知母黃柏天門冬玄參末為丸如梧子大每服百丸空心服以救肺虛又用阿魏黃連山楂沉香牛黃辰砂膽星

陳皮神曲糊為丸梧子大臨卧姜湯下三四十丸以治厚味服訖復用瓊玉膏一劑繼服之安

東垣調中益氣湯加減法

如秋冬月胃脉四道為衝脉所逆并脇下少陽脉二道而反上行病名曰厥逆其証氣上衝不得息而喘息有音不得卧如吳茱萸五分或一錢觀厥氣多少而用之如夏月有此証為太熱也蓋此証隨四時為寒熱溫涼宜以酒黃連黃柏知母各等分為細末熱湯丸如桐子大

每服二百丸白湯送下。空心服。仍多飲熱湯。服畢少時。便以羨食壓之。使不得胃中停留。直至下元。以瀉衝脈之邪也。大抵治飲食勞倦所得之病。乃虛勞七損症也。當用溫平甘多辛少之藥。是治其本也。如時見寒熱四時証也。又將理不如法。或酒食過多。或食辛熱寒冷之物作病。或居太寒太熱之處。益其病。當暫用太寒太熱之藥。而取効。此從權也。不可以得効之故。而久用之。必致夭橫矣。

平居則氣和。行動則氣促。而喘者亦衝脈之火。予族兄六旬有餘。素有喘症。或嘔吐。血痰。平居時則不喘。稍行動。則氣促。喘急。以黃柏知母滋腎丸。空心服。七八十丸。其症大減。此黃柏知母能泄衝脈之火者。如此效也。

簡易方 治肺氣喘嗽。馬兜鈴二兩去殼。取子。秋石半兩。入碗內。和勻。慢火炒乾。甘草一兩炙。干味為末。每一錢水一盞煎。六分溫呷之。以藥末含嚥津。亦得。

肺氣虛者宜補之

本事方治喉喘氣急以參一味為末鷄子清投
新水調下一錢昔有二人同走一舍人參一不
含俱走三五里許其不含者大喘含者氣息自
如乃人參之力也

仲景治火逆上氣咽喉不利以麥門冬湯主之止
其逆而下其氣也 麥冬七升半夏升人參四兩
甘草二两粳米三合大棗十二枚 右六味以水一斗
二升煮取六升溫服一升日三夜一

許學士治一婦年五十餘素有痰數忽一日大喘
痰出如泉身汗如油脉浮而洪似命絕之狀予
適在彼速用麥門冬四錢人參二錢五味子一
錢五分煎服一帖喘定汗止三帖後痰亦漸少
再與前方內加瓜萎仁一錢五分白朮當歸芍
藥黃芩各一錢服二十餘帖而安此實麥冬五
味人參之功也如自汗兼腹滿脉沉實而喘者
裏實宜下之

活人五味子湯 治喘促脉伏而數者

五味子錢人參麥冬杏仁橘紅各二分

姜三片紅棗三枚水煎服

喘冗遇冬而發此寒包熱也解表則熱自除

枳殼炮

一錢

治肺壅甚當半通利九竅

麻黃

防風

黃芩

桔梗錢

陳皮

木通

治肺壅甚當半通利九竅

紫蘇葉

右分四帖水煎服之

又方

治寒包熱而喘必用發散

半夏

枳殼

炒桔梗

黃芩

炒紫蘇

麻黃

杏仁

甘草

如天寒加桂枝

東垣麻黃定喘湯 小兒寒鬱喘喉中鳴腹內响
堅滿臭流清涕脉沉急而數 麻黃 草寇
益智仁各兩 分半 甘草 歸身 紅花 黃芩 生
柴胡各一升 麻 神曲各五 吳茱萸三分 蘇木半
全蝎 右分十二服水煎微汗愈
麻黃蒼朮湯 治秋暮冬月每夜連声嗽不絕口
喘至天明日高半緩口苦兩脇下痛卧而多驚
筋挛肢節痛痰吐涎沫日晚呵欠不能飲食
柴胡 羌活 蒼朮各五 麻黃一分 防風 甘草

稍生歸尾 黃芩各四分 炙甘草三分 五味子九分

草豆蔻六分

黃蓍一錢半

右分二帖水煎稍熱

服入

此二方發中外之寒

七情氣鬱宜四磨湯以解之庶下其氣而止其喘急也

人參 桂榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎一二沸放溫服

加木香枳殼為六磨湯有苦寒者加丁香亦可

行義云烏藥桂榔氣稍走泄但不甚剛猛與沉香同磨作湯治胃中氣膈甚當

丹溪治一婦人發熱氣喘與解表藥汗出而定因夜半食粥早喘再作心痞口乾半夏 枳實
炒各三錢 黃連 白术各二錢 木通 陳皮各一錢 半麻黃
各一錢 紫蘇 炙甘草 加姜水煎服
分氣紫蘇飲 治脾胃不和酒漬惡寒氣逆喘促
五味子 桑白皮 茯苓 炙甘草 草果
大腹皮 陳皮 桔梗各等 紫蘇減半
姜三片水煎服

東垣人参平肺散 治心火刑肺傳為肺痿咳嗽

喘嘔痰涎壅盛，胃膈痞悶，咽喉不利。
桑皮一錢，知母七分，炙甘草一分，地骨皮一錢，人参五分，茯苓三分，天冬各四分。
如熱甚，加黃芩、紫蘇葉半夏各五分。
參蘇溫肺湯 治形寒飲冷，則傷肺，喘煩心脅滿短氣，不能宣暢。人參一錢，肉桂三分，五味子二錢，陳皮一錢，半夏一錢，白术一錢，桑皮一錢，紫蘇葉二錢，茯苓一錢。每五七錢，姜三片水煎服。
如冬寒月，每服加不去節麻黃半分。

加味華蓋散 肺受風寒，脅滿聲重。
蘇子 陳皮 赤茯苓 桑皮 麻黃 杏仁
各二錢
甘草一錢 姜三片，東二枚水煎服。
九寶湯 欣而身熱，喘急惡寒。
麻黃 薄荷
陳皮 肉桂 紫蘇 杏仁 甘草 桑皮
大腹皮 各等分 加姜葱水煎服。
發時有痰吐出者，宜化痰。
婦人大全千絃湯 半夏七枚破四片製之，皂角去皮
炙甘草各一生姜大指 右用水一碗煮去滓。

頤服一方不用甘草但用半夏末一兩皂角
去皮絃半兩生姜七片同入紗袋中水三升
煎至一盞五分以手搾洗取清汁分作三服
連進之效

咳逆上氣時濁唾但坐而不得卧者皂莢丸主

之方在咳之散門

水氣凌肺者宜徹之

東垣神秘湯治病人不得眠則喘急水氣
逆行上乘于肺得水而浮使氣不流通其脉

沉大蘇葉陳皮生姜桑皮人參
錢茯苓木香各二右分二十帖水煎服
防已葶藶丸治肺氣喘嗽面白浮腫小便赤澀
喘促不得卧漢防已木通貝母各一苦
葶藶炒杏仁右為末枣肉膏為丸梧子大桑
白皮湯下

喘咳倚息不得卧仲景小青龍湯加石膏主之

方在痰之散門

汚血凝滯脅膈者宜活之

丹溪治卒上氣喘鳴息急欲死者 蕉汁飲半升

升瘡蓋蕉汁能去胃中惡血滯氣

又方 治上氣咳嗽胃膈妨悶氣喘 杞仁二兩去皮尖以水一升研取汁和粳米二合煮粥食

東垣加味瀉白散 治陰氣在下陽氣在上咳嗽

喘促 桑皮一兩 青皮二兩 茶芩三錢 甘草

地骨皮七錢 陳皮五味 人參各五錢

每五七錢入粳米百粒水煎服

清金湯 治男婦不拘遠近肺氣咳嗽上氣喘急

清金湯 治男婦不拘遠近肺氣咳嗽上氣喘急

喉中涎声胃滿氣逆坐卧不安飲食不下
丹溪清金丹門見哮門 治食積痰喘嗽因厚味而發者

調氣化痰丸 快脾順氣化痰消食治久喘或作或止者

半夏 南星 白朮 皂角 生姜

右各一觔水煮南星無白點為度揀去皂角不用

不用將生姜切作片同半夏南星晒乾

青皮去白 橘紅 蘇子炒 蘿蔔子炒另研 乾葛

杏仁去皮尖另研 神曲炒 麥芽炒 山楂炒 香附子

右各半觔淨與前藥合和一處為細末。生姜汁浸餅打糊為丸。桐子大。每服五七十丸。食後茶湯送下。

飲水多者宜滲利之。

仲景云病人飲水多必暴喘滿以五苓散主之。白朮散治夏月飲冷酒生痰膈滿而喘。

白朮 茯苓 黃芩 半夏各等分 每服六七錢。姜三片水煎調陳皮神曲末各一錢食後服。

開提之劑

簡易方 治喘急 桔梗一兩半為末。童便半升煎取四合去渣溫服。

開闔之劑

安肺散 治癆嗽不問新舊喘急氣逆。

麻黃去節二兩 炙甘草二兩 御米殼去蒂炒五錢水一盞入烏梅一枚煎七分溫服。

人參理肺散 治喘嗽不止。

麻黃去節二兩 川歸各一兩 木香各一兩 御米殼炒杏仁炒各二兩 每服六錢水煎服。

雜方

保命集半夏丸

傷風痰作喘逆兀兀欲吐惡心

歌倒

半夏一
兩

楨柳

雄黃各三錢

右為末姜汁

浸餌

糊

為丸梧子大

每服五十丸姜湯下

羅太無人參半夏丸

化痰墜涎止嗽定喘或風

痰茶痰食痰一切

痰逆嘔吐頭痛或風氣偏

正頭風疼或壅頭目昏眩耳聾鼻塞咽乾脣膞

不利

人參

茯苓

南星

薄荷

各五

半夏

乾姜

白礬

寒水石

各一
兩

蛤粉

二
兩

藿香

一
錢

半夏

右為末水糊為丸梧子大每服三五十丸
湯下日三服此方治久喘極効於未發時
服之若已發時用沉香滾痰丸微下之累効
孫兆視雷道矩病吐痰項間已及丁升喘咳不已
面色慚黯精神不快兆乃與仲景葶苈大枣瀉
肺湯下服訖已覺胸中快利畧無痰唾矣
加味白虎湯治熱痰喘嗽火迫肺金
白虎湯加瓜萎仁枳殼黃芩神効
隻玉散治火痰喘嗽痰湧如泉

寒水石 石膏 等分為末，人參湯下三錢。

羅太無真應散

遠年喘急不能卧，百藥不効者。

白石英

四兩通明者以絹袋盛，以椎猪肚一箇，如前法煮三次，取出藥

肺丸研極細末，入后用官局欬冬花散二錢，入

前末二錢，再加桑白皮二寸生姜三片棗子一枚，水一盞半煎七分，通口服。其猪肚亦可

食只不得用醬椒醋鹽姜等調和。

官局欬冬散

欬冬花一錢 貝母

知母 桑葉

杏仁 半夏 阿膠

甘草

各二錢

麻黃

去節四錢

杏仁為末。

陳皮湯

治痰喘

橘紅半斤

明礬半

共炒香

炙甘草

二兩

半夏

浸水煮

兩姜汁

右為末，每服二錢湯。

杏蘇飲

治上氣喘嗽浮腫

杏仁半錢 蘇葉

五味子

大腹皮

烏梅肉

紫苑

炙甘草

各一錢

橘紅

麻黃

去節

桑皮

姜三片水煎服。

玉華散

咳嗽上喘清肺利膈

甜葶苈

桑皮

半夏

貝母

天冬

馬兜鈴

杏仁

百合 人参 百部 甘草

各七分

杏水煎服

定喘膏詩括一兩 麻油二兩 密半兩 生姜自然汁紫苑
麻黃及杏仁 桔梗細辛斟酌入更加半夏與人參慢火熬成黑漆臨睡之時三兩匙覺來

定喘無蹤跡

定喘

治上氣喘滿倚息不能卧 杏仁 杞仁

俱炒桑皮各一人參錢去皮尖

姜棗水煎服

二奇方

治水氣發喘

方在水

杏仁煎

治喘嗽

杏仁

去皮尖

胡蘆肉

去皮等分研

為膏入煉蜜少許丸如彈子大每嚼一二丸
姜湯下

又方 治氣虛喘嗽極效 人参

錢胡桃肉一枚五枚

姜五片水煎服

又方 用胡蘆肉三枚生姜三片臨卧嚼下畢飲
湯三兩呷耳嚼蘆姜如前即就枕勿行動初
又方 肺熱胸滿痰嗽 爪蒌仁

研半夏二味和匀生姜自然汁打麵糊為丸如梧子大每服五十丸姜湯下

又方 治諸喘 麻黃分七錢 杏仁一錢 甘草分四錢 細茶八錢 分石膏一錢半

水煎服

定喘奇方 治稠痰壅盛肺肥實而喘者

廣橘紅二錢

明礬五錢

同炒香去礬不用

半夏

一兩 杏仁一錢

斐炒

瓜萎仁

一兩

皂角

去皮絃子燒

半

炙甘草

七錢

黃芩

乾五錢

右為末

餅用淡姜湯

打糊為丸

葛根

酒拌晒

右為末

餅用淡姜湯

次服三五日 大便下稠痰而愈

虛弱人每

服七分

治熱嗽喘咳不已 苦葶藶二兩

炒另研

知母

蜜

貝母

後臨卧桑白皮湯下 五十丸

各一兩

杏仁

二兩

去皮

右為末

煉蜜丸

梧子大

食

治喘嗽

貝母一兩

香附子半兩

生炒

為末

食後茶

治

調下

二錢

忌鹽油煎燉

不拘水

嗽

鹹

嗽

並効

劫

喘

方

牛黃散

治熱瘡

暴

死

者

白牽牛

炒

二

大黃

煨

兩

蜜

水

下二錢

治喘

用古文錢七箇

鹽梅七箇

水一盞

同浸

元

又方

蘿蔔子

蒸

皂角

燒存性

姜汁和

蜜丸

梧子大

食

治

喘

用古文錢七箇

鹽梅七箇

水一盞

同浸

元

各一兩 杏仁二兩 去皮 尖研為末 右為末 煉蜜丸 梧子大 食
後臨卧桑白皮湯下 五十丸

治喘嗽 貝母一兩 香附子半兩 生炒 為末 食後茶
調下二錢 忌鹽油煎燉 不拘水 嗽鹹嗽並効
劫喘方 牛黃散 治熱瘡暴死 者 白牽牛 炒二
大黃 煨兩 蜜水下二錢

又方 蘿蔔子 蒸 皂角 燒存性 姜汁和蜜丸 梧子大
食 每服五十丸 白湯下

治喘 用古文錢七箇 盡梅七箇 水一盞 同浸 元

宿每服一呷空心良久呴出惡痰而効子和稀涎散治痰喘氣逆下氣化痰甚速

氣短氣促少氣

短氣而息促似喘非喘也少氣者氣少不足以言

也

素問云三陽絕三陰微是為少氣方盛衰論怯然少氣者是水道不行形氣消索也示從客滿言而微終日乃復言者此奪氣也客滿言綱目云治此少氣蓋生脉散獨參湯之屬為愈也

一陽發病少氣善咳善泄

運氣言少氣有二

一曰火熱經云火鬱之發民病少氣又云少陰之復少氣骨痿又云少陽之復少氣脈痿治以諸寒是也二曰風溫經云太陽司天之政四之氣風溫交爭風化為雨民病大熱少氣是也

喘與短氣辨

成無己曰短氣者氣而不能相續者是也似喘而非喘若有喘上衝而實非氣上衝也夫喘者張

口擡肩捶身滾肚謂之喘也氣上衝者腹裏時時氣上衝也所謂短氣者呼吸雖數而不能相續似喘而不搖肩似呻吟而無痛者此短氣也經所言短氣者衆實為難辨愚師莫識悞者多矣要識短氣之真者氣急而短促謂之氣短者是

共六有_共識_共短氣之真者氣急而短促謂之氣短者也是

脉經曰寸口脉沉胷中短氣

生生子曰短氣少氣治法亦有異也短氣仍有虛有實治法有補有瀉少氣則純不足也治惟有補而已

仲景曰陽脉微而緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣又曰胸痺氣中氣寒短氣茯苓杏仁甘草湯主之橘枳姜湯亦主之方見胃胸痺痛門肺痺喘息咳唾胷背痛短氣括萎薤白半夏湯主之方見胃夫短氣有微飲當從小便去之苓桂术甘湯腎氣丸亦主之腎氣丸方見脚氣中款花補肺湯治咳嗽短氣又曰短氣皆屬飲苓桂术甘湯是其一法也金櫃云咳嗽倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲又云支飲亦喘而不得卧加

短氣其脉平也又云膈上有留飲其人氣短而渴四肢歷節痛脉沉者有留飲又云肺飲不弦但吞喘短氣其治法危急者小青龍湯脹滿者厚朴木黃湯胃眩者苓桂术甘湯及澤瀉湯不得息葶苈大棗湯吐下不愈者木防已湯之類是也東垣曰胃滿少氣短氣者肺主諸氣五臟之氣皆不足而陽道不行也氣短小便利者四君子湯中去茯苓加黃蓍以補之如腹中氣不轉者加甘草一半肺氣短促或不足者加人參

白芍藥中焦用白芍藥則脾中陽升使肝膽之邪不敢犯之如衣薄而短氣則添衣于無風處居止氣仍尚短則以熱湯一碗薰其口鼻則不短也如衣厚于不通風處居止而氣短則宜減衣摩搘汗孔令令干漫風處居止如久居高屋天寒陰溫所逼令氣短者亦如前法薰之如居周密小屋或大熱而處寒涼氣短則就風自亢氣短皆宜食滋味湯飲令胃氣調和仲景曰平人無寒熱短氣不足以息者實也丹溪治許

白雲先生脾疼跨痛短氣用太吐大下法是也

孫尚丘元散

治氣不接續兼治滑泄及小便數王丞相服之有効 索木一兩全鈴子去核二錢半右件為末入硼砂一錢煉過研末和勻每

服二錢鹽湯或溫酒空心調服

芩桂术甘湯

治癰飲短氣

方在瘡門

產後喘

產後喘乃急症極危多死郭氏謂此名孤陽絕陰為難治因所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚

肺中故令喘促喉中氣急也治此症用獨參湯為妙 陳無擇云宜大料芎歸湯 若惡露不快散血停疑上薰于肺亦令喘急但服奪命丹血去喘自定

血沒散 產後敗血冲心胃滿上喘命在須臾
真血竭 沒藥 等分為末每服二錢用童便
母酒煎一太沸溫調下 方產時進一眼上
床良久再服其惡血自循經下行更不上串
免生百病

參蘇飲

產後血入於肺而赤發喘，欲死者。

人參一兩

蘇木二兩

右以水二碗，將蘇木煎至

一碗去渣，調入參末，隨時加減，服神効。

若因憂怒性氣抑鬱而發喘者，以小調經散用桑

皮杏仁煎湯調服。

旋覆花湯 產後傷風寒咳嗽，數痰涎壅盛，半卧

不寧。旋覆花

赤芍藥

荆芥穗

半夏麵

五味子

麻黃

茯苓

杏仁

甘草

前胡

各等

姜五片，東二枚，水煎服。

丁婦孕時足腫，七月初旬產後，二日洗浴，即氣喘，但坐不得卧者，五個月惡風，得暖稍寬，兩關脉動尺寸皆虛，百藥不効。牡丹皮、桑白皮、桂枝、茯苓、乾姜、枳實、厚朴、桑皮、紫蘇、五味子、瓜萎仁、前胡，之即寬，二三服得卧，其痰如失，蓋作汚血感寒，治之也。

若傷感冷飲食而喘者，宜見觀丸。姜黃、三棱、小草、燈芯、陳皮、良姜、人参、莪术、右等分，為末，蘿蔔水煮爛研細，將汁煮麵糊為丸。

梧子大蘿蔔子湯下

小調經散 產後四肢浮腫者敗血循經流入四肢留日久腐爛如水故令四肢腫面色黃宜服此血行腫消則愈 没藥 琥珀 桂心

芍藥 當歸 各一細辛 射香各五錢 分五分

右為末每服五分姜汁酒調服

哮

丹溪曰哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐不用涼藥湏常帶表散此寒包熱也亦有虛而不可

哮喘遇冷則發者有三

其一屬中外皆寒者治法乃東垣參蘇溫肺湯

調中益氣加吳茱萸湯及紫金丹刲寒痰者是

也

紫金丹即砒霜豬肉

研末蒸餅丸者

其二屬寒包熱治法乃

仲景越婢散之時先用大承氣湯下其熱至冬

寒時無熱可包哮自不發是也

食積壅塞哮喘咳嗽清金丹遇厚味發者用之

蘿蔔子

淘淨蒸熟研末

猪牙皂角

燒存性三錢

用生姜

汗浸蒸餅丸如小豆蔻大每服三五十丸

鹽

下
却喘以姜汁煉蜜如梧子大每服七八十九噙下止之

遠年速日哮喘痰嗽
六 蝶退去
輕粉研
馬兜鈴各一 五靈脂生 雄黃生 杏仁去皮研各五錢 淡荳豉四十粒 右為未用生姜薑麯自然汁合輕粉諸藥為丸小彈子大每服十九細嚼臨睡牛姜湯下

治齁噦 蘇子二錢 麻黃去苗三錢 款冬 桑葉蜜炙
半夏各三錢 杏仁去皮尖一錢半 甘草 白果二十一枚去衣炒黃

色水三鐘不用姜煎二鐘徐徐頻服
一方治全上 用糯米泔水磨茶子滴入鼻中令吸入口內服之口中橫咬竹管一個片時間則涎自口鼻中流出如綿當日立愈二次絕根
洽水吐 芫花未過 大水上浮滓濾過 大米粉
右三味搜為裸清水煮熟恣意食之
又方 青皮一枚開者入芭荳一粒鐵線縛定燒存性為末姜汁并酒各一呷同調服過口便定喘湯 白萸十一枚去皮切碎炒黃色 麻黃 款冬花

安桑皮蜜

法製半夏

如無以甘草湯泡七

甘草

錢一
蘇子

錢杏仁一

錢黃芩

炒一錢半右用

水三鐘煎

一鍾分二服不用姜不拘時徐服

詩曰 諸病原來有藥方 惟愁喘最難當

麻黃桑杏尋蘇子 白藥冬花更又良 甘草

黃芩同半夏 水煎百沸不須姜 病人遇此

仙舟藥 服後方知定喘湯 金陵有一浦舍

用此方專治齁疾無不取効此其真方也

壓掌散

治男婦哮喘咳嗽

麻黃去節二

炙甘

草

錢

白藥

打碎五箇

水煎臨卧服

二黃丸濟生方

治停痰在胃喘息不通呼吸欲

絕

好雌黃一雄黃一研極細末熔黃蠟為丸

彈子大每服一丸於半夜時煮糯米粥乘熱

以藥投入粥內攪轉和粥吃

善悲

內經云在臟為肺在志為悲又云精氣并于肺則

悲是也

肺虛補母仲景云婦人臟躁喜悲傷故哭象如神

胡零附數久伸甘麥大棗湯主之

甘草三
丙

小麥升一
大棗十枚

水六升煮三升分三服亦

補脾氣

許學士治一婦人數次無故悲泣不止或謂之有祟祈禳請禱備至終不應予忽憶金櫃有丁証云婦人臟躁悲傷故哭象如鬼神靈數欠伸者宜甘麥大棗湯予急令治藥尽劑而愈古人識病制方種種絕妙如此

運氣云悲証皆屬寒水攻心經云火不及曰伏明

伏明之紀其病昏惑悲忘從水化也又云太陽司夫寒氣下臨心氣上從喜悲數久又云太陽司夫寒淫所勝善悲時眩仆又云太陽之復甚則入心善忘善悲治以諸熱是也

姪娘善悲

綱目述鶯先生治一姪娘四五箇月臟躁悲傷遇晝則慘感淚下數欠象若神靈如有所憑醫與巫皆無益與仲景大棗湯一投而愈

偏風肺癆

金匱要略千金方
脉經論同

論曰寸口脉數其人病咳口中反有濁唾涎沫出何也師曰此為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺痿或從汗出或從嘔吐或從渴小便利數或從便難被快藥下重亡津液故得肺痿又寸口脉不出而反發汗陽脉早索陰脉不澁三焦踟蹰入而不出陰脉不澁身體反冷其內反煩多唾脅燥小便反難此為肺痿傷于津液便如爛瓜下如豚腦但坐努汗故也其病欬數不得咳嗽出乾沫久久小便不利其脉平弱肺痿吐涎沫

而不嗽者其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欲飲者自愈自張口者短氣也

王海藏曰此証初得可治久則難愈何者上枯水之源下竭水之本也

又曰寸口脉虛小者為肺痿熱之所過初結為膿始萌可救微發渴者欲愈

又曰亢傷風傷寒後咳嗽唾血者此肺虛也若不危恐乘虛而成肺痿當以小柴胡去人參木東

羌姜加乾姜五味子又曰無汗惡寒脉浮緊得自傷寒法從麻黃。有汗惡熱脉沉實得自傷酒法從葛根。
又經云陽明司天噦出白血者其狀淺紅如肺色故曰白血

又曰冷必眩不渴不咳上虛下不能制溲渴者屬消渴
甘草湯治肺痿涎唾多出心溫液液方
甘草二兩水三升煮取一升半分服

生生子曰痿乾瘡也即早發還先痿之痿

甘草乾姜湯溫臟治肺痿多涎唾小便數肺中

冷必眩不渴不咳上虛下不能制溲渴者屬消渴
甘草湯治肺痿涎唾多出心溫液液方
甘草二兩水三升煮取一升半分服
生姜甘草湯治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴
生姜五兩甘草四兩人參三兩大棗十枚
石水七升煮取三升分三服
桂枝皂莢湯治肺痿吐涎沫不正桂枝

生姜各三

甘草二

皂莢一

大棗十五枚

水七升煮取三升分三服

千金麻黃湯

仲景名小青龍加石膏湯

治肺脹咳而上氣

咽燥而喘脉浮心下有水

麻黃

芍藥

生姜各半

石膏四

水一斗先煮麻黃去上沫內諸藥

煮取三升

強壯服一升羸者減之日三服

小青龍湯

無石膏

知母茯苓湯

肺痿喘嗽不已往来寒熱自汗

知母

甘草

各二兩

五味子

人參

茯苓

炙甘草

各二兩

知母

五味子

人參

薄荷

半夏

柴胡

白朮

款花

桔梗

麥冬

黃芩

各五錢

川芎

阿膠

炒各三錢

右每服一兩姜三片水煎服

久病咳嗽肺痿見血

知母

貝母

天冬

麥

冬

款花

各三分

川歸

地黃

故仁

杏仁

天杞粉

各五分

桔梗

甘草

馬兜鈴

紫菀

阿膠

白芍

各一分半

姜三片

東一枝水煎連進

人參三服立愈

人參平肺散 治心火剋肺，傳為肺痰，咳嗽喘嘔，
痰涎壅盛，冒膈痞滿，咽喉不利。橘紅、甘草、
炙地骨皮、茯苓、青皮、蘇葉、半夏各一錢，
桑白皮一兩，知母七錢，人参、天門冬各四錢。
有熱加黃芩四錢，五味子三粒，每服五錢，姜三片。
水煎服，或為末，姜汁丸如彈子大，噙化亦可。
入參款花膏，脾胃虛寒，久嗽不已，咽膈滿悶，咳
嗽痰涎，嘔逆惡心，腹脇滿脹，腰背傷痛，或虛勞
冷嗽，及遠年近日一切咳嗽諸藥，不効者，成全金
散，肺病。

款花 人參 五味子 紫苑 桑白皮
右為末，煉蜜丸，芡實大，每食後細嚼一丸，淡
姜湯下，噙化亦可。

肺癰

仲景王叔和論同

孫真人曰：病欬唾膿血，其脉數實者，屬肺癰虛者，
屬肺瘦效，而口中自有津液，舌上胎滑，此為浮寒，
非肺瘦。若口中辟辟燥效，即胃中隱隱痛，脉反澀，
而數，此為肺癰也。問曰：病者欬逆師脉之何以知
為肺癰？當有膿血吐之，則死後竟吐膿死。其脉何

類何以引之。師曰寸口脉微而數微則為風，數則為熱。微則汗出數則惡寒。風中於衛呼氣不入，熱過于營吸而不出。風傷皮毛，熱傷血脉。風全於肺，其人則咳，口乾喘滿，咽燥不渴，多唾濁沫，時時振寒熱之所過，血為凝滯，蓄結癰腫。吐如米粥，始萌可救。膿已成則難治。寸口脉數，趺陽脉浮緩，胃氣如經，此為肺癰搏，故振寒而咳，趺陽脉浮緩，胃氣如經，此為肺癰。師曰振寒發熱，寸口脉滑，而數其人飲食起居，如故，此為癰腫病。醫反不知而以傷寒治之，不應愈。

也。何以知有膿？膿之所以在，何以別知其處？師曰：假令膿在胃中者，為肺癰。其脉數欬唾有膿血，設膿未成，其脉自緊，數緊去，但數，膿為已成也。生生子曰：按金櫃要畧，脉經元戎論，肺痿肺癰皆無分別治亦相湏。以其俱為肺病也。愚歷見今之病耳者，亦稍有分別，不能不為之辨也。肺痿近于虛怯，故王海藏援內經勞風論証，不之謂上枯水之源，下竭水之本也。何言乎內經五痿論，皆以肺熱葉焦為本故。今之病，肺痿者多乾

咳聲啞，无力，緣肺主聲，肺為火，燥憊，則枯痿乾癟，故聲不充發也。虛怯者多有之。肺癰雖亦為肺熱所致，多有之。因外感，因酒熱，故間有下，及膿血而愈者，有漏肺而愈者。茲分肺痿肺癰為二門。祖千金也。

王海藏曰：寸口脉實大為肺癰，血為凝滯，化為五色，脉數為弱，膿成難已。不渴者難治。

黃昏湯 治欬有微熱，煩滿，胃心甲錯是為肺癰者方 黃昏手掌大一片，是合昏皮也。咬咀以

水三升，煮取一升，分二服。

又方

薏苡仁

瓜瓣

杏仁

五十枚

筆莖

切二

二斗煮取
五升去滓

右四味，內蓆汁中煮取二升，服一升。

當有所見吐膿血。

王海藏加味葶藶大棗鴻肺湯 治脉緊數，則膿已成喘，而不得卧。葶藶二兩炒，右件杵成丸，以水三升，煮大棗二十個，取二升，去渣，內麻黃五味子各半兩，取清飲，頓服，令三日服一劑，瘥。

欵之法 治一切欬唾膿血久欬及出不止好酥三十勦三遍煉停取凝成膏醍醐服二合日三服瘧

如聖丸 治風熱毒氣上攻咽喉痛腫脣塞妨悶及肺癰噴嗽膿血胃滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣息腥臭久咯膿狀如米粥 龍腦另研

牛黃另研 桔梗 甘草生用各一錢 石為細朱煉蜜丸每兩作二十丸每服一丸噙化

嗽藥青龍散 石膏入膏 朴硝 甘草生用各一錢

青黛半兩 右為細末每服二三錢煎薄荷湯點熱漱冷吐

衍義蛤蚧散 治肺虛欬久成瘧吐膿血犀角

羚羊角 鹿角 阿膠 蛤蚧

搜膿散 治諸瘡膿汁不絕腐盡 黃蓍 白芍

藥 香白芷各等分 右為末乾上患處上用膏

藥敷貼一日一換

海藏云此方雖云上瘡吐膿血久不盡者亦宜用此藥作湯散煎調服之又宜糊為丸桐子大白

湯下三五十丸或乾糲細末咽津大妙

錢氏如聖散

桔梗

甘草

阿膠白炒

煎甘桔取清內膠化服

黃蓍鱉甲散

治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠

五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有

盜汗胸脇不利飲食多渴欬唾稠粘時有膿血

知母

桑白皮

秦艽

白茯苓

紫

苑味各五錢淨

地骨皮

本忌火令

有說別培

生地黃

柴胡

去蘆

六錢六

分
等
肉桂
見火
不
人參
苦桔梗

已上三味各
三分淨

天門冬

湯洗去心
焙一本忌火

二味各一兩

半夏

五
更佳

右為粗末

每服二大錢水一盞煎至七

半

分去渣溫服

食後

海藏云此方內闕

黃蓍

半

疑黃芩是黃蓍也然內有黃芩有小柴胡今

金

亦妙

內有桂本治發熱惡寒即柴胡加桂也

亦妙

骨皮赤芍藥即錢氏地骨皮散也○治盜汗

亦妙

內有桂本治發熱惡寒即柴胡加桂也

亦妙

內有桂本治發熱惡寒即柴胡加桂也

○天門冬人參地黃即三才也○秦艽柴胡

甘草釐甲芍藥即黃龍湯也○紫苑桔梗甘草即苑散也○桂芍黃耆甘草即黃耆建中湯也又云此方治本無傷寒風而得○然真人治喉膿血用麻黃升麻之類及青龍湯之類亦從傷寒而得也內多五味子皆祖仲景法無論傷寒、傷風皆可加五味子○又云桔梗一味有辛有苦辛以散之苦以泄之當如上下之意

硃砂膏 鎮心神解熱除煩止血等證

硃砂另半兩研 珍珠末 生犀角 人參 玳瑁末
甘草各半兩研 金箔沈分半用輕粉二錢 蘇合油一分牛黃
另研麝香研龍腦研南鵬砂 琥珀 遠志 珍
羊角 赤茯苓已上各半兩 安息香酒熬去石約半兩
右為細末入研藥極細煉蜜丸蘇合油和諸藥為錠子更以金箔為衣每兩作五錠每服丁皂角子大噙化人參湯下亦得並阿膠丸相雜服尤勝至宝丹

定肺散

知母半兩

貝母二錢半

人參二錢半

枯礬半兩

烏梅肉

半兩 御米殼

炒 二

白术

二錢

為細末水

煎生姜湯

點亦得蜜丸

彈子大噙化

亦得

定肺丸

款冬花

紫苑

知母

貝母

八參

甘草

炙 桑白皮

御米殼

麥門冬

百部

馬兜鈴

五味子

烏梅肉

已上各等分

古方紫苑散

紫苑

半兩

款冬花

半兩

右為細末

棗蜜丸

彈子太噙化

丁丸

右為細末

烏梅湯

點服生姜亦得

如效加

五味子

共

杏仁

渴加烏梅

氣逆加陳

頭痛加細辛

三錢甘草

二錢

氣脹者

加御米殼蜜炒粗末水煎

增損防風通聖散

治鼻塞不通肺氣不利

桔梗

桑白皮

紫苑

鼠粘子

各半兩

荆芥穗

三 甘草

一兩各生用

上

右為粗末防風通聖散各一

半和勻每服四錢水

丁盞半生姜五片煎至

七分去渣溫服食後

葶苈大枣泻肺湯

肺癰留滿脹一身面目浮腫

鼻塞清涕出不聞香臭酸辛

欬逆上氣喘鳴迫

急

加陳皮

半

水

塞先服小青龍湯丁帖
先以水三升煮棗取二升去棗入葶苈子取一升服

外臺桔梗白散 咳而脣滿振寒脉數咽乾不渴
時出濁唾腥臭久火吐膿如米粥者為肺瘡
桔梗 貝母 各三 巴豆 分右三味為散壯人服
五分弱者減之病在膈上吐膿血膈下者馮
出若下多不止者飲冷水一杯

久吐膿者，米粥者，為肺癰。桔梗湯主之。
桔梗一
甘草二
右二味以水三升，煮取一升，分溫再服，則吐出膿血而愈也。
效逆上氣時時濁唾，但坐不得卧，皇葵丸主之。
皇葵
刮去皮，為細末，蜜丸梧子大，以東膏和湯。
服三十丸日三夜一。

孫真人治肺癰吐膿血用甘桔湯二十餘條加減
生甘草一兩桔梗二兩水煎服 咳逆氣者加
陳皮咳嗽者加知母貝母 欲而渴者加五味

吐膿血者加紫苑，肺瘦者加阿膠，面目腫者加菝葜，嘔者加生姜半夏，少氣者加人參麥冬，脢疼者加黃蓍，目赤者加梔子黃連，咽痛者加鼠粘子竹茹，声不出者加半夏桂枝，疫毒頭腫者鼠粘子木黃芷硝，胸痛膈不利者加枳殼，心胃痞者加枳實，不得眠者加梔子，發狂者加防風荆芥，酒毒者加葛根陳皮。

桔梗湯 治肺癰心胸氣壅咳嗽膿血心神煩悶

咽喉多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澁
桔梗 貝母 當歸 爪姜仁 只殼 茴仁
桑皮 防已各一分 甘草節 杏仁 百合各二分
黃蓍八錢 分二服 姜三片水煎溫服 大便秘者加木黃 小便秘加木通
升麻湯 肺癰吐膿血作臭氣 升麻 苦梗
苡仁 地榆 黃芩 牡丹皮 芍藥各一錢
甘草三分 分二服水煎食後溫服
紫苑湯 治咳嗽唾中有膿血虛勞癰瘻，

卷之九

分部

附錄

參 紫苑 知母 桔梗 甘草 五味子
茯苓 阿膠 貝母 各一 錢 姜三片水煎服

排膿散

肺癰吐膿以此排膿補肺

黃蓍

一兩

水二鍾煎一鍾食後溫服

東膏丸

肺積在右脇下如杯發為瘡

陳皮

苦梗

葶藶各等分東肉搗為丸梧子大每

服五十丸米飲下

消濃飲

肺有壅膿腥氣上衝嘔而咳嗽

桔梗

天南星

半夏

知母

貝母

生地

阿膠

川芎 甘草 桑皮 防風 射干 桔梗
天冬 薄荷 杏仁 白芷 紫蘇 白芨
烏梅 各等分每服七錢姜三片水煎服

大宮詹少溪吳馭閣校

赤水玄珠九卷終

赤
青
黃
綠
藍
白

2

1

卷之三

1

十一

卷之三

