

泰西熱病論

三

和書門類		
四三三號	一三六函	一册
五册		

內閣文庫		
四三三號	一三六函	一册
五册		

內閣文庫	
番號	和 43133
冊數	5 (3)
函號	195 301



淺草文庫

泰西熱病論卷三

非藏

原

泰西
加賀醫官
世山侍醫
津侍醫

玉函夫古撒謨 著

吉田成徳直心 譯

足立世茂松父

程田國道玄悦 校

長府侍醫 松岡士藏道遠

齋
箱

神經熱腐敗熱區別篇第六

熱病中惡性腐敗熱ト遷延神經熱ハ明徴ノ説ナク較著
ノ區別ナキ時ハ相混淆ノ錯誤ヲ致ス_ト多シ然レ_レ能

泰西熱病論 卷三 一〇 齋齋堂藏

ク鑒察スルトキハ其區別自ラ灼然タリ古今ノ醫家ヨク是ヲ言フ者稀ナリ持リ蘭孤利私ヨク分別セリ今其法ニ源キ更ニ自見ヲ加エテ其區別ヲ論ス

○惡性腐敗發斑熱ハ其患源血ニ在リ遷延神經熱ハ其病因唯水液及ヒ靈液ニ在リ是レ其基本ノ分別ナリ○惡性腐敗熱ノ極リハ諸液腐敗シ血液烱解渙崩ヲ爲ス遷延神經熱ハ遷延持久スト雖モ腐敗ノ徵候アルナシ是レ其基本各異アルガ故ナリ

○此兩種ノ熱病ハ其人ノ平常ノ起居飲食ニ就テ考ルヲ可トス飲食藥劑等常ニ溫熱辛辣慄悍鹽走竄芳香ノ

物ヲ用フル者ハ惡性腐敗熱ヲ發ス或ハ土地氣候ノ溫熱ナルヨリ亦此病ヲ患ルコトアリ又常ニ生冷瓜瓠水氣多キ物品或ハ粘滑ノ食物其他不良ノ菓實淡薄ノ諸飲等ヲ喫スル者ハ毎ニ遷延神經熱ヲ發ス又土地ノ氣候雨濕多ク冷氣多キヨリシテ此病ヲ患ルナリ○又此熱病ハ兩種共ニ傳染ニ因テ發ス是レ其一箇ノ毒氣ナルガ故ニ其毒ニ冒觸セラレ遂ニ體中ニ侵襲セララルナリ此兩種ノ毒性ヲ區別スルニ惡性腐敗熱ノ毒ハ此レヲ譬フルニ蝮蛇咬毒註前ニノ血球ニ侵入シ血質ヲ毀損シ速ニ腐敗變壞ヲ爲スガ如シ

○遷延神經熱ノ毒ハ蝮蛇毒ノ急烈ナルガ如クナラズ
 是ヲ譬フルニ風犬咬毒成徳云此毒ノハ予カ選スノ所ノ蘭藥鏡原ニ詳ナリ
 專ラ水液靈液ニ侵入穿通シ其勢遷延持久死ニ至ルト
 雖モ嘗テ腐敗ノ徵候ナク只悲衰ノ症候有ルカゴトシ
 ○此兩種ノ熱病其原因既ニ此ノ如ク各異アリ因テ見
 症モ同ジカラズ治法モ又甚タ區別アリ○予按スルニ
 兩症動モスレハ兼併スルイアリ其故ハ其人血質酷厲
 ナリト雖モ脈絡纖維ノ質軟弱ナレバ運行ノ機筈脈絡
 ノ充張勢力強健ナラズ故ニ酷厲液慄悍鹽等ノ衝動ノ
 候顯著ナラズシテ見症却テ劇烈ヲ見ルイナク其狀慢


延彌久シ死ニ至ルト雖モ猶然ル者アリ

○是以テ纖維ノ強弱ト血液ノ多少トヲ鑑斷シ其各各
 ノ病因ヲ察スルトキハ異候百端ナリ凡其原因自ラ明
 白ニノ疑惑スルイナシ猶次篇ニ精審ニ論辨シ其區別
 ヲ知ラシム

遷延神經熱篇第七

成徳案スルニ是レ從來三陰症又勞役感冒等ト稱スル者ナリ

遷延神經熱ハ其症初メヨリ神志樂マズ或ハ不寐或ハ
 起居意ニ適セス心中安カラズ微シク振慄惡寒シ後チ
 微熱ヲ發ス其熱有ルガ如ク無キガ如ク全身勞倦懈惰
 シ宛モ大イニ勞動セル後ノ如シ又常ニ神志沉重鬱憂



ヲ兼子頭部困重ヲ苦ミ或ハ頭痛眩暈或ハ惡心ヲ生シ
 或ハ頓ニ飲食ノ味ヲ失シ微渴シテ煩渴ナク好シテ屢
 嘔吐ヲ發ス然レ凡他物ヲ吐スルヲ無ク唯無味ノ粘液
 ヲ吐出スルノミナリ○或ハ時トシテ病苦減シ輕快ヲ
 覺フルヲアリ然レ凡亦速ニ前症ヲ發シ却テ重篤ナル
 ヲアリ其症最七夜間ニ甚シク頭部益困重シ頭旋轉回
 シ熱勢増盛シ脈急數ニシテカナク且ツ軟弱ナリ又呼
 吸不利ノ壓迫シ動モスレハ頭ノ後部麻痺痠痛ニ或ハ
 寒冷ヲ覺ヘ或ハ前頂ノ冠縫ニ重痛ヲ覺フルヲアリ此
 冠縫ト頭後ノ痠痛ハ總テ神經熱ノ徵ニノ是レニ得テ

多クハ謔妄ヲ發ス

○前件ノ諸症稽留スルヲ大抵五六日患者困重慘悽ノ
 状態アリテ較著顯然ノ病症無キガ如ク大イニ平生ニ
 懸絶セル態ナシ然レ凡其人須臾モ安靜ナルヲ能ハズ
 煩躁苦悶志意不樂且ツ惱怒シ晝夜嘗テ眠ルヲナク偶
 或ハ稍眠ルガ如シト雖モ其ハ却テ昏重鬱冒スル者ニ
 シテ決ノ熟睡スルニ非ズ故ニ傍人今少シク眠レリヤ
 ト問エハ患者極テ敢ンゼサルナリ

○其脈七八日ヲ經ルト雖モ依然トノ軟弱ニ且ツ數又
 乍チ急乍チ緩乍チ大乍チ小總テ變動ノ齊一ナラズ或

ハ一瞬時間稍遅緩順正ナル一在リト雖モ復タ忽チ轉
 變シテ急數ニ搏動シテ定則ナシ○此症發熱惡寒有リ
 ト雖モ分明ニ定規ナク或ハ急ニ頰額赤熱シ鼻頭耳尖
 ハ却テ冷エ或ハ額上冷汗出テ或ハ顔面焮衝赤潮ヲ現
 シ成徳案ズルニ是世人ノ四肢ハ甚タ冷ル等此病ノ常
 戴陽症ト云フ者ナリ
 症ナリ

○小便ハ大抵糝淡色ニノ動モスレハ清利シ鹹渣ノ色
 ヲ發シ或ハ變敗ノ麥酒ノ如ク且ツ滓滲ナク或ハ尿雲
成徳云既上下ニ浮遊ノ定所アル一ナシ○舌ハ始メ乾
ニ註ス燥スル一ナク其色變セス或ハ淡白色ノ薄胎有リ後チ

多クハ甚タ乾燥ノ赤色ニ或ハ裂紋ヲ見シ皮面ハ乾枯
 セレ石榴皮ノ如シ此舌ノ狀ハ病ノ最高ニ至リ或ハ終
 期ニ及フト雖モ猶異狀アル一ナシ○咽喉唇口ノ乾燥
 スルニ比スレバ渴ハ却テ少ク時時舌熱ス若シ其甚シ
 キニ及テハ暫時渴スル一有リト雖モ大約ハ渴劇シカ
 ラス

○大抵七八日ニ至テ頭旋轉運且ツ身體ノ困重大イニ
 増盛シ兩耳騷鳴ノ休マズ最モ頭部ノ困重甚シキヲ覺
 フルトキハ次テ譫妄ヲ發ス又胸中ノ壓迫苦悶等漸ク
 増進シ皆眩最モ甚シ然テ頰及ヒ掌心ハ甚熱スト雖モ

額上手背ニハ却テ冷汗ヲ發シ須臾ニ其汗止テ出テズ
此時ニ當テ小便黤淡青白ナル者ハ必ス譫妄ヲ發シ或
ハ臑註前ニ顫振動セントスル徵ナリ

○此證譫妄ヲ發スト雖モ劇盛ナラズ只精神錯誤シ呢
喃ノ語ヲ唱テ休マズ且ツ語勢蹇澁ノ分明ナラズ其精
神ノ錯誤時トメ正意ニ復スルヲ有ルモ頓ニ耄昧昏惑
ス是レ其常ナリ

○病勢ノ最極ニ至ルトキハ舌大イニ乾燥ス殊ニ中央
ノ部位最モ甚シク周邊ハ帶黃色ナリ患者強テ舌ヲ出
セバ甚タ震搖ス若シ舌潤ヒ夥ク痰唾出ル者ハ善徵ト

ス或ハ飲食藥湯燕下シ難ク咽喉梗塞梗塞スル者ハ甚タ危
症ナリ或ハ少シク呃逆ヲ兼ル者ハ最モ危篤トス

○凡ソ九日十日十二日許ニ至テ諸部ヨリ汗多ク漏泄
シ其汗四肢ハ冷テ粘著シ或ハ澆稀ノ大便ヲ下利スル
者アリ此二證ヲ見ハス時ハ患者甚タ羸瘦疲弱ス○若
シ皮膚温ニシテ潤ヒ微汗出ルハ善徵トス又微微ニ下利
ヲ發スルヲアリ大抵其後チ譫妄及ヒ昏睡ノ諸症退ク
ナリ

○身體ノ勢力頓ニ脱ノ沉垂シ四肢冷エ爪甲黤淡或ハ
淺油綠色脈ハ前ニ説クガ如ク順序ヲ失ヒ駢逐震蕩シ


且ツ甚ク弱ニノ急數是レヲ按スルニ辨別シ難ク或ハ
 時時遲緩シ且ツ結代スルヲ有リ或ハ患者全ク知覺ヲ
 失ヒ音響及ヒ燈光モ分明ニ辨知シ難キヲアリ此症ヲ
 發スル者ハ最初ハ却テ音響燈光等ノ通徹スルヲ甚ク
 敏速ニシテ堪ベカラザルガ如ク抵觸ス或ハ精神昏冒
 今一等甚シケレバ全ク昏睡シテ死ニ至ル者モ亦少カ
 ラズ又大小便自利シ覺エス淚流泄シ且ツ總テ血液烱
 解渙崩ノ徵ヲ見ハシ又神經大イニ牽掣シ振振惕惕痲
 痺ノ前徵ノ如キヲ發スル者ハ即チ患者ノ命一線ニ繫
 ル者ナリ此二症ノ如キ大抵十四日或ハ十八日或ハ二

十日自餘或ハ持久スルモ必ス死ス

○大抵此病ハ終末ニ至テハ皆聾ヲ發シ且ツ精神昏聩
 ス其中チ強ク聾スル者ハ最初ハ却テ知覺甚ク敏速ニ
 ノ感觸ニ過キ僅ノ音響ニモ堪ルヲ能ハズ是レ其徵ナ
 リ故ニ感觸ノ甚キモノハ聾モ亦甚シク且ツ精神錯亂
 ス又初ヨリ甚シク睡ル者ハ遂ニ昏睡病ニ陥リ死ヲ恐
 ルニ至ル強テ醒サント欲スレハ亦精神錯亂シ不寐
 ノ症ニ變センヲ恐ルニ至ル又耳聾ノ終リニ至テ
 耳中膿腫ヲ發シ潰膿スル者ハ善候トス又耳腺腺ノ註
前ニ在
 リ膿潰シ或ハ唇鼻ニ大ナル疹疱ヲ發スルモ亦善徵ト

○大凡神經熱ハ遷延數日ニ速ニ治セザルナリ此症從來詳ニ說與スル書ナシ故ニ予今病因症候看法及ヒ病者ノ體質等ニ至ルマデ詳ニ左ニ論ス凡ソ此病ヲ患フル者ハ多クハ神經虛弱體質軟脆血液匱乏淡薄ノ人ナリ是レニ加フルニ大イニ泄液脫損ノ一アリ成徳案スルニ及ヒ泄液脫損ハ五液ヲハ脱シ及ヒ諸失血等ノ一ヲ言フ或ハ生平神志ヲ勞傷シ或ハ安睡セザル一過度或ハ書籍ノ涉獵ニ疲レ或ハ凡百困重ノ勞事ヲ爲シ或ハ生冷不良ノ食物麤惡淡薄ノ諸飲ヲ常用シ或ハ久シク汚穢ノ鬱蒸氣ヲ受テ或ハ吐涎劑

ヲ過用シ或ハ下劑ヲ多服シ或ハ房勞過度等ニ因テ自然ノ勢カヲ缺脱衰弱スル者皆此病ノ源トナル是以テ此症ハ固形質脆弱スル等ヨリ起發ス○治方ハ徐徐ニ諸器諸液ヲ衝動シ粘稠ヲ稀釋シ健運強心ノ藥食ヲ用フベシ○依トト加刺ト的私ト云ク療法ノ的當ヲ得ント欲セハ先ツ其病性ヲ知ルベキナリト今予ガ撰スル所ノ方法其說ニ從テ立ツ最モ熱病ヲ療スル良則ナリ故ニ予カ說ヲ知ラント欲セハ依トト加刺ト的私トノ書ニ就テ考フヘシ猶其病性ノ症候ヲ詳說スル者ハ設ト兒修私トニ若クハナシ其言ニ曰ク諸病ハ其原因ヲ辨知スレハ必ス治



又故ニ其病者ノ自然質ヲ知リ然テ治法ヲ考定ス此自
 然質ヲ研求考定スル一醫ノ一大緊要タリト詳ナル一
 ハ其書ニ就テ考フヘシ○夫レ諸般ノ疾病多端ナリト
 雖モ熱病ノ治法ヨリ緊要ナルハナシ其故ハ其病ム日
 短ク且ツ藥劑モ良効ヲ奏スル一甚タ難キヲ以テナリ
 ○若シ此病ヲ受ル一甚シカラザルモノハ自然ノ運行
 モ順道ニ復シ易ク藥劑モ亦速ニ効ヲ奏ス然レモ初ヨ
 リ劇症ナキガ故ニ病者早ク醫療ヲ施ス一無クシテ慢
 爾トノ時日ヲ經過スルナリ予此症ヲ曆觀スルニ患者
 ノ體質從來衰弱虚乏スル者或ハ諸般ノ脱泄過度ナル

者殊ニ妄リニ刺絡ヲ過度スル者ハ毎ニ的中ノ療法ナ
 シ○又最初ニ下劑ヲ過用シ是レニ因テ精氣脱缺シ昏
 弱虚衰遷延持久シ或ハ危篤ノ諸症ヲ發スル者ヲ見ル
 一多シ是レ誤治ニ屬ス然レモ此症或ハ最初ニ腸胃ヲ
 疏滌スベキノ症アラバ唯和緩ノ吐劑或ハ大黃或ハ刺
 蜜成徳云代用ノノ如キ和緩ノ下劑ヲ用ヒヨ誤テ遽ニ
 強キ下劑ヲ與レハ患者一旦ハ劇劑ニ堪フルガ如シト
 雖モ後チ大イニ悔フル一アリ○又案スルニ凡ソ和緩
 ノ吐劑ハ自然ノ良知能ヲ妨害スル一少フノ其効多ク
 且ツ捷ニシテ下劑ヲ用フルニ遙ニ勝レリ若シ患者惡

心ヲ發シ或ハ心胃ノ部位ニ當テ苦悶壓迫ヲ覺工且ツ腐敗變穢ノ物胃中ニ鬱積畜聚スル諸症ヲ見バ吐劑最モ必要タリ是等ノ症ハ毎ニ熱勢發作ノ時ニ起ルナリ

○自然ノ良知能ヲ以テ大便ノ通利ヲ為スニ足ラザル者ハ牛乳砂糖食鹽等ノ單味ヲ水銃劑ト爲シ二三日ニ一度用フベシ尤モ効アリ

○適宜ノ勢力強キ強心劑ヲ以テ蒸氣ヲ開達スルノ甚夕此症ニ應ス○適宜ノ強壯潤灌ノ飲食ヲ用フルノ緊要ナリ○終リニ至テ血液ノ運行衰頽遲緩スル諸症アルヲ辨知セハ發疱膏ヲ貼スベシ慎テ時ヲ失フノ勿レ

凡テ精密ニ注意シ患者ノ身體ト精神トヲ按察シ務テ安靜ニスルノ肝要タリ若シ身體ヲ勞動煩擾スレハ自然ニ安眠ヲ催スノ無ク患者大ニ衰憊勞倦ス然レモ強キ阿芙蓉劑ヲ用ルノ甚ク害アリ縱令不寐煩躁ストモ慎テ斟酌スベシ○徐徐ニ蒸氣ヲ開發スルノ劑ハ即チ五味根散附錄ニ載スニ少シク加私多樓護代用ノ說附錄ニ載スヲ加ヘ用ヒ或ハ的里亞加精附錄ニ載ス等最モ此症ニ効アリ能ク徐徐ニ汗ヲ發シ蒸氣ヲ開達ス故ニ靈液及ヒ血液ノ騷擾ヲ靜和シ又能ク快眠ヲ催スナリ○若シ精神昏瞶シ沉重殊ニ甚シキ者ハ瓦兒拔奴護名脂或ハ支兒彪護

泰西熱病論 卷三 九 蘭馨堂

樹子ノ名ニ龍腦少許ヲ加工テ用フ又急ニ發疱膏ヲ頭莖頭
 後耳後ニ貼スベシ其貼スルニ當テハ必ス輕稀ノ牛酪
 精ニ蒲桃酒ヲ加工テ多ク飲服セシメ或ハ自餘口ニ適
 フ甘美ノ清涼飲ヲ飲シムベシ其ハ大麥湯ニ和柔ナル
 蒲桃酒少許ヲ加工用ヒヨ是レ即チ清涼飲ナリ○又此
 症ハ熾盛熱酷厲熱等ニ用フルカ如ク飲漿ヲ多服セシ
 ムルハ必要ニ非スト雖モ然レ凡屢飲漿ヲ用フルヲ
 良トス是レニ因テ潤灌渙流ノ運營ヲ全盛スルニ足り
 且ツ徐緩ノ汗ヲ發シ蒸氣ヲ進催シ血中ニ新鮮ノ津液
 ヲ加養ス既ニ精氣ヲ脫失セル敗液酷厲ノ水性アル者

ヲ新陳替更シテ運行ヲ健利ナラシム○此等ノ術ヲ標
 準トシ治ニ處スベシ又稀淡ノ雞肉羹汁ヲ用フルヲ良
 トス是レ食養ノ功有テ且ツ療藥ノ功ヲ扶ク此物最モ
 病勢間靜ニ熱無キニ臨テ用フルヲ良ナリ又鹿角膏沙
 孤米或ハ蒸餅水最モ良ナリ或ハ此物件ニ少ク蒲桃酒
 及ヒ回青橙汁設貯製設
產佳ナリ佛手柑汁等ヲ加フベシ○凡ソ
 此患者ハ徐徐ニ發汗スルヲ善トス其故ハ是レニ因テ
 酷厲液ノ爲ニ發スル所ノ壯熱ト及ヒ血液ノ擾動等ヲ
 靜止スレバナリ慎テ暴大汗ヲ發スルヲ勿レ又強烈熱
 性ノ劑走竄ノ灰汁鹽劑又諸藥精等ヲ用テ發泄スルヲ

勿レ若シ誤テ此等ノ劑ヲ病初或ハ熱ノ増進ノ時ニ當
 テ用フレバ元運ノ靈液ヲ驅散スルガ故ニ精神大イニ
 衰弱シ註前ニ 潤動牽掣シ動モスレバ振振慄慄トノ
 冷粘汗ヲ出シ精神昏聩スルニ至ル或ハ昏睡病ノ如キ
 ニ陥ル一アリ或ハ順序無キ稽留壯熱ヲ發シ或ハ大イ
 ニ下利漏汗尿崩註前ニ 失血等ヲ發シ或ハ苦悶煩燥狂妄
 シ且ツ呼吸促迫シ胸中壓迫等ノ危症ニ至ル一アリ此
 時ニ當テ密ニ診察セザレハ誤リ認テ又肺焮衝熱トス
 ル一アリ然レ一心ヲ用テ細察スレバ始メヨリ焮衝熱
 ノ刺絡スベキが如キ症ニ非ル一ハ自ラ分明ナリ其故

ハ脈疾數ナリト雖モ最モ弱小ニノ定準ナク小便清利
 ノ水ノ如シ假令胸中苦悶シ壓迫煩燥等ノ症アルモ是
 レ其部ノ神經ノ抑鬱困迫ニ因テ發スルナレバ肺閉塞
 シテ焮衝熱ヲ發スル類ニ異ナリ又呼吸促迫モ熱勢ニ
 因ル者ニ非ズ唯呻吟ノ狀ヲ爲シ或ハ呃スルガ如キ狀
 アリ又咳嗽ヲ兼ル一無シ成德案ズルニ咳嗽ヲ兼
 此症ノ促迫ハ痙攣ノ一種ナルナリ婦人ノ子宮衝逆發
 作ノ時ニ此促迫ヲ患フル一アリ類シテ知ルベシ
 ○藥ハ強神經劑強心劑ヲ與フ又發疱膏ヲ腿脚或ハ腕
 ニ貼スベシ左ノ方ヲ撰用セヨ



洎夫藍滌

五味根散

二分四釐
附錄ニ載ス

洎夫藍

五釐
附錄ニ載ス

扶羸糕子

三分五釐
附錄ニ載ス

洎夫藍舍利別

適五
附錄ニ載ス

右調勻シ滌ト爲ス若シ健

註前ニ在リ

大イニ顫動振戰掣

瘵スル者ハ麝香一分六釐ヲ以テ五味根散ニ代フ尤

モ良ナリ

鹿角飲

鹿角鹽

一分五釐
附錄ニ載ス

佛手柑汁

三錢

消厲露

十二錢
附錄ニ載ス

右調勻シ火ニ上七煎煉ノ後藥ヲ加フ

刺賢埴兒精

附錄ニ載ス

洎夫藍舍利別

各一錢五分
附錄ニ載ス

右調勻ノ飲トス

此劑ヲ五時

成徳案スルニ本邦ノ二時
半ナリ下文是レニ倣ヘ

或ハ六時八時毎

ニ用フ又間ニ乘シテ強心清涼飲

附錄ニ載ス

ヲ用フヘシ又

揮發精

附錄ニ載ス

ヲ輕清ノ蒲桃酒或ハ菓醬

附錄ニ載ス

ノ淡稀

ナルモノニ和シ用フルヲ尤モ良ナリ或ハ患者ノ嗜好

ニ從テ白芥子ノ稀煎ニテ送下スベシ此劑高價ニ非ル

ヲ以テ輕蔑スルヲ勿レ甚タ効アリ○此等ノ藥劑ニ因

テ脈絡ノ弛弱徐徐ニ復旺シ搏動充張ノ勢再ヒ揮發シ

血液稀解潤渙スル時ハ從テ快爽ノ汗ヲ發シ痙攣拘急

ノ運動頓ニ消除スルヲアリ予屢用ヒテ屢功ヲ得ル所

ナリ○前件ノ如ク飲中ニ鹽類ヲ調和スルハ皮膚ノ汗孔ヲ開發センガ爲ナリ故ニ白蒿鹽ヲ調和シ用フレバ發汗ヲ進メ且ツ小便ヲ通ズル功アリ白蒿鹽ヲ調和スル劑ハ附録ニ載スル神飲ノ類ナリ○按スルニ前ノ飲ハ肺ノ擧急ヨリ發スル喘急ノ諸症ニ用イテ屢驗アリ因テ其藥性ヲ辨知スベシ○上件ノ藥劑ヲ用イテ猶胸中悶壓呼吸促迫ヲ生ズル者多シ大抵七日或ハ九日或ハ十一日或ハ其餘ヲ歷テ粟疹ヲ發スル者多シ總テ諸般ノ熱病胸中苦悶壓迫ノ甚キ者ハ必ス疹疱ヲ發スル徵トス此時ニ當テ刺絡ヲ施スハ誤ナリ勉メテ自然精氣ノ作用ヲ扶テ速ニ病毒

ヲ排出スルヲ要トス故ニ驅逐ヲ扶クルニ緩和ノ強心劑附録ニ載ス又對症ノ潤灌劑成徳云方ハ第一卷等ヲ用ヒ

或ハ的里亞加安獨魯麻支私或ハ龍藍酸附録ニ載スヲ兼用スベシ此等ノ方ハ諸症ノ患苦ヲ減ズルノミナラス蒸

氣ヲ開達シ徐徐ニ汗ヲ發シ粟疹ヲ快發ス○此症ニ和汗ハ良シ烈汗ハ惡シ假令疹疱ヲ發スルモ烈汗ニ因テ

得ル者ハ善徵ト爲シ難シ予嘗テ經驗スルニ粟疹ヲ發スル時ニ當テ烈汗シテ止マザレハ患者聊輕快ヲ覺フ

ルヲナク其症却テ險惡ニ進ミ遂ニ衰弱ノ極ニ歸スルヲ見ル○又按スルニ發汗スルハ本來病毒ヲ排出セ

泰西熱病論 卷三 一四

ンガ爲ナリ然ルヲ強ク發汗スルトキハ却テ病勢ヲ増
 シ疹疱ヲ發ス是レ皮中ノ粟樣腺腫起シ疹疱ト爲ルガ
 故ナリ今無病ノ人ト雖モ烈汗ニ因テハ皆汗疹ヲ發ス
 ルガ如シ○上件ノ誤治ニ因テ消耗衰脫スル者ハ醇好
 ノ赤蒲桃酒ヲ微微トシテ用フ甚タ効アリ是レ速ニ汗
 ヲ止メ患者ヲ強壯ニス此法又暹田封古成德案スルニ
 是レ暹思中ノ
一種ニシテ赤疱
 ヲ發スル者ナリヲ兼發スル者ヲ消除ス○設兒修私曰
 ク澁瀋ノ蒲桃酒ハ加兒細亞屈私ニ大効アリト予按ス
 ルニ此カハ兒細亞屈私ハ遷延神經熱ニ消耗汗ヲ兼スル
 者ナリ○熱退ク時ニ當テ暴汗シ衰弱ニ至ル者ハ必ス

機那准ニ泊夫藍肝兒宜尼亞安設私蘭瓦屋兒的兒代用
 ノ

附錄ニ
 載ス
 ヲ加用ス又時時大黃少許ヲ以テ腸胃中ニ滯積

スル穢物ヲ通利スヘシ○神經熱ノ退ントスル時ニ臨
 ニテ熱ノ往來アルト間歇熱ノ狀ノ如クニシテ定期ア
 ル者ハ甚タ善徵トス特ニ機那機那劑ヲ用フベシ又白
 蒿鹽佛手柑汁ヲ調和スル飲劑最モ効アリ○予嘗テ經
 驗スルニ大抵上件ノ症ノ如クナル者ハ其病久シク稽
 留スルトナシ然レ凡粟疹ヲ兼發スル者ハ遷延稽留ノ
 危懼ノ諸症ヲ發スルナリ○此症ノ衰弱スル者ヲ驗ス
 ル三四十日ノ後醫猶延延トメ發汗法ヲ施シ因テ粟疹



ヲ發ス粟疹ヲ發スル一三四回ノ後子遂ニ精氣脫衰シ
消耗渙崩ニ歸スル者ヲ見ル

○終ニ至テ微シク下利ヲ發スルハ大イニ善シ然レモ
不化ノ稀液ヲ下ス者ハ甚タ害アリ是レ脫衰ニ至ル候

ナレバナリ便色京ムテサキ淺青蓮ウツテ下モ或ハ淺油綠ニノ駛瀉スル者ハ

最モ惡徵ナリ又水瀉モナク口舌ニ鷲口瘡成徳云鷲口

腐敗熱篇ニ註ス併セ見ルベシ春ノ善惡ハヲ生スル一モナク痰唾ヲ快吐スル者

ハ善候トス又其他皮膚ニ津潤ヲ生スル者ハ患者身體

衰弱シ精神昏曠スル等ノ一無シ假令有リト雖モ不治

ノ症ニハ非ルナリ○又耳聾スル者終リニ至テ聾少シ

ク通徹シ諸部徐徐ニ復故スル者ハ死亡ヲ免ル、候ナ

リ

○凡ソ甚シキ脫泄ヲ兼ル者ハ專ラ意ヲ飲食ニ用テ強

壯潤灌ニスル物品ヲ與フルヲ一大要トス是レニ因テ

精神ヲ健運シ耗減ノ津液ヲ満足シ殘餘ノ血液ヲ修補

ス又患者知覺ヲ失ヒ精神萎靡スル等モ亦此法ニ因テ

能ク回復ス是レ固ヨリ藥劑ヲ用フルヨリハ滋養ノ力

ハ勝レルヲ以テナリ

○此症ハ自然ノ良知能ヲ以テ病毒ヲ排出スル一足ラ

ナルカ故ニ此ノ如キ許多ノ諸症在苒トノ稽留スルナ

リ

リ○又小便ハ熟化スルナク成徳云尿ノ熟不熟ハ予カ譯スル所ノ斐カ五

診精要ニ詳ナリ不熟尿其因四アリ一曰人身自然ノ

溫氣ノ衰弱スルニ因ルニ曰尿ヲ化熟スル道路ノ閉

塞スルニ因ルニ曰尿中ニ入ルベキ各種ノ諸液ノ他

部ヨク漏泄スルニ因ルニ曰水漿ヲ過飲シ頓ニ衝瀉

スルニ因ルト然レ凡病ニ因テ又善惡可否ノ

別アリ其詳ナルヲハ本篇ニ就テ考究セヨ

稀薄ナリ又夥ク通利スルナク有リ或ハ病劇發ノ後チ或

ハ發汗ノ後チ便色濃赤色ニ變ズルナリ然レ凡進滓

ナク其量少フメ多クハ粘意アリ○蓋シ遷延神經熱ノ

原因ハ全軀血液ノ運行大イニ遲緩シ活動ノ勢力衰脱

シ其血液恰モ水ノ如ク其性最モ酷厲ヲ成シ遂ニ滯積

ノ此病ヲ發ス因テ按スルニ此時ニ當テ鹹渣ハ熱ノ爲

ニ凝結セラレ稀釋順流シテ生活ノ常資ニ供スルナク能

ハズ遂ニ酷厲腐敗ノ性ヲ成ス水液モ亦粘稠トナリ留

積ノ流レズ漸ク腐敗シ敝穢惡臭ノ液ト爲ル然ルヲ今

人身自然ノ良知能ヲ以テ其敗液ヲ體中ノ常道ヨリ驅

逐セントシテ汗孔ハ汗ヲ漏シ唾管ハ唾ヲ出ス然テ其


驅逐ノ常道ハ各部ニ在リト雖モ大小便道ハ最モ大イ

ナル處ナリ○上件ノ如ク自然ノ驅逐ニ因テ下利スル

者ハ其勢夥多ナリト雖モ遽ニ閉止スルナク勿レ若シ急

ニ閉止スルトキハ病毒他ノ險路ニ轉移シ更ニ一種ノ

惡症ノ下利ヲ發ス又急ニ汗ヲ閉澁スレハ其害必ス播



搦寧急振搖胸中苦悶昏眩等ヲ發ス此レヲ例スルニ小便ノ過泄ヲ防止セントシテ強ク澁瀉劑ヲ用フレハ惡心胃痛腸疼精神錯亂等ヲ發スルニ同シ○芫菁膏ヲ貼ノ發疱スルニ其疱處ヲ遠ニ乾癢スベカラス貼處ヨリ稀水出ルヲ愈多ケレハ其功ヲ取ルヲ愈多キガ故ナリ或ハ疱處膿潰スルモ極メテ惡候ニ非ス其故ハ總テ膏性ハ酷厲ナルガ故ニ此レヲ貼スル時ハ人身ノ勢力其酷厲ニ堪ヘス相抵抗シ頓ニ排斥セントノ急ニ膿ヲ釀シテ汁液ヲ驅泄ス其驅泄スル者ハ即チ膏ノ酷厲毒ト病毒トナレバナリ是以テ精氣大イニ缺損スル者ハ抵

抗ノ勢ナキガ故ニ排斥ノ力無ク膿潰スル等ノヲナキナリ凡ソ發疱膏ハ一回施シテ乾癢スルヲアラバ又別處ニ貼スベシ是レ發疱ノ用ハ膏ニ血液ノ澁滯ヲ發發運進スルノミナラス其流出ノ膿水ヨリ病毒ヲ泄除セシガ爲メナレバナリ○患者自然ニ大イナル腫疱ヲ發シ其後チ熱愈増盛シ其疱或ハ速ニ膿潰スル者ハ良兆ナリ是レヲ自然良知能ノ發疱トス

○諸般ノ通泄自然ニ過度ナル者ハ精密ニ診鑑ノ適宜ニ防止スベシ頓ニ閉澁メ内攻潜伏セシムルヲ勿レ故ニ冷氣冷衣冷食冷飲等ヲ禁スベシ然レモ熱性ノ強心

劑走竄ノ灰汁鹽等ヲ用ヒ及ヒ熱蒸ノ氣ニ因テ發汗ヲ
 求ル等ハ皆錯誤ニ屬ス唯其病治セサルノミナラス却
 テ焯解渙崩ノ危ニ至ルナリ○或ハ患者夥シク粟疹ヲ
 發シ其色或ハ白ク或ハ赤キハ是レ病毒過多ニ係ルト
 雖モ多クハ醫ノ誤治ニ因テ發ス

○予世醫ノ痘瘡ヲ療スルヲ見ルニ熱性ノ食料ニ因テ
 大汗ヲ發シ能ク其功ヲ終ルナキヲ見ル其故ハ痘瘡
 ノ病毒ハ排出ヲ求ルニ熱病ヨリハ尤モ甚シ然ルヲ此
 徐汗ノ法ニ依ラザルハ其不可ナルニ必セリ是以テ究
 理ノ明哲痘瘡疹ヲ療スルニ暴大汗ニ因テ發促スル

ハ未タ曾テアラザルナリ

○粟疹熱遷延神經熱ヲ療スルニ熱性ノ發汗劑熱性ノ
 飲食等ヲ用テ開達スルトキハ多クハ患者ヲシテ死地
 ニ至ラシム前件ノ方法論說ヲ見テ辨知スヘシ○案ス
 ルニ粟疹熱遷延神經熱等ヲ能ク治スルニナキ者ハ總
 テ醫タル者人身自然ノ良知能ノ嗜好ヲ領解シテ精氣
 ノ衰弱ヲ救援セザルニ因ル凡ソ病ヲ療スルニハ國家
 ヲ治ムルト一般ナリ精氣病毒ヲ驅ルニ足ラザル者ハ
 藥劑ヲ以テ是ヲ揚進シ驅逐ノ勢殊ニ劇烈ナルハ方法
 ヲ以テ是レヲ抑制ス又非常ノ病ニ非常ノ排泄アルヲ

妨止スル_レカレ其排泄ノ順序有テ間斷無ク來_ラハ藥
ヲ以テ阻遏シテ自然排泄ノ順路ヲ失ハシムル_レカレ
最モ左右シテ催起セヨ譬ハ熱病ノ下利甚シキ者は是レ
ヲ防制スルニ的_テ里亞加安獨魯麻支私_カ及ヒ緩和強心ノ
劑附錄ニ數方ヲ載ス等ヲ以テ治スルカ如シ此レ病毒ノ腸中ヲ
刺動攻衝スルヲ防制シ且ツ蒸氣ヲ催進シ下利ヲ止レ
ハナリ故ニ緩潤ノ汗ハ常ニ良法ト爲ス○是以テ強キ
澁瀉劑ヲ以テ一頓ニ閉止スレハ自然順導ノ勉力ニ戾
テ毎ニ排出ノ道ヲ隔絶ス○遷延神經熱ノ事件ヲ詳ニ
説ク者ハ利加兒獨滿寧瓦護名ナリ精詳ヲ求メントナ

ラバ其書ニ就テ研究セヨ

泰西熱病論

卷三

三十一

蘭馨堂藏

泰西熱病論卷三

