


仿宋書

本草從新

吳儀洛先生編

上海文海圖書局印



海上文局印行

凡例

一 註本草者當先註明其所以主治之由與所以當用之理使讀之者有義味
可咀嚼也茲集藥性病情互相闡發庶便資用若每處皆釋則重複煩瑣反
生故前後間見或因藥論辨讀者彙觀而統會之可

一 上自神農本草經以至李氏綱目俱遞有收載自綱目以後收載絕少如燕
窩之類用治甚多從前俱爲失收茲集俱爲增入

一 藥品主治諸家析言者少統言者多如治痰之藥有治濕痰者有治燥痰者
諸書第以治痰概之頭痛之藥有治內傷頭痛者有治外感頭痛者諸書唯
言治頭痛而已此皆相反之證未可混施舉此二端其餘可以類推矣又祇
言某病宜用而不言某病忌用均屬闕略茲集並加詳註庶無貽誤

一 自古本草以及近今本草俱有是名而今並無是藥者如預知子之類俱爲

刪去

一 每藥先辨其氣味形色次著其所入經絡乃爲發明其功用而以主治之證
具列於後其所以主治之理卽在前功用之中不能逐款細註讀者詳之

一 徐之才曰藥有宣（上升下行曰宣）通補瀉濇滑燥濕（卽潤也）輕重十種是藥之大體而本經不言後人未述凡用藥者審而詳之則靡所失遺矣今爲分闡以標於本藥之上（此十劑也陶隱居多寒熱二劑茲不具述茲本集燥劑卽陶氏之熱也而通劑乃徐氏之燥劑也）

一 藥品主治已註明某臟腑者則不更言入某經絡以重複無用也

一 陰陽升降浮沉已詳於藥性總義中故每品之下不加重註

一 採用諸書悉標其名氏使知爲先哲名言有可考據也間有刪節數行數句者以限於尺幅也有增改數句數字者務暢其文義也其間廣搜博採義圖貫通取要刪繁詞歸雅飭庶幾爽觀者之心目云爾

一 凡假藥不可不辨如花草子僞沙苑蒺藜香欒僞枳實枳殼之類始則以僞亂真漸至真者絕少數百年來從無一人起而指摘之者此類甚多茲集俱正其誤

一 同是藥名而力量厚薄懸殊性味優劣迥別如野白朮與種白朮并江西白朮之類至肉桂中洋桂黃連中新山連更害人之尤也茲集俱細爲分別一本藥而雜別種在內用之卽不能取效如肆中柴胡夾雜白頭翁小前胡遠

志苗丹參等於內不細爲棟去不唯無益而反有害矣斷不可不正之
一 藥品修治必須如法今肆中熟地黃用煮菟絲餅加麵之類製治乖方斷不可用俱爲正之

一 凡可以救荒者收載稍繁以其有裨於生成之實用也

一 養生與治病食物之宜否闢繫非細故收載不厭其繁

原序

余先世藏書最夥凡有益於民用者購之尤急以故岐黃家言亦多海內希見之本余自髫年習制舉業時即旁覽及焉遇有會意輒覺神情開滌於是盡發所藏而精繹之迄今四十年矣夫醫學之要莫先於明理其次則在辨證其次則在用藥理不明證於何辨證不辨藥於何用故拙著醫書十種其一曰一源必徹其二曰四診須詳於經義病情必斟酌羣言而期於至當也而又念天之生藥凡以濟斯人之疾苦者也有一病必有一藥病千變藥亦千變能精悉其氣味則千百藥中任舉一二種用之且通神明不然則岐多而用眩凡藥皆可以傷人況於性最偏駁者乎自來註本草者古經以下代有增訂而李氏綱目爲集大成其徵據該洽良足補爾雅詩疏之缺而以備醫學之用或病其稍繁踵之者有繆氏之經疏不特著藥性之功能且兼言其過劣其中多所發明而西昌喻嘉言頗有異議最後新安汪氏祖述二書著備要一編卷帙不繁而采輯甚重宜其爲近今膾炙之書也獨惜其本非岐黃家不臨證而專信前人雜採諸說無所折衷未免有承誤之失余不揣固陋取其書重訂之因仍者半增

改者半旁搜舊文參以涉歷以擴未盡之宣書成名曰本草從新付之剞劂庶幾切於時用而堪告之古人矣乎其餘數種當次第刊布與有識者商之

乾隆丁丑歲三月上巳日漱水吳儀洛遵程書於陝川之利濟堂

校正本草從新總目

卷一 草部

人參

黃精

黨參

土人參

西洋人參

北沙參

空沙參

甘草

黃精

萎蕤

黃蓍

野白朮

種白朮

蒼朮

桔梗

天麻

秦艽

柴胡

前胡

獨活

羌活

防風

升麻

細辛

遠志

金狗狗脊

溼羊藿

巴戟天

瑣陽

肉荳蓉

白芨

三七

地榆

丹參

元參

苦參

龍胆草

黃連

胡黃連

黃芩

紫草

知母

貝母

白頭翁

白前

白微

白茅根

白鮮皮

延胡索

落得打

開金鎖

冬蟲夏草

錦地羅

水仙根

(山草類五十四種)

卷二 草部

當歸

白芍藥

芎藭

牡丹皮

澤蘭

馬蘭

鬱金

薑黃

蓬我蓬

荆三棱

香附

木香

砂仁

白豆蔻

草豆蔻

草果

肉豆蔻

破故紙

益智子

蛇牀子

華芨

良薑

藿香

白芷

藁本

香薷

荆芥

紫蘇

雞蘇

薄荷

甘松香

山奈

嫋酣草

茉莉花

(芳草類三十四種)

卷三 草部

生地黃

乾地黃

熟地黃

鱠腸

麥門冬

甘鞠花

穀精草

草決明

決明子

木賊草

麻黃

刺蒺藜

沙苑蒺藜

茺蔚

夏枯草

青蒿

連翹

紫花地丁

漏盧

惡實

大小薌

馬鞭草

劉寄奴

紅花

王不留行

瞿麥

萹蓄

車前子

燈芯

地膚子

冬葵子

海金沙

茵陳

葶藶子

大青

青黛

蘆根

豨莶草

旋覆花

紫菀

款冬花

牛膝

續斷

胡蘆巴

艾葉

木棉

鷄冠花

元寶草

雪裏青

萬年青

白米飯草

淡竹葉

耆實

箬

芭蕉根

苧麻根

萱草

石龍芮

狗尾草

敗醬

薇銜

蠡實

石龍芻

酸漿

鼠麴草

(隰草類六十五種)

卷四 草部

附子

草烏頭

白附子

天南星

半夏

常山

藜蘆

大戟

甘遂

商陸

莞花

續隨子

牽牛

蓖麻子

貫衆

射干

蚤休

玉簪

大黃

蘭茹

天名精

山慈姑

茵芋

莽草

仙茅

莫耳

木鼈子

鳳仙子

土連翹

煙

(毒草類三十種)

卷五 草部

何首烏

菟絲子

覆盆子

五味子

天門冬

百部

馬兜鈴

括蔞仁

天花粉

王瓜

白蘃

山豆根

金銀花

薔薇根

土茯苓

草薢

防己

木通

通草

天仙藤

葛根

茜草

紫威花

威靈仙

鉤藤鈎

使君子

雀梅葉

(蔓草類二十八種)

卷六 草部

澤瀉

石菖蒲

蒲黃

水萍

海棠

海帶

昆布

(水草類七種)

石斛

骨碎補

石葦

金星

景天

地錦

(石草類六種)

海苔

卷柏

馬勃

(苔類三種)

卷七 木部

柏子仁

側柏葉

松脂

杉材

肉桂

桂心

桂枝

辛夷

沉香

丁香

白檀香

紫檀香

降真香

烏藥

乳香

沒藥

血竭

楓香脂

安息香

蘇合香

龍腦香

樟腦

阿魏

蘆薈

胡桐淚

(香木類二十五種)

卷八 木部

黃柏

槐實

苦棟子

秦皮

樗根白皮

櫟櫚

沒石子

訶黎勒

厚朴

皂莢

皂莢刺

肥皂莢

水楊枝葉

西河柳葉

榆白皮

海桐皮

杜仲

蕪荑

烏柏木根皮

蘇木

乾漆

大風子

巴豆

(喬木類二十四種)

卷九 木部

桑根白皮

乾桑枝

乾桑葉

乾桑椹

楮實

枳實枳殼

梔子

酸棗仁

蕤仁

山茱萸

金櫻子

郁李仁

女貞子

五加皮

枸杞子

地骨皮

石楠葉

蔓荆子

木槿

木芙蓉

狗骨

南燭

枸橘葉

山茶花

密蒙花

八角金盤

柞木

荆瀨

(灌木類二十八種)

竹瀝

竹茹

竹葉

天竹黃

(苞木類四種)

琥珀

茯苓

茯神

豬苓

雷丸

桑寄生

(寓木類六種)

卷十 果部

杏仁

巴旦杏仁

烏梅

桃仁

栗子

大棗

(五果類六種)

柿

梨

木瓜

山楂

橘皮

青皮

香櫞

香欒

花紅

枇杷葉

楊梅

石榴皮

銀杏

胡桃

榛

(山果類十五種)

荔枝核

龍眼肉

橄欖

榧子

海松子

檳榔

大腹皮

枳椇子

落花生

(夷果類九種)

川椒

秦椒

胡椒

吳茱萸

白沙糖

紫沙糖

(味果類五種)

瓜蒂

西瓜

甘蔗

藕節

荷葉

(蓏類五種)

蓮子

西葫

蓮蕊鬚

慈姑

藕

蕷

蓬

芡實

荸薺

慈姑

(水果類十種)

卷十一 菜部

韭

葱白

薤

大蒜

薹薹

白芥子

蔓菁子

萊菔子

生薹

薹汁

薹皮

煨薹

乾薑

黑薑

胡荽

大茴香

小茴香

胡蘿蔔

水芹

旱芹

蓬蒿菜

白菜

(草辛類二十三種)

菠菜

薺菜

莧菜

馬齒莧

生菜

萐苣

蒲公英

翹搖

蓴菜

羊蹄

藜菜

黃瓜菜

魚醒菜

蕨

芋

土芋

山藥

甘薯

百合

竹筍

(柔骨二十種)

茄子

壺盧

冬瓜

南瓜

越瓜

胡瓜

絲瓜

(蔬菜類七種)

茭白

紫菜

海粉

石花菜

龍鬚菜

(水菜類五種)

木耳

香蕈

磨菰草

雞縱

(芝栢類四種)

卷十二

穀部

胡麻

大麻仁

小麥

浮小麥

大麥

擴麥

蕎麥

野麥

糯米

粳米

黍

梁

(麻脈稻類十一種)

稷

黍

粱

粟

秫

穄子

蜀黍

玉蜀黍

秈米

穉

蓬草

茴草米

篩草子

稗

薏苡仁

御米穀

(穢粟類十六種)

黑大豆

黃大豆

白豆

赤小豆

綠豆

豌豆

蠶豆

豇豆

白蘿豆

稽豆

刀豆

黎豆

(菽豆類十二種)

淡豆豉

大豆黃卷

豆腐

陳廩米

粥

蒸餅

麵筋

麥粉

神麴

紅麴

麥蘖

穀芽

飴糖

醬

醋

酒

(造釀類十六種)

卷十三 金石部

金

自然銅

銅青

鉛丹

蜜陀僧

古文錢

鐵

(金類八種)

雲母

白石英

紫石英

(玉類三種)

硃砂

水銀

輕粉

銀硃

雄黃

石膏

滑石

赤石脂

爐甘石

無名異

鍾乳

石炭

石灰

海石

陽起石

慈石

代赭石

空青

石膽

礬石

砒石

青礞石

花蕊石

石燕

石蟹

(石類二十六種)

食鹽

戎鹽

凝水石

元精石

朴硝芒硝

光明粉

硇砂

硼砂

石硫黃

白礬

綠礬

硝石

(硇石類十二種)

卷十四 水部

立春雨水二節內水

驚蟄春分清明穀雨四節內水

小滿水

梅雨水

重午日午時水

神水 立秋處暑白露秋分四節內水

寒露水

霜降水

液雨水

大雪冬至小寒大寒及臘日水

明水

露水

霜

臘雪

冰

(天水類十六種)

潦水

半天河水

流水

井泉水

醴泉

玉井水

乳穴水

溫泉

阿井水

山巖泉水

海水 地漿

百沸湯

生熟湯

蘆水

餽氣水

銅壺滴漏水

(地水類十七種)

卷十五 火土部

桑柴火 炭火

蘆火竹火

燈火

燈花

艾火

神鍼火

火鍼

燧火

陽火陰火

(火類十種)

白堊

黃土

伏龍肝

東壁土

墨

釜臍墨

百草霜

梁上塵

鹹

孩兒茶

(土類十種)

卷十六 禽獸部

燕窩

石燕

夜明砂

五靈脂

雀

雀卵

白丁香

鴿

雞

烏骨雞

雉

(原禽類十一種)

白鶴血

鵝鴨油

鵝

鳬

鷓鷉

鷺鷥

(水禽類七種)

斑鳩

鵠

(林禽類二種)

豬

狗

牛

牛黃

黃明膠

阿膠

驢溺

白馬溺

(畜類九種)

虎骨

象皮

犀角

熊膽

羚羊角

鹿茸

鹿角

麋茸麋角

麝香

貓胞

豬獾

兔屎

獺肝

腽肭臍

(獸類十五種)

猴鼠矢

猾皮

(鼠類二種)

卷十七 蟲魚鱗介部

桑蟲

蟬蛻

蠅蛆

麻蟲

蟲蟲

(他生類五種)

蜂蜜

露房蜂

蟲白蠟

五倍子

桑螵蛸

白殼蟲

原蠶砂

斑貓

蠍

水蛭

糞蛆

(卵生類十一種)

蟾蜍

田雞

蜈蚣

白頸蚯蚓

(濕生類四種)

鯉魚

鰐魚

鯊魚

青魚膽

勒魚

白魚

鱸魚

鰐魚

鰐魚

嘉魚

鯧魚

金魚

(有鱗類十八種)

鰆魚

鰈殘魚

鮋魚

鱠魚

海螵蛸

海蛇

鰓魚

鰐鱗魚

鱈魚

鱠魚

帶魚

鯊魚翅

鱈魚

海鰓魚

海馬

河豚

蛇蛻

蛇膽

鰆魚

鰐鱗魚

海參

(無鱗類十五種)

龍齒

鰆鯉

蛤蚧

(龍類四種)

蛇蛻

蛇膽

白花蛇

烏梢蛇

(蛇類四種)

蛇蛻

蛇膽

蟹

(龜鼈類三種)

牡蠣

蛤粉

蚌粉

蜆粉蜆肉

真珠

石決明

螺

螺

螺

田螺

海螄

石決明

吐鐵

魁蛤

淡菜

利殼片

(蛤蚌類十六種)

江珧柱

西施舌

卷十八 人部

髮

牙齒

人中黃

金汁

人中白

童便

秋石

乳汁

月水

口津唾

人氣

初生臍帶

人胞

人骨

本草從新

藥性總義

凡酸屬木入肝苦屬火入心甘屬土入脾辛屬金入肺鹹屬水入腎此五味之義也。凡青屬木入肝赤屬火入心黃屬土入脾白屬金入肺黑屬水入腎此五色之義也。凡酸者能澗能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能下能妥
音堅淡者能利竅能滲泄此五味之用也。

凡寒熱溫涼氣也酸苦甘辛鹹淡味也氣爲陽味爲陰

氣無形而升故爲陽
味有質而降故爲陰

氣厚者爲

純陽薄爲陽中之陰味厚者爲純陰薄爲陰中之陽氣薄則發泄厚則發熱

陽氣上行故氣薄者能通利

辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰

同涌泄爲陰

辛散甘緩故發肌表
收苦澗故爲吐竊

鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽重濁沉降爲陰清陽出下竅

本平地者魄下下

謂耳目口鼻

二謂前後二陰

清陽發腠理

於皮膚故清陽發之

謂上上數七竅濁陰出下竅

本平地者魄下下

謂耳目口鼻

二謂前後二陰

清陽發腠理

於皮膚故清陽發之

六腑傳化水穀

陰受氣於五臟故濁降走之清陽實四肢

四肢爲諸陽之本

本故清陽實之

濁陰歸六腑

六腑傳化水穀故濁陰歸之

此陰陽之義也

凡輕虛者浮而升重實者沉而降味薄者升而生

春氣薄者降而收

凡氣厚者浮而升味厚氣薄者沉而降

秋氣厚者浮而升

味厚氣薄者沉而降

冬氣平者化而成

氣厚者浮而升味厚氣薄者沉而降

氣味俱厚者能浮能沉氣味俱薄者可升可降酸鹹無升辛甘無降寒無浮熱無沉

此升降浮沉之義也

李時珍曰升者引之以鹹寒則沉而直達下焦沉者引之以酒則浮而上至頭項一物之中有根升梢降生升熟降者是升降在物亦在人也○凡根之在土中者

半身以上則上升半身以下則下降難一藥而根梢各別用之或差服亦因效耳

凡質之輕者上入心肺重者下入肝腎中空者發表內實者攻裏爲枝者達四肢爲皮者達皮膚爲心幹者內行臟腑枯燥者入氣分潤澤者入血分此上下內外各以其類相從也

凡色青味酸氣臊

臊爲木氣所化

性屬木者皆入足厥陰肝足少陽膽經

肝與膽相表裏

甲木

肝與膽相表裏

乙木

氣所化

色赤味苦氣焦

焦爲火氣所化

性屬陰主血諸藥入厥陰血火者皆入手少陰心手太陽小腸

肝與膽相表裏

丙木

肝與膽相表裏

丁木

肝與膽相表裏

戊木

經心與小腸相表裏腸爲丙火心爲丁火

火氣所化

性屬陰主血諸藥入厥陰血火者皆入手少陰心手太陽小腸

肝與膽相表裏

己木

火氣所化

色黃味甘氣香

香爲土氣所化

性屬土者皆入足太陰脾足陽明胃經

脾與胃相表裏

庚木

脾與胃相表裏

辛木

色白味辛氣腥

腥爲金氣所化

性屬金者皆入手太陰肺手陽明大腸經

肺與大腸相表裏

壬木

金氣所化

色黑味鹹氣腐

腐爲水氣所化

性屬水者皆入足少陰腎足太陽膀胱經

腎與膀胱相表裏

癸水

水氣所化

十二經中惟手厥陰心包絡手少陽三

三焦經

庚子

焦經無所主其經通於足厥陰少陽氣分者併入心包絡少陽主氣諸藥入膽經氣

膽經

辛丑

氣所化

分者併入三焦命門相火散行於膽三焦心包絡故入命門者併入三焦此諸經之部分也

人之五臟應五行。金木水火土。子母相生經曰虛則補其母。實則瀉其子。又曰子能令母實。如腎爲肝母。心爲肝子。故入肝者併入腎與心。肝爲心母。脾爲心子。故入心者併入肝與脾。心爲脾母。肺爲脾子。故入脾者併入心與肺。脾爲肺母。腎爲肺子。故入肺者併入脾與腎。肺爲腎母。肝爲腎子。故入腎者併入肺與肝。此五行相生子母相應之義也。

凡藥各有形性氣質。其入諸經。有因形相類者。如連翹似心而入心。荔枝核似睾丸而入腎之類。有因性相從者。如潤滑者走血。分燥者入氣。分本乎天者。觀上本乎地者。觀下之義。有因氣相求者。如黃柏知母破紙胡桃之類。有因質相同者。如香氣入脾氣。焦入心之類。有因性相從者。如頭入頭幹。身枝入肢皮行。

似皮又如紅花蘇木汁似血而入血花之類

自然之理。可以意得也。

有相須者。同類而不可離也。如黃柏知母破紙胡桃之類。爲使者。我之佐使也。惡者。奪我之能也。畏者。受彼之制也。反者。兩不相合也。殺者。制彼之毒也。此異同之義也。

肝苦急。急食甘以緩之。

肝爲將軍之官。其志怒。其氣急。急則自傷。反爲所苦。故宜食甘以緩之。則急者可平。柔能制剛也。

肝欲散。急食辛以散之。以辛補之。以酸瀉之。

木不宜鬱。故欲以辛散之。順其性者爲補。逆其性者爲瀉。

性者爲瀉。肝喜散而惡收。故辛爲補。而酸爲瀉。

心欲耎。急食鹹以耎之。用鹹補之。以甘瀉之。

心藏神。其志喜。喜則氣緩而心虛。神虛故宜食酸以收之也。

心欲耎。急食酸以收之也。

脾欲溼。急食苦以燥之。

脾以運化水濕。制水爲事。濕勝故以鹹爲補。心苦緩。故以甘緩爲瀉也。

脾貴充和。溫厚其性。欲緩故宜食甘以緩之。

肺苦欲緩急。食甘以緩之。用苦瀉之。以甘補之。

肺以運化水濕。制水爲事。濕勝則反。傷脾土。故宜食苦以燥之。

心火太過。則爲躁越。故急宜食之。

脾欲緩急。食甘以緩之。用苦瀉之。以甘補之。

脾喜甘而惡苦。故苦爲瀉。而甘爲補也。

脾欲緩急。食甘以緩之。用苦瀉之。以甘補之。

脾喜甘而惡苦。故苦爲瀉。而甘爲補也。

肺苦欲緩急。食甘以緩之。用苦瀉之。以甘補之。

氣上逆急食苦以泄之。

肺主氣行治節之令氣病則上逆於肺故急宜食苦以泄之

肺欲收急食酸以收之用酸補之。

以辛泄之。

肺應秋氣主收飲故宜食酸以收之肺氣宜緊不宜散故酸收爲補辛散爲瀉

腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通

腎爲水藏藏精者也陰精者苦燥故宜食辛以潤之善辛從金化水之母也其能開腠理致津液者以辛能通氣也水中有真氣性辛能達之氣至水亦至故可以開腠理之燥

腎欲堅急

食苦以堅之用苦補之以鹹瀉之。

腎主相藏氣貴周密故腎欲堅宜食苦以堅之也苦能堅故爲補鹹能喫堅故爲瀉

此五臟補瀉之義也。

酸傷筋酸走筋變則傷筋而痙攣

辛勝酸辛爲金味故勝木之酸

苦傷氣苦從火化故傷肺氣火劫金也又如陽氣升

火性升發則不能舒伸故苦傷氣

鹹

勝苦

膩爲水味故勝火之苦按氣爲苦而用鹹勝之此自五行相制之理若以辛助金而以甘澀苦亦是捷法蓋氣味以辛甘爲陽酸苦鹹爲陰陰勝者制之以陽陽勝者制之以陰何非勝復之妙而其中

勝甘傷肉酸勝甘酸爲木味故勝土之甘

勝金之辛故傷皮毛

苦

火載於水化故傷心血水勝火也食鹽則渴傷血可知

甘勝鹹甘爲土味故勝水之鹹

勝火之辛故傷皮毛

苦勝辛苦爲火味故勝金之辛

鹹傷

此五行相尅之義也。

血得鹹則凝結而不流多食之令人癃瘻

辛走氣氣病無多食辛

五味論曰多食之令人洞心洞心透心若空也

鹹走血血病無多食鹹

五味論曰多食之令人渴骨重難舉矣

甘走肉肉病無多食

五味論曰多食之令人渴心病禁苦

酸走筋筋病無多食酸

五味論曰多食之令人癃瘻小便不利也

甘多食之令人渴心病禁苦

五味論曰多食之令人渴心病禁苦

多食酸則肉胝脣

五味論曰多食之令人癃瘻小便不利也

病之所禁也。

多食鹹則脈凝泣

同上水能耗火故澆在心之脈與色也五味論曰心病禁鹹

而變色

水能耗火故澆在心之脈與

多食苦則皮槁而毛拔

火能耗金故病禁苦

多食辛則筋急而爪枯

火能耗木故病禁辛

在肺之皮毛也五味論曰肺病禁苦

多食辛則筋急而爪枯

火能耗木故病禁辛

多食酸則肉胝脣

音

唇揭

在脾之內與唇也。五味篇曰脾病禁酸。

多食甘則骨痛而髮落。

土能制水故病在腎之骨與髮也。五味篇曰腎病禁

甘此五味之所傷也。

風溼於內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之。

風爲木氣金能勝之故治以辛涼過於辛恐反傷其氣故佐以苦甘苦勝辛甘

益氣也木性急故以甘緩之。

風邪勝故以辛散之。

云爾。

熱溼於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之。

濕

勝之故治以鹹寒佐以甘苦甘勝鹹所以防鹹之過也苦能泄所以去熱之實也。

盛於經而不斂者以酸收之熱鬱於內而不解者以苦發之。

濕溼於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之。

濕

爲土氣燥能除之故治以酸淡以苦燥之者苦從火化也以淡泄之者淡能利竅也。

治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之。

相火畏火也故宜治以鹹冷苦能泄火辛能散火故用以爲佐酸收苦發義與上又熱注同治。

於內治以苦溫佐以甘辛以苦下之。

燥爲金氣火能勝之治以苦溫苦從火化也佐以甘辛木受

內故當以苦下之。

內

寒溼於內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之。

金傷以甘緩之金之正位以辛瀉金也燥結不通則邪實於

此六溼主治各有所宜也。

寒

凡藥須俟製焙畢然後秤用不得生秤濕潤藥皆先增分兩燥乃秤之。

寒爲水氣土能制水熱能勝寒

凡酒製升提薑製溫散入鹽走腎而軟堅用醋注肝而收斂童便除劣性而降下米泔去燥性而和中乳潤枯生血蜜甘緩益元陳壁土藉土氣以補中州麵煨麪製抑酷性勿傷上膈黑豆甘草湯瀆並解毒致令平和羊酥豬脂塗燒咸滲骨容易脆斷去穰者免脹去心者除煩此製治各有所宜也。

本草所謂黑豆烏豆皆黑大豆也蘇頌曰緊小者力更佳皆謂黑者爲雄入藥尤佳宗奭曰小者力更佳皆謂黑

大豆中之較小者非世俗所稱之馬料豆也。世俗所謂馬料豆卽魯豆也。魯豆性溫熱味濶劣。乃豆中最
品以其野生價最廉。北方甚多故以馬用之。蓋凡豆皆可作馬料而莫有如此豆之價廉也。今藥肆中煮何
皮加入煎劑者不知黑大豆而用魯豆甚謬。並有將煮過何首烏之魯豆爲充談豆破尤屬可笑。市齋每有以
首烏不用黑大豆而用魯豆爲充談豆破尤屬可笑。市齋每有以學豆以致後人多誤。

用藥有宜陳久者。

收藏高燥處又必時常開看不令蟲蛀

有宜精新者如南星半夏麻黃大黃木賊櫻櫛

芫花槐花荆芥枳實枳殼橘皮香欒佛手柑山茱萸吳茱萸燕窠蛤蚧沙糖壁土秋石金汁石灰米麥酒醬醋茶薑芥艾墨蒸餅諸麴諸膠之類皆以陳久者爲佳或取其火氣脫也。

凡煎阿膠等止宜微火令小沸不得過七日若日數多火氣太重雖陳之至久火氣終不能脫服之不惟無益反致助火傷陰也。煎膏子亦宜微火并不可久煎陰虛有火之人一應

餌食物最忌煎炒修合丸子宜將藥切細薄片子蒸爛熟燙爲丸若用火製培不但不能治病反致發火傷陰舊疾必更作也。

餘則俱宜精新若陳腐而欠鮮明則氣味不全服必無效唐耿湧詩云朽藥誤新方正謂是矣此藥品

新陳之不同用之貴各得其宜也

本草從新卷一

草部 山草類

人參 大補元氣生陰 甘溫微苦 大補肺中元氣

李東垣用藥法象曰肺主氣肺氣旺則臟腑之氣皆旺精生而形盛十劑曰補可去弱人參羊內之氣

類是也人參補氣 肉補形

瀉火

東垣曰參者甘草退火之聖藥按煩勞則虛而生熱得甘溫以益元氣而虛熱自退故亦謂之歸

除煩

生津

止渴

開心益智

心氣強則善思而益曾

聰耳明目

俱佳洗與服

安精神定魂魄

止驚悸

通血脉

氣行則血行

破堅積

氣運

則積 消痰水

氣狂則痰水消

氣壯而胃自開

氣和而食自化

治虛勞

內傷

除煩

生津

止渴

開心益智

傷宜養正傷於風寒

黃綠燥火爲外感

宜扶正

如發熱證

外感則常痛不休

內傷則時痛時止

外感則時熱時

內傷則手背熱

內傷則手

感雞架火不除

內傷則得暖便減頭痛證

外感則常痛不休

內傷則時熱無間

內傷則時熱無間

心熱外感則鼻塞不通

內傷則口淡無味

發汗自汗

自汗屬陽虛宜參

汗多者服參

參汗必浮緩而

外傷亦自

虛欬喘促

陳嘉謨本草蒙筌曰欬有肺熱還傷肺之句准言寒

固

身爲累而

冬不藏精

其氣實也若虛寒

作搐急宜用之矣

傷寒

唐淺之輩不察虛實但見發熱動手便攻且曰傷寒無補法獨不觀仲景傷寒

三百九十七法而治虛寒者一百有奇垂一百一十三方而用人參附子者

五十有一

固

身爲累而

冬不藏精

其氣者染之尤易所以

發表藥中宜少用

人參三五

意草中著之其爲詳細也

瘧疫

瘧疫病陽脈濡弱正虛也陰脈弦緊邪實也

正虛邪實則一團毒邪內燃莫能解散

病

固

身爲累而

冬不藏精

其氣者染之尤易所以

發表藥中宜少用

人參三五

意草中著之其爲詳細也

筋肉久痠宜祛風邪

從

淋瀝

肺氣化則弱

行而不頻數

脹滿

皇甫嵩本草發明云胸膈逆滿宜補之而張自除經所謂

肌表出俱忌用之

塞因塞用也俗醫泥於作絕不敢用不知少用反滋壅

多

用則宣通補之

正所以導之也

多夢紛紜離魂異疾

有入覺臥則身外有身一樣無別蓋臥則魂歸於肝此由肝

虛邪襲魂不歸舍病名離魂夏子益有疾方用龍齒赤茯苓

珠砂各一錢。臨睡服三服愈矣。

妊娠吐水

酸心嘔痛不思飲食。惠民利局方炮蘿蔔等分爲末。生地黃汁和丸。桐子大每服五十丸。米湯下。

胎產諸虛小兒慢

驚痘科險症

凡痘諸顏色煩紅而不蒼老或頭臉或皮薄者清養。搘滌瀉俱屬氣虛宜用之。若因用熱藥不大行及醫後毒發者均忌泄瀉。由於肺熱者忌之。

外科陰毒

癰疽出瘡後收口其效尤神。採藥用之亦妙。

因虛失血

古人治大失血脈訖洪者並用人參氣旺則能歸血也。又凡脫血者須益其氣。蓋由血不自生須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長之義。

也若單用補藥則血無由而生矣。若火氣方盛血熱妄行則忌之。氣虛甚者濃煎獨參湯進之。挾寒者稍加附子。按人參功能在諸藥之上。但閑氣肺有火熱及肺氣不利者忌之。實表裏有邪者忌之。凡

遠東寧古塔出者光紅結實。船廠出者空鬆鉛塞並有糙有熟宜隔紙焙用。忌鐵

不宜見風。白茯苓爲使。畏五靈脂惡皂角黑大豆紫石英人溲及藜蘆。

李言聞曰東垣理脾胃篇

陰火交泰丸內用人參皂角是惡而不惡也。古方療月閉四物湯加入人參五靈脂是畏而不畏也。又療癰在胸膈人參藜蘆同用而取其湧轉是寓其怒性也。非胸膈者不能知也。凡失血不止人參和

童便服卽止因相惡而效更奇絕也。

參條

生津補氣

乃橫生蘆頭上者其力其薄止可用以調理常病及生

津止渴其性橫行手臂凡指臂無力者服之其效。

參鬚

生津補氣

亦橫生蘆頭上而更細者其性與參條同而力化薄要知參條參鬚不過得參之餘氣危險之證

斷難倚仗

太子參

大補元氣

雖甚細如參條短緊堅實而有蘆紋其力不下人參。

參蘆

言通吐然亦有種性

入手太陰肺陽中之陰蘆則萬太陰之陽亦猶所謂黃芽能

發汗根能止汗也。疫在上滿在經絡宜七之吐中就有發汗之義。一婦因怒而病犯乍則舉身跳動昏不知人乃瘳因怒鬱氣不得降以參蘆半兩煎水煎飲之大吐頑痰數椀大汗昏睡而安一人作勞發甚

服瘧藥變爲熱病舌短淡嫩六脈洪數而滑此取蓄胸中也
以麥蘆湯加竹陳酒出頭三塊火與參者當歸而安矣

今東洋西洋俱常用之。又人參內一種白皮細

長名鳳凰城又有一種皮糙
體輕名泡頭東洋俱大行

參葉 大苦大寒損氣敗血其性與人參相反且無用所

以從來本草內俱不載。

珠兒參

補氣除肺火

苦寒微甘味厚體重補肺除火肺熱者宜之。臟寒者服之卽作腹

痛鬱火服之火不透發反生寒熱具性大約與西洋人參相同不過清熱之功熱去則火不刑金而肺臟受益非真能補也。出閩中須多去皮再用滾水泡以其苦劣之味在皮近中心則苦味減而稍甘。

黨參

補中氣生津補肺氣

甘平補中益氣和脾胃除煩渴中氣微虛用以調補甚爲平安。按古

本草云參須上黨者佳今真黨參久已難得肆中所賣黨參種類甚多皆不堪用。

唯防風黨參性俱和平足貴根有獅子盤頭者真硬紋者僞也。

蒸之極透則寒性去氣香味淡性善下降能伸肺經治節使清肅下行

土人參

補肺氣下行

甘微寒氣香味淡性善下降能伸肺經治節使清肅下行補

氣生津治欬嗽喘逆痰壅火升久瘧淋瀝難產經閉瀉痢由於肺熱反胃噎膈由

於燥濕凡有升無降之證每見奇效。其參一直下脾虛下陷滑精夢遺俱禁用以其

下行而滑竅也孕婦亦忌。出江浙俗名粉沙參

紅黨參即將此參去皮淨者

極熱陰乾而成者味淡無用

西洋人參

補肺火除火

苦寒微甘味厚氣薄補肺降火生津液除煩倦虛而有火者相宜。

出大西洋佛蘭西。形似遼東錢人參，而之不香，其氣甚薄。

北沙參補陰清肺火 甘苦微寒，味淡體輕，專補肺陰，清肺火，治久嗽，肺痿，金受火刑者宜之。寒客肺中作嗽者勿服。人參補五臟之陽，沙參補五臟之陰，肺熱者用之。 白實長大者良，惡防已反藜蘆。

肺熱咳嗽者用沙參半兩水煎服之甚效。

南沙參補陰清肺火 功同北沙參而力稍遜，色稍黃，形稍瘦小而短，近有一種味帶辣者不可用。產臺灣州。

空沙參卽薺羌，利肺甘解毒寒 甘淡微寒，解百藥毒，利肺氣，和中明目，主咳嗽，消渴強中。壅長興盛，不交精液。

自生謂之強中。

瘡毒疔腫。

李時珍本草綱目曰：薺羌寒而利肺，甘而解毒，真良品也。而世不知用，惜哉！人參當參，土人參，洋參，薺羌，沙參，桔梗相似，不可不辨。參體虛無心而味淡，薺羌體虛無心而味甘淡，人參體實有心而味甘微帶苦，自有餘味。洋參雖似穀參，但氣不古爾。

卽甜桔梗乃桔梗之一類二種。

甘草有補有瀉，能補能瀉。 可升可降，生陰血。

味甘生用氣平，補脾胃不足而瀉心火。能生肺金

炙用氣溫，補三焦元氣而散表寒，入和劑則補益，入汗劑則解肌。解退肌表之熱。

入涼劑則瀉邪熱，入峻劑則緩正氣。蔓附加之恐其峻，丁皆緩之之意。 入潤劑則養陰血，能協和諸藥，使之不爭生肌止痛。脾主肌肉，甘能緩，療行十二經，解百藥毒，故有國老之稱。療諸癰腫，瘡瘍，惟中滿證忌之。

甘令人滿，然亦有生用爲瀉者，以其引諸藥至於滿，所經云以甘補之，以甘瀉之，是已故。陶隱居明醫別錄，雲權性論，升丹除滿，脾健運則滿除也。又甘草得茯苓，則不見資滿而反泄溼，故

云下氣，除滿仲景有甘草瀉心湯治瘡滿。

大而結者良，出大同名粉草。彈之有聲，細者名統草，補中炙用宜。

大者瀉火生用宜細者去赤皮甘草頭宣通消腫導毒者在上部效宜入吐藥甘草稍

中產草止莖中痛淋濁證用之取其經達蒸中也

甘遂海藻然亦有並用者

胡治百病方治瘰疬十載湯加甘草東垣治結核與海藻同用丹溪治瘰疬與芫花同行非妙津精微者不知此理

黃精平補氣血而潤甘平補中益氣安五臟益脾胃潤心肺填精髓助筋骨除風濕下三戶

蟲以其得坤土之精髓久服不飢

氣滿則不飢

却病延年似玉竹而梢大黃白多鬚

故俗呼爲玉竹黃精又一種似白芨俗呼爲白芨黃精又名山生薑恐非眞者去

鬚九蒸九曬用每蒸半日方透一次必

萎蕤即玉竹平補氣血而潤去風濕

甘平補中益氣除煩渴潤心肺治風溼濕毒目痛皆爛

風寒熱

店癧中風不能動搖頭痛腰痛

凡頭痛不止者屬外感宜發散乍痛乍止者屬內傷宜補虛又

帶疾積瘀血風寒濕熱之不

同凡挾虛熱風濕者宜萎蕤

去毛蜜水或酒浸蒸用畏鹹鹵熬膏良

小便猝淋萎蕤五錢苦蘿根二至二盞煎一盞入滑石末一錢服

黃耆補氣固表生亦屬火生陰血

甘溫生用固表無汗能發有汗能止

丹溪曰黃耆大補陽虛自汗若表虛有邪發汗不出者服此又能自汗

溫分肉實腠理補肺氣瀉陰火解肌熱炙用補中益元氣

溫三焦壯脾胃

脾胃一虛土不能生

金剛肺氣先經脾胃緩和則肺旺而肌表固實健中亦卽所以固表也

生血生肌氣能生血血充則肉長

排膿內託瘡癰聖藥

毒氣化則成膿而氣故能

內託癰疽不能成膿者死不治毒氣盛而元氣衰也痘證亦然耳

痘證不起陽虛無熱者宜之

合人參甘草生薑爲保元湯治虛不起或加芍藥官桂桂木助之

王好古湯液本草曰實斂氣是表藥益脾胃是中州藥治傷寒尺脈不至補腎元是裏藥飴權謂其補腎者氣爲水母也曰華大明本草謂其止崩帶者氣旺則無陷下之患也蒙筌曰補氣藥多補血藥亦從而補氣補血藥多補氣藥亦從而補血益氣湯雖用當歸因勢寡功被參耆所據補血湯黃耆數倍於當歸亦從當歸所引而補血補血湯黃耆一兩當歸二錢氣藥多而云補血者氣能生血又有當歸爲引也爲補藥之長故名者

槌扁蜜炙如欲其稍降鹽水炒形如箭幹者佳絲軟而嫩無了枝故又名綿耆切片外白中黃金井玉靈五臺耆口耆皆不堪入藥入補中藥

李林隱之病自愈也有上病下取下病上取補彼經而益及此經者此類是也

達表生用或酒炒亦可茯苓爲使惡龜甲白鮮皮

畏防風

東垣曰黃耆得防風其功益大乃朴畏而更以相使也

按黃耆極滯胃口胸胃不寬者勿用實表有表邪

及表旺者勿用助氣氣實者勿用多怒則肝氣不和亦禁用陰虛者宜少用恐升

氣於表而裏愈虛爾

用鹽水炒以制其升性亦得

熬膏良

野白朮

補氣生血
健脾燥濕

甘補脾溫和中苦燥濕

經曰脾惡濕急食苦以燥之

本善補氣同補血藥用亦能

補血

生血

無汗能發有汗能止

止汗同者芍之類發汗加辛散之味

補脾則能進飲食祛勞倦

脾主四肢虛則四肢

瘡止肌熱

肉脾主肉

化癩癩

癩癩因脾虛不運者宜用此以健脾脾運則積化也

和中則能已嘔吐定痛安胎

得黃芩清胎熱

得艾葉治寒得參大補胎元之弱蓋胎

繫於脾胃虛則帶無所依附故易落氣不得施化津向由生用白朮以除

止泄瀉化胃經痰水

土蒼白

能勝濕

理心下急滿

於轉轉利

腰脅血結去周身濕痺

二症皆氣停爲寒濕去則安矣

止泄瀉化胃經痰水

土蒼白

能勝濕

理心下急滿

於轉轉利

六腑內充蓋甚言其功之廣也腎虛者勿用有火者宜生用

萬意草中載時中等研寫寒臨危求肉汁涼飯食畢

大叫一聲而發泄之。人間危急，索飯之時，尚有法可救否？嘗嘉言曰：獨參湯可以救急。後忽嘆曰：「其擾動陽氣，急迫無奈，令進參湯，不可捷得。」遂將白朮三兩，熬濃汁一椀，與服。卽安妥，凡力微不能服者，重用野朮，類可代之。

下黑陰氣不脫，而上焦陽氣發脫者，大可起死回生。

產於潛者最佳。今甚難得。卽浙江諸山出者，俱可用。俗稱爲天水朮。有鶴頸甚長，內有硃砂點。朮上有鬚者尤佳。以其得土氣厚鬚，乃其餘氣也。其次出宣歙者，名狗頭朮。冬月採者佳。用糯米泔浸。

借氣氣以和脾

陳壁土炒

藉土氣氣以助脾

或蜜水炒人乳拌用。

開以制其燥
黃若炒焦則氣味全失

宜炒白朮止。

種白朮

健脾燥濕

止，可用以調補常病之虛者，及病後調理脾胃。若生死關頭，斷難恃以

爲治。陰虛燥渴，肝腎有築築動氣者勿服。

產浙江台州燕山，亦以冬月採者

爲佳。並無鶴頸與鬚，反肥大於野朮。熬膏良。

雲朮形長大性燥，人或切片以雜之

江西白朮，其形甚

小，與浙江野朮相似。雖有鶴頸而甚短，其體堅實，其味苦劣。

如野朮不可得，惟用白朮爲穩，餘俱不可用。

蒼朮

祛脾燥濕宣升陽解鬱

苦溫辛烈，燥胃強脾，發汗除濕，能升發胃中陽氣。

土形雄壯，能除濕治中氣，下陷下安太陰，使邪氣。

止吐瀉逐痰水。

許叔微本事方曰：蒼朮能破水飲之，辟囊蓋燥脾以去濕，崇土以補脾。方用蒼朮一斤，大棗五十枚，去皮，燒沫半兩水，二盞研濾汁，和丸名神朮丸。丹溪曰：

實脾土燥牌濕，是治痰之本。

消腫滿辟惡氣。

爲除邪氣之上品，辟邪惡，鬼氣，陰濕處，焚之佳。

散風寒濕，爲治療要藥。

陽明處，則

宗筋維弛帶脈不引，故痿瘦。蒼朮陽明經藥，經曰：治瘻，獨取陽明合黃柏爲二妙散，加牛膝，名三妙散。

又能總解痰火氣血濕食六鬱。

丹溪曰：諸鬱皆因傳

化失常氣，不得升浮。病在中焦，將欲升之，必先降之；將欲降之，必先升之。越鞠丸用蒼朮、香附、入蒜、經芩、桔梗、陽明之藥，通行飲滯，香附乃陽中快氣之藥。一升一降，故鬱散而平。

及脾濕。

下流腸風帶濁。

帶濁者熱傷血分白者濕傷氣分並有寒熱二證亦有因痰而生濁者宜二陳加二朮升柴

燥結多汗者忌用。出茅山

堅小有硃砂點者良。糯米泔浸焙乾同芝麻炒以制其燥。二朮皆防風地榆爲使。

古本草不分蒼白。陶隱居分二種。始各施用。

因濕氣身癢者蒼皮泔浸切煎取汁敷膏白湯貼

桔梗

音通宋血竊火寒載藥上浮

苦辛平色白屬金入肺。

分瀉熱兼入手少陰心足陽明胃經開提

氣血表散寒邪清利頭目咽喉。開胸膈滯氣。凡痰壅喘促鼻塞目赤喉痺咽

痛。

兩少陰火寒

齒痛。

陽明

口瘡肺癰乾欬。

火鬱在肺

胸膈刺痛。

火鬱上焦

腹痛腸鳴。

肺火鬱於大腸

並宜苦

梗以開之爲諸藥舟楫載之上浮能引苦泄峻下之劑。至於至高之分成功。

既上行而

又熊下氣何也。肺主氣肺金清肅氣自下行耳。枳桂湯治胸中痞滿不痛取其能通肺利膈下氣也。甘桔湯通治咽喉舌頭病取其苦辛散寒去平除熱也。

去浮皮泔浸微炒。

畏龍膽白芨忌豬肉。

本經桔梗一名蕡莞苦桔梗蕡莞乃類首部苦二種別錄始分新老條

天麻

宣桂

辛溫入肝與氣分通血脈疏痰氣治諸風眩掉頭旋眼黑語言不遂風濕

瘡瘻小兒驚癇。

諸風眩皆屬肝木肝病不能榮養故見前證天麻入厥陰而治諸疾肝氣和平諸疾自瘳

血液衰少及非真中風者忌

用。

風藥能燥血故也。於風藥同養血藥用利其燥也。養血藥同搜風藥用宣其燥也。古云治風先治血。血行風自滅。

根類王瓜莖名赤箭明亮堅實者

佳。濕紙包煨熟切片酒浸一宿焙子名還筒子定風補虛。

秦艽

宣去風濕

苦燥濕辛散風去腸胃之熱疏肝膽之氣活血勞筋。

風藥中間劑散藥中補劑

治風寒濕

痺。

經曰風寒濕三氣雜至合而爲病。風勝爲行。寒勝爲痛。脾濕勝爲著腫。腎重在脈則血澀在筋則拘急在肉則不仁在皮則寒

通身攀急潮熱骨蒸。

時

日手足陽明經藥兼入肝膽陽明有濕則手足痺痛寒熱有熱則急勞煩蒸其柴胡各一兩甘草五錢爲末年服三錢又方治小兒骨蒸每食減瘦藥茶甘草各一

兩年服一二錢錢丁小兒直訣加薄荷五錢

疽黃酒毒腸風瀉血口噤牙痛

囊曰秦先能去下牙痛及本經風濕

濕勝風淫之證利大小便

牛乳點眼兼治黃疸煩渴便赤

下部虛寒小便不禁大便滑者忌用形

作羅紋相交長大黃白左紋者良菖蒲爲使畏牛乳

一切瘡口不合素光爲末擦之效

柴胡宣發表和裏退熱升陽解鬱經

苦微寒味薄氣升爲陽主陽氣下陷能引清氣上行而平少陽

厥陰之邪熱

肝膽心包三焦相火時發曰行少陽黃芩爲佐行厥陰黃連爲佐

宣暢氣血散結調經

人第知柴胡能發表而不知柴胡最能和裏

足少陽膽經表藥

胆爲清淨之腑無出無入其經在半表半裏法當和解少柴胡湯之類是也若病在太陽服之太早則引賊入門若病入陰經復服柴胡則重虛其表最宜詳慎

治傷寒邪熱痰熱結實心下煩熱諸瘧寒熱

東垣曰竊據以柴胡爲君生以引經之藥論嘉言醫門法律云瘧發必有寒有熱蓋外邪伏於

半表半裏適在少陽所主之界入與陰爭陽勝則熱出與陽爭陰勝則寒卽純熱無寒爲瘧瘧溫瘧寒多熱少爲壯瘧要皆自少陽而造其極偏補偏救亦必還返少陽之界但陰陽協和而後愈也謂少陽而

兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不成其爲瘧矣臍緣屢遷而弦之一字實貫徹之也

頭眩嘔吐邪在半表半裏則多嘔吐

青皮川芎白芍柴胡湯加

口苦耳聾皆肝膽之邪

熱入血室之柴胡在臟主血在經

胎前產後

諸熱小兒痘證能散十二經滻血凝氣滯功同連翹

連翹治血熱柴胡

主氣熱爲少異

氣升者禁用產江南古城山名齊接口者佳

定遠縣出者亦好

外感生用內傷升氣酒

炒用凡治中及下降用梢有汗效者蜜水拌炒前胡半夏爲使惡皂角按柴胡

所用甚多今藥客入山收買藥肆中俱切爲飲片其實真柴胡無幾須揀去別種

用淨柴胡。苗主治卒聾。擣汁頻滴之。銀州柴胡。宣治勞熱 治虛勞肌熱骨蒸勞。

瘧熱從體出。小兒五疳羸熱。根長尺餘微白。

前胡宣解表篤下氣治風痰 辛以暢肺解風寒。甘以入脾理胸腹。香氣有餘便是火 苦泄厥陰肝之熱。寒散太陽。

喘嗽嘔逆。痞膈霍亂。乃手足太陰陽明之藥與柴胡純陽上升入少陽厥陰者不同 無實熱與外感者忌用。能除實熱。治痰熱哮。

喘嗽嘔逆。痞膈霍亂。但柴胡性升前胡性降爲異肝膽經風痰前胡能除之 無實熱與外感者忌用。能除實熱。治痰熱哮。

勿用半夏爲使。惡皂角忌火。

獨活宣理伏風去濕 辛苦微溫。氣緩善搜。入足少陰氣分。腎以理伏風。治本經傷風頭痛。頭。

暉目眩宜與細辛同用 風熱齒痛。文○公藥準用獨活地黃等分爲末每服三錢 痘癰濕瘻。項背強直手足反張曰瘡濕流瀉節痛而煩曰瘡瘍風勝經故二活

奔豚疝瘕。於腎家所致疝瘕亦然 古方惟用獨活後人分二種。以形虛大有白如

鬼眼節疏色黃者爲獨活。色紫節密氣猛烈者爲羌活。並出蜀漢。又云自西羌來

者爲羌活。故又名胡王使者。日羌活之獨本者卽喻嘉言

羌活宣理遊風發表勝風 辛苦氣溫。氣雄而散。味薄上升。入足太陽。膀胱 以理遊風。兼入足少陰。

厥陰氣分。腎瀉肝氣。搜肝風。治風濕相搏。本經頭痛。同川芎治太陽少陰頭痛凡頭痛多肝脾並病 用局藥以煎頂之上。惟風可到也。

督脈爲病。督脈並太陽經 脊強而厥。剛痙柔痙。痙者大約風證宜二活血虛忌用 中風不語。填中

宜之若氣血
病損者大忌

頭旋目赤散肌表八風之邪利周身百節之痛爲却亂反正之主藥

若血虛頭痛遍身痛者此屬內證二活並禁用

防風

宣發表去
風勝濕

辛甘微溫升浮爲陽搜肝瀉肺散頭目滯氣經絡留濕主上部見血

用之爲使亦能治崩

上焦風邪頭痛目眩脊痛項強周身盡痛太陽經證

膀胱係之才曰得又行

脾胃二經爲去風勝濕之要藥

凡風藥皆能勝濕東垣曰卒伍卑賤之職隨所引

而至乃風藥中潤劑若補脾胃非此引用不能行

瘍若血虛症急頭痛不因風寒傷內泄瀉不因寒濕火升作嗽陰虛盜汗陽虛自汗

者並禁用

同黃耆白芍又能實表止汗合黃耆白朮名玉屏風散固表聖藥黃耆得防風而功倍大乃相畏而更相使也

青州黃潤者良輒蘆糯體

登州萊陽次之癰東者性硬不用惡乾薑白蔻芫花畏草薢殺附子毒

升麻

輕升
陽解毒

甘辛微苦足陽明太陰引經藥

脾胃參者上行須此引之亦入手陽明太陰

大腸表散

風邪

引葛白散手陽明風邪同葛根能發陽明之汗引石膏主陽明頭痛齒痛

升散火鬱能升陽氣於至陰之下引甘溫之藥

上行以補衛氣之散而實其表

柴胡引少陽清氣上行升麻引陽明氣上行故補中湯用爲佐使

治時氣毒癟頭痛

連齒

寒熱肺痿吐膿下痢後重

後重者氣滯也氣滯於中必上行而後能下降有病大小便滯

久泄

經曰清氣在下則生飧泄脫肛崩中帶下

能緩帶脈之縮急痘瘡

升葛湯初發熱時可用痘出後或下陷繼瘡者可少用否則見點之後必不可用爲其解散也

癰瘍

成朵如錦紋者爲斑癰見紅點者爲疹蓋胃熱失下衝入少陽則助相火而成疹又有內傷陰證見癰瘍者微紅而稀少此胃氣極虛逼其無根之火遊行於外當補益

氣血使中主則氣不外血不外散忌用升散之品

風熱瘡瘍解百藥毒吐蠭毒殺精鬼

桂陽氣升味甘故也

陰虛火升

者忌用。

下元虛者用此升之則下元愈虛失陰活人書言瘀血入裏吐衄血者犀角地黃湯乃陽明聖藥如無犀角代以升麻二藥性味相遠何以云代蓋以升麻能引諸藥同入陽明也朱二十九曰

升麻性升犀角性降用犀角止血乃借其下降之氣清心肝之火使血下行歸經耳倘誤用升麻血隨氣升不愈涌出不止乎古方未可盡泥也

裏白外黑緊實者良名

鬼臉升麻去鬚蘆用

或有參苦補劑須用升柴而又恐其大升發者並用蜜水炒之別有一種綠升麻炮仲醻廣筆記用治癆有效附後方卒腫毒起升麻醋磨頰塗之

細辛

宣肺風寒溫行水氣潤腎燥

辛溫散風寒故諸風痺痛欬嗽上氣頭痛脊強者宜之

專治少陰之頭痛

散浮熱故口瘡喉痺

火少陰

鼻淵齒齧者宜之

蟲蚀

水停心下則腎燥細辛之辛能

行水氣以潤之

腎燥者心亦躁火屈於水故躁也經曰腎苦燥急食辛以潤之

手少陰引經心乃足少陰本藥

腎能通

精氣利九竅故驚癇耳聾鼻

鼻塞不聞音臭風寒濕熱入於醫故氣不宣鼻通寒宜表濕熱宜清有瘻肉者爲末吹鼻

風眼淚下倒睫

大便燥結者宜之溫經發汗

能發少陰之汗仲景治少陰證反發熱者麻黃附子細辛湯乃治邪在少陰之表劑

行血下乳散結破

痰味厚性烈不可多用北產者細而香

華陰出者最佳

南產者稍大而不香名土辛

又名馬辛

以其葉似馬蹄也

揀去雙葉者用惡黃耆山茱萸畏硝石滑石反藜蘆

危亦材得效方暗風卒倒

不省人事者細辛吹入鼻中

遠志

宣散鬱

苦洩熱溫行氣卒散鬱主手少陰心能通腎氣上達於心強志益智聰

耳明日利九竅治迷惑善忘驚悸不寐

諸證皆因心情憂鬱惄怒而得遠志辛能散鬱

並善豁痰遠志交通心腎並無補性虛

而挾滯者同養血補氣藥用資其宣導臻於太和不可多用獨用純虛無滯者忌

山西白皮者佳。山東黑皮者次之。去心甘草水浸一宿用畏珍珠藜蘆得茯苓龍骨良。葉小名

草益精補陰氣治虛損夢洩。

可於統柴胡內揀出用之

金毛狗脊

平補肝腎除風寒濕

苦堅腎甘益血

滋

肝溫養氣治失瀉不節

益

腳弱腰痛寒濕周痺

經日內不在臟腑而外未發於皮獨居分肉之間真氣不能周故曰周痹

除風虛強機關利俯仰

燃腎益肝則骨健而筋強

有黃毛如狗形

故名去毛切酒拌蒸草薢爲使熬膏良。

溼羊藿

補腎命

辛香甘溫入肝腎補命門益精氣堅筋骨利小便治絕陽不興絕陰

不產冷風勞氣四肢不仁

手足麻木

相火易動遠之一名仙靈脾北部溼羊一日百合

食此藿所致故名去枝羊脂拌炒山藥爲使得酒良

牙齒虛痛仙靈脾爲粗末煎湯頻服大效

巴戟天

補腎風

甘辛微溫入腎經血分強陰益精治五勞七傷散風濕治風氣腳氣

水腫陰虛而相火熾者忌服根如連珠擊破中紫而鮮潔者僞也中雖紫微

有白粉色而理小暗者真也蜀產佳

山藥根似巴戟但色白人或醋煮以亂之

去心酒浸焙用覆盆子

爲使惡丹參

瑣陽

補陽滑腸

甘溫補陰益精興陽潤燥養筋

強筋故能興陽

治痿弱滑大腸

便燥者淡之可化痰或煮粥服佳

洩瀉及陽易舉而精不固者忌之鱗甲櫛比狀類男陽酥炙

肉蓯蓉

補腎命滑陽

甘酸鹹溫入腎經血分補命門相火滋潤五臟益髓強筋治五勞七

傷絕陽不興。絕陰不產。腰膝冷痛。峻補精血。

時珍曰：補而不峻。故有從容之號。

驟用恐妨心滑大便。

功用與瑣陽相倣。禁忌亦同。長大如臂。重至斤許。有松子鱗甲者良。酒浸一宿。刷

去浮甲。劈破除內筋膜。酒蒸半日。又酥炙用。忌鐵。

蘇頌註唐本草曰：今人所用多草蔻。功力稍劣。

白芨

瀉補肺化
瘀生新

苦辛而平。性滯而收。得秋金之令。入肺止吐血。

摘元云：試血法。吐水內浮者肺血也。沈者肝血也。半

滯沉者心血也。各隨所見以羊肺、白芨末。日服之最佳。

肺損者能復生之。以有形生有形也。人之五臟惟肺葉損壞者可以復生。

酒服

二錢

油調

惡瘡癰腫敗疽死肌去腐逐瘀生新除面下酐

瘡也

塗手足皺裂

令人肌滑

紫石英爲使

畏杏仁

反烏頭

重舌鶴口爲末

治跌打折骨

孢面

三七一名山漆

篇散瘀定痛

甘苦微溫散血定痛

治吐血劙血

血痢

目赤癰腫

紫石英

乳汁

搘塗足心

塗手足皺裂

令人肌滑

紫石英爲使

畏杏仁

反烏頭

重舌鶴口爲末

治跌打折骨

爲金瘡杖瘡要藥

故時先服一二錢。則血不衝心。枝後敷之去瘀

消腫易愈

大抵陽明厥陰血分之藥。故治血瘀

能損新血

無瘀者勿用

從廣西山洞來者

略似白芨長者如老乾地黃

有節味微甘

頗似人參以末摻豬

血中血化爲水者真

又有一種葉似菊艾而勁厚有歧尖莖有赤梗夏秋開黃花如金絲盤紐可愛而氣不香根大如牛蒡味甘極易繁衍云是三七治金瘡折傷血病甚效與南

中來者不同

地榆

瀉止血

苦酸微寒性沈而濡

收汗止血皆

入下焦除血熱

治吐劙崩中腸風

收汗止血皆

古方斷下多用之

氣血虛寒及初起者禁用

似柳根外黑內紅取上截炒黑用梢反行血得

髮良惡麥冬

陽風隨感而見也。血瘀者爲蟲毒積久而發也。糞前爲近血出腸胃糞後爲遠血出肺肝

血痢

蘇頌本草圖經曰

古方斷下多用之

氣血虛寒及初起者禁用

血餅者爲

丹參
補心去瘀生新

氣平而降味苦色赤入心與包絡破宿血生新血

察去後生新

安生胎養墮

死胎
瘀去

調經脈

風寒濕熱襲傷營血則經水不調先期屬熱後期屬寒又有血虛血瘀氣滯痰阻之不同大抵婦人之病首重調經經調則百病自散

除煩熱功兼

四物

一味丹參散功同四物湯

爲女科要藥

治冷熱勞骨節痛風癱不隨

手足緩軟不隨受血而能步掌受血而能握

癥瘕

癥者有塊可覺瘕者假也移動聚散無常須分別治

血虛血瘀之候又治目赤疝痛瘡疥腫毒排膿生肌養

神定志通利血脈

雖能補血長於行血無瘀斟酌用之

畏鹹水忌醋反藜蘆

元參

屬無根之火補陰

苦鹹微寒入肺腎二經

景岳云本草言其入腎而不知其尤入肺藏也元素曰元參乃陽明之劑管領諸氣上下清肅而不濁風藥中多用

俱用元參

人書治傷寒陽毒汗下後毒不散心下懊憹煩不得眠心神顛倒欲絕者以此證之治胸中氤氳之氣竊無根浮游之火當以元參爲聖劑也

除煩止渴降火滋陰

明日

爲末米泔蕷羊肝日日蘸食之亦治赤眼眞瞳神

解毒利咽喉

通肺氣下水治頭痛

火熱生風鼻瘡

瘧瘈

以水浸

瘧瘈鼠瘧

俱生搗敷日三易

發癬咽痛頸下結核急喉痺風

以上皆肅清肺氣之功

癰疽瘍瘡氣溫

瘧游風潮熱骨蒸

肺金爲腎水之上源肺金清則腎水自生故又能理癥

脾虛泄瀉者忌

取青白者

元參色本青白其黑色本青

瘧瘈

後來濕蒸之癥色若收采時即晒乾並不壞也

蒸過再焙勿犯銅器惡黃耆萸肉薑棗反藜蘆

苦參

葛根

因

大苦燥濕大寒勝熱沈降入腎消癰解毒明日止淚

酒爲濕肝熱之散

治夢遺滑精

殺蟲

蠭生

白虎牡蠣倍之雄精

肚丸亦治赤白帶下熱痢血痢

也宜散風涼血爲佳

腸風瀉血溺赤黃疸又能祛風

白朮

丸亦治赤白帶下

倍之雄精

蒸過再焙勿犯銅器惡黃耆萸肉薑棗反藜蘆

治大風疥癩眉脫

又能解酒毒

酒爲濕熱之散

肝腎虛而無熱者忌

其病能傷腎沈括夢溪筆

病腰痛

由其氣傷腎也

糯米泔浸去腥氣蒸

元參爲使惡貝母菟絲漏蘆反藜蘆

龍膽草 編肝膽涼火
下焦熱

大苦大寒沈陰下行入肝胆而瀉火兼入膀胱腎經除下焦之濕

熱與防已同功酒浸亦能外行上行治骨間寒熱督主驚癲邪氣肝經時氣溫熱

熱痢疸黃脚氣足傷風熱則成脚氣腫而痛者爲濕脚氣宜清熱利濕搜咽喉風熱赤睛胬肉

篇肝胆火能明目元素曰柴胡爲主龍膽爲使目疾要藥凡人目疾初起時宜發散忌寒涼癰疽瘡疥大損胃氣無實火者忌之甘

草水浸一宿曝用小豆貫衆爲使忌地黃

黃連

屬火
燥熱

大苦大寒入心瀉火

海藏曰篇心實篇脾也實則篇其子
能去心惡血

鎮肝涼血

凡治血防風爲上部之使黃連爲中部之使地黃爲下部

使之燥濕開鬱解渴除煩消心瘀

能去心惡血

止盜汗

涼心

治熱毒諸瘻

致瘻之由不一若止因

瘻熱血氣實者

津爲要

則止因之由不一若止因

酸吐酸

因肝火鬱而成者
同吳黃連火鬱鬱

腹痛心痛伏梁

積心

目痛皆傷

人乳浸貼或合歸芍等分煎湯熱洗散熱活血亦佳

癰疽瘡疥

濟皆屬於火

諸瘻痛癢

目定驚止

嘔心

解毒除疳殺蛇

則伏

虛寒爲病大

忌久服黃連苦參反熱從火化也善炎上作苦味苦必燥燥則熱矣且苦寒沈陰

肅殺伐傷生和之氣也或用甘草以調其苦或亦人參以節制之其庶幾乎

黃連種數甚多

雅

州連細長彎曲微黃無毛有硬刺馬湖連色黑細毛綉花針頭硬次形如雞爪此

二種最佳雲南連體鬆軟毛無硬刺古勇連

之水連頭又名魯連產雲南西廣體重無毛無硬刺此二種次

土連

產川中古勇山

光黃性重斷則淡黃色以上三種服之害人

產處

色黑團節

馬藥中

雞屎連

色黑細小斷則淡綠色以上三種服之害人

雲錦連

產雲

色黑斷則紅色不入藥川中種連黑黃軟毛無硬刺味微苦而薄服

之無效

去毛治心火生用肝膽火豬膽汁炒上焦火酒炒中焦薑汁炒下焦火

鹽水炒

或童便炒

食積火黃土炒濕熱在氣分吳萸湯炒在血分醋炒

制其苦寒
其燥性者詳之

黃芩龍骨爲使惡菊花元參蘆薈白鮮皮畏款冬牛膝忌豬肉

曰方有藏連丸黃連猪膽丸
丸豈忌肉而不忌藏連乎

殺烏頭巴豆毒

胡黃連

其性味功用並以黃連故名

今諸家俱用以治小兒潮熱五疳等證

論嘉言曰凡治小兒五疳即大人五勞也幼科如用

五疳之成方而不知五勞之次第初起者治之可以得效四虛者服之有死而已矣善膳草蘆薈黃連胡黃連等之蠭擾苦大寒兒不能勝爾大方亦然計安謂五種虛勞之外又有未用苦寒諸藥如是死者醫

之解吃烟毒

二尤曰解吃烟毒合茶服之效出波斯國今秦隴南海亦有之心黑外黃折之塵出如

煙者乃爲眞也其禁忌畏惡俱同黃連

黃芩

瀉火

苦入心寒勝熱瀉中焦實火除脾家濕熱治澼痢腹痛

痰濕之不同寒宜溫熱宜清虛宜補實宜攻食宜消導瘀血宜行散經活宜化痰利濕瘀時手不可接者爲實瘡接之痛止者爲虛瘡

寒熱往來

邪在少陽

解渴安胎

胎孕宜清火也

因火動當先降火

黃疸五淋血

閉

實熱在血分

氣逆癰疽瘡瘍及諸失血降痰

丹溪曰黃芩降痰假其降火也

因火動當先降火

不妄行
則胎安

酒炒則上行瀉肺火利胸中氣

肺主氣熱傷氣

瀉熱所以利氣

治上焦之風熱濕熱

焦藥火嗽喉腥

五臭肺爲腫

目赤腫痛

黃芩得柴胡退寒熱得芍藥治麻得厚朴黃連止腹痛得桑皮

太陽少陽合病下痢黃芩湯少陽證下後心滿竊心湯並用之蓋黃芩苦寒入心竊熱除脾家熱使胃火不流入肺不致刑金即所以保肺也肺虛不宜者苦寒侵土損其母也少陽壅堵在半表半裏而心虛

痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默不欲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽藥也楊以濤直指方曰柴胡退熱不及黃芩時珍曰柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治肺熱身如火療煩渴引飲而晝盛者宜一味黃芩來煎湯以竊肺經氣分之火黃芩一兩煎服本事方治崩中暴下一味

戒胎前若非實熱而服之陰損胎元矣 中虛者名枯芩卽片芩瀉肺火清肌表

之熱 上行輕飄者

內實者名條芩卽子芩瀉大腸火

堅重者 下降

上行酒炒瀉肝膽火豬膽

汁炒山茱龍骨爲使畏丹皮丹砂

紫草 滑腸熱 甘鹹氣寒入厥陰血分

心包

涼血活血利九竅通二便

性寒

治心腹邪

氣卽熱 及痘瘡血熱毒盛二便閉滯者

血熱則毒閉得紫草則血行而毒出曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾實者可用脾虛者能作瀉古方惟

用草取其初得陽氣以類解類用發痘瘡人不達此理概用之誤矣

便滑者勿用 去頭鬚酒洗

知母 瓢火補水 開燥滑腸

辛苦寒滑瀉腎家有餘之火

膀胱邪熱

因而上清肺金

兼瀉

入二經氣

分 黃柏入胃經血分故潤腎滋陰消痰定嗽止渴除煩

火入於肺則煩瀉腎家有餘之火是其

本功至於清金諸效良由相火不炎自

分 二藥每相須而行

退有汗

利二便消浮腫

小便則

腫消東垣

而不渴乃肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜用瀉之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便祕

化小便自通丹溪曰小便不通有熱有濕有盛結於下宜清宜瀉宜升又有隔一隔三之治如肺不燥但

膀胱熱宜瀉膀胱此正治如因肺熱不能生水則清肺此隔二之治如因脾濕不運而精不上升故肺不

能生水則燥胃健脾此隔三之治瀉膀胱黃柏知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二水之類

凡病皆有隔二隔三之治不獨便祕也

能生水則燥胃滑腸令人作瀉

李本草通元藥性解曰苦寒肅殺非長養萬物者也世以其茲陰用治虛損則如水益深矣

得酒良上行酒浸下行鹽水拌忌鐵

貝母
開肺化痰

甘微寒瀉心火辛散肺鬱

入肺經氣分心火降則肺氣清詩曰潤心肺化

氣化之源

表裏肺爲瘻瘤結

乳閉產難功專散結除熱敷惡瘻斂瘻口火降邪散瘻口自斂非貝母性斂也能入肺

治燥非脾家所喜

汪機曰俗以半夏燥毒代以貝母不甘貝母寒潤主肺家燥何可代也故凡風寒濕熱諸症貝母非所宜也宜用半夏南星

川產最佳圓正底平開瓣味甘

象山貝母體堅味苦去時感風痰

土貝母形

大味苦治外科證痰毒俱去心擣用厚朴白微爲使畏秦苑反烏頭

上時感風痰土貝母形

白頭翁

涼血苦堅腎寒涼血入陽明血分

腸大治熱毒下痢

仲景治熱痢有白頭翁湯合黃連黃柏秦皮東垣曰

腎欲堅急食苦以堅之病則下焦虛故以純苦之劑堅之

溫瘡寒熱齒痛骨痛

腎主齒骨屬陽明鼻齶禿瘡瘰疬瘻瘍血痔偏

墜

明目消疣血分無熱者忌

藥肆中多於統柴胡內揀出用之然必頭

上有白毛者方真得酒良

白前

篇肺降氣下痰辛甘微寒長於降氣下痰止嗽治肺氣壅實

喉中作水聲者服之立愈

胸膈逆滿

肺實者宜否則忌也

似牛膝粗長堅直脆而易斷者白前也短小柔軟能彎

不

斷者白微也

近道多有形色頗同以此別之

去頭鬚甘草水浸一伏時焙用忌羊肉

白微

熱

苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身熱支滿忽忽不知

人陰虛火旺則內熱生風火氣焚灼故身熱支滿痰隨火湧故不知人

血厥

汗出過多陽氣獨上氣塞不行而厥婦人尤多此證宜

白微湯白微當歸各一兩參五錢甘草錢半每服五錢

淋。溫。瘧。寒。熱。凌。痛。寒熱作則勞氣不
能內榮故癆痛

婦人傷中淋露。

血熱孫真人一千金方白微散治胎前產後遺寒不暖時白微白芍藥等分煎調

服丹溪曰此卽劉河間原病式所謂熱甚延孔繩結神無所全不能收禁之意也延孔女人之漏孔也

產虛煩嘔。

經濟云古方經種子往往用之蓋不孕緣於血熱而其源於真陰不足

陽勝而內熱故營血日枯也益陰清熱則血自生汪而有子矣非任以歸地芍藥杜仲於芩等藥

輒去鬚酒洗惡大黃大戟山茱薈棗。

肺實鼻塞不通同貝母黃各一兩百部二兩米飲服末一錢

白茅根。

涼血止暟

甘涼入手少陰心足太陰陽明。

脾胃除伏熱消瘀血利小便解酒毒

治吐衄諸血。

心肝火旺逼血上行則吐血肺火盛則衄血茅根日和血寒涼血引火下降故治之撲損瘀血清汁服名茅花湯亦治鼻衄產淋

則崩

傷寒

噦逆。

卽呃逆說文云噦氣接也許說文解字周易說文字原

肺熱喘急。

內熱煩渴。

血寒則渴酒蒸服一錢濃一孔二針或二孔

黃疸水腫。

清火行水時珍曰貞藥也世人以微而忽之惟事苦寒之藥傷仲和之氣烏足歎此哉

鍼能瀆膿。

酒蒸服一錢濃一孔二針或二孔

花能

止血。吐血因於虛寒者非所宜也。

白鮮皮。

通法風濕

氣寒善行味苦性燥入脾胃除濕熱兼入膀胱小腸行水道通關節。

利九竅爲諸黃風痺之要藥。

一味白鮮皮湯治產後風時珍

兼治風瘡疥癬女子陰中腫毒。

與猪胰所致乘虛客腎

下部虛寒雖有濕證勿可餌也。

近道處處有之以四川所產爲良江寧府滁州潤州所產俱次之根黃白而心實取皮用。

苗爲茱萸惡桑螵蛸桔

梗茯苓草薢。

風癩已破出膿血白鮮者汗服效

延胡索。

宣活血利氣

辛苦而溫入手足太陰肺厥陰心包

能行血中氣滯氣中血滯通小

便除風痺治上下內外諸痛。通則不病癥瘕崩漏月候不調。

氣血不和因時至

產後血暈暴

血上衝折傷積血爲活血利氣之藥然辛溫走而不守。

獨用力迅宜兼

通經墮胎瘀

滯有餘者宜之生用破血炒用調血。酒炒行血
醋炒止血經事先期虛而崩漏產後虛運均

忌之。

根知半夏黃色而堅

落得打

宣行血止血

甘平治跌打損傷及金瘡出血並用根煎能行血。

醋炒或燒敷之不作膿

苗高尺

許葉如白荷

根如玉竹而無節擣爛則黏。

開金鎖

宣扶風濕

苦平祛風濕治手足不遂筋骨疼痛與蒼朮當歸同用甚效。

產江

浙苗高三四尺葉如草薢根如何首烏而無稜肉白色而無紋似菝葜而無刺。

冬蟲夏草

補肺腎

甘平保肺益腎止血化痰已勞嗽

四川嘉定府所產者最佳雲

南貴州所出者次之冬在土中身活如老蠶有毛能動至夏則毛出土上連身俱化爲草若不取至冬則復化爲蟲重之以充方物

錦地羅

鴉鴉解

微苦平治山嵐障毒瘡毒並中諸毒以根生研酒服二錢七卽解。

出廣西慶遠山巖間鎮安歸順柳州皆有之根似萆薢及括蔞根狀彼處人頗珍重之以充方物

水仙根

鴉鴉解

苦微辛寒滑治癰疽及魚骨哽

花

一名金臺

主治作香澤塗身去風

氣又療婦人五心發熱。

胡潔衛生下簡方同。乾荷葉、赤芍等分爲末，白湯調服，每服二錢，熱自退。

本草從新卷二

草部
類芳草

當歸
補血潤滑腸

甘溫和血辛溫散內寒苦溫助心散寒

諸血屬心凡通脈者必先補心當歸苦溫助心

入心肝脾

血肝藏血脾統血

爲血中氣藥治虛勞寒熱欬逆上氣

血和則氣降

溫瘧

厥陰肝邪

澼痢頭痛腰痛心

腹肢節諸痛

和血散寒

跌打血淋作脹風痙無汗

身強項直角弓反張曰痙無汗曰剛痙有汗爲柔痙當歸辛散風溫和血產後亦有癱痙者以

脫血無以養筋也宜十全大補湯

痿痺癥瘕

筋骨緩縱足不任地曰痿風寒濕客於肌肉血脈曰痹

痘證癰疽瘡瘍衝脈爲病氣逆

裏急帶脈爲病腹痛滿腰溶溶如坐水中

衝脈起於腎下出於氣街挾躣上行至胸中上頸參諸陽氣諸經下行入足太陰三陰並陰爲十二經脈之海主血帶脈橫

及婦人諸不足一切血證陰虛而陽無所附者潤腸胃澤皮

膚去瘀生新溫中養營活血舒筋排膿止痛

血和則痛止

使氣血各有所歸故名

血虧能補血枯能潤血亂能撫蓋其辛溫能行氣分使氣調而血和也東垣曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流全活血而統治雷敷海蔴並云頭破血時珍曰治上用頭治中用身治下用尾統治

全用雷敷著雷公御家論時珍曰此

極善滑腸瀉者禁用

當歸爲君白芍爲臣黃芩爲佐芍藥爲使名四物湯活血之藥劑血虛則陰純陰不能生血氣虛血弱之人當用參耆以取陽壯生陰之義

川產力剛善攻秦產力柔善補以秦產頭圓尾多肥潤氣香裏白不油者爲良名馬尾當歸尾粗堅桔者名鐵頭當歸只宜發散用宜酒製治吐血宜醋炒畏菖蒲海藻生薑惡濕麵

當歸和酒服當歸生薑子死

出不

白芍藥

補血瀉陰

苦酸微寒入肝脾血分

白芍補脾陰

爲手足太陰行經藥

瀉肝火

肝以散爲補

安肺固腠理

肺生皮毛脾主肌肉肝木不耗土則脾安土

俱太陰病不可缺此寒鴻冷痛忌用古方治腹痛白芍四錢甘草二錢名芍藥甘草湯善腹痛因營氣不

從鍊於肉裏白芍能調營氣甘草能緩逆氣又痛爲肝木耗脾土白芍能復肝故也其治腹痛止血虛腹

氣酸主收斂

緩中止痛

東垣曰損其肝者緩其中卽調血也

除煩歎汗退熱安胎治瀉痢後重血虛腹痛

瀉

痛餘痛不治以其酸寒

脇痛

脇痛者肝膽二經來往之道其火上冲則脇

收斂無溫散之功也

酸

其收降之性又能入血海

衡脈藥血海

男女皆有之而至厥陰經治鼻衄目澀肝血不足小兒痘瘡

肝

地紅血散毒不附

婦人胎產及一切血

同白朮補脾同參耆補氣同歸地補血同芍藥瀉肝

湯和營衛酒炒加入補中益氣

又曰產後忌用

丹溪曰以其酸寒伐生生之氣也必不得已酒炒用之可耳時珍曰產後肝血已虛不可再瀉也

宗奭本草衍義曰減芍藥以避中寒體寒如芍藥古人猶諱諱戒謹况大苦大寒可肆行而莫之忌耶接

產後虛熱多汗陰氣失敗用白芍以此斂之取帶寒以退虛熱正其相宜前言亦失之太過耳景岳全書

爲中正內所論極

赤芍藥

散瘀

瀉肝火散惡血利小腸治腹痛脇痛堅積血癰疤痕

邪聚外腫爲瘕腹內爲瘕

腸風癰腫目赤

皆散鴻

白補而斂赤散而瀉白益脾能於土中瀉木赤散邪能行

寒制其

下痢後重不炒惡芒硝石斛畏鼈甲小薊反藜蘆

利小腸治腹痛脇痛堅積血癰疤痕

邪聚外腫爲瘕腹內爲瘕

經閉

菖蒲
宣行氣搜風

平溫升浮爲少陽引經

入手足厥陰心包乃血中氣藥升清

陽而開諸鬱

丹溪曰氣升則鬱自除
爲通陰陽氣血之使

潤肝燥而補肝虛

東垣曰頭痛必用之如不愈加
散之辛以補之之意也

上行頭目下行

頭目下

行血海

搜風散瘀止痛調經治風濕在頭諸種頭痛

東垣曰頭痛必用之如不愈加
散之辛以補之之意也

黃丹溪曰諸經氣鬱亦能頭痛

偏正頭風腹痛脇風氣鬱血鬱血痢寒瘲筋攀目淚多

涕

肝風木爲病

諸風散掉及癰疽瘡瘍

頭

謂不及火熱搏之則流溢而行速爲太過氣鬱邪入血中爲陽滯於陽以致生惡毒百病則皆由此起

菖蒲酸寒爲陰歸辛溫爲陽故四物湯取其相濟以行血藥之帶耳川芎辛散豈能生血者乎治法云婦人經過三月用川芎末空心熱湯調一

趕發者用是經期

男婦一切血證

菖蒲根口臭水煮

使畏黃連硝石滑石惡黃耆山茱萸

菖蒲含之佳

牡丹皮

鴟伏火去瘀

辛苦微寒入手足少陰心腎

厥陰心包

瀉血中伏火

色赤故入血分能瀉諸經伏火古方所以用活

相火世人專以黃柏治

不知丹皮之功更勝

和血涼血而生血

血熱則枯涼則生

而屬陰本靜因相火所發故越出上竅

治驚癇瘻癰

筋脈抽掣爲瘻癰或手足抽掣口眼喝斜卒然眩

錢時發時止爲瘻皆陰虛血熱風火相搏瘻隨火湧所致

除煩熱療癰瘻涼下胞胎退無汗之骨蒸

張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地骨皮治有汗之

氣丸用丹皮治神志不足也接內經云水之精爲志故腎藏志火之精爲神故心藏神

胃氣虛寒經行過期不淨者勿服胎前亦宜酌

用。單瓣花紅者入藥。

時珍曰花白者補赤者利須分別之也

肉厚者佳。酒拌蒸用。畏貝母菟絲大黃。

忌蒜胡荽伏砲。

丹皮根燒末服解中蠱毒

澤蘭通行血治水

苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾微溫行血入足太陰厥陰。

脾通九竅利肝

關節破宿血通月經消癥瘕散水腫。

甘溫能和血行血獨入血海攻擊滯留其水腫者乃好化爲水之水非脾歸停滯之水也

治產後

血瀝腰痛。

療行未盡古方澤蘭丸甚多近今

身面浮腫吐血鼻衄目痛頭風癰毒撲損。

性雖和緩終是破血

之品無瘀者勿輕用。

稟賦漸薄不可常用

時珍曰蘭草澤蘭一類二種俱生下隰

紫根素枝赤節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓節長葉光有岐爲蘭草莖微方

節短葉有毛爲澤蘭嫩時並可按那

而佩之楚詞所謂紓秋蘭以爲佩也。

朱子難疑解讀

云必花葉俱香纔無變方可刈佩今之葉蘭花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩

澤蘭走血分消水腫塗癰毒破瘀除癥爲婦人

要藥。蘭草走氣分利水道除痰癖殺蟲辟惡爲消渴良藥。

經曰數食肥甘等爲消渴治之以蘭所以除陳氣也

朱子難疑解讀

名大澤蘭。

與澤蘭俱生下濕之地故也

俗呼省頭草。

夏月採置髮中則髮不膩

蘭澤草香草。

根油塗髮去垢香澤故名蘭澤又名香草

朱子難疑解讀

爲山蘭誤矣。

蘭或以爲都梁香或以爲澤蘭或以爲閑蘭當以澤蘭爲正今之所種如麥門冬者名蘭

蘭非真蘭也故陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊今所謂蘭其葉如茅者根名土蘿蘭因花穗都故得蘭名楊升菴云世以如蒲蒼者爲蘭尤誤之受譏也久矣

又吳與登草廬集有蘭說云蘭爲醫總上品有枝有莖草之苗者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指爲離騷之蘭矣氏本草謂於流俗反疑舊說爲非夫醫經爲實用豈可譏哉今之蘭果可以利水殺蟲而除痰癖乎其種盛於閩未子閩人豈不識其土產而辨析若此世俗至今猶以非蘭爲蘭何其惑之甚也姑按時珍之辨蘭草指實詳明語據鑒鑒則蘭草爲澤蘭之一類二種也夫復何疑若山蘭葉

全無氣味於以上之稱名不守何能有以上之功效乎。汪氏力辨蘭草爲山蘭葉但並無實據此不過爲臆度之見爾。

士林所著本草叢收蘭葉致無識之醫遂有加捷蘭葉爲引者也。

馬蘭血瀉涼

然開

鬱金

宣解鬱鴻
涼血破瘀

辛苦微甘氣寒其性輕揚上行入心及包絡兼入肺經涼心熱散肝

鬱破

血下氣

治吐衄尿血婦人經脈逆行

經不下行上爲吐衄證用鬱金末加韭汁薑汁童便服其血自清矣。瘀中帶血者加竹瀝。

諸痛產後敗血攻心顛狂失心

頭多喜笑尙知畏懼證屬不足狂多忿怒人莫能制。

因瘀血凝而痘瘡陷伏者可用。

血氣

金丸

鬱金散惡血白藥化頑痰

痘毒人心

瘀陷伏者可用。

陽毒生肌定痛

能開肺金之鬱故名今醫

用此開鬱

罕效如真陰虛火亢吐血不關肺肝氣逆不宜用也。

近日鬱證多屬血鬱用破血之藥開鬱不能

致不救者多矣

開而陰已先敗速驚之者俱峻削性烈按虛者大忌

出川廣體銳圓如蟬肚外黃內赤色鮮微香折之光明脆徹苦中

帶甘者乃真

今市中所用者多是鬱黃並有以蓬蕤速驚之者俱峻削性烈按虛者大忌

薑黃

行氣破血

味若辛溫色黃入脾兼入肝經理血中之氣破血下氣

辛散苦泄專於破血下氣其旁及者

耳除風消腫性更烈於鬱金治血積氣脹產後敗血攻心通月經療撲損片子者

時珍曰入臂治痛其兼理血中之氣可知矣

色青三物不同所用各別經疏云薑黃主治介乎二種鬱金之間時珍曰薑黃鬱金姜黃形狀功用大略相近但鬱金入心專治血薑黃入脾兼治血中之氣進入肝治氣中之血稍爲不同時以涌如蟬者爲片子薑黃如蟬腹者爲蟬肚鬱金蟬形雖似鬱金而色青不獨爲異耳

能入手臂治風寒濕痺痛

理血中之氣可知矣

色青三物不同所用各別經疏云薑黃主治介乎二種鬱金之間時珍曰薑黃鬱金姜黃形狀功用大略相近但鬱金入心專治血薑黃入脾兼治血中之氣進入肝治氣中之血稍爲不同時以涌如蟬者爲片子薑黃如蟬腹者爲蟬肚鬱金蟬形雖似鬱金而色青不獨爲異耳

蓬莪遜

瀉血消積破血

辛苦而溫主一切氣又能通肝經聚血行氣消瘀通經化食止痛

治心腹諸痛冷氣吐酸奔豚痃癖

酒醋磨服拔音質小腹積痃癖多見於男子疝瘕多見於婦人並連香烈行氣塊瘕同三棱用治積聚諸病按五積心積

曰伏案起牀上至心下肝積曰膽氣在左膀肺積曰息竅在右肺脾積曰痞氣在胃肺右側腎積曰奔豚

在小腹上而至心下治之不可專用攻伐恐直於破血行氣藥中加補胃藥氣壯力能勝積也經

曰大積大聚其可犯也表其半而止過者卽死東道五積方凡用三棱莪朮皆兼人參贊助以成功

中惡鬼疰

濕矯雜滯陰陽乖隔鬼疰憑之利氣轉癥邪無所容矣

虛人服之積未去而真已竭兼以參朮或庶幾

耳根如生薑

莪朮生根下似卵不齊堅硬難搗灰火煨透乘熱搗之分入氣

酒磨或煮熟用

分入血

荆三稜

鴟破血行氣消積

苦平入肝經血分破血中之氣

亦能通肝經聚血

散一切血瘀氣結瘡硬食

停老塊堅積消腫止痛通乳墮胎功近香附而力岐

按化積必藉氣運專用伐射氣愈不運積安得去須輔以健脾補氣爲要一色黃體重若鯽魚而小者良醋

浸炒或麵裹煨

三棱兩半丁香三分爲末沸湯服一錢治反胃藥食不下

香附

一名莎草根宣調氣解鬱

氣香味辛能散微苦能降微甘能和乃血中氣藥痛行十二經入脈氣分主一切氣

人身以氣爲主氣盛則強虛則衰順則平逆則病絕則死矣經曰怒則氣上心則喜下喜則氣緩悲則氣消驚則氣亂思則氣結勞則氣耗又曰寒則氣收熱則氣

泄名九氣以香附爲君隨

證而加升降消補之藥

利三焦解六鬱

痰鬱火鬱氣鬱治多怒多憂淡飲積聚瘡滿腹

脹霍亂吐瀉

癰疽瘡瘍瘍瘍

此代茶大凡瘡疽瘍瘍

血瘀氣滯所致香附末服名獨勝丸治瘧疽由鬱怒而得者如瘡初作以

行成塊者氣之凝

癰疽又感間生極痛楚半載

張王夢授以方

蜜汁製香附爲末每服二錢米飲下遂愈

吐血便血崩中帶下月候不調

氣爲血配血因氣行成塊者氣之凝

縣丁而無氣之毒行後作暗氣而俱虛氣亦處也名紫氣之黑色黑則氣之甚也可經者氣之亂體

人痰多而經脈氣不運也香附降中主氣之藥氣順則血和暖然須輔以涼血補氣之藥丹溪曰能引血
藥生氣分而生血宜

諸種氣痛胎產百病

持珍曰得參朮則補氣得歸地則補血得木香則散
滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得

芎窮蒼朮則通解諸鬱得桔子黃連則清降火熱得茯神則交濟心腎得菖蒲故紙則引氣歸原得厚朴半夏則決壅消悶得玄参葱白則發汗苦杏得三棱苦遂則治癰痞拘得艾葉則治血氣侵于宮乃氣

病之物司女科之仙藥也大抵婦人多鬱氣行則搘解故服之才效非宜於婦人不宜於男子也又曰凡人病則氣清治煩香附爲氣分君藥臣以參者佐以甘草治氣滯其速也

苦燥而能耗

血散氣

士材曰乃治標之品惟氣質而未大虛者宜之不然恐損氣而耗

藥之一語皆未有發明及此者

產金華者良生則上

行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎旁徹腰膝童便浸炒鹽水浸炒則入血分青鹽炒則入腎酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚且斂其散蜜水炒制其燥性薑汁

炒則化痰飲炒黑又能止血忌鐵

治暗耳出汁香附爲末以蘇枝送入

木香宣行

辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣疏肝氣和脾氣

怒則肝氣上肺

氣調則金能制木而肝平木不缺土而脾和

治一切氣痛

時珍曰諸氣體皆屬於肺上焦氣滯用之者全賴泄之地中氣不運皆屬於脾中焦氣滞用之者脾胃喜芳香也大陽氣滯則後

重游肺氣不化則壅閉肝氣鬱則爲痛下黑氣滯用之者舉者通之也

中氣不省

閉目不語如中風狀爲末冬瓜子煎湯灌下三錢

一夜入麻油浸

湯滴耳一合煎

嘔逆反胃霍亂瀉痢後重

同橘榔用劉河間曰行血則便臍自愈調氣則後重自除

瘡閉痰壅氣結痃癖癥

塊腫毒衝脈爲病

氣逆裏急殺鬼物禦瘴霧去腋臭健胃寬中醒脾消食開鬱安

胎氣變則胎不安

香燥而偏於陽肺虛而熱血枯而燥者慎勿與之

丹溪曰味辛氣升若陰火

管上者反助火邪當用黃柏知母少以番舶上來形如枯骨味苦黏舌者良名青木香今人皆稱爲廣木香南木香

本草從新 卷二 草部

木香

磨汁用東

垣用黃連製亦有蒸用麵裹煨用者。

懷用實
陽止瀉

畏火。

本草內有番白芷狀同但色微黑體
接今人稱為烏柏根根爲子青木舌

砂仁 卽培砂仁
宣行氣調中

辛溫香竄和胃醒脾快氣調中通行結滯治腹痛痞脹。

入而痞者有食壅波寒而痞者有脾虛氣消而痞者須分虛實治之不宜專用利氣藥丸變爲散明指腹內脹而外有形痞脹脹而脹而已皆太陰爲病也霍亂轉筋噎膈嘔吐

上氣欬嗽奔豚崩帶赤白瀉痢。

濕熱積滯客於大腸
砂仁亦入大小腸經

祛痰逐冷消食醒酒止痛安胎。

散咽喉口齒浮熱化銅鐵骨硬。

好古曰得圓香荳蔻入肺得人參益智入脾得赤石脂入大小腸白飛龍通砂仁亦入大小腸經

氣不歸元用爲向導除胎桂附熱藥爲害。

地黃用之拌蒸亦取其下達也經疏曰腎虛辛竄性燥血虛火炎者勿用胎婦多服耗氣必

致難產。

出嶺南炒去衣研。

百一選方治魚骨入咽砂仁甘草等分爲末縣包含之鹽汁當隨痰出

白荳蔻 宣行氣
燥濕祛寒

辛熱流行三焦溫緩脾胃。

三焦利脾胃
還諸證自平

而爲肺家本藥。

肺主氣
散滯氣消

酒積除寒燥濕化食寬膨治脾虛瘧疾風寒腹痛吐逆反胃。

白睛翳肺
能散胃經太

陽經目眴紅筋。

太陽脈
起目眴
砂仁甘草等分爲末縣包含之鹽汁當隨痰出

火升作嘔因熱腹痛氣虛諸證咸宜禁之。

番舶者良去。

衣微焙研細末。

胃滑惡心食卽欲吐白
豆蔻三枚搗細好酒服

草豆蔻 國產名草蔻
燥濕祛寒

辛溫香散暖胃健脾燥濕祛寒治寒客胃痛霍亂瀉痢噎膈反

而微長皮色黃白薄而稜峻仁如砂仁辛香氣和去膜微炒香同細辛末含去口

臭。

草果貨廣所產名草
果除拔截處

辛熱破氣除痰消食化積據情治瘧厲寒瘻

佐常山能截瘻或與知母同用取其一陰一陽治寒

熱瘴癆蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也

若瘻不由於嵐障氣不實邪不盛者並忌

形如訶子

皮黑厚而稜密子粗而辛臭麵裹煨熟取仁用忌鐵

肉豆蔻

一名肉果
蓋中寒腸

辛溫氣血理脾暖胃下氣調中

日華稱其下氣以脾得補而善運
熱自下也非若陳皮香附之泄耳

逐冷除

痰消食解酒辟鬼殺蟲治積冷心腹脹痛中惡吐沫小兒吐逆乳食不下又能滯

大腸止虛瀉冷痢

病人有火瀉痢初起皆不宜服

出嶺南似草蔻外有綢紋

內有斑紋糯米粉裹或麵裹煨熟須去油浮忌鐵陰寒滑利腹痛不能食肉果錯
和火裏誤爲末粥飲滿服一錢

破故紙

一名補骨脂
燙補命火

辛苦大溫入心包命門補相火以通君火暖丹田壯元陽縮小

便亦治遺溺

治虛寒喘嗽能納氣歸胃

腰膝痠痛腎冷精流火虛泄瀉

食減少腹脹陽鳴腹瀉如鼎鑊之下無火物終不熟故補命門相火以生土破故紙四兩五味三兩肉桂二兩吳萸一兩薑煮環火名四神丸治五更之泄篤也

婦人血氣

說氣陷亦猶男子之督冷營流也

墮胎陰虛有熱大便閉結者戒之

出南番者色赤嶺南者色

綠酒浸蒸用亦有童便乳浸鹽水炒者得胡桃胡麻良惡甘草

唐本草相國方破故紙
兩酒浸蒸爲末胡桃二十兩去皮研蜜調如饴每晨酒服一大匙治虛寒喘嗽腰脚痠痛忌羊血共熬加杜仲名青夢丸白飛霞曰故紙屬火空固元陽胡麻屬木潤燥養血有木火相生之妙也

益智子溫脾胃補心氣命門

辛熱本脾藥兼入心腎主君相二火補心氣命門之不足能濬精

固氣又能開發鬱結使氣宣通溫中進食攝唾涎

胃冷則涎

縮小便腎與膀胱相表裏益智子

同烏藥等分酒煮山藥糊丸下名炮泉丸也

治客寒犯胃冷氣腹痛嘔吐泄瀉精崩帶

血燥有熱因

熱而崩帶遺濁者不可悞入也 出嶺南形如棗核取仁鹽水炒

腹脹忽癥不止諸藥不效濃鹽益智

之飲

蛇牀子

補腎命去風濕

辛苦而溫強陽補腎散寒祛風燥溼殺蟲治陰痿囊濕女子陰痛

除癰

濕生瘡同
燙煎湯洗

子藏虛寒產門不閉

炒熟

之腎命之病腰痠體痺帶下脫肛及頑癬

惡瘡

擦之多效

風濕諸病煎湯浴止風癩

時珍曰腎命三焦氣分之藥不獨補助男子而且有益婦人世人舍此而求補藥於遠城豈非貴耳賤目乎

火易動者勿食似小茴而細微炒殺毒則不辣

以地黃汁拌蒸二遍爲尤佳

惡丹皮貝母巴豆

出南番嶺南亦有類棋子而長青色去挺醋浸一宿焙乾刮薄皮粟子淨免傷人肺

衛生易簡方鼻流清

辛熱緩胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛

凡心口一熱或有蟲及因怒因寒而起以良薑

菖蒲

宣通經氣
冷散浮熱

辛熱除胃冷祛痰消食下氣治水瀉氣痢虛冷腸鳴

亦入大腸經

嘔

吐酸水

冷淡惡心痃癖陰疝辛散陽明之浮熱治頭痛

偏頭風者口含溫水隨左右以末吹一分入鼻孔

牙痛

寒痛宜乾薑草姜細辛熱痛宜石膏牙齦風痛宜生角鬚草房二鳥蟲痛宜石膏灰雄黃之類

鼻淵

古方用此甚少以其耗散真氣動脾

肺之火且損目耳

出南番嶺南亦有類棋子而長青色去挺醋浸一宿焙乾刮

去皮粟子淨免傷人肺

衛生易簡方鼻流清
用菖蒲末吹之效

良薑

宣通經氣
散寒

辛熱緩胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛

有渴或有蟲及因怒因寒而起以良薑

酒洗七次香附醋洗七次研因寒者薑二錢附一錢因怒者附二錢鹽一錢寒怒兼者每一錢五分米

飲加薑汁一匙鹽少許服

古方治心脾痛多用良薑寒者用之至二錢熱者亦用四五分於清火解中

取其辛溫下氣
止痛有神耳

嵐瘴瘧疾霍亂瀉痢吐惡嘔膈冷癖

虛人須與參朮同行若單用

多用恐犯冲和之氣出嶺南高州東壁土拌炒用紅豆蔻

即良藥子宣
燥溼肺醒脾溫肺散寒

醒脾燥濕消食解酒禁忌製用

同上

藿香宣去惡氣辛甘微溫入手足太陰肺快氣和中開胃止嘔去惡氣進飲食治霍亂吐

裏消和芳香之氣爲肺脾達氣要藥局方

瀉心腹絞痛上中二焦邪滯

有藿香正氣散正氣通暢則邪氣自除

陰虛火旺及胃熱

虛作嘔者戒用出交廣方

莖有節葉微似茄葉古唯用葉今枝梗亦用因葉多

冷露瘡藥藿香葉細茶等

僞也

分燒灰油調金之良

白芷宣發表祛風濕濕

性溫氣厚行足陽明戊土胃芳香上達

入手太陰辛金

肺故主治不離三經通竅發汗除濕散風治頭目昏痛

陽明之經禁於所故治頭

目諸疾楊吉老方白芷湯泡四五錢煎九服

子大名都梁丸每服一丸煎水貼眼

下

眉稜骨痛風熱頭痛同酒浸黃芩爲末蒸下

牙痛上根屬足陽明下根

於所故治頭

白芷潤肺主鼻風熱藥肺上壅以潤故鼻多塞第而潤經曰潤

宜同新辛辛承志之

目癢淚出面酐

十去聲

百黑氣

瘻瘍可作面貼

皮膚燥

養三經風熱之病及血崩血閉腸風痔瘻疽瘡瘍瘍

元以銀丹敷處酒擦下白芷末五錢種白芷能辟

致癰血淤鐵鏈致脾腹冷痛須以此排之

自後尾上攻血虛頭痛多在日晚宜四物加辛芷氣虛頭痛多在清晨宜葛根倍參耆蜜松石

保壽堂經驗方治偏頭風白芷川芎各三錢搽牛膝上加酒擦其熱食盡醉則其病如失

燥能耗血散能損氣有虛火者勿用癰疽已潰宜漸減去色白氣香者佳

名白芷香

不香者名水白芷不堪用微倍當歸爲使惡旋覆花。

藁本

宣去風寒濕

辛溫雄壯爲太陽經風藥

膀胱寒鬱本經頭痛連腦者必用之

凡癩頭痛宜

藁本防風酒

炒升藥

治督脈爲病脊強而厥

督脈並太陽經實脊

又能下行去濕治婦人疝瘕陰寒腫痛腹

和白芷作面貼

中急痛

皆太陽經寒濕

胃風泄瀉

夏英公病泄醫以虛治不效霍晝曰此風客於胃也飲以姜本湯而愈蓋本能除風濕耳

粉刺酒皰

作面貼

貞按頭痛挾內熱及傷寒發於春夏陽證頭痛不宜進也

小兒外敷藁本煎湯浴並浣衣

虛氣香味麻惡蘭若

小兒外敷藁本煎湯浴並浣衣

香薷

宣通利濕退熱

辛散皮膚之蒸熱溫解心腹之凝結屬金水而主肺爲清暑之主藥

暑必兼濕治暑必兼利濕

肺氣清則小便行而熱降

若無濕但爲乾熱非暑也

治嘔逆水腫

蒸薑根小便利則消

脚氣口氣

薰湯單服治霍亂轉筋

香薷乃夏月解表之品無表邪者戒之

其性溫熱除暑宜以溫散若陽暑

則宜清涼或服之反成大害時珍曰有處高堂大厦納涼太過飲冷太多陽氣爲陰邪所遏反中入內

病頭痛寒燒口渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散邪和脾則愈若飲食不節勞倦作喪之人傷暑

汙出如雨煩渴或渴吐者乃內傷之證宜用清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火谷元若用香薷是重虛其表而益之熱矣今人謂能解暑微用代茶是開門揖盜也

經所謂治溫以清涼而行之也孰知作藥小兒髮遲陳者二兩水一盞煎汁三分入猪脂半兩和塗白朮擦痛加胡粉而和塗之

荆芥

一名假蘇發表祛風理血轉宣

辛苦而溫芳香而散入肝經氣分兼行血分其性升浮能發汗

散風濕利咽喉清頭目治傷寒頭痛中風口噤身強項直口面喫斜目中黑花其氣溫散能助脾消食

氣血入牌

通利血脉治吐衄腸風崩中血痢產風血運

蘆後去血過多腹內空虛

則自生風故常有崩暈之患不待外風襲之也。消瘀最能散血中之
風華陀愈風散疥三錢微焙爲末豆淋酒調服或章便服諸家云其

瘰癧瘡腫清熱散瘀破結

解毒

結散熱清則爲風病血病瘡家聖藥

功本治風又兼治血者以其入

今人但遇風證

概用荆防此流氣散之相沿耳不知唯風在皮裏膜外者宜之若風入骨肉者須
防風不得混用連穗用

穗在於頭故善升發

治血炒黑用

風木之蟲即是鱉血之地也

今人但遇風證

河豚鱸肉

紫蘇

宣發表寒

味辛入氣分利肺下氣定喘安胎

治子氣

色紫兼入血分和血止痛性溫

發汗解肌祛風散寒氣香開胃益脾寬中利大小腸又解魚蟹毒

時珍曰同陳皮砂仁行氣安胎同藿香

香烏藥溫中止痛同杏仁消痰定喘同木瓜厚朴散濕解暑治霍亂腳氣

氣虛表虛者禁之

喜

氣古稱芳草致豪貴之疾此類是也氣香者良宜橘皮忌鯉魚

蘇子

治寒氣

開鬱降氣

蘇葉力倍

消痰利膈溫中寬腸潤心肺止喘咳

治子氣

腸滑氣虛者禁之

宣

氣順氣安胎功力稍緩挾虛者宜之

雞蘇

一名水蘇薄荷輕散熱理血

辛而微溫清肺下氣理血辟惡消穀治頭風目眩肺痿血痢

吐衄崩淋喉腥口臭邪熱諸病

辛烈之物走散真氣虛者宜慎

方莖中虛似

蘇葉而微長密齒而皺

薄荷

輕宣散風寒

辛能散涼能清

本經溫蓋體而用涼也

升浮能發汗搜肝氣而抑肺氣疏逆和中宣

滯解鬱消散風熱清利頭目治頭痛頭風中風失音痰嗽喘氣語濇舌胎。

含漱或
和蜜茶

之眼耳咽喉口齒諸病。

辛香疏竅
而散風熱

皮膚癰癧瘡疥驚熱。

小兒治醫藥有
用薄荷湯

骨蒸消宿食。

止血痢。

血病病在凝滯
辛能散涼能清

通關節定霍亂。

貓蟻蛇傷
薄荷酒

驚熱用薄荷湯。

桔汁塗之。辛香伐氣多服損肺傷心虛者遠之。

每見小兒多食薄

蘇州所蒔者莖小

荷葉者汗多體弱

蘇州所蒔者莖小

而氣芳最佳江西者稍粗次之四川者更粗又次之野生者莖葉氣味都相似入藥以蘇產者爲勝。

張果醫說方炙火毒氣入內兩股生瘡
汁水淋漓者用薄荷煎汁頓立愈

甘松香。

宣理氣
醒脾

辛甘溫芳香理諸氣開脾鬱。

時珍曰少加入脾
胃藥中甚醒脾氣

治風疳齒齦腳氣膝浮。

辛散心腹痛滿。

下惡氣

味雖甘專竟辛香伐氣挾虛者忌之。

出松州涼州遼

州等處葉細如茅草用根。

根極繁密八月采之
作湯浴令人身香

山奈。

俗作二柰
宣酒中辟惡

辛溫暖中辟瘴癘惡氣治心腹冷痛寒濕霍亂風蟲牙疼。

辛香

伐氣甚於甘松香不宜輕服。

產拂林國今廣中亦栽之根葉皆如生薑與甘松良薑俱用入合諸香用。

嫩酣草。

宣酒中辟惡

辛溫芳香暖中辟惡去臭氣止霍亂吐瀉。

忌同上

尖葉大如指

甲有枝梗夏月開細紫花成簇結子亦細今人俱盆內種之婦人摘其頭以插髮

茉莉花辛熱主治蒸油取液作面脂頭澤長髮潤燥香肌亦人茗湯以其無毒也。

根辛熱有毒主治以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒二寸二日三寸三日凡跌
損骨節脫臼接骨者用此亦不知痛也茉莉原出波斯移植南海今中華俱栽
蒔之臺灣所栽者最佳福州者次之贛州者又次之

本草從新卷三

草部

類草

生地黃大渴火逆

味苦微甘大寒入心腎瀉丙火

小腸爲丙火心與

清燥金

胃火

平諸血

逆消瘀通經治吐衄崩中

垂血者血隨唾出咯血者隨痰咯出或帶血滲出腎經及肺經自兩脣

總上吐出者屬肝經

吐出輒出成盆成碗者屬胃經

而出於內

有血衄者血溢於腦從鼻而出者並屬肺經

經血止日崩血暴則妄行故宜以此清之

諸

大熱毒大渴引飲折跌絕筋

生地一斤瓜瓣搗一斤生薑四兩炒熟臘傷處折筋易之又生地汁三升酒升半煮服下撲

海上方鵝汁和轉作轉能利出蟲忌用鹽

熱毒痢疾腸胃如焚傷寒溫疫痘證

血熱紅紫

諸

便又能殺蟲治心腹急痛

海上方鵝汁和轉作轉能利出蟲忌用鹽

必燥結有實火者方可用

生掘解

者搗汁飲之

熱渴皆沉地黃

乾地黃養陰

苦甘而寒沉陰而降入手足少陰心腎陰肝

心包

及手太陽經小腸養陰退

陽涼血生血治血虛發熱常覺飢餓五心煩熱

經曰陰虛生內熱

瘡瘍驚悸

有觸而心動曰悸無觸而自動曰驚

卽泄抑也有因心虛火助者有因肝虛火助者有因水停心下者火畏水故浮也地黃能安心腎而益肝亦能行水故居之也

悶肝火相火附伏胃中亦須同歸身用

吐衄尿血

涌爲血淋不稱爲尿血不謂之崩

血暈崩中

經曰陰虛陽

調經安胎利大小便

性寒而潤脾虛泄瀉胃虛食少均在禁例

以懷慶肥大而短襦體細皮菊花心

者佳用沉水者浮不用惡貝母畏蕪荑忌茱萸葱蒜銅鐵器得門冬陳皮當歸良

熟地黃

牛膝補肝腎 甘而微溫入手足三陰經滋腎水封填骨髓利血脈補益真陰聰

耳明目

耳爲腎竅目爲肝竅日得血而能見耳得火而能聽

黑髮烏鬚又能補陰止久瀉

經云腎司二便久瀉多屬虛且多亡陰自宜補腎不可

專責脾也

治勞傷風庳陰虧發熱乾咳痰嗽

火上升津液生痰不生血宜補血以制相火其痰

自除論嘉言曰凡欬嗽至半氣高汗煩不補但下但清其上必至氣脫卒亡醫之罪也

氣短喘促

熟地一兩歸身三錢炙甘草一錢名貞元散治氣短似喘呼吸急促提不能升咽不能降氣道

虛寒勢極並危者常人但知氣急其病在上而不知元每無以肝腎虧損此子午不交氣脫證也尤惟婦人血海常虧者最多此證宜以此飲濟之緩之倘虛衆不如安云痰鍾氣帶用牛黃蘇合及青陳枳壳破氣等劑則徒速其危已

胃中空虛覺餒痘證血虛無膿病後脛股痠痛產後腰腹急痛

丹溪曰產前當清熱

養血爲主產後宜大補氣血雞有雜節從末治之

感證陰虧無汗便閉

陰氣外溢則得汗陰氣下閑則便通

諸種動血一切肝腎陰

虧虛損百病爲壯水之主藥

按熟地黃性滯痰多氣鬱之人能窒礙胸膈用宜

斟酌

邵佩蘭本草匯曰丹溪云氣病補血雖不中病亦無害也不知血藥屬陰其性凝帶脾胃虛氣弱之人過服歸地等劑必致痞悶食減耗安能愈耶是并全書曰地黃產於中州沃土之鄉得上華之最厚

者也其色黃土之色也其味升土之味也而謂非脾胃中州之藥吾不信也但脾胃喜溫而惡寒生乾地黃性寒自非脾胃所喜蒸熟則甘溫正與脾胃相宜耳殊不知熟地黃乃陰虧不行之藥大爲脾胃

不宜也作熟地黃法揀取肥地黃沈水者數十斤洗去沙土略曬乾別以揀下瘦

按地黃取其純陰靜重近時多拌以好酒及砂仁末而蒸

小者數十斤搗絞取汁投石器中浸濾令浹入柳木甌放瓦鍋上蒸一日曬幾日

今市中惟以一煮而售

令極乾又蒸又曬如是九次鍋內倘有淋下地黃餘汁亦必拌曬使汁盡而乾其

地黃光黑如漆味甘如飴須瓷器收之以其脂柔喜潤也

按地黃取其純陰靜重近時多拌以好酒及砂仁末而蒸

害之是反以散動香燥亂其性矣其法甚爲不善有用黃汁拌炒者尤不合法

今市中惟以一煮而售

必生熟各半而用之。設以生地一煮便作熟地，投用歸腎右歸七味八味等藥中則寒涼之性未除心腎之經各別以心經寒涼之藥爲君，主以腎經溫暖之藥爲臣佐，豈徒無益反引寒性下損真陽，移虛者皆堪抵受大虛，致寒者氣立以危，製治乖方而爲害甚烈斯其罪也。市醫嘗將熟地、柏杞等炒作散用，是甘潤養陰之品變而爲苦燥傷陰之物，非徒無益而又害之。

鱠腸

卽早蓮草又名金步草

補腎

甘酸而寒，汁黑而補腎，黑髮烏鬚，赤痢變糞止血。

針灸瘡血不止，音敷之亦妙

固

齒擦功

善益血涼血。

當及時多收其效，其速

純陰之質不益脾胃，若不同薑汁，椒紅相兼修服者恐腹痛作瀉。

固

麥門冬

潤肺清心

味甘微苦，微微寒，潤肺清心，瀉熱除煩。

屬肺火，熱除煩，行政治浮腫

固

生津止嗽

午前嗽多屬胃火，午後嗽及日輕夜重者多屬陰虛，宜麥冬五味同煎，陰虛藥用。

客熱虛勞暑傷元氣，脈絕短氣。

同人參五味名生

固

脈痿吐膿血妄行。

經曉曰：麥冬實足陽明之正藥。

經枯乳閉，明日悅顏。

同人參五味名生

固

肥白而大者佳，去心入滋補藥酒潤。

寒制其熱，湯藥之。

或拌米炒黃地黃車前爲使，惡款冬苦參膏，箱木耳忌鯽魚熬膏良。

齒瘡出瘍，夏秋花葉

固

甘菊花

宣風熱補腎明目

白接草，經曉曰：麥冬實足陽明之正藥。

朝百脈，補清心，則氣充而肥復，故脈絕將死者服此能復生之。夏月火壯服之尤宜。曰人參甘潤東垣甘溫，元氣而鴻虛，熟麥冬苦寒，蒸燉金液，清水潤五味，酸溫鴻丙火而補庚金，益五臟之丙火，小腸庚金。

同人參五味名生

固

大楊並主風熱，治目淚頭眩，散濕毒游風。

家園所種，杭產者良。

花小味苦者名苦蘿，非真

固

肥白而大者佳，去心入滋補藥酒潤。

寒制其熱，湯藥之。

或拌米炒黃地黃車前爲使，惡款冬苦參膏，箱木耳忌鯽魚熬膏良。

齒瘡出瘍，夏秋花葉

固

甘苦微寒，備受四氣。

冬苗春葉，與柏杞相

飽經霜露，得金水之精，能益肺腎二臟，以制心火，而平肝木。木平則風息，火降則熱除，故能養目血，去翳膜。

與柏杞相

固

甘菊花

宣風熱補腎明目

甘酸而寒，汁黑而補腎，黑髮烏鬚，赤痢變糞止血。

音敷之亦妙

固

肥白而大者佳，去心入滋補藥酒潤。

寒制其熱，湯藥之。

或拌米炒黃地黃車前爲使，惡款冬苦參膏，箱木耳忌鯽魚熬膏良。

齒瘡出瘍，夏秋花葉

固

本草從新

卷三 草部 鰥腸 麥門冬 甘菊花

三

有黃白二種。單瓣味甘者入藥。點茶釀酒作枕俱佳。白尤枸杞子地骨皮爲使。菊青葉救垂疔疔毒。以葉搗爛入酒絞汁飲

穀精草

輕明

辛溫輕浮。功善明目退翳。兼治頭風喉痺。牙疼疥癩。田中收穀後多

有之。田低而穀爲水腐。得穀之餘氣結成。

穀精草爲未熟穎湯

以葉搗爛於毒上神效

草決明

一名青葙子
一名明目子

味苦微寒。除風熱治一切目疾。蟲疥惡瘡。能動陽火。瞳子散

大者勿服。食雞冠而穗尖長。

決明子

鴟子
名目

甘苦鹹平。祛風熱。作止能治頭風治青盲內障。翳膜遮睛。赤腫眶爛。淚出羞明。

木賊草

輕發汗
退目瘡

甘苦而平。治目疾。迎風流淚。翳膜遮睛。非乃肝邪鬱逆不能上通於目去節者能發汗。

中空而輕。有升散火鬱風濕之功。多服損肝。

舌轉出血本賊
煎水搗之即上

麻黃

輕發汗
汗

辛苦而溫。

借微洪云中半產麻黃
地冬不積雪性熱可知

入足太陽膀胱。

膀胱之經

兼走手少陰陽明心大腸。而爲肺

家專藥。能發汗解表。去營中寒邪。疏通氣血。利九竅。開毛孔。治傷寒頭痛惡寒無

汗。

東垣曰十劑云輕可去實葛根麻黃之類是也

邪客皮毛。腠理閉塞營衛不行。故謂之實。二藥輕清可去之。時珍曰麻黃太陽經藥。兼入肺經。肺主皮毛。太陽明經藥。兼入脾經。脾主肌肉。二藥相合。皆入太陽經藥。

發而所入不同。好古曰麻黃湯治實桂枝湯治虛。雖皆入太陽經藥。其實營衛藥也。心主營。肺爲血脈。主氣。故麻黃爲手太陰肺之劑。桂枝爲手少陰心之劑。時珍曰仲景治傷寒無汗用桂枝。未有究其情發者。津液爲汗。汗卽血也。在營則爲血。在衛則爲汗。寒傷營。營血內滯。不能外通於衛。衛氣固。則津液不行。故無汗。發熱而惡寒。風傷衛。則氣外泄。不能內護於營。營氣虛弱。津液不固。故有汗。發熱而惡風。然

風寒皆由皮毛而入皮毛肺之合也。善皮毛外用期邪熱內攻。故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪。建之肌表。故以杏仁泄肺而和氣汗。後無大熱而喘者加石膏。活人書夏至後加石膏。知母皆泄肺火之藥。

桂枝同甘草外散風邪。以救表內而伐肝木以防脾泄以芍藥泄木而固脾使以薑棗行脾之津液而口

管衛下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也。

汗後脹沉遲者加人參以益其肺氣也。

有火者加黃芩爲陽明湯以解肺實也。

是桂枝湯雖太陽解肌輕劑實爲理脾救肺之良藥。

金丹者也。

溫瘧欬

逆上氣。風寒鬱於肺經經曰。痰哮氣喘。

老證宜瀉肺然惟氣竇者可暫用。

皮肉不仁水腫風腫。唯冬月

在表真有寒邪者宜之。若非冬月或無寒邪或寒在裏或傷風等證。雖發熱惡寒不頭痛身疼而拘急六脈不浮緊者皆不可用。雖可汗之證亦不宜過劑。

汗爲心

患丹溪以人參麻黃同用亦可。補法也。

發汗用莖去節煮十餘沸掠去浮沫或用醋湯略

泡曬乾亦有用蜜水炒者。

庶免

止汗用根節。

諸時出汗爲自汗。屬陽虛者中出汗爲盜汗屬陰虛用麻黃根始粉栗米等分爲末。成膏之

胃熱痰飲中暑亡陽柔痉。坐墮皆可加用。善性能行周身肌表引藥至衛分而固腠理。出汗雖爲心液然

五臟亦各有汗經曰飲食飽甚汗出於胃。而奪精汗出於脾。

持重遠行汗出於腎。夜恐懼汗出於肝。陰勞苦汗出於心。

歸附黃一兩歸身一錢同炒黑色入麝香一釐爲末。搐鼻竇用效。

刺蒺藜。辛苦而溫。散肝風而瀉肺氣。勝濕破血。催生墮胎。通乳閉。消癰癩。細

審其質性。不過瀉氣破血之品。古方俱用以補腎何也。產同州府去刺酒拌蒸

牙齒動搖出血不止。白蒺藜末日擦之佳。

沙苑蒺藜。苦溫補腎。強陰益精明目。治虛勞腰痛遺精。帶下。痔漏陰癢。性能固精。

固精若陽道數舉。媾精難出者勿用。出潼關狀如腎子。帶綠色。炒用。

亦可代茶

茺蔚即益母草 通味辛微苦微寒。入手足厥陰心包

消水行血。去瘀生新。調經解毒。

瘀血去
則紅調

治血風血暈。血痛。血淋。胎漏。產難。崩中。帶下。

調脈橫於腰間。病生於此。故名茺蔚。赤屬血。白屬氣。氣虛者補中益氣。而

兼升提血虛者養
血滋陰而兼調氣

消疔腫乳癰。亦取其散

然解毒

通二便。其性辛散滑利。全無補益。勿以

其益母之名而濫用之。瞳神散大者尤忌。

勒頭成癰。益母草爲未水調
上一宿消之。極亦得

茺蔚子。調經

明目。血滯病目之活血順氣逐風。

血活則氣行。風散則氣行。所致

治心煩頭痛。血熱

人血滯血熱者。以之有子時珍曰。益母草。莖葉實皆可同用。若治血分風熱。明目調經。用子爲良。蓋根熱花葉專行子則行中有補也。雖曰行中有

補。終是滑利之品。非血滯血熱者勿與。瞳神散大。均在忌例。

微炒忌鐵。

夏枯草散結消癰。明目辛苦微寒。緩肝火。解內熱。散結氣。治瘰疬。鼠瘻。癰瘤。癥堅。乳癰。乳巖。

目珠夜痛。

夜痛及點苦寒藥反甚者。火爲陰寒所
鬱故爾。夏枯能散厥陰之鬱火者也。

青蒿瀉熱理血。生苗苦寒得春木少陽之令最早。

二月生苗

故入少陽厥陰血分。肝治勞瘦骨蒸。

能除骨蒸之熱。用童便浸搗汁熬膏。

暮勞虛熱。久瘧久痢。虛煩盜汗。

能除陰

風毒熱黃瘡疥惡瘡鬼氣。

尸疰身中鬼氣。接引外邪。有辨走皮膚。刺穿藏膚。每發刺痛變動不常者。爲設戶。附骨入肉。攻殺血脈。見心膈每發。絞切遇寒。冷便作者。爲沈戶。舉身沉重。精神錯亂。昏廢。每節氣大發者。爲戶疰。時珍曰。門庭可辟邪。冬至元旦各服二錢。亦良。則青蒿之治鬼疰善。亦有所伏也。

明日清暑辟穀

凡苦寒藥多與胃家不適惟青蒿芳芬襲脾宜於血虛有熱之

人以其不犯冲和之氣爾寒而洩瀉者仍當避之使子勿使葉使根勿使莖熬膏

良聖濟總錄治鼻中息肉青蒿灰等分淋汁敷膏點之

連翹

輕宣散結竊火

味苦微寒而性升浮其形似心

實似蓮房有瓣

故入手少陰厥陰心包心而瀉火

兼除手足少陽

三焦膽

手陽明經腸濕熱散諸經血凝氣聚利水通經殺蟲止痛消

腫排膿

皆結者散之月腫而痛者爲實邪腫而赤者爲結熱腫而不赤爲留氣停痰

爲十二經瘡家聖藥

經曰諸瘡皆屬心火

苦寒

之物多餌卽減食癰疽潰後勿服

集驗方治痔瘻後以刀上飛盜綠絲織入麝香貼之

紫花地丁

寫熱解毒

辛苦而寒治癰疽發背疔瘡瘰疬無名腫毒

葉似柳而細夏開紫

花結角生平地者起莖生溝壑者起蔓

乾坤秘藥治稻芒枯咽不得出地丁草嚼嚥下

漏蘆

解毒

苦下泄鹹軟堅寒勝熱入胃大腸通肺小腸散熱解毒通經下乳排膿止

血生肌殺蟲治遺精尿血

漏蘆古方以漏蘆湯爲首稱

癰疽發背出閨中莖如油麻枯黑如黍者真

甘草拌蒸連翹爲使

惡實

一名牛蒡子一名蕷子一名風

辛苦而寒瀉熱散結除風宣肺氣清咽喉理痰嗽治痘證消

癩疹利二便行十二經散諸腫瘍之毒利腰膝凝結之氣

性冷而滑惟血熱便閉者宜之否則禁用痘症虛寒泄瀉者切勿妄投

實如葡萄而褐色酒拌蒸

待有霜拭去用根苦寒竹刀刮淨絞汁蜜和服治中風汗出乃愈搗和猪脂貼瘡

腫及反花瘡

肉反出如花狀
小兒朝
隨牛糞樹汁細葉之

大小薊

破血

甘苦涼皆能破血退熱治吐衄腸癰小薊力微能破瘀生新不能如

大薊之消癰毒

丹溪曰小薊治下焦之結熱血淋本事方一入陰囊腫滿瘀痛煎大薑汁服立瘥

兩薊相似花如鬚大薊高莖而

葉皺小薊莖低而葉不皺皆用根

古驗出血不止或丸散出酒鮮
搗汁酒服者爲未冷水服

馬鞭草

根破血消癰

味苦微寒破血通經殺蟲消脹治氣血癥瘕下部癰瘡陰腫發背

癰疽楊梅毒氣頸以驅逐爲長瘡證久而虛者斟酌用之下地其多春月生苗

方莖葉似益每對生夏秋開細紫花作穗如車前穗其子如蓬蒿子而細根白而

小用苗葉

佳驗方男子陰囊腫大如升核
病人所不能忍其根草搗敷之

劉寄奴

瀉血宜行

苦溫破血通經除癥下脹止金瘡血多服令人吐痢一莖直上

葉尖長糙澀花白蕊黃如小菊花有白絮如苦蕡絮子細長亦似苦蕡子莖葉花

子皆可用

風入瘡口種痈創
拔篇末核之即止

紅花

古名紅藍花

通行血謂婦辛苦甘溫入肝經而破瘀血活血

瘀行則血活有熱結於中署吐紫黑血者吐出爲好吐未盡加桃仁紅花等藥行之大抵

潤燥消腫之痛

凡血熱血凝則作腫作痛則作腫則止
血宜行

治療經閉便難胎死腹中

非活血下行
血不能下

產後血暈口過

噤

有孕婦血熱門而死名醫華氏以紅花數十斤煮湯令婦於上而飲之溫冷再加半日而蘇金匱有紅藍花酒治婦人六十二種風毒

用能使血行不止而斃 酒噴微焰 脂肪活血解痘毒敷疔瘡
挑破以油子功與

花同葉搗塗遊腫

王不留行通行 甘苦而平其性行而不住

雖有王命不能留行故名

能走血分通血脉乃陽明衝任

之藥

陽明多血氣

除風去痺止血定痛利便通經催生下乳

氣盛血滯者可暫用

治金瘡

止癰瘍疔瘡

散血

出竹木刺失血後崩漏家及孕婦並忌之花如鈴鐸實如燈籠子

殼五稜取苗子蒸漿水浸

瞿麥通利水破血

苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱爲治淋要藥

若產後熱宜車前黃同用五味大抵皆歸熱熱利藥有八

正及山根滑石之類血淋宜小茴牛膝等分煎服淋宜補腎不可獨瀉老人氣虛者宜參木通山梔亦有痰滯中焦作淋者宜川芎桂兼通利藥不可發汗汗之以便血

破血利竅決離

消腫明日去翳通經墮胎

性利

小腸虛者忌服恐心熱未除而小腸復病矣當求

其屬以衰之花大如錢紅白瓣爛色其嫋媚俗呼洛陽花用慈丹皮爲使惡

螺旋竹木入肉

瞿麥爲末水服方寸七或煮汁日飲三次

萹蓄

一名隔符流瀉錢蟲

苦平利小便治黃疸熱淋殺諸蟲治蛇腹痛女子陰蝕

服

葉細如竹弱莖蔓引促節有粉三月開紅花

車前子

通利水清肺肝

甘寒清肺肝風熱滲膀胱濕熱開水竅以固精安令人有子

男女各能中各能

二竅一竅通精一竅通水如是二竅不並開水竅開則濕熱外脾相火常竄精竅常開久久精足明醫別錄云服固精藥久服此行房卽有子子五子衍宗丸用之

治濕瘧五淋暑濕

瀉痢目赤障翳催生下胎 陽氣下陷 賢氣虛脫勿服 入滋補藥酒蒸搗餅入

利水泄瀉藥炒研

車前草

通行水瀉
熱涼藥

甘寒涼血去熱通淋明目

惟此能解肝與小腸
利水之劑多損目

鎧芯

肺熱通利水
清肺熱

甘淡微寒降心火清肺熱利小腸

心與小腸相爲表裏心火清則肺
濁小陽亦清而熱從小便出矣

通氣止

血治五淋水腫燒灰吮喉瘻塗乳止夜啼擦癬最良

熱成指擦溼後擦時蟲從草出
脣水可見十餘次可以斷根

中

寒小便不禁者勿服

破傷出血燈芯
燭爛敷之即止

地膚子

通利水

甘苦而寒入膀胱除虛熱利小便而通淋

時珍曰無陰則陽無以化亦猶東垣
治小便不通用知柏鹽腎之意王節

齋云不禁或數數古方多以爲寒而用治經之藥殊不知屬熱者多苦勝寒火邪妄動水不得竅故不能
禁而頻數也老人多頻數由膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血爲火邪爲主而佐以收腄之劑
如杜衡山茱北味之類補血爲火治其標也

治癩疝散惡瘡

煎湯洗
蒼耳根

葉作浴湯去皮膚風熱丹腫洗

眼除雀盲澀痛

葉如蒿莖赤子類蠶砂惡螵蛸

臨下疼痛地膚子
未酒服六寸七

冬葵子

通閨腸
利城

甘寒淡滑潤燥利竅通營衛行津液利二便消水腫

用榆皮
等分煎

通關格

下乳滑胎

秋葵復種經冬至春作子者名冬葵子根葉同功春葵子亦滑不堪

入藥蜀葵花凡赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治血氣燥亦治血

淋關格皆取其寒潤滑利之功

湯火傷瘡冬葵
葉爲末敷之

海金沙

通淋
利城

甘寒淡滲除小腸膀胱血分溼熱治腫滿五淋莖痛得梔子牙硝蓬

砂治陽寒熱狂大熱利小便此之象唯熱在太陽經血分者宜之。產黔中及河南收暴

曰中小乾以紙襯之以杖擊之有細砂落紙上且暴且擊以盡爲度莖細如線引

竹木上葉紋皺處有砂黃赤色忌火。

茵陳通利濕熱
治諸黃

苦燥濕寒勝熱入足太陽經膀胱發汗利水以泄太陰陽明之濕熱。

爲治黃疸之君藥。

臍胃有濕熱則發黃黃者脾之色身如橘色汗如柏汁而色明者熱多黃而色暗者濕多須五苓之類佐助成功

又治傷寒時疾狂

熱瘡瘍頭痛頭旋女人癥疝皆濕熱爲病按黃疸須分陰黃陽黃陽黃宜茵陳陰黃宜溫補若不用茵陳多致不救。

葶藶子大衛氣閉通行水

辛苦大寒性急大能下氣行膀胱水肺中水氣積急者非此不能

除破積聚癥結伏留熱氣消腫除痰止嗽定喘。

皆水濕通經利便。

十劑曰曳可去閉

也大黃波陰分氣閉

性峻不可混服有甜苦二種甜者力稍緩更宜大棗輔之。

仲景大黃之屬是草本

蕷藶大棗鴉肺湯治肺氣喘急不得臥

子如黍米微長色黃糯米微炒去米或酒拌炒榆皮

爲使。頃風疹痛葶藶子爲末以湯淋汁沐頭三四度即愈

大青寫心胃熱毒

苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂陽毒發癥。

熱甚傷血裏實表虛則發癥紫黑者熱極而胃

爛也多死活人書治赤斑煩痛有耳角大青湯

黃疸熱痢丹毒喉痺非心胃熱毒勿用處處有之高二三尺。

莖圓葉長葉對節生八月開小紅花成簇實大如椒色赤用莖葉。

青黛瀉肝散
寒火

鹹寒色青。瀉肝散五臟鬱火。解中下焦蓄風熱。

有義曰一婦患清腹二陰

汙二便澀用燭燭松脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其婦嗜酒喜食魚蝦發風之物乃用馬齒莧四兩研爛青黛一兩和塗熱痛皆去仍服八正散而愈此中下焦蓄蒸風熱毒氣若不出當燔陽風內痔婦不能禁

酒物果
發物

治傷寒發癥。血痢咯血。

合杏仁研置神曲中裹食名聖母子治咳血

小兒驚癇。疳熱丹熱。敷癰瘡蛇

得也。今用乾花取嬌碧者每斤淘取一兩亦佳。

內多石淨故須淘淨

蘆根瀉熱

甘和胃。寒降火。治嘔嘔反胃。

胃熱火升則食不下客熱消渴傷寒煩熱

止小便數。

水之上源肺氣附於肺始能通調水道下輸膀胱爲水議而主二便三經有之則小便數甚不能少忍火性急速故也蘆中空清上焦潤解則肺之氣化行而小便復其常道矣

蘆筍

能解魚蟹河豚毒。反胃嘔吐。由於寒者勿用。取逆水肥厚者去鬚節。

因熱甚亂煩門退根

三錢麥門冬二錢水煎服即愈

豨莶草宣去風濕

苦辛生寒熟溫。治纏綿風氣。四肢麻痺。筋骨冷痛。腰膝無力。風濕瘡瘍。

長於埋風濕。畢竟是燥血之品。恃之爲輔非是。

本草相傳功用甚奇近世服之經年卒效者製法未盡善與風氣有分別與藥產非地

道與亦以見執方者之失也

江東人呼猪爲豨。其草似猪莶臭故名。以五月五日六月六日七月

七日採者尤佳。去粗莖留枝葉花實酒拌蒸晒九次蜜丸。

豨莶辛苦氣寒必蒸晒九次加以酒蜜則苦寒之陰潤盡

去而清香之美味見矣數不至九陰潤未盡不能透骨搜風而可都病也

搗汁熬膏以生地甘草煎膏煉蜜三味收之酒調尤

妙風氣行於腸胃泄篇豨莶爲末辟
湖大桐子大每服三十粒白陽下

旋覆花一名金絲草
別名下氣消痰苦辛能下氣行水鹹能軟堅微溫能通血脉入肺大腸經消痰結

堅舌唾如膠漆噫氣不除痰於分切落作喫胸中氣不暢故便以通之醫不足亦有此疾
火者歸有餘仲景治汗吐下復倍嗽竟氣者有代旋覆湯大腹

水腫風氣濕痺走散之藥冷利大腸虛人禁之

根治風濕葉治疗瘡腫毒敷金類金錢菊去皮帶蕊殼蒸用入煎藥須用絹包好有細毛恐射

紫菀開肺
下氣

辛溫潤肺苦溫下氣化痰止渴治寒熱結氣欬吐膿血事治血痰爲肺經虛

熱小兒驚癇亦屬而

能開喉渾取惡涎又能通利小腸

本草匯云苦能降下辛可益金故此血保肺散爲上藥雖入至高善

於難下使氣化及於州都小便自利故不漏

辛散性滑暫用之品陰虛肺熱者不宜用須地黃麥冬共之

根作紫色潤軟者良

今人多以車前族根爲之白者名女苑時珍曰紫入血

去頭鬚蜜水浸款冬

爲使惡天雄瞿麥藁本遠志畏茵陳

婦人小便卒不得出或小便血紫菀爲末服

款冬花開肺寒

辛溫潤肺消痰除煩定驚明日治欬逆上氣喘渴按火肺虛

癰欬吐膿血爲治嗽要藥

燒研以筒吸之亦良本草匯曰隆冬獨秀先春開花得腎之體先腎之用故爲溫肺肺血之最大抵效必因寒爲冬氣入肺而鍛熟多非肺家

草藥乃使肺邪從腎而治而治也

紫荳百合沙參生地麥冬五味茲仁如內熱骨蒸少丹皮地骨芍而復篤者爲肺移熱於大腸驕勝但多非肺家

病病嗽而發熱不止者爲陰虛火炎皆難治

十一二月開花如黃菊

雪積冰堅數花偏點想見其結陽之寒故其微主用皆辛溫開路也微不助火可以久任

見花未舒者良

生河北朔中世多以枳橘橘鷄之揀淨花甘草水浸一宿暴用得紫菀良杏仁爲使

惡皂角元參硝石畏辛夷青葙麻黃連翹黃耆貝母

難畏其母得之反良雖等分爲末用鹽津調成丸子先以微

以嫩床煎湯漱口乃
以鮮子敷之立消

牛膝 通下行補肝腎 治酸而平足厥陰少陰經藥。

肝腎能引諸藥下行酒蒸甘酸而溫益

肝腎 主筋 強筋骨。

肝主筋

治腰膝骨痛足痿經攀陰痿

血行故痛止下行故理足

久瘧

以上皆補

久瘧

皆補

生用散惡血破癥結

血行則結

治心腹諸痛淋痛尿血

熱蓄膀胱便澑而痛曰淋氣

淋便澑餘溼勞淋房勞即發

即發

即發

冷牀寒戰後浸膏擦出如膏石然精結成石

血淋濕冷子和曰石淋乃肝經移熱於膀胱曰久熬煎成石非腎與小腸病也大抵治淋宜通氣清心平火利

濕不宜用補恐濕熱得補增劇也牛膝淋證要藥血淋尤宜用之杜牛膝亦可又

有中氣不足致小便不利者宜補中益氣經所謂氣化則能出也忌用淋藥通之

經閉產難

下行之效誤用墮胎

誤用墮胎

即發

喉痺齒痛 引火下行 瘰腫惡瘡

金瘡傷折

以上皆散惡血之功

出竹木刺

搗爛罨之卽出

瘡口合刺猶自出

即發

酒浸蒸惡瘡甲畏白前忌牛肉

口舌瘡瀰牛膝浸酒含

主用皆在腎肝下部上焦藥中勿入夢遺精滑血崩不止及氣

虛下陷因而腿膝腫痛者大忌

出懷慶府長大肥潤者良下行生用入滋補藥

續斷 理筋骨 治腰痛胎漏

血漏血崩帶腸風血痢

崩帶腸風血痢

平胃散一兩用續斷二錢半每服二錢米飲下治時痢甚效

癰痔腫毒又主金

瘡口合刺猶自出

即發

即發

瘡折跌 以功命名 止痛生肌

女科外科需爲上劑

不濟取用宏多

川產良狀如雞脚皮黃

酒浸蒸惡瘡甲畏白前忌牛肉

口舌瘡瀰牛膝浸酒含

主用皆在腎肝下部上焦藥中勿入夢遺精滑血崩不止及氣

續斷 理筋骨 治腰痛胎漏

血漏血崩帶腸風血痢

崩帶腸風血痢

平胃散一兩用續斷二錢半每服二錢米飲下治時痢甚效

癰痔腫毒又主金

瘡口合刺猶自出

即發

即發

瘡折跌 以功命名 止痛生肌

女科外科需爲上劑

不濟取用宏多

川產良狀如雞脚皮黃

續斷 理筋骨 治腰痛胎漏

血漏血崩帶腸風血痢

崩帶腸風血痢

平胃散一兩用續斷二錢半每服二錢米飲下治時痢甚效

癰痔腫毒又主金

瘡口合刺猶自出

即發

即發

續斷 理筋骨 治腰痛胎漏

血漏血崩帶腸風血痢

崩帶腸風血痢

平胃散一兩用續斷二錢半每服二錢米飲下治時痢甚效

癰痔腫毒又主金

瘡口合刺猶自出

即發

即發

胡蘆巴 陰寒命 苦溫純陽入右腎命門暖丹田壯元陽治腎臟虛冷陽氣不能歸

陰寒命

去向裏鞭筋酒浸地黃爲使惡雷丸

葉搗葉打

撲瘡損

元
硫同附子

瘕症冷氣

同茴香巴戟川桂川棟吳茱萸

寒濕脚氣

相火熾盛陰血虧少者禁之

出嶺

南番舶者良云是番萊菔子淘淨酒浸暴或蒸或炒

小湯氣痛胡蘆巴爲末

每服二錢香湯下

艾葉

宣理氣血
燥逐寒熱

苦辛生溫熟熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二經走三陰

厥少

理氣血逐寒濕暖子宮止諸血溫中開鬱調經安胎

帶治帶
要藥

腹痛冷痢血痢霍亂轉筋殺蛇治癬

醋煎服外科有用乾艾作湯投白礬二三錢洗

瘡然後敷藥蓋人氣血冷必假艾力以佐陽而

艾性又能
殺蟲也

以之炙火能透諸經而除百病

丹田氣弱脾腹冷者以熱艾裝帶兜腰

腹其妙寒濕脚氣亦宜以此夾入襪內

治吐衄崩

良陽艾煎服亦治虛崩

治吐衄崩

燥凡血燥生熱者禁與炙火亦大傷陰血虛者宜慎

陳久者良揉搗如絲謂之

熟艾炙火用婦人丸散醋煮搗餅再爲末用

入茯苓數斤同研細易細

煎服宜鮮者醋香附爲使

艾附丸調婦人諸病末時重湯陰艾自明成化來則以蘇州艾爲佳

勝云灸酒塼一灸便透蒙筌發明並以野艾爲薦艾雖香實非艾

妙今人以蓮蒿爲蘇艾

木棉綿目作棉花俗呼

甘溫治血崩金瘡

白綿或布燒灰同研細易細

煎服宜鮮者醋香附爲使

有草木二種

草本出南番宋未始入江南今則偏及江北與中州矣不鑑

而綿不麻而布利被天下其益大哉

本出交州永昌等處

雞冠花甘涼治痔漏下血赤白下痢崩中赤白帶下

分赤白用

子治腸風瀉血赤白痢

崩中帶下

炒用苗治瘡痔及血病以花狀命名

元寶草

補陰

辛寒補陰治吐血衄血

生江浙田塍間一莖直上葉對節生如元寶向

上或三四層或五六層

雪裏青

鴉鴉

苦大寒治咽喉急閉

搗汁灌之立效

一名過冬青生田塍間如天名精而小葉佈

地生無枝梗四時不凋雪天開小白花

萬年青

鴉鴉

甘苦寒治咽喉急閉

搗汁入米醋少許
灌之叶瘦立甦

一名千年葛子可催生

白米飯草

一名糊米飯
養補肺

甘平潤燥補肺和中益胃治勞傷肺氣吐血欬嗽

不論根花葉搗汁灌之

白米飯草

一名糊米飯
養補肺

甘平潤燥補肺和中益胃治勞傷肺氣吐血欬嗽

不論根花葉搗汁灌之

淡竹葉

通利

甘淡寒利小便

小便利則心火因之而清故能兼除煩熱

有走無守孕婦禁服春生苗高數寸

寸細莖綠葉

儼如竹林結小長穗

根苗搗汁和米作酒麵甚芳烈

耆實

通中
大中小之以兩香爲度其病化爲血從大便出

味苦酸平益氣充飢明目總慧先知久服不飢不老

此神草也故本經列之上品

葉治瘡

箬

通中
大中小之以兩香爲度其病化爲血從大便出

味苦酸平益氣充飢明目總慧先知久服不飢不老

此神草也故本經列之上品

甘寒利肺氣

去濟納錄治肺壅鼻頭苦葉落灰白

治諸血證湯服一錢通小便

百一調方

甘寒利肺氣

去濟納錄治肺壅鼻頭苦葉落灰白

治諸血證湯服一錢通小便

百一調方

乳癰

五月五日棕苦燒灰敷之

愈目疾

經驗方龍葵燒灰洗之自效

苦蕷根

通利

甘大寒治一切腫毒發背欲死赤遊風癰風熱頭痛

消渴飲水

骨節痛熱生搗汗時食一二合

天行熱狂

同上

血淋澀痛

聖惠方同蓮草等分煎服日二

瘡口不合

脹

二三合通服

消渴飲水

骨節痛熱生搗汗時食一二合

天行熱狂

同上

血淋澀痛

聖惠方同蓮草等分煎服日二

瘡口不合

直指方取

荳麻根 通治甘寒治小便不通

同始粉各半兩爲末每服二錢 橫元方荳

根洗研細綑上貼少腹連陰際灸卽通

存性爲末

生豆腐蕪三五錢食卽效未溼可以肥豬肉二三片蘸食其妙

肛門腫痛坐之

湯藥洗燙爛

療血淋

治諸淋竈器

日茲一性攻血將芝研與產婦糊之破血止血量產後腹痛以芷安腹上卽止也

荳草

通去寒熱

甘涼煮食治小便赤澀去煩熱利濕熱除酒疸作疽利胸膈安五臟令人

歡樂忘憂輕身明目

根治少淋下水氣

小便不通煎水頻飲

除酒疸

黃色溫身者搗汁眼吹

乳乳癰腫痛

以滓煎之

石龍芮

補陰

苦平補陰氣不足治失精莖冷令人皮膚光澤有子

時珍曰石龍芮乃平補之藥古方多用之其功

與枸杞覆盆子相等而世不知用何哉

逐諸風利關節止煩渴明耳目用子

根皮功用相微差不及耳葉名水蘆俗呼胡椒菜

辛苦濬寒除心下煩熱主寒熱鼠瘻凜瘻生瘡結核聚氣

下瘀血

易簡方血虛初起胡椒菜根搗之

止霍亂解諸毒

唐本草搗汁洗馬毒瘡並服之又塗蛇蠍毒及

狗尾草 痘目貫髮以莖穿之卽乾滅凡赤眼拳毛倒睫者翻轉目臉以一二莖蘸

水夏去惡血甚良

一名莠

莠之亂

又名光明草

治目疾故名

敗醬

通波血

苦平解毒排膿治癰腫破凝血療產後諸病

時珍曰敗醬乃手足陽明陰陰藥也善排膿破血故仲景治癰及古

方婦人科產後腰痛腹痛等證多用之後人不知用蓋未遇載者爾

一名苦菜用根苗

楊氏涼乳方治癰痘尿瘡

出如浴惡風少氣以潔膚水各十

薇銜

通法風

苦平治風濕痺歷節痛驚癇賊風鼠癭癰腫

素問用治酒風證見身熱薄情汗

分薇銜五分合以
三指撮爲後飯

鹿銜一類也蘇頌曰南人謂之吳風草
一名鹿銜草言氣有疾銜此草卽瘥也

蟲實卽馬齒子通淋草

燥甘溫治小腹疝痛腹內冷積水痢諸病

石龍芻卽龍鬚草通淋草

苦微寒治小便淋閉莖中熱痛

敗席主治略同

取彌敗有垢

者方尺煮汁服

酸漿

卽燈籠草通清潔熟

苦寒除熱利濕清肺化痰除煩滿通小便

病效治黃

治上氣欬嗽

並煮汁或研膏生搗

敷小兒門

丹溪曰燈籠草苦能除濕熱輕能治上焦故主熱嗽胸痛此草治熱痰及嗽佛耳草

瘡

丹溪曰燈籠草苦能除濕熱輕能治上焦故主熱嗽胸痛此草治熱痰及嗽佛耳草

瘡

丹溪曰別錄云治寒熱止嗽藥東垣云治寒嗽言其本也大抵寒嗽多是火鬱於內而寒鬱於外也按陳氏經驗方云一切欬嗽不論久遠晝夜無時用款冬花加佛耳草減半熟地黃二兩焙研末每

用二錢於爐中燒之以筒吸烟薰下有涎吐去予家藏獲久病此器治不效偶在沅州得一婢用此法兩

加入湯中甚效

根莖花葉俱可用葉貼灸

葉貼灸不發

子酸平與根莖花葉同功

天台錄言其標也日華云之或爲末油調

鼠麴草卽佛耳草能救荒

甘平除痰止嗽

時珍曰別錄云治寒熱止嗽藥東垣云治寒嗽言其本也大抵寒嗽多是火鬱於內而寒鬱於外也按陳氏經驗方云一切欬嗽不論久遠晝夜無時用款冬花加佛耳草減半熟地黃二兩焙研末每

用二錢於爐中燒之以筒吸烟薰下有涎吐去予家藏獲久病此器治不效偶在沅州得一婢用此法兩

加入湯中甚效

根莖花葉俱可用葉貼灸

葉貼灸不發

甘平除痰止嗽

天台錄言其標也日華云之或爲末油調

加入湯中甚效

雜米粉作糗食甜美荒年當糧最佳

而愈也

本草從新卷四

草部
毒草類

附子大燥回陽補腎
命火逐風寒濕 辛甘大熱純陽其性浮多沈少其用走而不守通行十二經無所

不通能引補氣藥以復散失之元陽丹溪曰氣虛甚者稍加附子以行參耆之功肥人多濕用 引補血藥以滋不

足之真陰引發散藥開腠理以逐在表之風寒同乾姜桂枝溫經散寒發汗 引溫暖藥達下焦以

去在裏之寒濕善引火下行津調塗足心亦妙 治三陰傷寒戴陽吳綬傷寒蘊要曰附子陰證要藥凡傷寒傳變三陰中寒夾陰身雖大熱而脈沈細或厥俱赤煩渴引飲脈七八至但接之則散用姜附湯加入參投半斤得汗而愈此神聖之妙也

風卒中曰中漸傷曰傷輕爲感重則爲中 氣厥痰厥欬逆元陽下虧生氣不布宜同歸地人參用 自汗陳言三因方有耆附參附三湯嘉言曰衛外之陽不固而自汗則用耆附牌中之陽虧微而自汗則用水附腎中之陽浮游而自汗則用參附凡屬陽處自汗不能舍三方爲治

嘔噦膈噎膈噎多由氣血虛胃冷冒稱而成飲可下而食冷不下搞在吸門喉間之會厭也食下胃脘痛須臾吐出搞在贲門胃之上口也此上焦名噎食下良久吐不出搞在幽門胃之下口也此中焦名膈朝食暮吐隔在闢門大小腸下口也此下焦名反胃又有涉飲食

積瘀血壅塞胃口者如寒痰胃冷則宜姜附參尤胃槁者當滋潤宜四物牛羊乳瘀血者加韭汁

寒客中焦脾胃爲霍亂寒客下焦肝腎爲轉筋

拘攣風癥癥瘕積聚督脈爲病脊強而厥小兒慢驚瘡痘灰白

癰疽不斂一切沈寒痼冷之證經曰陰盛生內証寒陽虛生外寒 開關門消腫滿

經曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也

嘉言曰腎之納門不開必以附子回陽蒸動腎氣其扇始開胃中積水始下以陽主開故也集驗曰腫因積生積去而腫再作若再用利藥小便愈附醫多束手蓋中焦氣不升降爲寒所阻惟服附子小便自通

縮小便

潔古曰益火之原以消陰翳則便解而節

壯陽退陰殺邪辟鬼通經墮胎通宜冷服

熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽上浮

治之以寒則陰益其治之以熱則格臣不納用熱藥冷飲以治寒證此寒因熱用義亦相同也經曰正者正治反者反治如用寒治熱用熱治寒此正治也或以寒治寒以熱治熱此反治也經所謂必伏其所主而先其所因蓋借寒藥熱藥爲反佐以作向導也故亦曰從治

真曰仲景麻黃附子細辛湯熱附配麻黃發中有補四逆湯生附配乾姜補中有發其旨微矣王節齋名醫雜著日氣虛用四君虛用四物虛甚者俱宜加熱附等四君四物皆和平竄緩之劑須得附子健脾

之性行之方能成功附子熱毒本不可輕用但有病病當之雖累暑熱時月亦可用也張氏曰今之用附子者必待勢不可謂不得已然後用之不知回陽之功當於陽氣將去之際專用之以望挽回若既去之後死灰不可復燃矣但附子性悍獨任爲難必得大甘之品如人參熟地炙甘草之類皆足以制其烈而濟其勇斯無往不利矣丹溪曰烏附行經仲景八味丸用爲少陰向革後世因爲補藥誤矣附子走而不守取其健悍走下以行地黃之滯耳相習用爲風藥及補藥殺人多矣張氏曰附子味甘氣熱峻補元陽陽微欲絕者起死回生非此不爲功故仲景四逆真武白通蘇湯多用之其有功於生民甚大况古人日

用常多方多用之本非禁劑丹溪乃僅以爲行經之藥而云用作補劑多致殺人言太過矣蓋丹溪法重滋陰政每以陽藥亦其偏也

若內真熱而外假寒熱厥似寒

宜承氣白虎等湯

因熱霍亂等證服之禍不旋踵陰虛者亦不可加入滋陰藥中常服

古好

曰用附子以補火必防熱水若陰虛之人久服補陽之藥則虛陽益熾真陰日耗精血愈枯而氣無所附薦遂成不救者多矣

從前附子皆野生所產甚罕價值甚高而力甚大近今俱是種者出產多而價值賤力其薄土人以鹽醃之愈減

其力陝西出者名西附四川出者名川附川產爲勝川附體鬆而外皮多細塊西附體堅而外皮光潔以皮黑體圓底平入角頂大者良修治法煎極濃甘草水將

附子泡浸剝去皮臍切作四塊再濃煎甘草湯泡浸令透然後切片慢火炒黃而乾放泥地上出火毒

有用水浸燒裏煨令發折則雖熱而毒仍未去非法之害者有甲黑豆煮者有甘草鹽水姜汁童便煮者恐煮之氣味煎出其力大微且製之不過欲去甘草鹽水姜汁童便煮者恐煮之氣味煎出其力大微且製之不過欲去

毒生耳若用童便是反抑其陽剛之性矣尤非法之善者惟用甘草湯包爲末以水麴調塗之

畏人參甘草黃耆防風

犀角綠豆童便反貝母半夏枯萎白芨白蔹中其毒者黃連甘草犀角煎湯解之

或用黃土水澄清亦可解附生者爲附子

手足康裂附子去皮爲末以水麴調塗之

烏頭大燥

功同

附子而稍緩附子性重峻回陽逐寒烏頭性輕疏溫脾逐風寒疾宜附子風疾宜

烏頭卽附子之母

有謂春深爲烏頭冬採爲附子者非也

烏附尖

宣吐

吐風痰治癲癇取其銳氣

直達病所

丹溪治許白雲雖用瓜蒂梔子苦參蓼薑等劑吐之不退後用附子头和漿水與之始得大吐脣瘻數枚而安

天雄大燥回陽補腎

補下焦腎

命陽虛

夫烏附天雄之尖皆向下其濟乃向上生苗之處寇氏謂其不肯就下潔古謂其補上焦陽虛則鬚心肺之分當用

參耆不當用烏附矣

治風寒濕痺爲風家主藥發汗又能止陰汗細長者爲天雄側子燥

足風散側旁生宜於發散四肢充達皮毛治手足風濕諸痺連生者爲側子

草烏頭

大燥開

辛苦大熱搜風勝濕開頑瘻治頑瘻以毒攻毒頗勝川烏然至毒無

所釀制不可輕投野生狀類川烏故亦名烏喙

薑汁炒或豆腐煮十便良方治腰脚冷瘻草烏頭

三拗去皮膚爲末醋調貼須臾痛止

白附子

治面疾

辛甘大熱純陽陽明經藥能引藥勢上行治面上百病

陽明之脈本於面部游風可作面肿消癰瘻

祛風痰治心痛血痺諸風冷氣中風失音陰下濕瘻燥毒之品似中風證雖有痰亦禁用小兒慢驚勿服根如草烏之小者皴紋有節炮用陶隱居曰此藥久絕

無復真者今
准涼州生之

天南星 味辛而苦能治風散血。

南星防風等分爲末名玉真散治破傷風刀傷跌傷如神
破傷風者瘡口敷藥溫酒調下二錢打傷至死童便調灌

三錢連淮丹溪曰無活氣溫而燥能勝濕除痰性緊而毒能攻積拔腫爲肝脾肺三經之藥治驚

癲風眩 丹溪曰無身強口噤喉痺舌瘡結核疝瘕毒濟癬蛇蟲敵毒
不作眩 按南星治風痰半

氣利水墮胎更烈於半夏與半夏皆燥而毒故皆墮胎南星辛而不守半夏辛而能守所以古安胎方中亦有用半夏者

按南星治風痰半夏治濕痰功用雖類而實殊也非西北人真中風者勿服陰虛燥痰大忌

根似半夏而大看如虎掌故亦名虎掌以礬湯或皂角汁浸三晝夜曝用或酒浸一宿

蒸熟竹刀切開以不麻爲度或姜渣黃泥和包裹熟用造麴法以姜汁礬湯和南

星末作餅楮葉包待生黃衣日乾造膽星法臘月取黃牛膽汁和南星末納入膽

中風乾年久者尤佳得牛膽則燥性減且

畏附子乾姜防風

得防風則不麻火炮則毒性緩所謂火能革物之性自附子

至南星皆
大毒之物

半夏 燥濕痰宣通陰陽

辛溫體滑性燥能走能散和胃健脾除濕化痰發表開鬱下逆氣止

煩嘔發聲音救暴卒

凡遇五絕之病用半夏末吹入鼻中卽活蓋取其能作癟也五絕謂猛烈死崩死堅死竄死產死也

又能行水氣以潤腎

燥利二便止咽痛

半夏使氣能化液故潤燥丹溪謂二陳湯能使大便潤而小便長成無已傷寒明理也二物亦能去血故桂枝桂枝皆主之唯陰虛勞損則非潤燥之邪而用利膈行氣之藥是重賛

其津液鹽之罪也。豈藥之咎哉？皇甫論甲乙經用治不眠是果性燥者乎？半硫丸與硫黃等分，生姜糊丸。

治欬逆頭眩

火炎脾生則勝
痰厥頭暉眉稜骨

痛風熱。脇痛胸脹，傷寒寒熱，痰瘡不眠。

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

夏湯陰陽既通，陽立至又有渴，不眠者左不得眠，右不得眠，風熱，宜清肝服藥無效者，不治。

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

止汗。爲治濕痰之主藥。

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

待藥好古曰：腎主五液化爲痰，此非半夏曷可治乎？若以貝母代之，則首

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

爲弟，入脾爲痰，痰者因效而動，脾之濕也。半夏泄痰之標，不能治痰之本。治本者，治腎也。效無形，則謂有形，則謂無形。所以爲治脾濕而潤腎燥之劑也。俗以半夏爲肺藥，非也。止痰爲足陽明除痰爲足

太陰小柴胡湯用之，雖云止瀉，亦助柴芩主寒熱，往來是又爲足少陽也。時珍曰：脾無濕不生痰，故脾爲生痰之源。肺爲虧痰之器，按有聲無痰曰欬，善導於肺氣，有痰無聲曰嗽，善動於脾濕也。有聲有痰曰欬嗽，當以治痰爲先，而治痰又以順氣爲主。氣順則火降，而痰消宜以半夏。南星解其痰，枳壳利其氣，肺虛加溫散之味，肺實加涼降之劑。

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

苟無濕者，均在禁例。古人半夏有三禁。

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

謂血家渴家汗家也。若非脾濕，且有肺燥，誤服半夏，悔不可追。

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

燥烈若風寒濕食諸痰，則相宜。至於孕婦服之能損胎。

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

失血証，痰反能燥，血液而加病。

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

造麴十法。一姜汁浸造，名生姜麴。治淺近諸痰。

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

一礬水煮透，兼薑和造，名礬麴。礬最能郤水，治清水痰。

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

一煮皂角汁，鍊膏和半夏末爲麴。或加南星，或稍加麝香，名

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

皂角麴。治風痰開經絡。一用白芥子等分，或三分之一竹瀝，和成略加麴，和名竹瀝。

火炎脾生則勝

寒多屬痰消腫

以潤燥名麻油。麴治虛熱勞咳之痰。一用臘月黃牛膽汁略加熟蜜和造。名牛膽
麴。治癲癇風痰。一用香附蒼朮撫芎等分熬膏。和半夏末作麴。名開鬱麴。治鬱痰。
一用芒硝居半夏十分之三煮透爲末。煎大黃膏和成。名硝黃麴。治中風卒厥傷
寒宜下。由於痰者。一用海粉雄黃居半夏之半爲末。煉蜜和造。名海粉麴。治沉疴痰。以
沉酒。一用黃牛肉煎汁鍊膏卽霞天膏。和半夏末爲麴。名霞天麴。治沉疴痰。以
上並照造麴法。草盦七日待生黃衣。懸掛風處。愈久愈佳。浸七日逐七日換水。

瀝去涎。切片姜汁拌炒。

性畏生姜用之以制其毒而功益彰

羊血海藻飴糖惡皂角反烏頭。

盤陽生產時子陽先出產後不收者以半夏末煑鼻中則上也

柴胡射干爲使。畏生姜秦皮龜甲雄黃忌

常山

宣吐痰截
瘧通行水

辛苦而寒能引吐行水祛老痰積飲。

痰有六風痰寒痰濕痰食痰氣痰
也飲有五汎於肺爲支飲肝爲膽飲

於心爲伏飲。於經絡爲盜飲。於陽胃爲痰飲也。常山力能吐之下之。

截諸瘧必效。

瘧疾必有黃涎聚於胸中。故曰無痰不成瘧。故服主瘧飲。故曰瘧勝自敗。常山去老痰積飲。故爲瘧要藥耳。時

珍曰。常山蜀漆相痰截瘧須在發散表邪反提出陽分之後。用之。瘧有經絡臟腑風寒暑濕痰食瘴癥之別。須分陰陽虛實不可混用。常山蜀漆得甘草則吐得大黃則利得烏梅穿山甲則入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草葉使榔則入脾。蓋無痰不作瘧。一物之功亦在驅逐痰水而已。士材曰。常山發吐。非生用。多用爲然而甘草同用亦必吐。若酒炒。雖但用錢許。每見奇功未

見其吐也。世人泥於雷駁老人久病忌服之說。使良藥見疑。沉疴難起。抑何愚耶。常山吐瘧痰。川芎。附子。吐氣痰。紫蘇。桂枝。風痰。

性猛烈施之。藿食者

多效。若肉食之人。稍稍挾虛。不可輕入。

雞骨者良。燒酒浸一宿炒透用括囊

使。忌葱茗。蜀漆

常山
熱藥

功用略同。

古方有蜀漆散取其苦性
輕根發散止熱之邪

甘草水拌蒸。

藜蘆

宣引

辛寒至苦。司蠱毒與喉痺。能殺蠱理疥癬。入口卽吐。善通頂。令人噦風癘。

證多用之。

張子和瀟門事親曰。一婦病風。初一二年一發。後漸日發。甚至一日數發。求死而已。值歲大飢。百草食見野草。若葱拌蒸。食覺不安。吐脹挺數日。約一二斗。汗出如洗。其昏困後。

遂輕健如常。八以所食葱訪人。乃葱炒苗。即藜蘆是也。時珍曰。和王妃年七十中風。不省牙關緊閉。先考太醫更目月池翁。記視濃煎藜蘆湯灌之。少嘗。氣遂吐痰而甦。藥不瞑眩厥疾不瘳。誠然。

服

之令人煩悶。吐逆。大損津液。虛者慎之。取根去頭用黃連爲使。反細辛芍藥諸

參惡大黃畏葱白。

蘇夢蘆末摻之。研細蟲釐藜蘆末。生油塗。

大戟

寒通篇水濕。

苦能直泄。嶺瀉臟腑水濕。兼善逐血。辛能橫散。故發汗消癰。寒能通二

便閉。治十二種水。腹滿極痛。積聚癥瘕。頸腋腫腫。風毒脚腫。通經墮胎。瀉火逐痰。

時珍曰。淡黃爲物。諸氣升浮無處不到。入心則迷。或癲癇。入肺則塞。或背冷。入肝則脹痛。乾渴寒熱往來。入經絡則痙攣。遠痛入筋骨則牽引。癰瘍入皮肉則癰癧。瘡腫陳無擗。並以搘涎丹主之。殊有奇功。

此乃治痰之本。淡之本水也。濕也。得氣與火則結爲痰。大戟能泄藏腑水濕。甘遂能行經隧水濕。白芥子能散皮裏膜外。痰氣唯善用者能收奇功也。又曰。鎬仲陽謂腎爲真水。有能無瀉。復云。痘症變黑歸腎者。用百祥膏下之。非瀉腎也。瀉其腑則藏自不實。腑者膀胱也。百祥細大戟一味。能行膀胱之水。故也。謂非獨鷄脯乃腎邪實而鷄肝也。實則瀉其子。大戟浸水青綠。肝膽之色也。痘症毒盛火熾。則水亦涸。風挾火勢則土受劫。故津液內竭。不能化膀而成黑陷之症。瀉其風火之毒。所以救腎扶脾也。張潔古活法。標要用大戟一兩。裹三枚同煮爛去戟。用棗丸服。名棗變百祥丸。

陰寒善走大

損真氣。非元氣壯實。水濕伏留。不可浪施。杭產紫者爲上。北產白者傷人。漿水

煎軟去骨。得大棗良。赤豆爲使。惡山藥。畏菖蒲。反甘草。

甘遂

寒通篇水濕。

苦寒能瀉腎經。及隧道水濕。直達水氣所結之處。以攻決爲用者。爲

下水之聖藥。可主治十二種水。大腹腫滿。名水蠭。嘉言曰。胃爲水梁之海。五藏六腑之源。脾不能散胃之水。積於肺而病於中。肺不能通胃之

水道於暗之而病於上腎不能司閼之關時其輸泄而病於下以致積水浸注無所底止好古曰水者脾肺腎三經所主有五臟六腑十三經之部分上頭面中四肢下腰脚外皮膚中肌肉內筋骨脈有尺寸之殊浮沉之別不可輕窺當知病在何經何臟方可用之按水腫有疾效食積寒血致清不升濁不降而成者有濕熱相生脉道血脈而成者有燥熱營華交結不通而成者是證屬有餘有服寒涼傷飲食中氣虛衰而成者有大病後正氣衰憊而成者有小便不通水液妄行脾不能制而成者證屬不足宜分別治之然其源多由中氣不足而起丹溪曰水病當以健脾爲主使脾實而氣運則水自行宜參苓爲君視所挾證加減苟徒用利水藥多致不起

利

疝瘕積聚

瘡熱宿食痰迷癲癇去水極神損真極速大寶大水

可暫用之否則宜禁

皮赤肉黑根作連珠重實者良麵裹煨熟用

或用甘草蕪花汁浸三日其水

如墨以清爲度再起裏環

瓜蒂爲使惡遠志反甘草仲景治心下留飲與甘草同用取其相反以立功有治水腫及腫毒者以甘遂末敷腫處濃煎甘草湯服之其腫立消二物雖相反感應如此其神

商陸通水

苦寒沉陰下行與大戟甘遂同功療水腫脹滿

腫屬脾脹屬肝腫則陽氣猶行如單脹而不腫者名虛脹爲木橫桂心腹而帶四肢者吉由四股而入心腹者危男自下而上女自上而下皆難治

通薄切醋炒塗喉中良利二便瀉蠱毒敷惡瘡墮胎孕

腫脹因脾虛者多若誤用之一時雖

效未幾再作決不能救

取白花之根

三分燒貼小便利則腫消

銅刀刮去皮水浸一

宿黑豆拌蒸得蒜良

芫花大通水

苦溫去水飲痰癖療五水在五臟皮膚脹滿喘急痛引胸脇欬咳瘡瘻水五

者風水皮水正水石水黃汗也水積胞中堅滿如石名石水汗如柏汁名黃汗久不愈必致癰瘍時珍曰冲房治傷寒太陽證表未解心下有水面微乾癰發熱或喘或利者小青龍湯主之表已解有時頭瘡出門也十囊逐裏邪使水從二便出內經所謂潔淨府去陳莝法也十囊湯芫花甘遂大戟等分棗十枚

毒性至緊取效最捷稍涉虛者服之多至夭折葉似柳二月開花碧色葉生

花落陳久者良好醋煮過曬乾反甘草

根療疥

續隨子一名千金子行水破血解毒鶴辛溫行水破血治冷氣脹滿癥痰飲血積月閉蠱毒鬼疰

利大小腸下惡滯物塗疥癬瘡時珍曰續隨與大戟澤芥甘遂葉相似主水用之得當亦要藥也攻擊猛驚腫脹

月閉等證各有成病之由當求其本不可概施脾虛便滑者服之必死

斗門方治水氣腫脹服用千

百日今走方者俱用此加百草霜等在內使人不能認識詛言祕傳將草頭煉就單方庸俗信而服之一竊而腫張立消索謝而去未幾再作無藥可救間有氣體壯實者愈後卽不復發然暗損真氣不過於數年之內患他病而不起數十年來浴之目見心傷者不可枚舉其奈習俗舊曹率猶長夜之不醒何子欲

呼之用斯代折衷寄生者勿蹈覆轍以保生也至於醫者明知故犯則傷人必多鑒鏡當前悔之何及今玉樞丹用之治百病元氣強者間有小效猶挾虛無不受其害總之執一方治百病多見其失也去

殼取色白者研細紙包壓去油黑痣贅疣塗之自落

牽牛

大寫熱分

辛熱屬火善走入肺經瀉氣分濕熱肺主氣辛能泄氣達右腎命門走精隧可通

下焦鬱遏大腸風祕氣祕利大小便逐水消痰殺蟲墮胎治水腫喘滿痃癖氣塊

東垣曰有謂牽牛苦寒誤矣其味辛殊久嚼益烈雄壯所謂苦寒安在哉乃寫氣之藥比諸辛藥泄氣尤甚若濕從下受下焦主血血中之濕宜苦寒之味而反用辛熱之藥泄上焦之氣是血病瀉氣使氣血俱損也好古曰以氯藥引則入氣以大黃引則入血時珍曰一婦腸結年六十服黃氣滯血間燥則凝結服硝黃藥則若罔知如此三十餘年其人體肥膏梁而多癆日吐聲嘶乃竚此乃三焦氣滯有升無降津液皆化爲痰不能下潤營精非血燥也閏爾留滞相黃入血不能入氣故無效用牽牛爲末皂角膏丸緩服便通外勞素非酒色病二便不通張痛呻吟七情夜用通利藥不效予思此乃濕熱之邪在精通壅氣路膀胱也用棟實茴香穿山甲諸藥倍率牽牛三服而平

凡氣虛及濕熱在血分者大忌主治多在肺脾肺牌

之疾多因虛起何來藥況諸藥應用藥物神良者不少何至舍其萬全而就不可必之毒物哉東道尋復其氣以戒後人勿用善目繫子和日莫用之故歸之其力世信不知取快一時後悔奚及丹溪曰薑牛馬火等走黑者兼屬水白者兼屬金若非病形虛者不可輕用驥之攻虛先苦深中之意有黑白二種此藥本經不收仲景諸方亦未

不張湯不大柴煎者不可輕用

研末洗效

聖濟總錄忌熱頭痛黑牛生搗小兒夜

研末一錢水煎敷鼻上即止

諸方用雞子清誠黑丑末搗面上

黑者力速亦名取子淘去浮者春去皮酒蒸研細得木香乾薑良

增元方用雞子清誠黑丑末搗面上

雀斑夜敷日洗效丑七首砂仁一粒研末井華水調仰鼻中涎出即愈

黑猝牛末一錢水煎敷鼻上即止

葛麻子

鴻通破拔毒

辛甘熱性善收亦善走能開通諸竅經絡治風氣頭痛

痛不可忍乳

香葛麻仁等

分搗並隨左右貼太陽解髮出氣甚驗

口眼喎斜右嘴貼左鼻塞耳聾

搗黑附子左擦貼左鼻塞耳

喉痺舌脹鼻塞鼻塞耳

能出有形滯物治針刺入肉

鴻突傷處油看割出

竹木骨哽置古根鳴自然不見

消腫追膿拔毒敷瘰疬惡瘡一切腫毒

麻仁研油作敷即止

外用頗奏奇功

鴻油能引藥氣入內

用油忌鐵故諸膏藥多用之

氣味頗近巴豆內服不可輕率

形如牛蜱黃褐色有癰鹽水煮去皮研或

癰發癰痘化骨哽

仁香油煎去滓三日後擦效果

勝渠作擦葛麻仁七粒研擦同蘇合香丸貼足心痛即

止

貫衆

鴻臚

味苦微寒能解邪熱之毒治崩淋帶下產後血氣脹痛金瘡鼻血破癥

癰發癰痘化骨哽

堅

殺諸蟲有毒而能解毒去癥而能生新別名管仲

相類耶抑爲其有雜霸之氣耶

根似狗脊而大汁能制三黃化五金伏鍾乳結

砂制汞解毒軟堅

其水能驗時疫

射干 屬火解毒

苦寒能瀉實火。火降則血散腫消而痰結自解。故能消心脾老血。行

太陰厥陰之積痰。

肺脾

治喉痺咽痛爲要藥。

噙之引涎

每煎用

消結核癰痘便毒瘡每

東甲

之治瘧母取其

寒陰相火也

通經閉利大腸鎮肝明目。

唯實火者宜之。虛則大戒。

扁竹花根

也。葉黃鋪如鳥羽及扇

故名鳥羽白蘿蔴

泔水浸一日筆竹葉煮半日。

普濟方二便不通諸藥不效紫花扁竹根生水漫者佳研汁一盞服之

蚤休一名重樓金線

味苦微寒專理癰疽除蟲蛇毒。

諸云七葉一枝花深山是我家應痘如遇者一似手拈拿蘇亦曰磨盤敷癰疽蛇毒甚有妙時珍曰三分草烏頭一分半爲末以少許點牙落處卽自落

玉簪仙一名白鷄解毒

辛甘而寒搗汁服解一切毒下骨硬塗癰腫。

丸服者不可著牙損齒極速。

余居士取牙方玉簪根乾者一錢白礐三分白硝七分蓬砂二分咸靈仙三分草烏頭一分半爲末以少許點牙落處卽自落

大黃大薦血分實熱下有形積滯

大苦大寒入足太陰脾手足陽明厥陰

大腸胃心包肝

血分其性沉而不浮其用走而不守若酒浸亦能引至至高之分。

仲景太陽門調胃承氣湯大黃註曰酒浸小明門大承氣湯大黃註曰酒洗少陽陽明小

承氣湯大黃不用酒製皆有分別東垣曰邪氣在上非酒不至若用生者則遺至高之邪熱病愈後或曰赤確庫頭痛膈上熱疾生也

久成形謂之積陰聚散無常謂之

聚屬陽積多是血或食或痰聚多是氣

溫熱瘴瘧下痢赤白腹痛裏急黃疸水

腫癥瘕積聚。

積久成形謂之積陰聚散無常謂之聚屬陽積多是血或食或痰聚多是氣

大腸有燥糞故溫熱瘴瘧宜下之

留飲宿食心腹痞滿二便不通吐血

劖血血閉損傷積血一切實熱血中伏火行水除痰蝕膿消腫能推陳致新

東垣曰如

定禱亂以致太平所以有將軍之名時珍曰仲景篤心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連黃芩乃葛

心包肝脾俱四經血中之伏火也又治心下痞滿按之轉者用大黃黃連葛根心湯亦瀉脾胃之濕氣非葛

心也病發於陰而反下之則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上腕當心故曰瀉心經曰太陰所至爲痞滿又曰瀉氣所在則生腹脹是已病發於陽而反下之則結胸乃熱邪陷入血分亦在上腕故大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則用小陷胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯或問心氣不足而吐利何以不補心而反瀉心丹溪曰少陰不足亢陽無轉致陰血妄行故用大黃瀉其亢盛之火又心本不足肺肝各受火邪而病作故用黃芩清肺黃連清肝肺者心之主肝者心之母血之舍也肺肝火退則血歸經而自安矣宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心善一舉而兩得之士材

曰古人用大黃治虛勞土弱意甚深微蓋濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血不生也

峻利猛烈長驅直擣苟非血分熱結六脈沉

實者切勿輕與推蕩病在氣分而用之是爲謀少無過

川產錦紋者良有酒浸酒蒸生熟之不同生

用更峻欲取通利者不得遽進穀食大黃得穀食便不能通利夷堅志云湯火傷者搗生大黃漿敷止痛無癢

黃芩爲使梅師方男子漏墜作痛大易黃末醋和塗之乾則

自半夏至大黃皆常毒之品

根如血

瀉破

辛寒蝕惡肉排膿血殺蟲除熱瘻破癥瘻

素問曰烏鵲骨治婦人血枯

根如萊菔皮黃

肉白葉長微闊折之有汁結實如豆一顆三粒甘草爲使

天名精

一名池松一名活鹿草一名蝦

根葉濃煎膏飲下血一桶小便通而愈葉破血解毒

能止血吐痰除毒解毒殺蟲治乳蛾喉瘻砂淋血淋

一婦產後口渴氣喘面赤有礙大便泄小便則用行血利水藥不效用天名精

根方云濃煎加乳膠少許神效

小兒牙關緊閉急慢驚風

不省人事者絞汁入好酒灌之卽以醋拌渣敷項下

辛甘而寒能破血

一婦產後口渴氣喘面赤有礙大便泄小便則用行血利水藥不效用天名精

止牙痛搗敷蛇蟲螫毒

根名社牛膝功用相同色白如短牛膝

煎湯洗痔瘻之亦取其甘味

漱汁

爲使

男女吐血地松蜜乾爲末茅花湯調服二錢良

苦辛殺五臟虫治疣皯腹痛

面白唇紅時發時止蟲痛肥肉汁調末服塞瘻處良

即天名精子最黏人衣有狐氣炒熟則香

怪疾奇方大陽蟲出不斷斷之復生行坐不得轉未水調半兩服自愈

山慈姑鴟夷解毒

甘微辛而寒功顯清熱散結治癰瘡疔腫瘰疬核核解諸毒蠱毒

蛇蟲狂犬傷

根類慈姑小蒜去毛殼

有毛殼包裹者真故今人俱稱爲毛姑

茵芋宣去風濕

苦微溫治風濕拘攣痺痛

時珍曰古方治風癱有茵芋丸治風瘻有茵芋酒治產後風有茵芋膏風濕諸證多用之茵芋石楂芥草皆治風妙品也

所罕

莖赤葉似石榴而短厚炙用

莽草宣去風濕

辛苦而溫治頭風癱腫乳癱痘瘻

蘇頌曰古方治風濕諸酒多用之今人取葉煎湯熱含治牙蟲瘻瘻甚效甄權曰不入湯法

細剉以生甘草水蓼二味同盛入生稀絹袋中

甑中蒸一日去一味曬乾

聖惠方治頭風

久病莽草易
沫之勿令入目

仙茅燥補腎命

辛熱助命火益陽道明耳目補虛勞治失溺無子心腹冷氣不能食腰

脚冷痺不能行

緩筋

專於補火唯精寒者宜之

唐婆羅門始進此方當時盛傳服之多效如法製陰虧蜜丸酒服禁食牛乳牛肉許真君

敷能養精滑能養血和苦酒取之必有效也

火熾者有偏絕之虞

葉如茅而略潤根如小

指黃白多涎竹刀去皮切糯米泔浸一宿去赤汁則毒出忌鐵

藁耳

一名蒼耳卽詩卷耳輕發汗散風濕

甘苦而溫善發汗散風濕上通腦頂下行足膝外達皮膚治

頭痛目暗齒痛鼻淵肢攣痺痛瘰疬瘡疥

李漁湖集續方採根煎熬名萬應膏

遍身作癢

作浴湯佳

散氣

耗血虛人勿服去刺酒蒸忌豬肉

千金翼治毒攻手足腫瘻欲絕蒼耳搗汁漬之并以滓敷之立效春用心冬用子

木鼈子鴟夷治瘡外用

味苦微甘利大腸治瀉痢疳積瘰疬瘡痔乳癰蚌毒消毒追毒生肌

除野黑瘡。顴入外科。核扁如鼈綠色。去油者。番木鼈形較小。

鳳仙子

一名急性子
瀉穎堅

微苦而溫。治產難積塊。噫膈骨硬。

凡咽中骨硬欲死者白鳳仙子研水一
大鐘以竹筒裝入咽其物即軟不可著

牙或爲
末吹之

透骨通竅。

時珍曰鳳仙子其性急速故能透骨軟堅而人食魚肉硬者投數粒即易軟爛是其驗也

緣其透骨最能損齒與玉簪

根同。凡服者不可著齒。多用亦戟人咽。

摘元方金鳳花子研末入
砂少許點痛牙根取之

花。又名金

甘溫而滑

活血消積。治腰脇引痛。不可忍。

研餅臘乾爲末
空心酒服三錢

又治蛇傷。酒服。

經。軟堅透骨。治杖撲腫痛。

葉廷器方搗葉如泥塗腫破處乾則又上一
夜血散即愈冬月收取者研末水和塗之

雞魚骨哽。

危氏方用根
搗爛滌藥骨

自下雞骨尤效卽以溫
水漱口。勿損齒爲要

誤吞銅鐵。

方同上
自蘭茹至
皆小毒之品

土連翹。宣行。

苦溫。治風寒濕痺。歷節。腫脹。撲損。疼痛。
爲末同沒藥

大損新血。無瘀勿用。

體虛有痰
亦忌之

烟。宣降穎。殺蟲。

明時征滇深入瘴地軍中皆染病獨一營
以服得免由是傳遠近人皆服之矣

寒濕。

陰邪。辟穎殺蟲。

搗汁可毒頭蠅
箇中水能解蛇
毒

其氣入口頃刻而周一身。令人通體俱快。

其性純陽
能行能散

用以代酒代茗。終身不厭。

故一名相思草
音之證甚多未必不由嗜烟所致

耗血。

損年衛生者宜遠之。

閩中產者最佳。

質細名金絲露書云古未國有草名淡巴菰漳州人
自海外攜來莆田亦種之今處處有之不獨閩矣

本草從新卷五

草部
蔓草類

何首烏

補益肝腎精氣化虛痰

苦堅腎溫補肝甘益陰濬收斂精氣強筋益髓養血祛風

先治血虛行風自消烏鬚髮故名

以調補久病之聖藥

強陽事令人有子爲滋補良藥

補陰而不滯不寒強陽而不燥不熱

惡血痿黃諸病自己療久痢惡瘧

益陰補肝瘧家要藥

調胎產崩帶止破傷出血

鈞筆卷衛生經典方末數

年深大者收採精製久服延年令人不老

有赤白二種夜則藤交

交藤一名故名

陰陽交合之象以大如拳五瓣而嫩潤者良老鞭多筋者不用三百年者大如栲栳服之成地仙凡使赤白各半泔浸竹刀刮皮切片用大黑豆拌勻入柳甌砂鍋

上九蒸九曬茯苓爲使忌諸血無鱗魚葱蒜萊菔鐵器

與蘿蔔全食令姜早白犯鐵器傷人

菟絲子

溫補三陰

甘辛而溫凝正陽之氣入足三陰

肝脾腎

強陰益精溫而不燥治五勞七

傷溺有餘瀝寒精自出口苦燥渴

煎湯任日治消渴

寒血爲積祛風明目止瀉進食

未常服無使如馬牙雪

補衛氣助筋脈益氣力肥健人爲調元上品

同熟地名雙補丸

同元參名元菟丹

腎家多

火強陽不痿大便燥結者忌之

無根蔓延草上子如黍粒得酒良揀去雜子酒

淘淨去土曬乾放瓷器內勿使出氣入煎劑再微炒研破若入丸須另磨細末古
人因難於磨細酒浸一宿煮令吐絲搗成餅烘乾再研則末易細然酒浸稍久往
往味變酸臭全失冲和馨香之味每多無效今市中菟絲餅俱將麥麵打入氣味
全乖斷不可用山藥爲使

覆盆子

溫補肝腎
竈縮小便

甘酸而溫益腎臟而固精補肝虛而明目起陽痿縮小便

宋宗夷曰
服之可覆

其弱器故名季嘗之曰續絕傷美顏色烏鬚髮

搗汁塗
楚不白

女子多孕同蜜爲膏治肺氣虛

寒

李士材曰強腎無選之良藥之品也

性固澀小便不利者勿服

去蒂淘淨搗餅用時酒
爲未沸之日一次以匙爲度

拌蒸葉絞汁滴眼中出目弦蟲除膚赤收濕止淚

勝冷濃湯加酸漿洗後覆盆子葉

五味子

補肺腎
蓄積氣

性溫五味俱備

皮肉酸核中
苦辛都有酸味

酸鹹爲多能斂肺氣而滋腎水

氣爲水
母經曰

肺欲收急食酸以收之王好古
日入手太陽而分足少陰氣分

益氣生津

肺主氣計故能益氣氣能生津
夏月宜常服以鴻火而益精

補虛明目清精強

陰

內核如腎
義如之

退熱斂汗止嘔住瀉甯嗽定喘

感風寒而體虛者當表散宜辛涼解表
送而虛寒者當清降宜二陳及桔子等身湯水

氣逆而喘嗽者宜小青龍半夏茯苓
陽氣虛病久而喘嗽者宜人參五味

除煩渴消水腫解酒毒收耗散之氣瞳子散大

潔古
云夏

服五味使人精神頓加兩足筋力涌出東垣曰此腎神助大火其必用之藥五味功用雖多但肺保腎四字足以盡之

按五味乃要藥人多

不敢用者寇氏虛熱之說誤之爾唯風邪在表痧癱初發

一切停飲肺家有實熱

者皆當禁之

北產黑紫者良入滋補藥每粒銅刀切作兩片蜜酒半蒸晒乾焙

臨用再研碎入勞嗽藥搗碎核生用南產色紅而枯若風寒在肺宜南者蕊蕊爲使惡萎蕤熬膏良

葛根風眼五味子蔓
荊子煎湯擦洗之效

天門冬鴻臚少陰
腎水潤燥甘苦大寒入手太陰氣分肺清金降火益水之上源下通足少

陰腎苦能堅腎實能去腎家濕熱故亦治骨痿熱瘡爲正虛不得混治

二便治肺痿肺癰肺痿者感於風寒以至氣虛而咳嗽有寒痰熱瘡二症肺癰者熱毒甚全曰腎主津故燥則咳而爲痰澤肌膚利

熱瘡拔開提升斷續爲邪瘡結或吐膿血胞中癰痛痰重而喘不得息得涼化所謂治痰之本也

滋陰潤燥殺蟲消痰苦泄血帶甘益元氣寒止血安行

痰嗽喘促嗌乾消渴口燥多飲爲消渴由火盛津枯

宜潤燥肺熱風熱天門冬者食止渴去熱或暴乾爲末蜜丸服尤佳亦可洗面

食者大非所宜取肥大明亮者去心皮酒蒸熬膏良

滋陰助元潤督痰

地黃貝母爲使惡

鯉魚肺熱風熱天門冬者食止渴去熱或暴乾爲末蜜丸服尤佳亦可洗面

百部溫肺潤燥殺蟲止咳皆有蟲與天門冬形相類而用相反故名野能傷胃滑腸脾胃虛人須與補氣藥並

殺蛻蟻蠅亦可煎湯洗衣破作湯洗牛犬去蟲一切樹木蛀蟲即死

青入膏不持取服可療三十年嗽

療骨蒸傳尸疳

積疥癬天門冬但天門冬治肺熱此治肺寒爲異耳能傷胃滑腸脾胃虛人須與補氣藥並

行根多隊成百故名取肥實者竹刀劈去心皮酒浸焙

馬兜鈴瀉肺下氣體輕而虛熟則四開象肺故入肺寒能清肺熱苦辛能降肺氣

時珍曰錢乙傳

肺弱膠散用之非取其補肺取其清熱降氣則肺自安也其与阿膠糯米乃補肺之正藥

治療嗽喘促血痔瘻瘡肺大腸經熱

時珍曰腸與肺爲表

裏肺移熱於大腸故腸風痔瘻清滅熱則肺熱亦清子令方單用治水腫以能瀉肺行水也

亦可吐鹽湯劑中用

根名土青木香塗諸毒

熱腫 肺虛挾寒者畏之如蟄

實如鈴去筋膜用之

括薑仁

俗作瓜薑 濟火潤下能清上焦之火使痰氣下降爲治嗽要藥

甘補肺苦寒潤下能清上焦之火使痰氣下降爲治嗽要藥

或米飲下治小便不通

指迷方培研舌頭

通乳消腫治結胸胸痺酒黃熱痢二便不通炒香酒服止一切血

丹溪曰消

清咽利腸

涌大丹神藥

腸王

寒胃滑腸胃虛食少脾虛泄瀉勿投 實圓長如熟柿子扁多脂去油拘

杞爲使畏牛膝乾漆惡乾姜反烏頭

附紅生括薑汁溫服以猪肉汁洗手按令自入

天花粉

治熱痰

酸能生津甘不傷胃微苦微寒降火潤燥滑痰解渴生肌排膿消

腫行水通經止小便利

行而小便不數

治熱狂時疾胃熱痘黃口燥唇乾腫毒發背

乳癰癰癧

脾胃虛寒者均宜戒用

卽括薑根澄粉食大宜虛熱人畏惡如括

薑

王瓜

鄭士瓜根葉熱通利水行血

苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疸消渴

用

便數帶下月閉瘀血

利大小腸排膿消腫下乳

通乳藥多用之單服亦可

墮胎唯實熱壅滯者宜之稍稍挾虛者切勿

妄投

根如括薑之小者味如山藥根子通用

經傳曰主治略似括薑傷寒發瘡用王瓜搗汁和飲

肝末服此効黃疸變黑醫所不

白薇舊火
結

苦能泄.辛能散.甘能緩中.寒能除熱.殺火毒.散結氣.生肌止痛.治癰疽瘡

腫.面上泡瘡.金瘡撲損.

請變不出者用丹皮或半夏爲末酒服

斂瘡方多用之.

故名每與白芨相須

擦凍耳同黃柏末

赤藪功用皆同.

鄭義一曰能治溫瘧血症陽風痔漏赤白帶下蔓赤枝有五葉根如卵而長三五枚同煎皮葉主婦末敷之

烏肉白反烏頭.

外臺方湯火灼

山豆根

蕷熱解毒

苦寒瀉心火以保肺金去肺大腸之風熱.

少火降則不內熱而金清肺虛大陽亦消湯相表裏肺金清則大陽亦清

腫止痛治喉癰喉風齦腫齒痛含之

薰汁

喘滿熱效腹痛下痢五痔諸瘡解諸藥毒敷

禿瘡蛇狗蜘蛛傷療人馬急黃.

所致血熱極

大苦大寒脾胃所惡食少而瀉者切勿沾唇.

苗蔓如豆經冬不凋.

金銀花

除熱解毒

甘平除熱解毒補虛.

凡物皆補

療風養血止渴.

丹溪曰癰疽愈後發渴黃耆六一湯春忍冬大切當忍冬養血黃耆六一兩處再入酒一宿熟分三服一日一夜吃盡重者日二劑服至大小

補氣潤何由作

除痢寬膨.

土材

曰今人但入瘡科忘其治瘧通利則藥力到忍冬丸載器云熟毒血崩濃煎服之爲末貼誦常良能無益

種戶痘.

稟春氣以生性極中和故無禁忌其藤葉名忍冬.

經冬不凋

乾者不及生者力速釀酒代茶敷膏並妙.

忍冬酒治瘧疽背一丸惡瘧初起便服奇效忍冬五兩苦草一兩水煎酒打糊爲丸載器云熟毒血崩濃煎服之爲末貼誦常良能無益

力速釀酒代茶敷膏並妙.

忍冬酒治瘧疽背一丸惡瘧初起便服奇效忍冬五兩苦草一兩水煎酒打糊爲丸載器云熟毒血崩濃煎服之爲末貼誦常良能無益

謂通利則藥力到忍冬丸載器云熟毒血崩濃煎服之爲末貼誦常良能無益

須多用乃效.

近今又以黍花爲最烈黍

花痘小便多色黑不

香氣異亦易辨耳

薔薇根

散熱

苦澗而冷入胃大腸經除風熱濕熱生肌殺蟲治泄痢消渴牙痛口糜.

煎汁
含腋

遺溺好眠癰疽瘡癬

千金方薈薇根角蒿口瘡之聖藥角蒿所在多有開淡紅紫

子名營

實酸溫主方略同

花有黃白紅紫數色以黃心白色粉紅者入藥

抱朴子方治金瘡腫痛

燒灰每白湯服
方寸七日三服

土茯苓

通法
濕熱

甘淡而平祛濕熱以利筋骨利小便以止泄瀉治筋骨拘攣楊梅瘡毒

楊梅瘡古方不載明正德間起於贛表其證多屬陽明厥陰而兼及他經善相火寄於厥陰肌肉屬於陽明故也醫用輕粉丸劑其性燥烈入陽明則去疫疾逐逐口齒出瘻即乾癥決毒氣竄入經絡筋骨血液枯槁筋失所養變爲拘攣癰漏竟至廢瘡土茯苓能制轉粉之毒去陽明濕熱用一兩爲君芩苡銀花防風木通木瓜白芍皮各五分皂角子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分名搜風解毒湯

癰瘡

濕鬱而爲熱營衝不和則生瘡腫經云濕氣害人皮肉筋脈是

也土茯苓淡能參甘能和患瘧甚而血氣狂者煎湯化除甚妙

淡滲傷陰肝腎陰虧者勿服

大如鴨子連綴而生俗名冷飯團有赤白二種白者良可煮食亦可生啖忌

茶

草薢

通風濕

甘苦性平入足陽明厥陰胃肝祛風去濕

陽明主內屬濕

陰主外屬風

以固下焦以堅筋骨

治風寒濕痺腰痛久冷關節老血膀胱宿水陰痿失溺莖痛遺濁痔瘻惡瘡

諸病皆陽

明濕熱流入下焦草薢能去濁分清史國信云若欲與陽先發肺力若欲便清先分肝火揚子建萬全謹

命方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此病必因火熱秘熱不通水液以就小腸大膀胱耳其甚則

身熱心躁思水如此重證也此妄本因貪酒色或過食辛熱葷膾之物積有熱毒腐物耗血乘虛流入下

腸故便時作痛也此便數而痛與淋痛而痛不同宜用草薢一兩鹽水炒爲末每服二三錢使之通導

入大腸仍以葱湯潤滑殺毒令氣得通則便數及痛自減也

腎有二竅水道出於筋竅濁證出於精竅

痛者皆禁

有黃白二種

黃長硬

白虛軟

名粉

藍薢

白者良

時珍曰土茯苓草薢根莖不同形而主治不甚相遠豈一類而數種

陰虛火熾濕有餘瀝及無濕而腎虛腰

半夏藥根
葛根作
白長淺白

薏苡仁爲使畏大黃柴胡前胡忌茗醋。

防已

通行水瀉下
馬氣分風熱

大辛苦寒太陽經藥

能行十二經通膀理利九竅瀉下焦血分

濕熱爲療風水之要藥

十劑曰通川去病通草防已之屬是也古之通草卽今之木通是脉之才亦以行水者爲通草經無以別矣木通甘淡瀉氣分濕熱防已苦寒爲

血分

主治膀胱火邪熱氣諸癇

下接

濕瀉腳氣

足集寒醫爲脚氣寒濕而爲熱氣則腫熱則痛防已爲主藥溫加苡仁蒼朮木瓜

木通熱加知柏屬加羌活草薢淡加竹瀉南星痛加香附木香活血和四物大便閉加桃仁紅花小便閉加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝皮蠶仙痛連膝加龍膽草又足根痛者屬腎虛不與脚氣同論

風腫癰腫惡瘡

性陰而健陰虛及濕熱在上焦氣分者禁用

東垣曰防已大苦大寒瀉血中濕熱亦膜

肢之藥也服之使人身心煩亂飲食減少惟濕熱壅脹及脚氣甚凡下焦濕熱攻二陰不通者非此不效若虛人用防已其害有三發食已虧復泄大使重亡其血一也渴在上焦氣分而防已歸下焦血分二也

也

邪傳肺經氣分濕熱而小便黃赤禁用血藥三也

出漢中根大而虛通心有花紋色黃名漢防已黑點黃

傷寒

木強者名木防已不住

藏器曰治風用木防已治水用漢防已

酒洗惡細辛畏草薢女菀鹹鹵

防已煎汁服能

黃毒

木通

古名通草

輕通

水源肺熱瀉則化水道通

下行

水瀉心小腸火

辛甘淡平輕虛上通心包降心火清肺熱

心火率則肺熱清

化津液

爲肺

下通大小腸膀胱導諸濕熱由小便出

凡利小便者多不利大便以小水愈

補大便愈燥也木通能入大腸兼通

之火火退則小便自利便利則諸經火邪皆除小便而下

通利九竅

血脈關節

治胸中煩熱遍

身拘痛

楊仁齋云偏身熱夜不能寐足冷由伏熱

傷血宜木通以通心竅則經絡自活行也

大渴引飲火

中焦

淋瀝不通

下焦火心與小

腸相牽裏心移

葛根小勝耳聾通草

目眩口燥舌乾舌乃病

喉痺咽痛火炎

鼻塞

熱壅清道則

失音

清音清氣則

脾熱好眠脾主四肢筋脉脾好眠心爲脾母心主清則脾益有清除煩退熱止痛排膿破血催生行經下乳

火不亢於內氣

兩頭皆空酸酒竈亦治煩渴

通草古名通草木體利水退熱

精滑氣弱內無濕熱及妊娠者均忌

色白而梗細者佳藤有細孔

兩頭皆空酸酒竈亦治煩渴

通草古名通草木體利水退熱

色白氣寒體輕味淡氣寒則降故入肺經引熱下行而利小便味

淡則升故入胃經通氣上達而下乳汁治五淋水腫目昏耳聾鼻塞失音

天仙藤通草根

苦溫疏氣活血治風勞腹痛妊娠水腫

葉似葛圓而小有白毛根

有鬚四時不凋一云即青木言藥叶三莖半歲服之治疳氣作痛也

百一選方治頭風去皮取根子上糊膏其

性研末二錢熱酒下

之

葛根升陽散火

辛甘性平輕揚升發入陽明經能鼓胃氣上行生津止渴

風熱多癧葛根獨能止癧

葛根升陽散火

兼入脾經開腠發汗解肌退熱

根獨能止癧

葛根升陽散火

入肺而生津液

葛根升陽明氣

葛根升陽散火

兼入脾經開腠發汗解肌退熱

葛根升陽明氣

胃病亦不宜服。卽當用者亦宜少用。多則反傷胃氣。以其升散太過也。

夏月表虛汗多尤忌

生葛汁大寒解溫病大熱吐衄諸血。

茜草通行

血

色赤入營氣溫行滯味酸走肝而鹹走血

本經

入厥陰血分心包能行血

苦寒

止血

能行故能止血

能行血

經又能止吐衄諸血

消瘀通經

酒煎一兩治風壅黃疸

消經甚效

治風壅黃疸

痘有五黃疸發疽酒疸黃汗痘女

痘此善治血發黃不專於風熱水人夢培其氣兼補其血附肉桂亦所必用再加甘草白芍川芎等

崩暉撲損痔瘻瘍無

瘀滯者忌投

一名蘆茹一名血見愁根可染絳忌鐵

紫葳花

一名紫葳子花鶴血熱破血藥

甘酸而寒入厥陰血分

心包能去血中伏火破血去瘀主產乳

餘疾崩帶癥瘕腸結血閉淋閉風癥血熱生風之證

女科多用之肺經有用之爲君藥

研末和蜜治

置紙袋內封口燒熟鼻吸

破血之藥走而不守虛人避之孕婦尤忌

花開五瓣黃赤有點不可

近鼻聞傷腦畏鹹鹵

通身風癩紫瘻

末酒服二錢效

威靈仙

宣行氣化風氣

辛泄氣鹹泄水氣溫屬木其性善走能宣疏五臟通行十二經絡

風氣之害主者也或者言其性烈者言其效驗

治中風頭風痛風頑痺

風熱之病皆能治之

細熱之病皆能治之

其性烈者言其效驗

治中風頭風痛風頑痺

其性烈者言其效驗

治中風頭風痛風頑痺

其性烈者言其效驗

其性烈者言其效驗

其性烈者言其效驗

中風頭風痛風頑痺

中風頭風痛風頑痺

中風頭風痛風頑痺

中風頭風痛風頑痺

中風頭風痛風頑痺

中風頭風痛風頑痺

中風頭風痛風頑痺

切冷痛性極快利積疴不瘡者

服之有捷效治諸骨哽頤駁

或云鉄脚散靈砂砂糖和酒煎一口吞下去效劇

小腸秘風濕痰氣

或云鉄脚散靈砂砂糖和酒煎一口吞下去效劇

或云鉄脚散靈砂砂糖和酒煎一口吞下去效劇

一如大走真氣耗人血不得已而後用之可也。根叢鬚數百條長者二尺餘色深

黑俗名鐵脚威靈仙忌茶茗麵。

鈎藤鈎

宣除風熱定驚

甘微苦寒除心熱平肝風舒筋除眩下氣寬中治大人頭旋目眩。

小兒驚啼癰癧

筋急而結爲瘻而緩而舒曰癧仲縮不已爲癰癧俗謂之瘻瘻

客忤胎風發斑疹主肝風相火之病風

靜火息則諸症自平

相火散行於肝心包三焦心包得力也

客忤胎風發斑疹主肝風相火之病風

寒無火者勿服有刺類鈎故名藤細多鈎者良

去梗純用嫩鈎其功十倍久煎則無力

使君子

殺蟲消積

甘溫殺蟲消積治五疳便濁瀉痢瘡癬爲小兒諸病要藥

經疏曰五疳便濁瀉痢瘡癬皆由脾胃虛弱因而乳厚食帶濕熱瘀塞而成脾胃健則積滯皆濕熱散水滌利而前證盡除矣時珍曰凡

殺蟲之藥多是苦辛獨使君子擬子甘而無毒每月上旬蟲頭向下中旬蟲頭黃下旬蟲頭向

云初一至初五蟲頭向上凡有蟲病每月上旬空心食數枚蟲皆死而出矣按地黃胡麻皆甘而能殺蟲也

無蟲積者勿食出閩蜀五瓣有棱內

仁如榧亦可煨食久則油黑不可用忌飲熱茶犯之作瀉。

旋花

一名旋蕘補陰解熱利尿止渴

甘辛溫補勞損益精氣續筋骨

用根葉搗汁擦傷處冷敷其上日二易半月即癒消便癥

卽鼓子花

雀梅葉

一名鴟梅解毒瀉陰

酸寒治乳癰便毒有奇功

一名爵梅

薔薇葉生細梅如小豆大

本草從新卷六

草部

水草類 石草類 茅類

澤瀉

通利水濕勞
號火去濕熱

甘鹹微寒入膀胱利小便

在尿分瀉腎經之火邪功顯利濕行水

治消渴痰飲嘔吐瀉痢腫脹水瘡脚氣疝痛淋瀝陰汗

陰陽

尿血洩精

既利而又能止

乃濕熱爲病不爲虛清者言也虛治則當用桂附矣明目之功

脾胃有濕熱則頭重耳鳴目昏矣去其濕氣則清目紫黃白腫色晝入暮黑非桂附入腎經時日非桂附方取其消勝味之精妙甚古人用桂附宜

濕邪去則補華得力一虛一濡化乃此病後人不知此不患一虛則必致健脾之患矣王氏東壁集曰

地黃山萸桂附葛根皮葛子桑桂附名皆命門藥何待也王氏東壁集謂浮腫爲真亦可謂之虛邪耳易老云去桂附以甘無能爲供也故此

醫狂故稱齊扶脾不虛脾之虛水不可鵝膏甘伏附之澤瀉善瀉古稱補虛者誤矣扁鵲謂其害眼者確也病人無濕腎虛精滑目虛不明切勿輕與新鮮不蠹色白者佳去皮鹽水拌或酒浸畏文蛤忌鐵

石菖蒲

宣通

辛苦而溫芳香而散開心孔利九竅明耳目發聲音去濕除風逐痰消

積開胃寬中療噤口毒痢

陽土滿曰噤口雖之亦莫若胸膺所致用止音失之溫山士之開在舌等之亦可也

同黍米醃驚癇崩帶治漏消腫止痛解毒殺蟲

士母曰之經傳爲水草之精氣神妙之藥殊常酒治諸風驚癇崩帶治漏消腫止痛解毒殺蟲

之效又曰芳苦利竅心脾之藥能治地黃天冬之屬資其宣導者多用緩用亦能利血而除熱香燥而散陰血不足者禁之精滑汗多者尤

忌 生水石間不沾土根瘦節密一寸九節者良去毛微炒秦艽爲使惡麻黃忌

蛤糖羊肉鐵器人吐鐵器令

人吐鐵器令

蒲黃性滑行血止血甘平厥陰血分藥心包生用性滑行血消瘀通經脈利小便祛心腹

膀胱之熱同五靈脂名失笑療撲打損傷瘡癰諸腫

一婦舌古脹滿口以蒲黃頻移比曉乃愈宋度宗舌脹滿口生嚼用蒲黃乾薑末

等分擦之急時珍曰龍此則蒲黃之涼血活血可却矣蓋舌爲心苦心色紅火乃其臣使得乾薑是陰陽相濟也

炒黑性濤止一切血崩帶洩精無

療者勿服香蒲花中蕊屑湯成入藥

古重生經蒲黃未敷舌上瘥耳中出血補黃炒黑研末移入敷

水萍宣發汗風通行水辛寒輕浮入肺經發汗祛風

吹云天生靈草不根幹不在山間不在岸始因飛絮得東風沉根青青蘸水百神味一味去沉疴採

時值在七月半選其嫩風葉大風些小嫩風葉不可穿豆然酒化服三丸銖錢頭上也出汗利水消腫

非大實大熱不可輕試

丹溪曰浮萍鼻衄不止浮萍未發汗勝於麻

黃七月採紫背浮萍揀淨以竹篩攤曬下置水一盆映之則易乾

鼻衄不止浮萍未吹之大腸脫肛用

紫背浮萍爲末敷貼之

海藻瀉熱散堅痰消癰瘡

苦能洩結鹹能軟堅寒能滌熱消瘰疬結核癥瘕陰瘻之堅聚及痰

飲脚氣水腫癰腫之濕熱去宿食消五膈脾寒有濕者勿服產膠州有大葉

丹溪曰浮萍未發汗勝於麻

馬尾二種亦作海菜食洗去鹹水

其用在軟不宜過洗

反甘草

東垣治瘰疬萬方海藻甘草並用蓋溴之以潔堅也

昆布下水消癰功同海藻似海藻而粗柔韌而長

舍之或取其根老瘦也頑癰積聚性更雄

於海藻多服令人瘦削 出登萊者搓如繩索出閩越者大葉如菜略洗去鹹味
以上水草類

石斛

平胃氣除虛熱

甘淡微鹹微寒平胃氣

功宗與曰治胃中虛熱有雷轂散曰石斛鎮涎

除虛熱

別錄曰皮膚邪熱

安神定驚療

風痺脚弱自汗發熱囊濕餘瀝

長於清胃除熱唯胃腎有虛熱者宜之虛而無

火者不得混用 光澤如金鉉股短中實味甘者良

溫州最上廣西省文廣東最下

長虛味苦者名

木斛食之損人去頭根酒浸惡巴豆畏殼蠶細剉水浸熬膏更良

宜於湯液不宣入丸

骨碎補一名僕藥腎行血治折傷

苦堅腎故治耳鳴及腎虛久瀉牙痛

以上三證俱研末入楮腎中以黑爲末擦牙齒下亦空心食之炒黑爲末擦牙齒下亦

根似薑而扁長銅刀刮去黃赤毛細切蜜拌蒸

臘病後髮落同野薑薇根煎汁刷

石葦通脉苦甘微寒清肺金以滋化源

凡行水之藥必皆能先清肺火

通膀胱而利水道治崩淋發背

未炒冷過調服別錄謂其補五臟益精氣亦止清熱利濕之功非真有補性也無濕熱者勿

與 生石陰處柔韌如皮用須拭去背上黃毛微炙杏仁滑石射干爲使得菖蒲良生古瓦上者名瓦葦治淋亦耳

金星草一名鳳尾草一名七星草苦冷解毒消腫顓理外科惡瘡初起陽毒未潰沿頸瘰疬

發背癰疽或剉煮酒煎或研末酒吞或煎汁洗或搗爛敷並建神效並解丹石毒

若非陽毒及金石發毒不可服。

蘇頌曰性至冷服後下利須補治乃平復老年不可服宗奭曰丹石毒發於背及一切癰疽以其根葉二錢半酒一盞煎

服取下黑汁不惟下所服石藥毒兼毒去瘡愈也如不飲酒則爲末以新汲水服以知爲度時珍曰此藥大抵治金石發毒者若憂門氣血而凝滯發毒者非所宜也

根搗真麻油塗

頭大生毛髮。

景天一名慎火草
鴟熱解毒苦酸而寒純陰之品獨入離宮專清熱毒療諸種火丹一切遊風搗

敷蛇蟲中寒者服之有大害。

眼生花葉痛難開
天搗汁日點三五次方效

地錦一名血見愁
宣散血止血辛平通流血脈能散血止血治金刃撲損出血血漏下血崩中女子

陰症血結及癰腫惡瘡

時珍曰專治血病故俗稱爲血竭又名醫學草象花葉形似鱗有汁方土秋月採者雖在丹砂硫黃

非血滯血瘀勿

用以上石草類。

海苔一名堅
輕解熱外
苦咸寒消癰瘤結氣

夷堅志云河南一寺僧盡患癰疾有落陽藥其味每食取苔脯同餐經數月崔頂齋皆活乃知海物皆能除是疾也

卷柏一名柏
炙用止血生用辛平破血通經治癥瘕淋結灸用辛溫止血治腸風脫肛生

石上卷攀如雞足俗名萬年松鹽水煮半日井水煮半日焙

馬勃輕解熱外
用敷瘡辛平輕虛清肺解熱散血止嗽治喉痺咽痛

或研細鹽取吐痰兼鼻竇失

音外用敷諸瘡良

每見用寒涼藥敷瘡者雖愈而熱毒內攻變生他疾爲害不小此藥辛平而散甚爲穩妥

生濕地朽木上狀如肺肝

紫色虛軟彈之粉出取粉

久嗽不止馬勃爲末蜜丸梧子大每服二十丸白湯下卽止亦可吐劑不止馬勃末濃米飲服半錢

以上苔類。

本草從新卷七

木部
類香木

柏子仁

補心脾滋肝腎

辛甘而平氣香能透心脾

凡補脾藥多燥澀此存能舒脾而歸潤助脾藥中兼用最妙

性潤能滋肝腎

好古曰肝經氣分藥

益智寧神聰耳明目

香通誠

養血止汗

小生出汗爲血液汗

除風濕愈驚癲澤皮膚辟鬼魅

多油而滑作瀉者禁

與多痰者亦忌

蒸驪炒研去油油透者勿入藥畏

菊花

積德堂方法黃水濕瘡真柏油香油各二兩熬稠搽之如神

側柏葉

涼血清血分銀熱

味苦微寒性濶而燥

西向得燥金之氣

最清血分濕熱止吐衄崩淋腸風尿

血血痢

一切血證去風濕諸痺歷節風痛

肢節大痛晝夜劇名白虎歷節風亦風寒濕所致

塗湯火傷

搗爛水調搽

生肌殺蟲炙罨凍瘡汁

烏鬚髮丹溪以爲補陰要藥

然終屬苦寒燥濕之品惟

血分有濕熱者以此清之爲宜若真陰虛者非所宜也

柏有數種唯根上發枝

數莖蒙茸茂密名千頭柏

又名佛手柏者爲真或炒或生用桂牡蠣爲使惡菊花

宜酒

頭髮不生爲未和麻油塗

松脂

一名松香一名瀝青一
名蠟

苦甘溫燥祛風去濕化毒生肌止痛熬膏而貼崩中惡瘻牙痛

研末而嘗

齧齒有孔松脂維塞蟲即從齒出

感太陽之氣而生燥可去濕甘能除熱故外科取用極

多性溫而燥。血虛者勿服。水煎百沸。白滑方可用。

聖惠方治小兒緊唇松脂炙化貼之

松節
溫濕

苦

溫而燥。治骨節間之風濕。

丹溪曰能燥血中之濕

燥性過於松脂。血虛尤忌。

杵碎浸酒良。

松毛
祛風生髮

苦溫可生毛髮。宜敷凍瘡及風濕諸瘡。

忌同松脂。

切細用。

鵝絛餅

善移諸痘瘡傷損並濕爛不癥。

多食發上焦熱病。

杉材

即杉木宣散腫脹

辛溫開發除心腹脹滿脚氣腫痛。

柳子厚纂救死方云得腳氣半夜瘡絕脅塊如石昏困且死鄭洵美傳杉木湯服半食脅塊

松花

潤益氣
祛風

甘溫潤心肺益氣止血除風亦可釀酒。

須及時取用不可久停今人和白沙塘印榔七枚連子搗碎童便三升煮分二服若一服得快利停後服

稍挾虛者忌用。其木不生白蟻燒灰最發火藥。

肉桂

大燥補命門火平肝通血脈引火歸元

辛甘大熱有小毒氣厚純陽入肝腎血分補命門相火之不足。

兩腎中間先天祖氣乃真火也人若無此真陽之火則無以蒸燄相而化精微脾胃衰敗氣盡而亡矣

益陽消陰治痼冷沉寒下焦腹痛奔

豚疣瘻疏通百脈宣導百藥能抑肝風。

木得桂而枯削桂土爲木冠不能防水古行水方中多用之如五苓散之類

而扶脾土。

肝木盛則土平肝木甘益脾土

療虛寒惡食濕盛泄瀉。

土爲木冠不能防水古行水

引無根之火降而歸元從治欬逆結氣目赤腫病格陽喉痺上熱下寒等證。

以熱攻熱名曰從治若肺熱氣不下行每上見熱譯下見足冷設誤用之禍不旋踵

通經

催生墮胎。

辛熱能動血以上三宗體略鬆皮直有花紫

交趾桂最佳。

體鬆皮直起花紫肉黑油味甜多辣少今難得

其次蒙自桂可用。

不甚遠

安南桂東京桂亦可用。

以上三宗體略鬆皮直有花紫肉黑油多黑油少味甜少辣多

姚桂尋桂紫荆桂皆體重皮不直有花俱微上味

基
略

用之不能治病洋雲南桂

體皆極重切開肉內有白點起

珠苦辣嘗之舌上獨膩甚至麻木

皆大有害萬不可用

筋急

去粗皮用

其毒方入煎一二錢即服

不見火

須臨用切碎羣藥煎好

得人參甘草麥冬良忌生葱石脂

足避

桂末和白酒塗之外腎偏腫桂末水調方寸匕塗之

桂心

大根補陽活血

入心脾血分能引血化氣化膿內託癰疽痘瘡

同丁香治痘瘡灰塌

消瘀生肌補

虛寒宣氣血利關節

治風痺癥瘕噎膈腹滿心腹諸痛

桂枝

輕解衛調營衛

辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通脈發汗解肌

能利肺氣

經散辛溫發曰爲陽能發

治傷風頭痛無汗傷寒自汗

有汗能止桂枝爲君芍藥甘草爲佐加薑棗名桂枝湯能和營實表

調和營衛使邪從

汗出而汗自止

王好古曰或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得

汗出者此爲營弱衛強陰虛陽必湊之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自

汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以調和其營衛則邪從汗解而汗自止非桂枝

能閉汗孔也亦惟有汗者宜之若傷寒無汗則當以發汗爲主而不獨謂其

營衛矣故曰無汗不得服桂有汗不得服麻黃以桂枝湯中苟藥之故也

亦治手足痛風脇風

痛風有風痰濕痰熱血氣虛血虛之異桂枝用作引經藥屬肝桂枝能平肝東垣曰桂枝橫行手

臂以其爲枝也又曰氣薄則發泄桂枝上行而解表氣厚則發熱肉桂下行而補腎李士材曰肉桂乃近

根之最厚者桂心卽在中之次厚者桂枝卽頂上細枝肉桂在下主治下黑桂心

在中主治中直桂枝在上主治上黑此本乎天者親上本乎地者親下之道也

桂枝偏陽陰虛之人

一切血證

最能動血

不可誤投

木犀花辛溫同百藥煎孩兒茶作餅噙生津辟風

臭化痰治風蟲牙痛同麻油蒸熟潤髮及作面脂

桂葉搗碎浸水洗髮去垢除風

辛夷花

一名木筆花
一名迎春

辛溫輕浮入肺胃氣分能助胃中清陽上行通於頭腦溫中

解肌通九竅利關節主治鼻淵鼻塞

時主鼻清移熱於齶則鼻多濁涕而齶風寒客於齶則鼻寒經曰齶冷爲涕王冰曰瀝波不清則爲霍涕如糞不已

及頭痛面赤作頭暈目眩齒痛九竅風熱之病

辛香走竅虛人偶感風寒

而鼻塞者禁之頭痛屬血虛火熾者服之轉甚

李時珍曰肺開竅於鼻陽明胃腑環鼻上行

足清陽不升則頭爲之傾九竅爲之不利

人之記性皆在醫中小兒害忘者醫不滿也老人健忘者醫不

漸空也凡人外見一形必有一形留於醫中今人每記憶往事必閉目上脣而思累之此卽凝神於醫之

也

去外毛皮

毛骨膚

微焙芎藴爲使惡石脂畏菖蒲石膏蒲黃黃連

鼻瘻及痘後瘡

少許忍白蘿入數次甚良

沉香

先煎氣

腫脹腎

並用辛夷研末入

沉香

入數次甚良

亦能升故能理諸氣而調中

東垣曰上至天下至泉用與使最相宜

其色黑體陽故入右腎命門暖精

助陽行氣溫中治心腹疼痛噤口毒痢癥瘕邪惡冷風麻痺

氣痢氣淋肌膚水腫

大腸虛閉氣虛下陷陰虧火旺者切勿沾唇

色黑沉水油熟者良香甜者性

平辛辣者性熱

帶頭斑名更沉如牛角黑者名角沉相之軟者名黃蠟沉甚難得半頭者名煎青黃者勿用

入湯

劑磨汁沖服入丸散紙裹置懷中待燥研之忌火

吳氏活人心統治胃冷久嗽沉香熟者白豆蔻仁各一錢爲末每用柿蒂湯五

七分
服效

丁香

溫腎

辛溫純陽泄肺溫胃大能療腎壯陽事暖陰戶治胃冷壅脹嘔噦呃逆

有病逆有痰。則氣帶食塞。不得升降者。有火結下焦者。有傷寒汗吐下後。中氣大虛者。有陽明內熱失下者。可也。古方單用柿蒂。取其苦溫。降氣濟生。加丁香生薑。以取其開鬱散瘀。亦嘗收效。朱氏但執以寒治熱過矣。橘核之

痃癖奔豚。腹痛口臭。丹溪曰。脾有鬱火。溢入肺中。渴氣上升。發爲痰。治要訣。治食蟹致傷。

白不發。辛熱而燥。非屬虛寒。概勿施用。雄者顆小爲公。丁香雌者顆大爲母。丁

香卽雞舌香。畏鬱金。忌火。丁香未姜湯五分服。

白檀香。宣理。辛溫調脾胃。利胸膈。療噎膈之吐。止心腹之痛。辟鬼殺蟲。開胃進食。龍

上升

紫檀香。宣和平血。分之藥。和營氣。消腫毒。敷金瘡。止定痛。諸香動火耗氣。夏月囊香辟臭。尙謂其散真陰而開毛孔。况服之乎。癰疽潰後。諸瘡膿多。及陰虛火盛者。俱不宜用。

降真香。宣脾惡止

辛溫。辟惡氣。怪異。療傷折金瘡。止血定痛。生肌消腫。

周崇波海底刀傷血出不止數

花蕊石散。不效。軍士李高用紫金散。敷之血止。痛定。明日結痂無癰。曾救萬人。紫金散。即降真香之最生者也。

忌同檀香。燒之能降諸真。故名。

金瘡

桐花等分。末敷。

烏藥。宣順

辛溫香竄。上入肺肺。下通膀胱。與腎能疏胸腹邪逆之氣。一切病之屬氣者。皆可治。

四磨湯治七情鬱結。上氣喘急者。卒中兼收瀉中兼補。也。方用人參。烏藥。沉香。檀榔。各濃磨汁。七分合煎服。

氣順則風散。故用以治中氣。

中風

厥逆痰壅口噤脈伏身溫爲中風身冷爲中氣又有痰爲中風無痰爲中氣局方治此亦用烏藥煎氣散許學士云暴怒傷陰陽脫離不已氣多風逆往往得中氣之薑不可作中風治老人非風是也若經痰氣阻滯者當大補以固其脫

卒倒大抵氣血衰敗陰陽脫離而然景岳所謂非風是也若經痰氣阻滯者當大補以固其脫

膀胱冷小便頻數白濁反胃吐食宿食不消

瀉痢霍亂女人血凝氣滯小兒蛲蟲外如瘡瘍疥癩皆成於血逆理氣亦可治療貓犬百病氣血虛而內熱者勿服根有車轂紋形如連珠者良酒浸一宿炒亦有研用者

乳香

一名婆羅香宣活血舒筋苦溫辛香善竄入心通行十二經能去風伸筋_{筋不伸者}調氣活血

托裏護心

香微瘡孔能使毒氣外出不致內攻

生肌止痛治心腹諸痛口噤耳聾癰疽瘡腫產難折傷

皆取其活血止痛

亦治癲狂_{能去風散淤沈存中靈苑後砂散吳砂一兩乳香蜜仁各半錢酒下丸飲沉醉聽睡一二日勿動醒則不可治本事方加人參一兩名南志奮}

止洩

瘡疽已潰勿用

膿多勿敷水飛過用鉢坐熱水中以燈心同研則易細

山居四要玉華作痛此秋者市人或以今松脂楓脂中有乳香葱白等分搗敷

之性黏難研水飛過用鉢坐熱水中以燈心同研則易細

能生姪血宣散瘀定痛

此秋者市人或以今松脂楓脂中有乳香葱白等分搗敷

沒藥

一名末藥宣散瘀定痛

辛平入十二經散結氣通滯血消腫定痛_{血滯則氣壅氣壅則經絡滿急故陣日痛}

推陳致新

治金瘡杖瘡惡瘡痔漏翳暎目赤

肝經

產後血氣痛破癥墮胎散瘀皆能消腫

出諸南香色亦類琥珀者良

製法同上_{筋膏損傷米粉四兩炒黃入沒藥}

乳香末各半兩酒調成膏糊貼之

止痛生肌故每兼用

諸痛不由血瘀而由血虛產後惡露去多腹中虛痛癰疽已潰法當咸禁

出諸南香

色亦類琥珀者良製法同上_{筋膏損傷米粉四兩炒黃入沒藥}

乳香末各半兩酒調成膏糊貼之

血竭

一名模鑿竭和血續命

甘鹹平有小毒色赤入血分肝散瘀生新專除血痛治金瘡折跌傷

口不合止痛生肌。此善收瘡口却能引膿性急不可多用無瘀積

者忌之出南番磨之透甲燒之有赤汁涌出久而灰不變色者真嚼之不爛如蠟

爲上。

假者是海母血味大鹹有腥氣

須另研作粒篩過

若同衆藥搗則化作塵飛散甲亦痛及血痔俱爲末敷鼻頭以末吹之

楓香脂即白膠香宣調氣血辛平活血解毒止痛生肌治吐衄咯血齒痛風疹癰疽金瘡外科取

用甚多

色白微黃能亂乳香功亦相近

危氏方治金瘡筋絕槐苦末敷之

安息香宣行氣血辟邪惡辛香苦平入心經研服行血下氣安神去祟

伎之心主血血清則氣不宣

快安神行之鬼胎能下蠱毒可消燒煙辟邪逐惡病非鬪惡侵犯氣者勿用辟邪

安息諸邪故名或云安息國名也

奇效良方小兒驚邪安息香一豆許焚之自除

蘇合香宣通竅氣辟一切不正之氣殺精鬼

今人濫用蘇合丸手少陰王藏神昏則東邪

不知諸香走散真氣每見服之輕病至重重病卽死唯氣體壯實者庶可暫服一

二丸否則當深戒也

別錄謂其可以久服筆談甚言欲蘇合酒之效嗚呼立言失當殆害無窮此類是也

出諸番合衆香之汁煎成

故又名蘇合油形如鯉膠以筋挑起懸絲不斷者真

龍腦香一名冰片宣通竅氣辟一切不正之氣殺精鬼

細目云微寒蓋體溫而用清火

辛溫香竅善走能散先入肺傳於心脾而透骨通諸

竅散鬱火逐鬼邪聰耳明目消風化濕治驚癲痰迷目赤膚翳

之功效嘔吐出黏骨痛齒痛治痘瘍陷瘍作引酒服或紫草

難產

新服水調之耳聾鼻瘻中

瘡肉點之自出皆通竅之功

喉痺舌出黏骨痛齒痛治痘瘍陷瘍作引酒服或紫草

難產

新服水調之耳聾鼻瘻中

五痔。風病在骨髓者宜之。若在血脉肌肉。輒用腦麝。反引風入骨。如油入麵。莫

之能出。目不明屬虛者。不宜入點。

葛謙曰冰片大辛熱用之點眼取其散出火邪。蓋火鬱發之從治法也。世人誤以爲寒而常用之。遂致積熱瞎目。故曰眼

不點不暗者此也。芳香為

以杉木炭養之則不耗散牙痛冰片砂末各少許擦腫立止

內外痔冰片分半葱汁化搽之

今人有以樟升漁乳之

百藥之冠。杏基者性必溫熱。

大置足心微火烘之汗出為效。牙痛丸彈子

集要云和烏頭爲末。醋丸。冰片砂末各

湯洗過搽之。其爲末以退瘡之

樟腦 宣補破除濕 辛熱善竇。能於水中發火。

置水中焰益熾

通關利滯。除濕殺蟲。置鞋中去脚氣。

阿魏 鴻臚 級 辛平入脾胃。消肉積。殺細蟲。去臭氣。

蒜白研之用鉢研細。熱酒器上。煖過入藥。

解蕈菜自死。牛馬肉毒。治心腹冷痛。瘧痢。

據病多由積帶而起。傳尸疳癆。症蟲。人之血氣聞香則順。聞臭則逆。虛人雖有痞積。當先養胃氣。胃強則堅。積漸磨而消矣。不宜用此臭烈更傷胃氣。出西番木脂。熬成極臭。試取少許。安銅器一宿。沾處白如銀汞者真。

人多以胡蒜白研之。用鉢研細。熱酒器上。煖過入藥。 大苦大寒。功專清熱殺蟲。涼肝明目。鎮心除煩。治小兒驚癇。敷齷齒。

淨敷半和散

濕癬。吹鼻殺腦疳。除鼻癢。脾胃虛者。忌投。

出波斯久木脂也。

蘆薈 鴻臚 淨敷半和散

大苦大寒。功專清熱殺蟲。涼肝明目。鎮心除煩。治小兒驚癇。敷齷齒。

以鹽湯洗半和散。吹鼻殺腦疳。除鼻癢。脾胃虛者。忌投。出波斯久木脂也。

胡桐淚

鴉蠅
殺蟲

苦能殺蟲。鹹能入骨軟堅。大寒能除熱。治咽嗽熱痛。

磨搗取涎

齒齦風瘡。骨

槽

今日齒家多
用爲要藥

結核瘰疬。

切勿多服。令吐無休。

出涼肅乃胡桐脂。

入土得斤鹵

之氣結成。如小石片。名石淚。入藥最勝。

木淚及樹脂流出者。其狀如膏油。不堪用。

牙疳宣露臘血臭氣者。胡桐淚一兩。杞根一升。每用五錢煎湯熱敷。

本草從新 卷七 木部

十

本草從新卷八

木部
喬木

黃柏
潔清熱

苦寒微辛沉陰下降瀉膀胱相火

足太陽引經藥

除濕清熱療下焦虛

非真氣補

也督苦燥辛食辛以潤之腎欲堅食苦以堅之相火退而腎固則無任薄之患按腎本屬水虛則熱矣心本屬火虛則寒矣

骨蒸勞熱諸痿癱瘓

熱甚則傷血血不榮筋則

利濕爲治療要藥或兼氣虛血虛脾虛腎虛濕痰死血之不一宜隨證施治

目赤耳鳴煩渴消渴黃

利短而爲尚濕勝則傷弱不束骨則

引長而爲癓合蒼朮名二妙散清熱

疽水腫便閉

王子夫病便閉腹堅如石腹裂出水治滿利小便藥猶服不效東垣曰此奉養太過膏肓積熱損傷胃水致膀胱乾涸小便不化火又逆上而爲嘔吐難經所謂量則不得小便格

水滯清熱療下焦虛

則壯逆內經所謂無陰則陽無以化也遂處以北方大苦寒之劑黃柏知母各一兩酒

洗研桂一錢爲引名滋腎丸服二百丸末幾前陰如刀割火燒澗出如泉腫脹便消

血腸風漏下赤白

數皆濕熱爲病

諸瘡痛癰凍瘡

敷乳謂

頭瘡

末

口瘡

蜜炒研細凡口瘡用涼藥不效者乃中氣不足虛火

胃炒黑能止崩帶酒製治上蜜製治下惡乾漆得知母良

時珍曰知母佐散火之標寒者加附子或陰官桂引火歸元

殺蟲安蛇必尺脈洪大按之有力方可用

若虛火誤服有寒中之變川產肉厚色深者良生用降實火蜜炙則庶不其傷

胃炒黑能止崩帶酒製治上蜜製治下惡乾漆得知母良

時珍曰知母佐散火之標寒者加附子或陰官桂引火歸元

有金木相生之義古云黃柏無知母猶水母之無蝦也蓋黃柏能制命門膀胱腎中之火知母能清肺金盛腎之化源千金方治小兒重舌黃柏根竹根塗之其妙

槐實
即槐角

瀉風

熱清肝涼大腸

疏風熱治煩悶風眩痔血腸風

內痔

痔道有肉名風痔頭上有孔名痔瘻瘻內有蟲名蟲痔大法用槐實地榆生地人參涼血生血外防風桑枝風濕歸芎和血黃芩枳殼賣陽升麻升提治風熱同不宜專用寒涼須兼補對收功陰瘻

濕癢明目去淚

清肝淚爲肝熱

固齒烏髭

稱乃虛星之精十月上已採青牛膽中陰乾百殺蟲墮胎

槐性純陰虛寒者宜戒卽虛熱而非實火亦勿妄投

去單子及五子者銅鎗搘

碎牛乳拌蒸

槐花

鴆血涼血

苦涼功同槐實涼血治風熱目赤赤白痢泄五痔腸風吐崩便効諸血

上

出血如線者名舌期炒研摻之

忌同槐實含蕊而陳久者佳微炒

苦棟子

一名金鉢子鴆熱治疝殺蟲

苦寒有小毒能導小腸膀胱之熱因引心包相火下行通利

小便爲疝氣要藥亦治傷寒熱狂熱厥腹痛療瘡疥殺三蟲

其津液者取根皮濃煎飲

加勝服下其蟲而渴自止

苦寒止宜於殺蟲脾胃虛寒者大忌川產良酒蒸待皮軟

刮去皮取肉去核凡使肉不使核使核不使肉如使核搾碎茴香爲使花

皆效洗服驚癇風濕諸癆

秦皮

鴆熱治目病

苦寒色青性濁以其除肝熱而平木故治目疾

洗服皆效

驚癇風濕諸癆

以其收濁故治崩帶下痢

苦寒清熱是其所長綱目謂其久服輕身益精有子

未必然也出西土皮有白點瀆水碧色書紙不脫者真今藥客皆以此皮縛北

細辛大戟爲使惡吳茱萸

赤眼生翳水煮秦皮一兩清日日溫洗

樗根白皮

卽臭椿根皮潤腸燥溼

苦燥濕寒勝熱濬收斂入血分而牆血去肺胃之陳痰治濕

熱爲病泄瀉久痢崩帶腸風

夢遺滑精有斷下之功

一婦年四十餘既無度多食魚蟹

雜下大陽連肛門其痛用止血劑藥不效用腸風藥谷甚蓋陽風有血無熱也服熱藥腹脹痛血愈下服冷藥住篤食成服至平無則若不知半餉垂死或數服服人家散傳皮人參各一兩爲末空心溫服或半錢

欵下二
錢達愈

去疳蠶

苦寒之性虛寒者禁之腎家真陰虛者亦忌以其徒燥耳痢疾

積滯未盡者勿遽用勉強固瀆必變他證葉功用相倣差不及爾 椿根白皮椿根
皮主用相倣力稍遜之根東引者良去粗皮醋炙或蜜炙忌豬肉熟麵止入

丸散不入湯煎

櫻櫛金止

苦能瀉熱瀆可收脫燒黑能止血

紅見黑則止同側柏枝存性飯丸止逐年下血亦可煎服

治吐衄崩帶

腸風下痢惟去血過多滑而不止者宜之若早服恐停瘀爲害年久敗樁良與髮灰同用尤佳燒黑須存性不可燒過置地上出火毒

沒石子一名無食子

清精外用染鬚

苦溫入腎瀆精固氣強陰助陽止遺淋除泄痢收陰汗烏鬚髮

性偏止瀆不宜多用獨用出大食諸番顆小紋細者佳揀去蟲食成孔者忌銅

鐵器用漿水於砂盆中研乾焙再研如烏犀色

牙齒疼痛不能行投一錢咬之涎出吐去效

訶黎勒一名訶子

腸飲肺下氣

苦溫以泄氣消痰

海魚放涎凝滑起不能行投刺子湯尋化爲水化痰可知

酸瀆以斂肺收脫除

脹滿下食積利咽喉通津液開音止渴治冷氣腹脹膈氣嘔逆痰嗽喘急瀉痢脫

肛腸風崩帶同烏梅倍子則收斂同陳皮厚朴則下氣得人參治肺虛寒嗽得陳皮砂仁治冷氣腹脹

佐白朮蓮子治虛寒久瀉佐樗皮治腸脹便血同桔梗五味山茱萸陳皮杜仲治虛寒瀉下

嗽痢初起者勿服雖酸瀆卻又泄氣氣虛者亦忌性溫若肺有實熱瀉痢因濕熱

氣喘因火沖者法咸禁之。

丹溪以爲降火殊爲不然東垣以爲嗽藥中不可用亦是信見

從番舶來嶺南亦有六棱黑

厚朴

鵝下氣
熱滿

苦降能瀉實滿

辛溫能瀉濕滿

脹滿證不同消補貴得其宜氣虛宜補氣血虛宜補血食積宜消導痰滯宜行痰扶熱宜清熱濕盛

宜利^寒寒^熱者散寒怒^鬱者行氣

蓄血者消瘀不宣專用行散藥

入足太陰陽明

脾胃與

能調中

佐蒼朮爲平胃散平胃土之太過以致於中和消痰化

食行結水破宿血散風寒殺臟蟲治反胃嘔逆喘嗽瀉冷痛霍亂一切客寒犯胃濕氣侵脾之證但可施於元氣未虛邪氣方盛若脾胃虛者切勿沾唇雖一時未見其害而清純冲和之氣潛傷默耗矣孕婦服之大損胎元

厚紫潤味辛者良刮去粗皮切片薑汁炒乾薑爲使惡澤瀉硝石忌豆

柏之動氣 榮樹皮也肉厚紫潤味辛者良刮去粗皮切片薑汁炒乾薑爲使惡澤瀉硝石忌豆

皂莢

一名皂角
宣通竅搜風

辛溫而鹹有小毒入肺大腸兼入肝經性極尖利搜風泄熱吸之

導之則通上下關竅而涌吐痰涎搐鼻立作噴嚏治中風口噤胸痺喉痺

凡中風不省人

事口噤不能進藥急提頭髮手捲人中用皂莢末或半夏末吹入鼻中有瘻者生無瘻者爲肺氣已絕死或用稀涎散吐之皂莢末一兩白礬五錢每用一錢溫水調灌或加藜蘆少麝鵝飼探喉令微吐稀涎再用藥治年老氣虛者忌用

服之則除濕去垢

最去油膩刮入腸胃

宣壅導滯

取中段湯泡服治老人風癆

消痰破堅殺蟲下

胎治風濕風癩痰喘腫滿堅癥囊結

厥陰肝脈絡陰器寒客肝經則爲囊結

塗之則散腫消毒煎膏貼

一切痺痛合蒼朮焚之辟瘟疫濕氣濟急頗有神效稍涉虛者切勿輕與孕婦忌之

一種小如猪牙一種長而枯燥一種肥厚多脂者良去皮子弦或蜜炙酥

炙絞汁燒灰.柏實爲使.惡麥冬畏人參苦參.

性能消熱不結.英者繁樹一孔入鉢封之則結
病矣.經見之久則成孔故此木不能攀蔓

子去皮水浸軟煮糖漬食之.治大腸燥結.

汪機曰其性得濕則滑時珍曰本療瘻惡瘡卒

頃痛皂莢末吹鼻取嚏
諸不通皂莢末吹之

皂莢刺

宣通竅

辛溫搜風殺蟲.功同皂莢.其鋒銳直達病所.潰散癰疽.治腫毒妬.

乳乳離汁不出內結成腫名癰

風癟搗風乃醫氣熱風寒客於脈而不去也.經曰脈風成爲搗脈與營皆血也.蒸露爲末.大黃湯調下

癬瘡米醋熬嫩

胎衣

不下.爲癰疽未潰之神藥.已潰勿服.孕婦亦忌.

葉洗風瘡.

肥皂莢

禹熱宣行

辛溫微毒.除風去垢膩.

潔身豐面多用之

療無名腫毒有奇功.

不內奇癘惡毒用生肥皂去子故及

水楊枝葉宣行 苦平痘瘡頂陷.漿滯不起.煎湯浴之.

此因血氣凝滯或風寒外束而然宜用水楊枝葉無葉用嫩枝五角沸水一盆

熱湯浴如冷添湯良久照見舉起有暈綠者漿行也.如不滿再浴之虛人只洗頭面手足雖浴不起者死
主及癩瘡者皆不可.谷若內服助氣血藥其效尤速此方有變理之妙蓋黃鍾一動而萬物皆亨東風

一吹而堅冰解
康之義也夫

西河柳葉

一名赤柳
滑利破下宣解毒

甘鹹而平.消瘡解酒.利小便.療諸風解諸毒.近又以治瘻瘍.

榆白皮滑利破下宣解毒

甘平滑利.入大小腸膀胱經.通二便利.利諸竅.行經絡.滲濕熱.滑胎.

下有形留著之物.治五淋腫滿.小便利.通嗽喘.不眠.

云橘令人誤療疥癬

產.或胎死腹中.下有形留著之物.治五淋腫滿.小便利.通嗽喘.不眠.

橘康養生言.治療疥癬

禿瘡消赤腫妬乳。和陳諳津封日敷尤易效十劑曰滑赤白二種來皮爲麵。荒年當糧可

可去著多桑子根白皮之屬是也

食香料用之黏滑甚於膠漆去粗皮取白。

小兒蟲瘡海桐皮末和猪脂塗綿上覆之立瘥火燄潤瘡擦皮嘴塗之

海桐皮宣祐苦平入血分祛風去濕殺蟲能行經絡達病所治風篤頑痺腰膝疼痛。

煎服或含嚥

者不宜出廣南皮白堅韌作索不爛。

風癬有蟲海桐皮蛇床子末等分臘佳

膏

目赤

洗

腰膝痛非風濕

杜仲補腰膝甘溫能補微辛能潤色紫入肝經氣分潤肝燥補肝虛子能令母實故兼

皮中有絲有筋骨相著之象

腰痛

經日腰者

腎之府轉

補腎肝充則筋健腎充則骨強能使筋骨相著。

移不能腎將憊矣膝者崩之府仲屈不能筋將憊矣一少年新娶得脚軟病且痛甚作脚氣治不效孫仲曰此腎虛也用杜仲一兩半酒半水煎服六日全愈按腰痛不已者實腎虛痛有定處數死血往來走痛

醫家續腰冷身重遇寒即發屬寒濕或痛或止屬受孕一兩月以杜仲八兩糯米同炒斷續斷二兩酒浸山藥六兩糊丸或裹肉丸米飲下二藥大補腎氣托住胎元則胎不墮

陰下濕養小便餘瀝胎漏。

腰血

經日腰者

腎之府轉

胎墮。

胎者謂墮

胎者

腰之府轉

廣湖南者佳。

色黃皮

皮厚肉厚

川杜仲色

去粗皮剉或酥炙蜜炙鹽酒炒薑汁炒斷絲用惡元參。

黑皮厚肉
薑不堪用

合歡皮一名夜合和調心脾。

心爲君主之官土爲萬物之母二職

謂和則五臟自安神明自得養生訣

云合歡相忘正謂此也

同

和血止痛明目消腫續筋骨長肌肉。

丹溪曰補陰之功甚捷與白蠟同入膏用神效而外科未用何也

同

塗蜘蛛

殺蟲不拘入煎爲末熬膏外治並妙得酒良。

生油

蕪荑

辛散滿苦殺蟲溫燥濕化食

諸蟲皆因風而生氣食皆因寒而潤

祛五臟皮膚肢節風

濕心腹積冷癥痛鼈瘕

直指方云增酒人血入於酒爲酒竈多氣人血入於氣爲氣竈虛勞人病血入竈爲血竈如蟲之行上侵人裏下侵人肝或附陽背或附陰腹無用

者雖有積勿概投形類榆莢陳久氣瘤者良

蕪荑炒兼暖胃理氣益血之藥乃可殺之

痔瘻瘡癬小兒驚疳冷痢

得誠子薏良

胃中蟲痛未米飲下脾腎虛

者雖有積勿概投形類榆莢陳久氣瘤者良

牙蟲作痛以蕪荑仁安丸中及燒中甚效

烏柏木根皮

蕪荑熟

苦涼性沉而降利水通腸功勝大戟療疔腫解砒毒

凡患腫毒中風者不拘服及之治風即治風先治血血行

花葉搗汁多飲得大利卽愈

鹽齁痰喘

柏樹去粗皮搗汁和飛麵作糊略熟早晨與兒吃三四箇待吐下鹽涎乃住如仍不行以熱茶催之

極能瀉下稍虛者

忌柏油塗一切腫毒瘡疥

蟲瘡舊謂作衣化油塗之卽著此衣次日蟲出油上鹽之有聲

蘇木

綠行血祛風

甘鹹辛平入三陰血分行血去瘀宣表裏之風

元素曰宜與防風同用但此之治風卽治風先治血血行

風自滅之義不宜與防風同用也

治產後血暈脹滿欲死

葛洪肘後百一方者汁服海藥方加乳香酒服此皆乘後故血上冲實證也若挾虛氣喘面黑欲死乃取而乘

虛入肺也用蘇木二兩水二杓煮一杓入人參末一兩服隨時加減神效不可言若產後

去血多氣隨血去脈急神倦口鼻氣冷胸腹無滯而暈者宜單用大劑獨參湯以固其脫

血痛血瘀經

閉氣壅癰腫撲傷排膿止痛無瘀滯者忌之

出蘇方國

故又名蘇方木

交趾亦有忌

鐵

未敷刀斧斷指外以鈍頭敷好卽接

乾漆

漆皮血消

必有瘀血停滯

血見乾漆便化爲水其能損新血可知虛人及慣生大瘡者戒之勿爲丹

溪兼補之說所誤

其毒者杉木湯蒸蘇湯醫

湯俱可解之生漆瘡者涼之

炒令烟盡爲度或燒存性半夏爲使畏

辛溫毒烈功專行血殺蟲破年深凝結之滯積瘀血續筋骨絕傷

炒令烟盡爲度或燒存性半夏爲使畏

川椒紫蘇鷄子蟹添得蟹

燥淡外
用治瘡

熱有退癰之功而傷血致
病將愈而先失明者

出南番子中有仁白色久則油黃不用入丸藥壓去油

丹溪曰粗工治大風病佐以大風油殊不知此物性

大風子通大燥 辛熱有毒取油治瘡癬疥癩有殺蟲刮毒之功

丹溪曰粗工治大風病佐以大風油殊不知此物性

有病將愈而先失明者

出南番子中有仁白色久則油黃不用入丸藥壓去油

壽域神方

治手背皺裂大
風子搗泥塗

巴豆通大燥

辛而大熱大毒開竅宣滯去臟腑沉寒最爲斬關奪門之將

大黃巴豆同爲燥下之劑

但大黃性寒驕病多熱者宜之巴豆性熱驕病多寒者宜之故仲景治傷寒傳裏多熱者多用大黃東垣治五積屬羸者多用巴豆

丸五十粒服二日不癒而愈自是每用治瀉痢愈者近百人

破疾癖血癥氣痞食積生冷

硬物所傷大腹水腫瀉痢

時珍曰一婦年六十瘧篤五載投生冷油膩肉食卽作痛服升蕎藥瀉反甚厭沉而滑此乃脾胃久傷精食滯瀉法當以熱下之用蠶蠶巴豆

驚癇口喎耳聾牙疼喉痺

一兩鬱金一錢巴豆十四粒去皮油

爲丸每服五分津蘿下雄黃破結氣鬱金散惡血巴豆下稠涎然係厲劑不可輕用或用紙撲蘸巴豆油然火刺喉或搗巴豆綿裹隨左右納鼻吐出惡涎紫血卽難鼻雖少生瘡無礙

殺蟲通經

爛胎油作紙擦燃火吹息或薰鼻或刺喉能出惡涎惡血治中風中惡痰厥氣厥

喉痺不通一切急病

元素曰不可輕用鬱滯難開真陰隨損以少許著肌膚卽

起泡况腸胃柔薄之質無論下後耗損真陰卽臟腑被其薰灼能無潰爛之患耶

萬不得已亦須炒熟去油入少許卽止或用殼或用仁用油生用炒用醋煮燒存

性用好古曰去心皮臘油生用爲急治水穀道路之劑炒去油令紫黑用爲緩治消堅磨積之劑可以通腸可以止瀉也

去油名巴豆霜芫花爲使畏大

黃黃連涼水中其毒者以此解之或黑豆綠豆汁亦良

得火良

疣瘻黑子巴豆一錢石灰拌過人信一錢糯米五分炒研點之

根皮治癰疽發

背腦疽癰

搗取洗搗敷處留頭沙不可
收銀陰乾時水搗亦可

本草從新 卷八 木部

本草從新卷九

木部

闊木類

寓木類

桑根白皮

鴉肺

甘辛而寒。瀉肺火。

養血乃瀉肺
方之準則也。

利二便。散瘀血。

下氣行水。

止嗽清痰。

肺熱喘滿。唾血。

熱渴水腫。

腫脹。肺虛無火。

及因風寒而嗽者。

勿服。

刮去薄皮。

肺熱喘滿。唾血。

熱渴水腫。

腫脹。肺虛無火。

及因風寒而嗽者。

勿服。

刮去薄皮。

或乾者煎水塗之甚效。

乾桑枝

宣桂

苦平。通關節。

行津液。祛風利水。

治風寒濕痺諸痛。

以其入四肢也。

水氣脚氣。

氣升。

一日服盡。

名桑枝煎治風氣脚氣。

乾桑葉

涼血祛風

苦甘而涼。

得金氣而柔潤不燥。故論嘉言。

清燥救肺湯以之爲君。

滋燥涼血止血。

刀斧傷者爲末乾桑葉。

未乾桑葉。

去風長髮。

未乾桑葉。

去風長髮。

明日

黑芝麻等分

大名扶桑力除濕。

去風烏賀明日。

代茶止消渴。

末服止盜汗。

嚴州有清每

身比目衣皮皆透。

二十年不能療。

寺教採湯。

用經霜者。

乾桑葚

一名文武實補肝腎

甘酸而溫。色黑入腎而補水。

桑乃箕星之精其精英盡在於甚。

利五臟關節。安魂鎮神。

聰耳明目。生津止渴。

陳齊又能治服金石藥熱渴。

利水消腫。解酒烏鬚。

不可多食。多食致劖。

晒乾爲末蜜丸良。新鮮桑葚瀝汁熬膏入蜜煉稠點湯和酒並妙。入燒酒經年

愈佳。每日湯貼服亦治瘧癱名文武膏

楮實一名穀實
鴟鴞堅甘寒而利消水腫療骨哽明目軟堅。

時珍曰別錄大明皆云大補益而修真秘書又云久服令人骨髓濟生秘覽治骨哽用楮

實煎湯豈非破骨之徵乎南唐書云烈祖食蛤喉中噎醫莫能愈吳廷紹譜進楮實湯一服疾去羣醫他日取用皆不驗平廷紹答云噎因甘起故以此治之此卽治骨哽軟堅之義爾翠墨用治他噎故不驗也落按陶隱居蘇頌抱朴子皆甚言其功而方書用之爲補者除楊氏還少丹而外不多見其他如外臺祕要用以敷治身而石疽機要用以治水氣脹集簡用以治喉風喉痙直指用以治肝熱生瘡無非涼寫軟堅之義則古本諸說本可信也

水浸取沉者酒蒸皮甘平善行水治水腫氣滿皮可爲紙搗汁和白芨飛麪糊

和接紙水葉甘涼祛濕熱治老少下痢瘧痢爲末白痴姜湯下赤白痴姜糖湯下

枳實枳殼鴟鴞破氣行痰苦酸微寒皆能破氣氣順則痰行喘止痞脹消。

脾無積血心下不痞濁氣在上則生膜脹東垣

枳殼治下而主血根殼治上而主氣刺痛息後重除治胸痺結胸食積五膈痰癖癥結嘔逆欬嗽水

腫脹瀉痢淋閉痔腫殼所主略同但枳實利胸膈枳殼寬腸胃枳實力猛丹淳

枳殼力緩爲少異時珍曰殼實上世未分魏晉始分殼治上實治下海藏始分殼主氣實主血然仲景治上馬解胸痞用枳實古方治

下血痢痔陽秘後重用枳殼則實不獨治下而殼不獨治上也蓋自飛門至魄門皆肺主之三焦相通一氣而已大損真元脹滿因於邪實者可用若

因土虛不能制水肺虛不能行氣而誤用之則禍不旋踵氣弱脾虛以致停食痞

滿法當補中益氣則食自化痞自消若再用此破氣是抱薪救火矣孕婦虛者忌

之。元素曰枳殼泄氣走大腸損胸中至高之氣昔湖陽公主難產方士進瘦胎飲用枳殼四兩甘草二兩五月後日服一錢懷古改以枳朮名東胎丸啟宗貞明其不然善孕婦全賴血氣以養胎血氣充實

胎乃易生彼公主奉養太過氣實有餘故可服之若概施則誤矣吾用海白瘦胎東胎名目亦啓祖工政
伐之門時珍曰八九月胎氣陰虛當用枳殼葛根梗以順氣胎前無病則產後無虛氣者誠大非所宜矣

皮厚而小爲枳實殼薄虛大爲枳殼陳者良麸炒用枳實枳殼又有采狗橘橘爲者

梔子(燒心肺三焦之火)苦寒輕飄象肺色赤入心瀉心肺之邪熱使之屈曲下行由小便出

海藏曰或用爲利小便藥非利小便乃肺清則化行膀胱津液之腑得此氣化而出矣

而三焦之鬱火以解熱厥(厥有寒熱二證)

心痛以平(丹溪)

曰治心痛當分新久若初起因寒因食宜溫尚久則鬱而成熱若用溫劑不助痛而添病乎古方多用梔子爲君熱藥爲之向導則邪易失此病雖日久不食不死若病止恣食病必再發作也

吐衄

崩淋血痢之病以息(最清胃腑之血炒黑末服吹鼻治衄)

治心煩懊惱不眠(仲景用梔子破湯好古曰煩者氣也躁者血也故梔子治肺煩香附也)

治腎躁亦用作止藥以邪在上焦吐之則邪散經所謂其高者因而涌之也接梔破湯吐虛煩客熱瓜蒂散吐痰熱客寒

五黃(古方多用梔子茵陳)

五淋目赤紫癰白癟

炮礲瘡瘍(皮膚肺所主故也)損胃伐氣虛者忌之心腹痛不因火者尤爲大戒世人每用治血不知血寒則凝反爲敗證(本草匯曰治實火之血順氣爲先氣行則血自歸經治虛火之血正氣爲先氣壯則自能攝血丹溪曰治血不可單行單止亦不可純用)

寒涼(氣有餘而逆爲火氣即是降火)內熱用仁表熱用皮生用瀉火炒黑止血姜汁炒止煩嘔(燒灰)

劖止(汗篇心君易動皆由膽怯所致經脉也)寧心(心君易動皆由膽怯所致經凡十一官皆取決於膽也)

療膽虛不眠(溫膽湯中或加用之肝虛則膽亦虛肝不藏神故不寐血不歸脾臤亦不安全

酸棗仁(補肝膽斂汗)甘酸而潤生用酸平專補肝膽(今人事以爲心家藥殊未明耳)炒熟酸溫而香亦能醒脾助陰氣堅筋骨除煩止渴(生津)

斂汗(經疏曰凡服固表藥而汗不止者用棗仁炒研同生地白芍北五味麥冬龍眼肉竹葉煎服多效以

置治虛勞虛症不眠用酸棗仁湯(棗仁二升甘草炙知母茯苓芍藥各二兩深師加生薑二兩此補肝之劑經曰臤則而臤於肝蘇知曰一方加桂一兩一方棗仁皆生用治不得眠則生用療膽熱好眠之說未

可知也。善胆熱必有心煩口苦之證。何以反能好眠乎？若肝火鬱於胃中，酸收而

以致倦怠嗜臥，則當用辛涼透發。肝火如柴薦之屬，非棗仁所得司也。

酸收而當疏風清熱。

肝膽

二經有實邪熱者勿用。炒香研惡防已。

蕤仁

一名白接。風清熱治目。消

甘微寒。消風清熱和肝明目。退翳膜赤筋。理眞傷淚出。

凡目疾在表

在裏。屬腎虛血少神勞。宜補腎養血安神。

當疏風清熱。

破心下結痰。除腹中痞氣。

皆肝邪

目病不緣風熱而因於虛者。

勿用。

叢生有刺實如五味圓扁有紋紫赤可食。湯浸取仁去皮尖水煮過研膏。

山茱萸

補肝腎

溫精氣。通九竅。

經疏云：楮氣充則九竅通利。鄭康曰：山茱萸通九竅。古今疑之。得經疏一言而意旨豁然。

始載。前人識見深遠不易測度。多有如此類者。卽經疏一言而擴充之實可發覺人之迷悶也。

如何？

以

與通竅同義。汗屬陰血乾枯汗從何來？唯補陰助陽始有黑蒸雨致

之妙。鄭康曰：該解外滿何以反發恐屬誤文。何其明於彼而昧于此也。

腫。能除風。

鼻塞目黃。

肝虛邪客。期目黃。

皆固精通竅之功。好古曰：滑則氣絕。

月事過多。

強陽不痿。小便不利者不宜用。

去核。

滑精。

陳久者良惡防已。

防風桔梗。

金櫻子

固腸

酸澀平固精秘氣治滑精。

名水陸三仙丹。

泄痢便數。

性澀而不利於氣。

丹溪曰：經效速道以通暢為和平狀者喜其澀精而服之，致生別證自作不靖咎。將詭執時珍曰：無故而服以療然則不可。若精氣不固者服之何害？

似榴而小黃赤有刺。

取半黃者熟則甘。

去刺核研或熬膏。

全失澀味。

郁李仁 血潤氣破
血潤氣燥

辛苦甘平性降下氣行水破血潤燥治水腫癰急大腸氣滯關格不

通用酒能入膽治悸目張不瞑

一婦因大恐而病愈後目張不瞑錢乙曰目係內連肝膽恐則氣結膽橫不下郁李潤能散結隨酒入膽結去膽下而目瞑矣

下後令人真液虧損燥結愈甚乃治標救急之藥津液不足者慎勿輕投湯浸去皮尖蜜浸研如膏

女貞子

補陰除火

甘苦涼少陰之精隆冬不凋益肝腎安五臟強腰膝明耳目烏鬚髮補

風虛除百病

女貞酒蒸晒乾二十兩桑葉乾十兩早蓮草十兩蜜丸治虛損百病如四月卽搗桑葉汁十斤卽搗早蓮草和藥不必用蜜時珍曰女貞上品要藥古方罕用何哉

至靜之品唯陰虛有火者宜之否則腹痛作瀉女貞冬青時珍作二種實一物

也

近人效蠶蟲于此樹冬至採佳酒蒸

七日每用點眼治風熱赤眼

五加皮

宣去風濕補壯筋骨

辛順氣而化痰苦堅骨而益精溫祛風而勝濕逐皮膚之瘀血療

筋骨之拘攣

腎得其養則痰水去而骨壯肝得其養則邪風去而筋強

治虛羸五緩

五臟筋脈緩繼

陰痿囊濕女子陰癢小兒脚弱明目縮便愈瘡瘍疝釀酒尤良

兒脚弱明目縮便愈瘡瘍疝

王惟曰風病飲酒能生火惟五加浸酒谷人

下部無風寒濕邪而有火及肝腎虛而有火者勿服

莖青節白花赤皮黃根黑上應五運之精故名芳

香五葉者佳遠志爲使惡元參

葉作蕘風濕作蕘食去

枸杞子

滋補肝腎而潤肺

甘微溫滋肝益腎

景岳曰用之以助熱地其妙

生精助陽補虛勞強筋骨

肝主筋腎主骨養

營除煩去風明目

肝開竅於目黑水神光屬腎

利大小腸治嗌乾消渴

諺云離家千里勿食枸杞以其色赤屬火補精壯陽耳然味甘性潤

仍是補之藥品所以能滋
腎益肝明日而清消渴也

便滑者勿用 南方樹止數尺北方並是大樹以甘州所產

紅潤少核者佳酒潤搗

地骨皮 涼血除熱治以甘寒
地骨一斤生地五斤酒煮服治帶下

外感之風不同 熱退則風自息 中平胸脇痛

肝下利大小腸療在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸

東垣曰地骨皮瀉腎火能治外熱地爲陰骨爲裏皮爲表朱二允曰能退內熱人所知也能退外熱人實不知病或風寒散而未盡作朝往來非柴葛治用地骨走表又走裏之藥消其浮熱之邪服之未有不愈者特表明之時珍曰拘拘地骨甘寒平補使精氣充足而邪火自退世人多用苦寒以芩連治上知柏治下致傷元氣惜哉余嘗以青蒿佐地骨退熱屢有奇功

中寒者勿用 甘

草水浸一宿

葉名天精草

苦溫而涼清上焦心肺客熱代茶止消渴

婦人陰腫或生瘡地骨皮煎水洗效

石楠葉 壓腎宣去風

辛苦平有毒散風堅腎利筋骨皮毛逐諸風療風痺脚弱浸酒飲治

頭風爲末吹鼻愈小兒通睛

小兒誤跌或打著頭腦受驚肝係受風致瞳人不正宜石楠散吹鼻通項石楠一兩蓼蘆三分瓜丁五七個爲末每吹少許入鼻孔日三

度內服牛黃平肝藥

祛風通利是其所長補腎之說未可信也 關中者佳炙用五加皮爲

使惡小薊

蔓荆子 輕宣散上部風

味苦辛平輕浮升散而搜風通利九竅治濕痺拘攣頭痛腦鳴

大陽脈

於目痛齒痛齒雖屬腎爲骨之餘而上齦屬足陽明下

陽明風熱上攻則動搖腫痛頭面風虛之證

頑痛目痛不因

風邪而因血虛有火者忌之元素云胃虛人不可食飲生痰疾產南皮縣去膜

用亦有酒
蒸炒者
惡石膏烏頭
初起酒末方寸七

木槿
嫩葉用川槿皮肥皂水浸時擦之或浸汁磨燒黃丸妙
苦涼活血潤燥治腸風瀉血病後熱渴作飲服令人得睡擦頑癬及蟲瘡

有蟲用川槿皮肥皂水浸時擦之或浸汁磨燒黃丸妙
不宜多服川產者良紅者爲真用根皮赤白帶下川槿皮二兩半煎一候空心白酒搗半煎一候空心

服白帶用
紅酒甚妙

木芙蓉
嫩葉涼血解毒

辛平性滑涎黏清肺涼血散熱止痛消腫排膿治一切癰疽腫毒有

殊功

用芙蓉花或葉或皮或根生搗或乾研末蜜調塗四圍中間留頭乾則頭換初起者卽覺清涼涌止腫消已成者卽脫出已漬者卽易結癟科就其名爲清涼膏清露散鐵桶散皆此物也或加赤小豆末或茶耳燒存性

未或茶耳燒存性

用花葉經水不止芙蓉花蓮蓬殼等分爲末米飲下二錢效

狗骨

卽箭尾刺補陰

甘微苦涼盜肝腎用木皮浸酒服惟暖脚令健

生津止渴

用葉代茶甚妙

祛風

用枝葉燒灰沐光滑而味酸濃結實如朴局子皮

有刺俗名鼠老刺又名八角茶

藏器曰此木肌白如狗之骨樹如杜仲詩云南山有杞是也蘇軾詩疏云其狀如櫟木理白滑可爲函板有木蠹在葉中卷之如子日化爲蠶絲頌曰多生江浙間取以施盒器其佳時珍曰葉有五刺如蠶之形故名樹如女貞皮埋甚白葉長二三寸青翠而厚硬四時不凋五月開細白花結實如女貞及菝葜子九月熟時赤紅色皮薄味甘核有四刺人呼其木

南燭

陰補

苦酸澀平強筋骨益氣力固精駐顏

一名天南燭

時珍曰吳楚山中甚多葉似山楂光滑而味酸濃結實如朴局子皮

子酸甘平強筋骨益氣力固精駐顏

一名天南燭

時珍曰吳楚山中甚多葉似山楂

族生青九月熟則紫色內有細子其味甘酸人家多植庭除間按古今詩話云卽楊桐也葉生者尤凌寒食其葉潤水染飯色青而光能資陽氣謂之青精飯也

皮煮省以塗鳥者謂之鵝臘

枸橘

宣解

辛溫治下痢腹血後重

同草薢等分炒存性每抹腹二錢

喉瘻消腫導毒

奇疾方呴液生瘻層層如疊不痛日

久有創出真氣感飲食用

一名臭橘

樹葉並嫩枝同但幹多刺三月開白花青葉不香結實大如彈丸形如枳實而殼薄人家多收種爲活雞或收小實爲充枳實

及青橘皮售之不可

刺風蟲牙痛以一合煎汁含之

山茶花

鵝掌

微辛甘寒涼血治吐衄腸風下血湯火灼傷

麻油

用紅者子婦人髮

植研末掺之

密蒙花

潤肝

甘而微寒潤肝燥治目中赤脈青盲膚翳赤腫眵淚羞明怕日小兒疳

氣攻眼

目

產蜀中樹高丈餘葉冬不凋其花繁密蒙茸故名揀淨酒潤焙

密蒙黃柏根末各一

兩水力桔子大

每四時處服十九至十五

日

八角金盤

鸚鵡

苦辛溫毒烈治麻痺風毒打撲瘀血停積

其氣猛烈能開通壅塞痛淋立止虛人慎之

樹高二

三尺葉如臭梧桐而八角秋開白花細簇取近根皮用

柞木

通利竅

苦平下行利竅主難產催生此木堅莖可爲鑿柄故俗名鑿子木橫

生逆產用舊鑿柄多經斧敲已經卷轉者尤妙

葉治腫毒癰疽

荊瀝

宣通筋絡

甘平除風熱化痰涎開經絡行氣血治中風失音驚癇痰迷眩運煩

悶消渴熱痢爲去風化痰妙藥

甚年秋錄云熱多用竹瀝寒多用荊瀝丹溪云虛疾用竹瀝實疾用荊瀝並宜姜汁助送則不凝滯

氣虛食少者切戒

牡荆俗名黃荊截取尺餘架輒上中間火炙兩頭承取瀝以上灌木

類

竹瀝

渴火滑
擦潤其經

甘苦寒滑清痰降火

虛者宜細參並行人參固其經竹瀝通其絡則甘寒藥味相得益彰治中風口噤經鴻云中風

未有不因陰虛火旺痰結所致如果外來風邪安得復用此寒滑之藥治之哉

痰迷大熱

丹溪曰痰在經絡四肢皮裏膜外者非此不能遠行時珍曰竹瀝性寒而滑大抵因風熱燥火而有痰者宜之若寒濕胃虛腸滑之人服之則反傷腸胃箭多食藥人增家以箭爲利陽危節此義也

而有箭者宜之若寒濕胃虛腸滑之人服之則反傷腸胃箭多食藥人增家以箭爲利陽危節此義也

卒然牙疼

瘡苦竹瀝乘熱消之

風癇癲狂自汗煩

悶消渴反胃

和米粥服

竹能損氣故虛人食箭甚不相宜

竹類其多淡竹肉

薄節間有粉多汁而甘最良勒竹堅而節促皮白如霜苦竹本粗大葉長潤筍味

姜能除痰且濟其寒故每兼用小兒

瘡竹瀝和黃連黃柏黃丹敷之效

苦入藥惟此三種取竹瀝如取荆瀝法薑汁爲使

竹能損氣故虛人

食箭甚不相宜

竹類其多淡竹肉

熱膈噎嘔嘔

胃熱吐血衄血

清肺涼胃止血不止便解含之

竹瀝驚癲

清肝火

崩中胎動

涼胎氣

刮去青皮

竹茹

腐上黑煩

熱涼血

甘而微寒開胃土之鬱清肺金之燥涼血除熱治上焦煩熱溫氣寒

用第二層

齒血不止醋浸令人舍之燒其背上

竹葉

鴉上焦熱

辛淡甘寒涼心緩脾消渴止痰除上焦風邪煩熱

葉在上故治上焦仲景治

傷寒發熱大渴有竹葉石

竹葉須

齊湯乃假其辛寒以瀉邪熱也

效逆喘促嘔嘔吐血中風失音小兒驚癲

凡用竹瀝竹茹竹葉須

生甫及一年者爲嫩而有力

竹根同葉煎湯洗婦人子宮下脫

天竹黃

鴉涼心

以瀉其辛

甘而微寒涼心經去風熱利竅豁痰鎮肝明目功同竹瀝而性和緩

無寒滑之患治大人中風不語小兒客忤驚癲爲尤宜久用亦能中寒出南

海大竹之津氣結成

即竹內黃粉

片片如竹節者真以上草木類

琥珀

通行水散
瘀安神

甘和以脂入土而成寶故能通塞以寧心安魂魄療癲邪

從黃堅藥
以安心神

赤

色入手少陰足厥陰血分心故能消瘀血破癰瘍生肌肉合金瘡

從辛溫藥
破血生肌

其味

甘淡上能使行肺氣下降而通膀胱

通飲食入胃得溢精氣上歸於肺通諸水道下輸膀胱凡參藥皆上潤而後下降

故

能治五淋利小便燥脾土

從淡參藥則
利竅行水

又能明目磨翳淡滲傷陰凡陰虛內熱火

炎水虧者勿服若血少而小便不利者服之反致濕燥之苦

松脂入土年久結

成

韓保昇曰楓脂
入地亦能結成

以手心摩熱拾芥者真以柏子仁入瓦鍋同煮半日搗末

茯苓

通行水霽
心益脾

甘平益脾寧心淡滲利氣除濕色白入肺瀉熱而下通膀胱

能通心氣
于腎使熱

小便結

從小便出然必上行入肺清其化源而後能下降利水故潔古謂其上升東北謂其下降各不相背也

舌乾口爲脾竅舌爲心生津止渴

則津生因熱去

治憂恚驚悸心下結痛寒熱煩漏口焦

者能通多者能止

素問曰肺氣
盛則便數

功專行水伐腎小便不禁虛寒精

滑及陰虧而小便不利者皆勿妄投

松根靈氣結成產雲南色白而堅實者佳

去皮

產浙江者色雖白而體鬆其力甚薄
近今茯苓頗多種者其力更薄矣

赤茯苓

通利
濕熱

白者入肺膀胱氣分赤者入心

小腸氣分

時珍曰白入氣赤入血

益心脾白勝利濕熱赤勝

茯苓皮

通行
水

專能行水治水

腫脹

以皮行皮之義若皮可用之凡腫而煩渴便謂渴赤屬陽水宜五皮散疏藥飲不煩

大便溏小便數尿陰水宜實脾飲法氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便

茯神

通行水
竊心

主治與茯苓同而入心之用居多開心益智安魂養神療心虛驚悸多

患善忘卽茯苓抱根生者

以其拘心故入心之用多

去皮及中木 茯神心木

名黃松節

療諸筋攣縮

偏風唱斜心掣健忘

心木一兩乳香一錢石器炒研名松節散每服二錢木湯下治一切筋掣疼痛乳香能伸筋木瓜熊筋也

二茯俱惡白蘚

畏地榆秦艽鼈甲雄黃忌醋

面齧雀斑用白茯苓末蜜和夜夜敷之二七日愈

猪苓

通行水

甘苦淡平泄滯利竅入膀胱腎經升而能降開腠發汗利濕行水與茯苓

同而泄較甚治傷寒瘟疫大熱

經說曰大氣利小便亦分消之意

懊憹消渴熱腫脹淋濁瀉痢瘧瘧

瘧多由暑著必兼濕熱

宗奭曰損腎昏目潔古云淡滲燥亡津液無濕者勿服

多用

楓樹下塊如猪屎故名

馬果曰通猪屎曰苓答卽果也古字通行

白而實者良去皮

雷丸

殺蟲消積散風濕

苦寒有小毒入胃大腸經功專消積殺蟲

殊語間竊云楊勑得異矣每發語腹有小聲應之久則聲大有道士曰有

北應聲蟲也但讀本草取不應者治之讀至雷丸不應服數粒而愈殺蟲之外無他長能令人陰痿

生故名大小如栗竹刀刮去黑皮甘草水浸一宿酒拌蒸或炮厚朴芫花爲使惡

葛根

小兒出汗有熱雷丸末二兩粉四兩搗之

苦堅腎助筋骨而固齒長髮甘益血止崩漏而下乳安胎舒筋絡而利關節和血脈而除痺痛外料散瘡瘍追風濕海外深山地暖不蠭桑無採捋之苦氣化濃蜜自然生出有言鳥啣他子遺樹而生者非也他樹有寄生恐反有害

莖葉並用忌火

去津酒服或去艾葉又治膈氣生梨情生搗汁一盞服之

以上寓木類

散風濕骨

苦堅腎助筋骨而固齒長髮甘益血止崩漏而下乳安胎舒筋絡而利關節和血脈而除痺痛外料散瘡瘍追風濕海外深山地暖不蠭桑無採捋之苦氣化濃蜜自然生出有言鳥啣他子遺樹而生者非也他樹有寄生恐反有害

