

醫方類聚卷之二百二十六

婦人門 二十一

妊娠 六

聖濟總錄 二

妊娠胎不長養

妊娠將理無方脾胃不足飲食減退不能行

榮衛化精微養衝任故令胎藏內弱子氣不

足生化稍虧巢元方謂母病療母則胎安是

也若使脾胃和而能飲食水穀化而運氣血



則何慮胎氣不長也

治妊娠胎不長養白朮散方

白朮貳兩 芍藥 人參 阿膠炙令燥各

壹兩 甘草炙剉半兩

右六味擣羅為散每服三錢匕以葱粥飲

調下日三

治妊娠養胎芎藭散方

芎藭 白朮各壹兩 蜀椒去目及閉口炒出汗三兩 牡蠣

煨研為粉半兩

右四味擣研為散每服二錢匕食前溫酒調下米飲亦得

治妊娠氣血不足胎瘦不長乾地黄湯方

熟乾地黄焙 阿膠米炒 芎藭 當歸切米炒各

貳兩 赤芍藥 甘草炙剉 人參各半兩

右七味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入粳

米少許同煎至七分去滓溫服日三

治婦人血衰不足經候慳澀致子宮不榮妊娠多病胎不長成地黄丸方

熟乾地黄 不拘多少

右一味切焙搗為末鍊蜜為丸如彈大每服壹丸空心煎當歸酒嚼下温酒亦得

治妊娠氣血虛弱令胎不長和氣養胎地黄芎藭丸方

熟乾地黄 焙壹兩 芎藭 三分 白茯苓 去黑皮半兩 人

參 切焙各三分 芫胡 去苗 刺薊 桑寄生

焙乾各半兩 厚朴 去麤皮淨生 龍骨 阿膠 炒

白石脂 各三分 黃耆 剉半兩 甘草 炙剉一分

右壹十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九不計時候粥飲下口三

妊娠心痛

妊娠心痛者蓋因痰飲冷癖或風寒邪氣上乘於心之別絡致攻擊疼痛休作有時若傷心之正經而痛者旦發則夕死夕發則旦死所以然者心為五官之主不受外邪故也治妊娠心痛痰逆不思飲食沉香湯方

沉香 剉壹兩 白豆蔻 去皮各半兩 白朮

剉炒人參 白茯苓 去黑皮 各半兩 厚朴 去龜皮 生薑汁

兩 半夏 半兩 薄切 生薑汁拌炒熟 陳橘皮 湯浸去白 焙三分

木香 半兩 乾薑 壹分 甘草 炙半兩

右壹十二味 麤搗篩 每服三錢匕 水壹盞

生薑三片 棗壹枚 擘同煎至七分 去滓稍

熱食前服

治妊娠心痛煩悶地黃湯方

生乾地黄 焙 淡竹茹 剉各桂 去龜皮 青兩 半兩

石三味 麤搗篩 每服三錢匕 水壹盞 半煎

取青蓋去滓 溫服 不拘時

治妊娠心痛溫中調氣金粟湯方

粟米 半夏 生薑汁浸五宿 切焙 各貳兩 甘草 炙 壹兩

參 半兩 白木 桂 去麤皮 壹兩 檳榔 剉四枚

右七味 麤搗篩 每服二錢匕 水壹盞 生薑

三片 煎六分 去滓 溫服

治妊娠心痛不思飲食橘皮湯方

陳橘皮 湯浸去白 焙四兩 甘草 剉炒 貳兩 厚朴 去龜皮 生薑汁

炙白木 各四兩 草豆蔻 去皮 貳兩

右五味將葱一握細切拌藥罨一宿炒令
黃色擣爲齏末每服二錢匕水一盞煎至
七分去滓溫服

治妊娠心痛脇滿不思飲食枳實湯方

枳實去瓤炒人參 赤茯苓去皮判 茈胡去木

香炮桂皮去麤 草豆蔻去皮各半兩 白木參 檳榔

生判 壹兩

右九味麤擣篩每服二錢匕水一盞煎取
七分去滓溫服不拘時

治妊娠心痛嘔逆不思飲食芎藭湯方

芎藭 甘草炒 芍藥 草豆蔻去 榔各

貳兩

右五味麤擣篩每服二錢匕水一盞煎一
枚擘生姜三片煎至七分去滓溫服不拘

時

治妊娠心痛脹滿胎不安大腹湯方

大腹皮判 芎藭 赤茯苓去皮 陳橘皮湯

去白 人參各三分 當歸切 苧麻根判 紫蘇莖

葉各壹兩

右八味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎取壹盞去滓溫服不拘時

治妊娠心痛不可禁忍沉香湯方

沉香剉厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩附子炮裂去皮臍尖陳

橘皮湯浸去白焙甘草炙各半兩白朮各二兩芎藭各二兩

右七味剉如麻豆每服二錢匕水一盞生姜三片棗一枚擘同煎至六分去滓溫服

治妊娠心痛胃腕不利嘔吐冷痰七寶湯方

半夏半兩生薑汁浸透切炒大腹皮剉日草炙草豆

薤去皮訶梨勒剉去核白朮各一兩郁李人去皮一分

木香半兩乾蠍去土炒人參半兩白茯苓去黑皮

芎藭各壹兩

右一十二味麤擣篩每服二錢匕水一盞生姜三片棗一枚擘同煎至七分去滓溫服

治妊娠心脾痛嘔逆不下食厚朴湯方

厚朴去麤皮剉生薑汁浸青宿炒熟白朮各四兩白芷三兩乾

姜炮一兩 甘草炙 益智皮炒去 陳橘皮去白縮切炒 沙炒去皮各貳兩

右八味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時候

治妊娠心痛時多痰逆食飲無味腹脇脹滿肉豆豉湯方

肉豆豉人煨 附子去皮臍切鹽湯浸暴乾炒 縮沙炒去皮各 半木香壹兩 白朮芎藭各一兩

右六味剉如麻豆每服二錢匕水壹盞生

薑三片煎七分去滓溫服不拘時

治妊娠心痛胸膈不利不思飲食如聖散方

人參 白朮各一兩 乾姜炮 丁香炒白 縮沙炒 檀香剉 桔梗炒各一兩 胡椒炒壹兩 甘草炙

右九味搗羅為散每服二錢匕煎湯點服

治妊娠心痛腹脇脹滿不思飲食嘔逆不止人參飲方

人參 桑寄生 阿膠炒燥 陳橘皮去白焙

茯苓

去黑皮各一兩

白朮

甘草

炙厚朴

去蘆皮牛姜汁

炙到各三分

右八味麤搗篩每服四錢匕水壹盞半煎至七分去滓溫服不拘時候

妊娠腹滿

妊娠脾氣不和痰飲留滯則中焦生寒寒則胃受水穀不能消化令人胃脹胃脹者腹滿也

治妊娠腹滿飲食遲化寬中勻氣建脾和胃

白豆蔻丸方

白豆寇

去皮

枳殼

用漿水煮令軟去瓢焙乾半斤

陳橘皮

貳兩醋漿水煮令軟

去白細判炒令黃色

訶梨勒

去核貳兩壹兩煨一兩生

用木香

貳兩

當歸

切焙

右六味搗羅為末將漿水煮去皮核爛研和藥丸如梧桐子大每服二十九至三十丸切生姜入搥炒焦黑色煎湯下不計時候

治妊娠腹滿兩肋妨悶不思飲食人參湯方

人參 厚朴去麤皮生 訶梨勒煨取 阿膠

搗碎炒 赤茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸去白

木各三分 甘草炙

右八味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入

生姜半分切棗二枚擘同煎取七分去滓

不計時候温服

治妊娠腹滿脹急可進飲食利心胃止乾嘔

丁香散方

丁香壹分 白朮各壹兩 蒼朮各壹兩 前胡去蘆頭 胡椒

高良姜 乾姜炮 葛根 厚朴去麤皮生

兩半 藿香 訶梨勒去核 旋復花各一分 甘草炙

右一十三味搗羅為散每服二錢匕沸湯

點服不計時候

治妊娠腹滿氣衝胃膈煩悶訶梨勒飲方

訶梨勒煨去核 赤茯苓去黑皮 前胡去蘆頭 大腹

皮剉 陳橘皮 桑根白皮剉各三分 白朮 芎

藟 枳殼麤炒去穰

右九味麤搗篩每服三錢匕以水壹盞入
生姜半分切棗二枚擘同煎取七分去滓
溫服不計時候

治妊娠腹滿喘逆脹悶阿魏丸方

阿魏麩裏煨熟細研丁香 木香 懷奇子微白

芷 陳橘皮湯洗去白焙 檳榔剉 香附子炒各壹分

甘草炙剉 生薑去皮薄切暴乾各半兩

右壹十味搗羅為末鍊蜜和納三五百杵
丸如櫻桃大每服壹丸爛嚼煎蘿蔔湯下

溫酒或搗湯生姜湯下亦得此藥大能下
氣療心腹虛脹

治妊娠腹脹不欲飲食厚朴煮散方

厚朴去雞皮生姜汁炙青兩半 白朮 芎藭 乾姜炮

當歸切焙 訶梨勒煨去核 陳橘皮湯浸去白人焙各一兩

參 芍藥各半兩 甘草炙壹分

右壹十味麤搗篩每服三錢匕以水壹盞
入大棗二枚擘煎取七分去滓不計時候
稍熱服

治妊娠腹滿不思飲食今氣利膈沉香散方

沉香判陳橘皮湯浸去白焙人參各半木香

茯苓去黑皮甘草炙各兩白朮貳兩

右七味為細散每服二錢匕入搗少許以

沸湯點食前服

治妊娠腹滿温胃氣化冷痰利胃膈思飲食

藿香丸方

藿香葉木香各壹兩肉豆蔻夫丁香各半

夏貳兩透切焙乾

右五味搗羅為末生姜汁煮麵糊和丸如

梧桐子大每服二十丸食前生姜湯下

治妊娠腹滿少食多脹白朮湯方

白朮參兩陳橘皮湯浸去白焙木香半甘草炙

厚朴去麤皮生丁香半乾姜炮二

夏壹兩生薑汁浸

右八味麤搗羅篩每服三錢匕水二盞入

生姜五片同煎至壹盞去滓不計時候温

服

治妊娠腹滿可思飲食嘔逆不止木香丸方

木香 莎草根沙去毛 蓬莪茂炮 青橘皮湯

去白 甘草炙半

右六味壽羅為末水浸炊餅和丸如彈丸

大每服壹丸濕紙煨生姜壹塊如皂子大

與藥同嚼溫湯下食前服

妊娠腹痛

妊娠藏府虛弱胃寒濕之氣邪氣與正氣相擊故令腹痛病不已則傷胞絡令胎不安治

法宜祛散寒濕安和胎氣則痛自愈

治妊娠腹痛和氣思食治中滿姜莪湯方

姜黃 蓬莪茂煨 藿香葉各壹兩 甘草炙半

右四味麤搗篩每服二錢匕水壹盞煎至

六分去滓溫服不拘時

治妊娠腹內疝痛如刀所刺人參湯方

人參四兩 大腹三枚 檳榔三枚 枳殼去瓢 芍藥各

兩 柴胡去苗 附子炮裂去皮

石七味剉如麻豆每服三錢匕水壹盞半

生薑三片煎至八分去滓空心食前溫服

治妊娠腹痛脹悶芎藭散方

芎藭 當歸切焙 陳橘皮湯浸去白焙各一兩 乾姜炮

右四味搗羅為散每服二錢匕川糯米飲

調下不拘時

治妊娠內挾寒冷腹中疝痛安和胎氣黑神

散方

杉木節半斤燒留性 乾姜壹兩燒留性

右二味搗羅為散溫酒調下壹大錢匕不

拘時

治妊娠腹痛不可忍安胎止痛芎藭散方

芎藭 當歸切焙各壹兩

右二味搗羅為散溫酒調下二錢匕不拘

時

治妊娠腹痛一切氣疾枳殼丸方

枳殼貳兩漿水浸壹日去 木香炒壹兩

右二味將木香搗羅為末入枳殼糊內和

丸如梧桐子大每服二十九温酒下不拘時

治妊娠腹痛疔刺安胎白术湯方

白术剉麩炒桂去麩皮陳橘皮湯浸去白

厚朴去麩皮生甘草炙芍藥剉芎藭各

兩

右七味麩搗篩每服二錢匕水一盞生姜

三片棗一枚擘破煎至六分去滓食前熱

服

治妊娠腹痛不思飲食真白湯方

木香剉沉香剉丁香各壹分芎藭壹蓬莪茂

煨當歸切焙芍藥剉棟實炒去核藁香子炒各

甘草炙壹兩益智去皮陳橘皮湯浸去白

右一十二味麩搗篩每服二錢匕水壹盞

棗壹枚擘破煎至六分去滓食前温服

治妊娠兩脇脹悶腹中疼痛嘔逆不思食妙

姜朮方

乾姜炮梔子去麩木香剉沉香剉當歸切

草炙白豆蔻皮去黑青橘皮湯浸

焙各芍藥兩剉壹乾木瓜姜黃各半兩

右壹十二味搗羅為末湯浸蒸餅為丸如

小彈子大每服壹丸細嚼溫酒下食前服

治姪娠腹中冷痛丁香散方

丁香五分當歸焙切蓬莪茂煨益智皮非苴炙

芫薺木香各壹青橘皮湯浸去白

右八味搗羅為細末每服二錢匕沸湯調

下食前服

治姪娠內積冷氣腹中切痛沉香散方

沉香剉半兩蜀椒去閉口及目甘草炙烏藥

剉當歸焙切芫薺各壹兩

右六味搗羅為末每服二錢匕溫酒調下

熱湯亦得不拘時

治姪娠羸瘦腰冷腹痛不欲食安胎澤蘭丸

方

澤蘭當歸桂去麤皮乾姜兩壹芫薺

阿膠炙令燕蕒藁本去苗石膏研白芷

栢子人炒人參 白朮 細辛去苗甘草

炙剉各壹兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下日再服

妊娠心腹痛

妊娠心腹痛者由妊娠失於將護外受風冷內挾宿寒邪客於心脾之經心之經手少陰是也脾之經從胃別上膈注心中是也二經為風冷宿寒所攻邪正交擊故令心腹俱痛

久不差則妨害飲食耗弱氣血傷動胞絡

治妊娠心腹疼痛思進飲食桔梗丸方

桔梗一訶梨勒煨去核木香各半兩白朮厚

朴去麤皮生薑汁炙各二兩細辛去苗葉半兩

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐大每服三十九溫米飲下食前服

治妊娠心腹痛胎動不安阿膠湯方

阿膠炙燥芎藭 桑寄生 陳橘皮湯浸去白燉各

青艾葉炒枳實去瓢麩炒當歸切焙高良

姜 甘草各一分

右九味麤搗篩每服三錢匕以水壹盞入棗二枚煎至七分去滓不拘時稍熱服

治妊娠胃冷心腹刺痛氣逆嘔噦吳茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙乾 人參 厚朴去麤皮生

茯苓去黑皮 桔梗炒 當歸切焙 芍藥各

兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服日三

治妊娠心腹引痛當歸湯方

當歸切焙 桂皮去麤皮 乾姜炮 木香各半兩 草豆蔻

去陳橘皮白湯浸去 白朮 熟乾地黄焙各一兩

芎藭三分

右九味麤搗篩每服三錢匕以水壹盞入

棗二枚去核煎取七分去滓稍熱服不拘時候

治妊娠心腹俱痛引脇肋妨悶不思食人參

湯方

人參

厚朴

去麤皮生

訶梨勒

煨去核

阿膠

炙令燥

赤茯苓

去黑皮各一兩

白朮

陳橘皮

湯浸去白

焙各一分

甘草

炙壹分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生

姜五片棗二枚擘破煎至七分去滓溫服

不拘時候

治妊娠心腹痛脇肋脹滿煩躁參朮湯方

人參

白朮

枳殼

去瓢麩炒

赤茯苓

去黑皮各貳兩

檳榔

煨剉三分

肉豆蔻

去殼四枚

芫胡

去苗壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生姜

三片棗壹枚擘破煎至七分去滓食前溫

服

治妊娠心腹氣攻疼痛當歸湯方

當歸

切焙

麥門冬

去心焙

芎藭

赤茯苓

去黑皮

甘草

炙各壹兩

大薊

去根

芫胡

去苗各三分

右七味搗篩為麤末每服三錢匕水壹盞

入生姜五片棗三枚煎至八分去滓不計

本草綱目

卷之七

本草綱目

卷之七

時候稍熱服

治姪娠冷氣攻心腹疼痛或不納飲食厚朴散方

厚朴二兩去麋皮塗生陳橘皮壹兩湯浸

草豆蔻壹兩去皮人參叁分去芎藭叁分白朮叁分

阿膠叁分擣碎乾姜半兩炮吳茱萸壹分

浸洗七遍訶梨勒壹兩煨甘草壹分炙

曝乾微炒用皮微赤剉右一十二味擣篩為麤散每服三錢匕以

水壹中盞半入生姜三片大棗三枚擘去

核同煎至壹盞去滓不計時候稍熱服之

日三服

治婦人姪娠心腹疼痛及兩脇肋內妨悶嘔逆惡心不止飲食不下體倦四肢少力或時發氣脹喘息麤大胎不安穩宜服大腹皮散方

大腹皮剉三分人參 赤茯苓去黑皮當歸

煨枳殼去穰芫胡去苗白朮各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生姜

三斤棗壹枚擘煎至七分去滓溫服日三
治妊娠心腹痛面青汗出悶喘無力地黃飲
方

生乾地黃焙 人參 當歸切焙 桑寄生 芍

藥 赤茯苓去黑皮 桔梗剉炒各一兩 桂皮去麤皮 鈞

藤剉 甘草炙剉各半兩

右壹十味麤擣篩每服三錢匕水壹盞生
姜三片棗壹枚擘煎至七分去滓溫服日
三

治妊娠心腹疼痛木香散方

木香 枳殼去麤炒 白芷 蓬莪茂煨 白朮

炒 益智去皮炒 甘草炙各兩 桂去麤皮半兩 青橘皮

湯浸去白焙 人參 京三稜煨剉各壹兩

右壹十壹味擣羅爲散每服二錢匕不拘
時候沸湯調服

治妊娠心腹冷痛霍亂吐瀉木香和脾飲方

木香 丁香 白朮 甘草炙 芎藭 人

參 草豆蔻去皮 沉香 大腹皮剉 訶梨勒

本草綱目卷之六十一
治諸虛百損

煨去核
各半兩

右壹十味麤擣篩每服二錢匕水壹盞入
生姜五片同煎至七分去滓溫服空心食
前

治妊娠心腹痛芍藥散方

芍藥貳兩 白朮一兩 黃芩去黑心壹兩 陳橘皮湯

白焙壹兩 木香三分 丁香半兩

右六味搗羅為細散每服二錢匕空心炒
生姜湯調下

治妊娠心腹痛祛散寒濕安和胎氣保生湯
方

紫苑去苗土 苾胡去苗 龍骨 赤石脂各壹兩半 艾

葉炒 白朮各三分 黃連去真 厚朴去麤皮生 阿

膠炒令燥 枳殼去瓤麩炒 地榆壹分 肉豆蔻

去散壹枚 益智皮去 乾姜炒 旋復花炒 黃芩去黑心各

兩半

右壹十六味麤擣篩每服五錢匕水壹盞
中煎至八分去滓溫服

本草綱目卷之六十一
治諸虛百損

治妊娠心腹疴痛當歸湯方

當歸焙切甘草炙到各

乾姜炮半

右三味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入棗

二枚擘煎至七分去滓溫服

治妊娠心腹氣脹疴刺疼痛胎不安雞蘇飲

方

雞蘇

人參

赤茯苓去黑皮

大腹皮

芎

藟各半兩

苧麻根一兩

右六味剉如麻豆大每服三錢匕水壹盞

生姜三片煎至七分去滓溫服

妊娠嘔逆不下食

妊娠之人脾胃氣弱風冷乘之則中焦否隔

胃中虛滿其氣上溢氣不下降故雖食飲卒

不得下甚則嘔逆

治妊娠嘔逆不下食和調胃氣豆蔻丸方

草豆寇去皮

白朮各壹兩

人參一兩

陳橘皮白

焙青半夏半兩入生姜

兩薑爛焙

右五味擣羅爲末用棗肉爲丸梧桐子大

每服二十丸生姜湯下不計時候服

治妊娠嘔逆不下食和胃順氣生姜散方

乾生姜壹分姜黃 陳橘皮去白白芷 白

朮 甘草各半

存六味擣羅為散每服二錢匕用粥飲調

下不計時候

治妊娠嘔逆不下飲食胃膈痞悶白朮散方

白朮壹兩木香 青橘皮去白丁香

麥蘖炒人參 赤茯苓去黑皮甘草炙 檳

檳各半乾姜一分

右壹十味擣羅為散每服二錢匕入搥少

許沸湯點不計時候服

治妊娠嘔逆不下食升降陰陽和調胃氣扶

神湯方

扶神去木黃耆炙人參 白朮各半藿香葉

甘草炙各

右六味麤擣篩每服二錢匕水壹盞入生

姜三片同煎至六分去滓食前溫服

治妊娠嘔逆不下食和胃氣利胃膈人參湯方

人參 山芋 白茯苓去黑皮 陳粳米各壹兩

半夏半兩湯洗七遍姜汁炒

右五味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入生

姜五片棗三枚擘破同煎至六分去滓不

計時候溫服

治妊娠嘔逆不下食心腹滿悶脇肋疼痛枳

杷葉湯方

枇杷葉拭去毛炙黃 半夏湯洗十遍 陳橘皮湯

去白 高良姜 丁香 甘草炙 檳榔剉各壹兩

右七味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入生

姜五片煎至六分去滓稍熱服

治妊娠嘔逆不下食飲保生湯方

陳橘皮二兩湯浸去白瓢焙 人參壹兩去蘆頭 白朮半兩

門冬壹兩去心 厚朴壹兩去麤皮塗生 白茯苓

兩

右六味擣篩為末每服四錢匕水壹中盞

入生姜三片淡竹葉二十片煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠嘔逆不下食飲人參散方

人參三分去前胡一兩去白朮三分甘草半兩

赤芍微麥門冬壹兩去心陳橘皮壹兩湯浸白茯苓壹兩湯浸

芎藭壹兩葛根半兩半夏七分湯浸

右九味搗篩為散每服三錢匕水壹中盞

入生姜五片棗三枚煎至六分去滓溫服

治妊娠嘔逆不下食厚朴湯方

厚朴去麤皮生人參去黑皮陳橘

皮湯浸去白朮炒竹茹為末生半夏汁製作餅

一兩

右七味蠶搗篩每服三錢匕水壹盞生姜

三片煎至七分去滓食前溫服

治妊娠嘔吐惡食七物飲方

淡竹茹一兩人參貳兩桔梗炒前胡去蘆頭半夏

湯洗七遍白茯苓去黑皮茅根各壹兩

右七味剉如麻豆大拌勻每服五錢匕水

本草綱目

卷之四

本草綱目

卷之四

壹錢半生姜三片棗兩枚擘破煎至八分
去滓溫服

妊娠痰飲

痰飲者由氣道澀滯水飲停積結聚而不散
令人隔腕痞悶嘔逆惡心體重多唾不思食
飲妊娠痰飲不可專以破痰逐飲之劑故昔
人論諸病痰飲者當以溫藥和之

治妊娠痰飲嘔逆惡心利膈丸方

半夏

參兩湯洗七遍去滑擣羅為細末
生姜汁和作餅子焙乾用

前胡

大蘆根

赤茯苓

去黑皮

檳榔

剉碎

百合

陳橘

皮湯浸去白焙乾

訶梨勒

煨去核

桔梗

炒

枳殼

去穢炒

黃人參各半兩

右壹十味擣羅為細末水煮麩糊和丸如
梧桐子大每服十五丸至二十九食後溫
生姜湯下

治妊娠痰飲留滯不思飲食前胡湯方

前胡

去蘆頭剉一兩

半夏

貳兩以生姜自然汁豈升半漿水壹升同於銀

器內慢火煮令小與姜汁盡薄切焙乾

人參

木香

各一兩剉厚

朴塗生薑汁炙枳殼去瓤炒旋復花 陳橘
皮湯浸去桔梗炒各半兩赤茯苓去黑皮白朮各一兩
甘草叁分炙微

右壹十二味 籠擣篩 每服三錢匕 水壹盞
入生薑五片 同煎至七分 去滓 不計時候
溫服

治妊娠痰飲胃膈不利 可思飲食 旋復花湯
方

旋復花去萼枳殼去瓤炒半夏湯洗七遍

乾木通各壹兩前胡去蘆頭白朮 赤茯苓

去黑陳橘皮湯浸去檳榔各六兩

右九味 籠擣篩 每服五錢匕 水壹盞 半入
生薑五片 煎至八分 去滓 空心服 午前再
服 此藥利胃膈 行滯氣 消痰飲 療脹滿 極
効 有風痰人 常宜服 一方有甘草 炙三錢
治妊娠 痰逆 不思飲食 止煩渴 定欬嗽 麥門
冬湯方

麥門冬去心半夏生薑自然汁貝母炮各

類聚卷之三
二十七

青橘皮去白 乾姜炮 甘草各壹分

右六味麤搗篩每服三錢匕生姜三片水壹盞慢火煎至七分去滓通口空心食前服

治妊娠痰飲欬嗽嘔逆不思飲食木香丸方

木香 甘草 白朮 陳橘皮湯洗去白

天南星 半夏生薑汁浸壹宿炒 白芷各壹分 乾姜炮

右八味搗羅為末同粟米飯為丸如梧桐

子大每服二十九食後煎生姜棗湯下
治妊娠痰飲膈腕痞悶嘔逆惡心天南星丸

方

天南星 半夏貳味並去臍用生薑白然汁浸三宿細切焙乾用

人參 白茯苓去黑皮 白礬壹兩半

右五味搗羅四味為末入白礬和藥再研令勻用生薑汁煮麪糊輒鞅得所和丸如梧桐子大每服十五丸熟水下空心日午晚食前一

治妊娠痰逆和脾胃思飲食黃耆湯方

黃耆兩到壹兩 半夏半兩湯洗 芍藥半兩 甘草壹分

人參 白朮 陳橘皮去白 赤茯苓去黑

皮枳殼去瓢炒 訶梨勒皮各三分

右壹十味麤搗篩每服二錢匕水一盞入

生姜三片棗壹枚擘同煎取六分去滓溫

服不拘時

治妊娠痰盛嘔逆惡心頭目旋運枳殼丸方

枳殼去瓢炒 乾姜炮裂 白朮剉炒 半夏

貳兩湯洗去滑焙乾

右四味搗羅為末生姜汁煮麵糊和丸如

梧桐子大每服十五丸溫米飲下食前服

漸加至二十九

治妊娠痰盛膈腕滿痞不思飲食丹砂沉香

丸方

丹砂別研 沉香剉細 肉豆蔻去殼 半夏湯洗

扁去滑切 人參參分 丁香微炒 白茯苓去黑

陳橘皮湯浸去白 甘草炙 檳榔剉各

右壹十味除丹砂外擣羅爲末入丹砂研
拌令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五
丸生姜湯下食前服

治妊娠痰飲浸漬膈腕目運頭旋乾薑丸方

乾薑炮裂白礬熬令汁盡芎藭半夏生薑汁同

兩白朮貳兩

右五味擣羅爲末煮棗肉和丸如小豆大
每服十五丸温淡生姜湯下不計時候服

治妊娠痰盛調脾胃進飲食人參丸方

人參 高良薑 白茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸

去白厚朴 去蘆皮生薑汁炙 半夏貳兩湯洗七遍

培去滑炒 乾薑炮 甘草炙各半兩

右八味擣羅爲末用生姜汁浸烝餅心和
劑爲丸如梧桐子大每服三十丸食後臨

卧生姜湯下

治妊娠痰盛止噉寬膈和氣進食白朮散方

白朮一人參 白茯苓去黑皮 黃耆微炙

姜製半夏各壹兩 山芋 桔梗炒 桑根白皮

微炙 白芷 五味子 各半兩 甘草 壹分
右壹十壹味搗羅為散每服二錢匕沸湯
點食後臨卧服

妊娠虛煩懊熱

妊娠虛煩懊熱者以陽氣偏勝熱氣獨作心
下懊悶頭痛面赤小便黃澀甚則淋痛是也
病源又謂之子煩

治妊娠虛煩懊熱退熱湯方

人參 甘草 炙 黃芩 去黑心 當歸 切 芍藥

梔子人 防風 去苗各
右八味麤搗篩每服五錢匕水壹盞煎取
七分去滓温服食後

治妊娠虛煩懊熱胎氣不寧手足煩倦芫胡
飲方

芫胡 去 桑上寄生 知母 切 百合 洗 麥門

冬 去心 升麻 各壹兩 甜竹茹 新竹刮

右七味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半生
姜三片同煎至壹盞去滓食後温服

治姪娠虛煩懊熱心中悶亂頭運重嘔逆四肢倦怠茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 防風去人參 白朮炒 枳殼

去雞 甘草炙各一兩

右六味麤擣篩每服三錢匕水壹盞生姜三片煎至七分去滓溫服不拘時

治姪娠虛煩懊熱知母湯方

知母切 防風去 黃芩去黑心 甘草炙 麥門冬

去心 茯苓去黑皮 升麻各一兩

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞生姜三片同煎至七分入竹瀝少許攪勻去滓溫服不拘時

治姪娠心下煩懊熱躁竹瀝湯方

防風去 麥門冬去心 黃芩去黑皮 升麻 石

膏碎 梔子人各膏兩

右六味麤擣篩每服三錢匕水壹盞竹瀝半合煎至七分去滓食後溫服日再

治姪娠煩懊虛悶四肢疼痛不睡酸棗人湯

方

酸棗人炒貳兩芍藥 防風去赤茯苓皮

此胡去苗犀角鎊五味子 甘草炙人參

檳榔判各壹兩

右壹十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至壹盞去滓不拘時溫服

妊娠欬嗽

妊娠欬嗽者以肺感寒氣故也經謂形寒飲冷則傷肺久欬不已則寒氣相移不惟孕育

有傷而肺氣痿弱皮毛枯悴治法宜發散寒邪資補胎氣則欬嗽自已

治妊娠欬嗽喘滿短氣防已湯方

防已 白藥子各壹兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎七分去滓溫服未効再服

治妊娠欬嗽胃滿氣急減食此胡湯方

此胡去苗桃人去皮尖雙天門冬去心麥

門冬去心甘草炙白茯苓去黑皮山芋 黃

耆到阿膠兵令人參各壹兩

右壹十味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎

至六分去滓不計時候溫服

治妊娠欬嗽及安胎氣槐豆散方

槐豆炒當歸酒浸切焙貝母去心芎藭人參各

兩

右五味搗羅為散每用二錢匕溫酒調下

日三

治妊娠欬嗽不止麥門冬飲方

麥門冬去心焙紫苑去土杏仁去皮尖桑根

白皮剉各半兩桔梗炒三分甘草炙壹分

右六味麤搗篩每服三錢匕竹茹如雞子

大水壹盞半煎減半入蜜少許打轉去滓

溫服日三

治妊娠咳嗽人參散方

人參洗切作片子焙陳橘皮湯浸去白焙甘草炙叁兩生姜五兩

右四味搗羅為散每服二錢匕沸湯調下

治妊娠欬嗽胃膈不利痰涎壅悶前胡湯方

前胡去苗和皮大腹剉半夏為末生姜汁和作餅子陳

橘皮去白甘草炙各

右五味麤擣篩每服三錢匕水壹盞生姜

三片同煎至六分去滓食後臨臥溫服

治妊娠欬嗽不止消痰逆和胃氣丁香半夏

湯方

丁香炒木香炮半夏生姜汁拌人參白

朮剉桔梗炒白豆蔻去皮陳橘皮湯浸去甘

草炙檳榔剉前胡去苗赤茯苓去黑皮

右壹十二味麤擣篩每服三錢匕水壹盞

生姜三片煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠欬嗽痰盛嘔逆白朮湯方

白朮貳兩半夏壹兩生姜汁浸一宿焙

右二味麤擣篩每服三錢匕水壹盞生姜

三片同煎至半盞去滓食後溫服日三

治妊娠欬嗽痰盛喘逆桑白皮丸方

桑根白皮貳兩半夏生姜汁浸阿膠炒令

人參各壹兩 丹砂研壹分 甘草炙半兩

右六味搗羅為末糯米粥為丸如鷄頭實

大每服壹丸食後臨臥含化嚥津

治妊娠感風冷欬嗽痰壅頭目昏痛荆芥飲

方

荆芥穗 旋復花 前胡去苗各兩 芍藥

半夏生薑汁製去毒 甘草各壹兩炙 麻黃去節煎掠去沫焙壹兩半

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞半

三片煎至六分去滓不拘時溫服

妊娠傷寒

妊娠感冒寒邪藏於皮膚洒然而寒燴熱而
悶頭項痛腰脊強脉浮在表者當汗之在裏
者下之汗下之理制方宜輕但非破血傷胎
之劑皆通用之和其陰陽正其表裏使經不
傳邪無深入斯無危殆矣

治妊娠傷寒安胎出汗阿膠湯方

阿膠炒令燥 獨頭蒜一顆 以秋收瓜蔓裹

以炭火貳斤燒令通赤放冷打開取出
細研為末無瓜蔓但尺以瓜根半兩代

活頭去蘆獨活去蘆蒼朮米泔浸壹宿紫苑
去白朮去蘆皮焙人參炮裂去皮甘草半
附子臍各壹分甘草半

右壹十味剉如麻豆每服三錢匕水壹盞
入連須葱白壹寸同煎至七分去滓溫服
如人行十里許連服二服至三服末後壹
服喫了便以冷水漱口漱壹二十徧漱罷
以衣微蓋取汗

治姪娘傷寒壯熱憎寒頭疼體痛白朮湯方

白朮青麻黃去節先煎石膏剉葛根剉

何首烏壹兩甘草壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入葱
白壹寸煎取七分去滓溫服不計時候

治姪娘傷寒發熱惡寒身體疼痛麻黃湯方

麻黃去節先煎蒼朮各叁白朮一兩陳橘皮

去白炒甘草壹

右五味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入葱
白壹寸搗鼓七枚煎至七分去滓溫服不

計時候

治姪娠傷寒頭痛惡寒渾身壯熱前胡湯方

前胡去蘆細辛去苗芍藥 麻黃去根節

去沫杏仁去皮尖雙枳殼去穢防風去澤

濕 芍藥各三茯苓去木白朮 旋復花

各貳兩甘草劈破乾姜炮裂各半夏參兩水

拾沸薄切放乾入牛姜汁拌炒黃色

右一十五味籠擣篩每服三錢匕水一盞
入葱白壹寸同煎至六分去滓稍熱服不

計時候

治姪娠傷寒初受病二三日頭痛肢體疼痛

煩躁惡風身熱憎寒並皆治之白朮湯方

白朮麩炒石膏各貳兩別甘草炙人參

五味子微炒芍藥剉麻黃去根不夫節先煎

乾姜炮裂

右八味除石膏外麤擣篩入石膏末拌和

令勻每服三錢匕水壹盞入生姜三片棗

三枚擘破同煎至六分去滓稍熱服不拘

時

治妊娠傷寒頭痛體疼安胎和氣異功湯方

麻黃去根節先煎掠蒼木米泔浸一白木

各二兩米泔芎藭甘草炙黃到

右五味麤擣篩每服三錢匕水一盞入葱

白二寸煎至七分去滓通口服日三王氏集驗

同

治妊娠傷寒憎寒壯熱頭痛體疼芫胡湯方

芫胡去苗白木各一兩米泔芎藭當歸焙

芍藥 防風去義赤茯苓去黑皮黃耆細生

乾地黃焙各半兩

右九味麤擣篩每服三錢匕水壹盞棗二

枚擘破生姜三片煎六分去滓不計時候

溫服

治妊娠傷寒憎寒發熱頭痛體疼前胡湯方

前胡去蘆頭升麻 麻黃先煎掠人參 羚羊

羊角鈔白木各壹兩陳橘皮去白炒甘草炙

分

右八味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入葱
白一寸生姜三片煎至七分去滓稍熱服
不計時候

治妊娠傷寒頭疼壯熱前胡湯方

前胡去蘆 白朮 人參 石膏碎 黃芩去黑

心各
貳兩

右五味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入葱

白壹寸同煎至六分去滓溫服空心食前

治妊娠傷寒護胎白散子方

白藥子

右壹味不拘多少為末用雞子清調塗在
紙花上紙可椀口大貼在臍下胎存處乾
即以溫水潤之

治妊娠傷寒頭痛壯熱前胡湯方

前胡去蘆 黃芩去黑 石膏碎 阿膠炙燥各

右四味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎七

分去滓不拘時溫服

治妊娠七八月暴傷風寒身體煩疼寒熱往

來胎動不安頭昏眩腰背痠痛芍藥飲方

芍藥

當歸

切

白朮

甘草

炙

人參

厚

朴去蘆皮生薑汁炙各壹兩

右六味養搗篩每服五錢匕水壹盞半生

姜三片薤白三寸同煎至八分去滓溫服

不拘時

妊娠下痢

妊娠飲食過傷脾胃不和冷熱之氣入於腸間腸虛則泄故為痢也然冷多則白熱盛則

赤冷熱相交赤白相雜甚則膿血雜下速宜療之恐傷胎也

治妊娠下痢日夜頻併臍腹撮痛厚朴散方

厚朴

去蘆皮生薑汁炙熟叁兩

吳茱萸

水浸半日炒三分

藿香

干姜

微炒

甘草

炙

陳橘皮

去白焙各壹兩

右六味搗羅為末每服二錢匕煎紫蘇木

瓜湯調下食前服

治妊娠下痢不可療者及丈夫脾虛泄瀉肉豆蔻散方

肉豆蔻 十枚大者去殼用白麩作餅草

豆蔻 拾枚去皮白麩裏文武木香兩訶梨

勒 貳拾枚十枚炮過熟甘草一分蜜炙

右五味搗羅為散每服二錢匕米飲調下

食前

治姪娠下痢及水瀉不止米穀不消化者神

捷散方

萹蒲 切作片子赤石脂各壹兩大火乾生

姜 兩半

右三味搗羅為散空心米飲調下二錢匕

日三

治姪娠下痢極甚者不過三五服見効狐灰

散方

野狐腸連心肺 須臾月收於罐子內以文

火候有青煙出便塞即

竅干勿冷透氣候令取

右一味研為細散每服二錢匕米飲調下

極甚者壹日三服大効三日內頓安如是

治姪娠下痢日夜頻併安胎氣止腹痛阿膠

丸方

阿膠炒令燥醋石榴皮各半兩黃連去須炒當

歸切焙肉豆蔻去殼各叁分

右五味搗羅為末鍊蜜丸如赤小豆大米

飲下十五丸食前

治姪娠下痢頻併後重裏急黃連湯方

黃連去須搗碎炒黃蘗去麤皮各三兩白朮四兩

右三味麤篩每服五錢匕水壹盞半生

姜三片同煎至八分去滓溫服日三

治姪娠下痢臍腹撮痛益胃氣思飲食建脾

湯方

厚朴去籠皮剉蒼朮水浸去皮剉各四兩大棗壹升煮熟

研取棗汁約五升以來同煮厚朴蒼朮候水盡為度漉出焙乾陳橘皮去

剉炒叁兩白茯苓去黑皮兩半人參二兩甘草炒叁兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生

姜三片棗壹枚擘破同煎至六分去滓溫

服此藥能進食調脾胃

治妊娠下痢腹痛腸鳴白豆蔻湯方

白豆蔻 用人一分 生壹半熟 陳橘皮 去白炒 細切 訶梨勒

去核半生半熟 桂皮 去麤 當歸 切焙各二兩 枳殼 去瓢 水煮熟

煎炒 半斤

右六味 麤擣篩 每服三錢匕 水一盞 半姜

五片 棗二枚 擘同煎至七分 去滓 稍熱服

如要丸用 好棗漿小煮去滓 核細研和為

丸如梧桐子大 以生姜拍碎炒黑色 入水

煎湯下十五丸

治妊娠下痢日夜不止方

烏梅 二兩 輒者竹串 慢火炙令乾焦

右壹味為細散 食前陳米飲調下二錢匕

如瀉血加黃連一兩為末

治妊娠下痢和調脾胃保護胎氣木香散方

木香 肉豆蔻 去殼 蜜陀僧 煨 沒藥 研 陳橘

皮 去白炒 龍骨 各壹分 訶梨勒 去核 當歸 切 赤石

脂 甘草 各半兩 胡椒 乾姜 各半兩

右壹十二味 擣羅為散 每服二錢匕 米飲

調下日三

治姪娠下痢方

補生易簡方治胎前產後痢

敗龜

一枚用米醋炙

右壹味搗羅為散米飲調下二錢食前服

治姪娠下痢膿血不止腹中疴痛阿膠丸方

阿膠

炒令燥參兩

白朮

五兩

黃連

去須

肉豆蔻

人壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前溫米飲下

治姪娠下痢冷熱相攻赤白相雜日夜不止

訶梨勒湯方

訶梨勒

炮去核

蒼朮

去皮

肉豆蔻

去殼

赤石脂

已上

各壹兩

乾姜

半兩炮裂剉

阿膠

一兩搗碎炒令黃燥

艾葉

壹兩

炒令

白朮

壹兩

龜骨

半兩

陳皮

壹兩湯浸去白穢焙

甘草

壹兩炙微赤剉

右壹十壹味搗羅為細末每服二錢匕以

粥飲調下不計時候

治姪娠下痢赤白腹中疴痛腰疼或如欲產

黃蘗散方

黃蘗微炙 桑寄生 當歸微炒 赤芍藥

阿膠杵碎炒 艾葉微炒 芎藭已上各壹兩 乾姜

三分炮 甘草壹分炙

右九味擣羅為散每服四錢匕以水壹中

盞煎至六分去滓不計時候稍熱服

治妊娠下痢赤白腹痛不止阿膠散方

阿膠壹兩杵碎 當歸壹兩到 白朮三分 艾葉

半兩炒 醋石榴皮半兩

今微黃 微炒

右五味擣羅為散每服四錢匕水壹中盞

半入生姜三片同煎至八分去滓溫服

治妊娠下痢乾姜散方

乾姜炮 細辛去苗 桂去麤 附子炮裂去皮

椒目 豬苓各半兩 小麥麴炒貳兩

右七味擣羅為散每服方寸匕溫酒調下

治妊娠下痢艾葉湯方

艾葉去梗炙 白芷 阿膠炙令 白朮到厚

朴去蘂皮生 黃連去須各 扶神去木 地榆皮

赤石脂 研各一兩半 黃芩 去黑心半兩 肉豆蔻 一枚

右壹十壹味麤擣篩每服五錢匕水以壹

盞半生姜五片煎至八分去滓溫服

妊娠守淋

婦人懷子而淋者謂之子淋因腎虛膀胱經客邪熱令溲少而數水道澀痛引於臍者是其候也

治妊娠子淋日夜頻數澀痛石蠟散方

石蠟 碎壹枚 乳香 一分 滑石 壹兩

右三味研細為散每服壹錢匕煎燈心湯

調下

治妊娠子淋海蛤湯方

海蛤 木通 剉 豬苓 去黑皮兩 滑石 碎 冬葵

子 微炒各

右五味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入燈

心十莖同煎至六分去滓食前溫服

治妊娠子淋滑石湯方

滑石 三兩 赤柳根 剉半兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎至八分食前去滓溫服

治姪娠子淋小便頻澀痛白芷散方

白芷三分鬱金 阿膠炙滑石各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕煎葱白湯

調下

治如娠小便頻數澀少疼痛石韋湯方

石韋去毛榆白皮剉各壹兩滑石二兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入葱

白二寸生姜二片煎至六分去滓食前溫服

治姪娠子淋澀痛木通湯方

木通剉石韋去毛各壹兩陳橘皮湯浸去白炒赤茯苓去黑皮芍藥 桑根白皮剉人參各三分

右一味麤搗篩每服三錢匕水壹盞半入

牛姜一棗大拍碎煎至八分去滓溫服

治姪娠子淋澀痛煩悶當歸湯方

當歸切焙芍藥 赤茯苓去黑皮甘草炙梔子

人各半

右五味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至八分去滓溫服

治姪娘子淋小便澀少疼痛煩悶赤芍藥湯方

赤芍藥兩一檳榔一枚麪裹煨熟去麪

右二味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至七分去滓空心溫服○經驗良方檳榔散

治胎前諸般淋瀝小便不通醫作轉脬用

地藥治不愈用此方屢效檳榔赤芍藥分

右為粗末每服五錢水壹盞半煎七分去

滓溫服空心食前尋常男子婦人血淋及

小便淋瀝澀滯水道疼痛用之甚效

治姪娘子淋人參散方

人參 木通剉 青蘄細研以湯壹盞化浸前二味壹宿焙乾

海金沙別研各壹分 莎草根去毛二兩

右五味將人參木通莎草根擣羅為細散

同海金沙青蘄壹處再研勻每服二錢匕

空心酒或米飲調下

娠胎間水氣肌膚浮腫

脾合土候肌肉土氣和平則能制水水自傳
化無有停積若娠胎脾胃氣虛經血壅閉則
水飲不化濕氣淫溢外攻形體內注胞胎懷
娠之始腫滿者必傷胎氣如臨月而脚微腫
者利其小便則病可愈

治娠身軀浮腫心腹脹滿小便不通木通
湯方

木通半斤 香薷 桑根白皮剉各壹兩 木香 訶

梨勒皮 黃芩各三分 枳殼上剉炒 檳榔 紫

蘇葦葉各半兩

右九味麤搗篩每服四錢匕水壹盞入生
姜半分拍碎煎至六分去滓溫服食前日
再

治娠身體腫有水氣心腹脹滿小便澀
赤茯苓去黑皮壹兩 檳榔剉半兩 白朮炒三分 郁李

赤茯苓去黑皮壹兩 檳榔剉半兩 白朮炒三分 郁李

人湯浸去皮枳殼去瓢麩葶藶子少令黃
研半兩右六味擣羅四味為末入二味同研令細
 鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九煎桑白
 皮湯下

治妊娠水腫茯苓湯方

赤茯苓去黑皮白朮去黑心黃芩去黑心杏仁易浸
尖雙旋復花各一兩防己二兩
 右六味人炒麝香各一兩篩每服四錢匕水壹盞半煎
 至七分去滓溫服

治妊娠四肢腫皮肉拘急桑白皮飲方

桑根白皮剉炒商陸根一兩赤小豆三合
活去蘆頭右四味半兩咬咀如小豆大拌勻用水五盞入

生姜七片同煮候豆熟濾去滓渴即飲汁
 并食豆小便利差

治妊娠遍身虛腫寄生飲方

桑寄生剉桑根白皮剉木香半兩紫蘇莖
 葉青大腹貳分

右五味細判如麻豆大拌勻每服三錢匕
水壹盞煎至七分去滓溫服

妊娠小便不通

妊娠小腸挾熱結胞內使氣道否澀故小便不通令人腹脇脹滿臍下急痛是其證也
如妊娠小便不通及胞轉臍下脹痛木通丸方

木通判黃芩去黑心冬葵子微炒生乾地黃焙各壹兩

右四味搗羅為末川麴糊和丸如梧桐子大每服二十九燈心湯下食前服

治妊娠小便不通心神悶亂少腹急痛榆白皮散方

榆白皮判王不留行各壹兩滑石各壹兩

右三味搗研為細散每服二錢匕煎燈心湯調下

治妊娠小便不通臍下鞭痛豬苓湯方

豬苓去黑皮木通判桑根白皮判各壹兩

右三味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入燈心同煎至七分去滓食前溫服

治姪娠小便不通小腹脹痛冬葵子散方

冬葵子微炒榆白皮細滑石阿膠炙令燥

右四味擣羅為散每服二錢匕溫水調服

不拘時

治姪娠小便不通臍下滿痛四味葵根湯方

冬葵根壹握洗去土車前子 木通細剉

阿膠炙令燥

右四味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓食前溫服

治姪娠子淋小便不通大黃湯方

大黃剉炒地膚草 豬苓去黑皮知母微炒芍藥

枳實去瓤升麻 木通剉甘草炙黃芩

去黑心

右一十味麤擣篩每服三錢匕以水壹盞

煎至七分去滓溫服日再

治姪娠小便不通方

葵根切壹兩 榆皮剉半兩

右二味以水三盞半煎至壹盞半分溫三服

妊娠小便利

腎主水入胞為小便腎氣和平乃能約制洩出以時若妊娠腎虛胞冷不能約制故小便利下而多也其證令人背項憎風少腹急痛治法當加以扶養胎氣之劑
治妊娠小便滑數桑螵蛸湯方

桑螵蛸炒 人參各壹兩 鹿茸去毛酥炙 黃耆剉各兩

牡蠣粉壹兩半 甘草炙剉半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生薑壹棗大切棗二枚擘煎至七分去滓食前溫服

治妊娠下焦冷氣少腹疼痛小便利多鹿茸丸方

鹿茸去毛酥炙一兩 白竜骨燒過三分 桑螵蛸炒半兩 牡

蠣粉二兩

右四味搗羅為末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十九空心食前溫湯下

治姪娠遺尿雞胫脰散方

雞胫脰拾具熟乾地黃焙當歸焙各半兩牡蠣

粉黃耆一兩厚朴去麤皮生薑汁炙三分

右六味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒

調下

治姪娠小便利日夜無度菟絲子丸方

菟絲子酒浸焙乾芎藭肉蓯蓉酒浸切焙各壹

兩蛇牀子酒浸三日河五味子洗焙各防

風去遠志去心各壹分

右七味搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如

梧桐子大每服十九空心溫酒下

治姪娠小便利溫氣除寒補下丸方

葫蘆巴酒浸焙龍骨研菖蒲各半遠志去心壹兩

半補骨脂炒益智去肉蓯蓉酒浸壹宿切

右七味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子

大每服三十九空心溫酒下

治妊娠小便利秦椒丸方

秦椒去目及閉口炒出汗六兩 藁香子炒一兩 黃蠟四兩熬化

入地黃汁少許攪勻

右三味搗羅二味為末鎔蠟和丸如梧桐

子大每服二十九空心温酒下

治妊娠小便利少腹急痛艾葉丸方

艾葉炙 乾姜生各兩 厚朴去蘆皮生 益智皮去

各半兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服三十九米飲下以飯壓之

治妊娠小便日夜頻數椒菊丸方

蜀椒去目及合口炒取紅貳兩 甘菊花 肉蓯蓉酒浸壹宿

切焙 菖蒲兩各壹 巴戟天去心 遠志去心 黃耆剉附

子炮裂去皮 各半兩

右八味為細末酒煮麵糊和丸如梧桐子

大每服二十九空心食前温酒下

治妊娠小便不禁臍腹疼痛熟乾地黄丸方

熟乾地黄焙 巴戟天去心 肉蓯蓉酒浸壹宿切焙 五

味子 醋浸壹宿少 蒺藜子 炒去角 革薢

山芋 去目及合口者炒取紅 續斷 各壹兩 菟絲

子 酒浸別搗 杜仲 去麤皮蜜炙各半兩 沉香 壹分

右一十三味為細末鍊蜜和丸如梧桐子

大每服十五丸食前溫酒下

妊娠大便不通

妊娠腸胃有風加之挾熱津液不足氣道否
澀故令腸胃枯燥大便不通甚則呼吸奔喘
腹脹乾嘔

治妊娠大便不通腹滿不能食養津液潤腸
胃麻人丸方

大麻人 別研如膏四兩 人參 剉去核大

黃 剉炒半兩

右四味先搗後三味為末次入麻人鍊蜜
和劑更於臼內塗酥杵勻丸如梧桐子大
每服三十丸空心溫水下大便通即止

治妊娠大便熱結旬日不通檳榔丸方

檳榔 剉到一兩 木香 半兩 大黃 剉炒貳兩 青橘皮 湯浸去白

熱半
兩

牽牛子 貳兩一分生用壹半炒

右五味搗羅為末鍊蜜和劑更於白內塗酥杵勻丸如梧桐子大每服二十九溫水下空心服

治姪娘熱在藏府大便秘澀羌活丸方

羌活 頭 大麻人 別研 檳榔 五枚 防風

去積殼各壹兩 大黃 剉炒壹兩 木香 一兩

右七味搗羅六味為末與麻人同研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫水下

食前服日三以微利為度

治姪娘大便結塞不通臍腹鞭脹不能安卧

氣上喘逆枳殼丸方

枳殼 去瓢麩炒壹兩半 大黃 微炒貳兩半

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心米飲下未通再服以通為度

治姪娘大便不通腸脇堅脹潤腸丸方

枳殼 去瓢麩炒為末 大麻人 別研各壹兩

右二味再研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前溫水下生薑湯亦得

治姪娠大便不通葱膠湯方

葱白

壹匙切

牛皮膠

貳片大者惟碎

右二味以水壹盞半煎令膠烊盡去滓頓服之

治姪娠大便不通踈氣黃者丸方

黃耆

剉枳殼

去瓢麩炒各壹兩

葳靈仙

貳兩

右三味搗羅為末用麴糊和丸如小豆大

每服三十九溫水下不拘時未通稍加之

姪娠大小便不通

姪娠大小便不通者以藏府盛實熱氣蘊積不時宣導之所致也若熱結於大腸則大便不通結於小腸則小便不通今大小腸俱有熱則大小便俱不通其候令人煩滿少腹脹急惟能均調府藏使氣疏達則傳化無所留滯矣

治姪娠大小便不通臍腹脹痛梔子湯方

梔子人一兩石膏四兩黃芩壹兩去黑心澤瀉兩

芫胡兩去苗壹兩赤芍藥兩萎蕤壹兩車前草兩

切半

右八味麤擣篩每服四錢匕水壹盞半淡

竹葉十片同煎至八分去滓食前服

治妊娠大小便不通心腹妨悶不欲飲食檳

榔湯方

檳榔剉赤茯苓去黑皮大腹皮剉木通剉郁

李人湯浸去皮尖甘草炙桔梗炒桑上寄

生各半

右八味麤擣篩每服四錢匕水壹盞煎取

七分去滓不計時候溫服

治妊娠大小便不通七八日以上腹脹脅悶

冬葵根湯方

冬葵根乾者一握洗車前草壹兩乾木通

細剉大黃剉炒

右四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎

至八分去滓食前溫服

治妊娠大小便不通下焦熱結芫胡通寒湯方

芫胡去苗黃芩去心陳橘皮湯浸去白微炒澤瀉

羚羊角銹各三分梔子人兩石膏兩大黃剉炒

右八味麤搗篩每服四錢匕水壹盞入生

地黃壹分拍破鼓半分微炒同煎至七分

去滓食前服

治妊娠大小便不通木通飲方

木通細剉車前子壹兩半黃芩去黑心郁李

人湯浸去皮暴乾壹兩半大黃剉炒

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞煎至

八分去滓空心溫服

治妊娠大小便不通結悶氣急脹滿欲死茅

根湯方

茅根剉碎滑石 車前子微炒大黃剉碎微炒

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎

至八分去滓食前溫服

治妊娠大小便不通冬葵子湯方

冬葵子 貳兩 微炒 大黃 壹兩 剉炒

右二味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前溫服

治妊娠大小便俱不通車前子湯方

車前子 五兩 剉碎 木通 四兩 剉碎 黃芩 三兩 剉碎 郁李 人 湯浸去皮 大黃 貳兩

右五味麤擣篩每服四錢匕水壹盞半煎至八分去滓食前溫服

治妊娠大小便不通下部脹滿坐卧不安木

通湯方

木通 貳兩 剉碎 大黃 剉碎 滑石 三兩 大麻人 一兩

右四味麤擣篩每服四錢匕水壹盞半煎至七分去滓空心溫服

治妊娠大小便不通榆白皮湯方

榆白皮 剉碎 桂 去麤皮 甘草 壹兩 剉碎 石 三兩 滑

右四味麤擣篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去滓食前溫服

治妊娠大小便不通冬葵根汁方

生冬葵根洗貳斤細切爛搗生生姜四兩洗切

爛研上細布絞取汁中合

右二味同和令勻分作三服空心日壹服

未利再服又未利盡三服

治妊娠大小便不通方

豬脂如半鷄子人碎切

右膏味以酒半升煖令沸投豬膏在內更

煎壹兩沸分三服食前溫服未通再服

妊娠半產

妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產

蓋由妊娠婦衝任氣虛不能滋養於胎胎氣不

固或擷撲閃墜致氣血損動或因熱病溫瘧

之類皆致半產仲景謂寒虛相搏此名爲革

婦人則半產漏下是也

治妊娠胎氣損動氣血不調或擷撲閃墜因

致墮胎謂之半產及產後氣血不和惡滯不

盡腹中疝痛生地黃湯方

生乾地黃焙壹兩 大黃略 芍藥 白茯苓去黑

皮當歸切炒 細辛去苗 甘草炙 黃芩去黑 桂

去麤皮 各半兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入

生姜壹棗大拍碎同煎至壹盞去滓不拘

時候溫服

治半產後胃中氣短腹脇疔痛餘血不盡煩

渴悶亂蒲黃湯方

蒲黃壹兩 芒消半兩 芎藭壹兩 桂去麤皮 桃人半兩

去皮尖 生乾地黃焙二兩 人參一兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞半煎

至八分去滓不拘時候溫服

治半產後血下過多心驚體顛頭目運轉或

寒或熱臍腹虛脹疼痛人參湯方

人參 麥門冬去心 生乾地黃焙 當歸切

芍藥 黃耆剉 白茯苓去黑 甘草炙

右八味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓食前溫服

治妊娠胎月未足氣血未充輒墮胎者其血傷動下而不止虛煩困倦扶苓散方

白茯苓

去黑皮

人參

黃耆

薄切

醋

石榴皮

炒切

陳橘皮

去白炒

甘草

炙各一兩

右六味搗為細散每服二錢匕熱酒調放溫服米飲亦得不拘時候

治半產後心煩悶倦羚羊角飲方

羚羊角屑

半兩

芍藥

兩

枳實

去瓢炒三分

人參

麥門冬

去心焙半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓不拘時候溫服

治半產後氣血不快惡露斷續延胡索湯方

延胡索

當歸

切炒

芍藥

芎藭

桂

去麤皮

甘草

炙各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至七分去滓不拘時候溫服

治半產後惡露不盡氣攻疼痛血下成塊結築臍腹芒消飲方

芒消 蒲黃 芎藭 桂皮去麂 鬼箭羽各半

兩生乾地黄焙壹兩 桃人夫皮尖雙

右七味釐搗篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓不拘時候溫服

治半產後惡露不斷心悶氣短艾葉飲方

艾葉 當歸切焙 人參 生乾地黄焙 地榆

乾姜炮 阿膠炙令燥

右七味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞

煎至七分去滓不拘時候溫服

妊娠數墮胎

胚胎之始賴血氣以滋育若妊娠血氣盛強陰陽之至和相與流薄於一體唯能順時數謹人事勿動而傷則生育之道得矣若衝任氣虛將攝失宜于藏風冷不能滋養於胎故每有妊則數致傷墮也

治妊娠數墮胎子宮虛冷熟乾地黃散方

熟乾地黃 黃耆剉 芎藭 白朮 人參

當歸切焙各壹兩 乾姜炮 甘草炙 吳茱萸湯洗七遍

焙乾微炒
各半兩

右九味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒
調下

治妊娠胎動數損墮止痛安胎桑寄生湯方

桑寄生 當歸切 芎藭 人參 甘草炙
分

右五味麤搗篩每服四錢匕水壹盞入葱
白七寸同煎至六分去滓溫服

治妊娠數墮胎小腹疝痛不可忍阿膠湯方

阿膠炙令燥 熟乾地黄焙 艾葉微炒 芎藭 當

歸切 杜仲去麤皮 白朮各一兩

右七味麤搗篩每服四錢匕水壹盞半入
棗三枚擘破同煎至八分去滓食前溫服

治妊娠氣血衰微胞藏挾冷數墮胎地黄湯
方

熟乾地黄四兩 當歸切 艾葉各貳兩 芎藭 阿

膠炒令燥 杜仲去麤皮 五味皮各三兩

右七味判如麻豆大每服五錢匕水壹盞

半煎至壹盞去滓溫服空心食前

治子宮久冷妊娠數墮胎杜仲丸方

杜仲

去蘆皮炙判

防風

去義

附子

炮裂去皮臍

石菖蒲

桔梗

炒

秦艽

去苗土

細辛

去苗葉

厚朴

枳實

去麤皮

半夏

湯洗二分

漏

熟乾地黄

焙

沙參

蜀椒

去目并閉口者炒出汗

乾姜

炮各半兩

右壹十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大空心溫酒下十五丸漸加至二十九

壹月效

治子宮久冷妊娠數墮胎吳茱萸丸方

吳茱萸

湯洗十遍焙

蜀椒

去目及閉口者炒出汗各三兩

高良

姜

附子

炮裂去皮臍各壹兩

青橘皮

湯浸去白麩炒黃壹兩半

白朮

貳兩

右六味搗羅為末用乾柿二十枚以好酒浸令軟研膏和搗得所丸如梧桐子大每服十九至十五丸空心臨臥溫熱水下

治妊娠數墮胎心腹疼痛芎藭湯方

芎藭

芍藥

白朮

阿膠

炒令燥

甘草

各

壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水膏蒸入艾葉糯米生姜同煎至六分去滓食前服

治血氣不足子藏挾寒姪娠數墮紫石英丸

方

紫石英

椎作小塊以葵菜葉煮半日碾細水飛

鹿茸

切片酒浸壹宿

去毛

禹餘糧

大煨醋淬

當歸

切焙

枳殼

去麩炒

芎藭

各一兩

側柏

微炙

艾

細剉醋拌炒黃

阿膠

蛤粉炒

赤芍藥

桂皮

白芷

各三分

烏賊魚骨

去甲

微炙木香各半兩

右壹十四味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下空心晚食前各壹服

治婦人血氣衰弱子藏風冷姪娠數墮地黃丸方

熟乾地黃

新潤者焙壹兩

澤蘭

嫩者

肉蓯蓉

酒浸切焙

芋

石斛

沉水者

厚朴

去蘆皮生薑汁炙令透

蛇牀子

柏葉

艾

嫩者

續斷

卷柏

湯浸洗

五味子

各半

右壹十二味擣羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心晚間生姜艾湯下十五丸治婦人血海冷憊不能養胎姪娠數墜白薇丸方

丸方

白薇去蘆頭牡丹皮剉熟乾地黃焙木香

當歸焙切肉豆蔻人遠志心附子炮裂去

禹餘糧火煨醋碎五肉蓯蓉酒浸去皺皮

芎藭白扶苓去黑糾辛去石膏研獨

活去蘆頭吳茱萸湯洗七遍去蜀椒去目并

出汗黃耆剉五味子微炒去麤皮

右二十味除別研外擣羅爲末入研藥拌

勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫

酒下空心食前

治婦人曾傷三月四月胎補益調中飲方

芍藥剉炒當歸切焙厚朴去麤皮生續斷 芎

藟剉白朮微炒茈胡去李根白皮生剉烏梅

去核枳殼去瓤炒

右壹十味龕擣篩每服五錢匕以水壹盞

半煎至八分去滓溫服

拔粹方

娠娠惡阻 歸原散治娠娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入

食服諸藥無効者

人參 甘草 川芎 當歸 芍藥 丁

香各半 白茯苓 白朮 陳皮各壹兩半 桔梗

炒枳殼錢半 炒各貳半 夏洗七次切 黃壹兩

右咬咀每服三錢生姜五片棗壹枚水同煎

芎歸湯治娠娠先患冷氣忽中心腹痛如刀刺

川芎 人參 茯苓 桔梗 吳茱萸

當歸各三兩 厚朴製 芍藥各貳兩

右咬咀以水九升煎取三升分三服氣下

即安

治婦人胎漏下血或因事下血

枳殼去穰麩炒半兩黃芩半兩白朮兩

右為麤末每服五七錢水煎去滓食前油

方衛生易○易簡方又云妊娠下血名曰珍

胎漏胞胎乾者兒亡

傷寒

黃耆解肌散治婦人妊娠傷風自汗

人參黃耆袖珍方用茯苓當歸川芎炙甘

草各五錢芍藥六錢大錢加蒼朮

右為篩末每服五錢水煎溫服無時○袖

珍方右咬咀每服八錢水二瓊煎至八分

去滓溫服不拘時加蒼朮生地黃亦可

枳殼湯治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼選妙去瓢黃芩各半兩白朮壹兩

右為末水煎食前溫服醫方集成同

婦人傷寒脉浮頭腫自利腹中切痛宜桂枝

加芍藥當歸湯

桂枝芍藥當歸各一兩

右剉細每服壹兩水煎

婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脈沉者大陰也宜芍藥湯

芍藥 白朮各壹兩 甘草 茯苓各五錢 黃芪

貳兩

右如前修服

柴胡散治孕婦傷寒

柴胡 前胡 川芎 當歸 人參 芍

藥 粉草 生地黃各等分

右為細末每服三錢姜三片棗三枚水煎

要出汗加葱

秦艽散治妊娠時氣五六日不得汗口乾多喫冷水狂語嘔逆

秦艽 柴胡各壹兩 石膏二兩 前胡 赤茯苓

甘草 葛根 升麻 犀角屑 黃芩各半兩

兩

右咬咀每服四錢姜四片竹茹三錢水煎

承寶鈴方姜半分淡竹茹壹分水煎溫服無時 敗毒散升麻葛根

湯皆可用之

七寶散治男子婦人壹切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒不問鬼瘧食瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者亦皆治之

常山 厚朴製 青皮 陳皮 並不 甘草

檳榔 草菓仁 各等分

右咬咀每服半兩於未發隔夜用水一椀酒壹盞煎至壹大瓊瀝出露一宿却將滓再用酒水更依前煎一次去滓別以椀盛亦露一宿來日當發之早盪溫而東先服

頭藥少歇再服藥滓大有神効

治姪娠三五个月胎死在腹內不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮 各參兩 當歸 壹兩

炒 滑石末 七錢 瞿麥 葵子 茯苓 粉草

子芩 各半兩

右爲龕末每服四錢水煎

鄧知縣傳療死胎不出朴硝研細半兩 王氏集驗

方 以童子小便溫調下屢効

花藥石散 方見產後 治婦人敗血奔心胎死腹中

胎衣不下等證極妙

立刻散治婦人胎動不安如重物所墮冷如冰

川芎 常歸 各等分

右為麤末秤三錢水煎食前溫服 南止經 驗方油

珍方同

保安散治姙娠因有所傷胎動疼不可忍及血崩不止

連皮縮砂 不以多少 炒黑去皮

右為細末溫酒調下覺腹中熱則胎已安也

胎產證

婦人童幼至天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆從厥陰論之天癸已絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰經無犯胃氣及上三焦為之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之證利大便則脈數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥

之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣
如發渴而白虎氣弱則黃耆血刺痛而用以
常歸腹中疼而加之芍藥大抵產病天行從
增損柴胡雜證從增損四物宜詳察脈證而
用之

產前寒熱小柴胡湯中去半夏謂之黃芩湯
醫方集成

和劑方竹茹湯治妊娠嘔吐頭疼眩暈永類

此下云煩悶心虛惡阻集
驗無茯苓麥門冬甘草

橘紅去人參去白朮去麥門冬去甘

草分白茯苓分厚朴姜製各

右咬咀每服三錢水壹盞姜五片入竹茹

壹塊如彈子大同煎至七分溫服不拘時

南北經驗方神珍方同鈐方此
下云即濟生參橘散無人參

南北經驗方

宣明方黃芩湯治婦人孕胎不安

白朮各等黃芩分

右為末每服三二錢水二盞入當歸壹根

卷之五

同煎至壹盞溫服方同

拔粹方芍藥散治婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脉沉者太陰也宜此藥

芍藥 白朮各乙兩 甘草 茯苓各五錢 黃芪

補珍方

右剉細每服壹兩水煎

拔粹方若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而弱太陽經病宜表虛六合湯

四物湯四兩 麻黃衛生易簡方用蒼朮 細辛各半兩

拔粹方若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊

大陽經病宜表實六合湯

四物湯四兩 防風 蒼朮製各七錢

用麻黃

拔粹方若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發

癰如錦文宜升麻六合湯

四物湯四兩 升麻 連翹各七錢

拔粹方若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜

頭

三

人參六合湯

四物湯四人參 五味子各五錢。袖珍方衛生易簡方

拔粹方若妊娠傷寒汗下虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯

四物湯厚朴 枳實麩炒各五錢。袖珍方衛生易簡方

袖珍方

枳實檳榔丸治安養胎氣調和經候癥瘕癖

塊有似姪孕可以久服血氣通和兼寬膈美食

枳實生 檳榔 黃連 黃蘗 黃芩 當

歸 阿膠灰炒 木香各半兩

右為末水和丸如小豆大溫米飲下三十丸不計時南北經驗方同

失笑散治小腸氣痛婦人血氣痛欲死者用

五靈脂蒲黃各等分右為末每服二錢用

醋壹合熬藥成膏水壹瓊煎服

當歸湯治妊娠胎動盪心悶絕煩燥口乾橫
生倒產上衝下築迷悶唇青黑手足厥冷產
科名保安散壹方無甘草有川芎厚朴產保
方有川芎

當歸 人參 各壹兩半 阿膠 壹兩 甘草 貳兩

右咬咀每服八錢水壹盞半連根葱白壹
握煎至八分去滓溫服不拘時

阿膠散治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食

白茯苓 白朮 川芎 阿膠 各叁分 當歸

炒 陳皮 各壹兩 甘草 壹分 生姜 三片 棗 叁介

右咬咀每服八錢水壹盞半煎至八分去
滓食前溫服

黃耆散療妊娠胎不長宜服安胎和氣思食
利四肢

川芎 甘草 各五錢 黃耆 白朮 陳皮

麥門冬 白茯苓 前胡 人參 各叁錢 〇 承類

鈐方
叁分

右咬咀每服八錢生姜三片棗枚 鈐方每三錢姜

三片棗 水壹錢半煎至八分去滓食前温服

童骨散療因損胎下惡血不止

龍骨 當歸 地黃 各八錢 承類 艾葉 各八分

炒四錢 地榆 阿膠 芍藥 乾姜 各六分

鈞方四分 蒲黃 五分 牛角腮 炙焦十貳分

右為末食前米飲調二錢服 鈞方右細末粥飲調下吞

紫石 英元

麻黃散治姪娘五六月傷寒頭痛壯熱四肢

煩疼 承類鈞方或口乾心燥

升麻 鈞方 桂心 柴胡 赤藥芍 各一廿

草

右咬咀每服八錢 鈞方 生姜三片水壹錢

半煎至八分去滓通口不拘時候 鈞方此下云鄭

氏加葛根壹兩去桂心

消熱飲子治姪婦六七月熱甚大小便不利最宜服

茫硝 壹兩 葵子 叁兩

右為末每服五錢溫水調下無時

治婦人臍腹疼痛不省人事只壹服立止不知者云是心痛誤矣

白芍藥 五靈脂 木通等分

右咬咀每服五錢醋水各半瓊煎至七分去滓溫服不拘時候

人參散治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩燥壅熱口舌乾渴

人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 家

葛根 黃芩 犀角屑各叁錢 甘草五錢

右咬咀每服八錢水壹瓊半煎至八分去滓溫服

梔子仁飲子治妊娠熱病斑出黑色小便如血氣欲絕胎欲落

梔子仁 升麻 石膏 地黄各二兩 黃芩

大青各壹兩 豆豉四拾九粒救急有杏仁無地黃石膏葱白七寸

右咬咀每服半兩水壹盞煎至五分去滓無時溫服 一方加青黛無大青 又方

以陳艾如鷄子大酒煮服救妊婦危困

大黃飲子治妊娠熱病六七日熱入腹中大

小便秘澁煩熱

大黃微炒石膏各一兩知母 前胡 赤茯苓

各五分梔子仁 甘草 黃芩各五分

右改阻每服八錢水一盞生地黃

一分煎至七分去滓溫服食前

八物湯

四物湯四兩玄胡索苦練炒檳榔木香各壹兩

若經水過多別無餘證宜服黃芩六合四

物湯四兩黃芩白朮各壹兩若經水澁少宜

四物加葵花煎又加紅花血見愁若虛

勞氣弱咳嗽喘滿服厚朴六合四物四兩厚

朴製壹兩枳實錢炒五若經水暴下加黃芩

壹兩若腹痛者加黃連如夏月不去黃芩

若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各壹兩

若經水少面色和者四物加熟地黃當歸

各壹兩 若經水適來適斷或有往來寒

熱者先服小柴胡湯以去其寒熱後以四物湯 若婦人血積者四物內加廣茂京三稜桂乾漆各二兩 若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜服八物湯四物湯四兩 黃耆甘草茯苓各二兩 白朮貳兩 若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒浮而弱大陽經病宜服表虛六合湯四物湯四兩 桂枝地骨皮各七錢 若妊娠傷寒脅痛而脈弦少陽也宜服柴胡六合湯四物

湯四兩 柴胡黃芩各七錢 若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脈沉數陽明太陰本病也急下之宜服大黃六合湯四物湯四兩 黃芩五錢 桃仁十介去皮尖 若妊娠傷寒汗下後不得眠宜服梔子六合湯四物湯四兩 梔子黃芩各五錢 若妊娠傷寒身熱大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜服石膏六合湯四物湯四兩 石膏知母各五錢 若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜服茯苓六合湯四物湯

四茯苓澤瀉各五錢 若妊娠傷寒太陽本

病小便赤如血狀宜服琥珀六合湯四物

湯四兩琥珀茯苓各五錢 若妊娠傷寒汗下

後血漏不止胎氣損宜服膠艾六合湯四

物湯四兩阿膠艾葉各五錢 一方加草同上一

方乾姜甘草黃芩 若赤白帶下宜服香

桂六合湯四物湯四兩桂香附子各五錢 若

妊娠傷寒畜血証不宜墮胎藥下宜服四

物大黃湯四物湯四兩生地黃大黃酒浸 若

虛熱病四物與參蘇飲相合名補心湯注

之 若四肢腫痛不能舉動四物蒼朮各

半湯主之 若治燥結四物湯與調胃承

氣湯各半名玉燭散 若沉濕潤燥宜四

物湯理中湯各半 若保胎氣令人有子

四物湯加縮砂四君子湯各半錢名八珍

湯 若熱與血相搏口舌乾渴飲水加括

蕒麥門冬 若腹中刺痛惡物不下加當

歸芍藥 若血崩者加地黃蒲黃黃芩

若頭昏項强者加柴胡黃芩 若因熱生風者加川芎柴胡防風 若臟秘結澀者加大黃桃仁 若滑瀉者加官桂附子 若嘔者加白朮人參生姜 若大渴者加知母石膏 若發寒熱者加乾生姜牡丹皮芍藥柴胡 若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防己 若虛寒似傷寒者加人參柴胡防風 若產婦諸証各隨六經以四物與仲景藥各十服之其効如神 若

婦人或因傷酒或因產去血或虛勞而心煩熱者四物二連湯四物湯內生用地黃黃連胡黃連真者溫飲清四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈等皆可作半湯此易老用藥大略也 若虛煩不得睡加竹葉人參 若婦人血虛心腹痞痛不可忍者去地黃加乾姜名四神湯 若諸痛有濕者四物與白朮相半加天麻茯苓山甲川酒煎

黑竜丹治妊娠臨產難生或胎衣不下產後血暈不省人事狀如中風血崩惡露不止腹中刺痛血滯浮腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或類瘧狀胎前產後一切急狼狽垂死以此藥灌三四丸無不救活者

五靈脂 當歸酒浸 生地黃 川芎 良姜

各叁兩

右剉入炒鍋內紙筋搗泥固濟炭火煨通

紅火映出研細入後藥

白草霜 乳香 生硫黃 琥珀 花藥

石

右五味計壹兩壹錢細末同煎藥和勻米

醋煮麪糊爲丸如彈子大每要服用炭火

煨藥通紅投入生姜自在汁浸碎之以無

灰酒併令童子使頓服神効不可盡述

二黃散治婦人有孕胎漏徐氏胎產方玉機微義有孕胎漏下

血

生地黄 熟地黄 胎產方 各等分

右為末煎白朮枳殼湯調下二錢 胎產方 參錢

食前服

麥門冬湯治妊娠傷寒壯熱嘔逆頭疼不思

飲食胎氣不安

人參 石膏 各壹兩 前胡 黃芩 各參分 家葛

根 麥門冬 各五錢

右咬咀每服壹兩水壹盞生薑三片 承類 鈐方

每五錢 棗二枚竹茹一分煎至壹盞去滓

溫服無時

醫方類聚卷之二百二十六