


元戎


女

庫文閣内	
三〇〇函	二
二	漢
内閣文庫	
番號	漢 12421
冊數	12 (7)
函號	300 216



綴じ部(喉部分)の文字等が開きが不鮮明な場所あり

段聖元元我
美第七




韓氏溫中篇
仲景
七物厚朴湯
平胃散

易簡平胃散

調胃丸

易簡養胃湯



王氏易簡理中湯

溫中湯方
三物厚朴湯

陶隱居厚朴湯
平胃散加減大畧

調胃散

內疝散

易簡參濕湯

活人厚朴黃連香薷湯

局方香薷丸

錢氏異功散

四君子湯

易簡四君子湯

易簡惺惺散

易簡白朮散

大半夏湯

易簡四獸散

易簡浙下湯

海藏黃香湯

錢氏白朮散 附和中散

養脾丸

調中人参湯

解酒毒例

葛花湯

橙香丸

不醉丹

百林丸

局方身氣散

集香丸

局方七香丸

五疔寬中散

烏沉湯

小烏沉湯

益脾丸

東垣三製三黃丸

七香丸

大七香丸

集香丸

木香餅子

易簡藜合香丸

木香餅子

丁沉煎丸

沉香降氣湯

調中沉香湯

金匱下痢病脈證并治

桂枝湯

訶黎勒散方 黃芩湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豆豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

王朝奉治喘例

活人舉^華葉佗喘說

潔古老人方

卷第八

太陰證

牝豆蔻散 局方草豆蔻散 草豆蔻丸

易簡縮脾湯 檉皮丸

法制陳皮 善麴丸

御方思念丸 思念丸

蘭省杏爛飯^飲丸 文^{大生}參^生姜丸

木瓜湯 三^奇六神麴

吧噦例

王朝奉吧論 大橘皮湯

橘皮青竹茹湯 溫中丸

海藏橘皮茯苓生薑湯

燙^善橘湯 活人大半夏湯

活人半夏生薑湯 桔梗半夏湯

活人橘皮竹茹湯 大橘皮湯

橘皮半夏湯 半夏茯苓陳皮湯

易簡二陳湯 易簡四七湯

考中^考文^中書^考姜丸
當作大生姜丸

玉液丸 玉芝丸
文潞公生犀丸
易簡消暑丹

赤茯苓湯
溫胃和痰湯

乳和善皮湯

小七氣湯

大橋皮丸
活人小半夏加茯苓湯

青龍散

活人橋皮湯

局方玉壺丸

辰砂化痰丸

易老水煎金花丸

小妙丸

定喘丸

二炒丹

消痰丸

安和丸

仲景葶藶大棗湯

易簡惺惺散

三聖丸

仲景猪羔丸

肺

又猪肚黃連丸
錢氏香連丸
橘連丸

仲景猪肚丸

猪肚丸

稍真丸

猪蹄湯

玄胡丸

紫霜丸

無名丸

無名丸料

天广辰砂丸

安先生傳

易老

解利

二藥

解利傷寒喘藥方
揚氏內解丸

四生丸

拾遺

翻胃例

御醫楚侍茶白龍丸

生善半夏湯
雞屎醴散

醫

棗

善來湯

善艾瑪丸

太陰拾遺

時後并脾胃所傷變易形法

海藏所定脾脈一十七道安方大略

茯苓桂枝白朮甘草湯

甘草半夏湯

十束湯

大青龍湯

防己湯 防己去石膏加茯苓芒消湯

芎藭湯

厚朴大黃湯 葶藶大連瀉肺湯

小半夏湯

防己椒目葶藶大黃湯

小半夏加茯苓湯 吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

豬苓湯

茯苓飲

支飲方加杏仁湯
加大黃湯
金匱嘔噦下痢病脈

桂枝五味子甘草湯

甘草五味子辛湯 四逆湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓白朮芎藭湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑汁半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

醫學元戎卷第七

趙州教授兼提舉管内醫學王好古進之答次

太陰證 先足經從湯液 後手經從雜例

仲景理中例

仲景理中湯

主治宿製並見金匱并傷寒論及諸方雜例

人參

白朮

乾姜

甘草

後本經加減八法 錢氏減乾姜為溫中丸

仲景理中乾姜湯 仲景治霍亂改理中

九活人枳實理中丸 局方消飲丸 理中

湯去人參加茯苓為調中丸亦為調中湯並見

蜜

陰陽 桂枝湯解表 四逆湯溫裏 仲景加
論 桂為人參桂枝湯 活人加青陳皮治胸膈
病名和中湯 許學士密和此六味為補脾
丸 虛則補其母 未有子宮而母貧者也
脾者太陰濕土 脾不足陰濕之劑以補之如
何用乾姜白朮以燥之是反泄濕也如何是
補脾 海藏云黃耆湯加減陰證論與四物
各半湯補氣血本方言丸不及湯海藏云大
便與者宜湯大便結者宜丸以其腸胃燥濕
不同也 如何仲景用丸以治霍亂泄瀉

去恐云字

今

理中去參加朴為和中湯
行義云令人使理中湯倉卒之間多不効者
何也是不知仲景之意為必効之藥蓋用藥
之人自有差殊耳如治胃痺心下痞堅氣結
胃滿腹下逆氣搶心理中湯主之人參白朮
乾薑甘草四物等共十二兩水八升煮取三
升每服一升三服以和為度或作丸須雞子
黃大皆可奇効今人使一丸如楊梅許服之
病既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥之罪
也今引以為例他可效此然年高及素虛人

當逐逐加減耳草 飲冷傷胃吐血以理中

湯理治中脘分利陰陽安定血脈只用本方

並三血茶在王氏易簡條下楊氏飲冷瀉血

服對金散止亦理中脘分利陰陽定安血脈

之意也飲冷酒過多吹灸博熱食冷者理

中湯一料加川芎一兩服之平昔素不飲冷

者梔子黃芩湯之類 海藏云楊師三朝三

大醉至醒食大湯飲冷水三巨盃次又飲冰

茶三碗後病便鮮血四次酌一盒先以吳茱

萸丸翼日又夕平思五苓各半散三大服血

止復白痢又夕神志凡曰服白痢乃止其安

如故或問曰何為不用黃連之類以解毒所

用者濕熱之劑予曰若用寒茶其疾大變難

療寒毒內傷復用寒茶非其治也沉血為寒

而凝浸入大腸間而侵下得濕乃行而用

濕熱其血自止經云治病必求其本此之

謂也胃既濕其血不凝而自行各守其本也

行義云有一男子暑月患血痢醫妄用以涼

茶送治專用黃連阿膠木香治之此茶始感

便治則可今痢久鳴底理不可服踰旬不效

萬

至季頤故曰理當別茶知是論之誠在匠之
通變耳。緒經則分每一失引此為例。餘皆倣
此。海藏云。暑月又血痢不用黃連。陰在內
也。

王氏易簡理中湯

治脾胃不和。飲食減少。短氣。虛羸。而後復吐逆。
或大病之後。胃中有寒。時善咳唾。霍亂之後。
氣虛未禁。熱茶並宜服之。

人參

乾姜

白朮

其中各一兩

出

石叻咀。每服四錢。水一盞。煎至半。分服。為寒
氣。泄氣。脈中者。加附子一兩。各附子理中湯。
霍亂吐瀉者。加橘紅青橘各一兩。各治中湯。
乾霍亂。心腹作痛。先以鹽湯少許。頓服。候吐
虫令透。即進此茶。吐者於治中湯內加
丁香半夏一兩。每服生薑十片。煎泄瀉者加
橘紅茯苓各一兩。各補中湯。澹泄不止者。
於補中湯內更加附子二兩。不喜飲水。澀不
化者。再加煆砂仁一兩。共成八味。若霍亂
吐下。心腹作痛。手足逆冷。於本方中。去白朮

加熟附子名四順湯。若傷寒結胸先以桔
梗枳壳小分煎服不愈者及諸吐利後胸痞
欲絕心煩高起急痛手不可近者加枳實炭
苓各一兩名枳實理中湯。若渴者再於枳
實理中湯內加桔梗根一兩。一法霍亂後
轉筋者理中湯加火煨石膏一兩。一法上
築者腎氣動也去朮加官桂一兩半。臣恐燥
故去朮恐作奔豚故加官桂。悸多者加茯
苓一兩。渴欲飲水者添加朮半兩。若寒
者添加乾姜半兩。腹滿者去朮加附子一
兩。一法飲酒過多及啖炙博熱食茶為鼻
衄加川芎一兩。一法專治傷胃吐血以此
茶能理中脫分利陰陽安定血脉不用本方
中附子毒者又用本方。或止用耳中乾
姜亦分煎服仍以烏豆煎湯解之。

韓氏溫中篇

夫傷寒病之說始自黃帝原作皇以用其端由至於
仲景方陳其餘目自後膚淺之學莫如其數疑知
立言者云病在表可發汗病在裡可下之或
云不可汗不可下即未嘗有溫中之說仲景

按当作松

傷寒論傷寒例云尺寸俱沉細太陰受病也
尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥陰受
病也又并太陰證云太陰病脈浮可發汗宜
桂枝湯又自利不渴宜四逆湯又腹滿轉痛
桂枝芍藥湯并少陰證云始得之發熱脈沉
廣黃細辛附子湯又少陰病二三日廣黃附
子日中湯又少陰病身體痛手足寒骨節痛
脈沉附子湯又少陰病吐利手足厥逆冷煩
燥欲死吳茱萸湯又少陰病脈沉急溫之宜
四逆湯今舉仲景論中數條最是治三陰之

良法一作未盡今世用之尚有未虛證者愚嘗按量

自至和初年迄今三十餘年不以歲之太

過不及每夏至以前者一作有病傷寒人十中七八

兩手脈俱沉細數多是胃腸滿剛或吐逆或

氣寒或腹鳴或腹痛今仲景三陰病之說脈

理同而證不同因茲豈敢妄投仲景治三陰

病業匠者方見脈沉及胸滿便投藥下之往

不救掌斟酌仲景理中丸与服之其病勢

輕者即胸中便快病勢重者半日計滿同依

然或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯溫之

然或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯溫之

病當作

尺兩

多^{原作令}茶力大熱後必發煩燥因校量此形證全
別立^方以治之多得病不可不傳焉
病人但兩手脈沉細數或有力或無力或關
脈短及身^{一勞}小胸膈塞問氣短不能相接者便
可隨脈證投區中茶以治之
病人再手脈沉遲或紫或緩皆為胸中塞也
若寸脈短及力小干闕先者此是陰盛陽虛
也或胸膈喘問腹中脹痛身體拘急手足逆
冷宜急溫之若^{一有至字}至春以後至清明以前宜溫
芒種以後至立秋以前宜橋皮湯主之

溫中湯^{一有方字}

船上下香皮

厚朴

去粗皮善製各一兩

乾姜炮

白朮

陳橋皮

丁香^{各二分}

右以咀每服二錢

水一盞入葱白

三寸荊芥

五穗煎至七分

去滓熱服如三兩服未快尚

手足逆冷

嘔吐更加船上丁香二分乾姜

二分炮

橋皮湯

七物理中湯

厚朴丸

白朮湯

橋葉湯

以上五方並見韓氏

微音及陰證論

仲景七物厚朴湯

厚朴 半斤 甘草 大黃 生姜

桂 各二兩 大棗 十枚 枳實 五枚

右水一斗煎取四升去滓溫服八合日三
者加半夏五兩下痢者去大黃寒多者
加生姜至半斤

三物厚朴湯 治腹脹脈數

厚朴 半斤 枳實 五枚 大黃 四兩

右水一斗二升煎二物取五升內大黃四兩
再煎取三升溫服一升腹中轉動勿服不動

更服 勿更字原錯非是

平胃散

此當在陽明例以其多太陰也此散

蒼朮 八兩 厚朴 各五分一作兩

加茯苓丁香白朮為調胃散此藥亦瀉脾濕

一法加藿香半夏續一作諸加減數例並見怡法

正氣飲諸局方局方平胃散加乾薑為厚

朴湯 平胃散此方大抵治脈緩濕勝中寒

者効 溫疫時氣溫毒傷寒頭痛壯熱加連

鬚葱白五寸豆豉三十粒煎三二服微汗出

愈如未得汗以稀粥投之取汗為度若中風

自汗者不宣發汗五勞七傷脚手心熱煩

燥不安肢節酸疼加柴胡痰嗽癰疾加乾

姜製半夏本藏氣痛加茴香水氣腫滿

加桑白皮婦人赤白帶下加黃耆酒傷

加丁香飲冷傷食加高良姜滑脫世隔

加肉豆蔻凡痰四肢沉困加荊芥眼膝

冷痛加牛膝渾身拘急及虛壅加地骨皮

腿膝濕痺加兔絲子白痢加吳茱萸

又痢加艾葉頭風加藁本轉筋霍亂加

赤黃 楠木

楠木皮已上佐使止加一銖此藥不同老

幼胎前產後五勞七傷六極八邪耳鳴眼昏

夢泄盜汗四收浮腫腿膝酸疼婦人宮臟久

冷月水不調者加官桂若能每空心一服

駐顏容一作元壯肌體調三焦壯筋骨祛冷氣快心

胸常助充陽益真氣使脾胃進飲食和氣祛

疾自然榮衛舒暢寒暑不侵此藥去厚朴加

防風療四時傷寒極有神効已上法並用水

煎每服一兩許

陶隱居厚朴湯 治心下至小腹痞滿

厚朴

甘草

枳實

桂 各十分

右細末、每服二錢、生姜湯調服

易簡平胃散

治脾胃不和、不思飲食、心腹脹助、膨脹刺痛、口苦、舌味、胃滿、短氣、呃噦、惡心、噎氣、吞酸、面色痿黃、肌體瘦弱、怠惰嗜卧、體重、腹疼、常多自利、或^{一有黃字}霍亂及五噎、八痞、膈氣及胃並互服之

蒼朮

甘草

厚朴

陳皮

右以咀、每服四錢、水一盞、半姜五片、棗一枚、煎至六分、去滓、食前服、惟大便秘、小便多

中不寒者、別加潤劑、常服調元陽、緩胃氣

化食消痰、飲避凡寒、冷濕、四時不正之氣

一法、加茯苓、丁香各三兩、共成六味、治胃

寒、嘔吐多、加生姜煎服、一法、若其人氣不

舒快、中脘痞塞、加煅砂、香附子各三兩、共八

味、生姜煎服、其効尤速、一方、去蒼朮、餘各

亦分、白水煎服、治酒食所傷、眼睛頭面遍

身黃色、服之神効、一法、加草蓂、烏頭各一

枚、治脾胃寒痞、瘧、平胃散、与五苓散相合、名對

藥

金散、夕六一散相合、名黃白散、夕錢氏異
散相合、名調胃散、欲進飲食、加神麩、麥
柏藥功効

吳茱萸、蜀椒、乾薑、桂、為吳茱萸湯

平胃散、加減大畧、加藁本、桔梗、為和鮮散

加藿香、半夏、為不換金平氣散、已上二藥

通治傷寒吐利、腸滑者、加肉豆蔻、瘧疾

寒熱者、加紫胡、小腸氣痛者、加苦練、苗香一有根字

調胃散

藿香葉

陳皮

炙甘草

厚朴製

半夏

製名亦分

右為細末、每服三錢、生姜水煎

調胃丸、已上調胃散、細末、薑糊丸、梧桐子大

每服三十九、生姜湯下

內疝散、治胃膈不快、腹痛下痢、不嗜飲食

青皮

去白

乾薑

炮

甘草

炙、各

生薑

陳皮

去白

各

右作一服、入棗二枚、水煎服之

易簡養胃湯

治外感風寒、內傷生冷、增寒壯熱、頭疼目昏、
肢體拘急、不同凡寒、二證並宜服之、先用厚

拘

款

變

咳当作痰

被蓋睡速進此茶教服加以薄粥粥熱湯之類

佐之令四肢微汗澌然候乾則徐去被

謹避外凡自然解散若先有汗又須溫潤

以和解之或有餘熱則以參蘇飲欲調之

或尚頭痛則以濃煎生姜湯加葱白下聖餅

子二證既除則不必服茶但節其飲食適其

寒溫自然平復大抵感冒古人不敢輕易用

茶汗者止一作緣黃能同熱理用或不得其宜

則導他真氣因而致虛變生他證此茶平和

也兼能辟山嵐瘴氣四時瘟疫或飲食傷脾

益為咳痰或中脘虛寒吐逆惡心悉能治療

厚朴

蒼朮

半夏

一本各半兩茯苓

人參

藿香

枳實

枳殼

甘草

橘皮

一作是為

右以咀每服四錢水一盞半生姜七片烏梅

二枚煎至六分去滓熱服或發寒瘧或感寒

疫及惡寒者並加附子一作是為味不換金散

藿香正氣散皆此茶也然不若此方大備

易簡滲濕湯

嘔

治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澀
或利大便澀泄皆因坐濕處或因雨露所蒸
或因汗出衣裡當冷濕久得之眼下重疼兩
脚酸痛腿膝或腫小便利及不渴者能治之

蒼朮

甘草

乾姜

白朮

茯苓

橘紅

丁香

右以咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一

枚煎至六分去滓溫服此茶煮治脾胃不

和嘔逆惡心大便時澀泄尤得其宜一

服之或不因濕氣所傷止是凡寒相搏以

致脘疼豆服生料五積散加桃仁數箇煎服

若腎虛致疼當服補藥

活人厚朴黃連香薷湯

治陰陽不順清濁相干氣射中焦名為霍亂

或飽食豚暍後飲酸漿海陸諸吳無不食之

或多飲冷或臥當風痛傷脾胃食結不流陽

不能升陰不能降二氣相反交錯不通所以

變成吐利也百脈昏亂榮衛俱虛冷搏於筋

轉筋注下

此是脫

消

厚朴 製

黃連

各二

香薷穗

一兩五錢

右厚朴黃連二味入生姜四兩同炒紫色杵

為細末少香薷同煎每服三大匙水一盞酒

半盞同煎至七分去滓用新汲水浸換極冷

頓服之冷則効速煎時不犯銅鐵器慢火熬

非時病者又治井中沉冷尤妙

局方香薷丸

香薷散

二藥主治脘製並見本

錢氏異功散

人參

陳皮

甘草

茯苓

白朮

錢氏異功散內減陳皮餘四味是也

四君子湯

人參

甘草

白茯苓

鎔砂仁

右方在四物八珍湯後

易簡四君子湯

治大人小兒脾胃不和中脘停飲大病之後

亟服此藥但味甘恐非快脾之例劑另增損之法

見於方後

人參

茯苓

白朮

各一

甘草

五錢

右以咀水一盞薑七片棗一枚煎至六分去

亦

丈

淳脈一方加橋紅木灸名異切散尤逆病
 後調理一方去人參加官桂木灸甘草亦
 減半名耳草湯治停食目眩一方去耳草
 加枳壳橋紅半夏木灸名六君子湯專治素
 有痰飲胃隔痞悶脾胃虛寒不嗜飲食脈燥
 茶不得者大豆服之一方去甘草加木香
 熟附谷加味四柱飲治丈夫元氣虛真陽
 耗散兩耳常鳴膝肢冷痛頭眩目暈四肢倦
 怠小便滑數泄瀉不止加善東煎服大病之
 後尤宜用此調理一方加黃耆白扁豆木
 灸大治腸風并五痔下血面色痿黃心忪耳
 鳴脚弱力乏口淡無味善東煎服碾為細末
 尤佳此方人未治之服者頗效李次仲云
 着不在面自有奇功

着

易簡惺散

治小兒凡熱瘡疹傷風時氣頭痛壯熱目澀
 多搐咳嗽氣粗鼻塞清涼

白朮

桔梗

細辛

甘草

茯苓

人參

瓜蒌

各一兩

右以咀每服三錢水一盞生薑三片入薄荷

水

三葉煎至半盞時令其服錢氏小兒壯熱昏

一有方字

睡傷凡凡熱瘡疹傷食病皆相似未能辨認

間服捏散小柴胡湯升方湯乾葛升方芍

藥中芍分白水煎服此散藥均能治療用

之甚驗惟傷食則大便酸臭水澆不化畏食

吐食宜以下藥下之加已豆感忘丸并參蘇

飲治諸般發熱尤為切當并耳冷肌冷手足

乍冷乍熱面赤噴嚏驚跳不安皆瘡疹之候

也已發未發升方湯消毒飲皆得其宜若三

狀如蚤痕者是也或發不速或倒靨黑陷極

為利害紫草木通甘草桔梗木分白水煎服

名曰如聖散更有小兒頭昏頰赤口內熱

氣小便赤澀大便秘結此為裡熱當用大黃

當飯芍藥芍草木分白水煎服各四順飲若

審是瘡疹之證不互用此

易簡白水散

治小兒泄瀉冒熱煩渴不問陰陽並互服之

人參 藿香 甘草 乾葛

木香 茯苓 白朮 各二

右以四每服二戈水一盞煎至半盞量大小
与服仍用香連丸同之渴欲飲水者時二煎
服任意飲之弥多弥佳

白朮散 一方治嘔

白朮 人參 半夏 各一 乾姜

甘草 茯苓 各五

右剉姜枣水煎服

錢氏方謂小兒吐瀉當溫補之每用理中丸
以溫其中止苓散以導其逆連進散服兼用

四君子加陳皮調之若以虛損用金液丹雜
以青州白九子為末米飲調服多服乃有効

吐 吐瀉之後發熱必作驚凡二葉服之累有神
効若胃氣已生則旋減金液丹却以異功散
亦葉徐調之若食不消脾胃虛寒嘔惡心

者當服益黃散用陳皮半夏青皮訶子肉甘
草各一分丁香一錢量大小煎服小兒暑月
吐瀉其證不一詳審用藥不可是謬 有伏
暑者小便不利豈一五苓散香薷散 有傷
食其吐并糞必酸臭氣至服感忘凡 若虛
冷者其瀉泄必多豈服六神散加附子服之

用人參茯苓山茱白朮白扁豆甘草木分善
棗煎服 凡證加天六 痢者加罌粟壳
吐瀉初定當以天南星為細末每服加冬瓜
子七粒煎服以防變痢若瀉色青當用驚茶
小兒之病与大人無異用茶一同當量力用
之惟中惡肺風夜啼重舌夏煎客忤驚痢解
顧魁一作魁痞疝氣不行救證大人無之並見錢氏
方一作病

大寒夏陽 後有小七氣湯

人參 白朮 車前 半夏

茯苓 附子 桂

易簡四獸飲

治五臟氣虛喜怒不節勞役兼致陰陽相勝
結聚涎飲夕胃氣相搏發為瘡疾悉能主之
兼治瘴癘最有神効

人參 白朮 車中 草果

半夏 茯苓 橘紅 各小

右同棗子烏梅生姜煎木分以咀以鹽少計
淹之須厚皮一作熟紙裹用水濕之慢火炮令香熟

焙乾每服半兩水二盞煎至六分去滓未發
前連進數服 一方治脾胃寒各扶脾胃飲用草

果人參白朮橘紅半夏厚朴縮砂仁附子木
公車草減半每服四錢薑十片烏梅二個棗

子一枚煎至六分去滓不以時候服用此藥
下紅凡子尤妙 兼治脾胃虛弱中脘停塞

不進飲食四肢無力並熱多痰飲以飲用前
胡柴胡各一兩官桂桔梗厚朴各三分黃耆

陳中乾薑各半兩右以咀每服四錢水一盞
一方名七室散用常山陳皮青皮枳榔草果

仁甘草各小分每服半兩酒水各一盞煎至
八分於當發日侵晨服之此藥既有常山必

頂吐吐人而後愈當日大作也謂劫藥是也虛
一作怯損人不宜服此脾胃素虛寒者用小附子一

箇炮以鹽浸再炮再浸如此七次去皮切作
片一作厚水三盞薑七片棗七箇煎至此分當發日

空心溫服各七棗湯 痞疾多因中脘有飲
用常山作効者以其能吐之不若用辰砂黃

丹葷而墜之為佳 其方用黃丹一兩大蒜

世

七

而

井

須

去皮碾膏凡作三九當癸日臨晨嚼一丸用
一有花字并水或熱水嚥下 一方用生硫黃辰砂各
為細末寒多倍硫黃熱多倍辰砂寒熱相亦
者勻用每服三錢臘茶清調服臨食日早晨
進之當日或作或不作皆是其效願早用之
為佳

易簡新下湯 治下痢赤白無問新久長短

白朮 茯苓 甘草 芍藥 各五錢

右以咀用罌粟壳十四枚去筋膜并葶藶煎

碎用醋淹為粗末同煎作一劑水一大碗善

七片束子烏梅各七箇煎至一大盞分二服

服之赤痢者加烏豆二粒白痢者加乾薑半

錢凡用罌粟壳治痢服之如神但性緊澀服

之令人嘔逆既用酸制製加烏梅不致為害然

嘔逆吐人則不可服大率痢疾古方謂之滯

下多因腸胃素有積滯而成此疾始得之時

不可遽止先以巴豆感衣丸十餘粒用白梅

茶下令大便微利仍以前茶服之無不忘手

而効 若脾胃素弱用肉豆蔻橘紅罌粟壳

各半分為末醋煮米糊丸梧桐子大每服五

難

十九烏梅湯下兼治泄瀉暴下不止一服即愈更令藥力相信為佳如覺惡心却以理中湯四君子湯加豆蔻木香藿調其胃氣仍以二陳湯水煑木香丸定其嘔逆嘔大凡痢疾乃腹心之患尊羊人元非巫巫若果首尾用平和之劑一作決次雖作効必致危篤雖已欲服此則已晚矣其如地榆秦皮黃蘗苦參木通之類其性苦寒却難難輕服血痢當服胃凡湯并艾膠湯之類血者宜服附子理中湯震

困

海藏黃耆湯

無時常用熟烏頭一兩厚朴甘草乾薑各一分生薑煎服今人治痢多用駝車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連阿膠其性本冷若厥感稍輕及餘痢休息不已則服之効効若病稍重非此可療若認其穩當則悠一有服乃自聚一作取困頓也

主治並見陰證畧例本方無藿香治三焦氣虛自汗

人參

白朮

黃耆

茯苓

甘草

陳皮

藿香

白芍藥

乾生薑

黃耆湯 芍四物湯各半 各托裏湯 加桂名

千金散 木方去茯苓加川芎當歸 為黃耆

解肌湯 去芍藥加白扁豆 為四君子湯 加

藿香葉以理氣此即補脾湯也

錢氏白朮散 和中散

養脾丸

人參

茯苓

甘草

一兩

乾薑

炮

右為細末煉蜜丸彈子大細嚼生薑湯下

調中參湯

人參

半兩

木香

二分

茯苓

半兩

葛根麩

一兩

甘草

一分

藿香

一分

陳皮

藿香

治酒毒加白朮

一味

右為粗末生薑水煎如細末生薑湯點服

解酒毒例

葛花湯 治傷酒之仙藥能上下分消其濕

葛根麩

小豆花

藿香葉

白豆蔻

益智仁

縮砂仁

香附子

車前子

葛花

一作葛葉

白檀

木香

丁香

沉香

檳皮

陳皮

善香

官桂

白木

沃陽

茯苓

甘草

右為細末、湯點服、酒調亦得、善糊丸、桐子大

酒下之、又一作得可服、畢、但鼻準微汗即解

橙香丸 一名葛盃丸

木香

沉香

白檀

甘草

各半兩

橙皮

葛麩

橘紅

一兩

白豆蔻

兩晒

益智子

各三

生薑

四兩

或碎

破

鹽

淹一宿

縮砂仁

枚

右為細末、水浸、蒸餅為丸、桐子大、細嚼一二

十丸、白湯下、或減甘草、用甘草膏子丸

不醉丹

白葛花

天門冬

白茯苓

牡丹葉

小豆花

縮砂仁

葛根

官桂

車草

海鹽

木香

沃陽

人參

陳皮

枸杞

右為細末、煉蜜丸、彈子大、每服一丸、細嚼熱

酒下一丸、可飲十盞、十九可飲百盞

百益丸

砂仁

高茶

而

訶子

一兩

廣香

一錢

昭子

少許

右為細末、煉蜜丸、每一兩、作十九丸、一有字米飲酒先

細嚼一丸酒下

局方勻氣散

丁香

藿香

甘州

木香

檀香

縮砂

白豆蔻

各一分

右共為末、白湯調服

集香丸 海藏云損其氣者以此藥接之

白豆蔻

縮砂仁

藿香葉

白茯苓

丁香

白檀

沉香

益智

烏藥

陳皮

甘草

人參

一法、噎食加柿霜、一法加廣茂、一法加

香附子、一法加乾姜、隨證定等分兩為末

點服

局方七香丸 主治脩製並見局方

丁香

廣茂

益智

縮砂

木香

甘松

甘草

香附

五疔寬中散 主治脩製並見本方

白豆蔻 縮砂 香附子 陳皮

丁香 青皮 耳草 木香

丁香 各等分

烏沉湯 主治脩製並見局方

沉香 烏菜 本草 人參

小烏沉湯 主治脩製並見局方

調中快氣治心腹刺痛

香附子 二兩 烏菜 一兩 甘草 一兩

右細末 薑湯點服

益脾丸 一名三花丸 飲酒不醉 嘗在不醉丹

小豆花 一兩 綠豆花 二兩 葛花 二兩 木香 二兩

一法加紅花一錢半

右為細末 蜜丸 桐子大 每服十丸 煎紅花湯

下夜飲津液下 三五七丸 則不醉

東垣先生治飲酒心下痞 三製三黃丸

黃芩 炒 五枚 酒浸 一半 火 炒 一半 生用 一半

右三停分 面勻為細末 糊為丸 桐子大 每服

三十丸 溫水送下 量輕重加減 治熱酒 亦傷

若傷冷酒 則下神志丸 主之

七香丸 治脉伏不見心腹痛欲死者

人參 栝柳 各二錢半 木香 丁香

乳香 藿香 沉香 檀香 各五

零陵香 知

右為細末蜜丸桐子大量數日細嚼米飲下

六七香丸

縮砂仁 二兩 香附子 一兩八分 耳州

麥蘗 炒一兩 橋紅 藿香 肉桂 各二兩

丁香 二兩 甘松 業脫量教

右月為細末煉蜜丸桐子大每服三十九每

一兩分八丸每服一丸細嚼湯酒任下

集香丸

縮砂仁 丁香 各半 耳草 七錢 麥蘗 七錢

耳松 一兩二錢 香附子 一兩 丁香

白檀 益智 各二錢半 白豆蔻 木香

蓬朮 廣茂 沉香 各三錢 一方加

神曲

右為末薑汁浸蒸餅丸如雞頭實大細嚼下

木香餅子

反前集香丸俱能寬中理氣消酒逐痰飲進

美飲食

香附子一本 川芎一本 木香 吳白芷一本

善黃 炮 縮砂仁 甘松 桂 各二 兩

甘草 半一 兩

右為細末、水浸蒸餅丸、生善湯、白湯、任下十

餅至十五餅

易簡藜合香丸 主治脩製一有之法二字 並見局方

白木 丁香 硃砂 白旦

沉香 烏犀 草際 竟腦

六香 蘇合油 青木香 安息香

薰陸香 香附子 訶梨勒子

右每服一大丸、沸湯文計許化服、治卒中昏不

知人、及霍亂吐瀉、心腹一有極字痛、鬼疰、客忤、癩病、驚

怖、或跌撲傷、換氣、暈欲絕、凡倉卒之患、悉

皆療之、此茶隨身不可暫闕、辟諸惡氣、併禦

山嵐瘴氣、無以踰此、若吊喪問疾、尤不可無

但市肆販賣、多用腦子、當用火上碎去、能飲

者、以酒調服、若用心過度、夜睡不安、尤宜服

之功效最健、筆舌難窮

木香餅子

丁香 二錢
木香 四兩
縮砂仁 十二兩

廣茂 十兩
檀香 四兩
甘松 五兩
水洗

右為細末，車州膏丸，每兩作二百五十九粒。

作餅子

下沉煎丸

丁香 二錢
白豆蔻 九錢

木香 一錢
沉香 三錢

右為末，薑糊丸，桐子大，酒下三十九粒。

沉香降氣湯 治喉下交結，脾胃濕滯，世脚氣。

沉香 一兩
砂仁 四兩
甘草 十二兩

右為細末，每服一錢，入鹽少許，沸湯點服，已

上三味，通治侵晨霧露之氣，去惡邪，諸瘴，治

酒丸佳

調中沉香湯

沉香 一兩
木香 一兩
白豆蔻 各一兩

丁香 半錢
甘草 二錢
菴腦 研二錢

右為細末，入菴腦和勻，沸湯點服，半錢入生

薑一片，鹽少許

金匱下痢病證并治

後代名醫諸書所說皆以此為法一有者字夫六腑

氣絕於外赤手足寒上氣脚縮五臟氣絕於

內者痢不禁不甚者手足不仁下痢脈沉

弦者下重脈大者為未止脈微弱數為欲自

止雖然發熱不死下痢手足厥冷急者

灸之不溫者脈不還及微而喘者死少陰跌

陽調者為順也下痢有微熱而渴脈弱者

當自愈下痢脈數有微汗出今當自愈設

脈緊為未解下痢脈數而渴者當自愈設

不解者必清膿血以有熱也下痢脈及弦

發熱自汗者自愈下痢氣者當利小便下

瀉

痢脈及浮數尺中自瀉者必清膿血下痢

清亮穀不可攻其表汗出必脹滿下痢脈沉

而遲其人面少赤身微熱下痢清亮穀者必

鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其

面戴陽下虛故也下痢後脈絕手足厥冷

時脈還手足溫者生脈不還者死下痢

腹脹滿身體疼痛者必溫其裡後攻其表溫

裡宜四逆湯攻表宜桂枝湯四逆湯見上

桂枝湯

桂枝 去皮 生姜 切 芍药 各三两

炙甘草 一两 大枣 十二枚 碎

右以咀、以水七升、煮取三升、去滓、温服一升

须臾、欲发、稀粥一升、以助药力、微汗

一下痢三部皆平、按之心下坚者、急下之、宜大

兼气、方见阳明病中

一下痢脉迟而滑者、实也、利未止者、急下之、宜

大兼气、汤

一下痢脉反滑、当有所去、下乃愈、宜大兼气、汤

一下痢、瘥至年月日时、发者、以病不愈、故也

当下之大兼气、汤以上数证、皆兼气、汤本虚者、当以别议

一下痢、讞语者、有燥屎、故也、宜小兼气、汤主之

方

大黄 四两 枳实 三枚 厚朴 三两面

右以咀、以水四升、煮成一升二合、去粗、分温

再服、一服、讞语止、若更衣者、停后服

一下痢、便脓血者、桃花汤主之、方

乾姜 二两 粳米 一升 赤石脂 一两半

右三味、以水七升、煮米、煎去滓、温取七合、内

赤石脂末方寸匕、日再服、若一服愈、餘藥勿服。

一热痢下重者、白頭翁湯主之方。

白頭翁 二兩 黃連 黃柏 秦皮 各三兩

右四味、以水七升、煮取三升、去滓、每服一升、

不愈更服。

一下痢後更煩、按之心下濡者、為虛煩也、梔子

豉湯主之方。

肥梔子 十四枚 香豉 四兩 綿

右二味、以水四升、煮梔子取二升半、內豉煮

取一升、去滓、分再服、溫進一服、得快吐止後

服。一下痢清亮、裏寒外熱、汗出而厥者、通脈四逆

湯主之方。

炙甘草 二兩 乾姜 可三兩、強人

附子 大者一枚、破八

右三味、切以水三升、煮取一升、二合、去滓、分

溫再服、其脈即出者愈。

一下痢腹痛、紫參湯主之方。

紫參 五錢 炙甘草 二兩

右二味切水五升先煮紫參取二升內甘草
煮一升半去滓久溫三服疑非仲景方

主氣痢訶黎勒散方

右一味為細末粥飲和頓服疑日仲景方

大便不通噦數譟語小兼氣湯主之方見千金

乾嘔下痢黃芩湯主之方玉函經云人參黃芩

人參 黃芩 乾姜 各三兩 桂枝 去皮二兩

大棗 十二枚 擘

右五味切以水七升煎取三升去滓溫服分

三服見小臺

右此下痢一章內有治傷寒數方仲景用治

雜病今全錄之使後人知之治傷寒有法治

雜病有方者非也傷寒雜病一治治矣

當在太陰下卷後今錄于此

王朝奉治喘例

夫喘者廣黃湯表證也小青竜湯挾水證也然

也 廣黃湯主喘也太陽證下之喘者表證未解

桂枝加厚朴杏仁湯喘家用桂枝湯加厚

朴杏仁又佳發汗下後不可更行桂枝若汗

出而喘無大熱者可用廣黃杏仁甘草石羔

湯太陰桂枝證。至及下之病不止。脈促者表未解。喘而出汗者。宜葛根黃芩黃連湯主之。
活人舉華陀喘說。

活人舉華陀云。喘者肺氣有餘也。宜梔子黃芩湯主之。

經云。帝曰。人有逆氣不得卧。而息有音者。有不得卧。而息無音者。有起居如故。而息有音者。又有得卧而行喘者。有不得卧不能行而喘者。有不得卧而喘者。皆何臟使然。願聞其故。
岐伯曰。不得卧而息有音者。足陽明之逆也。

足三陽者下行。今逆而上行。故息不言也。陽明者胃脈也。胃者六腑之海也。其氣又下行。陽明逆而不得從其道。故不得卧也。胃不和則卧不安。此之謂也。夫起居如故。而息有音者。此肺氣之脈絡逆也。脈絡不得隨經上下。故留經而不行。脈絡之病人。其微起居如故。而息有音也。夫不得卧。則喘者是水氣之

行也。夫水者。循津液而流也。腎者水藏。主津液。主卧。主喘也。帝曰。善。

前太陽。黃升。廣湯。壞證。某後。有王朝奉傷寒。

喘例諸喘皆屬於上當在手太陽例然內經云五藏皆有喘故例在此後

經云驚恐喜怒勞動靜皆為之變喘是以夜行

則喘出于腎淫氣于肺故墮恐喘出于肺淫

氣傷脾故有所驚恐喘出于脾淫氣傷心度

水跌跌仆喘出于腎与宗當是之時勇者氣行

則已怯者着而病也故動靜勇怯皆能成疾

形志苦樂各有受病不可不知

聖惠方 治十種水氣喘滿不得臥

右蟬蛭止箇曝乾為末米飲調下半錢至一

錢小便通快為度

潔古老人方

右用蟬蛭去頭尾与蒲荀心同搗露七日曝

乾為末酒調下暑月湿用尤佳

喘飢脾胃虛調飲食持重少血飽食氣滯久勞

飲食勞傷則主脾主氣不及接行動而火上

行卧氣上衝不下水飲也

嘔諸病喘巨皆屬於上諸病吐呃皆屬於中諸病

下痢皆屬於脾諸病腫滿皆屬於湿故手足

太陰病手足陽明病吐喘促傷胃虛實寒

一本...

热傷寒雜病俱混說于太陰條下



壬子臘月初三日授于直舍
是夜寒殊甚十指如僵

元簡記

醫星元戎卷第七 終



