


古今醫鑑 七




卷 七

補益	失血	眩暈	五癩
癩冷	上自汗	麻木	
虛勞	盜汗	癩狂	

漢書門	一	二	六	一	〇
類	號	函	架	冊	冊

內閣文庫	
番號	漢 12610
冊數	16 (7)
函號	301 107






王宇泰先生訂補古今醫鑑卷之七



金谿 龔信

子廷賢 續編

金壇 王肯堂 訂補



補益

脉氣虛脉細或緩而無力右手弱血虛脉大或數而無力左手弱陽虛脉遲陰虛脉弦真氣虛脉緊男子久病氣口脉弱則死強則生女人久病人迎強則生弱則死

證夫虛者虛損也難經所謂五損脉者亦因虛而致

損也。一損損於皮毛，皮聚而毛落。二損損於血脈，血脈虛少不能榮於五臟六腑。三損損於肌肉，肌肉消瘦飲食不為肌膚。四損損於筋，筋緩不能自收持。五損損於骨，骨痿不能起於牀。反此者，至脈之病也。從上下者，骨痿不能起於牀者，死。從下上者，皮聚而毛落者，死。治損之法，奈何？然損其肺者，益其氣；損其心者，調其榮衛；損其脾者，調其飲食；適其寒溫；損其肝者，緩其中；損其腎者，益其精。此治損之大法也。夫諸虛與勞極未始不由氣體虛弱，心腎有虧，水火不自升降而致也。或為寒暑勞

役所傷，或因色慾過度，俱能戕賊真氣，以致肌體羸瘦，腰膝無力，小便頻數，大便滑泄，目眩耳聾，遺精自汗，甚則虛火上攻，面赤發喘，此皆諸虛之證也。勞極者，七情傷乎五臟也。盡力謀慮，勞傷乎肝，應乎筋；極曲運神機，勞傷乎心，應乎脈；極意外過思，勞傷乎脾，應乎肉；極預事而憂，勞傷乎肺，應乎氣；極矜持志節，勞傷乎腎，應乎骨。極此五勞，應乎五極者也。勞極精氣變生諸證。

治 治療之法，當隨五臟六腑寒熱調之。經曰：形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。然滋補之藥，貴

乎平和不可驟用峻補丹右燥熱之劑恐腎水枯竭虛火愈熾惟當斟酌輕重而用之斯得之矣

方四君子湯

大補陽氣虛衰

人參一錢

白朮二錢

白茯苓一錢

甘草炙一錢

右剉一劑薑棗煎服有痰加陳皮半夏名六君子湯○按是方治氣分之聖藥也用人參補元氣白朮健脾胃甘草和中茯苓滲淡引參下行補下焦元氣氣乃無形之氣屬乎陽乃君子之象焉故名四君子湯

○四物湯

大補陰血虛損

生地黄

錢二

當歸

錢二

川芎

錢一

芍藥

炒

錢半

右剉一劑水煎服○按是方治血分之聖藥也用當歸引血歸肝經川芎引血歸肺經芍藥引血歸脾經地黃引血歸腎經惟心生血肝納血脾統血肺行血腎藏血男子化而為精女子化而為月水血乃有形之物屬乎陰故名四物湯

○八物湯

大補氣血兩虛

四君子湯合四物湯薑三片棗二枚水煎服

○十全大補湯

治氣血兩虛兼助陽固衛

八物湯加肉桂一錢黃芪一錢薑棗水煎服

○人參養榮湯 治積勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦

○面少顏色汲汲短氣飲食無味

人參 一錢 當歸 一錢 陳皮 一錢 黃芪 一錢 蜜炙

桂心 一錢 白朮 一錢 甘草 一錢 白芍藥 二錢

熟地 二錢 茯苓 一錢 五味子 七分 遠志 五分 去心炒

右剉一劑薑三片棗二枚水煎服

○固真飲子 治中年已上之人陰陽兩虛元氣不

足頭每痛日晡微熱少食力倦精氣時脫腰痛

斷酸服之者每得良效

人參 一錢 乾山藥 一錢 當歸身 一錢 熟地黃 二錢 五分

黃藥 炒一錢 白朮 五分 澤瀉 五分 山茱萸肉 五分

補骨脂 五分 五味子 十粒 陳皮 八分 白茯苓 八分

杜仲 七分 炒斷絲 甘草 七分

右剉一劑水煎服

○九僊酒 治諸虛百損

八物湯四兩加甘州枸杞子八兩用生薑二兩

棗十枚煮好酒一壺不拘時隨量飲大有補益

○六味地黃丸 治形體瘦弱無力多困腎氣久虛

寢汗發熱五臟虧損遺精便血消渴淋濁等症

此藥不燥不寒專補左尺腎水兼理脾胃少年

水虧火旺陰虛之症最宜服之

澤瀉 三兩 淮熟地黄 八兩薑汁炒

乾山藥 酒蒸 四兩

○六味山茱萸 酒蒸去核四兩

白茯苓 三兩 牡丹皮 去骨 三兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每七十九丸空

心白湯下○婦人血虛無子此方更效須加醋

炒香附當歸各二兩○虛勞加紫河車一具蒸

爛搗為丸○陰虛火動加酒炒黃藥知母各二

兩○心腎不交消渴引飲加麥門冬三兩五味

子二兩○腰膝痛加酒洗牛膝薑炒杜仲各三

兩○小便夜多去澤瀉加鹽酒炒益智仁三兩

○兼補右尺相火加製附子童便煑官桂各二

兩○遺精加牡蠣三兩○嗽加五味子三兩

○神僊既濟丹 少保劉專補諸虛百損五勞七傷滋

腎水降心火補脾土添精髓益氣和血壯筋骨

潤肌膚聰耳明目開心益智強陰壯陽延年益

壽此藥性氣溫而不熱清而不寒久服則坎離

相濟陰陽協和火不炎而神自清水不滲而精

自固此平補之聖藥也

山藥 酒蒸 三兩 牛膝 酒洗 三兩 杜仲 酥炙 二兩 巴戟 湯泡 二兩

五味子 二兩 白茯苓 二兩 枸杞 酒洗 二兩 小茴 鹽水炒 二兩

菘蓉 二兩 酒洗 山茱萸 酒蒸去核 石菖蒲 去毛

遠志 甘草水炮去 黃蘗 酒炒 知母 去毛酒

生地 酒蒸熟地 酒蒸麥冬 去心 人參 去蘆

瓦絲子 酒煮爛搗成 甘菊 酒洗 山梔子 炒黑

廣橘紅 一天冬 湯泡 當歸 酒洗 龍骨 火煨過

右為末煉蜜和棗肉為丸如梧桐子大每服七

八十九丸空心淡鹽湯送下

○天王補心丹 寧心益智壯力強志安神竟定驚

悸怔忡祛煩熱化痰涎稠濁

熟地 二兩 酒洗 白茯苓 二兩 丹參 二兩 柏子仁 去殼

百部 二兩 石菖蒲 二兩 牛膝 酒洗 杜仲 酥炙去

當歸 二兩 酒洗 棗仁 炒二兩 玄參 二兩 天門冬 去心

五味子 二兩 人參 二兩 白茯苓 二兩 遠志 甘草水

桔梗 一兩 甘草 一兩 麥門冬 一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣每服

一九臨臥燈心紅棗煎湯細嚼送下

接命膏 治氣血虛弱痰火上升及中風不語左

癱右換腰疼膝痛動履不便一切虛損

人乳 二盞肥白女人梨汁 一盞

右二味傾入銀錫錠中置沸湯內頓滾有黃沫

起開清為度每五更後一服大能消痰補血

○三才大補膏 劉大府傳

生地黄一斤 熟地黄一斤 天門冬四兩 麥門冬四兩
人參四兩 甘枸杞兩 牛膝四兩 何首烏八兩
右咬咀勿犯鐵器同入大砂鍋內用水二十梳
煎至七梳取汁別貯藥查如前再煮九次共得
汁七十梳濾查極淨別用中等砂鍋入汁七梳
慢火煎熬耗汁一梳方添一梳六十三梳皆添
盡則汁已濃矣蓋抵得汁六梳却用山白蜜去
蠟可一斤半同煎藥入砂鍋內重湯煮汁滴水

不散則成膏矣磁罐盛之埋土中七日取出如
前再煮一晝夜再埋一宿乃分貯小壘內封固
以次取用自煎至煮但用桑柴火藥本尋常妙
在火候不拘時以醇酒調服味美而功多若慾
愈室慾之人又深居簡出時服此膏亦可以擅
其天年矣七年之艾不可不蚤為之用也

○天真接命丹 方上異人傳

用無病室女月經首行者為最次二次者為中
次四五次為下然亦可用取法以黑鉛打一具
形如黃衣冠子樣俟月信動時即以此具令老

媪置陰戶上以絹幅兜住接其取起頓磁器中
再用前具再取約二三鍾許澄沉底紅如硃砂
此為母氣真元也其面如黃色浮起此為發水
也即用綿紙輕輕拖滲去却用極細白淨好茯苓
為末用熟水浮去木屑取沉底者曬乾搗入
紅鉛中如和麩然多寡軟硬以意消息打作薄
薄餅子陰乾待用不可犯鐵器既乾研成細末
以麻黃一大把剉煎成極濃膏子用綿布絞濾
去渣入前末中以成丸為度如菜豆大以老坑
辰砂研細末為衣用銀藥確盛之收存以黃蠟

封口每服五十九或七十八十九服後靜坐無風
處所略有微汗驗藥性流行充溢四肢經絡皮
毛之間如服後發熱作渴此元氣虛藥性到也
須服乳汁數盞以止之服藥後三日內蔬食不
可喫油膩之物此藥進二三次或越三五年又
進二三次立見氣力煥發精神異常草木之藥
千百服不如此藥一二服蓋人自十六歲已往
精氣漸減不但男女之慾足以損敗一與事應
則視聽言動皆耗散精氣之原故禪氏面壁僊
家坐關此藥採自人身產從元始非若金石草

木之有偏勝實可全挽回造化之功養生君子
珍之重之

○陽煉秋石法 京師傳

童便一缸牙皂煎水二三椀入缸內用柈條亂
攪起白泡用杓撇去隨攪隨撇令泡盡澄清許
久上去其泡下去其垢膩惟取中間清水入鍋
內煎熬用木柴火先文後武熬二三椀又加童
便半鍋又熬至乾又加又熬至缸中童便盡乃
止熬至焦乾入香油一椀從鍋週圍傾入鍋底
用極猛火燒過透紅無油氣連鍋掇起放地上

待冷一時自然成塊而起研羅細末用淨水二
椀入內攪勻如米湯樣澄一二日再攪起傾入
好雪白連四紙十數層盛藥下用竹篾為梢箕
水浸一宿去竹內黃水令淨將紙放竹箕內下
用磁器盛之濾下極清水於磁器內濾令乾收
入鍋內將紙查再入水攪如上法濾之將先濾
清水用廣鍋一口以缸瓦打磨令光如銀白入
內用炭火熬令乾為度抓起放紙上再將鍋又
打磨淨又熬第二次清水如上法只要潔淨得
如雪之白

○陰煉秋石法

京師傳

用童男童女便各一桶入半舊瓦缸內入淨水
一桶柳棍攪千餘下澄半日待清括去清者半
桶又入水一桶如前攪澄却括一桶如此七白
一日兩次共十四次將清水盡傾去止畱秋石
傾放皮紙上下用杉木枝或柏木枝盛貯曬乾
或日曬夜露取其日精月華或以人乳拌曬入
丸藥內或單用棗肉為丸如梧桐子大每服五
七十丸空心好酒送下大有補益善降虛火其
功不可盡述

○取紅鉛法


用室女經血或首經最佳以布帛用燒酒洗過
曬乾用之以烏梅水澄之取出入乳香末少許
乳汁為丸如櫻桃大每噙一丸取女人氣一口
乳汁送下治諸虛百損五勞七傷神效

○神僊伏氣秘法

劉雲
叢傳

治諸虛百損五勞七傷延年

益壽



橐籥

先於辰戌時行安命之功於右鼻進藥吹氣

共 六 十二 十八 六 四 止

次日寅時行進陽火之功於左鼻進藥吹氣

三 五 七 九 十一 十三 十五 十七 止

○於戌時退陰符仍照行十六至四止

每行之時先令病人仰面平枕口噙熱水或乳

香酒一ロ然後令童女照前數吹之吹法先取

紅鉛用未破身童女所行經脉以夏布揉洗令

淨或淨花亦可撮下曬乾如用時將熱童便洗

○下曬乾收起臨用時以童便化開滴於橐籥小

頭口邊入鼻內將大頭令童女口噙使力吹之
如上法病人候吹氣即吸入童女忌葱蒜酸辣
之物久久行之能接補天年行後如覺內熱可
服人乳即能解之

○三元丹 補虛損接天年

紅鉛 一兩 人乳 一兩 乳香 一錢 辰砂 一錢

秋石 一錢 用童便入瓦器內用掃淨新磚數
塊入內浸七日取出冬夫放陰地上夏

月埋土內要極深日
久自生白右掃下用

右共為末即以人乳調和將雞彈一枚磕一孔
傾出青黃不用紙展乾淨將藥末入內封固緊

密放羣彈內抱三七日取出丸如梧桐子大金箔爲衣如乾再添入乳汁爲丸每服三九人乳送下五更空心服汗出至足爲度不可見風

痼冷

證痼冷者謂痼久而冷也痼者固也冷者寒之甚也人之臟腑稟受不同亦或將理失宜遂致偏廢故方中有痼冷積熱之說痼冷中寒也其病多由真陽虛弱胃氣不實復啖生冷冰雪水酪諸寒之物或坐臥陰寒久濕之地以致臟腑久痼而冷其爲病也或手足厥冷或腹中久痛溏泄無度或腰腿

重痛如坐水中或陰痿不舉寒精自出或久嘔逆飲食不進或自汗戰慄或大腑洞泄或小使頻數此皆痼冷之爲病也

治治之法宜溫補下元健脾養胃祛寒邪固真氣使陽氣得復陰陽平和則無偏勝之患而病愈矣凡脫陽症或因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接人事不省或傷寒新瘥誤與女人交接其証小腹緊痛外腎拳縮面黑氣喘冷汗自出是名脫陽症須臾不救急用葱熨法更灸氣海在臍下寸五分關元在臍下各五寸壯內服薑附湯五積散之類然後

可服黑錫丹或灸男左女右手，中指一壯，再灸關元穴七壯。

凡陰證身靜而重，語言無聲，氣少難喘，息目睛不了了，口鼻氣冷水漿不入，大小便不禁，面上惡寒，有如刀刮，先用葱熨法，次服四逆湯。

方回陽返本湯 雲林製 治急陰症，手足冷，指甲青，少腹疼痛，外腎攣縮。

- 人參 一錢
- 白木 一錢
- 乾薑 一錢
- 丁香 八分
- 甘草 一錢
- 陳皮 一錢
- 半夏 一錢 製
- 大附子 一錢 製
- 茯苓 八分
- 神麩 六分
- 白豆蔻 八分
- 沉香 五分

右剉一劑，生薑三片，棗二枚，鹽少許，水煎服。外

於臍上用熟葱貼冷，則復易外腎，并陰囊以絹

帛扎住，用炒鹽款款烙之，再用炒鹽熨胸膈脇

肋上下小腹，如急陰不省人事，用鹽填滿臍中，

艾火灸之，以醒為度，或大便閉結，以利氣九通

○欽陽丹 治陰寒痼冷

- 丁香 一兩
- 砂仁 一兩
- 白荳蔻 一兩
- 紅豆 二兩
- 人參 五錢
- 厚桂 一兩
- 大附子 二兩
- 乾薑 一兩
- 良薑 二兩
- 均薑 二兩

右為末好酒煮米糊為丸如梧桐子大每服五
七十丸空心溫酒送下

○黑豆酒 治症同前

○黑豆不拘多少鍋內炒熟以好酒淬之就以碗
蓋勿令泄氣候溫飲酒大效

○回春散

楊小川傳

治陰冷如神歌曰

一錢白礬八分丹二分胡椒細細研焰硝一分
共四味醞醋調和手內攤男左女右合陰處渾
身是汗溼衣衫此方用者如神效不義之人不
可傳

○助陽散

秘方

治極冷急症

芥菜子

七錢 乾薑 三錢

右為末水調作一餅貼臍上以絹帛縛住上置
鹽以熨斗熨之數次汗出為度又將病人小便
攀陰莖往上盡頭處用艾炷灸十壯神效

○回陽丹

秘方

乾薑 一兩 牡蠣 一兩

右為細末以火酒調稠搽手上男子用雙手搽
外腎即愈女子以男子手搽藥急按兩乳仍搽
擦熱汗出則愈

○固陽膏

秘方

治因女色致成陰症

生白礬

三錢

黃丹

二錢

乾薑

五錢

母丁香

十箇

胡椒

十五粒

右為末用醋和得所以男左女右手握藥搭臍

○同上被蓋少頃汗出即愈

虛勞

脉

虛勞之脉或浮大或弦數大者勞也弦者亦勞太
弦易治血氣未衰可斂而正也弦者難治血氣已
耗而難補雙弦則賊邪侵脾加數則殆矣又曰骨
蒸勞熱脉數而虛熱而瀆少必殞其軀加汗加嗽

非藥可除

證

夫勞之為言言劇也故以勞瘵為難治之疾古方
雖分六極六損五勞七傷五戶九蟲十疰二十四
蒸之症種種不同大抵皆由年少之時嗜慾無節
起居不時或七情六淫之所傷或飲食勞倦之有
過漸至直陰衰虛相火熾焰火旺則銷燬真陰而
發蒸蒸之燥熱也蓋火衝於上焦者發熱之中則
兼咳嗽喘急吐痰吐血肺痿肺癰等症其火結於
下焦者發熱之中則兼淋濁結燥遺精盜汗驚悸
腹痛等症也婦人則兼月水不通之類及其火熾

既久氣必傷矣傷則不能運化水穀水穀停留而
 溼熱生蟲生積之由也蟲積日深變異莫測嚙人
 心肺蝕入臟腑精華殆莫能採矣况其親炙之人
 薰陶日久受其惡氣多遭傳染是曰傳屍即前所
 謂九蟲十疰二十四蒸之類是也得病日淺猶當
 施治姑息日久或至發熱不休形體尪羸真氣將
 脫事不及矣

治 治之之法惟滋陰降火是澄其源也消痰和血取
 積追蟲是潔其流也及灸膏肓催氏四花穴無有
 不效近世以來多以紫河車加補腎清心退熱之

藥治之獲效者亦多矣醫者可不以補虛為主而
 兼去邪矣乎

凡陰虛證每日午後惡寒發熱至晚亦得微汗而解
 脉必虛濡而數絕類瘧疾但瘧脉弦而虛脉大為
 辨耳若誤作瘧疾治之多致不救

方 滋陰降火湯 王節齋曰男子色欲過度損傷精
 血必致陰虛火動之病睡中盜汗午後發熱哈
 哈咳嗽怠倦無力飲食少思甚則痰涎帶血咯
 血唾血或咳吐衄血身熱脉沉數肌肉消瘦此
 為勞瘵最重難治輕則用藥數十劑重者期以

歲年然必須病人愛命堅心定志絕房室息妄
想戒惱怒節飲食以自培其根不則雖服良藥
亦無用也此病治之於蚤猶為不易若到肌肉
消盡沉困着牀六脉躁疾則更難為矣此方治
色慾症先見潮熱盜汗咳嗽倦怠稱蚤服之愈
可必也

當歸身 酒洗一錢二分
生地黃 酒洗五分
天門冬 湯泡去心一錢
陳皮 七分
白木 一錢三分
川芎 一錢
白芍藥 酒炒一錢
熟地黃 薑汁炒一錢
黃蘗 蜜炙七分
知母 蜜炙一錢
甘草 炙五分

一方去乾薑加玄參貝母麥門冬五味子甚效
右到一劑生薑煎加竹瀝童便薑汁同服○若
咳嗽甚加紫苑款冬花五味子杏仁○喘加桑
白皮○若痰多加製半夏貝母瓜蒌仁白茯苓
○若潮熱甚加柴胡知母地骨皮○若盜汗多
加酸棗仁牡蠣浮小麥○若遺精夢滑加龍骨
牡蠣山茱萸肉○若赤白濁加白茯苓黃連○
若兼衄血咳血出於肺也加桑白皮黃芩山梔
子○若兼嗽血痰血出於脾也加桑白皮貝母
黃連瓜蒌仁○若兼嘔吐血出於胃也加山梔

子黃連乾薑蒲黃韭汁薑汁○若兼咯唾血出於腎也加桔梗玄參側柏葉此症屬火大便多燥然當愈加樽節愛養勿令泄瀉若脾胃一壞則前項寒涼之藥難用矣倘遇如斯急服理脾固本健胃之劑

理脾固本湯

白朮炒一錢 白茯苓一錢 陳皮八分 半夏製八分
 神麴炒一錢 麥芽炒一錢 甘草炙七分
 右剉一劑薑棗煎服候脾胃氣固然後用前本病藥

抄此方治
 勞瘵陰虛
 火動者

清離滋坎湯

雲林製

治陰血虛相火旺盜汗潮熱咳嗽吐痰一切虛勞等症並加治之

生地黃二錢 熟地黃二錢 天門冬一錢 麥門冬一錢
 當歸酒洗一錢 白芍酒炒一錢 山茱萸酒蒸去核一錢五分
 乾山藥一錢 白茯苓八分 白朮土炒一錢 牡丹皮一錢
 澤瀉八分 黃蘗蜜炒八分 知母蜜炒八分 甘草炙七分
 右剉一劑木煎服○嗽盛加紫苑款冬花○痰盛加貝母瓜蒌仁○熱盛加地骨皮○心忤怔忡加遠志酸棗仁○吐血加山梔子茅花○鼻衄加桑皮韭汁

○東實西虛瀉南補北湯

治酒色過度妄泄真陰

陰虛火動火旺痰多發熱咳嗽咯血唾血等症

黃連

淡薑汁炒四兩瀉南方火寬

黃蘗

鹽水炒六兩補北方水除

枯苓 生用二兩清肺

知母

去毛三兩降止方右尺

貝母

去心四兩用瓜蒌仁煮汁浸

桔梗

二兩引諸藥至西方肺金

五味子

鹽水炒三兩滋

紫苑

去土二兩半用沉香

當歸

童便浸二兩補

赤芍藥 生用二兩

半平東方有餘之木

生地黃 酒洗三兩

安中央不足之土

天門冬

湯泡去心四兩

涼血生血清

天花粉

二兩止渴生津

白朮

麩炒一兩半益脾土以生肺金

白茯苓

二兩瀉諸經火

右剉每服八錢烏梅一箇燈心三分水煎温服

○吐衄盛加茜根大小薊藕節白茅根側柏葉

京墨○痰盛加半夏前胡竹瀝荆瀝○喘急加

瓜蒌仁石膏葶藶桑白皮紫蘇子沉香枇杷葉

○熱甚加柴胡地骨皮連翹銀柴胡○風盛加

防風荆芥穗酸棗仁薄荷甘菊花旋復花○寒

按此方治
勞瘵陰虛
兼有實熱

古今圖書集成
醫部全錄
卷之七

盛加人參黃芪桂枝○心下怔忡驚悸加茯苓
遠志栝子仁酸棗仁○脇下氣膨加枳殼青皮
白芥子○淋濁加猪苓澤瀉木通車前子○小
便澀加木通石韋滑石海金沙○遺精加牡蠣
蓮子肉○盜汗加黃芪牡蠣麻黃根浮小麥○
熱燥加滑石石膏火麻仁山梔子

○三和湯

雲林製

治咳嗽痰盛潮熱陰虛

當歸 一錢五分
川芎 五分
白芍藥 一錢
熟地黄 二錢
陳皮 八分
製半夏 八分
茯苓 一錢
黃連 一錢
黃連 薑汁炒
枯苓 八分
黃蘗 炒八分
山梔 炒八分
枳殼 八分

桔梗 杏仁去皮尖 桑白皮 五味子

知母去毛 貝母去心 玄參 白朮土炒

阿膠蛤粉炒或麩炒成珠子 馬兜鈴 甘草各等分

○右剉一劑生薑三片水二碗煎八分空心服

○清肺滋陰散杜次泉傳治酒色太過斲喪真陰陰火上

升肺金受侮以致唾痰稠濁咳嗽咽癢

川芎 酒洗 一錢
白芍 炒 一錢
生地黃 二錢
白朮 炒 一錢
陳皮 一錢
白茯苓 八分
黃蘗 蜜炒 一錢
知母 一錢
貝母去心 紫苑 八分
五味子 六分
款冬花 八分
麥門冬 一錢
地骨皮 一錢
黃連 炒 五分
遠志 甘草湯泡 八分

古今圖書集成

卷之七

二

酸棗仁 炒六分

甘草 四分

右剉一劑加生薑一片竹瀝三匙煎服○心下
怔忡夜臥不寐加人參八分○心煩躁亂加枳
實六分竹茹六分○如痰涎壅盛加瓜蒌仁六
分天花粉一錢○如咽喉有瘡用通噎散吹之

通噎散方
見咽喉門

坎離膏

黃賓江傳

治勞瘵陰虛發熱咳吐咯血等症

川黃蘗 四兩

知母 去毛四兩

生地黄 二兩

熟地黄 二兩

天冬 去心二兩

麥冬 去心二兩

杏仁 去皮七錢

胡桃肉 去皮四兩

白蜜 四兩

右先將黃蘗知母用童便三碗水三碗共六碗

側柏葉一把煎至三碗去渣入天麥冬生熟地

於汁內再添水二碗煎數百沸濾汁置一邊將

天麥冬生熟地查搗爛如泥再用水二碗另煎

約耗其半和入前汁再將杏仁胡桃仁用水搗

爛濾過汁再搗再濾勿溷入查同蜜入前汁內

慢火熬成膏子入水內去火毒每服三五匙側

柏葉煎湯空心調服忌犯銅鐵器

寧嗽膏

京師傳

治陰虛咳嗽火動咯血服之斂肺

天冬 去心半斤

杏仁 去皮四兩

貝母 去心四兩

百部 四兩

百合四兩 款冬花五兩 紫苑三兩 白朮四兩

右剉用長流水二十碗煎五碗濾渣再煎如是

者三次共得藥汁十五碗入飴糖半斤蜜一斤

再熬又入阿膠四兩白茯苓細末四兩和勻如

膏每服三五匙

○玄霜雪梨膏秘方生津止渴除咯血吐血及治勞

心動火勞嗽久不愈消痰止咳清血歸經

雪梨六十箇去皮取汁 藕汁十鍾

新鮮生地黃搗取汁 麥門冬搗爛煎

蘿蔔汁五鍾 茅根汁十鍾

右六汁再重濾去渣將清汁再入火煎煉入蜜

一斤飴糖半斤柿霜半斤薑汁一盞入火再熬

如稀糊則成膏矣○如血不止咳嗽加側柏葉

搗汁一鍾韭白汁半鍾茜根汁半鍾俱去渣入

前汁內煎成膏服之

○清火永真膏京師傳

生地黃四斤 天門冬六兩 款冬花六兩

右以天冬款冬水熬取渣搗爛再熬然後入地

黃汁煎煉成稠入白蜜一斤再煎再用五味子

一兩另熬汁半鍾入膏內再煎至稠粘為度海

按此方理
勞嗽治標
之劑

日用一二次

○噲化丹 秘方 治陰虛勞嗽

天門冬	一兩	蒸五焙	麥門冬	一兩	蒸五焙
生地	五錢	熟地	五錢	知母	一兩
杏仁	一兩	紫苑	一兩	款冬花	二兩
阿膠	八錢	蛤粉		當歸	一兩
枳實	一兩	桔梗	一兩	半夏	一兩
黃芩	一兩	米仁	七錢	花粉	一兩
薄荷	二兩	水		青礞石	八錢

右為極細末煉蜜丸如彈子大夜臥口噲化下

○抑心清肺丸 秘方 治肺熱咯血咳嗽兼治血痢

黃連 三兩 赤茯苓 三兩 阿膠 二兩

右以上二味為極細末水熬阿膠和丸如梧桐子大每服五六十丸食後米飲送下蓋連苓有降心火之功阿膠具保肺金之力則嗽除血止而病自愈矣

○小金丹 方外異 治勞瘵吐痰吐血發熱咳嗽

啞芙蓉 錢一 硃砂 三分 麝香 三分

右為細末外用高良薑四兩切碎燒酒泡三日去酒入水十碗煎至一二三碗濾去渣慢火熬成

膏再入乳汁半盞再熬入前藥為丸如黃豆大
金箔為衣每服一九先喫梨一片然後以藥丸
嚼下再喫梨一片痰嗽頓止發熱即退

神灸法 治傳屍勞蟲

於癸亥日灸兩腰眼低陷中是穴每穴灸艾七
炷若灸九炷十炷尤妙先隔一日前點穴方睡
至半夜子時一交癸亥日期便灸其蟲從大便
中出即用火焚之棄於江河中如蟲有黑嘴者
則其在內已傷入腎臟矣此不可治蟲宜謹避
瘵有數蟲如蜈蚣如小蛇如蝦蟇如馬尾如爛

麩如亂絲如蒼蠅如壁油蟲上紫下白形銳足
細而有口或如白蟻孔竅中皆出此勞瘵根毒
若傳至三人則如人形如鬼狀

○予觀近世陰虛火動之疾十無一活何也蓋由
色慾勞役之過七情五味之偏遂至真元漸耗
虛火上炎勞瘵之疾作矣方履霜之始飲食如
舊起居如常惟咳嗽一二聲自謂無恙且諱疾
忌醫滅身無悟及蔓延日久倒臥于牀而堅冰
已至矣良可哀哉若遇明醫必用滋陰降火健
脾之藥以培其本緩緩投以數十劑庶可少濟

如求治心亟效期旦夕服藥未幾數劑遂謂無功躁急心熱而陰火愈動有等醫者見其無回生之埋遽用峻藥劫之以紓目前之急則將不俟終日而死期將至矣以余意揆之方疾之始作必致謹於三事而後可三者維何一要遇明醫二要肯服藥三要能禁戒三者缺一不治也余敬書於方末以為邁是疾者警云

失血

脉諸證失血皆見芤脉隨其上下以驗所出大凡失血脉宜沉細設見浮大後必難治

證夫失血之證非止一端有吐血有咳血有唾血有咯血有衄血有溺血雖有名色之異大槩俱是熱證但有新舊虛實之不向耳或妄言寒者誤也丹溪曰血從上竅出皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經吐血者吐出全血是也因血溢妄行流入胃脘令人吐血有因飲食過飽負重傷胃而吐血者有因思慮傷心及積熱而吐血者有傷心肺而吐血者有因思傷脾而吐血者有因肺生癰疽而吐血者有從高墜下傷損內臟而吐血者有傷寒不解邪熱

在經隨氣上湧而吐血者

吐血者或因四氣傷於外七情動於內或飲食房勞
墜閃傷損致榮血流聚膈間滿則吐溢世謂妄行
或吐瘀血此名內傷

治有先吐血後見痰嗽者是陰虛火動痰不下降四
物湯為主加清痰降火藥○有先見痰嗽後吐血
者是積熱降痰火為急○有暴吐紫血成塊者是
熱傷血結于中吐出為好用四物湯加清熱藥調
之○吐血亦有因怒而得者經曰怒則氣逆甚則
嘔血怒則暴甚故也○吐血不止用乾薑炮為末

童便調服此從治之法也

一咳血者嗽出痰內有血者是也因熱壅於肺而成
久嗽損肺亦能嗽血壅於肺者易治不過涼之而
已損於肺者難治以其不足也熱嗽有血者宜金
沸草加阿膠勞嗽有血者補肺湯加阿膠白芨嗽
血損肺宜薏苡仁炒為末蘸熟猪肺食之如熱嗽
咽痛痰帶血絲或痰中多血而色鮮者宜服金
沸草散如服涼劑不愈此非熱症宜杏子湯主之
一唾血者鮮血隨唾而出者是也此出於腎亦有瘀
血內損肺氣壅遏不得下降用天麥冬知貝母桔

梗黃蘗熟地黄遠志或加乾薑天寒冬飲貝母
一咯血者不嗽而咯出血疙痞者是也用薑汁童便
青黛入血藥中用之或加入四物湯地黄膏牛膝
膏之類

一衄血者鼻中出血也此出於肺以犀角升麻梔子
黃芩芍藥生地黃紫參丹參之類治之

一溺血者小便中出血也乃膀胱所致用炒黑山梔
木煎服之或用小蘗琥珀小蘗治下焦結熱血淋

○溺血因血虛者四物加牛膝膏
一血者大便出血也乃臟腑蘊積溼熱之毒而成

或因氣鬱酒色過度及多食炙煇熱毒之物或風
邪所冒或七情六淫所傷使氣血逆亂榮衛失度
皆能令人下血

予嘗治諸虛吐衄咯血藥中每入童便一合其效甚
速凡單用重湯頓服無不效應蓋溲瀉降火滋陰
又能消瘀血止吐衄諸血先賢有言凡諸失血服
寒涼十無一生服溲瀉百無一死斯言信矣每用
童便一鍾少入薑汁二三點攪勻徐徐服之日進
一二次如天寒却以重湯頓溫服服此但以進飲
食相遠為佳

按此方治諸失血之總司也

方全生飲

製雲林

止吐血衄血嗽血咯血唾血

藕汁

磨墨

梨汁

茅根汁

葦汁

生地黄汁

各一兩

刺刺菜汁

蘿蔔汁

白蜜

竹瀝

生薑汁

童便

各半盞

右合一處頻頻冷服此方乃治諸失血之總司

犀角地黄湯

治上焦有熱口舌生瘡發熱或血

熱妄行或下血及不嗽血自來者宜服之

犀角

鎊一錢半

生地黄

二錢

赤芍藥一錢

牡丹皮

一錢

加黃芩

一錢

黃連一錢

右剉一劑水二鍾煎一鍾溫服○肝經血加條

芩○心經血加黃連麥門冬○脾經唾血加白

芍藥百合○肺經衄血加天門冬山梔百部○

腎經血加玄參黃蘗知母○三焦瀉血加連翹

地骨皮○膽經血加柴胡淡竹葉○胃經吐血

加大黃乾葛○心胞血倍牡丹皮加茅根○木

腸便血加炒山梔炒槐花○小腸瀉血加炒梔

子木通牛膝茅根○積熱加大黃芒硝○吐血

不止加大黃桃仁

○止血立應散 湖方治吐衄不止如神

按此方涼
血止血之
劑

按此方止
瘀血生新
血之劑

北地大黃

酒浸五錢

青黛

一錢

槐花

炒一錢

血餘

五錢

煨

右為末每服三錢用梔子丹皮各二錢煎湯調食後服○有熱湯內加地骨皮三錢

○清熱解毒湯

治吐血衄血

升麻

二兩

乾葛

五錢

赤芍藥

五錢

生地黃

一兩

大

牡丹皮

五錢

黃連

五錢

黃蘗

八錢

黃芩

五錢

大

桔梗

五錢

梔子

五錢

甘草

五錢

連翹

五錢

大

右剉每劑一兩水二鍾煎一鍾溫服

○清熱滋陰湯

治吐血衄血便血溺血

當歸

酒洗七分

川芎

酒洗七分

生地

酒洗二錢

黃蘗

酒炒三分

大

知母

酒炒五分

陳皮

酒洗三分

白朮

炒五分

麥門冬

一分

一錢

○服關牡丹皮

一錢

赤芍藥

七分

玄參

一錢

山梔

炒黑一錢

半

甘草

五分

右剉一劑水煎溫服○身熱加地骨皮一錢柴

胡五分子芩一錢○吐衄血加炒乾薑七分栝

葉茜根大小薊各一錢○大便血加炒槐花地

榆百草霜各一錢○溺血加炒黑山梔子車前

子小薊黃連各八分○四病血俱用阿膠珠五

分薑汁韭汁童便同服

○止鼻衄方

劉尚書傳

百艸霜

髮灰二物清煙墨一錠童便

葑汁無灰老酒各一錢

右下三味合一處用墨濃磨調上二物服水正

○陳槐湯劉尚書傳

治吐血衄血不止

當歸頭尾川芎二錢赤芍藥二錢黃芩二錢

槐花三錢陳皮二錢側柏葉蜜炒細茶三錢

烏藥二錢山梔子七箇藕節三分

右用水二鍾煎一鍾不拘時熱服

○通關止血丸秘方

治鼻衄 枯白礬一錢沉香三分半夏四箇糯米十四粒

麝香一分

右為末麩糊為丸如豌豆大每用二丸塞左右

兩耳即服陳槐湯

○治鼻衄良方

用大蚯蚓十數條搗爛并花水和稀患輕澄清

飲重則并查汗調服立愈

○扎指法治鼻衄不止

用線繫扎中指中節如左鼻孔出血扎右手指右鼻孔出血扎左手指兩孔俱出左右俱扎之

○鼻衄不止用水紙搭在鼻衝上隨用秘方

○真四 梔子 炒黑 百艸霜 龍骨 火煨 牡蠣 火煨

右為末用茅花水蘸濕蘸藥入鼻孔如無茅花將紙撚水濕蘸藥入鼻中真良法也

自汗 盜汗

○脉 汗脉浮虛或澀或濡軟大洪散渴飲無餘○脉大而虛浮而軟者汗在寸為自汗在尺為盜汗傷寒脉陰陽俱緊當無汗若自汗者曰亡陽不治

證 夫汗者心之液也心動則惕然而汗出也有自汗者有盜汗者自汗者不因發散而自然出也盜汗者

者睡而汗出及覺則不出矣自汗之症未有不由心腎俱虛而得者故陰虛陽必湊發熱而盜汗陽虛陰必乘發厥而自汗此陰陽偏勝之所致也丹溪曰自汗屬氣虛屬痰與溼盜汗屬陰虛相火熾盛其傷寒傷暑傷風傷溼痰嗽等自汗各載本門其無病而汗常自出與病後多汗皆屬表虛衛氣不固榮血泄漏宜黃芪建中湯加浮麥煎黃芪六一湯或玉屏風散或身溫而常出冷汗或身冷而汗亦冷別無他病并屬本症凡汗出髮潤一不治也汗出如油二不治也汗凝如珠三不治也

治 治內傷及一切虛損之症自汗不休總用補中益氣湯少加附子麻黃根小麥其效捷如影響但升麻柴胡俱用蜜水拌炒以殺其升發湧汗之性又欲其引參芪等藥至肌表故不可缺也○如左寸脉浮洪而自汗者心火炎也本方倍參芪加麥門冬五味子黃連各五分○如左關脉浮弦而自汗者挾風邪也本方加桂枝芍藥若無陰虛只用桂枝湯可也○左尺脉浮洪無力而自汗者水虧火盛也本方加黃蘗知母各五分熟地黃一錢壯水之劑以制陽光○如右寸脉浮洪或伏而滑此挾

痰也依本方加知母貝母天花粉各八分○如右關脉浮洪無力而自汗者此脾元怯弱也只依本方倍參芪○右尺脉洪數無力而自汗者或盜汗相火挾心火之勢而凌伐肺金也宜當歸六黃湯

方 王屏風散 治自汗腠理不密易感風寒

防風 一兩 黃芪 一兩 白朮 二兩

○黃芪一方加浮小麥茯苓牡蠣麻黃根甘草

右剉一劑生薑一片水二鍾煎一鍾空心溫服

○黃芪湯 治元氣虛弱自汗

黃芪 二錢 當歸 一錢 生地 一錢 天門冬 一錢

按此方治
自汗之劑

麥門冬一錢 五味子七分 防風五分 白茯苓一錢

○黃芪麻黃根一錢 甘草八分 浮小麥一撮

右剉一劑水煎溫服

○黃芪建中湯 治內虛挾外感自汗又補諸虛不

足羸之少力大益榮衛

玉桂二錢 肉桂二錢 白芍藥三錢 甘草三錢

○鎮液丹 思恒兄傳 治盜汗之聖藥也

防風一兩 黃芪二兩 白朮一兩 中桂一兩

芍藥一兩 大附子二兩 麩裏煨去 皮臍童便浸炒

右為末酒糊為丸每服五十九空心溫酒下

○當歸六黃湯 治盜汗之聖藥也

當歸一錢 黃芪一錢 生地黃一錢 熟地黃一錢

黃蘗炒七分 黃連炒七分 黃芩炒七分

右剉一劑水煎臨臥服

○黃芪六一湯 治虛人盜汗

黃芪六兩 甘草一兩 各用蜜炙十數次出火毒

右剉每劑一兩水煎空心服

○獨勝散 治自汗盜汗

用五倍子為末津唾調填滿臍中以絹帛縛定

按此方治
盜汗之劑

盜汗之劑

盜汗之劑

盜汗之劑

按此方治
自汗盜汗
兼治之劑

古今圖書集成

卷七

三

三

三

○白龍湯 治六脉孔動微緊男子失精女子夢交
及自汗盜汗等症

桂枝 三錢 白芍藥 三錢 甘草 三錢 龍骨 煨 三錢

黃芩 牡蠣 三錢

右剉一劑水煎溫服加棗子一箇同煎尤好

一人血氣大虛形體羸瘦太汗如雨不止命在

須臾諸醫弗效以十全大補湯倍用參芪以童

當便製附子一劑即效服不數劑全安

眩暈

脉

風寒暑溼氣鬱生涎上實下虛皆暈而眩風浮寒

緊溼細暑虛涎弦而滑虛脉則無治眩暈法尤當

審諦先理痰氣次隨症治又曰左手脉數熱多脉

澀有死血右手脉實有痰積脉大是久病

證

夫眩者言其黑暈者言其轉其狀目閉眼暗身轉

耳聾如立舟車之上起則欲倒皆屬于肝風邪上

攻所致然體虛之人外感六淫內傷七情皆能眩

暈當以脉症別之風則脉浮有汗項強不仁寒則

脉緊無汗筋攣掣痛暑則脉虛煩悶濕則脉沉細

重吐逆及其七情所感遂使臟氣不和鬱而生涎

古今圖書集成

卷七

三

三

三

一結而為飲隨氣上逆令人眩暈脊稜骨痛眼不可
開寸脉多沉此為異耳若疲勞過度下虛上實金
鎗吐衄及婦人崩傷產後去血過多皆令人眩暈
當隨其所因而治之
眩暈之症人皆稱為上盛下虛所致而不明言其所
以然之故蓋所謂虛者血與氣也所謂實者痰涎
風火也原病之由有氣虛者乃清氣不能上升或
汗多亡陽而致當升陽補氣有血虛者乃因亡血
過多陽無所附而然當益陰補血此皆不足之症
也有因痰涎鬱遏者宜開痰導鬱重則吐下有因

風火所動者宜清上降火若因外感而得者前論
須分四氣之異皆當散邪為主此皆有餘之症也
世有所謂氣不歸元而為丹藥鎮墜沉香降氣之
法蓋香竄之氣丹藥助火其不歸元之氣豈能因
此而復即內經所謂治病必先求其本氣之不歸求
其本用藥則善矣

治丹溪曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此症
屬痰者多蓋無痰不能作眩也雖有因風者亦必
有痰又曰火動其痰一陳湯加黃芩蒼朮羌活挾
氣虛者亦以治痰為主兼補氣降火藥

一人因憂思勞苦發作眩暈眼暗耳鳴面赤口乾發熱氣喘有汗不食六脉洪數用十全大補湯去桂加生地黃薑炒黃連麥門冬五味子陳皮酒炒黃藥知母

方清暈化痰湯雲林製
橘紅一錢五分半夏製一錢半白茯苓一錢甘草三分
川芎八分白芷七分羌活七分枳實一錢
南星製六分防風六分細辛六分黃芩酒炒八分
氣虛加人參七分白朮一錢有熱加黃連五分
血虛倍川芎加當歸一錢五分

按此方治痰火眩暈之劑

右剉一劑生薑三片水煎以此作丸亦可

○黑將軍散秘方治因痰火太盛眩暈難當

用大黃酒炒為末清茶調下○或用大黃酒浸

丸蒸九曬為末水丸如菜豆大每服百丸食後

臨臥清茶送下神效

○僊術通神散治風熱上壅頭旋目眩起則欲倒

卽防風通聖去麻黃芒硝加藿香砂仁甘菊花

蒼朮○如風熱上攻頭目昏眩悶痛痰喘咳嗽

依本方去麻黃芒硝加甘菊花人參砂仁寒水

石

方今醫鑑 卷十一 三十一

按此方治
氣虛痰厥
眩暈之劑

按此方治
血虛眩暈
之劑

古今醫鑑

卷十一

三

○半夏白朮天麻湯 治頭旋眼黑惡心煩悶氣促

上喘心神顛倒目不敢開頭痛如裂身重如山

四肢厥冷不能安睡此乃胃氣虛損停痰所致

方見頭
痛門

○芎歸湯 治血虛眩暈或去血過多之後眩暈

川芎 二錢 當歸 二錢
五分 五分

右剉一劑水二盞煎至八分空心溫服

麻木

脈浮而濡屬氣虛關前得之麻在上關後得之麻

在下也○脈浮而緩屬濕為麻痺脈緊而浮屬寒

為痛痺脈澀而芤屬死血為木不知痛痒

證 丹溪曰麻是氣虛木是溼痰死血

治 十指麻是胃中有濕痰死血宜一陳湯加蒼朮白

朮陳皮茯苓桃仁紅花少加附子行經又宜四物

湯加上藥及羌活蘇木○如手足麻痺因溼所致

者香蘇散蒼朮麻黃桂枝白芷羌活木瓜水煎脈

體虛者用五積散亦好

一如感風溼手膊或痛或木或遍身麻木用五積散

主之

一凡人手足麻木并指尖麻者皆痰滯經絡也宜一
 陳湯加竹瀝薑汁白芥子以祛痰火散風氣更灸
 百會肩顛曲池風市足三里絕骨此六處共十一
 穴以防中風癱瘓但年少者不可多灸
 一麻用補中益氣湯加當歸木香香附青皮川芎少
 加桂枝引經○木用四物湯并二陳湯加桃仁紅
 花二方俱用竹瀝薑汁白芥子以行經至脇肋逆
 痰之所在也竹瀝枳朮丸搜風順氣丸皆可選用
 一麻木者因風溼熱下陷入血分陰中陽道不行亦
 有痰在血分者其症合眼則渾身麻木痒者血不

按此方治
氣虛麻木
之劑

按此方治
氣鬱麻木
之劑

榮于肌腠治以參芪能助陽道以當歸能行陰道
 二木苓甘藥以除濕熱柴升芍藥以升提之痰加
 二陳治當活法

方加減補中益氣湯 治氣虛手足麻木

依本方加木香太附子麥門冬防風羌活烏藥

○人參益氣湯 治手指麻木四肢困倦怠惰嗜臥

黃芪 二錢 人參 二錢 甘草 二錢 白芍藥 七分
 柴胡 六分 甘草 六分 升麻 六分 五味子 三十粒

右剉一劑水煎稍熱服

○開結舒經湯 治七情六鬱氣滯經絡手足麻痺

按此方治
風氣麻木
之劑

紫蘇 八分 陳皮 八分 香附 八分 醋炒 台烏 八分

川芎 八分 蒼朮 八分 米泔浸三日 羌活 八分

南星 八分 半夏 八分 當歸 八分 桂枝 四分

甘草 四分

右剉生薑三片水煎入竹瀝薑汁各半盞服

○清風散 治身體麻木遍身結核非人謂之生飯

南人謂之鼓槌俗謂風疔瘡俱屬熱氣滯

防風 五分 荆芥 三分 羌活 五分 獨活 五分

連翹 五分 當歸 五分 赤芍藥 一錢 生地黃 五分

蒼朮 一錢 陳皮 一錢 半夏 一錢 白茯苓 一錢

烏藥 七分 檳榔 五分 木瓜 六分 牛膝 七分

木香 三分 黃連 五分 玄參 七分 鼠粘子 五分

草薺 二錢 金銀花 六分 升麻 一錢 白蒺藜 八分

防已 五分

右剉一劑薑三片葱白五寸水二盞煎八分服

癲狂

脉癲脉搏大滑者生沉小緊急則不治○熱狂脉實

大生沉小死癲脉虛可治實則死

證夫癲者喜笑不常而顛倒錯亂之謂也狂者狂亂

而無正定也故心熱盛則多喜而為癲也肝熱盛

則多怒而為狂也甚則棄衣而走登高而歌踰垣上屋罵詈不避親疎是蓋得之陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱結于中而為之耳此則癲狂之候也大抵狂為痰火實盛也治當大吐大下癲為心血不足多為求望高遠不遂其志者有之

治治以安神養血兼降痰火

心風者何蓋君火者心因怒發之相火助盛痰動于中挾氣上攻迷其心竅則為癲為狂所怒之事膠固於心輒自言談失其條序謂之心風與風何相干若痰不盛者則有感亦輕

○狂言譫語鄭聲辯

狂者大開目與人語所未嘗見之事為狂也譫語者合自言言日用常行之事為譫語也鄭聲者聲顛無力不相接續造字出於喉中為鄭聲也

陽附陰則狂陰附陽則癲脫陽者見鬼脫陰者目盲又畜血症則重復語之

方防風通聖散 方見中風

治一切癲狂風疾暴發之症

○寧志化痰湯 陳白 治癲狂心虛痰盛之症

按此方治癲狂初起多有實熱風邪宜之

按此方補
虛化痰清
火寧心之
劑

○膽星 一錢 半夏 製一錢 陳皮 一錢 茯苓 一錢

天麻 一錢 人參 一錢 黃連 薑汁炒 一錢

酸棗仁 一錢 石菖蒲 一錢

○清心養血湯 右剉一劑生薑五片水煎服再服清心養血湯

○清心養血湯

人參 一錢 白朮 一錢 茯神 一錢 遠志 一錢 水 泡去骨

棗仁 一錢 當歸 一錢 川芎 一錢 生地黃 一錢

甘草 五分

○黃白丹 秘方 治五癩五癩 右剉一劑加圓眼五箇水二盞煎八分空心服

黃丹 一兩 白礬 一兩

右用磚一塊鑿一窟可容二兩許置丹在下礬

在上用木炭五斤煨令炭盡取為末以不經水

猪心血為丸如棗豆大每服三十丸陳皮湯下

○獨參丸 治狂邪發作無時披頭大叫不避水火

苦參 不拘多少

右為末煉蜜為丸如梧子每十五丸薄荷湯下

○河車丸 治久患心風癩氣血兩虛之症

紫河車 不拘幾箇 焙極乾

右為末煉蜜為丸梧子大每七十九空心酒下

開迷散 治婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋乃築血逆于心胞所致

當歸 一錢 白木 炒一錢 白芍藥 一錢 柴胡 八分

白茯苓 八分 甘草 分 桃仁 五分 蘇木 一錢

紅花 一錢 遠志 錢五分 生地黃 一錢

右剉生薑煎服或用此方煉蜜為丸辰砂為衣一女子年十五因氣惱患語言顛倒欲咬人打物偷藏東西時哭時笑心怕膽小飲食不知饑飽身體發熱以防風通聖散加生地黃牡丹皮二服即安

秦承祖灸鬼法 治一切驚狂謔語為邪鬼惡物所附此因氣血兩虛邪乘虛入如癲如癩之症以病者兩手大拇指用細麻繩扎縛定以大艾炷置于中兩介申及兩指角肉四處着火一處不着即無效灸七壯神驗

五癩

脈虛弦為驚為風癩

證 夫癩者有五等而類五畜以應五臟發則卒然倒仆口眼相引手足搐搦背脊強直口吐涎沫聲類畜叫食頃乃甦原其所由或因七情之氣鬱結或

為六淫之邪所干或因受大驚恐神氣不守或自
劫受驚感觸而成皆是痰迷心竅如癡如愚
治之不須分五俱宜豁痰順氣清火平肝而以黃
連瓜蒌南星半夏之類尋痰分多分少治之
無有不愈有熱者以涼藥清其心有痰必用吐法
吐後用東垣安神丸及平肝之藥青黛柴胡川芎
之類

方清心溫膽湯 雲林製 平肝解鬱清火化痰益心生血

- 陳皮 一錢
- 半夏 一錢製
- 茯苓 一錢
- 枳實 一錢
- 白芍 一錢炒
- 當歸 一錢酒洗
- 香附 一錢炒
- 麥門冬 八分去心
- 川芎 六分
- 人參 六分
- 遠志 六分
- 甘草 四分

按此方治癩攻補兼施之劑

右剉一劑生薑煎服
育魂丹 杜御史方治一切驚癩癲邪等症

- 膽星 六錢
- 半夏 六錢製
- 茯神 六錢
- 黃連 六錢炒
- 遠志 六錢水泡
- 白朮 六錢炒
- 棗仁 六錢炒
- 柏子仁 六錢炒
- 乾山藥 兩
- 竹茹 五錢
- 白附 五錢煨
- 天麻 五錢酒洗
- 陳皮 三錢
- 全蝎 三錢二錢
- 川芎 五錢
- 犀角 五錢鎊
- 枳實 三錢炒
- 辰砂 二錢二錢
- 牛黃 二錢二錢
- 羚羊角 三錢五分
- 白礬 三錢生用
- 麝香 一錢
- 飛金 四錢貼

白礬 三錢 麝香 一錢 飛金 四錢 貼

右為細末竹瀝打甘草膏為丸如芡實大每服空心淡薑湯送下或用薄荷湯調下

○加減壽星湯 吳都堂傳 治癩症

南星四兩 半夏二兩 防風一兩 荆芥七錢

天麻一兩 皂夾一兩 香附一兩 青皮一兩

猪苓一兩 澤瀉一兩 赤茯苓一兩 白茯苓一兩

白朮一兩 細辛七錢 麥門冬一兩

右剉每劑一兩薑水煎服

○清神丹 秘方 治症同前

石菖蒲去毛 辰砂六錢 研細水飛過以半為衣

右為末猪心血打麩糊為丸如桐子大每服七八十九空心白湯送下服前育菟丹除根

○壯膽星硃丹 太醫院傳

硃砂一兩 膽星二兩 石菖蒲二兩 牛黃五錢

麝香五分 猪心七具 用血

右為細末竹瀝猪心血和丸如梧桐子大每服七八十九空心白湯送下

○丑寶丸 太醫院傳 祛風清火順氣豁痰益志除驚

安寃定鬼一切怔忡癩瘵難狀之疾並皆調治

牛黃五錢 琥珀錢 辰砂一錢 雄黃一錢

按此方治癩專攻之

今醫錄


膽星 一兩 礞石 五錢 沉香 一錢 犀角 一錢

黃芩 二兩 大黃 二兩 天麻 五錢 石菖蒲 一兩

殭蠶 七錢 蟬蛻 五錢 猪心 二具

右為末竹瀝猪心血和丸如棗豆大每服六七

十九臨臥薄苛湯下



王宇泰先生訂補古今醫鑑卷之七

