


外科精義序

掌間名臣奏疏對策。每及治之。必取箸于醫腎。云保身者。肉而元神。宜固。外而癥瘕。宜防。相因。



理也。未有元神虛而癥
濟^う者。未有^下癥濟
得^テ者。而元神不^{エラ}斷者。
此^ル是善^{ハシル}也。予^モ又^シ
治^ヒ之^{ハシル}。喻^{ハシル}醫^夫。內治修^テ而
外治^{ハシル}。則^{ハシル}夷齊^滑。方
干^ス之^{ハシル}。內治修^テ而外治^甫。
昌^ク軒^ク棣^ク克^ク。豈^{ハシル}尤^{ハシル}而奏^{ハシル}乘^{ハシル}
崇^{ハシル}虞^{ハシル}舜^{ハシル}征^{ハシル}。有^{ハシル}苗^{ハシル}而臻^{ハシル}恭^{ハシル}
已^{ハシル}。是^{ハシル}堅^有。有^{ハシル}內^{ハシル}外^{ハシル}科^{ハシル}而然^{ハシル}。

卷一
理^{タチ}也。未^{ハシル}有^{ハシル}元神虛而癥
濟^う者。未^{ハシル}有^{ハシル}癥濟
得^テ者。而元神不^{エラ}斷者。
此^ル是善^{ハシル}也。予^モ又^シ
治^ヒ之^{ハシル}。喻^{ハシル}醫^夫。內治修^テ而
外治^{ハシル}。則^{ハシル}夷齊^滑。方
干^ス之^{ハシル}。內治修^テ而外治^甫。
昌^ク軒^ク棣^ク克^ク。豈^{ハシル}尤^{ハシル}而奏^{ハシル}乘^{ハシル}
崇^{ハシル}虞^{ハシル}舜^{ハシル}征^{ハシル}。有^{ハシル}苗^{ハシル}而臻^{ハシル}恭^{ハシル}
已^{ハシル}。是^{ハシル}堅^有。有^{ハシル}內^{ハシル}外^{ハシル}科^{ハシル}而然^{ハシル}。

首神農掌之。易為作經。
宋開第，世醫學之源。嗣
後名醫代化。推本二聖
人矣。義叢其以赤霞。以
殘來學。至赤御醫齊矣。
遂于醫壘而於外科尤精。
年譜古人醫說之要。予
其平日治法之驗者多。
曰外科精義屬予行正。
因漢之三復而恍有得。

卷三

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.C.G.

首神農掌之。易為作經。
宋開第，世醫學之源。嗣
後名醫代化。推本二聖
人矣。義叢其以赤霞。以
殘來學。至赤御醫齊矣。
遂于醫壘而於外科尤精。
年譜古人醫說之要。予
其平日治法之驗者多。
曰外科精義屬予行正。
因漢之三復而恍有得。

焉。夫醫之為義。實難矣。
脉候雖有決。而杳乎入
微。方書雖有傳。而艱于
對。病。薦集。欽博。亟約汰。
粗。為精。皆古名家。誰著。

辨脉論。一以虛實。為
據。系而用之。具以驗。
種。立。称。察。脈。証。之。虛。實。
實。其。虛。其。實。全。保。義。也。
第。付。醫。少。知。其。義。于。凡。

癰疽疔腫諸危證。惟一
手家虛寒局守才藥而
緊以試之于人鮮。亦為
其口誤。則此病亦可不
傳于世矣。一卷止。蓋上

六二卷其起死回生。

啻。每屬革。秘書修內攘。
外默。寫經母之神功原。
如要終脩。備舉活人之妙。
用醫人治國理同予異。

卷之六
起沉疴于床头而发毒
為之源者豈止是才已
哉。蓋天子肥以民物視
天人之害病疾痛殊疾
瘦瘠。又病瘻乃身皆有
雖髮膚身神苟不以用
多者。且求以濟之。而
奚以屬。將使斯世生躋
毒域。奚一不樂。生被澤

卷之六
起沉疴于床头而发毒
為之源者豈止是才已
哉。蓋天子肥以民物視
天人之害病疾痛殊疾
瘦瘠。又病瘻乃身皆有
雖髮膚身神苟不以用
多者。且求以濟之。而
奚以屬。將使斯世生躋
毒域。奚一不樂。生被澤


者。又曰。有手札瘻。短折之患。諸云。手多良相。昂為良醫。是義。其功詎小補也。至于先予防患。所謂藥蠱。于未病。

圖書館
NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

卷之二

此又齊史醫方三外之
滌義也。循此義以為治
是。則夷氛清。而虜額消。
外攘之績。凡。內修之要
務耶。君之仁民愛物。自

尚子天壤
宣授保全郎
醫局提舉馬雲
醫局提舉馬雲



外科精義目錄

卷之一

論瘡腫診候入式法

論榮衛色脉參應之法

論持手訣消息法

論三部所主臟腑病證

論脈證名狀二十六種所主病證

論三部脉所主證候

論三部脉所主雜病法訣

身地一書卷之二

論診候肺疽肺痿法

論將護忌慎法

卷之二

論瘡疽腫虛實法

辨瘡疽淺深法

辨膿法

辨瘡疽癥腫證候法

辨瘡疽善惡法

砭鎌法

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

貼燙法

溻漬瘡腫法

針烙瘡腫法

灸療瘡腫法

內消法

追蝕瘡疽腫法

托裹法

止痛法

用藥增損法

卷之三

目錄

療瘡腫權變通類法

論五發疽

論癰疽

論附骨疽

論陰瘡

論時毒

論諸瘡

論丁瘡腫

辨丁腫十三種形色禁忌

論瘰癧治法

論痔瘻

卷之三

漏蘆湯

化毒丹

內消丸

五利大黃湯

內消升麻湯

五香連翹湯

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

壯礪大黃湯

和血通氣丸

地黃煎丸

槐角煎丸

皂角煎丸

苦參散

苦參丸

肺風丸

連翹散

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

竹葉黃芪湯

枳殼丸

五香湯

托裏黃芪湯

托裏茯苓湯

托裏當歸湯

托裏散

內托散

內補散

內塞散

香粉散

止痛當歸湯

黃芪茯苓湯

內補防風散

伏梁丸

溫經丸

木香湯腫湯

升麻湯腫湯

湯腫升麻湯

猪蹄湯

甘艸大豆湯

湯腫湯

洗毒湯

浴毒湯

何首烏散

八仙散

消毒湯

熨風散

應痛丸

黃芪丸

梔子仁湯

葛根牛蒡子湯

通氣散

白丁香散

金銀花散

皂蛤散

十香膏

犀角膏

乳香膏

白龍膏

消毒膏

磨風膏

天麻膏

善應膏

靈應膏

翠玉膏

追毒散

廻瘡錠子

射膿丸

替鍼丸

治療癰

并馬老鼠瘡

翠霞散

搜膿散

引膿散

乳香散

釣苓散

截疳散

抵聖散

青金錠子

白龍散

桃紅散

檳榔散

金黃散

生肌散

水澄膏

拔毒散

金露散

消毒散

卷之四

大檳榔散

天麻散

決効散

水銀膏

平肌散

神黃散

博金散

金傷散

完肌散

定血散

碧霞錠子

東垣十書

目錄

漏蘆湯

玉粉散

香礬散

紫金散

通耳丹

菖蒲錠子

寸金錠子

薰痔散

通靈丸

三神丸

玉芝飲子

平和飲子

玄參丸

犀角散

防風散

烏金散

劉守真瘡論

沒藥膏

卷之十一

目錄

力

必效散

易金散

抵聖丸

應效散

白金散

如聖散

天蛾散

必効散

蛤粉散

治小兒丹瘤

治小兒疳口瘡

治破傷風并洗頭風藥

烏龍丸

紫參丸

萬靈丸

治眼

治吹妳

治痔瘡

洗痔

寸金丹

牙疳藥

廻瘡蟾酥錠子

乳香托裏散

四聖旋丁散

萬應膏

治小兒面癰瘡

天丁散

治赤白口瘡

治乾濕疥癬

治湯火燒燙瘡

治破傷風


治破傷

治風狗咬破傷風

論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

目錄

終



國家圖書館

NATIONAL
CENTRAL
LIBRARY

•

•

•

外科精義卷之一

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂

宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿校

○論瘡腫診候入式法

夫醫者人之司命也。脉者醫之大業也。蓋醫家苟不明脉則如冥行索途動致顛覆矣。夫大方脉婦人小兒風科必先診脉後對證處藥獨瘡科之流多有不診其脉候專攻治外或有證候疑難別召方脉診察於瘡科之輩甘當淺陋之名噫其大率小哉。如是原失瘡

腫之生皆由陰陽不和血氣凝滯若不診候何以知陰陽勇怯血氣聚散耶由是觀之則須信療瘡腫于診候之道不可闕也歷觀古今治療瘡腫方書甚多其間診候之法略而未詳比夫諸科甚有滅裂愚雖不才輒取黃帝素問難經靈樞甲乙及叔和仲景扁鵲華陀千金外臺聖惠總錄古今名醫諸家方論之中診候瘡腫之說簡編類次貫成篇帙首載診候入式之法次論血氣色脉參應之源後明脉之名狀所主證候及瘡腫逆從之方庶使爲瘡腫科者覽此則

判然可曉了無凝滯於胸次一朝臨疾診候至此則察逆從決成敗若黑白之易分耳

○論榮衛色脉參應之法

夫天地之道曰陰與陽陰陽在人曰血與氣蓋血者榮也氣者衛也榮者榮於中衛者衛於外所以榮行脈中衛行脈外脉者血氣之先也血非脉則焉能榮於中氣非脉則焉能衛於外二者相資而行內則通於五臟六腑十二經絡外則濡於九竅四肢百節萬毛晝夜循行如環無端以成其度會於寸口變見於

脉故曰氣血者人之神也。脈者氣血之神也。所以治病之始五決爲紀。蓋五決者五臟之色脈也。脈應於內色。應於外。其色之與脈當相參應。故曰能合色脈可以萬全也。凡爲醫先須調明色脈。况爲瘡科。若於此不精。雖聰惠辨博亦不足委也。

○論持手訣消息法

夫診候之脉法。常以平日爲紀。陰氣未散。陽氣未動。飲食未進。氣血未亂。經脈未隆。絡脈調匀。故乃可診。有疾之脉。若遇倉卒。病患不拘。此論內經所謂持脉。

有道以虛靜爲保。但可澄神靜慮。調息凝心。視精明察五色。聽音聲。問所苦。方始按寸尺。別浮沉。以此叅照。決死生之分矣。復觀患者身形。長短肥瘦。老少男女。性情緩急。例各不同。故曰形氣相得者生。三五不調者病。謂如室女。尼冠。脉當濡。而弱嬰兒。孺子之脉。細而疾。三四歲者。呼吸之間。脉當七八至。爲平。比夫常人特不同耳。大抵男子先診左手。女子先診右手。男子左脉大。則順。女子右脉大。則順。大凡診脉。先以中指揣按掌後高骨。骨下爲關。得其關位。然後齊下。

兩左右二指若臂長人疎挑其指若臂短人密挑其指三指停穩先診上指曰寸口浮按消息之中按消息之重按消息之上竟消息之下竟消息之推而外之消息之推而內之消息之然後先關後尺消息之一類此若診得三部之中浮沉滑澁遲疾不調何病所主外觀形色內察脉候參詳處治以忠告之不可輕言談笑亂說是非左右瞻望舉止忽略此醫之庸下也

○論三部所主臟腑病證

夫診候之道醫者之難精也若非燈下苦辛勤於記誦黎師訪友晝夜不遑造次顛沛寤寐俯仰存心於此安能知神聖之妙哉古人曰按其脈知其疾命曰神以悟其探願索隱之妙也又曰切其脉治其病謂之巧以明其指別之功也蓋三指相去毫釐之近主病若干里之遠觀夫指別之功世人固以爲難命曰神豈容易可至哉常考於經脈有三部寸關尺也從魚際至高骨却行一寸曰寸從寸上一分曰魚際從寸至尺曰尺澤寸後尺前爲關關前爲闕即寸口也

關後爲陰，卽尺脉也。陽出陰入，以關爲界。寸主上焦，頭手皮毛。關主中焦，腹及腰。尺主下焦，小腹及足。此三部所主，大略也。又有左右兩手二部爲之六脉也。又有人迎氣口神門所主，又各不同。蓋左手關前曰人迎，右手關前曰氣口。兩關之後，一分卽曰神門。故脈法讚曰：用心出左肺脾，出右腎爲命門，俱出尺部。魂魄穀神皆見。寸口所謂左手關前心之部也。其經手少陰與手太陽爲表裏。小腸合爲府。左手關上，肝之部也。其經足厥陰與足少陽爲表裏。膽合爲府。左手

手關後，腎之部也。其經足少陰與足太陽爲表裏。膀胱合爲府。右手關前，肺之部也。其經手太陰與手陽明爲表裏。大腸合爲府。右手關上，脾之部也。其經足太陰與足陽明爲表裏。胃合爲府。右手關後，命門之部也。其經手厥陰與手少陽爲表裏。三焦合爲府。此謂六部所主。臟腑十二經之義也。又脉要精微論曰：尺內兩旁，則委脇也。尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候膈。右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸。中左外以候心，內以候

竇中前以候前後以候後上竟上者胸喚中事也下竟下者小腹腰股膝脛足中事也粗大者陰不足陽有餘爲熱中也來疾去徐上實下虛爲厥癲疾來徐去疾上虛下實爲惡風也故中風者陽氣受也有脉俱沉細數者少陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者爲拘仆諸浮不躁者皆在陽爲熱其有躁者在乎陽諸細而沉者皆在陰則爲骨痛其有靜者在足數動一代者病在陽之脉也洩及便膿血諸過者切之濇者陽氣有餘也滑者陰氣有餘也陽氣有餘爲身

熟無汗。陰氣有餘爲多汗。身寒。陰陽有餘則無汗。身
寒推而外之。內而不外者。有心腹積也。推而內之外。
而不內者。身有熱也。推而上之。上而不下者。腰足清
也。推而下之。下而不上者。頭項痛也。按之至骨。脈氣
少者。腰瘠痛而身有痺也。已上諸疾。若非指明心了
烏可得而妙也。又平人氣象論曰。一呼脉再動。一下吸
脉亦再動。呼吸定息。脉行五動爲以大息。不大不小。
不長不短。不滑不澀。不浮不沉。不遲不數。命曰平人。
平人者不病也。蓋平人之常氣。稟乎胃。胃氣者。平人

之常氣也。所以人常稟氣於胃，故脉以胃氣爲本也。正理論曰：穀入於胃，脈道乃行。合靈樞經云：胃爲水穀之海也。又曰：脈應四時。曰平，信夫。四時之脉皆以胃氣爲本。謂春弦，夏洪，秋毛，冬石。春之胃脉微弦，曰平，餘皆倣此。過四時則病矣。若診婦人之脉，妊娠則慎勿亂投湯散。其婦人之脉，診得少陰，脉動甚，則有子也。又曰：陰搏陽，則有子也。又曰：身汗而無脉者，卽子也。蓋重身者，問其月事，觀其體貌，然後主治不可忽也。又經曰：察色，按脉，先別陰陽。蓋陰陽者，天地

之道也。是以治病者，必求其本。本於陰陽寒暑四時，五臟之根也。以脉言之，則浮沉也。以部言之，則尺寸也。故經云：脉者，陰陽之法。以應五臟。是謂呼出心與肺，吸入腎與肝。呼吸之間，脾受穀味，其脉在中也。以浮沉論之，則曰浮者陽也。沉者陰也。應在臟腑，則浮牢而長者，肝也。按之而大舉指來實者，腎也。所以肝腎俱沉也。遲緩而長者，脾也。脾爲中州，所以脉在中也。仲景曰：大浮數動滑，皆陽也。沉濁弱弦微，皆陰也。

陽者熱也。陰者寒也。所以寒則脈來沉而遲。熱則脈來浮而數。故曰諸數爲熱。諸遲爲寒。無如此驗也。脉經曰。諸浮爲風。諸緊爲痛。諸伏爲聚。諸弦爲飲。芤者失血。長則氣治。短則氣病。濶則煩心。大則病進。浮爲在表。沉爲在裏。遲爲在臟。數爲在腑。又形壯脉細。少氣不足以息者危。形瘦脉大。胸中氣多者斃。形氣相得者生。三五不調者病。三部九候皆相失者死。此先聖診脉之大法也。故曰凡治病則察其形氣色澤。治之無候其時也。所以形氣相得者生。色澤以浮者病

易已。脉從四時者可治。脉弱似滑者是有胃氣。此皆易治也。若形氣相失。或色夭不澤。及脉逆四時。或脉實益堅。皆不可治。經所謂必察四難。而明告之。又若病熟。脉靜泄。而脉大脫血。脉實汗後脉躁。此皆難治也。若瘡疽之人。膿血大泄。脉滑數者。難治也。凡瘻膿多。或如清泔。脉滑大散。寒熱發渴者。治之無功也。若患肺瘡者。咳嗽膿血。脉見洪滑。治之難痊矣。大凡診脉。見浮數。應當發熱。而反惡寒。雖頭項拘急。四肢煩痛。或復戰慄渴甚者。但有痛處。欲發瘡腫也。

○論脉證名狀二十六種所主病證

夫脉之大體二十六種此診脈之紀綱也細而論之毫釐少差舉治必遠總而言之逆從虛實陰陽而已兩者議之以要其中謹於諸家脈法中擷其機要翦去繁蕪載其精義

○浮脉之診浮於指下按之不足舉之有餘再再尋乏狀如太過浮警警然見於皮毛間其主表證或爲風或爲虛浮而大散者心也浮而短濶弱者肺也浮而數者熱也浮數之脉應發熱其不發熱而反惡

寒者瘡疽之謂也

○洪脉之診似浮而大按舉之則泛泛然滿三部其狀如水之洪流波之湧起其主血實積熱瘡腫論曰脉洪大者瘡疽之病進也如瘡疽結膿未成者宜下之膿潰之後脉見洪大則難治若自利者不可救治也

○滑脉之診實大相兼往來流利如珠按之則累累然滑也其主或爲熱或爲虛此陽脉也瘡疽之病膿未潰者宜內消也膿潰之後宜托裏也所謂始

爲熱而爲虛也

○數脉之診。按之，則呼吸之間，動及六至。其狀似滑而數也。若浮而數，則表熱也。沉而數，則裏熱也。又曰：諸數爲熱。仲景曰：脉數不時見，則生惡瘡也。又曰：肺脉俱數，則生瘡也。診諸瘡，洪數者，裏欲有膿結也。

○散脉之診。似浮而散，按之，則散而欲去。舉之則大，而無力。其主氣實，而血虛。有表無裏，瘡腫，膿潰之後，而煩痛尚未痊退者，診其脉，洪滑粗散，難治也。

以其正氣虛，而邪氣實也。又曰：肢體沉重，肺脉大，則斃。謂浮散者也。

○芤脉之診。似浮而軟，按之中，中央空，兩邊實，其主血虛，或爲失血，瘡腫之病。診得芤脉，膿潰後易治，以其脉病相應也。

○長脉之診。按之，則洪大而長，出於本位。其主陽氣有餘，也。傷寒得之，欲汗出自解也。長而緩者，胃脉也。百病皆愈，謂之長，則氣治也。

○牢脉之診。按之，則實大而弦，且沉且浮，而有牢堅

之意。若瘰癧結腫，診得牢脉者，不可內消也。

○實脉之診。按舉，有力而類結。曰實經。曰邪氣勝。則實久，病則虛。人得此，最忌瘡疽之人得此，宜急下之。以其邪氣與臟腑俱實故也。

○弦脉之診。按之，則緊而弦。其似緊者，爲弦。如按弦而不移。緊如切繩，而轉動。以此爲異。春脉浮弦，而平不時見，則爲飲。爲痛。主寒。主虛。瘡疽論曰：弦洪相搏，外緊內熱。欲察瘡疽也。

○緊脉之診。似弦而緊。按之，如切繩，而轉動。其主切

- 痛積癖也。瘡腫得之，氣血沉濁也。亦主痛也。
○濇脉之診。按之，則散而復來。舉之，則細，而不足。脉濁，則氣濁也。亦主血虛。瘡腫潰後，得之無妨也。
○短脉之診。按舉，則不及本位。內經曰：短，則氣病。以其無胃氣也。諸病脉短，皆難治也。瘡腫脉短，真氣短也。

○細脉之診。按之，則緊。緊如蜘蛛之絲，而欲絕。舉之，如無，而似有。細而微。其主亡陽衰也。瘡腫之病，脈來細而沉，時直者，裏虛而欲變證也。

○微脉之診。按之則軟小而極微。其主虛也。真氣復者生。邪氣勝者危。瘡腫之病潰後脉微而勿舉。自差也。

○遲脈之診。按舉來遲呼吸定息方得三至。其狀似緩而稍遲。痼疾得之則善。新疾得之則正氣虛憊。瘡腫得之潰後自痊。

○緩脉之診。按舉似遲而稱馳於遲。仲景曰陽脉浮大而濇。陰脉浮大而濡。陰陽同等謂之緩脉。見長緩百疾自瘳。凡諸瘡腫潰後其脉濇遲緩者皆易

愈以其脉候相應是有胃氣也。

○沉脈之診。舉之不足。按之方見。如爛綿其主邪氣在臟也。水氣得之則逆。此陰脉也。瘡腫得之邪氣深也。

○伏脈之診。比沉而伏。舉之則無。按之至骨方得與沉相類而邪氣益深矣。

○虛脈之診。按之不足。遲大而軟。輕舉指下豁然而空。經曰脉虛則血虛。血虛生寒。陽氣不足也。瘡腫脉虛宜托裏和氣養血也。

○軟脉之診按之則如帛在水中極軟而沉細亦謂之濡其主胃氣弱瘡腫得之補虛排膿托裏
○弱脉之診似軟而極微來遲而似有仲景曰微弱之脉綿綿如瀉漆之絕其主血氣俱虛形精不足大抵瘡家沉遲濡弱皆宜托裏

○促脉之診按之則去數來時一止而復來仲景曰陽盛則促主熱畜於裏也下之則和瘡腫脉促亦急下之

○結脉之診按之則往來遲緩時一止而復來仲景

曰陰盛則結經曰促結則生代則死
代脈之診按之則往來動則中止不能自還因而復動者曰代脈也代者氣襄也諸病見之不祥大凡瘡腫之病脉促結者難治而況見代脈乎
○動脈之診見於關上無頭尾如豆大厥厥然而動搖者是也脉經曰陰陽相搏故謂之動動於陽則陽氣虛而發厥動於陰則陰氣虛而發熱是陽生於尺而動於寸陰生於寸而動於尺不可不辨也
○論三部脉所主證候

○夫寸關尺者脉之位也。浮沉滑濇者脉之體也。奠位分體指文語證者診脉之要道也。脈經曰。大凡診候兩手三部脉滑而遲不浮不沉不長不短去來齊等者無病也。

○寸口脉浮者傷風也。緊者傷寒也。弦者傷食也。浮而緩者中風也。浮而數者頭痛也。浮而緊者膈上寒脇下冷飲也。沉而緊者心下寒而積痛。沉而弱者虛損也。緩而遲者虛寒也。微弱者血氣俱虛也。弦者頭痛心下有水也。雙弦者兩脇下痛也。偏絶者

者不遂也。俱絕者不治也。濶濶如羹上肥者陽氣微也。連連如蜘蛛絲者陽氣衰也。

○關主中焦胸腹中事。去來徐而緩者無病也。浮者腹滿而不欲食。胃虛脹也。滑者客熱在胃也。數者熱結中焦也。沉伏者中焦水氣或嘔逆而呑酸也。弱者胃氣虛也。雖有虛熱不可大攻。須防熱去。則生寒也。牢而實者腹滿嚮嚮噎塞而不通。或復大痛澀者氣逆也。芤則瀉血滯堅太實。按之不減。而有力者中焦實有結伏在胃也。微浮者積熱不消。

耽動心悸也

尺主下焦腰腎膝脛足中事也。尺脉浮者風熱小便難也。沉者腰背痛而腎氣不足。數者臍下熱痛。小便赤色而惡寒也。遲者下焦寒而陰虛也。緊者臍下小腹急痛也。緩者脚弱下腫而痿痺也。弱者下冷而腎氣衰也。軟者脚不收而風痺。小便難也。伏者小腹痛而疝瘕穀不化也。細者溏泄而下冷也。芤者小便澁血而下虛也。牢而小者足膝寒痺。脚下隱隱疼痛也。細而急者筋攣不能行也。來而

斷絕者男子小腹有滯氣也。婦人月水不利也。
○論三部脉所主雜病法訣

夫三部之中俱見丁脉所主雜病略而言之。脉經曰陽邪來見浮洪。陰邪來見微細。水穀之邪來見實堅。寒癬之邪來見弦小。又曰浮而滑者宿食也。短而滑者酒病也。遲而滑者脹滿也。洪而大者傷寒也。浮而數者傷風也。浮而急者飲食不消。脾不磨也。沉而弦者寒氣結而陰痛也。浮而緩者皮膚不仁也。滑而散者癱瘓也。遲而濇者寒癥也。浮而濇者霍亂也。弱而

濇者，反胃也。緊而滑者，吐逆也。短而數者，心痛也。弦而數者，爲瘧也。緊而急者，尸遁也。實小而堅者，病在內而冷也。浮滑而緊者，病在外而熱也。短而急者，病在上也。長而緩者，病在下也。長而弦者，病在肝也。滑而洪者，病在心也。微而軟者，病在脾也。浮而濇者，病在肺也。沉而緊者，病在腎也。又訣曰：諸浮爲風，或爲虛也。諸緊爲痛，或爲積也。諸濇爲痺，諸弦爲飲，諸數爲熱，諸遲爲寒。芤則爲失血，軟則爲虛。若脉沉沉澤澤，四肢不仁者，亡祟也。或大而慄慄者，社祟也。若脉

來乍大乍小，乍短乍長者，鬼祟也。

○論診候肺疽肺癆法

夫肺者，五臟之華蓋也。處于胸中，主于氣，候于皮毛。勞傷血氣，腠理虛而風邪乘之，內感于肺也。則汗出惡風，咳嗽短氣，鼻塞，項強，胸脅脹滿，久久不瘥已成肺癆也。風中於衛，呼氣不入，熱至於榮，則吸而不出，所以風傷皮毛，熱傷血脉，風熱相搏，氣血稽留，蘊結於肺，變成瘡疽。診其脈候，寸口脉數，而虛者，肺癆也。數，而實者，肺疽也。肺癆之候，久嗽不已，汗出過度，重

亡津液，便如爛瓜。下如豕脂，小便數而不渴。渴者，自愈欲飲者，欲瘥此。由肺多唾，涎沫而無膿者，肺痿也。其肺瘡之候，口乾，喘滿，咽燥而渴甚，則四肢微腫，咳唾膿血，或腥臭濁味。胸中隱隱，微痛者，肺疽也。又聖惠曰：中府隱隱，而微痛者，肺疽也。上肉微起者，肺瘡也。中府者穴也，在雲門下一寸六分，乳肋間動脈應手陷中也。是以候始萌，則可救。膿成則多死。若欲知有膿者，已有膿也。又內經曰：血熱則肉敗，榮衛不行必數者，皆有膿也。未有膿也，緊甚而

將爲膿。大凡肺瘡當咳嗽短氣，胸溝時唾，膿血久久如梗米粥者，難治。若嘔膿而不止者，亦不可治也。其嘔膿而自止者，自愈。其脉短而濶者，自痊。浮大者，難治。其面色當白，而反面赤者，此火之尅金，皆不可治。

○論將護忌慎法

大凡有瘡道生，皆只如黍粟粒許大，其狀至微。人多不以爲急。此蘊大患，宜速辨之。不可自忽。若能防之於未形，理之於未成，或朝覺而夕治，求治於良醫，則必無危困矣。若因循慢忽，詢於庸醫，致令膿血結聚，

委之於命，束手待斃，不以去道遠乎？以致筋骨敗遺，穿通臟腑，死者十有八九矣。可不慎歟！蓋患瘡疽之人，托命庸醫，任意措置，危殆立至。若用良醫，則可保痊愈。用醫之際，不可不擇。辨之何難？若能飽讀經書，久諳證候，湯藥熟閑，洞明色脈，性情仁善，孝義忠信，臨事不惑，處治有決。方爲良醫。委用勿疑。然後要在病人自克。不可恚怒悲憂，叫呼忿恨，驕恣情性，信任口腹，馳騁勞役。惟宜清靜恬澹，耐煩爲宜。於患人左，在止息，煩雜切忌。打觸器物，諸惡音聲爭辨，是非，況

罵鬪，及產婦姪男體氣不潔，帶酒腥羶，鷄犬乳兒，孳畜禽獸並須遠離。設或親友重意問疾者，可以預囑徐行低聲欵曲，伺候禮畢躬退，勿令嗟呀驚怪，詬引其遊賞宴樂，遠別親戚，牽惹情懷，但恐病人心緒淒愴，尤不可亂舉方藥。徒論虛實，惑亂病人，凝滯不決，祗令方便省問，不可久坐多言，勞倦病人，深不長便。夫侍患者，宜須壽近，中年，情性沉厚，勤謹，耐煩，仁慈智惠，全在調以粥藥，無失時節。勿令於患人左右彈指，嗟咨掩淚，竊言感激，病人甚不利便。飲食之


聞忌慎非細不可不載畜中勿食驢馬駝驃猪狗牛
羖羊等并雜魚龜鱉蝦蟇及淹泥臭陳自死病倒之
類慎勿嘗啖飛禽之中忌食鵝鴨鴻鷺雀鶴鶯鷺
鷺鳩鵠鴉鷄雉及能學人言者慎勿食之野獸之中
忌食獐鹿狐兔虎豹熊豺及爪牙害人有毒蟲獸并
父母自本命生屬忌慎勿嘗啖菜蔬之中忌食黃瓜
茄子蘭香芸薹胡荽生菜蓼芥菌瓠韭蒜葱薤慎勿
食之果木之中忌食桃杏棗栗李柰梨梅軟棗紅柿
櫻桃胡桃榛松林檎及諸虫艸未熟之果慎勿食之

若其瘡疽膿潰腫消氣血虛弱則可食羊肉鵪鷄蔓
菁薑醬瓜薺蘿蔔及黃白粳米細米稀粥軟飲若至
肌肉漸生思想滋味則宜食白熟酥餅羹粥羹湯熟
軟溫和稀稠得中製造如法勿令大飽此時猶忌饅
頭蒸餅餽餅餛飩肉角煎餅及炙燂燠煥煎炒鹹酸
油膩脂肥魚肉若至肌膚欲平惡肉去盡瘡口收斂
之際尚忌起立行步揖待賓客房酒宴會喚怒沐浴
登陟臺榭運動肢體寒暑勞倦正宜調節飲食保攝
以待瘡癥平復精神如故氣力完全方無所忌百日

東坡一書
內慎勿觸犯之

外科精義卷之一

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



外科精義卷之二

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂
宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿校

○論瘡疽腫虛實法

夫瘡疽膿潰腫毒浸展。證候危惡者。須辨虛實。況夫虛者難補。實者易瀉。補瀉之法不可輕用。若或少差。利害甚大。然而虛實證多端。不可不辨。有瘡之虛實。有臟腑氣血。上下真邪各有虛實故不同也。分而言之。則腫起堅硬膿稠者。瘡疽之實也。腫下軟慢膿稀。

者，瘡疽之虛也。瀉痢腸鳴，飲食不入，嘔吐無時，手足
並冷，脈弱皮寒，小便自利，或小便時難，大便滑利，聲
音不出，精神不爽者，悉臟腑之虛也。大便硬，小便澀，
飲食如故，腸滿，膨脹，胸膈痞悶，肢節疼痛，口苦咽乾，
煩躁，多渴，身熱，脈大，精神昏塞者，悉臟腑之實也。凡
諸瘡疽，膿水清稀，瘡口不合，聚腫不赤，肌寒肉冷，自
汗，色脫，氣血之虛也。腫起色赤，寒熱疼痛，皮膚壯
熱，膿水稠粘，頭目昏重者，氣血之實也。頭疼鼻塞，目
赤，心驚，咽喉不利，口舌生瘡，煩渴，飲冷，睡語咬牙者，
謂血實，則決之；氣虛，則掣引之。

上實也，精滑不滯，大便自利，腰脚沉重，睡卧而不寧者，下虛也。肩項不復，四肢沉重，目視不正，睛不了了，食不知味，音嘶色敗，四肢浮腫者，真氣之虛也。腫厥尤甚，痛不可近，積日不潰，寒熱往來，大使祕澀，小便如淋，心神煩悶，恍惚不寧者，邪氣之實也。又曰：真氣奪則虛，邪氣勝則實。又曰：諸痛爲實，痒爲虛也。又曰：診其脈，洪大而數者，實也；微細而軟者，虛也。虛則補之，和其氣，托裏也。實則瀉之，疎利而自導其氣，內經謂血實，則決之；氣虛，則掣引之。

○辨瘡腫淺深法

夫瘡候多端，欲辨淺深，直須得法。若不素知方論，而妄生穿鑿者，如大匠捨其繩墨，以意度量，安能中於規矩哉？嘗聞古人有言曰：多則惑，少則得，簡而論之。則瘡疽槩舉有三種：高而軟者，發于血脈，腫下而堅者，發于筋骨，皮肉色不相辨者，發于骨髓。又曰：凡療瘡疽，以手按搖，瘡腫根牢而大者深也，根小而浮者淺也。又驗其人初生瘡之時，便覺壯熱惡寒，拘急頭痛，精神不寧，煩躁飲冷者，其患瘡疽必深也。若人雖

患瘡疽，起居平和，飲食如故，其疾浮淺也。惡瘡初生，其頭如米粟微似有痛痒，誤觸破之，卽熾展，覺有深意，速服犀角湯及漏蘆湯通氣丸等，取通利疎暢，兼用浴毒湯溻漬之類，若浮淺者，紙貼膏求差，以此推之，淺深之辨始終之次者也。

○辨膿法

夫瘡腫之疾，毒氣已結者，不可論。內消之法，卽當辨膿，生熟淺深，不可妄開視其可否，不至干危殆矣。凡瘡疽，腫大按之乃痛者，膿深也；小按之便痛者，膿淺。

也。按之不甚痛者未成膿也。若按之卽復者有膿也。不復者無膿也。非膿必是水也。若發腫都軟而不痛者血瘤也。發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也。氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所爲也。留積經久極陰生陽寒化爲熱以此潰必多成瘻宜早服內塞散以排之諸癰瘤疣贅等至年衰皆自內潰理于年壯可無後憂也。又凡療癰疽以手掩其上大熱者膿成自輒也。若其上薄皮剝起者膿淺也其膿不甚熱者膿未成也。若患瘰疬結核寒熱發渴

經久不消者其人面色痿黃被熱上蒸已成膿也。至於臟腑腸胃內瘡內疽其疾隱而不見目旣不見手不能近所爲至難可以診其脉而辨之亦可知矣。有患胃脘癰者當候胃脉人迎者胃脉也其脉沉細者氣逆則甚甚則熱聚胃口而不行胃脘而爲癰也。若其脉洪數者膿已成也。設脈遲緊雖膿未就已有瘀血也宜急治之不爾則邪毒內攻腐爛腸胃不可救也。又肺癰論曰始萌則可救膿成卽死不可不慎也。久久咳膿如粳米粥者不治。嘔膿而止者自愈也。又

腸癰論曰。或達臍生瘡。膿從瘡出者。有出臍中者。惟大便下膿血者。自愈也。

○辨瘡疽癰腫證候法

夫瘡疽癰腫其名甚多。載之紛紜。方書百緒。及至臨疾治之。無據。不知所以。內經曰。知其要者。一言而終。不知其要者。流散無窮。愚雖不才。姑揣其要而言之。熱發於皮膚之間。是以浮腫根小。至大不過二三十者。癰也。六腑積熱騰出於外。肌肉之間。其發暴甚。腫皮光軟。侵展廣大者。癌也。五臟風積熱攻熾。干肌骨。

風毒猛暴初生。一頭如瘡癟。白焦枯觸之應心者。疽也。夫癰發於六腑。若燎原之火。外潰膚肉。疽生。五臟沉澀難療。若陶室之燧。內消骨髓。癌則易療。惟難將息而遲。瘡疽則難療。易得痊復。夫癰與瘡初生。步宜灸之。謂其氣本浮達。以導其熱。令速暢也。疽則烙不宜灸。謂其氣本深沉。須達其原也。凡瘡疽生於外。皆由熱毒蘊於內。明乎三者。脾毒丹藥可以類推矣。蓋皮膚微高起而肌厚。或痛或痒。移走無常者。謂之腫。有因風而得之者。有因風熱相搏而得之者。腫硬色

白因熱而得之者，腫焮色赤，因風熱相搏而得之者，久久而不消。熱勝於風，若不卽治，血不流通，與氣乘，足以成膿也。又曰：風多則痒，熱多則痛。此爲驗也。又有丹毒者，謂人身忽然變赤，如塗丹之狀，故謂之丹毒。世俗有云：赤瘤或因有瘡誤而相觸，四畔焮赤，謂之瘡瘍。凡丹瘤之疾，皆遊走不定，狀如雲氣者是也。小兒得之，最忌百日之內，謂之胎瘤，以其氣血嫩弱，臟腑柔脆，難任鍊針，所以忌也。又頸腋之間，而生核，初如豆粒，或如梅李核，累累相連，歷歷三五枚，久

久不消，以漸長大，或發寒熱者，謂之癰瘍。有風毒者，得於風熱；毒者，得之於熱氣；毒者，得之於氣，悉由風熱邪氣蘊經所成。證候不同，治之者亦各異矣。

○辨瘡疽善惡法

夫瘡疽證候，善惡逆從，不可不辨。從來醫瘡集，舉五善七惡，殊不知此。特謂腸胃之內，臟腑瘡疽所論之證也。發背、腦疽，別有善惡之證，載之於後。蓋七惡者，煩躁時嗽，腹痛渴甚，或泄痢無度，或小便如淋者，一惡也。膿血既洩，腫焮尤甚，膿色敗臭，痛不可近，一惡者。

也。目視不正。^黑睛緊小。^白睛青赤。瞳子上看。^三惡也。
喘麤短氣。^{恍惚}嗜卧。^四惡也。肩背不便。^{四肢}沉重。^五惡也。不能下食。^{服藥}而嘔。食不知味。^六惡也。聲嘶色
敗。唇鼻青赤。面目四肢浮腫者。^七惡也。動息自寧。飲
食知味。^一善也。便利調匀。^二善也。膿潰腫消。水鮮。^三善也。
臭。^四善也。神彩精明。語聲清亮。^五善也。體氣平和。^六善也。
病有證合。^七惡皮急緊。^八而如善者。病有證合。^五
善也。病有證合。^七惡皮急緊。^八而如善者。病有證合。^五
善而皮緩虛。^九如惡者。夫如是者。豈淺識之所知哉。只
知五善併至。則善無以加矣。七惡併至。見惡之極矣。

思意裁之。凡患瘡疽之時。五善之中。乍見一二善證。
瘡亦固也。七惡之內。忽見一二惡證。宜深懼之。大抵
證候瘡疽之發。虛中見惡證者。不可救也。實證無惡
候者。自愈。大凡膿潰之後。而煩疼。尚未痊者。診其脉。
洪滑龐散者。難療。微濇遲緩者。易痊。此善惡之證。於
診候之中。亦可知也。發背。膿疽。及諸惡瘡。別有五逆
之證者。白睛青黑。而眼小。服藥而嘔。傷痛渴甚。脾項
中不便。音嘶色敗者。是爲五逆。其餘熱渴痢。嘔。益毒
氣入裏。臟腑之傷也。當隨證以治之。

○砭鎌法

夫上古制砭石，大小者隨病所宜也。內經謂針石砭石鑠針其實一也。今時用鎌者從聖濟總錄丹毒論曰。法用鎌割出血明不可緩也。合扁鵲云。病在血脉者治之以砭石。此舉素問血實宜決之。又氣血形志論曰。形樂志樂病生于內。治之砭石。蓋砭石者亦東方來爲其東方之民。其病多瘡瘍。其法宜砭石。砭石之用自有證候。非止丹瘤也。但見腫起色赤遊走不定。宜急鎌之。先以生油塗赤上。以鎌鎌之要在決洩。

其毒然而此法不可輕用。忌其太深。內經所謂刺皮無傷肉。以其九鍼之用而各有所宜也。砭鎌之法雖治瘡瘍不可輕用也。

○貼燙法

夫瘡腫之生於外者。由熱毒之氣蘊結於內也。蓋腫於外有生頭者。有漫腫者。有皮厚者。有皮薄者。有毒氣深者。有毒氣淺者。有宜用溫藥貼燙者。有宜用涼藥貼燙者。有可以乾換其藥者。有可以濕換其藥者。深淺不同。用藥亦異。是以不可不辨也。若瘡腫初生。

似有頭者卽當貼溫熱藥引出其熱毒火就燥之義也。於四畔赤赤處搗生寒藥貼燙之折伏其熱勢驅逐其邪惡撲火之義也。夫生寒藥勢氣力精全性味雄健或有療者不本物理皆通用藥艸膏之類有勢力微欲使疮瘡者敵其勇夫不亦難乎。又有蠶工不審逆從便用寒藥敷貼趁逐邪毒復入于內歸于肝心十死八九矣。大抵敷貼之法欲消散腫毒血脉疎通寒熱逆從斷其去就焉慎不可執方無權安能散于鬱結不成膿乎。其腫皮厚者以故輒布或以紙花于鬱結不成膿乎。其腫皮厚者以故輒布或以紙花于鬱結不成膿乎。

子塗藥貼燙之待其藥乾換腫皮薄者卽用疎紗或薄紙塗藥貼燙之其藥未乾卽當換之若至膿潰之後卽貼溫肌生肉膏藥要在逐臭腐排惡汁取死肌生良肉全藉溫熱膏劑之力也切勿用寒涼之藥水調貼之夫血脈喜溫而惡寒若著冷氣過理卽血滯難瘥矣。

○渴瀉瘡腫法

夫渴瀉瘡腫之法宣通行表發散邪氣使瘡內消也。蓋湯水有蕩滌之功古人有論瘡腫初生經一二日

不退卽須用湯水淋射之。其在四肢者，湯潰之。其在腰腹背者，淋射之。其在下部委曲者，浴潰之。此謂疎道腠理通調，血脉使無凝滯也。且如藥二兩，用水二升爲則，煎取一升半，以淨帛或新綿蘸藥水，稍熱，濕其患處，漸漸喜渴，淋浴之，稍涼，則急令再換，慎勿冷用。夫血氣得寒，則凝滯；得熱，則淖澤。日用五七次，病甚者，日夜不住，或十數次，腫消痛止，爲驗。此治瘡腫神良之法也。

○針烙瘡腫法

夫瘡疽之疾，證候不同。針烙之法，實非小端。蓋有淺有深，有遲有疾，宜與不宜，不可不辨。蓋疽腫皮厚，口小，腫多，膿水不出，不快者，宜用針烙。癰皮薄，惟用針以決其膿血，不可烙也。如其未成膿已前，不可以諸藥貼烙，溻漬，救療，以待自消。久久不消，內潰成膿，卽當弃藥，從其針烙。當用次針，如似火筋磨，令頭尖如棗核樣，圓滑，用燈焰燒，須臾作炬，數盞油燒，令赤于頭，近下烙之。烙不透，卽須再烙，令透。要在下膿水易出，不假按抑。近代良醫，倉卒之際，但以金銀鐵鉗，其

樣如鍼者可通用之。實在泄其毒也。或只以木炭熟火猛燒通赤。蘸油烙之尤妙。烙後實者撚髮爲紙虛者以紙爲紙于紙上蘸藥紙之上以帛攤溫熱軟粘膏藥貼之。常令滋潤勿令燥也。夫瘡疽既作毒熱聚攻食其膏膜肌肉腐爛若不鍼烙毒氣無從而解。膿淤無從而泄過時不烙反攻其內內既消敗欲望其生豈可得乎。嗟乎此疾針烙取差實爲當理。然忌太早亦忌稍遲。嘗見龐工不審其證淺深妄施針烙之法。或瘡深針淺烙毒氣不得泄以致內潰。或瘡淺烙

深誤傷良肉筋骨腐爛或抑擦掀動。加益煩痛或針之不當別處作頭或卽時無膿經久方潰遂使痛中加痛真氣轉傷詳其所由不遇良醫也以此推之凡用醫者不可不擇。縱常醫療之得瘡者幸矣。

○灸療瘡腫法

夫疽則宜灸不宜烙。癰則宜烙不宜灸。丹癰腫毒宜瀉漬之。腫皮光軟則鍼開之以洩其毒。治瘡之手法迨不過此而各有所宜。故聖惠方論曰認是瘡疽便宜灸之一二百壯。如菉豆許大灸後覺似懨痛經

宿乃是火氣下徹腫內，熱氣被火導之隨火而出。所以然也。若其瘡痒宜隔，或餅子炙之，其餅須以椒姜鹽蔥相和，搗爛捏作餅子，厚薄如折三錢以來，當瘡頭或餅子上炙之。若覺太熱，即擡起，又安其上，餅子若乾，更換新者尤佳。若其瘡痛，即須急灸，壯數多爲妙。若其膿已成者，慎不可炙，即便針開之，即得瘥也。若諸瘡經久不瘥，變成瘻者，宜用硫黃灸法灸之。其法硫黃一塊可瘡口大小安之，別取少許硫黃于火上燒，用釵尖挑起點硫黃，令著三五遍，取濃水乾差。

爲度者，其發背初生，卽宜上餅灸法炙之。初覺背上，有瘡疼痒，頗異，認是發背，卽取淨土水和，捻作餅子，徑一寸，厚二分，貼著瘡上，以艾作炷，炙之一炷，一易餅子，其瘡粟米大時，可炙七七炷，其瘡如錢許大，日夜不往，多以瘡爲度已上，數法並依本方。一一親驗，所以載之，愚謂瘡醫自幼至老，凡所經驗，必須寫之。嘗記瘡癰惡瘡，諸醫不驗者，取蟾蜍剪去兩頭，安瘡口上，以艾灸之，七炷一易，不過七枚，無不効者。又法用乞火婆虫灸之，同前法，累驗之，神效。人皆祕之，往往

往父子不傳，又法赤皮蒜搗爛，作餅子，一如豆豉。

餅子炙法，炙之彌佳。

○內消法

夫瘡疽丹腫之生，皆由陰陽不調，榮衛凝滯，氣血不流之所生也。古人有言曰：陽滯於陰，則生瘡；陰滯於陽，則生疽。瘡疽之生，有內有外。內生于臟腑胸腹之中，外則生于膚肉筋骨之表。發無定處。夫鬱滯之本，則曰氣血不流，蒸氣不能外達。留滯而成內熱，瘡疽所生焉。若初覺氣血鬱滯，皮肉結聚，腫而未潰，特可

疎滌風熱，通利臟腑一二行徐，次諸湯渴清，即得內消矣。不然則治之稍慢。毒熱不散，反攻其內，致令膿血之聚也。內經謂治病必求于本，蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也。其風邪寒氣所聚也。治之宜溫熱之劑，和血令內消也。辨之有法，須認風寒則腫硬，色白，熱毒則焮腫，色赤，以爲異也。如其氣已結聚，不可論內消之法，宜用挑膿托裏之藥。此者先後之次也。

○追餌瘡疽腫法

夫瘡蕘生于外，皆由積熱蘊于內。內經謂血熱肉敗，

榮衛不行，必將爲膿。留于節腠，必將爲敗。蓋瘡疽，膿潰爛之時，頭小未破，瘡口未開，或毒氣不出，疼痛難忍者，所以立追餌膿之方法，使毒氣外泄而不內攻。惡肉易去，好肉易生也。若其瘡紙，其血出不止者，則不可紙于瘡上，繆追餌之藥，待其熱可紙方紙。若其瘡紙之痛，應心根者，亦不可以強紙之。誤觸其瘡，其熾痛必倍，變證不無不可不慎也。若瘡癧，膿成未破于薄皮剝起者，卽當用破頭代鍼之劑，安其上，以膏貼之。膿出之後，用搜膿化毒之藥，取効如神矣。若

膿血未盡，便用生肌斂瘡之劑，務其早愈，殊不知惡肉未盡，其瘡早合，後必再發，不可不慎也。

○托裏法

夫瘡疽丹腫，結核瘰癧，初覺有之，卽用內消之法，經久，不除。氣血漸衰，肌寒肉冷，膿汁清稀，毒氣不出，瘡口不合，成聚腫，不赤結核，無膿外證不明者，並宜托裏。膿未成者，使膿早成，膿已潰者，使新肉早生，血氣虛者，托裏補之。陰陽不和，托裏調之。大抵托裏之法，使瘡無變壞之證，凡爲瘡醫，不可一日無托裏之藥。

然而寒熱溫涼煩渴利嘔臨證宜審其緩急耳

○止痛法

夫瘡疽之證候不同，寒熱虛實皆能爲痛止痛之法。殊非一端。世人皆謂乳沒珍貴之藥可住疼痛，殊不知臨病制宜，自有方法。蓋熱毒之痛者以寒涼之劑折其熱，則痛自止也。寒邪之痛以溫熱之藥熨其寒，則痛自除矣。因風而有痛者除其風，因濕而痛者遣其濕燥，而痛者潤之，塞而痛者通之，虛而痛者補之，實而痛者瀉之。因膿鬱而閉者開之，惡肉侵潰者引

之。陰陽不和者調之，經絡祕澀者利之，臨機應變方爲上醫，不可執方而無權也。

○用藥增損法

古人用藥，因病制宜，治不執方，隨病增損，療積聚，補益，可用丸藥，以從舊不改方，增損，蓋瘡疽危要之際，證候多種，安有執方之論，固可臨時加減，以從其法。只如發背腦疽惡腫，膿潰前後虛而頭痛者，於托裏藥內加五味子，恍惚不寧，加人參茯苓，虛而發熱者，加地黃瓜蔞根，往來寒熱者，并潮熱者，加柴胡地。

骨皮渴不止者加知母赤小豆大便不通者加大黃芒硝小便不通者加木通燈艸虛煩者加拘杞子天門冬自利者加厚朴四肢厥逆者加附子生姜薑逆者加丁香藿香多痰者加半夏井陳皮膿多者加當歸川芎痛甚者加芍藥乳香肌肉遲生者加白斂官桂有風邪者加獨活防風心驚性者加丹砂口目瞞動者加羌活細辛愚雖不才自幼及老凡治瘡道常依此法加減用藥取効如神後之學者宜細詳焉

○療瘡腫懼變通類法

夫瘡道之病治療多方總而論之各有所宜補瀉淋漏及敷掃貼燙鍼鑊炙烙用之不同蓋知其道也舉治必効昧於理者利害不無嘗見以寒療熱以熱療寒古今之通論也又有檢方療病妄製加減以意裁之自以爲可殊不知病有逆從治有緩急法有正權方有奇偶用有輕重夫醫者意也得其意然後能變通也達其變通者悟其道而省其理也則左右逢其源矣愚雖不才略陳萬一嘗見治寒以熱而寒彌甚治熱以寒而熱彌熾者何也蓋不知五臟有陰陽之

性。其可因其類而取之也。假如心實生熱者當益其腎。腎水滋熱將自除。腎水虛生寒當補心。心火既降寒將自除。此所謂寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽也。又寒因熱用。熱因寒用要在通其理類而已。又聞微者逆之甚者從之何謂也。蓋治寒以熱必涼而行之。治熱以寒必溫而行之。此亦欲其調和也。其間有正有權者何也。蓋病有微有甚。微者逆治理之正也。甚者從治理之權也。然爲瘡科於補瀉汙下標本。遁從正權之理。曷可闕而不知也。大凡治療瘡

疽之要法曰。初覺熱毒發熱鬱結而作瘡疽。一二日宜先服五利湯。蕩滌邪氣。疏通臟腑。令內消也。古今湯法謂切剗咬咀。如麻豆大。以猛火急煎。無令過熟。欲其速利也。次有丸散。宣導血脉。漸次消磨。令緩散也。助以淋湯。調和榮衛。行經絡也。更當膏潤溫養。兼磨傅四畔。貼燙之藥順其陰陽也。追餌托裏。汗下調補。臨時製宜。淺深緩急自有等差。男女貴賤亦當別論。晉尚書褚澄曰。寡婦尼僧。異於妻妾。雖無房室之勞。而有憂思之苦。此深達其情者也。又仲景云。物性。

剛柔餐居亦異治亦不同也所以黃帝典四方之間岐伯舉四治之能况病之新舊形志樂苦豈可執方無權以求其愈疾哉亦有瘡疽腫痛初生一二日便覺脈沉細而煩悶臟腑弱而皮寒邪毒猛暴恍惚不寧外證深沉者亦宜卽當用托裡散或增損茯苓湯及溫熱之劑以從治之

○論五發疽

夫五發者謂癰疽生于腦背眉鬚是也大槩論之分爲三等一者疽也二者癰也三者癧也夫疽初生

如黍米大辨痛有異誤觸破之卽熾展四畔赤腫沉闊牽引脇肋疼痛數日之後漸覺肌膚壯熱惡寒煩渴腫脹侵展爛漿汁出積日不潰抑之則流血者謂之發背疽也其發於胸者爲胸疽也其發於鬚眉者以類呼也又有初生其狀無頭腫潤三四寸始覺注悶疼痛因循數日皮光微軟者甚則亦令人發熱惡寒頭痛煩渴者謂之發背癰也又有初生一頭色浮赤而無根腫見于皮膚之間大小一二十者癧也三者之候惟疽最重此疾初生皆曰滋味與厚衣衣

服厚暖則表易招寒。滋味過多則五臟生熱。臟腑積熱則血脉不流而毒氣凝滯。邪氣伏留熱搏於血。血聚則肉潰成瘡。淺則成癰。實則爲癰。深則爲疽矣。亦有因服金石發動而患此疾者。蓋由上祖曾服餌者。其毒氣流傳子孫。此病初生認是疽則宜速療之。若氣實之人。急服五香連翹湯。漏蘆湯。若干年幾未五十少壯實者。可服五利大黃湯。化毒丸。取通利臍腑。丁二行瘡頭。上用追毒散之類。貼溫熱膏劑。更湯腫湯。瀉毒湯。淋湯。

之如此調治以待膿成。已前不可以諸藥救療。以安患者之心。慎勿惱觸。著至膿成敗潰。宜服五香湯。及內托裏散。扶苓湯。當歸托裏散之類。渴不止者。服竹葉黃芪湯。乳香散。勿爲太熱。服大黃硝苦寒之藥。若因服利藥而利不止者。死矣。若瘡中惡肉未退。膿水不快者。卽用追蝕之藥或錠子。紙之上。用鹿角散。以醋熬爲糊。貼之。惡肉退去。好肉漸生。卽用搜膿散。翠霞散之類。紐之。若瘡中毒氣未盡。慎勿早歛。忌早。上生肌之藥。縱得平復。必再發。其間調理次第臨時。

制宜將護忌慎之法耳

○論癰疽

夫瘡腫之患莫大乎癰疽。然而癰疽何以別之？經所謂榮衛稽留于經脈之中，則澀不行，血脉不行，則陽氣鬱遏而不通，故生大熱。熱毒之氣騰出于外，畜結爲癰。久而不散，熱氣乘之，腐化爲膿。然而骨髓不焦枯，腑臟不傷敗，可治而愈也。何爲？疽者，其膿皮薄以澤，此其毒熱熾甚，下陷肌膚骨髓皆枯，血氣涸竭，其膿色夭堅如牛領之皮，故命曰疽。

候也。癰疽之生，有內有外。內生胸腹臟腑之中，外生膚肉筋骨之表。凡此一毒，發無定處，而有常名。夫鬱滯之本，始於喜怒憂樂不時，飲食居處不節。或金石草藥之發動，寒暑燥濕之不調，使陰陽之不平，而蘊結外，使榮衛凝滯，而腐潰輕者，起於六腑浮連，而爲癰；氣行經絡而浮也。重者，發於五臟沉澁，而爲疽，氣行經絡而沉也。明乎二者，腫毒丹疹可以類推矣。

○論附骨疽

夫附骨疽者，以其毒氣深沉，附著于骨也。此疾與

風相類而不同人不能辨治之悞矣。蓋附骨疽者由秋夏露卧爲冷折之。風熱伏結附骨成疽。賊風之候由風邪之氣搏於骨節故其痛深徹骨髓遇寒則痛甚附骨疽痛而不能轉初按之應骨皮肉微惡洪洪如肥狀者是也。其賊風皮骨不甚熱而索索惡寒時復汗出當欲熱熨痛處卽得少寬其附骨疽初時但痛無時乍寒乍熱而無汗者經久不消極陰生陽寒化爲熱而潰也。賊風不治久而變爲攣曲偏枯所以不同也。認是賊風則服引越脾治風之劑卽得差矣。

認是附骨疽急宜服漏蘆湯或五香連翹散疎下之次用內消升麻湯及湯潰膏貼之類縱不能消亦得浮淺及有緩疽石疽與附骨疽亦相類矣異者蓋緩疽石疽皆寒氣所作深伏于骨髓之間有腫與皮肉相似若疼而堅硬如石故謂之石疽緩疽其熱緩慢積日不潰久乃亦紫黯色皮肉俱爛故名曰緩疽此二者其治初覺便宜補虛托裏溫熱之劑以取消之其次調治臨疾制宜故不復具載矣

○論陰瘡

夫陰瘡者大槩有三等。一者濕陰瘡。二者妬精瘡。三者陰蝕瘡。又曰下疳瘡。蓋濕瘡者由腎經虛弱。風濕相搏邪氣乘之。瘡痒成瘡。浸淫汗出。狀如疥癬者是也。妬精者由壯年精氣盈滿久曠房室。陰上生瘡。赤腫作白。妨悶痒痛者是也。陰蝕瘡者由腎臟虛熱結下焦。經絡痞澀。氣血不行。或房勞洗浴不潔以致生瘡。隱忍不醫。狀腫尤甚。袖瘡在裏。揩手無方。疼痛注悶。或小便如淋。陰丸腫痛是也。或經十數日。潰爛血膿。肌肉侵蝕。或血出不正。以成下疳。若身體壯熱。

煩渴惡寒。宜急治之。以大豆甘草湯。漬之。潰毒湯等。洗浴之。服五香連翹湯。漏蘆湯等。疎之。更以截疳抵聖散。乾繖之。四畔用磨風膏。溫潤之後。以將護忌慎之。渴不止者。服竹葉黃芪湯。大便軟者。宜服托裏茯苓。調治之。夫如是則無不差矣。

○論時毒

夫時毒者爲四時邪毒之氣而感之於人也。其候發於鼻面耳項咽喉赤腫無頭。或結核有根。令人增寒發熱。頭痛肢體痛甚者。恍惚不寧。咽喉閉塞。人不識。

者將爲傷寒便服解藥。一二十日腫氣增益方悟始召瘡醫。原夫此疾古無方論。世俗通爲丹瘤。病家惡言時毒切恐傳染。考之于經曰人身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒。此風熱惡毒所爲。謂之丹瘤與夫時毒特不同耳。蓋時毒者感四時不正之氣。初發狀如傷寒。五七日之間乃能殺入治之宜精辨之先診其脉滑數浮洪沉緊弦濶皆其候也。蓋浮數者邪氣在表也。沉濶者邪氣深也。認是時毒氣實之人急服化毒丹以攻之。熱實以不利大黃湯下之。其有表證者解。

毒升麻湯以發之。或年高氣慚者五香連翹湯主之。又於鼻內噙通氣散取十餘噙作効。若噙藥不噙者不可治之。如嚏出膿血者治之必愈。如左右看病之人日日用噙藥噙之必不傳染。切須忌之。其病人每日用噙藥三五次以泄熱毒。此治時毒之良法也。經三四日不解者不可大下。猶宜和解之。服犀角散連翹散之類。至七八日大小便通利。頭面腫起高赤者可服托裏散。黃芪散。宜針鎌砭割出血泄其毒氣。十日外不治自愈也。此病若五日已前精神昏亂咽喉

閉塞語聲不出。頭面不腫。食不知味者必死之候。治之無功矣。然而此疾有陰有陽。有可汗。有可下。嘗見龐工但云熱毒只有寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣。

論諸瘡

夫諸瘡之生。其類甚多。種大小方書載之。紛紛以要而論槩舉四等。一者因於氣血稽留而結於內者。謂腸胃之中癰疽是也。二者因於氣血稽留而結於外者。謂十丁九癰五痔之類是也。三者不因氣血而爲

瘡。謂墮仆井金刃湯火炙烙而傷皮肉之類是也。四者不因氣血而骨肉損傷者。謂蟲獸爪牙所害之類是也。然而四等皆不難。損於肌膚。害於筋骨。不必具載。今於隨方條下。該說治證。以法附之。爲治之者。臨疾制宜。適事爲故耳。

論丁瘡腫

夫丁瘡者。以其瘡形如下蓋之狀者是也。古方論之。凡有十種。華元化載之五色。丁千金方說。丁瘡有十三種。以至外臺祕要神巧萬全其論頗同。然皆不離

於氣客於經絡，五臟內蘊毒熱。初生一頭，四腫痛，青黃赤黑無復定色。便令煩躁悶亂，或增寒頭痛，或嘔吐心逆。以針刺瘡，不痛無血，是其候也。其候本因甘肥過度，不慎房酒，以致邪毒畜結，遂生丁瘡，內經曰：膏梁之變。足生大丁，此之謂也。其治之法急於艾炷灸之。若不覺痛者，針丁四邊，皆令血出，以廻瘡錠子，從針孔紙之。上用膏藥貼之，仍服五香連翹湯、漏蘆湯等，疎下之爲効。若或針之，不痛無血者，以猛火燒鐵針，通赤於瘡上，烙之令如焦炭。取痛爲効，亦紙前

錠子，用膏藥貼之。經二二日，膿潰根出，服托裏湯散，依常療之，以取平服。如針不痛，其人眼黑，或見火光者，不可治也。此邪毒之氣入臟腑故也。養生方云：人汗入食肉食之，則生丁瘡，不可不慎也。

辨丁腫十三種形色禁忌

凡療丁腫，皆刺瘡心，至痛處又刺四邊，十餘下，令血出去，傳藥藥力得入針孔中，則佳。若不達，裏藥力不到，又看口中頰邊舌上有赤黑如珠子者，是也。瘡上按之，繆痛應心者，是秋冬寒毒久結，皮膚中變，作

東坡先生集卷之二
此瘡不急療之。日夜根長流入諸脉數道如箭入身。
頓掉不已。若不慎口味房室。死不旋踵。經五六日不
差。眼中見火光。心神昏昧。口乾心煩。嘔吐不定。宜速
治之。

- 一曰麻子丁。其狀肉起頭如黍米色稍黑。四邊微赤多痒。忌食麻子油衣布衣并入麻田中行。
- 二曰石丁。其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛。忌瓦礫博石之屬。
- 三曰雄丁。其狀炮頭黑膿四畔仰炮漿起有水出。

- 色黃大如錢孔形高者忌房室。
- 四曰雌丁。其狀瘡稍黃向裏膿亦似炙瘡四面炮漿起心凹色赤如錢孔者忌房室。
- 五曰火丁。其狀如湯火燒灼瘡頭黑膿四邊有烟漿又如赤粟米者忌火燒烙。
- 六曰爛丁。其狀色稍黑有白班瘡中潰有膿水流。出瘡形大小如匙面者忌沸熱食爛物。
- 七曰三十六丁。其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生一明日生二及至十若滿二十六藥。

所不能治。未滿三十六可治。忌嗔怒畜積愁恨。

○八日蛇眼丁。其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇眼大體硬忌惡眼人看并嫉妬人見忌毒藥。

○九日鹽膚丁。其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起食鹽大忌。

○十日水洗丁。其狀大如錢形如錢孔瘡頭白裏黑膿汗出中硬忌飲漿水水洗渡河。

○十一日刀鎌丁。其狀濶狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒烙吟忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以藥

治不可亂攻

○十二日浮漚丁。其狀瘡體曲圓少許不合長而狹如薤葉大內黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之痛。

○十三日牛拘丁。其狀肉色炮起指不破。

右十二種丁瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子丁一種始末惟痒初錄忌者不得觸犯觸犯者發作難治療其浮漚丁牛拘丁兩種無所禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸丁不同皆

宜將護依法治療，禁忌勿得觸犯。若或觸犯，脊強瘡痛極甚，不可忍者是也。又云：丁腫初發時突起，如丁蓋，故謂之丁。令人惡心惡寒，四肢強痛。一二日瘡變爲焦黑色，腫大光起，根硬刺之不覺痛，皆其候也。在手足頭面胸背骨節間，最急。其餘處則可。毒入腹則煩悶恍惚似醉，如此者三二日死矣。皆不可不速治也。

○論瘰癧治法

大瘰癧之病，其名甚多。巢氏病源載之，三十六種。

金聖惠所論瘰癧九漏總論說：有風毒熱毒氣毒之異。瘰癧結核寒熱之殊。其本皆由恚怒氣逆憂思過甚，風熱邪氣內搏於肝。蓋怒傷肝，肝主筋，故令筋畜結而腫。其候多生於頸腋之間，結聚成核，初如豆粒，後若梅李核，累累相連，大小無定。初覺增寒壯熱，咽項強痛，腫結不消者，當便服五香連翹湯。或牡礪大黃湯，疎下三兩行於上貼十香膏，烏犀膏及用淋湯、腫湯、潰毒湯，時復淋湯。如此救療，即得消散。若未消散，可服內消丸，或皂角丸之類，漸以求差。若腫結深

硬在苒月日不能內消者久必成膿若腫高而稍軟其人面色痿黃皮膚壯熱上蒸膿已成也可以針決核中令其潰散則易愈也治法如瘡法於瘡口中用追毒餌肉鏹子紙之於上用烏犀十香膏等貼之及托裏之劑和之經久不差或愈而復發或別處自穴膿水透出流津不止肌體羸瘦者變成九癩內經日陷脉爲癩留連內腠即此病也可用蒜餅子炙之然後瘡口上用紫金散翠霞散等於上紙貼膏藥求差其將護忌慎治療用法無造次焉


○論痔瘻

夫痔瘻之候其名有五一曰牝痔二曰牡痔三曰氣痔四曰血痔五曰酒痔又曰腸風痔脉痔雌雄痔皆五痔之別名也其狀初生悉在肛邊或如鼠乳或結小核疼痛注悶甚者身熱惡寒諸方論之皆由房酒過度久嗜甘肥不慎醉飽以合陰陽勞擾血脉腸澼滲漏衝注下部肛邊生瘻變爲痔疾治法始覺痔作便服通氣丸槐角丸熟實者服諸利湯疎利臟腑及浴洗薰熨以取內消切忌酒麵辛熱房室肥脈稍縱

嗜欲腐潰膿血或逗流滯汁歲月已深旁穿竅穴卽變疔漏卽須用寸金錐子三五次痊愈若能味無味之味五味足矣事無事之事百事備矣其次服餌調節謹慎合宜未有不差者也

外科精義卷之二 緒

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



外科精義卷之三

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂
宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿校

漏蘆湯

治一切惡瘡毒腫。丹瘤癰癧。丁腫魚睛。五發癰疽。
初覺一二日。便如傷寒。頭痛煩渴。拘急惡寒。肢體
疼痛。四肢沉重。恍惚悶亂。坐卧不寧。皮膚壯熱。大
便祕滯。小便赤黃。並宜服之。姪身莫服。

漏蘆

白斂

黃芩去黑心

麻黃

去節

枳實

麸炒去穰

升麻

芍藥

二兩

甘艸

炙一兩

硝石

一兩各等

大黃

二兩

右除硝外餘咬咀與硝同和勻每服三錢氣實人
五錢水一盞半文武火煎七沸去粗滓心熱服
化毒丹

治百種惡瘡毒腫初覺一二日咳逆煩悶或咽喉
閉塞發熱惡寒

沒藥

乳香

巴上各五錢

坤鳥頭

醋浸炮制

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

浮石

巴上各一兩

燒赤醋

淬另放

巴豆

四十九粒

研去皮生用

另研

右五味爲細末用浮石烏頭餘醋打麵糊爲丸如
豌豆大每服五七丸食後冷酒送下忌熱飲取快
利三二行或吐出惡爲効

內消丸

治瘡腫初生及癰癧結核熱毒鬱滯服之內消矣
大効

青皮

一兩

陳皮

巴上各一兩

牽牛

八兩取頭末二兩

薄荷葉

皂角

已上各八兩
皮搗碎二味水一升煎令粗

粗用熬成膏

右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用煎膏子和丸如菉豆大每服三十丸食後荆芥茶清溫水皆可下。

五利大黃湯

治人年四十已前氣血盛多若患瘡疽大小便祕者

大黃根

黃芩

去腐

升麻

已上各二兩

芒硝

梔子

已上各一兩二錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎五七沸去粗空心稍熱服。

內消升麻湯

治證同前

大黃

升麻

當歸

黃芩

去腐

枳實

炒去

芍藥

已上各二兩五錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去粗食前

東坡全集卷三

國家圖書館 國家圖書館藏書

五香連翹湯 如不用五香。日七味連翹湯。

治證同前

稍熟服。

沉香

丁香 巴上各
丁兩

藿香葉

木香

麝香 一字五味爲
粗末另研

連翹

射干

獨活

升麻

大黃 一兩五錢

甘艸 灸

寄生艸

巴上各
一兩

右七味咬咀與前五味和分。每服五錢水一盞半。

牡礪大黃湯

治證同前

牡礪

木香

大黃

煖巴上
各等分

煎至一盞去粗溫服。取利爲效。未利則再服。食前。右咬咀。每服五錢水一盞半。煎至七分。春夏露渴。一宿於鷄鳴時空心服之。冬月於暖處放一宿。婦人重身者勿服。此藥決利三兩行便。勿服。已上五方對證選用。

和血通氣丸

治證同前。

人參一兩

麥門冬去心二兩

大黃

黃芩去腐

黃藥已上各四兩

牽牛一斤炒香取頭末四兩

右六味爲細末，鍊蜜爲丸，如豌豆大。每服二三十丸，食後溫水送下。尋常積熱之人，隔三日服此藥，微利潤動，永不生瘡腫。如已早覺者，服之亦得內消矣。

地黃煎丸

治臟腑有熱，胸膈痰實，血氣不和，經絡祕滯，多生

瘡腫，已患惡瘡毒腫，大小便結滯。

生地黃

新者十兩洗水浸研如泥

黃連五兩

黃芩

去腐三兩

枳殼炒去

大黃已上各二兩五錢

人參

二兩

右除地黃煎外，並爲細末，再和地黃煎和搗入鍊蜜丸，如豌豆大。每服五七十丸，食後溫水下。素有熱之人，日服百餘丸，不發瘡瘍。年高氣弱之人，亦宜常服，清利胸膈，明目。

槐角煎丸

東坡子書

卷三 外科精義

五

身身十一書卷之二

卷之二

治瘡瘍癰瘡疥癬赤腫等瘡

天麻

川芎

甘艸炙

黃藥子

甘菊花

人參各一兩

何首烏

苦參各一兩五錢

荆芥穗

防風各二兩

槐角

井仁另放

右除皂角膏外。槐仁與諸藥爲細末。入膏內。濃和。鍊蜜爲丸。如豌豆大。每服五十丸。食後竹葉湯下。

皂角煎丸

治風毒瘰疬

皂角

不艸者三十錠。內十錠炮黑。十錠酥。

灸十錠用木一斗煮。輒揉汁用度。

何首烏

玄參

薄荷葉

各四兩

右爲細末。與前膏子同。鍊蜜爲丸。如豌豆大。每服

三四十丸。食後溫水送下。

苦參散

出野夫多効方

治遍身瘡疥。經年不較

苦參

蔓荆子

何首烏

荆芥穗

歲靈仙各等分

右爲細末。每服二錢。食前酒調下。日進三服。忌發風物。

苦參丸

治證同前。

山梔子仁

玄參

防風

獨活

枳實

甘菊花

黃連

去鬚

黃芩

去心

大黃已上各等分

右爲細末。煉蜜爲丸。如豌豆大。每服五十丸。茶酒

任下。食後服。

肺風丸今體治世方

治面鼻風瘡及皰

細辛

旋覆花

羌活已上各兩

晚蠶蛾去足翅

苦參已上各二兩

右爲細末。軟飯和丸。如梧桐子大。每服五十丸。茶酒任下。不拘時。

連翹散

治瘍瘍癰腫。一切惡瘍疼痛。渴大便溏泄。虛熱

東坡一書

卷三

七

七

不寧

連翹

山梔子

甘艸

防風已上各等分

右爲粗末。每服三錢水一盞煎至七分去粗溫服。不拘時候。

竹葉黃芪湯

出總錄一百三十一

治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴者。

淡竹葉

一兩

黃芪

當歸

川芎

甘艸

黃芩

去心

芍藥

人參

麥門冬

去心

半夏

湯洗

石膏

已上各三兩

生地黃

八兩

右爲粗末。每服五錢水一盞半。竹葉五片。生姜五片。煎至一盞去粗溫服。

枳殼丸

出總錄

治瘡疽熱癰腫瘍癰。

枳殼

炒去穰

牽牛

炒取頭末

木香

青皮

已上各一兩

甘艸

大黃

右爲細末。用皂角長一尺許者三錠。約三兩。炮熑。

東坡子書

卷三 外科篇義

八

搗碎以好酒煮軟，搗取汁，熬膏稠粘，和前藥末，爲丸如梧桐子大，每服三五十丸。食後葱茶下，日進二服。

五香湯 出總錄

治諸瘡毒氣入腹，托裏。

丁香

木香

沉香

乳香 已上各一兩

麝香 三錢

咽者去麝香加

藿香

渴加

人參 已上各一兩

右爲細末，每服三錢水一盞，煎至六分，去粗空心。

稍熟服，總錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方，大同小異。大抵專治毒氣入腹，煩悶，氣不通者。其餘熱渴昏昧，口燥咽乾，大使硬，小便澀者，未可與服。

托裏黃芪湯 出總錄

治諸瘡潰後，膿多內虛。

茯苓 去皮

人參

官桂 去白

遠志 去心

麥門冬 去心

五味子 炮

黃芪

當歸 已上各等分

右爲粗末。每服五錢水一盞半。前至一盞去粗溫。服食前。

托裏茯苓湯

防風

桔梗

芍藥

五味子

川芎

甘艸

麥門冬

去心

桂

去皮

熟地黃

已上各二兩

當歸

黃芪

茯苓

兩五錢。已上各一

右爲末。每服五錢水一盞半。煎至一盞去粗溫服。托裏當歸湯

太醫瘡科何君玉方

當歸湯

太醫瘡科何君玉方

當歸

黃芪

人參

熟地黃

川芎

芍藥

甘艸

炙

柴胡

已上各等分

乾姜

炮

右爲粗末。每服五錢水一盞煎至六分去粗溫服。

溫服

托裏散

出太醫瘡科成子玉方

川烏頭

炮

茯苓

已上各三兩

乾姜

炮

麻黃

去節

甘艸

炙已上各一兩五錢

杏仁

炒去皮尖

五味子

桂心

已上各一兩

右爲粗末。每服五六錢水一盞半煎至一盞去粗食前溫服。

托裏玄參散

出總錄

主托裏止渴解熱煩渴，

玄參

人參

甘艸炙

甘菊花

巴上各等分

右爲細末。每服二錢。葛豆湯調下。亦名內托散。
內托散洪氏方有芍藥總錄無芍藥亦名生肉芍藥治癰疽潰後內虛者或氣弱人初覺生瘡瘍亦可

服內消宜詳細用之

當歸

芍藥

黃芪

厚朴去皮

桔梗

防風

甘艸炒

官桂去皮

人參

白芷

芍藥

巴上各一兩

右爲細末。每服三錢。溫酒調下。或水香湯亦可。

內補散

聖惠六十一總錄一百三十八無川芎

黃芪

麥門冬去心

川芎

當歸

茯苓去皮

人參

五味子 已上各一兩

遠志 去心

甘艸 炙

桂心 已上各五錢

甘艸 炙

右咬咀，每服五錢水一盞半。生姜三片棗三枚煎八分溫服無時。

內塞散

總惠一百二十二萬全方中。去附子用天雄。

治瘡瘻不差諸瘡

附子 炮二個

官桂 去皮

赤小豆

甘艸 炙

黃芪

當歸

茯苓

防風

白芷

桔梗

川芎 人參

遠志 去心

厚朴 已上各一兩

右爲末。每服二錢溫酒調下。空心日進二服。

香粉散

主托裏止痛解煩渴退虛熱

真葛豆粉 三兩 南乳香 一兩

右爲細末。每服三錢新水調下。

止痛當歸湯 出總錄一百三十

治膿疽發背穿潰疼痛

東坡十書

卷三

七

當歸

黃芪

人參

官桂

芍藥

甘艸炙

生地黃已上各一兩

右爲粗末。每服五錢水一盞半。前至一盞去粗溫

服日進三服。

黃芪茯苓湯

出總錄一百二十

治諸瘡潰後托裏除虛熱。

黃芪

麥門冬

白茯苓

官桂去皮已上各一兩

五味子

川芎已上各一兩

右爲粗末。每服五錢。生姜三片。棗一枚。水一盞半。
煎至一盞去粗溫。服食前日進三服。

內補防風散

附子二十箇炮裂去皮臍

防風

白芷桔梗

桔梗

當歸人參

人參

遠志官桂去皮

官桂

甘艸炙已上各一兩

厚朴二兩生姜洗剝

赤小豆

半斤酒浸一宿

右爲細末。每服三錢。溫酒調下。

伏梁丸

出養生必用方

治環臍脣痛腸胃瘡疽

茯苓

厚朴

生姜
汁製

枳殼

麸炒
生穀

白术

荆三稜

半夏

湯洗
七次

溫經丸

出前方

治陷脉癰

人參

巴附各一兩

大黃

厚朴

生姜
汁製

官桂

去皮

白术

巴上各一兩

甘艸

炙

乾姜

炮

木香

巴上各一兩

附子

二兩醋浸炮溶
七次去皮臍

右爲細末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸。食後飲湯下。

木香湯腫湯

治諸瘡疽始發腫煩，增長熱竊，

木香

犀角

大黃

梔子仁

升麻

黃芩

黃連

射干

黃藥

白欽

甘艸炙

硝石

紫檀

羚羊角

已上各一兩

右咬咀入生地黃汁五合。如無只用生乾地黃五兩，剉碎和匀。每用藥五兩水一斗煎至七升。入麝香五錢，淨帛蘸藥熱搗腫上。日兩三度冷即再換升麻湯。

升麻

黃芪

防風

川芎

生地黃

細辛

已上各等分

右咬咀用藥二兩水二升煎十沸稍熱淋湯內消渴。

渴腫升麻湯

出總錄林湯條下

升麻

芒硝

黃芩

漏蘆

梔子仁

蒴藋等分

右咬咀每用藥二兩水三升煎十沸帛蘸藥湯潰腫處。

腫處

猪蹄湯

出聖惠方

升麻

甘艸

芍藥

葫蘆已上各等分

右咬咀每用藥四兩水一斗。猪蹄一對。煮蹄軟取
出次下藥再煎十沸。帛蘸淋漏之。

甘草大豆湯出聖惠方

治外陰蝕下疳瘡瘍脾痛。

甘艸三兩

赤皮蔥三莖

大豆一合

右用水三升煮豆熟爲度。用槐條一握同煮。取清
汁熱淋浴冷卽再溫浸三二時爲度。大効。

湯腫湯

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC

芍藥

丹參

黃芩去黑心

白斂已上各等分

右咬咀用藥五錢水一升煎十沸。帛蘸頻漏之。

洗毒湯

苦參

防風

甘艸炙

露蜂房已上各等分

右咬咀水煮濃汁洗瘡腫。

浴毒湯出拾遺衛生方

治小腸風陰瘡痒痛。

東垣十書

卷之二 外科精義

上

木通

藁本

枳殼

管仲

白芷

荆芥

甘松

薄荷

荳蔻

右咬咀用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升熱洗浴瘡

何首烏散

出秘寶生方

治遍身瘡瘍疼痛

防風

苦參

何首烏

薄荷已上各等分

右爲粗末每用藥半兩水酒各一半共用一斗六升煎十沸熟洗便於避風處睡一覺其痛甚者二日痊愈

八仙散

出衛生方

治遊風腫痒疥癬瘡或因洗頭遊風瘙痒生瘡

細辛

荆芥

白芷

川芎

黃芩

防風

甘艸

地骨皮已上各等分

右爲粗末每用藥二兩水二碗煎十沸去粗熱淋

溺患處

消毒湯

治百雜瘡腫，悉能內消。

獨活

防風

藁本

細辛

荆芥

枸杞子

黃芩去腐

大黃

葳靈仙

苦參

當歸

黃芪

丹參

芍藥

漏蘆

官桂

黃芩

茯苓

甘草

黃藥

葛根

白芷

升麻

零陵香已上各一兩

葛蒲八兩

白芷

升麻

葛蒲八兩

白芷

零陵香已上各一兩

葛蒲八兩

白

熨風散

出王子子中箱集

羌活

防風

白芷

當歸

芍藥

細辛

芫花

吳茱萸

官桂已上各等分

右爲粗末，作一劑。赤皮蔥連鬚，細切半斤，同鹽醋拌勻炒令極熟，帛裹於瘡上熨之，稍冷，即換藥熨之，上下痛止而已。

應痛丸

治走注疼痛，疑是附骨疽者。

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

蒼术

去皮

當歸

艸烏頭炮

黑牽牛

已上各一兩

右爲細末，用醋糊爲丸，如小豆大，每服三十九空心，醋湯送下。

黃芪丸

治腎臟風虛，攻注手足頭面，麻痺痛癢，或生疥癬。

腫欝

黃芪

烏藥

茴香炒

地龍去土

川椒去目

防風

川練子

炒

海桐皮

歲靈仙

白蒺藜

去刺
已上各等分

赤小豆

陳皮

已上各等分

右爲細末，酒糊爲丸。如梧桐子大，每服三十丸，心溫酒送下。

梔子仁湯

出普濟生靈方

治時氣頭面赤腫

鬱金

枳殼

升麻

右爲細末。

每服三錢，蜜水調下。

梔子仁

牛蒡子

大黃

已上各一兩

葛根牛蒡子湯

治時毒，大頭病是也。

葛根

管仲

甘艸

鹽豉

牛蒡子

已上各一兩

右爲細末，每服三錢，用水調下。此疾近代患者傳染，多致天疰。治之者少得方法，只云大熱必然殊不知亦有虛實表裏治之者，詳其汗下吐不同。大抵與傷寒頗類，其中亦有可針鍊砭射出血者，亦有久而敗爛出膿者，其間變異百端，不可不慎。所

東方子集

卷三

三

通氣散

治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通用之取嚏噴七八遍洩出其毒則差若看病之人用此藥必不傳染。

玄胡

一兩
五錢

猪牙皂角

川芎
已上各
一兩

藜蘆

五錢

躑躅花

二錢
五分

右爲細末每用紙擦子蘸一米許紙於鼻中取嚏爲効。

白丁香散

治婦人吹妳初覺身熱頭痛寒熱及胸乳腫硬是其候也服之能令下其乳汁通其血脉止能自消矣

白丁香

直者

右爲細末每服一錢酒調服腫硬立消甚省不過

三服

金銀花散

治發背惡瘡托裏止痛排膿

東垣子集

卷三

三

卷三

金銀花

四兩無花用苗
葉嫩莖代之

甘艸一兩

右爲粗末分爲三服酒水各一盞同煎至一盞去粗溫服無時

皂蛤散

治婦人因露風邪氣外客於乳內始爲吹妳積久不消以爲妳癰此藥導其汁散其風邪汗出其病自然痊愈矣

皂角

不蛀者燒存性

貞蛤粉

巴上各等分

右爲細末每服一錢溫酒調下不拘時候

十香膏

治五發惡瘡結核瘰疬瘻瘍疽痔

沉香

麝香

巴上各一錢

木香

丁香

乳香

各一錢

甘松

白芷

安息香

藿香

零陵香

各五錢爲細末同

川芎

黃芪

木通

芍藥

細辛

升麻

白欵

獨活

川椒

卷三

三

三

三

蒙本

菖蒲

厚朴

木鱉子

官桂

商陸根

各二兩
制碎

桃仁

杏仁

柏子仁

松子仁

各五錢

槐枝

桑枝

柳枝

松枝

各二兩
剉

輕粉

雄黃

硃砂

雲母石

生犀角

亂髮灰

白礬灰

各二兩
研細未

真酥

猪脂

羊腎脂

各三兩

黃丹一斤

清芝麻油

三斤

右先於木炭火鍊油香熟下十六味剉碎藥片四枝四仁熬至紫黑色出火濾去粗入脂酥煎十餘沸再以新錦濾過油澄清拭鑊令淨再入火上煎油沸下丹用濕柳枝作算子不住攪熬一日滴在水中成珠不散則成也離火入十味藥末攪勺上攤貼之腸胃癰疽可作丸如梧桐子大每服七丸空心溫酒送下

犀角膏

當歸

川芎

黃芪

白芷

白斂

杏仁

木鱉子

官桂

乳香

沒藥已上各一兩

亂髮灰五錢

黃丹二斤

清油五斤

右前八味細剉於油內先浸一宿於木炭火上熬至杏仁白芷焦濾去粗澄清再熬油沸下丹以濕柳木算子不住攪旋滴藥在水中如珠不散出火

候一時辰下乳香沒藥并髮灰攪匀於磁盒內收依常法攤用之

乳香膏

治一切惡瘡打撲走注疼痛

乳香研

珠子瀝青

白蠟已上各五錢

白膠香二兩

杏子油一斤

右將瀝青於木炭火上先溶開下白膠香黃蠟化開入油攪勻以綿濾去粗於井花水中持拔白色如銀再溶入乳香在內拔白色收磁盒內依常法

攤用之

白龍膏

治頭面五發惡瘡及燒湯凍破潰爛止痛生肌清
血脉消毒散腫通氣脉如神且可無瘢痕

輕粉五錢另研

白薇

白芷

白欵

黃芪

商陸根

柳白皮

桑白皮以上各一兩

乳香二兩另研

定粉另研

黃蠟以上各八兩

杏子油一斤芝麻油亦可

右七味剉油內擇浸三日於木炭火上煎令白芷

黃色濾去粗於油中下黃蠟乳香後溶開點火再
濾候微冷下輕粉定粉急攪至冷磁盒內收貯每
用紺絹上攤用之

消毒膏

當歸

黃芪

川芎

杏仁

白芷

白欵

零陵香

槐白皮

柳枝嫩者

木鱉子用仁

甘松以上各五錢剉

乳香

沒藥以上各三錢

輕粉一錢

硃砂

硃紅

已上各五分

麝香

一分

黃丹

炒紫色

黃蠟

已上各八兩

芝麻油

一斤

右將剉藥油浸七日。木炭火上煎杏仁焦色濾去粗下黃蠟候溶開取出火下丹急攪百十轉下乳香麝香硃砂等六味不往手攬至凝磁盒內收貯。白光絹上攤之治證如白龍膏之類貼面目毛髮最宜用之。

磨風膏

治頭面五發瘡腫疥癬等疾及湯火破傷磨風止

痛滅癩痕

白附子

白芍藥

白茯苓

零陵香

白芨

白欵

升麻

細辛

黃芪

甘艸

杏仁去皮尖已

腦子一分上各五錢

括蔞根一兩

大括蔞去皮二兩

黃蠟六兩

芝麻油一斤

右先藥十四味剉油內浸百日於臘日慢木炭火

上銀石器內煎至百芷微黃色離火入括囊二味著火煮百沸重綿濾去粗再慢火上燥油香下削淨黃蠟溶開爲度傾在磁器內收貯上繫腦子密封旋用磨風塗之。

天麻膏

治疥癬赤禿手足癬皮剝起癰瘍瘻侵蝕痛腫汁浸淫滋蔓經久不差者

艸烏頭

釣芩根

木鼴子

甲仁

天麻

藜蘆

川芎

狼毒已上各

粉霜已上各二分另研

臘猪脂二兩

黃蠟六兩

油一斤

右前七味細剉如麻豆大於油內煎至焦紫色令冷濾去粗上火入黃蠟猪脂溶開再用重綿濾過入輕粉粉霜攪凝磁盒內收貯用以塗磨之大効善應膏出南京寶梵院明昌六年間進方

當歸

白芨

官桂

白斂

白芷

杏仁

木鱉子仁已上各一兩剉碎

乳香

卷之三

卷之三

三

沒藥 已上各五錢研

黃丹 二斤

芝麻油 五斤

右先將油煎剉藥令白芷焦黃濾去粗再煎油沸下丹用濕柳筍子不往手攬滴在水成珠子住火入乳香沒藥攬勺以磁盒內收貯每用依常法攤用之

靈應膏 出總錄

白斂 五兩

治五發惡瘡瘰癧結核乳癰

鹿角 十兩燒存性

白斂 五兩

右爲細末每用醋中熬如膏厚塗于上中心留

王兩燒醋淬七次

白麥飯石

一竅以出其毒以故舊輞布攤之貼未成膿者貼卽自消已成膿者便潰惡肉疾出新肉早生妙不必具陳用之如神

翠玉膏

治輞癰膿水逗流愈後復發

明瀝青 四兩

銅碌 二兩

芝麻油 三錢

棕猪膽 三箇

右先於炭火上溶開瀝青入油令沸下膽汁攪勻入水中用手搗破磁盒內收貯用于緋光絹上量

瘡大小攤貼之不須再換，上便瘞可自落爲度。

追毒散

太醫成子玉方

治一切惡瘡膿水不快者。

五靈脂

川烏頭炮

白乾姜

炮已上各一兩

全蝎五錢

右爲細末，用少許，繆瘡口，中深者紙燃蘸藥，紙入瘡內以膏貼之。或水浸蒸餅令浸透，揭去水和藥，須令勻，撚作錠子，每用紙入瘡口，中亦名毒錠子，廻瘡錠子。

治丁瘡大効

艸烏頭一兩

蟾酥七顆

巴豆七粒去皮

麝香一字

右爲細末，麵糊和就，撚作錠子。如有惡瘡透丁，不痛無血者，用針深刺到痛處，有血用此錠子，紙之上，用膏貼之。丁瘡四畔紙之，其丁三、十日自然拔出。此藥最當緊用。

射膿丸

治諸瘡癰膿水已成，卽當針開，放出陳臭惡淤，則

其治也。若其惡淤不出，欲鍼石須當開發用此藥，以射出其膿也。

白礬灰一錢

砒霜五分

黃丹一字

右爲末。麵糊爲丸，撚作錠子。每用粘瘡頭，欲出處以膏貼之，自潰。

替鍼丸

出保生信効方

治證同前。

陳壞米末一錢 硝砂五分

雄雀糞直者二
十枚

右爲細末。粳米粥丸如粳米樣。每用一丸帖在瘡

頭上以膏貼之。

治療癰并馬老鼠瘡。

銅碌

斑猫

砒霜已上各
五分

右爲細末。醋糊爲丸。如鼠糞大。每用時一錠子。作三丸，納於瘡口上。以膏貼之。如無瘡口，乾摻之亦妙。

翠霞散

治百雜惡瘡，去毒生肌。

滑石一兩

銅碌五錢

輕粉二錢

片腦

麝香已上各

粉霜一字

右爲細末。每蘸藥紙於瘡口內。以膏貼之。或滑石二兩。名二聖散。量其淺深輕重用之。

搜膿散

治年深不較惡瘡

白芷一兩

芎藭二兩

白芍藥三兩

輕粉三錢

右爲細末。每用乾搘瘡口上。瘡口深者。紙引膿散。

治證同前

狼毒

釣苓根

無心艸根

白丁香已上各

五錢

麝香一字

右爲細末。如前法用治之。

乳香散

治證同前

白乾姜

苦丁香

艸烏頭

五錢

上各

鈎芩根

狼毒

乳香

一兩

上各

右爲細末。每用乾搘之。或唾調作錠子。紙入瘡內。

卽愈。

釣芩散 陳官寶方

治證同前。

井鹽一兩

無心艸

乾姜已上各一兩

釣芩根三兩

貼之。

截疳散

治年深疳瘍瘍大效。

右爲細末。每用乾膠之。或唾調少許塗在膏上。就

密陀僧

白斂

黃丹已上各一兩

黃連五錢

白芨一錢

腦子

麝香已上各五分

輕粉一錢

右前四味爲細末。後四味別研極細。和勻爲散。每用或繖或紙糊口。中以膏貼之。

抵聖散

治耳中膿。經年不愈。及驢涎馬汗攻。焮瘡瘍骨疽。疳瘍等瘡。

白礬灰一兩

烏魚骨三錢

乳香二錢

乾胭脂

輕粉

已上各
五錢

麝香

五分

右爲細末。或參或紙。以膏貼之。如有耳膿者。用丁字紙耳中。

青金錠子

治諸惡瘡。膿出不快者。及多年瘡癩瘻愈而復發。

白丁香

銅青

硇砂

粉霜

輕粉

已上各
五分

麝香

右爲細末。麵糊爲丸。撲作錠子。每用紙入瘡口。中。

龍腦

已上各
一字

膿水出快

白龍散

主生肌止痛。及耳中卒然大痛。

寒水石

四兩燒半白研

烏賊魚骨研

滑石

已上各一兩研

鵬砂

三錢

輕粉一錢

右爲細末。每用乾參耳中痛者。油調如糊。滴紙於耳中。痛立止。

桃紅散

主歎瘡。生肌肉。定血。健風邪。

滑石

四兩

寒水石

燒二兩

小豆粉

一兩

乳香

輕粉一錢
已上各

右爲細末。每用乾糲血不正者。和燈艸貼瘡口上。以帛封之。

檳榔散

治久患惡瘡。肌肉遲生。

木香

黃連

檳榔等分
已上各

右爲細末。每用乾糲之。

金黃散

出九籥衛生方

主消腫散毒生肌止痛。

黃連

大黃

黃芪

甘艸五錢

黃蘗

鬱金一兩

另研

右爲細末。入龍腦研匀。若治濕毒丹腫。新水調掃。赤上。或蜜水調如稀糊。用小紙花子貼之。或小油調掃。如久不差。熟毒瘡赤。乾糲或水調塗。亦佳。

生肌散

主斂瘡大効。

東垣十書

卷三 外科卷

七

寒水石

燒

滑石

已上各

龍骨

烏魚骨

已上各

定粉

已上各伍錢

枯白礬

乾胭脂

大黃

黃藥

右爲細末用藥乾糝瘡口上

水澄膏

治熱毒腫痛大効

天南星

白芨

鬱金

黃蜀葵花

已上各一兩

石硝

右爲細末每用新水一盞半藥末一錢攬調匀候
澄底者去浮水以紙花子攤於腫處貼之如急
燥津唾潤之此藥治熱毒赤腫神效如皮膚白色
者勿用之

拔毒散

治熱毒丹腫遊走不定

寒水石

生用

石膏

生用已上各四兩

黃藥

右爲細末每用新水調掃之或油調塗之或紙花

甘艸

已上各一兩

子小貼亦妙涼水潤之

金露散

出普降生靈丸

治時氣熱毒

寒水石

生用一兩五錢

黃藥

一兩

白芨

白歛

雄黃已上各二錢五分

右爲細末無根水調以紙花子貼或搗亦妙

消毒散

治諸惡瘡生肌止痛消毒散腫

滑石

一斤

黃藥

二兩

黃丹

一兩


乳香

五錢

輕粉

三錢

右爲細末每用乾糝或燒湯及下注臙瘡風濕疥癬等瘡油調塗之



外科精義卷之四

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂

宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿校

六檳榔散

成子玉方

治乾濕疥癬

硫黃

黑狗脊

已上各五錢

輕粉一錢

紅娘子

大檳榔

已上各一箇

右爲細末，每用藥末半錢於手掌中，臨卧時油調如糊，兩手搓摩極熱，鼻內聞之，及摩擦疥上，隔日

再用甚者不過三上必驗。

天麻散

治白禿，臁瘡及風毒疥癬，

藜蘆

天麻

狼毒

白芷

蘭艸

釣芩根

艸烏頭

管沖

細辛已上各五錢

雄黃

輕粉一錢

右爲細末，每用藥半兩，紙一重，綿裹油二兩，浸三日。外蘸指擦患處，如稍乾，添油一兩，添至二兩，換。

藥其効如神。

決効散

治風痒頭瘡，

管仲

三兩

白芷

一兩

右爲細末，油調塗之。

水銀膏

治癩瘡疥癬無名惡瘡，但是手足瘡疥浸淫多汁，久而虫生，塗之神効。

蘭茹

剉

黃蠟

已上各一兩

黃連

剉

蛇牀

微炒

白礬枯

水銀

已上各
二兩

右用臘豬脂七兩熬開下三件剉藥煎至焦紫色去粗再入黃蠅溶開出火稍凝下水銀礬石攪至勻每用塗摩

平肌散

治諸瘡久不斂者

蜜陀僧

花藥石

二味同
煅赤色

白龍骨

已上各
一兩

黃丹

乳香

研

黃連

已上各
錢五分

輕粉一錢

右爲細末入乳香輕粉黃丹同研令勻每用乾搽之

神黃散

治一切熱腫攻熒疼痛

黃蘗末

一斤

黃丹

二兩

炒

雄黃

一兩

另研

右同研勻每用新水調如糊敷掃以小紙花貼稍乾以蜜水潤之

博金散

治下疳臭爛腫痛

白礬

與蜜陀僧同爲末相和於沙鍋內火上炮汁盡

蜜陀僧

五錢

白堊

二錢

黃丹

一錢

乳香

五分

麝香

一分

輕粉

一錢

右爲細末先須別用槐枝蔥白鹽甘艸熬湯淋滑洗一二時淹乾，栓上項藥每用藥先須洗浴然後繫藥甚者三五次差。

金傷散

治刀鎌斧傷僻風止痛生肌

白芨

三兩

陳石灰

風化

桑白皮

黃丹

巴上各二兩

白附子

天南星

龍骨

巴上各一兩

右爲細末每用乾貼之。

完肌散

治證同前。

蜜陀僧

桑白皮

新者

龍骨

巴上各四兩

陳石灰

二兩

黃丹

五錢

麝香

另研一錢

右爲細末每用乾繫之。

定血散

身地十書

卷四

四

治證同前。

黃丹 一兩

烏魚骨

白礬灰

龍骨 已上各 二兩

蜜陀僧 半斤

桑白皮 一斤

右爲細末。每用乾糲定血如神。
碧霞錠子 太醫陳官寶方

治惡瘡透不覺疼痛。

銅碌 一兩

硇砂 二錢

蟾酥 一錢

右爲細末。軟米飯一處擦匀。然作錠子。粳米樣。每用針刺之。不覺痛者。但有血出。出紙一錠子。在內以

膏貼之。或作散。以紙擦蘸。亦可。臨證看如何。
宜灸。周度。

漏蘆湯

治婦人吹妳初覺。

漏蘆

練實

大黃

黃芩

芍藥

甘艸

已上各
五錢

右爲麁末。每服三錢水。丁盞半。燈艸三十莖。同煎。

至一盞去粗。溫服。無時。

玉粉散 出蘇沈螺方

東垣一書

卷四 外科精義

五

治陰瘡浸淫不正

白礬灰

定粉

已上各等分

右研細末先洗浴淨淹乾敷參之

香礬散

治小兒斷廄之後不乾及膿出耳中

枯礬

五錢

龍骨

黃丹

已上各一錢

右爲細末每用乾參之

紫金散

麝香

研少許

治療瘻久不差者

枯礬

五錢

砒霜

一錢

石膽

五分

右爲細末入黃丹二錢每用紙入瘻口內以膏貼之如未破者灸一兩炷用津唾旋調一巨許安瘻上以膏貼之去根自平復

通耳丹

盧全寶傳

治耳聾

桑螵蛸

安息香

阿魏

已上各一錢五分

硃砂

五分

革麻子仁

大蒜

芭豆仁巴豆各七箇

右爲細末，入二仁與蒜同研爛爲丸，如棗核樣，每用一丸綿裹內耳中，如覺微痛，即取出，親驗方。

菖蒲錠子一名菖蒲散

治耳中卒痛

菖蒲

附子

炮去皮臍已上各二兩

右爲細末，每用油調滴耳內，立効。

寸金錠子

太醫成子寶方

治療痔疾

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

藤黃

雄黃

雌黃

硫黃

輕粉

粉霜

麝香

砒霜

黃丹

巴上各一錢

牡蠣粉

紅藤根

乾漆

巴上各五錢

右爲細末，研勻燒陳米飯和搗爲丸，如棗核大，每用一丸，內肛門中，深二寸許，放定，令用新磚瓦子二箇，炭火燒赤，蘸醋中蘸過，綿裹一箇，於肛門上熨之，冷即換上下次之來日，大便下臭敗惡物除，根也。

薰痔散

歲靈仙 三兩

右用水一斗半，煎至七八沸，去火就盆上坐，令氣薰之，候通手淋湯，冷即再暖。

通靈丸

治耳聾

松脂 五錢

巴豆

二十四箇
去皮研

右先將松脂溶開，入巴豆末，熬成膏丸，如白豆大，綿裹。先塞耳中，覺痛取出赤水，爲効。

三神丸

治僧道痔疾，因讀養生必効方，見乾義傳，僧覺海少年患痔疾，其行業比冰霜，緣此飽食久坐，知痔疾者不必酒色過度矣。故素問云：因而飽食，筋脉橫解，腸澼爲痔。治之故不同也。

枳殼 炒去殼

皂角 烧存性

五倍子

已上各等分

右爲細末，鍊蜜爲丸，如梧桐子大，每服三二十丸，溫水食前服，養生必効方中三味皆單用，一味爲方，今增爲一方，其効如神。

卷之三

玉芝飲子

治膈熱口舌生瘡，咽喉腫痛，

甘艸 炙二兩

藿香葉

石膏 水飛

山梔子仁 已上各一兩

右爲細末，每服一錢，新酒調下。

平和飲子

出顧頤經中

治小兒瘡疹

人參

甘艸

白朮

升麻

已上各等分

茯苓

右爲細末，每服一二錢，水煎去相溫，細細飲之，量歲大小虛實以意詳之。此藥治諸瘡疹，煩渴不寧者，皆可服之。惟小兒瘡疹尤佳。

玄參丸

出僧居泰傳

治口瘡連年不愈者，

天門冬 去心 麥門冬 去心 玄參

已上各等分

右爲細末，鍊蜜爲丸，如彈子大，每服一丸噙化。

犀角散

治口舌生瘡，咽喉腫痛，熱毒時氣，

升麻

牛蒡子炒四兩

桔梗

甘艸炙已上各一兩

右爲細末。每服三錢水一盞入竹葉五七斤煎至七分去粗細。熟嗽溫卽嚥之。其粗熟掃項腫上。

防風散

治破傷瘡瘍風邪或身體疼痛風邪攻注攀急及皮膚瘙痒麻木不仁頭昏悶牙關緊欲成破傷風者。

防風一兩

藁本

羌活

地骨皮

荆芥穗已上各五錢

右爲細末。每服二錢溫酒調下。

烏金散

治瘡瘍惡瘍。

麝香

蟾酥已上各一字

粉霜

硝砂

輕粉已上各一錢

銅碌

砒霜

白乾姜已上各一錢

艸烏頭

天南星

舶上硫黃已上各五錢

右爲細末紙撲紅之或湯浸蒸餅和爲錠子。紙瘡。

口內上以膏貼之

○劉守真瘡論

素問云痛痒瘡瘍癰疽瘻瘤氣結核拂鬱甚者皆熱五臟不和九竅不通六腑不和留結爲癰近于火氣微熱則痒熱甚則痛附近則灼而爲瘡皆火之用也人之瘡腫因內熱外虛所生也爲風濕之所乘則生瘡腫然肺主氣候于皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開爲風濕所乘脾氣溫而內熱即生瘡也腫者由寒熱毒氣客于經絡使血澀而不通壅結成腫風邪不

作卽無頭無根寒血相搏作者卽有頭有根壅盛則爲膿赤根腫則風氣流潰也瘡以_企痛則爲實痒則爲虛非虛爲寒也正謂熱之微甚也痒則美疾也故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也炙之以火潰之以湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散怫熱內作故也瘡瘍皆爲火熱而反腐出膿水者猶穀肉果菜熟極則腐爛而潰爲污水

也潰而腐爛者水之化也。癰淺而大疽深而惡熱勝血則爲癰膿也。瘍有頭小瘡也。疹浮而小癰疹也。瘡氣赤痛丹熛熱勝氣火之色也。

沒藥膏

治一切癰疽發背瘡疖傷折跌壞膿生肌止痛又貼灸瘡極妙

麒麟竭

明乳香

沒藥

已上各一分研

木鱉子仁

研

杏仁

已上各五錢

油頭髮

二兩

黃丹

六兩

右先用油一斤石器內或沙鍋內露天底鍊油令熟先下木鱉子當歸杏子頭髮慢火熬黃焦油耗五分離火用錦濾去不用再入鍋下黃丹以新柳箆子十條旋換攬不住手候黑色滴在水中成珠子硬軟得所取下火入三味研藥再攬匀磁盒內盛放地上以盆合丁宿出火毒用時或帛上或紙上攢一日一換

必効散

治久患瘰癧不効服此藥取効如神

南鵬砂 二錢

輕粉 一錢

麝香 五分

班貓

四十箇
去頭翅

巴豆

五箇去
皮心膜

白檳榔

一箇

右同研極細。取雞子清二箇，去黃調藥，匀却傾在雞子殼內，濕紙數重糊定，無令透氣。坐飯饌內，與飯一處蒸熟。取藥曝乾，研極細末，用時相度。虛實虛人，每服半錢；實人，每服一錢。並用炒生姜酒下。五更初服，至平明取下惡物。如覺小腹內疼痛，便用蕎麻子燒灰，入沒藥等分，同研細，用茶調下。一錢便入大腸。其取下惡物，如爛肉老鼠兒及

烏金散

新成卵內雀兒是藥，幼婦人有胎不可服。

治癰瘍腫硬無頭不變色者，

米粉

四兩

蔥白

一兩

右同炒黑色，杵爲細末。每用看多少，醋調攤紙上貼病處。一伏時換一次。消爲度。

抵聖丸

治男子婦人頭面手足虛腫。

苦葶藶

不以多少子火
上隔紙炒過

右杵爲細末。棗肉爲丸。如小豆大。每服十丸。煎麻子湯下。食前日進三服。五七日小便多。腫消全。如喘嗽。煎桑白皮湯下。忌生冷醋滑物及鹽須別。丸一等小丸兒。與小丸服。看大小加減。與服煎聚肉湯下。

應効散

治氣癟瘡。瘡多年不効者。

地骨皮

不以多少。冬月自取。只要皮。陰乾。

右杵爲細末。每用紙撲蘸。絴瘡口內。頻用。自然生。

肉更用米飲調二錢。無時日進三服。又名托裏散。白金散。

治風攻注。毒遍身及手足。生熱瘡。疼痛。有黃水出者。

桂府滑石

右爲細末。先用虎杖甘艸豌豆各等分。約半兩許。二椀水煎。上項三味至一椀去粗微。熟淋洗瘡。水冷拭乾。上糁滑石末。令通便睡。至明決愈。

如聖散

治渾身癩痒。抓之成瘡及癰疹之類。

蠶沙一升

右用水二斗煎至一斗濾去粗。夜卧避風處淋洗水冷卽拭乾便睡。

天蠶散

治刀斧傷止血定痛生肌

晚蠶蟻不拘多少

右爲細末。每用藥貼於瘡口上。用綿裹。不須再動。一上便可。

必効散

治蜘蛛咬著疼痛

鹽豉炒乾

右爲細末。每用油調塗之。必効。

蛤粉散

治湯火燒瘡

蛤礪燒赤放冷

右研如粉。每用油調塗之。日三次

治小兒丹瘤

木鱉子新者去殼

右研如泥，淡醋調傅之。一日三五次便効。

治小兒瘡口瘡，

天南星一箇去皮

右爲末，好醋調攤在紙上。男左女右貼在脚心底，以帛繫定。三日外取了，以溫水洗盡脚下藥。

治破傷風，并洗頭風藥

麻黃一錢去節

鷄稍二錢五分

蠻姜

艸烏頭

黑附子炮去皮

白附子

天麻
川芎已上各五錢

烏梢蛇好酒浸二夜去骨火上炙黃色

右爲細末，每服一錢，熱酒調下。日進三五服，重者三五日必效。此證不宜早治，但邪氣入臟，則難治。治有四死證，不可治。一頭面青黑色。二額上有汗珠不流。三眼小，目瞪。四身上汗出如油。

烏龍丸

治遍身風瘡癩疥等疾，服之消風散熱利膈，化痰唾，治肺氣不和，此藥推陳致新，去腸垢，治證

也服此藥大有神効

萬靈丸

治背腦疽并一切惡瘡初覺二十日

硃砂

麝香少許

血竭

蓮蕊等分

右爲細末酒糊爲丸如黃米大每服七丸溫酒送下瘡在上食後在下食前不過二服即効

治眼

治昏澀退翳膜

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

川椒

四兩
合者去子
不_用

熟乾地黃二兩
酒浸

甘菊花

二兩

蒸

九九曝

右爲細末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸食後細嚼新折米十餘粒送下

治吹瘻方

田仲寬方

治吹瘻及一切惡瘡初覺二十日立効

生姜

一兩
去皮

大黃

甘草五錢
已上各

瓜萎

一箇
去皮

右共搗作一塊以水半碗同煎至七分濾去粗入

沒藥乳香末共二錢半通作一服

治瘡瘍

雄黃五分

五靈脂去石燒過斷烟五倍子炮已上細研各一錢

沒藥明淨者二錢五分白礬半生半飛

右爲細末研令極細用紙花子貼瘡口上

洗瘡

防風

當歸

川芎已上各等分

右三味剉細煎水去粗令熱溫淋洗瘡用軟帛印乾傳前藥

寸金丹

二名返魂丹三名再生丸四名追命丹五名延壽丸六名來甦丸七名知命丸八名得道丸非人勿示此方若有人患瘡身未爛者與三丸服之嚥下便活如口噤但幹開牙關研下三丸灌下喉中立生此方治發背膿疽癰腫遍身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重體壯熱

麝香一分

南乳香

烏金石

輕粉

雄黃

狗寶

沒藥已上各

蟾酥二錢

粉霜

黃蠟已上各

硝砂五錢

鯉魚膽

乾用

狗膽已上各

金頭蜈蚣七條全者

灸黃色

頭首兒孩兒乳

一合

右件爲末，除黃蠟乳汁二味，熬成膏子，同和丸。如
菉豆大小兒丸，如芥子大，每服一丸。病重者加三
丸。白丁香七箇研爛，新汲水調送下。用衣服蓋之。
睡勿令透風，汗出爲度。太殷疼痛，如無頭瘡，脾不
過，三服立效。服藥後，喫白粥，或羹就服，大妙。

牙疳藥

此藥是京兆惠民局見行經驗方

治大人小兒，

揀信

青黛

輕粉已上各

麝香五分

右同爲細末，用小油調薄，攤紙上，用木鉗，鉗實收
起，每用臨卧，以漿水洗淨，印乾，可療口大小，以藥
紙封之，至曉去藥紙，嗽淨，勿令嚥下。大者不過三
上，必効。

廻瘡蟾酥錠子

馬雲卿親傳經驗方

東坡先生集 卷四
治丁瘡毒氣攻心欲死以針刺其瘡向心行處但覺痛有血處下錐子若累刺至心側近皆不痛無血者急針百會穴痛有血者下錐子若無血以親人熱血代之猶活三四况瘡初發無有不妙大抵丁瘡生于四肢及胸背頭項骨節間唯胸背頭項昆蟲初生_乍痛痒不常中陷如丁蓋撼_突之有根狀熱惡心是也。

天南星

欵冬花

巴豆仁

黃丹

白信

_{已上各一錢}

獨活

_{五分}

班猫

_{去頭足十箇}

右爲極細末用新蟾酥和藥如黍米大挾作錐子每遇丁瘡先以針刺其瘡必不知痛有血出者下錐子如覺痛不須再用若更不知痛再隨瘡所行處迎奪刺之至有血知痛卽止其元瘡亦覺疼痛以膏藥傅之膿出自差

用錐子法度以銀作細筒子一箇約長三寸許隨針下至瘡痛處復以細銀絲子內藥於筒內推至痛處

身世十事 卷四

三五

乳香托裏散 同前所傳

治一切瘡腫疼痛，不可忍。如少壯氣實者，先疎利後服之。大勃。

御米殼 去隔帶草，蜜炒 三兩

當歸

芍藥 已上各一錢

川芎 已上各五錢

沒藥

右爲麩末，每服五錢水一盞半煎至七分去粗溫服。病在上者食後，在下者食前若未止，卽再服。

四聖旋丁散 各醫秘傳經驗方

治丁瘡生于四肢，其勢微者，先以好醋調藥塗上，以紙封之。次服內托裏之藥，其丁自旋出根。

巴豆仁 五分

白殭蠶

輕粉

硝砂 已上各二錢五分

右爲細末，醋調用之。

天丁散 同前祕傳經驗方

治一切丁瘡及諸惡瘡，初生以藥塗之，急服托裏內消。

山丹花藥

香白芷 已上各二錢

牛蒡根 春採去皮

天丁乃皇角刺

蒼耳芽

大力子已上各五錢

雄黃一兩

右五月五日受氣修合爲細末。每用好醋塗紙封之。丁瘡上有黑甲者。必須胡桃油浸。次塗之。自可。

萬應膏

同前所傳

治一切瘡瘍初生。腫欒甚者。無問大小。以膏可腫痕貼之。煎葱白水。熱淋兩次。良久再淋。腫消爲度。如瘡老不能差者。亦收斂聚膿。決然早差。

黃藥

芍藥

白芷

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN ROC

黃芪

木鱉仁

杏仁

當歸

白芨

生地黃

官桂

玄參

去皮剉碎

沒藥

乳香

已上各五錢研

白斂

黃蠟

已上各一兩

黃芩

大黃

已上各二兩

黃丹

一斤

芝麻油半二斤

右件十四味。入油內浸。一宿絕早。入沙鍋慢火熬。用生柳條攪至申時。以焦褐色出火。去粗粗。又以重錦濾過。入丹。再熬。旋滴水中成珠子。不散者。出。

火絕烟入乳香沒藥黃蠟攬火用。壺器收貯於土。

內埋七日取出摊用。

治小兒面漚瘡。

俗云鍊銀瘡者是母受胎之日食酸辣及邪味過度多生此瘡。

百藥前五錢 生白礬二錢

右爲細末小油調旋搽之神効。

治赤白口瘡。

大人飢渴不時小兒失驚卽生口瘡。

生白礬

一錢

右噙嗽之從瀝頑涎立効。

治乾濕疥癬。

此是肺受邪毒運於四肢久而不散以生肉蠹。

硫黃一兩

生白礬八錢

右爲細末油調火炙抓破塗之立効。

治湯火燒燙。

無問新舊。

青槐枝一兩

剉碎

菜豆粉一兩炒黃色

輕粉一錢

右同爲細末，油調塗之，止痛滅毒。

治破傷風

手足顫掉不已者。

硃砂

另研

南星

姜製

獨活

去皮已上各二錢

人手足指甲

燒絕烟六錢

右爲細末，分作三服，酒調服之，立効。

治破傷風

無間新舊

石灰

右用一味驗瘡口，大小儘乾塗之，不須封裹。神妙治風狗咬破傷風。

此病非爲小可，及九死一生之病，可急用。

好班貓

七箇去翅足

右爲細末，酒調服之，於小便盆內見衣沫似狗形者，爲効。如無再服，七次雖無狗形，亦不再發也。此方累試經驗，今附于此。

論炮製諸藥及單方主療瘡腫法
夫藥者。治病之物。蓋流變在乎病。主治在乎藥。製用
在乎人。三者不可闕一也。凡用一味炮炙修製。及單
方主療。該引方書出處。不必隨方標寫。

硃砂

須研細。水飛濾乾。若入膏中者。待熬膏成。稍凝冷。
卽下急攬。勿令沉聚。大凡石類。一一如此。

雲母

卽須用鍊成熟粉。曾經婦人手拈者。不効。聖惠方。

治湯火瘡。羊髓和膏塗之。神良。千金方。如治金瘡及諸惡瘡。依上塗傅。大効。

礬石 卽白礬

凡用須木炭火上枯汁盡。主陰蝕惡瘡。去鼻中瘻肉。生含嚥津。治急喉閉。用後方治耳中卒腫痛。或有膿水者。以筒吹丁字於耳中。以綿塞之。立効。又治諸毒虫惡獸咬傷。傅之則差。千金方。以醋煮湯潰蝎蟹立差。王氏博濟治驢馬汁毒傷人瘡腫痛。和黃丹傅之。靈苑方。治傷折瘡腫。以沸湯投枯礬。

水銀

瀆浴之御藥院方。治陰汗。以枯礬投沸湯中。浴之。

主疥癬。瘻瘍。傷白禿。入膏令膏冷凝。下之攬。令勻散。如星。勿令沉聚。

水銀粉 卽輕粉

主瘰疬。殺疥癬虫。酒鱗風。以手髓和如膏塗。及點。廉瘡。一上可。

石灰

主疥癬。骨疽。金瘡。風化者。良。外臺秘要方。治風疹。

以漿水調熟搗之隨手差。孫真人治癩淋石灰水溫洗之千年者尤佳。

白麥飯石卽龐理黃石

曾磨刀者佳。凡用須礮醋淬之令屑落醋中者良。亦單用治發背神良。本草曰大凡石類多主癩疽。

花藥石

主金瘡止血。含硫黃木炭火炒良。或只刮花藥石末効。

黃芪

主癩疽久敗瘡排膿止痛兼五痔鼠瘻止渴聖惠千金外臺秘要方治發背腦疽托裏止渴用黃芪六兩甘草一兩剉細水煎溫服無時大効。

菜耳卽蒼耳

千金翼方丁腫用根莖葉炒灰存性爲末。醋泔淀和如泥塗之。一日三易之。三日腫消根丁自拔出。亦治諸腫。掃之尋差。

麻黃

凡用根節煮三沸掠去沫曬乾剉。

黃芩

凡用去腐蘆，揀細實者佳。梅師方治諸丹作末。水調掃之亦治湯火瘡。

烏頭附子

凡用須炮裂去皮臍，

半夏

凡用湯洗七次去滑，

羊蹄根

主乾癬疥頭禿取根嚼塗之効簡要濟衆方治癬

瘡久不差取新者絞汁和膩粉如膏塗之千金聖惠外臺等方皆治癬和醋或白礬或硫黃塗之皆愈。

狼毒

主癰疽惡瘡鼠瘻，聖惠方治癬瘡積年搔之黃汁出痒痛以末傅之或猪膏和塗之。

芭蕉根

主瘡腫搗根汁塗之良。百一方治發背根汁塗之。

土青木香卽馬兜苓根

主頭風搔痒，禿瘡。

連翹

主寒熱鼠瘻，癰疽惡瘡，癰瘍同甘草服食。

蒲公草

主乳癰，煮汁飲之自消。梅師方傳之亦消。

滑石

本草不言療瘡，本體較治諸瘡久不愈，消熱毒腫，及金瘡血不止，湯火炒瘡用之尤良。

白石英

主肺癰吐膿，咳嗽及膈上風熱痰肺瘻，消渴陰瘻，補五臟。

赤石脂

治瘡疽痔瘻，加芎、末等分，粥飲調服一錢重，神効。寒者加乾姜服。

白石脂

治癰疽，排膿，生肌，新生兒臍濕。

雄黃

主寒熱鼠瘻，惡瘡疽痔，痔外肌疥癬。

東坡十書

卷四

十一

外科編

東坡一書
卷四
硫黃

主女人陰蝕疽痔惡瘡疥癬殺虫

雌黃

主惡瘡疥頭秃下部惡瘡殺虫

磁石

消癰腫主鼠癟頸核喉痛

蜜陀僧

主金瘡止血口瘡疳瘻面上癥點

伏龍肝

膠主惡瘡水調掃丹腫酒調封發背令內消

礬石

主寒熱鼠癟惡瘡餌外肌

姜石

搗末雞子清調敷丁腫丹瘤乳癩

龜理黃石

堪作碓碾者卽磨刀龜石

齊馬嗣明治楊遵彥^全發背取此石猛火煅^火投釀醋中因有屑落取爲末醋熬如糊厚塗立愈大丸石頭多主癰疽

東坡一書

卷四 外科精義

七

爐甘石

主愈瘡止血治目赤瘡，

燈心

主破傷血出每用貼破上敷之立差

槐根皮

主痔及白皮煎湯薰浴良入荆芥尤妙

地骨皮

主疽瘡經年以籠皮煎湯洗之細沫白穰別研粉之即差

黃蘆

主瘡腫神良每用去籠皮塗蜜炙剉諸方用作湯漬陰瘡良搗末蜜水調敷腫

枳殼

凡用須炒去穰剉枳實亦同

厚朴

凡用須去皮生姜塗製炙微焦剉

皂角

凡用須不艸者去黑皮弦子酥炙黃色剉

木鱉子

凡用去殼主惡瘡毒腫孫用和方治痔用仁三五枚研如泥以沸湯浸用汁先薰但通手卽浴洗日三度

欤樹白皮

單用熬膏貼癰疽惡瘡疖瘻疾用其白馬牙燒灰治發背初生用粉瘡頭以膏封之

兎頭

連皮骨臘乃細剉瓶中封之百日塗發腦疽發背

惡瘡

出一百一方

兔腹下白毛

治湯火瘡已破者先用膠水搣之後用兎白毛貼之毛落平復勝金方治痔用坑月砂卽兎糞也和乳香末酒調三錢溫服日三服卽差

蜜

凡鍊須煎令沸掠去沫外臺治陰頭生瘡以蜜煎甘草末塗之神効肘後方單用塗湯火瘡壯礪

丸用木炭灰炒通赤濕地上放經宿方用經驗方
治瘰癧用牡礪四兩玄參三兩爲末糊丸如梧桐
子大酒服三五十丸食後服藥盡患亦除根集驗
方治一切癰腫水調牡礪粉掃之乾卽再掃卽消
名拔毒散初虞世治療瘰癧用和甘艸末茶調二錢
服之神効大驗

蛇退皮

諸方用治丁雜惡瘡十年不較者全用炒存性猪
膏和塗之其驗神効

聖惠治瘰癧不問新舊或成瘻者取乾爲末酥和
如糊貼之日三度大効千金治發背瘡亦治鼠瘡
神良譚氏治贅瘤瘡且以網絲作線際根繫之一
宿自落

醜頭

聖惠治一切惡瘡端午日收乾爲末者油調傅之
神効子母秘錄治忽得惡瘡未辨識者取新者絞
汁傅其上大効古今諸方治丁瘡欲效者取醜頭

心腹下度取之，稍白者是以針刺下瘡，當心及腰，以心塗貼之。百苦立已，經宿其丁自拔出，大心食羊肉多不効。

陳橘皮

凡用溫水浸去白青，橘皮亦然。

枇杷葉

主嘔逆下氣，凡用去毛刺甘草湯洗二葉重一兩者，

桃杏仁

主嘔逆下氣，凡用去毛刺甘草湯洗二葉重一兩者，

凡用須湯浸去皮尖雙仁炒剉或研

無心草

凡用去蘆苗煎洗，甲癰疽神効。

防風

凡用去蘆，

藜蘆

凡用去蘆，

犀角

凡用生不會見火者，卽鎊錯爲末。

茯苓

凡用去龜皮白者佳

芍藥

亦用白者佳

牽牛子

凡用黑成熟者微炒煅如一斤取頭末四兩

萬治元年戊戌三月吉日

二條通松屋町

書肆武村市兵衛新刊

外科精義卷之四 終