

醫方類聚卷之一百五

嘔吐門二

千金月令

主熱嘔逆方

生薑

二分

甘草

壹分

竹葉

壹握

人參

二分

梔子

七枚

右以水壹升煎取半升再服之凡熱疾宜

服通中散

主卒乾嘔不息方右吞生雞子黃三枚即立

差

主乾嘔兼哕方

橘皮兩四生薑斤半

右以水七升煎取三升分温三服

主卒哕方右以物刺鼻中令嚏即差不已即以皂莢末吹鼻中

又取枇杷葉拭去毛煎湯服之主咳嗽如拭毛不盡翻有所損切慎之

治嘔吐方右取白檳榔壹顆磨橘皮壹分炙末又以水五合煎服

大全本草

經驗方嘔逆翻胃散大附子壹箇生薑壹斤細剉煮研如麵糊米飲下之

圖經曰葛洪療嘔噦切蘆根水煮頓服壹升必効方以童子小便煮服不過三升差

張仲景治嘔而胃滿者茱萸湯主之吳茱萸壹升棗二十枚生薑壹大兩人參壹兩以

水五升煎取三升每服七合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之

孫真人食忌治嘔吐以白檳榔一顆煨橘皮一分炙爲末水一盞煎半盞服

廣濟方治嘔逆不能食調梨勒皮二兩去核熬爲末蜜和丸如梧桐子大空心服二十丸日二服

兵部手集療無故嘔逆酸水不止或言三五口食後如此方羊屎十顆好酒兩合煎取一合頓服卽愈如未定更服看大小加減服之六七歲卽五顆

經驗方治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者可以應用此侯効摩丸五靈脂不夾土石揀精好者不計多少搗羅爲末研狗膽汁和爲丸如雞頭大每服壹丸煎熟生薑酒摩令極細更以少生薑酒化以湯湯藥令極熟須是先做下粥溫熱得所左手與患人藥喫不得嗽口右手急將粥與患人喫不令太多

食療云主嘔哕風氣又吐後轉筋煮木瓜汁

飲之甚良

外臺秘要近効治嘔白油麻壹大合清酒半升煎取三合看冷熱得所去油麻頓服之
兵部手集治嘔噦麴醋和作彈丸二三十箇以沸湯煮別盛漿水二盞已來彈丸湯內漉出於漿中看外熱氣稍減乘熱吞三兩箇其噦定卽不用吞餘者加至七八丸尙未定晚後飯前再作吞之
暴得吐逆不下食以滑石生細末二錢七温

水服仍急以熱麴半盞押定

三因方 嘔吐

寒嘔證治

病者胃中寒心下澹澹四肢厥冷食卽嘔吐名曰寒嘔或因傷食多致傷胃氣或因病曾經汗下致胃氣虛冷之所爲也
四逆湯治寒嘔脉弱小便復利身有微熱見厥者難治方見金匱方
牛硫黃丸治同前

硫黃 不拘多少

右壹味以柳木槌研細生姜汁釋炊餅糊為丸如梧子大每服五十九米湯下食前靈液丹治胃中虛寒聚積痰飲食飲不化噫醋停酸大便反堅心胃脹滿惡聞食氣婦人妊娠惡阻嘔吐不納食者

硫黃 打碎 附子

去皮臍切如棗豆大各壹兩

棗豆 四兩用水膏梔

煮乾焙

右為末生姜自然汁煮麩糊為丸如梧桐

子大每服五十九米湯下食前服

熱嘔證治

病者胃中挾熱煩躁聚結涎沫食入即吐名曰熱嘔或因胃熱伏暑及傷寒伏熱不解濕疸之類皆熱之所為也

小柴胡湯治熱嘔 方見傷寒門

治法曰病者嘗發汗令陽微隔氣虛脉乃數數為客熱不能消谷胃中虛冷故吐當作寒嘔治之不可用此

痰嘔證治

病者素盛令瘦腸中瀝瀝有聲食入即嘔食與飲並出名曰痰嘔或因氣鬱涎結於胃口或因酒食甜冷聚飲之所為也

大半夏湯治心氣不行鬱生涎飲聚結不散心下痞鞭腸中瀝瀝有聲食入即吐得效方或因酒食甜冷聚飲之為也

半夏二兩湯洗十次完用人參三錢三字切右分四服每服水三盞蜜二錢重和水揚

令勻入藥煎至六分去滓溫服一法有生

姜七片治法曰嘔家先渴今反不渴者以

心下有支飲故也治屬支飲○直指方治

痰證嘔吐半夏製到二兩人參四錢切片右每四錢

薑七片蜜少許熟煎服朱氏集驗方同

茯苓澤瀉湯治同前方見霍亂門

食嘔證治

病者胃腹脹悶四肢厥冷惡聞食臭食入即嘔朝食暮吐暮食朝吐名曰食嘔此由飲食

傷脾宿谷不化之所為也

大養胃湯治飲食傷脾宿谷不化朝食暮吐
暮食朝吐上氣復熱四肢冷痺三焦不調及
胃虛寒氣在上憂氣在下二氣並爭但出不
入嘔不得食

厚朴去生 姜各二兩到同 肥棗上三味炒 白朮

山藥炒 人參 川芎 陳皮 當歸 五

味子 藿香 甘草炙 枇杷葉刷毛 黃芪

各壹兩

右為剉散每服四錢水一盞半姜三片棗

壹个煎七分去滓空腹服或為細末米湯

調下亦快

治中湯治同前兼治中寒飲食不化吞酸嘔
噦食則彭亨脹滿嘔逆

人參 白朮 乾姜炮 甘草直 青皮

陳皮各等分

右為剉散每服四大錢水壹盞半煎七分
去滓大便秘入大黃基于大兩枚○直指

方每服三錢棗壹枚煎服積聚大便秘者
加大黃二碁子許

血嘔證治

病者心下滿食入卽嘔血隨食出名曰血嘔
此由瘀蓄冷血聚積胃口之所爲也

茯苓湯治憂怒兼并氣攻血溢停留胃管噎
聞血腥嘔吐食飲及妊娠中脘宿冷冷血侵
脾惡聞食氣病名惡阻

半夏三兩湯洗十次○得效方一兩湯洗七次茯苓 熟地黃

各壹兩八錢○橘皮 細辛 人參 芍

藥 川芎 旋復花 桔梗 甘草炙各一兩

二錢○得效方無
旋復花 桔梗 甘草

右爲剉散每服四大錢水二盞姜七片煎

七分去滓空腹服有客熱煩渴口瘡者去

橘皮細辛加前胡知母腹冷下利者去地

黃入桂心炒胃中虛熱大便秘小便澀去

地黃加大黃一兩八錢黃芩六錢小

當歸湯治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆

從三焦起或因熱損發或因酒發悉主之

當歸 乾姜 炮 熟地黃 藥皮 小蘗

羚羊角 鎊 阿膠 妙各三錢三字○得白朮

得效方 芍藥 各半 黃芩 甘草 各壹分

右為剉散每服三錢水二盞竹茹一塊如

指大煎至八分去滓入伏龍肝半錢匕頭

髮灰半錢匕蒲黃半錢匕又煎至七分不

以時候服

氣嘔證治

病者心膈脹滿氣逆於胃間食入即嘔嘔盡

却快名曰氣嘔胃者足陽明合榮於足今隨

氣上逆結於胃口故生嘔病也

茱萸人參湯治氣嘔胃滿不納食嘔吐涎沫

頭疼

吳茱萸 湯洗數次 人參 三兩

右為剉散每服四錢水壹盞半姜五片

棗三枚煎七分去滓不以時服 得效方同

藿香湯治心下虛滿飲食不入時時嘔吐懷

憊短氣或大病將理不復胃氣无以養日漸羸弱

藿香 人參 桂心 桔梗 木香 白

朮 各半 茯苓 半 枇杷葉 十片 半夏 壹兩 湯

兩 製汁 去毛 洗用姜

右為剉散每服五錢水二盞入炒姜絲壹分煎七分去滓食前服

漏氣證治

病者身背皆熱肘臂攣痛其氣不續膈間厭

悶食入則先吐而後下名曰漏氣此因上焦傷風開其腠理上焦之氣慄悍滑疾遇開卽出經氣失道邪氣內著故有是證

麥門冬湯治上焦伏熱腹滿不欲食食入胃未定汗出身背皆熱或食入先吐而後下名曰漏氣

麥門冬 去心 生蘆根 竹茹 白朮 各五兩 甘

草 炙 茯苓 各二兩 橘皮 人參 萎蕤 各三錢

右為剉散每服四大錢水壹盞半薑五片

陳米壹撮煎七分去滓熟服

走哺證治

病者下焦實熱大小便不通氣逆不續嘔逆不禁名曰走哺此下焦氣起於胃下口別入回腸注於膀胱并與胃傳糟粕而下大腸令大小便不通故知下焦實熱之所為也

人參湯治下焦伏熱氣逆不續大小便不通嘔吐不禁名曰走哺

人參 萎蕤 黃芩 知母 茯苓 各三錢

白朮 橘皮 生蘆根 梔子仁 各半石

膏 服壹兩

右為剉散每服四錢水膏盞半煎七分去滓溫服

厚朴湯治乾嘔嘔而不逆熱少冷多好唾白沫清涎噫氣吞酸此由上焦閉塞

厚朴 姜製 白茯苓 川芎 白朮 玄參

吳茱萸 湯洗各半兩 桔梗 附子 炮去皮 人參

橘皮 各三錢

右為剉散每服四大錢水壹盞半薑五片煎七分去滓溫服

三物猪苓散治嘔吐病在膈上思水者是欲解也

猪苓去皮白茯苓 白朮各等分

右三味末之飲服方寸匕

助道方

治脾氣虛弱嘔吐逆

脾弱氣虛多嘔吐粥藥纔食留不住胡椒雞

舌送靈砂假饒翻胃無憂慮

往往脾虛胃冷嘔吐不止諸藥不效者用

胡椒五十粒雞舌香十粒如無雞舌香以

母丁香代之二味並為細末白湯半盞浸

藥送靈砂數粒立便愈澹寮方雞舌香即母丁香也

易簡方

治中脘停飲時或嘔逆不進飲食用蒼朮去

皮米泔浸七日煉蜜為圓熟水化下

直指方

嘔吐證治

附子理中湯治寒證嘔吐方見諸寒門

二薑湯治寒證嘔吐

良薑各半 生白薑各半 木香 丁香各二廿

草炙壹錢半

右剉散每服三錢水蒸半煎半食前服

吳茱萸湯治冷涎嘔吐陰證乾嘔通用

吳茱萸沸湯泡洗 生薑各壹兩半 人參三分 大棗

介五

右剉細每服四錢水蒸半煎半食前服

小柴胡湯多加生薑治熱證嘔吐方見血人病門

參須依分兩用或加烏梅亦得

小半夏茯苓湯治水氣嘔吐方見水腫門 金匱云

嘔家用半夏以去其水水去則嘔止

二陳湯方見諸瘧門 加縮砂丁香治宿食嘔吐○

衛生寶鑑治痰飲為患半夏橘紅各五 茯苓

芍藥三兩 甘草兩半 右咬咀每服五錢水一錢

半薑五片烏梅半箇同煎至八分去粗熱

服不以時嘔吐甚者加丁香一兩

地黃湯治膿血嘔吐

生地黄洗川芎各一兩半夏製甘草炙各三分南

星盪洗芍藥七次白芷茯苓北梗前

胡知母各半人參兩

右剉每服三錢半薑五片烏梅壹箇煎服

加減七氣湯治氣鬱嘔吐

半夏製二兩半人參湯洗幹桂厚朴製

方薑汁炒得效伏苓壹兩甘草炙半

右剉散每三錢半薑七片棗壹枚煎服加

木香亦得

霍香正氣散治風邪入胃嘔吐

半夏麩川厚朴製各三兩藿香葉橘紅壹

兩甘草炙七錢

右剉散每三錢薑七片棗壹枚食前煎服

又養胃湯方見諸寒門通用

木香豆蔻散治翻胃嘔吐

人參木香肉豆蔻麩裏煨白豆蔻仁

膏甘草炒壹錢半

右麤末每三錢薑棗煎服

參橘湯治翻胃

人參壹錢 真橘紅 石蓮肉各半兩 透明乳香

半壹錢

右末每一錢薑湯點服

丁香煮散治翻胃嘔逆

丁香 石蓮肉各十枚 北棗七枚 生姜片七片 黃

秫米半合洗

右水梳半煮稀粥去藥取粥食之

附子散治弱證翻胃

大附子一枚作兩截中心各刺小孔入丁

香四十九粒塞滿以竹針插合置

博上炭火煨四圍淬薑汁半梳再煨再淬

以盡為度去皮切焙○朱氏集驗方大照

附子子

右並末每壹錢半粟米壹拾北棗二箇煎

食前服 養正丹大治停寒留飲聚涎翻胃嘔吐方見

門添薑煎二陳湯下○得效方治冷痰作冷

嘔每服三十圓搗湯空心下方見痢冷門

嘔吐家多大便秘結虛冷者用靈砂或養正

丹溫而利之又蘇合香圓方見咳門用四分感

應圓方見脹門用六分夾研作細圓薑汁泡沸

湯下此亦溫利若大便熱結用蜜煮凝捻作

指錠納後部導之或用獾豬膽一枚取汁入

法醋少許以筆蘸滴灌於後部或燒皂角於

桶內熏穀道或用蓮根葱白煮握漢椒五十

粒擣細作餅焙熟和輕粉掩臍續以葱椒煎

湯熏盪身下

朱氏集驗方

嘔吐

丁香半夏丸治宿寒在胃嘔吐吞酸

丁香不見炒乾薑炮半夏湯泡橘紅各二

白木半

右為細末生薑自然汁打糊為丸如梧桐

子大每服五十丸淡薑湯送下食前嚴氏

方醫方大成集成南北經驗方袖珍方同

如神湯治痰證嘔吐連日不效

半夏子炒神曲不拘多少炒黃色丁香

右用二味水壹盞半煎八分其藥自然煎

成濃汁不妨通口服其疾即止用此藥下

養正丹甚妙

四七湯治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎

狀如破絮或如梅核咯不出嚥不下或中脘

痞滿氣不舒快痰涎壅盛上氣喘急並宜服

之出易簡方

半夏五兩茯苓四兩紫蘇葉二兩厚朴三兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗

壹枚煎至六分去滓熱服不拘時一名大

七氣湯大治七氣并心腹絞痛一方治七

情所傷中脘不快氣不升降腹脇脹滿用

香附子炒半斤橘紅六兩甘草壹兩同煎尤妙

嚴氏濟生方

嘔吐

理中湯方見霍亂門右如法煎服吐甚者加半夏

生薑煎 或飲食不節過食生冷肥膩腥膾吐逆不止加青皮陳皮煎理中湯 夏月霍亂吐利宜進香薷飲已載諸瘧門中或因傷風傷濕吐逆皆宜用五苓散多加生薑煎 傷風加生薑葱白煎最佳 大藿香散治憂愁思慮悲恐驚七情傷感氣鬱於中變成嘔吐或作寒熱眩暈痞滿不進飲食

藿香葉 半夏麴 白朮 南北經驗 木香

不見火 白茯苓 去蘆 人參 枇杷
各一兩 桔梗 去蘆 人參 枇杷
試去 官桂 不見 甘草 炙各

右為細末每服三錢水壹大盞生薑五片棗子壹枚煎至七分去滓溫服不拘時候

得效方醫方大成集成
袖珍方承類鈔方同

旋覆花湯治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花 去梗 半夏 湯泡七次 橘紅 承類鈔方淨 乾薑 炮

壹檳榔 人參 甘草 白朮 各半

右咬咀每服四錢水一盞半 醫方大成集成南北經驗

藥考百五

十七

方袖珍方鈔 生薑七片煎至七分去滓温
服不拘時候

竹茹湯治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止

葛根 兩三 湯泡七 甘草 兩炙壹

右咬咀每服五錢水二盞醫方大成集成

珍方永類鈔方每入竹茹棗許大成經驗

壹方鈔方薑五片煎至七分去滓取清汁微

冷細細服不拘時候得效方此下云二陳

見諸瘧門

赤芍藥湯治瘀血蓄胃心下滿食入即嘔血

名曰血嘔

赤芍藥 兩二 半夏 湯泡七次 橘紅 壹

右咬咀每服四錢水壹盞半薑七片煎至

七分去滓温服不拘時候

玉浮圓治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐及

久新翻胃不問得病之由皆可服之真良方

也

人參 白殭蠶 炒去 白朮 乾薑 丁香

類聚百五

十九

肉豆蔻

麩裏煨

橘紅

永煨方淨

白豆蔻

仁丁麥

藥

炒附子

炮去皮

木香

不見火

南星

炮

檳榔

八半夏

湯泡

甘草

炙

之山

甘

之

其

右等分

為細末

每服

二錢

入生麵

壹錢

以

醫

大成

和勻

生薑

自然汁

搜和

圓如

梧桐子

大入

百沸湯

煮令

浮盡

和圓藥

大成每服

五十圓

用淡薑湯

吞下

不拘時

候病甚

者不過三

服惡熱藥者

去附子

大便祕者

去肉豆

蔻

醫方

集

成

南北

經驗

不

前

食

胃丹朱砂稟太陰之精不經火煨以丁附等

脾藥陰煉成丹平補不僭善治真陽衰虛心

火怯弱不養脾土冲和失布中州虛寒飲食

不進胃膈痞塞或不食而脹滿或已食而不

消痰逆惡心翻胃吐食臟氣虛寒米穀不化

心腹絞痛泄利不止應是一切脾胃諸疾不

問男子婦人皆可服之

朱砂

大塊不夾石

新羅人參

縮砂仁

肉豆蔻

麩裏煨

革澄茄

白豆蔻仁

紅豆

類聚百五

高良薑剉 附子炮去皮臍 白朮 厚朴薑汁炒 丁香

香不見火 藿香葉 五味子 乾薑炮去土 胡椒

益智仁 麥門冬去心 草果仁 橘紅

已上各四兩

右將人參等二十味各如法修製剉如豆

大以銀鍋醫方大成集成河北經方 壹

口用白沙蜜五斤將藥壹半同蜜拌勻入

銀鍋內以夾生絹袋盛貯朱砂懸胎入銀

鍋內以桑柴火重湯煮四日四夜換蜜五

斤入前藥壹半和勻再煮三日三夜取砂

淘淨焙乾入乳鉢用玉錘研直候十分細

米粽為圓如菜豆大陰乾每服十粒加至

十五粒空心食前用人參湯送下棗湯亦

得如或嘔吐用淡薑湯送下忌食猪羊血

東垣試效方

嘔吐蘇合香丸

丁香安胃湯蘇室秘藏名治嘔吐噎胃虛寒

所致蘇合香丸

類聚百五

三一

類聚百五

二十一

丁香半錢 吳茱萸壹錢 草豆蔻 黃耆二人參

壹錢 炙甘草半錢 柴胡錢 升麻七分 當歸身壹錢

橘皮半錢 黃藥二錢 藏三分 秘蒼木一錢

右件判如麻豆大每服半兩水二大盞煎

至膏盡去粗稍熱服食前

茯苓半夏湯藹室秘藏 治胃氣虛弱身重有

痰惡心欲吐風邪羈絆於脾胃之間當先實

其脾胃

白朮 茯苓秘藏白 半夏秘藏各 炒麴各

錢○秘 大麥麴半兩○秘藏麥 陳皮各三

天麻三錢

右件咬咀每服半兩水二大盞生薑五片

煎至壹盞去滓稍熱服食前

柴胡半夏湯治舊有風證不敢見風眼澁頭

痛有痰眼黑惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊

手足重難舉居暖處有微汗便減再見風其

病即便復壹名補

半夏二錢 炒麴一錢 生薑十片 柴胡半錢○藹室

類聚百五

升麻五分 蒼朮壹錢 藁本半錢 白茯苓七分

右件咬咀麻豆大都作壹服水三蓋 秘藏水二

大煎至壹蓋 秘藏壹 去粗稍乾服

木香利膈丸蘭室秘藏名 治寒在膈上噎塞

咽膈不通

吳茱萸壹錢二分 草豆蔻壹錢二分 益智八分 橘皮八分

白僵蠶四分 人參八分 黃耆八分 升麻八分 麥蘖壹錢

半當歸六分 炙甘草六分 半夏一錢 木香一分

澤瀉四分 姜黃四分 柴胡四分 青皮二分

右件為細末湯浸蒸餅為丸如菜豆大每

服二十九秘藏服二十九 溫水少許送下勿多

飲湯恐速走下細嚼亦得

得效方

嘔吐

風證藿香散治風邪入胃嘔吐自汗或身疼

人參五錢 厚朴 藿香 陳皮各壹兩 半夏五錢

茯苓 芍藥 官桂 粉草各五錢

右劉散每服四錢生薑五片紅棗壹枚煎

食前服養胃湯兼用亦效

寒證理中湯專治胃虛感寒嘔吐不止方見霍亂

門

枳梗半夏湯治寒熱嘔噦短氣煩悶飲食不

下方見諸瘧門

暑證香薷散治傷暑飲冷常風取涼嘔吐不

止香薷散壹兩半重二陳湯壹兩重二藥

合和作六服生薑三片烏梅壹箇煎方見諸暑

門及諸瘧門或加塩煎

五苓散治同上藿香煎湯服未效生薑自然

汁調下消暑圓熱薑湯下方見諸暑門

濕證加味治中湯治體虛感冒雨濕嘔吐

人參 白朮 乾薑 青皮 陳皮各一兩

藿香 半夏各五錢 甘草三錢

右判散生薑三片紅棗一枚煎服

七情大藿香散方見嚴氏

痰證大半夏湯方見三因方

半夏圓治熱痰作嘔每服五十圓淡薑湯下

不拘時候方見諸瘧門

養正丹治冷痰作嘔每服三十圓塩湯空心

方見直下指方

加味理中湯治痰浮於上嘔吐不已加半夏

丁香酌量用每服四錢水煎不拘時熱服

再入生薑亦可方見泄瀉門

食證二陳湯治胃腹脹滿因傷宿食或吐後

噫敗卵氣加丁香縮砂生薑七片烏梅壹箇

煎未效服治中湯治同前兼療中寒飲食不

化吞酸覘嘔食則膨亨脹滿嘔逆澹寮方治

中湯主脾胃感寒胃膈不快飲食不消而作

嘔吐

人參 白朮澹寮方炒 乾薑炮 甘草炙○澹寮方減半

青皮澹寮方去白 陳皮各等分○澹寮方去白

右判散每服四大錢水一錢半煎七分去

滓大便秘入大黃棊于大兩枚

血證茯苓湯 當歸湯方並見三因方

氣嘔菜萸人參湯方見三因方

藿香正氣散治氣嘔大效每服三錢水壹盃

半生薑三片木瓜二片煎熱服方見傷寒門

加減七氣湯方見直指方

熱嘔竹茹湯方見嚴氏濟生方

通心飲治心脾蘊熱作嘔每服三錢燈心藿

香葉煎方見小兒驚癇門

小柴胡湯治胃中挾熱煩燥聚結涎沫水入

即吐或因胃熱伏暑及傷寒伏熱不解每

服三錢加人參烏梅生薑五片紅棗壹枚

煎方見傷寒門

三乙承氣湯治嘔吐水漿不入或食已即吐

大便秘或利而不鬆快時覺腹滿者或下痢

赤白而嘔吐食不下者或大腸小腸膀胱結

而不通上為嘔吐隔食

大黃 厚朴姜炒枳殼 芒硝各半兩甘草壹兩

右剉散每服四錢水壹盃半袖珍方每服壹兩小二盞

薑三片煎六分袖珍方煎至一盞却入硝細細啜

服

冷證嘔吐四逆湯治胃中虛四肢厥冷食即嘔吐或因冷食傷胃或累經汗下致虛胃氣但脈弱小便多復利身有微熱見厥者難治方見傷寒門未効服金液丹每服九圓米飲下丁胡椒三建湯生薑十片煎吞下方見痢冷門

通治藿香正氣散治胃中有虛熱作嘔生薑

三片木瓜二片煎方見傷寒門

香白圓治氣不順痰涎壅盛嘔吐不止

青州白圓子方見諸風門 青木香圓方見諸痢門

右各三十圓生姜湯吞下

炮附子圓治胃脘有熱胃中有寒嘔吐不止

附子炮去皮臍二兩

右為末以糊圓如梧子大就濕以大黃末五錢為衣每服十圓加至二十圓用薑湯下

快氣湯治一切氣心腹脹痛胸膈噎塞噫氣吞酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解可思飲食

香附子去毛三分甘草四錢縮砂仁去皮八錢

右為末每服壹錢搥湯點下常服快氣美

飲食養脾

勻理湯治體虛上氣壅盛中脘痞塞嘔逆翻

吐水飲不入其證急速

木香勻氣散方見諸理中湯方見霍

右二藥合和搥湯調服壹匕立效

人參散治吐逆及瀉後除煩渴常服調中和

氣

白茯苓各半人參各半白芍葛壹藿香木

香目草嫩黃耆去蘆一分

右剉散每服三錢水壹盃半煎七分去滓

溫服瀉後渴甚者每服加滑石末二錢同

煎

丁香煮散治脾藏伏冷胃脘受寒胃弱痞悶

心腹刺痛痰逆惡心寒嗽中滿藏腑虛滑飲

食減少翻胃吐逆四肢逆冷但是沉寒痼冷

無問久新功效不可具述○醫方集成治脾

胃虛冷嘔吐不食

丁香不見火 紅豆去皮 青皮去白 甘草 炙川烏炮

皮陳皮白 乾薑炮各 良薑炮去 益智去

五兩 胡椒二兩

右剉散每服二錢集成三錢 水壹盃生姜三片

搗一捻煎至七分空心食前稍熱服滓再

煎病退即止極妙袖珍方永類鈔方與集成同

澹寮方

加味二陳湯主痰生嘔吐等證

半夏 橘紅各五兩 茯苓去皮三兩 甘草二兩 丁香

二兩

右咬咀每服四錢水一盃半姜七片烏梅

壹箇煎至六分熱服惡甜者減甘草

棗合圓治脾胃虛冷乾嘔惡必嘔吐痰沫全

不思食十隔五噎

丁香半兩 半夏半兩 麴壹兩 鈐方無麴字 胡椒二錢 乾

姜二錢 木香二錢

右爲細末生姜汁浸蒸餅爲圓每兩作十

五圓每服壹圓用大棗壹枚去核入藥在
內濕紙裏煨令香熟去紙細嚼溫生姜湯
送下

又方胡椒二十粒丁香十四粒半夏七箇湯泡去滑

右同為細末生姜自然汁為圓如雞頭大
每服壹圓以乾棗壹枚擘破去核入藥在
內以濕紙裏煨熟放溫以米湯爛嚼送下
治氣不順嘔吐不止痰涎壅盛

青州白圓子 青木香圓

右各三四十圓生姜湯吞下

治嘔吐痰飲不納飲食狀猶翻胃投燥脾胃
等藥疾愈增劇意欲飲水此雖胃中冷而胃
口有熱也

人參 乾姜炮 白朮去蘆炒 甘草

右收咀每服四錢重水一盞半煎至七分
濾清汁浸令極冷頓服之即不吐

衛生寶鑑

嘔吐吃逆

霍香安胃散治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不待腐熟

人參 丁香各一錢 藿香七分 陳皮二錢

右為末每服二錢水二錢生薑三片煎至

壹錢去相掠服食前和粗服亦可

丁香柿蒂散治諸種吃噫嘔吐痰涎

丁香 柿蒂 青皮 陳皮各等分

右為粗末每服三錢水壹盞水煎至七分

去粗溫服無時

羌活附子湯治吃逆

木香 附子炮 羌活 茴香各半兩 乾薑一兩

右五味為細末每服二錢水壹錢半煎壹

捻煎二十沸和粗熱服壹服止

聖濟總錄

嘔吐

嘔吐者胃氣上而不下也譬之通緝小口頓

漑不入乃升氣所礙人病嘔吐其理如此蓋

脾胃氣弱風冷干動使留飲停積飲食不化

胃氣虛脹心下澹澹其氣上逆故令嘔吐也
 治嘔吐除中滿痞氣痰逆惡心宿昔成積面
 黃腹脹臧府不調水穀不化調順脾胃沉香
 煎丸方

沉香剉丁香 木香 胡椒 沒藥研丹

砂別研高良薑 檳榔麩裏煨硃明淨

研水飛用石 青橘皮去白硫黃別研水飛

器慢火熬乾 阿魏醋浸開白麩同作縮沙皮吳茱萸取

久者湯浸取沉 巴豆去皮心膜研細新瓦

老炒各半兩

右壹十五味除研藥外搗羅為末再入研
 藥研勻鍊蜜丸如棗豆大瓷合貯封每服
 二丸食前臨卧溫生薑橘皮湯下更量虛
 實大小加減

治脾胃虛寒痰飲停滯嘔吐不止豆蔻湯方

肉豆蔻三枚桂去麤零陵香 芎藭各壹

莎草根二十一陳橘皮去白甘草炙三

右七味麩擣篩每服二錢匕水壹盞入生

薑三片棗二枚擘煎至六分去滓溫服

治脾胃虛寒痰盛嘔吐厚朴丸方

厚朴

去麤皮薑汁炙壹斤

半夏

洗去滑焙切半斤

棗

生絹袋盛三斤

生薑

三斤研取汁盡更入水二碗絞取汁

右四味銀器內用文武火煮盡薑汁收厚

朴半夏焙乾擣羅為末棗去皮核入前藥

於日中再擣為丸如梧桐子大每服空心

臨臥溫酒下二十九

治脾胃虛寒痰盛嘔吐不止飲食不化藿香飲方

藿香葉

厚朴

去麤皮薑汁炙令熟各壹斤

青橘皮

湯浸

去白切麩炒三分

甘草

炙三分

桂

去麤皮半兩

乾薑

炮宣分半

枇杷葉

拭去毛炙壹分

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑

三片棗二枚擘破煎至七分去滓溫服不

計時候

治脾胃虛冷嘔吐痰涎胃膈症悶不思飲食七寶湯方

人參

白茯苓

去黑皮

甘草

微炙

連皮大腹

各一

兩 訶梨勒 五枚煨去核 草豆蔻 四枚麴裏煨去皮 半夏 壹分生薑自然汁炒黃

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生薑三片棗二枚擘破同煎至六分食前去滓溫服

治脾胃虛寒痰盛嘔吐不定藿香半夏九方

藿香葉 兩半 半夏 壹兩 丁香皮 舶上者 丁香

各半 水銀沙子 壹分

右五味搗羅為末同水銀研勻酒煮麵糊

和丸如梧桐子大每服七丸至十九生薑人參湯下不拘時候

治脾胃虛寒嘔吐不止桂心湯方

桂 去粗皮 乾薑 炮 半夏 湯洗去滑

右三味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生

薑三片煎至六分去滓空心溫服

治脾胃虛寒痰飲留滯嘔吐不止濟急散方

附子 壹枚切下蓋取出 丁香 四十九枚

右二味用生薑自然汁略浸附子同瓷瓶

中重湯煮之令乾擣羅爲細散每服一錢
匕含化嚥津

治脾胃虛寒痰涎壅滯嘔吐不止半夏飲方
半夏三分薑汁浸炒白朮壹兩檳榔五枚甘草生剉
右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞煎至
八分去滓熱服不計時候

治胛胃虛寒痰盛嘔吐不食半夏橘皮飲方
半夏洗去滑焙陳橘皮去白焙甘草炙枳去蠶皮
人參壹兩大腹壹枚

右六味擣麤篩每服五錢匕小二盞入生
薑三片煎至壹盞去滓溫服不拘時候

治嘔吐不止消痰下氣厚朴散方

厚朴去麤皮剉薑汁浸一宿炒四兩生薑二斤淨洗切片
甘草剉炒陳橘皮湯去白炒六兩草豆蔻去皮剉
兩

右五味擣羅爲散每服二錢匕沸湯入棗
點服脾氣等疾每服三錢匕水漬薑薑二
片棗二枚擘破煎至六分溫服

治嘔吐輒紅丸方

丹砂研砒霜研各半錢烟脂壹錢巴豆七粒取霜

右四味研細鎔蠟少許入油三兩滴和藥

為劑以油單裹之大人旋丸如菜豆大小

兒如芥子濃煎槐花甘草湯放溫下壹丸

勿熱食半時久

治食飲不下嘔逆清水而目虛腫和胃湯方

人參二兩赤茯苓去黑皮一兩半茅根一兩甘草炙半

竹茹三分半夏湯洗七遍一兩木通判三分

右七味麤擣篩每服三錢匕水壹盞生薑三片棗二枚擘破煎至七分去滓溫服

治嘔吐不下食前胡湯方

前胡去蘆頭麥門冬去心人參 淡竹茹

芍藥 陳橘皮湯去白焙半夏湯洗七遍

右七味剉如麻豆大拌勻每服三錢匕水

壹盞生薑三片煎至七分去滓食前溫服

治嘔吐不下食頭痛身熱芫胡知母飲方

芫胡去苗知母焙蘆根判三分檳榔一人

參半兩陳橘皮半兩

右六味搗篩為散每服三錢匕水壹盞生薑五片同煎至六分去滓熱服

治膈氣脾胃虛冷多嘔吐酸水人參散方

人參壹兩去壹兩檳榔壹兩高良薑半兩陳橘皮壹兩湯浸壹兩革撥壹兩白朮壹兩

右六味搗篩為散每服三錢匕水一盞生薑五片同煎至六分去滓熱服

治胃滿氣逆食不消化嘔吐陳橘皮散方

陳橘皮壹兩白朮二兩人參壹兩胡

椒半兩肉豆蔻壹兩甘草半兩

右六味搗羅為散每服四錢匕小壹盞生

薑五片同煎至六分去滓稍熱服

治脾胃虛弱不思飲食嘔吐茯苓湯方

茯苓去麩知母壹兩白朮壹兩枳殼去麩人參

去壹兩甘草壹兩蘆根切半易洗去滑

右八味搗篩每服三錢匕水壹盞半入生薑七片薤白二寸切同煎至七分去滓

不拘時溫服

治嘔吐厥逆不思飲食白朮湯方

白朮 丁香 甘草炙 陳橘皮去白 木香

各半 大腹剉 枳殼去心 訶梨勒炮去核 草

兩 豆蔻上 皮一兩

右九味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入生

薑五片同煎至七分去滓空心溫服

方 治上焦壅熱食飲不下嘔吐兩脅痛半夏湯

方

半夏湯洗七 人參 芫胡去苗 麥門冬去心

三分 赤茯苓去黑皮 竹茹 桂去 蘆根剉各

甘草剉 壹分

右九味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半入

生薑五片同煎至八分去滓溫服

治上焦壅熱見食嘔吐頭痛目赤石膏竹茹

湯方

石膏二兩 竹茹焙 人參 白茅根 半夏湯

七 徧炒 玄明粉研 桔梗炒 甘草炙 葛根剉

兩半

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入
生薑五片同煎至八分去滓溫服

治胃滿氣逆嘔吐不思食味白朮散方

白朮剉人參各二兩丁香炙甘草剉各白

茯苓去黑皮草豆蔻去皮陳橘皮焙乾薑

炮裂各壹兩桔梗炒半兩

右九味搗羅為散研勻每服二錢匕生薑

棗湯調下

治脾胃氣虛弱嘔吐不食腹中虛鳴陳橘皮

丸方

陳橘皮去白焙厚朴去麤皮生薑肉豆蔻

去殼乾薑炮裂木香醋炒白朮剉

梨勒皮去麤皮枳殼去瓢沉香剉芍

藥炒丁香各三分阿魏各半兩酒煮後細研更

煎成膏丸甘草炙剉壹分

右壹十五味搗羅十四味為末用阿魏煎

和丸梧桐子大每服二十九空心米飲下

治冷氣嘔吐及吐食附子散方

附子生去皮
臍壹枚

右壹味切作四片用生薑汁五合浸壹宿
取出火上炙乾入生薑汁浸良久又蒸薑
汁炙直候薑汁盡擣羅為散每服二錢匕
米飲調下

治嘔吐不下食紫粉丸方右以鉞沙醋浸一
夜去醋使帶醋炒直候并銚子紅色無煙
乃止放冷細研更用醋團火燒通赤取候

冷再研極細麵糊丸如梧桐子大每服四
十九粥飲下服訖使啜壹盞粥已不吐如
未定再服決定小兒小丸之隨兒大小與
之

治嘔吐不下食頭痛人參丸方

人參三兩夏湯洗七遍前胡去蘆頭 鈔丹

研半兩

右四味擣羅為細末煮棗肉丸如梧桐子
大每服二十九生薑湯下食後

大乾嘔

嘔而欲吐吐而無所出故名乾嘔此由陰陽不和胃中虛氣逆上行不能下故有乾嘔之證治胃氣逆乾嘔惡心參苓散方

人參 白茯苓去黑皮 藿香葉各壹兩 丁香枝

杖 甘草炙剉各半兩 葛根剉一兩

右大味搗羅為散每服二錢匕沸湯點服

不拘時候

治心胃痞悶痰逆惡心吞酸噫食腹脇疼痛

肢體倦怠和益脾胃思進飲食辟除邪氣麝香平氣丸方

麝香別研 木香 沉香 丁香 肉豆蔻去殼

丹砂別研各半兩 檳榔煨剉 桂皮去麤皮 厚朴去麤皮

炙乳香別研生薑汁內煮候冷 半夏湯洗七

乾薑為末薑汁和作餅焙乾別搗為末壹兩

右壹十壹味除別搗研外並搗羅為末次

入丹砂麝香再研勻將乳香半夏末入生

薑汁煮作薄糊和前藥輾輾得所丸如梧

桐子大每服十五丸至三十丸食後溫米飲下

治胃氣不和乾嘔惡心大補虛損四倍散方

訶梨勒煨去核一兩 人參二兩 白茯苓去黑皮四兩 白

朮半斤

右四味搗羅爲散每服二錢匕搥少許沸湯點服如欲煎每服三錢匕水壹盞生薑五片棗兩枚擘破同煎至七分溫服空心食前

治乾嘔惡心益津液和胃氣生薑丸方

生薑二斤和皮切片子以鹽甘草炙陳

橘皮湯浸去白香白芷 縮沙去皮胡椒各

兩蓬莪茂炮二兩

右七味搗羅爲末以麩糊和九如小彈子大細研丹砂爲衣每服細嚼一丸溫酒下食前

治乾嘔和胃氣養津液生薑湯方

生薑細切絲二兩 草豆蔻去皮四兩 甘草生剉半斤

右三味先搗草豆蔻甘草爲末同薑絲爛
研勻捏作餅子焙乾再搗羅爲末每服壹
大錢塩湯點服空心食前

治乾嘔除邪熱和胃進食安中散方

小麥炒黃壹兩乾薑剉炒壹兩甘草炙壹兩陳麴炒各壹兩
右四味搗羅爲散每服二錢匕棗湯調下

治乾嘔和胃順氣厚朴散方

厚朴去麤皮壹斤生薑半斤去麤皮切焙大棗壹升去核焙
甘草四兩

右四味川水三斗煮盡水爲度爛搗拍作
餅子焙乾再搗爲散每服壹錢沸湯點服

治乾嘔和胃氣青橘散方

青橘皮湯浸去白甘草剉各壹兩木香半兩白芷壹分桂
皮去麤皮枳殼去麤皮炒

右六味先將甘草炒微黃色後入藥同炒
褐色搗羅爲末每服二錢匕入塩沸湯點
治乾嘔和胃不氣木香散方

木香半兩丁香半兩檀香各半兩人參半兩沉香剉

白茯苓

去黑皮各壹兩

甘草

檳榔

到各一分

右八味約水多少慢火熬水盡焙乾擣羅

為細末每服一錢匕入鹽沸湯點

治乾嘔和調胃氣小丁沉丸方

丁香

半兩

沉香

甘草

炙

縮沙人

白芷

炒黃

益智

壹兩

木香

壹斤

懷香子

半兩

陳橘皮

炒各

兩

湯

浸去白

生薑

壹斤

細切入青鹽四兩

阿魏

兩

拌勻淹一宿焙乾

壹分用醋半升煎為膏

不

十一

味除阿魏

夜擣羅為末

入阿魏

膏

拌

勻

醋

煮

麵糊和丸如雞頭實大研丹

砂麝香各少許同為衣空心薑鹽湯嚼下

一丸

治乾嘔和胃下氣草豆蔻湯方

草豆蔻

去皮

藿香

用葉各半兩

丁香

壹分

白朮

半兩

桂

去

蘇皮

枳殼

去瓢炒

陳橘皮

湯

浸去

山芋

各

壹分

枳殼

炒

陳橘皮

白焙

兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞棗二

枚擘破粟米少許同煎至六分去滓食前

溫服

治胃府虛寒其氣上逆乾嘔不止人參湯方

人參 陳橘皮湯浸去白 附子炮裂去 草豆

蔻去皮各 半夏湯浸去滑 白朮炒 甘草炙

前胡去蘆頭 乾薑炮 桂去麤皮

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞

半生薑五片煎至八分去滓溫服

治乾嘔煩悶不入飲食桂參湯方

桂去麤皮 人參各半 厚朴去麤皮 縮沙人 各

兩白朮半 陳橘皮湯浸去白 乾薑炮半 甘

草炙剉

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞入粟

米并棗同煎至七分去滓溫服

治胃氣逆乾嘔不止和安湯方

陳橘皮湯浸去白 甘草炙剉 乾薑炮半

右三味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至

六分去滓溫服

治乾嘔不食參粟湯方

人參壹兩 陳粟米壹兩 生薑五兩 半夏湯洗

七漏四兩與生薑同杵碎暴乾

右四味同入銀石鍋中慢火炒令焦黃麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片大棗二枚去核同煎至七分去滓微熱服空心食前

心食前

治胃中不和氣逆乾嘔飲食不下順氣湯方

白朮二兩 白茯苓去黑皮 人參壹兩 甘草微炙 右四味咬咀如麻豆大每服三錢匕水壹

盞入薑棗同煎至七分去滓溫服不拘時候

治乾嘔氣逆不止開胃丸方

半夏麴 白豆蔻去皮 白朮 陳橘皮湯

右五味搗羅為末用生薑汁煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十九不計時候粥飲下加至三十九

治乾嘔氣逆不下飲食半夏丸方

半夏

湯洗七衛去滑焙乾壹兩

乾薑

炮半丁香壹分

右三味搗羅為末用生薑汁和為丸如菜豆大每服十九米飲下加至二十九

治胃冷乾嘔手足厥逆陳橘皮散方

陳橘皮

湯浸去白焙四兩

甘草

炙

縮沙人

白芷

各二兩

右四味麤搗篩每服四錢匕水一大盞入生薑半分同煎至七分去滓不計時候溫服

治胃氣逆乾嘔煩悶胡椒湯方

胡椒

三七粒

木香

二錢

糯米

壹合

右三味同炒以米熟為度麤搗篩分作三服每服水壹盞煎至七分去滓溫服

治乾嘔不止陳橘皮飲方

陳橘皮

湯浸去白焙

甘草

炙各二兩

草豆蔻

去皮

右三味麤搗篩每服四錢匕水壹大盞入生薑半分切同煎至七分去滓不計時候溫服

治乾嘔氣逆飲食不下平氣湯方

甘草剉厚朴去麤皮各四兩乾薑剉淨剉生薑去

切半大棗百枚

右五味用水七升同於銀石器中煮候棗熟剝去皮核再煮候水盡焙乾鱗持篩每服三錢匕水壹盞同煎至七分去滓稍熱服不拘時

拔粹方

青鎮丸治上焦吐頭發痛而有汗脉弦

柴胡兩黃芩七錢半甘草五錢半夏青兩半洗青黛

二人參錢

右為細末姜汁浸餗餅為丸桐子大每服五十九丸生姜湯下

白朮湯治胃中虛損及痰吐者

半夏麴兩白朮各錢檳榔二錢半木香 炙甘

草各壹錢茯苓二錢

右為末每服二錢生姜湯調下食前

金花丸治吐食而脉弦者由肝乘於脾而吐

乃由脾胃之虛宜治風安脾

半夏洗一兩 檳榔二錢 雄黃壹錢半

右為末薑汁浸餛餅為丸桐子大生姜湯下小兒另丸

紫沉丸治中焦吐食由食積與寒氣相假故吐而痛

半夏錢一 代赭石三錢 縮砂仁二錢 烏梅去核二錢

杏仁去皮尖一錢 丁香錢各二 沉香錢 木

香白木錢各一 橘皮錢五 肉豆蔻 巴豆霜

各半錢

右為末入巴豆霜令勻醋糊為丸桐子大每服三十丸食後生姜湯下

木香白朮散治嘔而吐食謂特實繫強是以腹中痛當和之又名丁香半夏湯

木香錢各一 丁香錢各一 半夏壹兩 白朮錢五 檳榔

二錢 茯苓錢五 炙甘草錢四

右為末濃煎芍藥生姜湯調下壹三錢

吐證

吐證有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通於天氣主內而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下通於地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪其證食已暴吐渴欲飲水大便結燥氣上衝而胃發痛其治當降氣和中中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假爲積而痛其脉浮而匿其證或先痛而後吐或先吐而後痛治法當

以小毒藥去其積檳榔木香和其氣下焦吐者皆從於寒地道也其脉沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法當以毒藥通其秘塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大便秘結而自愈也治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪宜先和中桔梗湯

桔梗 白朮 各壹兩半 夏 麴 各壹兩 陳皮 去白 茯苓 各壹兩 枳實 炒 厚朴 姜製 香

右艾咀水煎取清調木香散二錢隔夜空
腹服之後氣漸下吐漸止然後去木香散
加芍藥二兩黃耆壹兩半每壹料中叩筭
加之如大便燥結食不盡下以大承氣湯
去硝微下之少利再服前藥補之
如大便復結依前再微下之

木香散

木香

檳榔

各等分

右為細末前藥調服

厚朴九斗翻胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹
中諸疾其藥味即與萬病紫苑丸同方見傷寒門
其加減于后

春夏再加黃連

二兩秋冬再加厚朴

二兩

如治風癰不愈者依春秋加減外更加芎

蒲茯苓各一兩半

如治風癰不愈者依春秋加減外更加人

參芎蒲茯苓各壹兩半

如失精者加芎蒲白茯苓為輔

如肝之積加柴胡蜀椒為輔

如心之積加黃連人參為輔

如脾之積加吳茱萸乾姜為輔

如腎之積加菖蒲茯苓為輔 秋冬久瀉

不止加黃連茯苓

藿香安胃散治嘔吐不止

藿香葉壹兩半夏二兩陳皮二兩厚朴壹兩

蒼朮三兩甘草二兩

右為麤末每服五錢水壹盞半生姜五片

棗二枚同煎去滓溫服此經驗方

加減二陳湯治痰飲為患或嘔吐惡心或頭

眩心悸或中脘不快或發為寒熱或因食生

冷脾胃不和並宜服之

丁香壹兩半夏壹兩橘紅各五兩茯苓三兩炙甘草半兩

右咬咀每服四錢水壹盞半生姜七片烏

梅壹个煎至六分去粗熱服不拘時候治

痞疾加草豆蔻壹兩半麩裏燒熟用

南北經驗方

嘔吐

和劑方理中湯

方見諸寒門

專治胃虛感寒嘔吐

不止

醫方大成集虛補珍方
同類方永類方嘔吐霍亂

和劑方丁香附治中湯治胃冷停痰嘔吐不已

丁香

甘草

青皮

炒

陳皮

炒

人參

附子

炮

白朮

煨

乾薑

各一兩

右咬咀每服四錢水壹盞姜五片煎八分

空心熱服

醫方大成集虛熱
珍方永類方同

和劑方麝香半夏散治胃虛中寒停痰留飲

噦逆嘔吐

半夏

易洗七次炒
黃色二兩

丁香皮

半兩

藿香葉

壹兩

右咬咀每服三錢水壹盞姜七片煎七分

食前溫服

醫方大成集虛補
珍方永類方同

和劑方香薷散

方見諸暑門

治伏暑嘔吐

醫方大成集虛

補珍方永類方同

活人方生姜橘皮湯治乾嘔噦或致手足厥

冷

橘皮四兩 生姜半斤

右咬咀每服水七盞煮至三盞去滓逐旋

溫服醫方大成集成袖珍方類鈐方同

拔粹方四君子湯衛生易簡方治乾嘔噦

茯苓 白朮 人參 黃芪各乙兩

右剉如麻豆大每服壹兩水三盞生姜五

片煎至壹盞去滓溫服如吐瀉轉筋頭痛

自汗脉浮者加桂五錢 如吐瀉轉筋頭

痛無汗脉浮者加麻黃五錢袖珍方同

徐同知方養胃湯治脾胃虛冷不思飲食翻

胃嘔吐

丁香 縮砂仁 白豆蔻 人參 麥牙

粉炙○袖珍方 沉香 肉豆蔻 炮附子

橘紅 麥曲各二錢半

右爲細末姜鹽湯調下

袖珍方

嘔吐

安脾散治停飲傷胃以致食噎酸嘔吐黃水

不已

高良姜 電兩以百平塵壁 南木香 草菓

饗人參 去慮 陳皮 去白 白朮 丁香 胡椒

白茯苓 各半 甘草 炙宣

右為末每服二大錢空心米飲入搥點服

搥酒亦可 醫方大成集成

小半夏湯治諸嘔噦心下堅痞膈間有痰水

眩悸

半夏 五兩 茯苓 三兩

右咬咀每服八錢川水壹盞半煎至壹盞
入生姜自然汁投藥中更煎壹兩沸熱服
無時

永類鈴方

嘔吐

濟生丁沉半夏元治胃寒嘔吐吞酸水

丁香 一兩 乾姜 炮 陳皮 淨 半夏 制各二兩 白朮 壹兩

右細末姜自然汁打糊元梧子大每五十

元姜湯下

煙霞聖效方

香靈丸治嘔吐不止

丁香錢六五靈脂錢四朱砂錢六

右同研勻以狗膽汁丸如雞頭大每服壹

丸生姜陳皮湯下

施圓端效方

紅豆丸治諸嘔逆膈氣翻胃吐食不止方曹

忠方丁香壹胡椒貳各縮砂各二十紅豆壹

介

右為細末生薑汁為丸如皂角子大每服

壹丸棗一枚去核填藥麪裏慢火燒熟細

嚼白湯送下空心日進三服其效如神

壽域神方

嘔部

治乾嘔欲死者以半夏湯泡七次壹兩並錢

半生薑壹兩咬咀每服五錢水二鍾煎至

八分去滓食後通口服

類聚百五
一方乾嘔若手足厥冷宜食生薑此是嘔方
中聖藥也

一方橘皮二兩湯浸去穢剉以水壹升煎至
五合通口頓服

一方以雞彈去白吞中黃數枚卽愈也

一方取甘蔗汁溫令熱服壹升日三服

一方用生薑自然汁服壹升

一方飲新汲井花水數升甚妙

一方以管安鼻孔內各三寸許吹皂莢末入

鼻中令嚏出卽痊

治醋心用吳茱萸一合水三盞煎至七分去
滓頓服縱濃亦須強服近有人心如蜥破
服此方後二十年不發其效如神

一方嘔逆不能食用訶子去核二兩炒爲末
蜜丸如梧桐子大每服二十九空心生薑
湯送下

一方川檳榔四兩橘皮二兩爲末空心川生
蜜湯調服方寸匕立效

衛生易簡方

嘔吐

治嘔吐用檳榔一顆煨陳皮壹分炙為末水壹盞煎半盞服

治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯洗七次生薑壹兩水壹盞煎六分去滓分二服不拘時溫服

治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中用半夏五兩湯洗七次為末每服三錢白麵一

兩搜切作碁子水煮麩熟為度以姜醋和服

治嘔逆不能食用訶梨勒皮二兩去核炒為末蜜丸如梧桐子大空心服二十圓日二服

治嘔嘔不止不欲食用枇杷葉煮汁飲之

治嘔噦用麩醋和作彈圓二三十枚煮熟漉出浸漿水中少頃乘熱吞三兩枚加至八九枚未定晚後飯前再吞

治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止用葛根二錢半夏錢半湯洗七次甘草炙壹錢水壹盞入竹茹壹塊姜五片煎七分去滓冷服不拘時

治口中常如淡泔嘔出用大黃六兩水六升煎取二升去滓分服

全價鉤玄

嘔吐

胃中有熱有痰朱奉議以半夏生薑橘皮為

上 孫真人誤以噦為咳逆 劉河間謂

嘔者火氣炎上此特壹端耳

胃中有熱膈上有痰者二陳湯內加炒山梔

子黃連生薑煎

久病嘔者胃虛不納穀也宜用

人參 黃芪 白朮 香付

惡心 熱 痰 虛

隨証用藥 皆用生薑

御醫撮要

生氣湯療氣滯不勻胃虛痞宿冷不消心腹刺痛除脹滿噎止嘔吐惡心常服調順脾胃進美飲食

丁香

檀香

各壹兩半

乾姜

二兩 丁香皮

二兩 胡椒

二錢 塩

右件七味同杵用煨火熅令香熟乘熟入

羹器內密覆候冷碾羅作細末密收勿泄

氣每服半錢沸湯點服食前

備預百要方

理反胃吐逆消淡進飲食方

丁香

去葉 木香

各一兩 胡椒

二十 糯米

二分 焦

右細末每以壹錢水盞煎至七分和滓

頓服不計時候

乾嘔羸瘦多睡面痿黃不下食變為陋慙破

棺煎方猪膽和生薑汁以米醋半合和灌

下部中以手急捻待氣上至喉中乃除手

必下五色惡物及細赤小虫若未差更

灌不過三度忌一切毒物

乾嘔不息方 葛根汁服壹升

又水蘇煎汁服差為度

又茅香煎湯服之

又葡萄根濃煎汁細細飲之

又橡葉去脉為末五錢水壹盞煎至七分和

滓服

久嘔方 麻人三兩炒研水和取汁著塩小許

服之立効

嘔吐湯飲不下方 粟米半升擣粉沸湯和

丸如桐子大煮熟點小塩食之

食則還吐方 大黃四兩甘草二兩以水三升煮

取一升分二服

煩悶吐逆及五噎不下食方 蘆根五兩水三大

盞煮二盞去滓服露根慎不可用

嘔吐禁忌

巢氏病源

嘔吐候

養生方云八月勿食薑一云被霜瓜向冬發
寒熱及溫病食欲吐或心中停飲不消或
爲反胃

嘔吐導引

巢氏病源

嘔吐候

養生方導引法云正坐兩手向後捉腕反拓
席盡勢使腹絃絃上下七左右換手亦然
除腹肚冷風宿氣積胃口冷食飲進退吐

逆不下

又云偃卧展脛兩手左躄兩足腫以鼻內氣
自極七息除腰中病食苦嘔

又云坐直舒兩脚以兩手挽兩足自極十二
通愈腸胃不能受食吐逆以兩手直又兩
脚底兩脚痛舒以頭枕膝上自極十二通
愈腸胃不能受食吐逆

論
 五疔圓 竹皮湯 乾姜湯 通氣湯
 羚羊角湯
 千金月令
 木聖惠方
 治五膈氣諸方

論
 膈噎門
 目錄

千金方

淋淋噎塞

五疔圓

竹皮湯

乾姜湯

通氣湯

羚羊角湯

千金月令

木聖惠方

治五膈氣諸方

訶梨勒散 半夏散 前胡散 利膈散

木香散 桃花散 通中散 桂心丸

訶梨勒丸 木香丸 羚羊角丸 蓬莪

茂丸 草荳蔻丸 人參丸 郁李人丸

琥珀丸 礞砂丸 川椒丸 乾姜丸

檳榔丸 大黃丸

治膈氣咽喉噎塞諸方

羚羊角散 射干散 人參散 赤茯苓

散 陳橘皮散 柴胡散 昆布丸

治膈氣妨悶諸方

訶梨勒散 白朮散 檳榔散 大腹皮

散 紫蘇散 枳殼丸 訶梨勒丸

下膈噎門二

聖惠方二

治膈氣嘔逆不下食諸方

草荳蔻散 半夏散 白朮散 訶梨勒

散 厚朴散 丁香散 人參散 吳茱

萸散 陳橘皮散 木香丸 枳殼丸

治膈氣痰結諸方

赤茯苓散 大腹皮散 旋復花散 檳榔丸

前胡丸 芫花丸 半夏丸

治五膈氣嘔吐酸水諸方

白朮散 檳榔散 厚朴散 人參散

丁香散 陳橘皮散 半夏散 木香散

訶梨勒散 木香散 草薺薹丸 赤茯苓丸

木香丸

治氣膈心腹痞滿諸方

柴胡散 枇杷葉散 訶梨勒散 白朮散

赤茯苓丸 人參丸 沉香丸

治膈氣宿食不消諸方

厚朴散 木香散 草薺薹散 葶澄茄散

人參散 訶梨勒散 人參散 訶梨勒丸

神麴丸

治膈氣心胃中痛諸方

赤茯苓散 檳榔散 丁香散 桂心散

柴胡散 半夏散 厚朴散 枳實散

類聚百五
六五

木香丸 小草丸

治五噎諸方

人參散 半夏散 蘆根散 訶梨勒散

半夏丸 生薑汁煎

治氣噎諸方

檳榔散 半夏散 大腹皮丸

治食噎諸方

半夏散 羚羊角散 檳榔散 白朮散

半夏散 木香散 前胡丸 檳榔丸

大全本草

三因方

五噎證治

五噎散 沉香散 嘉禾散 塩津圓

五膈證治

五膈圓 寬膈圓 嘉禾散 沉香散

神巧萬全方

礪砂丸 五膈丸 訶梨勒散 丁沉香

噎病方

是齋醫方

瑣碎錄

治膈氣

嚴氏濟生方

五噎散 五膈散 瓜蒌實圓

修月魯嚴經後錄

鼎元丸

得效方

五噎

沉香散 嘉禾散 大七氣湯

五膈

寬中散

澹軒方

醫治膈氣

肘後方

澹寮方

膈噎

五膈寬中散

衛生寶鑑

隔氣噎

桂香散 丁香附子散 漢防已散 紅

豆丸

聖濟總錄

五種膈氣

緩氣丸 建中丸 豆蔻散 通膈散

備急沉香散 五膈散 豆蔻丸 萊菔

木香散 京三稜丸 硃砂枳殼煎丸

木香訶梨湯 葶撥飲 五膈丸 紫金

丹

膈氣咽喉噎塞

檳榔湯 乾燕妙功丸 人參湯 大腹

湯 萬靈木香丸 丁香丸 人參丸

安息香煎丸 導氣散 京三稜丸 通

氣湯 撞氣丸 附子丸

膈氣嘔逆不下食

沉香煎丸 丁香丸 無比丸 檳榔散

木香丸 臘茶丸 化氣丸 分氣丸

安息香丸 沉香煮散 木香散 參苓

丸 氣寶丸 五膈丸

膈氣痰結

訶梨勒湯 木肉豆蔻丸 半夏五香丸

丁香勻氣丸 藿香湯 乾薑丸 妙紅

散 茯苓湯 前胡湯 五膈丸

膈氣宿食不消

人參茯苓湯 建中湯 磨脾散 卓豆

蔻散 參麴散 附子丸 養胃丸 礪

砂丸 麥蘖散 厚朴湯

拔粹方

胃膈痞之疾

人參利膈丸 十膈氣散 玄明粉 豆

蔻散

醫方大成

五噎五膈

膈氣散 撞氣阿魏圓 奪命四生散

南北經驗方

五噎五膈

百杯丸

永類鈴方

五噎五膈

煎紅元 五膈下炆元 三乙承氣湯

四生丸 對金飲子

經驗良方

玉機微義

五噎散 五膈散 五膈寬中散

壽域神方

衛生易簡方

五噎

備預百要方

食噎方因食喉塞

餘藥無名者散見本方

食治

鍼灸

導張

尚書傳云不建良本

食割寸山食割溪

游時百要古

可也

此處有模糊文字，似為醫書內容，但難以辨認。

膈噎門一

巢氏病源 否噎病諸候

八否候

夫八否者榮衛不和陰陽隔絕而風邪外入與衛氣相搏血氣壅塞不通而成否也否者寒也言府藏否塞不宜通也由憂恚氣積或墜墮內損所致其病腹內氣結脹滿時時壯熱是也其名有八故云八否而方家不的顯其證狀范汪所錄華他太一決疑雙九方云

治八否五疝積聚伏熱留飲往來寒熱亦不
說八否之名也

諸否候

諸否者榮衛不和陰陽隔絕府藏否塞而不
宣通故謂之否但方有八否五否或六否以
其名狀非一故云諸否其病之候但腹內氣
結脹滿閉塞不通有時壯熱與前八否之勢
不殊故云諸否

噎候

夫陰陽不和則三焦隔絕三焦隔絕則津液
不利故令氣寒不調理也是以成噎此由憂
患所致憂患則氣結氣結則不宜流使噎噎
者噎塞不通也

久寒積冷候

此患由血氣衰少府藏虛弱故令風冷之氣
獨盛於內其冷氣久積不散所以謂之久寒
積冷也其病令人羸瘦不能飲食久久不瘥
更觸犯寒氣乃變成積聚吐利而嘔逆也

腹內結強候

此由榮衛虛弱三焦不調則令虛冷在內蓄積而不散也又飲食氣與冷氣相搏結強而成塊有上有下或沉或浮亦有根亦無根或左或右也故謂之腹內結強久而不瘥積於年歲轉轉長大乃變成癥瘕病也

聖惠方

五膈氣論

夫五膈氣者謂憂膈恚膈氣膈寒膈熱膈也

憂膈之病胃中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦全無氣力恚膈之爲病心下苦實滿噫輒醋心食不消心下否澁積結在於胃中大小便不利氣膈之爲病胃脇逆滿咽塞不通噫聞食鼻寒膈之爲病心腹脹滿欬逆膈上苦冷臍腹雷鳴食不生肌熱膈之爲病藏有熱氣五心中熱口爛生瘡骨煩四肢重脣口乾燥身體頭面手足或熱腰背疼痛胃痺引背水穀不消不能多食羸瘦少氣此是五

膈形證也經云陽脉結謂之膈言憂恚寒熱動氣傷神而氣之與神並爲陽也傷動陽氣致陰陽不和而腑藏生病結於胃膈之間故稱爲膈氣衆方說五膈牙有不同聖濟總錄其發之原不越於此也有十膈證各不同大抵但傷動之由有五故云五膈氣也

嚴氏濟生方

五噎五膈論

素問云陽脉結謂之膈蓋氣之與神並爲陽

也逸則氣神安勞則氣神耗儻或寒溫失宜
食飲乖度七情傷感氣神俱擾使陽炁先結
陰氣後亂陰陽不和臟腑生病結於胃膈則
成膈氣留於咽嗑則成五噎五膈者憂恚寒
熱炁也五噎者憂恚勞食炁也其爲病也令
人胸膈痞悶嘔逆噎塞妨礙飲食胃痛徹背
或脇下支滿或心忡喜忘咽噎炁不舒治療
之法調順陰陽化痰下炁陰陽平勻氣順痰
不膈噎之疾無由作矣又有下虛氣上推膈

令人心下堅滿痞急肌中苦痺緩急如刺不
得俛仰名曰胃痞熱下然則胃下以成熱矣
儒門事親
凡十膈五噎浪分支派疏
病派之分自巢氏始也病失其本亦自巢氏
始也何者老子曰少則得多則惑且俗謂噎
食一證在內經若無多語惟曰三陽結謂之
膈三陽者謂大腸小腸膀胱也結謂結熱也
小腸熱結則而脉燥大腸熱結則後不固膀胱

熱結則津液涸三陽既結則前後闕滯下
既不通必反上行此所以噎食不下縱下而
復出也謂胃爲水穀之海日受其新以易其
陳一日一便乃常度也今病噎有三日五日
或五七日不便是乖其度也亦明矣豈非三
陽俱結於下廣腸枯涸所食之物爲咽所拒
縱入太倉還出喉嚨此陽火不下推而上行
也故經曰少陽所至爲嘔涌溢食不下此理
豈不曉然又氣厥論云肝移寒於心爲狂膈

中注陽與寒相薄故隔食而中不通此隔陽與寒爲之也非獨專於寒也六節藏象又云人迎四盛以上爲格陽王太僕云陽盛之極故隔拒而食不得入正理論曰格則吐逆故膈亦當爲格後世強分爲五噎謂氣憂食思勞也後又分爲十膈五噎其派旣多其惑滋甚人之溢食初未必遽然也初或傷酒食或胃熱欲吐或胃風欲吐醫氏不察本原火裏燒薑湯中煮桂丁香未已豈菘繼之葦撥木

已胡椒繼之雖曰和胃胃本不寒雖曰補胃胃本不虛設如傷飲止可逐飲設如傷食止可逐食豈可言虛便將熱補素問無者於法猶非素熱之人三陽必結三陽旣結食必上潮醫氏猶云胃寒不納燔鍼鑽肉炷艾灼肌苦楚萬千三陽轉結分明一句到了難從不過抽薪最爲緊要揚湯止沸愈急愈增歲月弥深爲醫所誤人言可下退陽養陰張眼吐舌恐傷元氣止在冲和閉塞不通經無來路

腸宜通暢是以鳴腸腸既不通遂成噎病世傳五噎寬中散有薑有桂十膈散有附有烏今予既斥其方信乎與否以廳後賢或云憂恚氣結亦可下乎余曰憂恚礧礧使同大醫太倉公見此皆下法廢以來千年不復今代劉河間治鬲氣噎食川承氣三湯獨超近代今用藥者不貫主用將謂風狂嗜嗜冰晒及觀其効猶昧本原既懶問咨妄與非毀今予不恤姑示后人用藥之時更詳輕重假如闕

久慎勿陡攻蹤得攻開必慮後患宜先潤養小著湯丸累累加之開局自透其或咽噎上阻涎痰輕用苦酸微微涌出因而治下藥勢易行設或不行蜜鹽下導始終勾引兩藥相通結散陽消飲食自下莫將芭豆耗却天真液燥津枯留毒不去人言此病曾下奪之從下奪來轉虛轉痞此爲芭豆非大黃牽牛之過箕城一酒官病嘔吐踰年不愈皆以胃寒治之丁香半夏青陳薑附種種燥熱燒錐燎

艾莫知其數或小愈或復劇且十年大便澁燥小便亦黃命予視之予曰諸痿喘嘔皆屬于上王太僕云上謂上焦也火氣炎上之氣謂皆熱甚而爲嘔以四生丸下三十行燥糞腸垢何啻數斗其人昏困一二日頻以冰水呷之漸投涼乳酪芝麻飲時時嚥之數日外大啜飲食精神氣血如昔繼生三子至五旬而卒

十形三療

隔食中滿

遂平李官人妻病咽中如物塞食不下中滿他醫治之不効戴人診其脉曰此痰膈也內經曰三陽結爲膈王啓玄又曰格陽云陽盛之極故食格拒而不入先以通經散越其中後以舟車丸下之凡三次食已下又以芡蕡散再越之健啖如昔日矣

澹寮方

夫膈噎之證最難治亦未易識也大槩氣鬱於胃膈而生痰飲每爲阻礙遇飲食則膈而不下食而不久又和痰飲吐山或誤認爲翻胃或噫食酸臭似有宿食藥圓硬物則吞不下膈此之謂五膈愚嘗療二三貴人者有此疾或用嘉禾散五膈散或更灸中脘并氣海穴繼之以下氣化痰之劑悉有效而不能速安須靜自將理而後可矣又有纔飲食入咽噎而阻礙多致吐出者謂五噎尤難治之令

備錄諸家之說以待審察而用藥云

噎病不在外不在內不屬冷不屬熱不是實不是虛所以藥難取効此病緣憂思恚怒動氣傷神氣積於內氣動則諸證悉見氣靜則疾候稍平捫之而不得疾之所在視之而不知色之所因聽之而不知音之所發故針灸服藥皆不獲効此乃神意間病也頃京師一士人有此證勸令淨觀內住將一切用心力事委之佗人服藥方得効若不如此恐卒不

能安孫真人云婦人嗜慾多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑儻有斯狀則療之尤難

雞峯方

永類鈴方

五噎五膈

諸方論皆以順氣化痰溫脾養胃順調陰陽氣順痰消誠是此七情內傷脾胃鬱而生痰痰與氣搏升而不降是氣爲濁氣非得於天之清氣者人人有此清氣而清氣常不足濁

氣常有餘清氣多濁氣少病自不生痰不必化脾胃不待溫養也若必順化溫養則濁氣者愈撓而不能清矣支派疏論之極詳且驗別刊于后昔先君子患此惜見此疏之晚其後先兄得此疏於湖口以歸方悟前所用者皆順化溫養之劑病已危困過期而不得用矣哀哉

脉病證

治

蘇合香元和姜汁

氣

飲食必於靜
處噫噦胸背
痛

四七湯 七氣湯
二陳湯 溫膽湯
四磨湯 濟生五
噎散 三因沉香散
簡易四磨飲子

七情

憂

喜怒哀憂憶傷
肺大便不和
或微嗽

分心氣飲磨沉香四
磨湯 聖惠半夏
散大便不通賓郎
散煩悶大伏皮散

之氣

留於思噎

情思不樂面
青淨心怔忡
目視眩眩

參香散 聖惠昆布
元 木香元

則成勞

傷神體瘦異
生料嘉禾散
胃丹

濟生

五噎

食

飲食生冷或
與津液結為

五膈元有椒附者噉
食痕又陳皮連白
乙兩青代姜黃各
半兩為末蒜汁浸

痕為膈虫

蜜元彈子大嚼化

永嘉中僧患瘡死弟子開胸得魚指大無目
養之盆中後投青靛迺化為水此迺生痕飲
食所致

跌陽脈

閉塞胸脇滿

局方五膈寬中散

丁沉透膈湯生

緊而澀

氣

噫聞食臭

嘉禾散御院十

膈散通膈散濟

難治

生五膈散大倉

七情

之氣

結於

胃脘

憂

氣結煩悶津分心氣飲磨沉香
液不通羸瘦 五膈寬中散
之氣 三因沉香散 聖

心下實滿簡易分心氣飲磨沉

噫輒醋心 香二陳湯加枳實

痞澁大小 枳殼四磨飲下胸

志膈

則成
五腸

寒

使不利

痞濟生瓜婁實元
百一選安脾散

腹脹欬逆局方膈氣散丁香煮

膈上苦冷散御院十膈散濟

腹鳴生靈砂元楊氏安

合元本事附子散

百一選附子草菓

飲仁齋丁香煮散

集成丁香附子散

熱

藏熱五心支派疎四生丸 三

中熱口爛乙承氣湯 調理

生瘡四支對金飲子 聖惠

或熱大黃丸 羚羊角

通見嘔散 六味賓郎散

吐胃熱紫蘇散 枳殼元

門胃熱濟生竹茹湯

又附子丁香散

玉機微義

論膈噎治病之因

丹溪云胃爲水穀之海脾爲消化之器清和則健而運行世人以痰飲胃吐諸氣多服香熱之藥偏助氣血沸騰其始也胃液凝聚其久也脾氣耗散傳化漸遲又以烏附丹劑服之積久血液俱耗胃腕乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物難入間或可入人亦不多名之曰噎其槁在下與胃爲近食雖可入難盡入胃良久復出名之曰膈亦曰反胃大

便秘小若羊矢然名雖不同病出一體或曰千金治噎膈反胃未嘗廢姜桂等藥何吳子之多言也予曰氣之鬱滯久留清道非借香熱不足以行然悉有大黃石膏竹茹芒硝澤瀉前胡朴硝茯苓黃芩蘆根瓜萆等藥爲之佐使其始則同其終則異也病邪易伏其病自安

論五噎五膈

嚴氏云五噎五膈者由喜怒不常七情傷於

脾胃鬱而生痰痰與氣搏升而不降飲食不
下蒸氣留於咽喉者則成五噎結於胃膈者
爲五膈五噎之名憂思勞食氣也五膈之名
憂恚寒熱氣也其病令人胃膈痞悶嘔逆噎
塞妨礙飲食治法調順陰陽化痰下氣陰陽
平勻氣順痰下則病無由作矣

按膈噎之證皆由氣聚成積自積成痰痰
積之久血液俱病以其爲病在咽在膈故
前人立膈噎二者之名三因方又分五噎

五膈病狀徒有其名爲治則一而已故不
敘焉又嚴氏爲化痰下氣之說夫氣之不
下痰之不化必有爲病之因苟不治其本
而專以香燥之藥治其標痰氣何由而自
下也

論三陽結爲膈病

子和云內經曰三陽結謂之膈三陽者大小
腸膀胱也結謂熱結也小腸熱結則血脈燥
大腸熱結則不圖膀胱熱結則津液涸三陽

既結則前後閉滯下既不通必反上行所以噎食不下縱下而復出也此陽火不下推而上行也故經曰少陽所至爲嘔涌溢食不下此理明矣後世強分爲十膈五噎其派既多其惑滋甚人之溢食初未遽然也或傷酒食或胃熱欲吐或胃風欲吐醫者不察本原投下香桂胡椒丁香之屬設如傷酒傷食正可攻逐豈可言虛便將熱補素熱之人三陽必結食必上潮醫氏猶云胃寒不納燔針灼艾

三陽轉結歲月弥深遂成噎病世傳五噎寬中散有姜有桂十膈散有附有烏其可用乎今代劉河間治膈氣噎食承氣三陽獨超近代用藥之時更詳輕重假如閉久宜先潤養小著湯丸累累加之關局自透其或咽噎上阻痰涎微用酸苦涌出因而治下藥勢易行設或不行寧塩下導結散陽消飲食自下莫將巴豆耗却天真

按此論三陽結爲膈病力闢世俗言胃冷

用熱藥之誤可謂明矣但用藥專指承氣而言則失之太峻蓋此藥有實熱者可用之其有脾胃衰虛并血液枯竭之人皆在所禁也

論噎爲諸氣所致

鍼經曰怒氣所至食則氣逆而不下勞氣所至爲咽噎病爲喘促思氣所至爲中痞三焦閉塞爲咽嗑不利

論噎塞由陰中伏陽所致

發明日噎者六腑之所生陽也氣也塞者五藏之所生陰也血也二者皆由陰中伏陽而作也

謹按噎爲七情所發或因三焦傳化失常所致此卽主於氣也或血液所虧胃脘乾槁或血積所致卽皆因於血也塞由填塞不通之義故發明有治幽門不通噎塞不便通幽湯例蓋陽無陰不能施化陰之失位而陽伏其中傳化不變而反上行矣然

人有所擊撲墜跌內致血瘀忽卽吐而食不能納此由氣血俱傷所可見也大抵始由炁致者初當從炁治之由血致者當從血治之豈可類川香熱之劑反耗炁血耶但世俗拘泥不能究乎病情遂成危證也悲夫

千金方

噦塞

五噦圓治胃中久寒嘔逆逆炁食飲不下結

炁不消方古今錄驗云五噦者炁噦憂噦勞噦食噦思噦炁噦者心悸上下不通噦噦不徹胃脇苦痛憂噦者天陰苦厥逆心下悸動手足逆冷勞噦者苦炁膈脇下支滿胃中填塞令手足逆冷不能自溫食噦者食無多少惟胃中苦寒常痛不得喘息思噦者心悸動喜忘目視眈眈此皆憂恚嗔怒寒炁上入胃脇所致也

乾薑

蜀椒

食茱萸

桂心

人參各

五

分細辛 白朮 茯苓 附子各四 橘皮

分六

右十味為末蜜和丸如梧子大以酒服三
九日三不知稍加至十九

又方治五種之氣皆令人噎方

人參 半夏 桂心 防風一作防葵 小草

附子 細辛 甘草各二兩 紫苑 乾薑

食茱萸 芍藥 烏頭各分 枳實壹兩

右十四味為末蜜丸如梧子大以酒服五

九日三不知加至十五丸烏頭與半夏相
反但去壹味合之

竹皮湯治噎聲不出方

竹皮壹用 細辛各二兩 甘草 生薑 通草

人參 茯苓 麻黃 五味子 桂心各壹

兩

右十味咬咀以水壹斗煮竹皮減二升去

竹皮下藥煮取三升分三服

乾薑湯治飲食輒噎方集驗名 半夏湯

乾薑 石膏各四兩 栝藎根集驗作人參

桂心各二兩 半夏 小麥各壹升 吳茱萸二升 甘

草壹兩 赤小豆三十粒

右十味咬咀以酒五升水壹斗煮棗二十

枚去滓合煮取三升分三服

通氣湯治胃滿氣噎方

半夏八兩 生薑六兩 桂心三兩 大棗三十枚

右四味咬咀以水八升煮取三升分五服

日三夜二

羚羊角湯治氣噎不通不得食方

羚羊角 通草 橘皮各二兩 厚朴 吳茱

萸 葶藶各三兩 烏頭五枚

右七味咬咀以水九升煮取三升分三服

日三

又方杏仁 桂心各三兩

右二味為末蜜丸如棗大稍稍咽之臨食

先含弥佳

治卒噎方神巧萬全方 滿口著蜜食之千金

月令肘後方
舍少許蜜
即下方同
經驗良

又方神巧萬全
方卒食噎
拾取飯盆邊零飯壹粒食之

即下方同
經驗良

又方神巧萬全
方卒食噎
刮春杵頭細糠舍之即下神

驗
經驗良方備預百要方同

治諸噎方常食乾粳米飯即不噎

又方末火炭蜜丸如彈子大舍少少咽即下

又方老牛涎棗核大水中飲之終身不復噎

千金月令神巧萬全
方肘後方同

千金月令

主卒噎及咽方右飲新汲水細細咽之

聖惠方一

治五膈氣諸方

夫五膈氣者壹曰憂膈二曰恚膈三曰氣膈

四曰寒膈五曰熱膈此皆寒溫失宜食飲乖

度或恚怒氣逆思慮傷心致使陰陽不和胸

膈否塞故名膈氣也

治五膈氣胸中煩滿否塞不通心腹虛脹心

下結實飲食不下訶梨勒散方

訶梨勒壹兩煨木香三分人參三分去青橘

皮半兩湯浸厚朴三分去麤皮塗生沉香

兩益智子半兩桂心兩檳榔兩枇杷葉兩

拭去毛華澄茄兩赤茯苓兩高良薑兩

炙微黃白荳蔻半兩白木兩前胡壹兩去甘草兩

炙改赤到

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候熱

服○聖濟總錄訶梨勒煨去木香各一人

參青橘皮湯浸去白厚朴去麤皮生薑沉

香剉益智皮去桂皮去蘆榔剉枇杷葉炙去

華澄茄赤茯苓高良薑白豆蔻皮白

米各半前胡壹兩甘草半兩右壹十七

味麤搗篩每服三錢匕水壹盞人生薑三

片同煎至七分去滓熱服不以時候

治五膈氣噎悶飲食不下宜服半夏散方

半夏一兩湯洗木通壹兩桂心兩赤茯苓

一陳橘皮二兩湯浸檳榔二兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹小
蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候
稍熱服

治五膈氣噎胸脇逆滿每食即氣塞不通前

胡散方

前胡壹兩蘆頭壹兩半夏壹兩湯洗陳橘皮二兩湯浸
去白焙桂心壹兩訶梨勒皮壹兩
右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蒸入生薑半分煎至六分去滓不計時候
稍熱服
治五膈氣胸心氣滯滿悶不通宜服利膈散
方

郁李人四兩湯浸去皮了擣研如膏看多
作餅子於鐵木香半兩厚朴半兩去麤皮塗
上博令黃色木香檳榔半兩陳橘皮半兩湯浸
熟肉豆蔻半兩檳榔半兩訶梨勒皮壹兩甘草壹分炙桂心半兩麝香半兩
訶梨勒皮壹兩微赤到桂心麝香半兩
細研

右件藥搗細羅爲散入麝香研令勻不計時候以生薑湯調下二錢

治五膈氣壅塞不通木香散方

木香壹兩吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾訶梨勒壹兩

皮桃人半兩湯浸去皮尖麝香壹分

右件藥搗細羅爲散不計時候以熱酒調

下二錢

治五膈氣食飲不下漸將羸瘦桃花散方

桃花二兩嘗檳榔三兩縮沙二兩馬牙消二兩

吳茱萸壹兩湯浸七遍焙乾微炒

右件藥搗細羅爲散每日不計時候以熱

酒調下壹錢

治五膈氣胃中不利藏腑壅滯宜服通中散

方

牽牛子壹兩半檳榔三分桂心壹分乾薑壹分

剉木香壹分

右件藥搗細羅爲散每服以熱酒調下二錢空腹可二服續續更以壹兩盞熱茶投

之得利三兩行下得惡物為效

神巧萬全方同

治五膈氣咽喉不利難下飲食背背俱悶或時嘔噦桂心丸方

桂心 湯浸去皮尖雙 訶梨勒皮

木香 洗去鹹味 琥珀 細研 陳橘皮 湯浸去白瓢焙

白朮 去 乾木瓜 去 沉香 已上各 雞舌香 一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以生薑湯下二十丸或丸如彈子大絲裹壹丸不問早晚含化嚥

津亦得

治五膈氣久不下食心胸妨悶多吐酸水訶

梨勒丸方

訶梨勒皮 二兩 乾薑 壹兩炮 甘草 半兩炙 枳

殼 壹兩 蘇子 炒 桂心 壹兩 陳橘皮 二兩 湯浸 檳

榔 壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如彈子大每日不問早晚常含壹丸嚥津如患甚即將一九以煎湯嚼破服

治五膈氣心胸壅噎食不能下木香丸方

木香一兩肉荳蔻一兩訶梨勒皮二兩檳榔壹兩

桂心一兩麝香壹錢

右件藥搗羅為末入麝香研勻鍊蜜和搗

三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候

以牛薑橘皮湯下二十九

治五膈氣胸心妨悶食少胃虛四肢無力

羚羊角方

羚羊角屑壹兩人參壹兩訶梨勒皮二兩

心一兩乾薑半兩甘草半兩赤茯苓二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以橘皮湯下

三十九

治五膈氣胸膈不利腹脇脹痛胃氣虛弱食

飲不下蓬莪茂丸方

蓬莪茂一兩訶梨勒皮二兩白朮一兩桂心二兩

薑壹兩炮赤茯苓二兩陳橘皮二兩湯浸木

香壹兩甘草半兩微赤剉

香壹兩甘草半兩微赤剉

香壹兩甘草半兩微赤剉

香壹兩甘草半兩微赤剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三
十九

治五膈氣飲食難下胃膈噎悶四肢不利草
荳蔻丸方

草荳蔻皮去附子炮裂去遠志去桂心細

辛乾薑炮裂川椒去目及閉口者微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如彈子大不計時候含一丸嚥津

治五膈氣心胃不利痰飲留滯宿食不消或
為霍亂心痛醋心心腹氣滿積冷時多人參
丸方

人參三分去頭甘草三分微赤剉赤茯苓三分乾薑

三分炮桂心三分細辛三分赤芍藥三分訶梨勒

皮壹兩檳榔兩陳橘皮壹兩厚朴兩

去龕皮塗生薑草荳蔻壹兩
汁炙令香熟去皮

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以生薑棗湯

下二十九如似有物在咽喉中即取十九併成一丸含化燕津

治五膈氣心胃氣壅宿食不消腹胃脹滿大腸祕澁郁李人丸方

郁李人一兩湯浸去皮微炒漢椒半兩去目及閉

口者微人參半兩去甘草壹分炙桂心半兩

乾薑半兩炮細辛半兩赤芍藥半兩陳橘皮壹兩

湯浸去厚朴一兩去麤皮塗生薑汁胡椒

白麩焙厚朴炙令香熟○總錄二兩胡椒

兩附子半兩炮裂川大黃碎二兩判木香一

訶梨勒皮二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以熱酒下三

十九神巧萬金方同

治五種膈氣喉咽不利心胃壅塞食少無力

琥珀丸方

琥珀壹兩細研檀榔壹兩木香壹兩訶梨勒皮壹兩陳

橘皮壹兩湯浸去白麩焙五味子半兩桂心壹兩桃人半兩

湯浸去皮尖雙川大黃碎壹兩判半夏湯壹洗

七偏昆布半兩洗去鹹味枳殼壹兩麩炒微黃去瓢白朮壹兩

右件藥搗羅為末入琥珀研勻鍊蜜和搗

三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候

煎生薑棗湯下三十丸

治五種膈氣壅滯氣逆心腹脹痛宿食不消

宜服礪砂丸方

礪砂壹兩沉香壹兩木香壹兩訶梨勒皮壹兩附

子壹兩裂去皮半兩檳榔壹兩乾薑壹兩炮桃人

皮壹兩天雙人麩炒微黃

右件藥搗羅為末入礪砂同研令勻鍊蜜

和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計

時候以生薑湯下二十九

治五膈氣逆腹脇妨悶羸瘦著床往來寒熱

腹中不調或利或嘔四肢少力宜服川椒丸

方

川椒一兩去目及閉桂心壹兩食茱萸半兩

辛二兩乾薑半兩訶梨勒皮壹兩厚朴二兩

皮壹兩塗生薑汁遠志半兩杏仁半兩湯浸去

炒微黃木香半兩附子半兩炮裂去皮臍當歸半兩判微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下二十九

治五膈氣心痛咽中如有物吐之不出食飲

漸少乾薑丸方

乾薑壹兩炮裂到麥門冬壹兩半去心焙附子半兩炮裂去皮

臍細辛一兩川椒半兩去目及閉遠心半兩

甘草半兩炙人參壹兩去蘆頭食茱萸一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下

二十九

治五膈氣或宿食不消或為霍亂或心腹疼

痛腹脹不思飲食宜服檳榔丸方

檳榔一兩桂心一兩乾薑一兩炮裂到赤茯苓壹兩判

梨勒皮一兩白荳蔻半兩去皮陳橘皮壹兩湯浸

甘草壹分炙人參半兩去蘆頭枳實半兩炒微黃細

辛半兩厚朴一兩去蘆皮塗生

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下三十丸

治五膈氣胃背俱悶不下飲食宜服此方

陳橘皮二兩湯浸去白瓢焙川朴消壹兩木香一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下三十丸

治五膈氣吐逆食飲不下心胃氣壅滯宜服此方

丁香二兩生薑壹斤酒壹中

右件藥相和令勻以文火熬成膏不計時候以熱酒調下半匙

治五膈氣心胃噎塞背悶不食方

訶梨勒皮十枚煨五枚用大腹子十枚五枚煨用五枚

右件藥搗細羅為散每服二錢如茶煎服之

治五膈氣大黃丸方

川大黃剉碎訶梨勒農用皮已

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以溫水下二十九以微利為度

治膈氣咽喉噎塞諸方

夫膈氣者由胸中氣結煩悶津液不通飲食不下是也凡陰注於內陽結於外謂之隔也皆憂恚寒熱動氣傷神氣之與神並為陽也傷動陽氣致陰陽不和藏腑生病結滯於胸膈之內上搏於咽喉之間或壅或塞不得宣

通故言膈氣咽喉不利也

治膈氣不順上攻咽喉噎塞或加煩熱四肢疼痛羚羊角散方

羚羊角屑壹兩柴胡壹兩赤芍藥壹兩訶梨

勒皮壹兩桑根白皮壹兩半夏三分大

腹皮壹兩枳實三分川大黃壹兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服之

治膈氣咽喉噎塞全不下食射干散方

射干三分湯洗半夏七分偏去滑甘草半兩炙剉訶梨

勒皮三分木通三分剉枳實三分微炒桂心三分雞

舌香三分紫蘇子三分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服之

治膈氣咽喉噎塞心神虛煩難下飲食人參

散方

人參三分去甘草半兩炙剉射干壹兩陳橘皮

三分湯浸羚羊角三分桂心半兩訶梨勒皮

去白烏梅壹兩去核微炒

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服之

治膈氣咽喉噎塞心胃滿悶不下飲食赤茯

苓散方

赤茯苓壹兩桑根白皮壹兩剉枳實壹兩微炒

陳橘皮一兩湯浸去白瓢焙人參壹兩去蘆頭木香三分甘

草三分炙射干三分大腹皮一分

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治膈氣因食即噎寒如有肉癢在咽中不下

陳橘皮散方

陳橘皮壹兩湯浸去白瓢焙檳榔壹兩桔梗壹兩去木

通三分赤茯苓壹兩百合三分羚羊角屑壹兩

馬蘭子壹兩紫苑壹兩射干三分枳殼三分

麩炒微甘草半兩炙黃夫微亦判

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治膈氣全不思食或食即欲嘔咽中噎寒食

稍難下宜服此柴胡散方

柴胡壹兩半桔梗三分榔三分榔三分榔三分

湯洗七訶梨勒皮三分赤茯苓三分陳橘皮一分

湯浸去桂心半

白朮焙 桂心半
右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍
熱服

治膈氣咽喉噎塞全不思食肩背氣壅四肢

煩疼昆布丸方

昆布二兩洗去鹹味 羚羊角屑壹兩 陳橘皮壹兩湯洗去白
蘇赤茯苓壹兩 木香壹兩 射干壹兩 旋復花壹兩 前
胡蘆頭二兩去 川升麻壹兩 郁李人二兩湯浸炒 桔

梗二兩去頭 紫苑一兩去苗土

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二
十九

治膈氣咽喉噎塞食飲不下方

半夏一兩湯洗七遍去滑 乾薑一兩炮裂 昆布二兩洗去鹹味

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中
盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
稍熱服神巧萬全方同

又方右以確背上一細糠蜜丸如彈子大不計時候含壹丸細細嚥津項碎錄肘後方衛生易簡方同

治膈氣妨悶諸方

夫膈氣妨悶者由憂恚思慮冷熱不調氣結胃中上下否隔飲食噎塞津液不通虛冷之氣攻迫咽喉故令妨悶也

治膈氣妨悶不能下食吐逆煩喘訶梨勒散方

訶梨勒皮一兩木香三分陳橘皮一兩湯浸去白瓢焙五

味子三分半夏七分湯洗人參三分去桂心

三分赤茯苓一分蘆根一兩枳殼三分麩炒微黃去麩

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治膈氣不散胃中噎塞不下食時時妨悶日

木散方

白朮半兩半夏壹兩湯洗青橘皮三分湯浸

赤茯苓壹兩大腹皮壹兩人參半兩去白麩焙枇杷

葉一兩拔去木香兩前胡二兩去檳榔壹

厚朴壹兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治膈氣心胸妨悶不能下食檳榔散方

檳榔三分前胡壹兩去桂心兩郁李人湯三分

去皮草薺半兩川大黃壹兩微炒枳殼三分

微炒乾薑半兩炮木香三分甘草一分炙

薑去乾薑裂炮木香分甘草微赤到

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治膈氣心胸壅滯妨悶大腹皮散方

大腹皮剉赤茯苓木香丁香芎藭

白朮沉香陳橘皮湯浸去人參去

草薺皮厚朴去薑皮塗生薑桂心已上

兩甘草壹分炙微赤到

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

人生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

治膈氣胃中妨悶痰壅不下食紫蘇散方

紫蘇莖葉二兩陳橘皮一兩湯浸半夏壹兩湯洗

七漏枳殼二分麩炒柴胡二兩檳榔一兩赤

茯苓壹兩桂心壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服神巧萬全方同

治膈氣心胸妨悶常欲嘔吐湯水不下方

桑根白皮壹兩桃人壹兩湯浸去皮木

香半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治膈氣脹滿喫食妨悶脚手煩疼漸加羸瘦

四肢無力枳殼壹兩方

枳殼壹兩麩炒木香一兩檳榔壹兩麥門冬壹兩

半去 羚羊角屑壹兩 赤芍藥一兩 赤茯苓二兩

心焙 胡蘆頭二兩

右件藥搗羅為末，鍊蜜和搗，二三百杵，
如梧桐子大，每服不計時候，以粥飲下，三
十九

治膈氣心腹妨悶不能下食訶梨勒儿方

訶梨勒皮二兩 檳榔壹兩 木香壹兩 陳橘皮壹兩

去白 五味子壹兩 川芒消壹兩

右件藥搗羅為末，以酒煮麵糊和丸，如梧

桐子大，不計時候煎生薑棗湯下，二十九

醫方類聚卷之一百五