

中藏經
下

華元化撰

中藏經目錄

應靈洞主探微真人少室山鄧處中序

第一卷

人法於天地論第一

陰陽大要調神論第二

生成論第三

陽厥論第四

陰厥論第五

陰陽否格第六

目錄

寒熱論第七

虛實大論第八

上下不寧第九

脈要論第十

五色脈論第十一

脈病內外證訣第十二

生死要論第十三

病有災恠第十四

水法有六第十五

火法有六第十六

第二卷

風中有五生五死第十七

積聚癥瘕雜蟲第十八

勞傷論第十九

傳尸第二十

論五臟六腑寒熱虛實死生逆順之法第二十一

論肝臟虛實寒熱生死逆從脈證之法第二十二

論膽虛實寒熱生死脈證之法第二十三

論心臟虛實寒熱生死逆順脈證之法第二十四
論小腸虛實寒熱生死逆順脈證之法第二十五
論脾虛實寒熱生死逆順脈證之法第二十六

第三卷

論胃虛實寒熱生死逆順之法第二十七

論肺臟虛實寒熱生死逆順之法第二十八

論大腸虛實寒熱生死逆順之法第二十九

論腎臟虛實寒熱逆順生死之法第三十

論膀胱虛實寒熱逆順生死之法第三十一

論三焦虛實寒熱逆順生死之法第三十二

論痺第三十三

論氣痺第三十四

論血痺第三十五

論肉痺第三十六

論筋痺第三十七

論骨痺第三十八

論治中風偏枯之法第三十九

論五疔狀第四十

癰瘡論第四十一

第四卷

論腳弱狀候不同第四十二

論水腫脈證生死疾第四十三

論淋瀝小便不利第四十四

古之與今有餌得火者第四十五

論三痞并方第四十六

辨上痞候并方

辨中痞候并方

辨下痞候并方

論療治有下汗吐補交錯致於死候第四十七

論診雜病必死候第四十八

第五卷

察聲色形證決死法第四十九

藥方

曼應丸

大靈洽傳戶明月丹

解勞生肌進食治血養心地黃煎圓

癥瘕

通氣阿魏圓方

諸氣不通胸背痛結塞悶亂宜服醉仙丹治偏枯不遂皮膚
不仁

破黃七神丹

暴喘欲死方

暴喘喉閉氣欲絕

駐顏長算百補病交藤圓

瘡方通神乳香膏

一切氣漏麝香圓

治厥陰面目俱青心下硬四肢冷細而欲絕破棺散

治陽厥發狂將成疽俗腸湯

起卒死救生丹

脾厥吐瀉霍亂

治心脾卒痛不忍

左慈真人千金地黃煎

太上延年萬勝追魂散治勞瘦垂死方

葛玄真人百補交精圓

扁鵲玉壺丸

療百病延壽酒

解一切毒玉霜圓

三瘡吐血黃疸三黃丸

救百物入咽喉鯁欲死方

第六卷

三茱丸治小腸氣痛

金鈴丸治小腸氣一服立愈

燒肝散治久年差心勞日瘡

補心丹治因驚失心或因思慮過當心氣不寧狂言妄語叫
呼奔走

椒紅圓治嗽不止及補中益氣進食

碯砂圓消積溫中順氣治風痰利胃膈尤治傷生冷嘔逆泄
瀉

強中圓治氣消食益脾胃進飲食

養胃丹治脾胃不和全不思飲食中脘停寒嘔逆惡心臍寒
泄痢腹痛腸鳴常服溫中養胃散思飲食

五皮散大治男子婦人脾胃停滯頭面四肢悉腫心腹脹滿

上氣促急曾膈煩悶痰涎上壅飲食不下行步氣奔狀如水
病先服此藥能疎理脾氣消退虛腫切不可亂服瀉水等藥
以致脾元虛損所患愈甚此藥平良無毒多服不妨

立效散治腰痛

香芎散治一切頭風

古鄉古敗散治頭風血風又名荆芥散

再甦丹治骨節疼痛語言不正行步艱難手足掉搖拽沉香
飲子治痞氣升降陰陽

礞石丸治脾積滯氣酒食所傷飲食不化惡心嘔逆胸膈不

快不思飲食胸腹脹滿臍脇有塊心脾冷痛口吐酸水停飲
冷痰痞癥痕發痛無度翻胃轉食而黃瘦之四肢頭面浮
腫臟腑不調裏急後重及十膈氣虛中有積婦人血氣塊硬
悉皆主之

紫沈消積丸

五勝散治四時傷寒冒風身熱頭痛昏倦寒痰咳嗽及中滿
傷寒三日以前服無不效

治傷寒咳逆噎汗尋常亦可服

如聖散治一切無異色瘡腫消毒併閃肭折傷接骨定痛活

痛經一
金
養血脈已破者不可用

第七卷

治惡瘡發背

神效乳香膏治一切瘡腫生肌止痛名金露

金屑丸亦名黃圓子治傷風頭痛肌熱大效

白散子治發背候取下毒無次用清涼膏貼之

清涼膏治發背等先用白散子取之次用此藥貼之

妙應膏治疥癬

治惡瘡金瘡刀斧傷見血方

治嵌甲累效

治惡瘡疥癬

佛手膏治膿窠瘡神效

治發背一切癰疽金石藥毒發

貼瘡白膏藥

接骨散治折傷

治金瘡妙方

治內損吐血

越桃散治下血及血利

灸肝散逐胃中風邪益脾進食凡人虛弱用補藥日久漸至
瘦損食少倦怠大便頻數泄漏服此無不取效妙

地黃散牢牙去齒病

治牙痛神驗

治牙痛及馬疳

治風氣攻注牙齒腫痛

治喉閉及腫痛

絳雪治喉閉

碧雲治口瘡如咽喉痛腫卽含化

烏龍散治骨槽風牙垠腫有奇功

治口瘡

治喉閉牙關不開者

白龍散治風毒赤爛眼眶倒睫冷熱淚不止滴水和爲雞頭
大圓子亦得

清中湯治暑氣中渴

皂角散治五腫腸風瀉血下痢糞前有血號外痔糞後有血
號內痔大腸不收號脫肛穀道四面有努肉如孪號舉痔頭
上有孔號漏竝治之

白龍散治消渴

神驗柴胡散治大人小兒骨熱夜間如蒸甚者不過十數日
見效

△ 聖餅子治咯血

治產後惡心

艾煎圓治婦人經脈不止

△ 治血山崩甚者

治產後發熱無憂散

治腫毒

治大人小兒偏墜服訖以石壓之

神應烏玉丹治丈夫婦人久新腸風痔瘻着牀頭痛不可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或疼熱道周回多生硬核此是痔如破是瘻只下血是風皆因酒色氣風食五事過度卽成此疾人多以外醫塗治病在腸內有蟲若不去根本其病不除此藥的有神效不可細述

治小兒癩

第八卷

常山湯治妊娠患瘡

常山湯治同前

鐵罩散安胎如神

失笑膏治婦人產後血不快刺痛等症

催生治危急神效

白朮丸治小兒白瀉

木香丸治小兒喫食大早遂成疳疾腹脹疳瀉及釀肚等病

玉柱杖散治小兒疳瘦

沉香養脾丸

佛手膏治眼生翳膜并努肉赤脈攀睛翳暈冷熱淚下及眼

眶赤爛等方

治小兒乳癖胃腹高喘急吐乳方

神朮散治傷風頭痛聲重

理大腸一切下血

治婦人懷妊多墮方

花紅散治惡瘡大效方

治喉閉

治腸風下血

治一切癰疽地黃膏兼治毒蟲所傷

萬全金花散理發背疽瘡疼痛不可忍者凡腫在脊骨邊根
株如椀蓋天上面有細頭子如粟米粒白色其間亦有如石
榴子者卽疽瘡也

治陰瘡

治吹爛

治風痰眩暈二烏丸

治風癩

治風艸牙

木香餅子

治癩癧

貼已破者

金瘡藥

神仙眼藥并種空青法

種空青法

治胞損小便不禁

治喘嗽上氣

蒲頰葉治一切肺喘劇甚者效如神

治蛇傷

換骨丹治一切卒中手足頑麻腰膝沈重左癱右瘓截四時
傷寒婦人血刺產前產後每一粒酒一盞碎搥浸至夜溫動
化散臨睡和滓服小兒驚搐米飲化半丸

作膏法

治痢疾神效香栗飲子

治爛眶風眼

華佗內照法附

中藏經卷第五

漢華佗元化撰

上虞徐舜山重校

察聲色形證決死法第四十九

凡人五臟六腑榮衛關竅宜平生氣血順度循環無終是爲不病之本。若有缺絕則禍必來矣。要在臨病之時存神內想息氣內觀。心不妄視。著意精察。方能通神明。探幽微。斷死決生。千無一誤。死之證兆具之於後。

黑色起於耳目鼻上。漸入於口者死。

赤色見於耳目額者。五日死。

黑白色入口鼻目中者五日死

黑或如馬肝色望之如青近則如黑者死

張口如魚出氣不反者死

循摸衣縫者死

妄語錯亂及不能語者死熱病即不死

尸臭不可近者死

面目直視者死

肩息者一日死

面青人中反者三日死

面無光。牙齒黑者死。

面青目黑者死。

面白目黑者十日死。

面赤眼黃。卽時死。

面黑目白者八日死。

面青目黃者五日死。

眉系傾者七日死。

齒忽黑色者三十日死。

髮直者十五日死。

遺尿不覺者五六日死

唇口乍乾黑者死

爪中青黑色死

頭目久痛卒視不明者死

舌卷卵縮者死

面黑直視者死

面青目白者死

面黃目白者死

面目俱白者死

中藏經

面目青黑者死。

面青唇黑者死。

髮如麻。喜怒不調者死。

髮眉如衝起者死。

面色黑。脇滿者不能反側者死。

面色倉黑。卒腫者死。

掌腫無紋。臍腫出。囊莖俱腫者死。

手足爪甲肉黑色者死。

汗出不流者死。

倉脈經
正蒼

卷五

三

唇反人中滿者死

陰陽俱絕目匡陷者死

五臟內外絕神氣不守其聲嘶者死

陽絕陰結精神恍惚撮空裂衣者死

陰陽俱閉失音者死

榮衛耗散面目浮腫者死

心絕於腎肩息回盼目直者一日死

肺絕則氣去不反口如魚口者三日死

骨絕腰脊痛腎中重不可反側足膝後平者五日死

有誤

腎當作

腎絕大便赤澁下血耳乾脚浮舌腫者六日死又曰足腫者九日死

脾絕口冷足腫脹泄不覺者十二日死

筋絕魂驚虛恐手足爪甲青呼罵不休者八九日死

肝絕汗出如水恐懼不安伏臥目直面青者八日死又曰
卽時死

胃絕齒落面黃者七日死又十日死

凡此察聽之更須詳酌者矣

藥方

曼應圓

甘逐 三兩

芫花 三兩

犬戟 二兩

巴豆 二兩
去皮

乾漆 二兩

皂角 七挺
去皮

大黃 三兩
煨

三稜 三兩

蓬莪茂 二兩

檳榔 一兩

木通 一兩

當歸 五兩

雷丸 一兩

黑牽牛 五兩

桑白皮 二兩

五靈脂 五兩

硃砂 三兩

訶子 一兩
煨熟去麩

澤瀉 二兩

梔子仁 二兩

右各洗丁細剉入米醋二升浸三日入銀石器中慢火熬令

醋盡焙乾再炒黃黑色存性入後藥同為末如後

木香 肉桂 陳皮白去 丁香 青皮白去 肉豆蔻

黃芪 白朮 沒藥 附子炮裂去皮 臍各一兩 芍藥

川芎 白牽牛炒 天南星水煮 鱉甲醋製浸 炙令黃

熟地黃酒浸 一宿 牡丹皮 赤茯苓

芸薹子炒 乾薑各二兩 炮裂去皮

右同為末醋糊丸菉豆大用在後須至誠靜室中合方驗也

結胸油漿水下七丸未動再服

積癰食癥水下三丸

水氣通身腫茯苓湯下五丸

膈噎丁香湯下三丸

因積成勞驚用湯下二丸

腹下一切痛醋湯下七丸

小腸疝癖茴香湯下三丸

大小便不通蜜湯下五丸

心痛茱萸湯下五丸

卒死以小便下七丸

白痢乾薑湯下一丸

下當作

赤痢甘草湯下一丸

胃冷吐食丁香湯下二丸

大靈治傳尸明月丹

按大靈者蓋天靈

雄黃半兩

兔糞二兩

天靈蓋一兩

驚甲製一分

木香半兩

輕粉一分

右為末用法酒一大升大黃半兩熬膏入煎藥為丸彈子大

硃砂為衣傳尸勞肌瘦面黃嘔吐咳嗽不定先燒安息香

令烟盡吸之不嗽非傳尸也不可用此藥若烟入口咳而

不能禁止乃尸也宜用此藥五更初服勿使人知以童子

按法酒者加酒而釀酒也史記有法酒與此義不同

初當作
補

小便同酒共一盞化一九服之如人行二十里止吐出虫
其狀如燈心而細長及寸或如爛李又如蝦蟇狀各不同
未効次日初服以應為度

解勞生肌進食活血養心地黃煎丸

生地黃汁五升

杏仁汁五升

生薑汁五升

藕汁五升

薄荷汁五升

鵝梨汁一升

法酒二升

沙蜜四兩

右慢火熬成膏入後藥

柴胡三兩洗去蘆

木香

人參

懸下疑
脫抄字

洞當作
洞

茯苓

山藥

栝子仁

微炒
另研

遠志

去心

白朮

枳殼

各一兩浸去
濃切麩黃

秦艽

二兩洗
去蘆

桔梗

熟地黃

四兩酒浸
一宿切焙

麝香

半兩
細研

右丸如桐子大每日食後甘草湯下二十九

癥瘕

大黃

濕紙
裏煨

洞砂

三稜

濕紙裏煨
乘熱細切

乾漆

炒至
烟盡

巴豆

去皮出油
各一兩

入醋一升熬成膏入藥如

後

木香

丁香

枳殼去穰切
麩炒黃

官桂各一兩半

右同丸如菜豆大米湯下三丸

通氣阿魏丸方

阿魏二兩酒熬

沉香一兩

桂半兩

黑牽牛一兩炒

右將阿魏先熬成膏次入前藥和丸如櫻桃大硃砂為衣一

丸酒化下諸氣不通胸背痛結悶亂宜

醉仙丹治偏枯不遂皮膚不仁

麻黃水煮焙乾為末一兩

天南星七箇炮

黑附子三箇炮去皮

地龍七條去土

右除麻黃先為末次將麻黃末入酒一升熬成膏入前末丸

如彈子大每日食後臨臥酒化一兩汗出效偏枯不遂皮

膚不仁者皆由五官虛氣風寒暑濕之邪蓄積在中久而

不散乃成疾焉

破黃七神丹

朴硝五斤

硃砂五兩

大黃七兩濕紙裏煨

梔子二兩

豆豉半升以絹袋盛之

甘遂二兩

臙粉 一兩

右水二斗熬令水盡除甘遂鼓梔子大黃只取朴硝硃砂粉末丸彈子大每一丸水化下以吐瀉為度

暴喘欲死方

大黃 一兩濕紙裹煨

牽牛 二兩炒

右為末蜜水調二錢立止此方治上熱痰喘虛肺寒冷胃不

可用

暴喉閉氣欲絕

乾漆 炒冷烟筒子吸之

駐顏長算祛百病交藤丸

何首烏 即交藤根也用
一斤赤白者

茯苓 五兩
牛膝 二兩

右蜜丸酒下三十九忌食猪羊血

瘡方通神乳香膏

乳香

沒藥

血竭

臘 一兩

黃丹

木鱉子 二兩

膩粉 三錢

烏賊魚骨 二兩

不灰木 四兩

五靈脂 二兩

海桐皮 二兩

瀝清 四兩

油 八兩
熬用

巴豆下
疑脫有
存

厥陰當作陰厥

命合霍

一切氣滿麝香丸古秘方無巴豆血竭止痛破血生肌肉及血

不止

麝香 一錢

乳香 一分

巴豆 十四箇去皮出油

右棗肉同丸任瘡上

治厥陰面目俱青心下硬四肢冷脉細而欲絕破棺散

硫黃 一兩酒煑

硃砂 一兩研

右二味酒丸鷄頭大入室中勿令人知同病人身長掘一坑

深一尺入粟稭火燒坑子極熱醋五升沃令氣出衣被鋪

坑以酒化一九服之後合病人坑上臥少時汗出治陽厥

發狂將成疸浴腸湯

大黃 四兩濕 紙裏煨

大青 一兩

梔子 二兩

甘草 一兩 炙

右水五升煎去二升內朴硝五合熬去一升分四升量虛實

之

起卒死救生丹 此方不可服

大黃 半兩濕 紙裏煨 膩粉 半兩

硃砂 一分

雄黃 一分

巴豆 七箇去 皮出油

右用鯽膽汁九雞頭大用童子小便下一九擗開口灌之內

鯽當作

按四升 義難解 蓋四分 之謂乎 服上疑 脫久字

口 歲 經 卷五

十

大葱尾一寸許入鼻中如人行五七里當吐出涎即活

脾厥吐瀉霍亂

附子 炮裂去皮臍

生薑

甘草 炒

豆豉 等分

右用水半升藥末二錢棗七箇生薑一片煎至一觔溫服

治心脾卒痛不可忍

木香 一兩

蓬朮 一兩

乾漆 炒至烟盡一分

右醋湯調下一錢立止

左慈真人千金地黃煎

生地黃一秤取汁熬八地黃未酒九下二十九

太上延年萬勝追魂散 治勞瘦垂死方

人參 杏仁去皮 天靈蓋一兩炒

柴胡一兩 川椒一分去目微炒出汗 柳桃心一小握

右用童子小便一升末一兩煎冷熟空心日午各一服五日

効

葛玄真人百補交精丸

熟地黃四兩酒浸一宿切焙乾秤 山藥二兩

五味子六兩 杜仲三兩去麤皮剉碎炒斷絲

口 癩 卷一 卷三
菘蓉 二兩酒浸一宿焙乾秤

牛膝 二兩去蘆剉寸酒浸一宿焙稱

澤瀉

茯苓

山茱萸

遠志 去心

巴戟

赤石脂

柏子仁 微炒另研

石膏 各一兩火燒冷赤出火毒

右蜜丸桐子大空心酒下二十九男女服之

扁鵲玉壺丸

硫黃 一斤桑灰煖入坑子內去火毒了細研如麩

右湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服十九

療百病延壽酒

黃精 四斤

天門冬 三斤

松葉 六斤

枸杞 五斤

蒼朮 四斤

水三碩煮一日

右熬如釀酒法空心服之

解一切毒玉霜丸

牙硝 半斤

朴硝 半斤

鵬砂 四兩

白礬 二兩

右四味火溶成汁傾入一地坑子內爲末龍腦二兩研水半

盞合生蜜調一錢小兒量虛實服

三硝吐血黃疸三黃丸

黃連 三兩

大黃

一兩濕 紙裹煨

黃芩

二兩

右煉蜜丸桐子大用熟水下十五丸食後服臨臥

救百物入咽喉鯁欲死

茯苓

貫衆

甘草

右等分米飲調一錢

中藏經卷第五終

中藏經卷第六

漢華佗元化著

上虞徐舜山重校

○三茱圓治小腸氣痛

山石吳茱萸各一兩

金鈴子取肉并皮一兩

青皮去穢

舶上茴香

馬蘭三味各一兩

右七味逐味於銀銚內炒令香為末酒餉圓如梧桐子大每疾作鹽酒下三五十圓久年不差五七服可除根本

○金鈴圓治小腸氣一服立愈

牽牛子炒

青皮去白

良薑各等分

川練子

舶上茴香各半兩

玄胡索一兩

右為細末生薑自然汁煮麵餲圓如梧桐子大硃砂為衣每

服三十圓燒綿為灰浸酒下不計時候

○燒肝散治久年不差心勞口瘡

銀州柴胡去蘆

白朮

紅芍藥

牡丹皮

蒼朮已上五味各一兩

人參

黑附子炮去臍皮

石斛去浮膜三味各半兩

右同爲細末用獐猪肝薄批去血水摻藥在土勻徧以荷葉
裏定濕紙包之慢火煨令過熟空心食前米飲下此藥有
奇功

○補心丹治因驚失心或因思慮過當心氣不甯狂言妄語叫呼
奔走

硃砂 一分

雄黃 一分
并研

白附子 一錢
爲末

右拌勻以猪心血圓如梧桐子大更別以硃砂爲衣每服二
圓臨臥用人參薑蒲湯下常服一粒能安魂魄補心氣鎮

神靈

○椒紅圓治嗽不止及補中益氣進食

小椒 揀淨二兩去目炒過出汗用

乾山藥 一兩

川附子 一兩炮去皮臍

右同為細末以好酒煮淡木苳和之再入臼中杵三五百下

圓如桐子大每服十五二十圓空心食前鹽湯溫酒任下

泄瀉米飲下如喉中痰涎如水雞聲曉夕不止者一兩服

見効

○縮砂圓消積溫中順氣治風痰利胸隔尤治傷生冷嘔逆泄瀉

天南星 四兩湯浸洗七遍切焙乾秤

良薑 四兩

縮砂仁 一兩

右爲細末生薑自然汁煮麵餬圓如梧桐子大每服十五圓
或二十圓擦生薑浸湯下不計時服

○強中圓治氣消食益脾胃進飲食

白朮或蒼朮

陳皮去穢

乾薑炮

良薑油炒

青皮去穢

右等分同爲細末湯浸蒸餅搗去水和圓如梧子大每服三

五十圓

○養胃丹治脾胃不和全不思食中脘停寒嘔逆惡心臍寒泄痢
腹痛腸鳴常服溫中養胃散飲思食

丁香 半兩

白豆蔻仁 半兩

人參 三分

甘草 半兩

乾薑 三兩炮用乾生薑尤佳

半夏麩 半兩

右同為細末煉蜜為圓每兩作十圓每服一圓溫湯化下空

心食前服之或細嚼湯下亦可造麩法半夏不以多少湯

浸洗七遍焙乾搗羅為末用生薑汁和作餅子焙乾用之

○五皮散大治男子婦人脾胃停滯頭面四肢悉腫心腹脹滿上

氣促急胸隔煩悶痰涎上壅飲食不下行步氣奔狀如水病

先服此藥能疎理脾氣消退虛腫切不可亂服瀉水等藥以

致脾元虛損所患愈甚此藥平良無毒多服不妨

生薑皮

桑白皮

陳橘皮

大腹皮

茯苓皮 各等分

右為麤末每服參錢水一盞半煎至八分去滓不計時候溫

服忌生冷油膩硬物

○立効散治腰痛

玄胡索

當歸

官桂

右等分酒調細末二錢七服

○香芎散治一切頭風

香附子 半斤炒去毛

川芎 二兩

甘草 一兩炙

石膏一兩
研

右爲細末每服一錢臘茶荆芥湯點服食後

○古鄉古敗散治頭風血風又名○荆芥散

荆芥穗一斤

乾菊花半斤

川芎四兩

白木三兩

右同爲細末食後茶調二錢此藥明目去風

○再甦丹治骨節疼痛語言不正行步艱難手足戰掉搐拽

川烏頭二兩

草烏頭一兩

五靈脂四兩

右爲末滴水爲圓如鷄頭大每服一圓研碎人酒一盞生薑

三片地黃三條乳香少許同煎至七分臨卧通口服喫了
須摩擦患處冷熱徹以助藥力如合時入乳香末一二錢
卽煎時更不須入

○沉香飲子治痞氣升降陰陽

沉香
木香
羌活
獨活

人參
桑白皮微炙
白茯苓

紫蘇葉已上各等分

右咬咀爲麤末每服三大錢水一盞半大棗二箇薑五片煎
至七分去滓食前溫服一滓又作一服

溫服下
疑脫日
存

○礞石圓治脾積滯氣酒食所傷飲食不化惡心嘔逆胸膈不快

不思飲食胸腹脹滿臍脇有塊心脾冷痛口吐酸水停飲冷

痰痞癥瘕發痛無度翻胃轉食面黃瘦乏四肢頭面浮腫

臟腑不調裏急後重及十高氣虛中有積婦人血氣塊硬悉

皆主之

礞石 一兩用米醋
參升化開

巴豆霜 二兩半二味同
入醋煮兩食久

青礞石 半兩研

京三稜 一兩醋浸一宿煨二
味次入煮半食久入

前醋 中煮

白麵 二兩酒半升化右一
味次入煮半食久

大黃 一兩半分三分一生一炒
煨右次入煮半食久

木香 以下並
為細末

入前醋
中煮五
字疑衍

檳榔

肉豆蔻

肉桂

猪牙皂角去皮

乾薑炮

丁香

蓬莪朮

芫花醋浸一宿炒
微令有煙

右九味各一兩

青皮

白豆蔻

好墨燒冷八
分過

右三味各半兩

胡椒一分

粉霜一分
研

右次第煮了次入木香等一十四味熬成膏圓如棗豆大每

服三圓酒飲薑湯雜下

○紫沈消積圓

沉香一兩
為末

阿魏一分
研

沒藥一兩
研

巴豆霜四錢

礞砂一兩
已上藥用酒蜜約度多少
一處熬成膏子然後撲藥

硃砂

丁香

乾薑已上各
半兩

硫黃

青皮

高良薑

檳榔

木香

人參

胡椒

官桂已上各
一兩

右為末將熬下膏子搜藥勻和為圓如梧桐子大每服五圓

至七圓橘皮湯下食後臨卧常用一兩圓更看虛實加減

五勝散治四時傷寒冒風身熱頭痛昏倦寒痰咳嗽及中滿傷

寒三日以前服無不効

甘草炙

石膏

白朮

五味子各一兩

乾薑三分炮

右五味同為細末每服二大錢水一盞入生薑二片棗子二

箇同煎至七分去滓溫服中滿以鹽煎傷風頭痛加荊芥

煎不計時候服

○治傷寒咳逆噎汗尋常亦可服

丁香

柿蒂各一錢

甘草

良薑各半錢

右為末用熱湯猛點乘熱一服効

○如聖散治一切無異色瘡腫消毒併閃肭折傷接骨定痛活養
血脉已破者不可用

赤小豆一升

川烏頭一兩

草烏頭一兩
炮

乳香半兩

芸臺子一兩

右件同爲細末每用一錢入白麵一錢瘡腫用水調稀煮一

兩沸放溫攤紙花上貼患處傷折用醋調骨損用黃米粥

調依患處大小貼之上用帛子纏繫或以沙木篋夾五日

一換六十日當差

中藏經卷第七

漢華佗元化撰

上虞徐舜山重校

治惡瘡發背

燒車螯

蘆殼

無有竹根伐

黃蘗

甘草

右等分爲末先以青鹽薄荷園荜櫨葱煮漿水湯洗瘡男子

以婦人婦人以男子唾調前藥塗之以赤水出爲度

神效乳香膏治一切瘡腫生肌止痛一名金露

芝麻油

四兩

黃丹

一兩半

乳香

二分

伐當
代之作

中藏經卷第七

羊同骨髓四兩

麝香少許

一方用沒藥一分代乳香

右件藥一處入磁器內用文武火燉之成膏用綿濾過入磁

合收之八黃蠟半兩

金屑圓亦名黃圓子治傷風寒頭痛肌熱大效

大天南星五箇

半夏二兩洗七遍

石膏二兩

甘草

鬱金一兩

右為末以生薑自然汁為圓如雞頭大每服二圓傷寒頭痛

荆芥茶下四肢厥冷燈焰上燒存四分性服大便不通大

無字疑
荷

戟湯下小便不通大黃湯下破傷風豆淋酒下常服茶清

下並嚼嚙

白散子治發背候取下毒無次用清涼膏貼之

白附子

大香附子

各半兩

半夏

一分薑製

黑牽牛

二兩半生半炒令熟

大甘遂一分

以大麥炒候麥黃赤色去麥不用須極慢火炒之

右為末量患人虛實加減每服二錢以蜜酒調下續飲溫酒

一兩蓋侯所苦處刺痛為度微利三五行瀉出惡物即差

次用膏藥貼之氣盛者一服二錢餘更裁度

清涼膏治發背等先用白散子取之次用此藥貼之

川當歸 二兩

香白芷

木鱉子肉

白芨

芍藥

黃蘗

白歛 各一兩

乳香 別研

膩粉 各少許

白膠 少許

黃丹 五兩

右用情麻油十兩 煎前 六味候紫色去之入槐柳枝各七寸再

煎少頃又去之入黃丹五兩熬成入乳香等重綿濾入罐

子內貯之用如常貼使

妙應膏治疥癬

藺茹

藜蘆

右等分爲籠末油煎焦黑去滓入黃蠟就成膏塗擦之

治惡瘡金瘡刀斧傷見血方

右降真香爲末貼之入水並無妨絕妙

○治嵌甲累效

硃砂一錢

乳香一錢

膩粉半錢

橄欖核三箇燒灰存性

黃丹一字

右爲末入生油調先以鹽湯洗淨揩乾傅之兩上効

治惡瘡疥癬

按嵌甲 因靴窄 研損爪 甲陷入 四邊腫 嗽黃水 流出侵 淫相染 五指濕 爛漸漸 引上腳

跌打癰疽
四起如
湯滾火
燒日夜
倍增不
能作動
者是也

巴豆

一十一粒油煎令沸去巴豆不用

蛇床

蘭茹

右後二味等分細末入輕粉少許用巴豆油調傅之及指痒

處

佛手膏治膿窠瘡神効

大戟

細辛

蛇床子

各一兩

雄黃

白膠香

青州蝎

黃蘗

黃丹

各半兩

白礬

一錢

右爲末以清油八兩熬煙出次下去皮巴豆四七粒槐枝二

七截候焦取去不用次下黃蠟一兩松脂二兩次下煎

味末以槐枝不住攪成膏磁合內貯又名紫霜膏

○治發背一切癰疽金石藥毒發

右以紫背車螯大者鹽渥固濟火煨通紅放冷取出研爲極細

末地上出火毒一宿以甘草膏子圓如梧桐子每服三五

十圓甘草湯下日進三服第三日取下惡物用後藥貼之

貼瘡白膏藥

右以寒水石不以多少火煨通紅入磁器中封口令蜜沉并

中一宿取出研極細以臘月豬脂和如膏稀稠得所自瘡

赤盡處塗之闊一指許上以薄紙爲花子中心留一孔財

定漸次赤退卽遙遷移近裏至愈紙花孔子外所留紙令
與所塗藥闊狹等

接骨散治折傷

黃狗頭骨

一箇以湯去毛便以湯連皮去之炭火煨過去泥爲細末

官桂末

牡蠣亦泥固煨

右三味各爲細末每用狗骨末五錢八牡蠣末三錢官桂末

二錢並炒以糯米粥鋪絹帛上方摻藥在粥上裏損傷處大

段折傷者上更以竹并夾之少時卽痒不可抓之輕以手拍

三兩日效

治金瘡妙方

右以石灰不以多少和人血作餅厚兩指許風乾旋切傳之

治內損吐血

右以飛羅麵微炒以濃磨墨一茶脚二錢許服立効

越桃散治下血及血利

越桃 梔子也

槐花

青州棗

乾薑

右等分燒存性為末陳米飲調下二錢

灸肝散逐胃中風邪益脾進食凡人虛弱用補藥日久漸至瘦

損食少倦怠大便頻數泄漏服此無不取効妙

茶脚下
疑脫和
字

白朮

白芍藥

山白芷

桔梗各四兩

右各生爲細末。用不八水。獺猪肝五兩。作小片子。或塊子。拌藥十五錢。細切葱白二寸。鹽一錢。同拌肝。令勻。以竹簽子作串。慢火炙香熟。啖之。米飲送下。空心食前各一服。渴勿喫冷水。半月必安。

地黃散。牢牙去齒病。出僧文瑩
湘江野錄

歌曰

猪牙皂角及生薑。西國升麻熟地黃。木律旱連槐角子。細

辛荷葉要相當。荷葉取心用青鹽等分同燒煨。研殺將來使最

良。擦齒牢牙髮鬢黑。誰知人世有仙方。

治牙痛神驗

草萆撥

木驚子去殼

右先研木驚子令細。入萆撥同研令勻。隨左右鼻內搐之。每

用一豆許。

治牙痛及走馬疳

右用頭髮乾饑。用剃面刀子細切銚內。慢火燒存性為細末。

搽患處。

饑疑
誤

○治風氣攻注牙齒腫痛

藁本

剪草

細辛

右等分爲麤末。每服三錢。水二大盞。煎至一盞半。以下乘熱

嗽之。過微覺痛。少頃自止。

○治喉閉及腫痛

白梅 二十五箇取肉

白礬 一錢

甘草 一錢

生草麻 四十九粒去皮

右同研勻。和圓如雞頭大。以綿裹含化。

○絳雪治喉閉

礪砂皂大一塊

白礬同上

馬牙硝一分

消石四兩

黃丹兩半

新巴豆六枚

右用麤磁小碗兒一箇。先煨令熱。下前四味。次下丹。次下巴

豆。仍將巴豆先打破。逐箇旋下。候焰盡。又下一箇。八蛇退

皮一條。自然燒化。以砂攪成汁。候結硬。未成。每用少許。以

筆管吹在患處。

碧雪治口瘡。如咽喉痛腫。卽含化。

焰硝二兩

甘草二兩不炙生用

青黛兩半

礪蠶兩半

右爲細末取黃牛膽汁和之令勻。卻入膽內當風吊曬。月合過百日中用。

烏龍散治骨槽風牙垠腫有奇功

右用不蛙皂角不得搥破。只剗取去皂子。卻入和皮尖杏仁一箇。在皂子處燒存性。研細。每一兩八青鹽二分。令勻。不計時揩牙用。

治口瘡

用五倍子爲末。摻瘡上。

治喉閉牙關不開者

右以白殭蠶微炒為末。生薑自然汁調下一錢。如神效。

○白龍散治風毒赤爛眼眶。倒睫冷熱淚不止。滴水。和為雞頭大。

圓子亦得。

白鱸粉一兩

銅礫一錢別研入

右同再研勻。每用半錢。百沸湯化開。以手指洗眼。

湯當作

○清中湯治暑氣中渴

陳皮二兩

甘草一兩蜜炙焦黃脆可折

乾薑半兩濕紙裏煨

右為末。每服二錢。水一盞。煎至八分。溫冷喫。湯點水調。皆可。

按努肉
二字和
劑作努
肉者可
也

皂角散治五種腸風瀉血下痢糞前有血號外痔糞後有血號
內痔大腸不收號脫肛穀道四面有弩肉如妳號舉痔頭上
有孔號漏並皆治之

黃牛角鯁一箇

蛇蛻一條

猪牙皂角五箇

穿山甲

右四味同入瓷瓶內黃泥封固候乾先以小火燒令煙出方

用大火煨令通紅為度取出攤冷杵羅為末患者先用胡

桃肉一箇分作四分取一分臨困時研細如餅溫酒調下

便睡先引蟲出至五更時溫酒調下藥末二錢至辰時更

進一服。取下惡物。永除根本。

○白龍散治消渴

寒水石生

甘草半生半炙

葛粉各等分

右件為細末。每服二錢。濃煎麥門冬苗湯。調下服立止。

○神驗柴胡散。治大人小兒骨熱。夜間如蒸。甚者不過十數日見

效。

土柴胡

不以多少去蘆洗淨炙黃色不令太焦亦不須銀州者

右為末。每服二錢。水一盞。入地骨皮指面大二片子。同煎至

七分。食後溫服。如虛瘦但空心服補藥。食後煎下。數服時

時如水飲之。

○聖餅子治咯血

青黛

錢一

杏仁四十粒

去皮尖以黃明蠟煎黃色取出研細

右二件再同研勻。卻以所煎蠟少許。鎔開和之。捏作錢大餅子。每服用乾柿一箇。中破開。入藥一餅。令定以濕紙裏。慢火煨熟。取出。以糯米粥嚼下。

○治產後惡心

白朮

分一

生薑

減半

右並咬咀水一盞。煎至七分。溫服。知神。

艾煎圓治婦人經水不止

金毛狗脊

一兩去黃毛

威靈仙

一兩

良薑

一兩

熟艾二兩

糯米餬和日乾為末一法用醋熬焙乾亦可為末

赤芍藥

一兩

附子

半兩炮

右為末以藥一半同醋煮麵餬和餘一半藥末為圓桐子大

每服十圓温酒下食前空心服

治血山崩甚者

右以凌霄花焙乾為末酒下三錢立止晝夜不定者一服效

治產後發熱無憂散

虎鼻一兩

生地黄半斤切

右將地黃於銀器中炒煙盡。合地上出火毒。乳鉢內研為末。每一兩虎魄末二錢。勻合。用童子小便與酒中半。調下一錢。

日三服。

治腫毒

天南星生為末

白礬研細

右等分新汲水調塗。乾再掃之。

治大人小兒偏墜服訖以食壓之。

防風

官桂研細辛 疎者

右等分爲末酒調二錢

○神應烏玉丹治丈夫婦人久新陽風痔瘻着床頭痛不可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或疼穀道周回多生硬梗此是痔如破是瘻只下血是風皆因酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸內有蟲若不去根本其病不除此藥的有神效不可細述

櫻櫚

亂髮

各二兩

猬皮

四兩

猪蹄甲

一十四箇須後腳者

牛角腮

二兩

槐角

一兩半

苦練樹

根二兩半洗淨

雷圓

脂麻

各一兩揀淨

真麝香

二錢

滴乳香

半兩

右除乳麝二香別研細外。並細剉入藏瓶。或沙合子不固濟。

周回用熟炭火煨。烟才盡便去火。

全在體度煨未有則殺納不細煨過則藥無力

入二香同研勻。無灰醇酒打麵糊為圓如梧桐子大。每服

八粒。先細嚼胡桃一枚。以溫吞下。空心晚食前。日二服。如

病甚日三服。切忌服別藥。不過三兩日。永除根本。

○治小兒妳癖

右以芥子不以多少研成膏。攤紙花子上。貼疼硬處。坐中效。

中藏經卷第七終

中藏經卷第八

漢華佗元化撰

上虞徐舜山重校

◎常山湯治妊娠患瘡

常山 二兩

甘草 一兩

黃芩 三兩

烏梅 十四箇

石膏 八兩 並研

右以酒一升二合漬藥一宿。煮三四沸去滓。初服六合。次服四合。又次服二合。發前次第服之。今但抄伍大錢。漬酒一

盞。

◎常山湯治同前

常山 三兩

竹葉 三兩

石膏 八兩

杭米 一百粒

右以水六升。煮取二升半。分三服。第一服未發前待食久服之。次臨發時服。餘一服以塗頭額及胸前伍心。藥滓置頭邊。當日勿近水。及進飲食。過發時乃飲粥。此二方皆大湯劑。今但抄五大錢。水一盞半。煎至七分服。

◎鐵單散安胎如神

右以香附子炒去毛令淨。爲細末。濃煎紫蘇湯調下一錢。

○失笑膏治婦人產後血不快。刺痛等症。

五靈脂 蒲黃

右等分爲細末。每服二錢。米醋半盞同熬成膏。再入水一盞煎至七分。熱服痛如失。

◎催生治危急神妙

朱砂半兩 乳香一兩

右爲末。端午日猪心血圓梧子大。乳香湯下一粒。并治小兒斑豆不出。

◎白朮圓治小兒白瀉

白朮 當歸 芍藥 木香減半

右等分爲末。煉蜜圓如菉豆大。每服十圓十五圓。不拘時候。米飲下。

◎木香圓治小兒喫食太早。遂成疳疾。腹脹疳瀉及釀肚等病。

木香

沈香

青皮

去白各一錢

肉豆蔻

一箇麵裏煨

牽牛

二錢炒

右爲細末。醋麩餵圓如麻子大。二三歲兒服三粒。五六歲服

五七粒。濃煎蘿蔔湯下。

玉桂杖散治小兒疳瘦

黃耆

人參

白茯苓

右等分爲末每服一錢水一盞煎至六分呷之不拘時

○沉香養脾圓

人參 白朮 川麴薑炮

甘草炙 木香 丁香

肉豆蔻煨 麴裹 縮砂八味各半兩 沈香一分

右爲細末煉蜜圓一兩作十粒每服一粒嚼下食前服化下

亦得

○佛手膏治眼生翳膜并努肉赤脉攀睛翳暈冷熱淚下及眼眶

赤爛等方

醫方

日 裁 經 卷八 三

乳香 真者研半字

硃砂 半字研

麝香 一字研

當歸 半錢剉細

黃連 一錢去鬚稱剉細

白礬 半字飛過研細

白砂蜜 四兩須白砂者佳

青鹽 一字光明者研

右除蜜先將上七件於乳鉢內研爛同蜜一處拌勻入新竹筒內用油紙兩三重以線繫扎定口勿致水入放淨鍋內添水煮竹筒自早至午時破竹筒傾藥以新綿或重絹濾過入藥於瓷瓶子內牢封埋地坑內經宿取出點之用銅柱點每點了合眼少頃復以溫淨水洗之翳膜嫩者是近

退下當
入隨藥
下
警
警當作

年生者當五七次隨藥退下。翳老者頻點旬日退下即効。
○督內瘀肉不過兩三日。隨藥以銅柱刮落翳肉。自然綻斷。
此方不謬累驗。

○治小兒乳癖胸腹高喘急吐乳方

右以不入倉黑豆七粒。去皮研極細。滴水七偏和成作七丸。
以青黛末袞之令徧。更用白麵和作皮裏藥。慢火煨熱。去
麵再研細。別入膩粉生腦子麝香各少許。再滴水丸作七
丸。每服一丸。臨卧溫水送下。兒子小嚼破無妨極効。

○神木散治傷風頭痛聲重

蒼朮

四兩

川芎

一兩

藁本

二兩

炙甘草

一兩

右咬咀每服二錢水一盞生薑二片同煎至七分通日服不

拘時候

◎理大腸一切下血

取雄黑豈

緊小長者是

不以多少微以皂角湯浸發動炒熟去皮

為細末煉猪脂為丸如梧桐子大每服二十九丸陳米飲熟

水皆得服甚妙

◎治婦人懷妊多墮方

熟艾

五斤米醋三斤煮乾焙為末

木鱉子

五箇研細

大赭石

二兩米醋
碎七遍

右同為末。煮藥肉為丸。梧子大。每服三十九。米飲下。

◎花紅散治惡瘡大效方

龍骨雪白真者 一兩

乳香 半皂
子大

粉霜 半錢

輕粉 用小平錢
抄半錢

麝香 少許

腦子 少許

黃丹 逐旋人看顏
色粉紅即止

右合和了。如患瘡先用温漿水洗淨。次用好油塗瘡口上了。

方可將藥摻在瘡上。用膏藥貼。日三四次易之。趙允蹈赴

温。倅過諸暨傳此方。云親自得効。渠患一漏瘡。以藥用紙

搥填瘡中。上以膏藥貼之。日生肉。舊不通。遂漸覺痛。有血。是好肉生也。

◎治喉閉

白僵蠶

天南星

並生用

右等分爲末。以生薑自然汁調一字許。用筆管灌在喉中。立効。仍咬乾薑皂子大。引涎出。

◎治腸風下血

槿藤子

二箇如當三錢大者如更大。只用一箇取穰別研極細。

不艸皂角子

四十九粒燒存性別研細。

右拌勻。每服二錢。溫酒調下。如人行五里。再以溫酒一盞。趁之日一服。極効。

◎治一切癰疽地黃膏兼治毒蟲所傷

石膏 火煨 藿香葉 蚌粉 香白芷

雄黃 研

右等分。同爲細末。以生地黃自然汁調。稀稠得所。塗瘡上。四圍留瘡頭已破者。亦留瘡口。勿塗。乾卽再傳之。藥厚以新水潤之。其効如神。極妙。

◎萬全金花散。理發背疽瘡。疼痛不可忍者。凡腫在脊骨邊。根株

如椀蓋大。上面有細頭子如粟米粒。白色。其間亦有如石榴子者。卽疽瘡也。

車螯

紫色者出海際用火煨地上出火毒氣了爲細

生黃蘗

爲末

生甘草

爲末

乾蘆皮

自東邊面西蘆籬障上取皮爲末

右各爲末了。旋抄車螯末黃蘗末各一錢。甘草末半錢。已上

蘆皮末一錢半。已上拌勻。用津唾調。以竹篋子傅腫上。須蓋遍瘡根。未穴者自穴。已穴者惡物自出。凡十上取効。每傅瘡時。須先用赤根葱三兩莖。薄荷少許。鹽少許。一處煎。

湯放冷淋洗。旋旋用帛子拭乾。方可上藥。應係惡瘡癰。並傳之。無頭者即消。有頭者即膿出。神効。

○治陰瘡

臙茶 五倍子 等分 臙粉 少許 右傳之

○治吹妳

水茸角 不以多少新瓦上燻乾

右為細末。臨瓦酒調服二錢。七次。日即愈。已破者略出黃水。

亦効。水茸角狀如鬼腰帶。作小窠子。生三四月。開小黃花。

葉如夜合葉。六七月採。兩浙呼合萌。

◎治風痰眩暈二烏圓

川烏頭

草烏頭

各四兩

青鹽

四兩

黑豆 半斤

右用水二升同煮四味。水耗卽用溫水添之。候川烏頭半軟。四破之。更煮以透爛爲度。去皮。同煎烏頭並黑豆於石臼或木臼內搗令極爛。不見白星卽就圓。乾卽以煮藥水添濕同搗。煮時留一盞以下水。以備添。勿令煮乾也。圓如梧子大。每服三二十圓。鹽酒鹽湯任下。食前。

◎治風痛

右九蒸九爆天南星爲末。薑汁餵圓梧子大煎人參菖蒲湯。或麥門冬湯下二十圓。

◎治風虫牙

右用大北棗一枚。劈開去核。入和皮巴豆一粒。卻捏合。於慢火上炙令焦黑。如乾浮炭樣。取放地上良久。碾爲細末。以紙撚尖。搽少許。入虫牙竅內。不過五七。永絕根本。

○木香餅子

木香 半兩

丁香皮 二兩

益智仁 一兩

香附子 四兩去
籠皮炒

甘草 二兩
炒

縮砂仁 一兩
麪裏煨
麪熟爲度

蓬莪茂

二兩 炮

右件七味為細末。水餵為圓梧子大。捏作餅子。每服一二十

餅。溫熟水嚼下。食後。

◎治瘰癧

瞿麥 海藻 凌霄花 北邊背陰土 別研

皂角刺新者

右並等分。每服三錢。米飲調下。食後日二服。

◎貼已破者

右用鉛炒取灰滓。研細。以溫鹽漿水洗淨貼之。

◎二虎丹治瘡

辰砂 硫黃

右熱多加辰砂。寒多加硫黃。並研細。棗肉為圓。如龍眼大。當發日新水七分一盞化下。

○金瘡藥

右用上等風化石灰羅過。以紫刺芥心韭一般多。少。搗灰成塊。陰乾。旋為末。用付之。五月五日合。

○神仙眼藥并種空青法

秦皮 三錢去麤皮剉細

乳香 一塊如棗大

胡黃連 三錢

燈心 一握 長七寸

棗子 三個

斑猫 一箇 去翅頭足

古老錢 七文 不剉

右都為麤末。八無油去聲器中。砂器尤佳。用井化水一大碗。熬去半椀。用綿絹擠過。再將滓以水半磁椀。煎取一盞。入擠過汁同煎。汁入新椀中。熬似稠粥樣。入小藥合中。或角合中。盛將空青併鵬砂一塊。如兩豆大。飛過熬乾。空青不熬。再研入腦子多不妨。麝香少許。四味同入藥膏內攪勻。每點一粟米許。在眼皆頭將手挪勻。抑面候藥微澁。過將沸

鹽湯用軟帛片蘸洗快則已之

◎種空青法

朴消 半錢

白茯苓 一分

龍膽草 一分

仙靈毗葉 一錢

旋覆花 一錢

右為末用黃泥一塊拳大同藥和勻水調如軟飯相似作土

餅一箇用大平錢伍文按五方排定於光面墨書金木水

火土五字所寫字向下錢字向上隨五方安用礶砂如豆

大每錢安四塊在四字孔罅中須要乾黃土上頓着土餅

將新砂盆一箇蓋之又將燥黃土蓋盆冬月十日夏月五

口取出於錢上摘取下細研入藥此為種空青法不可嫩亦不可老須得中也

◎治胞損小便不禁

牡丹須細花者不然無効

白牡丹

根皮為末一錢

白芨

為末一錢

生絹

一尺

右同以水煎如飴每服半盞

◎治喘嗽上氣

蒲頰葉治一切肺喘劇甚者効如神焙碾為細末米飲調服

一二錢上併服取差氣味清香其實酸澁夏紅可食核如棗

核類山茱萸揀葉背白者用江西謂之盧都子

○治蛇傷

香白芷

右為末。濃煎麥門冬湯調下二錢。神効。

○換骨丹治一切卒中手足頑麻腰膝沉重左癱右瘓截四時傷

寒婦人血刺產前產後每一粒酒一盞碎槌浸至夜溫動化

散臨睡和滓服小兒驚搐米飲化半圓

桑白皮 川芎 吳白朮 紫河車

威靈仙 蔓菁子各二兩 人參 防風

何首烏各二兩 地骨皮 五味子 木香

苦參 各一兩 犀角 半兩 麝香 龍腦 各半錢

右為細末用膏和

○作膏法

地黃黃 在麻黃

地黃 三斤去根不 去節剉細 蒼朮 半斤 槐角 半斤

右用河水一斗八升并水亦得同熬至三四升去滓留清者

再熬成膏和前藥每兩作八圓硃砂為衣

治痢疾神効香粟飲子

丁香 五枚 鷲粟殼 五箇 炙黃 甘草 一寸 炙

白豆蔻仁 一枚 乳香 一皂子大

右吹咀以水一椀煎至半椀溫服

○治爛眶風眼

宣黃連

半兩去鬚

大肉棗

三七箇去核

杏仁

五十粒不去皮尖

腦子一字

右一處用雪水一升砂鍋內文武火煮留一盞許膏三七日

以銅筋點食後臨卧日可三四次點之杏仁去尖

按膏音
蔭地室
也地藏
酒為膏
杏仁去
尖四字
疑衍

中藏經卷第八終

醫方類聚

以除其根全愈謂之根除何人謂之根除

本經曰根除者謂之根除何人謂之根除

論云

論云根除者謂之根除何人謂之根除

論云

論云根除者謂之根除何人謂之根除

華佗內照法附

漢華佗元化撰

上虞徐舜山重校

四時平脈

春弦

一日長

夏洪

一日云數鈎

秋毛

一日云濟浮

冬石

一日云伏

第二當明臟之病

從心起

其液汗

心風嗜息

心風寸浮數

心風成癩癩

其聲音

心氣痛甚

心氣寸緊

心氣成伏梁

其味苦

心熱狂走

心熱寸焦數

心熱風狂走

其焦臭

心冷死矣

心冷寸沉浮

心冷成痰

真心痛手足冷

其色赤

心虛嗜驚

心虛寸濡弱

心虛成恐懼

右上五般之病除虛不灸餘四種並灸心俞第七椎相去
二寸二分量病輕重上至百下至三壯一七若從起處
灸之亦差餘並做此也不須更敘

從肝起

其液泣

肝風筋脈痠痛

肝風關浮數

肝風癩癧頸筋急

其聲呼

肝氣左脇痛

肝氣關緊強

其肝氣風痺氣左脇妨

其味酸

肝熱骨節疼

肝熱關洪盛

其肝熱成精目赤而骨節煩

其臭臊

肝冷不食菜吐水

肝冷關沉細

其肝冷有痰飲清風

其色青

肝虛多多恐懼

肝虛關乳濡

肝虛恐懼無力

右上五般病當灸肝俞從大脰下行至第九脰夾脰相去

二寸二分候本臟脈或從餘臟來當灸餘藏還量老少
病若重或輕量事而制之除虛不灸也

從肺起

其液涕

肺風皮膚生瘡

肺風寸浮數

肺風鼻塞瘡疥

其聲哭

肺氣成上氣噎

肺氣寸緊數

肺氣上喘氣膈

其味辛

肺熱成癥嗽病

肺熱寸洪濇

肺熱頭面生疱瘡

其臭腥

肺冷成面墨悲

肺冷寸沉細

肺冷右脇生癍氣

其色白

肺虛饒涕皮痒

肺虛寸浮濡

肺虛鼻中肉結生

右五般病除虛不灸餘並灸之從大臍下行至第五臍夾

臍相去二寸三分若從餘臍來候當臍脈量老少輕重

制之

從脾起

其液涎

脾風旋重

脾風關浮數

脾風癱緩右邊多重

其聲歌

脾氣皆妨

脾氣關緩實

脾氣背痛久成瘦病

其味甜

脾熱饒睡

脾熱關洪數

脾熱成黃亦為三消

其臭香

脾冷吐水

脾冷關細濇

脾冷風入尺胃痰飲脹滿

其色黃

脾虛來欠

脾虛關浮芤

脾虛心熱嗜飢嘔

右上諸病除虛不灸餘病須灸第十一臍兩邊相去四寸
半季脇盡處卽是隨病輕重而灸之若從餘藏來當候
脈而灸之不妨藥治

從腎起

其液唾

腎風旋吐酸

腎風尺浮數

腎風瘦變急

其聲呻

腎氣脇脊疼

腎氣尺浮緊

腎氣背脊疼痛

其味鹹

腎熱骨煩痛

腎熱尺洪數

腎熱陰毒時行

其臭腐

腎冷腰脚疼

腎冷尺沉浮

腎冷腰冷痺

其色墨

腎虛頭足痠

腎虛尺脈弱

腎虛多風耳聾

右上諸病除虛不炎餘並炎腎俞大椎下行至第十四椎

兩邊相去四寸是內腎又夾此椎相去七寸八分斜下

是外腎俞亦主膀胱俞也不妨藥治之恐不審細仍爲

圖記之後人背面

第三明五臟相入

肝病入心

肝風入心

爲癩亦或癩癧項筋急頭痛舌縮壯熱

肝氣入心

爲疝瘕氣痛甚難忍左脇下痛

肝熱入心

項筋急目赤舌乾少睡嗜驚恐

肝冷入心

爲吐酸水飲食不下手足泠泠如鐵名心痛

肝虛入心

嗜驚惡罵燥不欲聞人語聲則叫呼

右此五般之病除虛不灸餘並灸之當候之脈從何生灸

之卽不錯也兼服藥大段灸之當候穴同上心病入亦

准上子不合傳母之逆也病卽難差

肺病入心

肺風入心

咳嗽唾血身軀戰掉颼颼不安皮膚搔痒瘡疥

肺氣入心

胸中病痛取氣短卧不安胸背痛悶不已

肺熱入心

嗽逆吐血皮膚生瘡喘息麤短面赤

肺冷入心

目中多淚悲思不已面目青黑色不常

肺虛入心

悲啼思慕嗜驚怕怖皮膚白色

右此五般病狀除虛不灸量病輕重觀其老少斟酌用之

不妨服餌

心病入肺

心風入肺

皮膚生瘡白屑白癩反花癩中生結子

心氣入肺

胸背熱悶胸前及背上熱結子

心熱入肺

皮膚熱蒸手足煩悶胸中及口生瘡

心冷入肺

雞皮白膚面無血色冠弱怯懼色無

心虛入肺

啼泣悲目中冷淚鼻塞口乾悲思

右五般病除虛不灸其餘並灸當候其脈輕重老少藥性

臨時制之

腎病入心

腎風入心

為癩拂然而死輕則眼旋目前生花

腎氣入心

爲痲痺氣動而反變爲氣病面黃

腎熱入心

爲狂顛之病輕則骨煩各陰毒時行

腎冷入心

手足冷如鐵是名真心痛甚則死

腎虛入心

四體昏昏喜汗出足無力困悶昏昏

右此五般病亦候其脈除虛不炎視老少患狀斟酌不得

不依

心病入腎

心風入腎

脚氣熱吸吸無力手足骨節痠疼頭痛

心氣入腎

連臍痠疼兼膀胱及腰脚痛不可忍

心冷入腎

手足冷如鐵痛甚即死名真心痛

心熱入腎

困不知痛處心意燥煩怨不耐痛

心虛入腎

背吸吸耳聾目昏徒忌嗜旋無力

右上諸病餘並灸之除虛不灸服藥量病老少衰弱斟酌

候本俞

脾病入心

脾風入心

嗜嘔吐頭重眼前昏昏往往見黃黃黑黑花

脾氣入心

背膊妨心中悶悶妨滿不飲食兩脇妨

脾熱入心

饒唾涕目黃疸身熱惡心變吐昏悶

脾冷入心

脾中痰飲時時吐水沫脈脹不欲飲食

脾虛入心

食了旋飢心中徃徃多熱來嗜欠卧

右上諸病除虛不炎餘並炎之量老少衰弱斟酌之不妨

藥治

心病入脾

心風入脾

生熱結子在肉中極則成疱瘡癩病

心氣入脾

胃脾中痛自臍上至心難忍則死

心熱入脾

及熱皮膚量極風消渴消中消腎

心冷入脾

飲食不消背膊妨悶胃中細氣

右諸病除虛不炎餘並炎之量老少衰弱臨時制之不

妨藥治

腎病入脾

腎風入脾

手足戰掉四體不安習習昏困無力

腎氣入脾

腰脚背疼及胸兩脇妨痛甚隔氣

腎熱入脾

饒睡困重不知痛處所在面腫浮也

腎冷入脾

腰背疼及痺脚氣疼白虫蛸虫

腎虛入脾

腰脚無力虛吸吸四體困悶頑痺

右件諸虛不炎餘並任炎但且炎腎俞脾自愈

脾病入腎

肝病入脾

肝風入脾

肉中生結子癩癧疱疔瘡反花等瘡

肝氣入脾

左右脇下妨痛甚則爲顛塊痛矣

肝熱入脾

背脊上熱腫成熱癰極則成膿

肝冷入脾

好吐酸水不欲喫菜及水亦不欲也

肝虛入脾

喜太息來欠咨嗟嘆煩悶擾也

右件諸病除虛不灸肝脾量老少衰弱以意消息脾病入

肝無異

腎病入肺

腎風入肺

頭旋鼻塞梁疼頭重脚痠

腎氣入肺

肺胸脊欲得槌嗽逆無氣力

腎熱入肺

皮膚熱痛嗽逆戰掉久差

腎冷入肺

悲泣涕哭面無血色力微小

腎虛入肺

耳聾塞口乾痠疼腰膝無力

右五般病除虛不炎餘並炎之量其老少衰弱輕重制之

肺病入肝

肺風入肝

嗜卧丁瘡反花結筋一髮生惡瘡

肺氣入肝

百脈脹口鼻青色行卧不得

肺熱入肝

骨節龕肉生結子結後爲瘡

肺冷入肝

鼻目多水出淚涓涓不絕肉帶青色

肺虛入肝

常驚怕狀似怯人筋中疼痛也

右上諸病除虛不炎餘並炎仍服藥勿使不慎口當候其

脈勿使龕心量病輕重而制之腎病入肺無異前也

脾病入肺

脾風入肺

痕嗽生瘡在腦及頭口疥癩等瘡

脾氣入肺

或噎疾膈氣上喘瘦病背胛中妨

脾熱入肺

惡腫多患膿血疥癩是也

脾冷入肺 反胃嘔吐胃中疼心饒吐稀痰

脾虛入肺 皮膚白色擇痒欠嘔等是也

右件諸病候其脈量輕重之除虛不炎從各四支不妨藥

治

第四明臟腑相入

脾病入胃口

脾風入胃 胃中熱惡心喫飯無味鼻中覺香氣吐恬水

脾氣入胃 胃中妨悶喫食即脹滿妨勿食白麵食節發脹滿

脾熱入胃 喫水多心熱面目黃色欠不瘥成三消之病

脾冷入胃

胃好吐酸水不欲食心中痛久而成反胃吐也

脾虛入胃

胃好呵噫時時心悶欲食不喜食來欠多

右諸病除虛不炎餘並炎四支須炎脾俞差但依病當

量之胃俞當第十二椎兩邊二寸三分是也

腎病入膀胱

腎風入膀胱

小便無度頭旋惡心眼昏脚痠疼

腎氣入膀胱

膀胱夾臍及背脊兩脇妨痛極成結氣

腎熱入膀胱

小便難赤目精痛皮膚寒頭痛

腎冷入膀胱

遺溺氣腰痛白虫蛲帶下

腎虛入膀胱

令人無力房事不興腦轉耳鳴

右上諸病當灸腎俞及膀胱俞在第十九椎兩邊二寸三

分量老小衰弱兼治之臨時而制

心病入小腸

心風入小腸

腸鳴作聲或時激痛小便秘瀝頭項痛

心氣入小腸

令人臍下疔痛赤白痢不秘澀難痛

心熱入小腸

令人渴血熱悶煩痛腸中如熱湯不安

心冷入小腸

令人渴水穀不化臍中疔痛不知無計

心虛入小腸

令人神蒐狂亂忌見恍惚多語陶攪

口 癩 經 二
右 上 諸 病 當 灸 小 腸 俞 第 十 七 椎 兩 面 二 寸 二 分 并 灸 心
俞 第 五 椎 兼 沼 之 無 妨 量 老 少 衰 弱 臨 時 制 之 胃 中 之
病 亦 相 透 得 病 因 種 種 不 同 述 難 盡

肺 病 入 大 腸

肺 風 入 大 腸

腸 中 宛 轉 間 不 欲 食 食 卽 吐 清 冷 水

肺 氣 入 大 腸

腸 中 痛 不 已 成 妨 悶 作 聲 脹 滿 不 食

肺 熱 入 大 腸

令 人 糞 色 黃 稀 無 度 而 不 堪 近

肺 冷 入 大 腸

令 人 腸 中 水 穀 不 化 名 爲 水 痢 瀉

肺 虛 入 大 腸

令 人 面 色 百 胞 內 枯 瘦 雞 皮 有 鱗

右上諸病當灸大腸俞夾第十六椎兩邊二寸二分亦須

眼藥

肝病入膽

肝風入膽

當吐黃水爪甲及面並帶青色項痛

肝氣入膽

膽脹滿左脇下痛并脾脇中痛者也

肝熱入膽

目赤痛嗜驚叫呼面色惡罵無度

肝冷入膽

不欲食菜如吐酸水左脇中第五肋中妙悶

肝虛入膽

嗜怕懼不安饒淚哭泣面色青

右上諸病當灸膽俞夾第十椎兩面三寸三分老少衰弱

中藏經
三
斟酌之病有風氣相和冷熱相和風冷相和熱氣相並虛
而得也因虛而風熱氣展轉通入臟腑相薰成久而不醫
遂重難輕而易差便而良醫有重者而難痊謂之小手此
蓋爲自不識病源養之成重非醫之過也針有一月之功
灸有終身之效藥通於六腑丹石通骨大而言之藥治六
腑之病灸治五臟之病五臟主皮筋骨血其方內有藥重
處用藥一件爲治應藥脈流行無非灸道而實貫之達者
思之

第五明臟腑應五臟藥各古人處方立法本自不同藥

不執方旋為加減量老少虛實斟酌服之無不痊愈

心風服踈冷藥論藥性炮炙製度各名開具在後

地骨皮 龍骨 青黛 升麻 牛黃 梔子

大黃 知母 瓜蒌 黃連 人參 空青

生地 犀角 黃芩 右為細末溫水調食遠服

心氣服踈熱藥

黃芪 當歸 芍藥 桂心 吳茱萸 蒼朮

陳皮 前胡 柴胡 遠志 人參 茯苓

大黃 食鹽 戎鹽

右為末生姜煎去渣不拘時温服

心熱


原缺

心冷

原缺

心虛

原缺



肝風

原缺

肝氣

原缺

肝熱服次冷藥

秦皮

石決明

署預

百合

黃芩

生地

黃連 天冬 萎蕤 桔梗 芍藥 芒硝

右為末蜜丸如梧桐子大每服三十九溫茶食後服

肝冷宜服熱藥

大腹 枳榔 肉蔻 吳茱萸 桂心 槁皮

柴胡 前胡 鱉甲 葶撥 姜屑

右為末蜜丸梧子大三十九米飲湯空心服

肝虛宜服溫補藥

白芍藥 枳壳 黃芪 吳茱萸 五茄皮 人參

赤茯苓 木通 遠志 五味子 為末生薑去渣

不拘時溫服上諸藥量病輕重製之淮上肝虛

肺風宜服疎冷藥

桔更 欵冬花 升麻 黃芩 梔子 芍藥

萎蕤 百合 麥門冬 茯苓 栝藟 署預

黃芪 加薑煎去渣食後溫服

肺氣宜服疎藥

知母 茯苓 人參 丹參 貝母 猪牙

皂莢 蒿本 黃耆 百合 大棗 葶藶

防已 杏仁 為細末煉蜜為丸梧子大每服二十九

熱水食遠服

肺熱服疎藥

棗根皮 署預 犀角 通草 百合 黃連

梔子 茯神 欵冬花 桔梗 杏仁 麥門冬

秦芩 右煎去渣食遠溫服

肺冷宜服平藥

黃芪 人參 茯神 五味子 芒硝 山萸肉

防已 檳榔 柴胡 澤瀉 射干 百合

為粗末生薑煎去渣食遠溫服

肺虛服溫冷藥

欵冬花 貝母 升麻 百合 桔梗 麥門冬

五味子 五茄皮 地骨皮 黃連 人參 茯苓

菴蓉 大黃 爲末蜜丸如梧子大熱水食遠服

右上諸藥臨時候脈處其方隨時消息

脾風宜服踈藥

前胡 橘紅 人參 姜屑 升麻 黃芩

仙靈皮 五粒松 犀角 桂心 羚羊角

爲末熟水酒各半食前調服

脾氣宜服使藥

前胡

大黃

荆三稜

鱉甲

枳壳

橘紅

桔梗

吳茱萸

蒼朮

蜀椒

為末蜜丸每服三十九薑湯食遠服

脾熱服踈冷藥

升麻

黃芩

桔梗

通草

百合

麥冬

桑白皮

芍藥

萎蕤

欵冬花

秦艽

右煎去渣食前溫服

脾冷服踈藥

姜屑 附子 桂心 吳茱萸 白朮 茯苓

大黃 澤瀉 橘紅 赤芍 防葵 干姜

為末酒糊丸梧桐子大二十九米湯食前服

腎風服熱藥

黃芪 地骨皮 茵陳 石斛 兔絲子 鹿茸

萆薢 戎鹽 姜屑 桂心 石楠

為末蜜丸加酒糊梧桐子大每服三十九溫酒食前下

腎氣服鹹熱藥

吳茱萸 桂心 戎鹽 鹿茸 從容 磁石

石鹽 禹餘糧 鐘乳粉 硃砂少許 夜明砂

為細末酒糊丸梧子大二十九鹽湯食前下

腎熱服踈冷藥

梔子 大黃 石膏 硝石 甘草 葛根

麻黃 黃連 麥門冬 括蕞 芍藥 滑石

為粗末水煎去渣微熟食遠服

腎冷服毒熱藥

附子 干姜 牛膝 杜仲 天雄 草薢

磁石 萹撥 吳茱萸 黃芪 骨碎補 鹿茸

爲末煮糊丸如梧子大三十九丸空心淡酒下

腎虛服執補藥

天雄 鹿茸 鬼絲子 從容 甘草 弓須

當歸 枳壳 芍藥 萆薢 吳茱萸

爲末水酒煮糊丸梧子大三十九丸鹽湯下

右諸件藥以意應五臟六腑風冷執氣虛損量病應藥脩
合炮製精細詳審旋爲加減用之如神夫良醫處治用藥
變應時無以爲定病與藥合得復行隨其宜製之無施不
尅方分等差亦時製之但稟藥性兼識病源而不錯也凡

藥有州土採取皆有時節用有新陳搗煉合和服一切知
之名爲良醫也又識會陰陽之體行年本命旺相生氣禍
害絕命福德天醫病之淺深量而制也是良醫知病與藥

第六明臟腑成敗

五臟死

心絕一日死

何以知之臺睂喘迴視遲口如魚口

死矣

肝絕八日死

何以知之面青但伏視而不見泣出

如水不止

肺絕三日死

何以知之但口張氣出而短鼻色黑

脾絕十二日死

何以知之臍滿泄痢不覺出足腫

腎絕四日死

何以知之齒面黑目中黃腰中欲折

自汗流水

五體敗

骨絕五日死

何以知之脊痛腰中重不覺翻覆耳

肉絕六日死

何以知之舌腫溺血大便赤然也

筋絕九日死

何以知之手足爪甲青叫呼罵而死

脈絕三日死

何以知之口鼻張氣但出而短者死

腸絕六日死

何以知之髮直如麻乾曲身不得者死

五證死

肉及足卒腫一證

面腫蒼肝敗不堪治一日死

眼枯陷二證

手骨并缺盆骨滿敗一日死

聲散鼻張三證

脣反無理肺敗不治五日死

脣齩齒露四證

臍腫滿者脾敗不治十二日死

氣喘語遲五證

陰陽腫不起腎敗三日死

五色死

面赤目青死

面青目黃死

面黃目黑死

面白目黑死

面黑目青死

五聲死

氣聲絕腹脹如鐵脾絕死

妄語錯亂神去死

語色散魂去身無肺死
語聲高魂去身無肝死

長吟呻志去身無腎死

五體死
重嘔吐一體死

足重心腫二體死
手足甲青三體死

腳爪黑四體死
膝大如升五體死

五竭
髮直如麻是血竭

足爪甲青筋竭
齒燥如熟小豆骨竭

鼻張氣促出氣竭
耳鼻唇焦黑肉竭

五傷死
五傷脈不療
房事無度傷腎

傷腎三尺脈如屋漏解索雀啄彈石

食飽醉卧傷脾

傷脾右關如鰕遊鷄足踐地魚翔

言無多寡傷心

傷心左寸足如斷索雀啄屋漏

嗜時鹹熱傷肺

傷肺右寸憂雨之狀亦如彈弦之狀

用力無度傷肝

傷肝左關如繫弦之狀

五不稱脈

脈大而息細死

大人脈如小兒脈死

小人如大人脈死

息大而脈小死

熱病而脈沉死

視死

病人目上看人者死

病人目看斜者死

病人目直視者死

病人下看人者死

病人無睛光者死

凡辨生死之法但人改常者即死矣

色聲心序

但一改常即死矣

夫人者稟之法吐納之氣是也以陰陽氣造化之內而運者即手足是也興動吹變須會逆順若逆則五氣相反若順則五氣相生然以五氣之中則主五臟之內稟五氣非但人身瓦礫草木悉同於此藥性方術亦復如然然知之鮮矣以圖之於象合物會之刻心思惟察深理於皮骨之內露五臟焉