



H. VII. Ric

August Gottlieb Richter's,

der Arzneywissenschaft und Weltweisheit Doktors,

Er. Königlichen Majestät von Großbritannien Leibarztes, und Hofraths, der praktischen Arzneywissenschaft und Wundarzneykunst ordentlichen öffentlichen Lehrers auf der Universität zu Göttingen, des Collegiums der Wundärzte daselbst Präses, Direktors des öffentlichen Hospitals, des Fürstenthums Göttingen, Physicus, Mitglieds der Königl. Göttingischen, und Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften, wie auch der medicinischen Societät zu Kopenhagen

Anfangsgründe

der

Wundarzneykunst.

Dritter Band.



Mit Kupfern.

Göttingen,

bey Johann Christian Dieterich, 1790.



Inhalt.

Das erste Kapitel.

Von der Augenentzündung. S. 7

Das zweyte Kapitel.

Von dem Eytterauge. 84

Das dritte Kapitel.

Von den künstlichen Augen. III

Das vierte Kapitel.

Von den undurchsichtigen Flecken der Hornhaut. 117

Das fünfte Kapitel.

Von dem Felle auf dem Auge. 140

Das sechste Kapitel.

Von dem Staphylom. 153

Das siebente Kapitel.

Von dem grauen Staare. 169

Das achte Kapitel.

Von dem Vorfalle der Regenbogenhaut. 363

Das neunte Kapitel.

Von der verschloffenen Pupille. 370

Das

Inhalt.

Das zehnte Kapitel.	
Von der widernatürlichen Erweiterung der Pupille.	S. 387
Das eilfte Kapitel.	
Von der Augenwasserfucht.	393
Das zwölfte Kapitel.	
Von dem Vorfalle des Augapfels.	406
Das dreyzehnte Kapitel.	
Von der Ausrottung des Augapfels.	415
Das vierzehnte Kapitel.	
Vom schwarzen Staare.	423
Das fünfzehnte Kapitel.	
Von dem Doppeltsehen.	463
Das sechszehnte Kapitel.	
Von der Halbsichtigkeit.	475
Das siebenzehnte Kapitel.	
Von der Tag- und Nachtblindheit.	479
Das achtzehnte Kapitel.	
Von der Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit.	485
Das neunzehnte Kapitel.	
Von den Flecken und Funken vor den Augen.	504
Das zwanzigste Kapitel.	
Von verschiedenen Gattungen des fehlerhaften Gesichts.	521

Zwente Hauptabtheilung.


Von den

besondern Krankheiten.

Dritter Abschnitt.

Von den

Krankheiten der Augen.





Das erste Kapitel.

Von der

Augenentzündung.

§. 1.

Die Entzündung der Augen entsteht auf dieselbe Art, und erfordert dieselbe Behandlung als die Entzündung anderer Theile. Alles also, was von der Entzündung überhaupt (s. diese Anfangsgründe erster Band, erstes Kapitel) gesagt worden ist, gilt größtentheils auch von der Entzündung der Augen; nur das, was dieser Entzündung eigen ist, und wodurch sie sich von andern Entzündungen unterscheidet, soll hier angezeigt werden.

§. 2.

Unter allen Augenkrankheiten ist die Augenentzündung die allerhäufigste. Es giebt wenig Augenkrankheiten, die sie nicht zuweilen veranlaßt. Bey vielen ist sie als Zufall, oder Folge. Ihre zuverlässigeren Zeichen sind Schmerz und Röthe. Das letztere Zeichen, die Röthe, ist desto deutlicher, da das Auge im gesunden Zustande ohne alle Röthe ist.

Indessen ist es doch nicht immer ganz zuverlässig. Es giebt heftige Augenentzündungen mit wenig, ja ohne alle Röthe. Hieher gehört z. E. die catarrhalische oder rheumatische Augenentzündung, die Entzündung der innern Theile des Auges (phlegmone oculi.) Auch ist dies Zeichen oft nicht zu bemerken, weil heftig entzündete Augen oft nicht gedffnet werden können. Uebrigens ist dies Zeichen am allerdeutlichsten im Weißen des Auges bemerklich. Bey heftigen Augenentzündungen wird jedoch nicht selten sogar auch die durchsichtige Hornhaut roth. Man hat gesehen, daß die wässerichte Feuchtigkeit im Auge, ohne Zweifel durch eine Blutergießung roth gefärbt worden ist. Auf der durchsichtigen Hornhaut erzeugen sich zuweilen kleine Blasen, die voll ausgetretenen Bluts sind. Die dunkelrothe Geschwulst der Conjunctiva bey der heftigen Augenentzündung, die man Chemosis nennt, rührt von einer Blutergießung unter die Conjunctiva her. Auch die Augenlider nehmen nicht selten an dieser Entzündungsröthe Antheil. In Fällen, wo das Auge nicht gedffnet werden kann, oder darf, kann man mehrentheils sicher schließen, daß der Augapfel entzündet ist, wann man den untern Rand des obern Augenlides roth und angeschwollen findet.

§. 3.

Der Schmerz ist das vornehmste, und wenn die Augenlider nicht gedffnet werden können, oder dürfen, das einzige Zeichen der Augenentzündung. Er ist von verschiedner Art. Bey gelindern Augenentzündung

entzündungen empfinden die Kranken eine Hitze, oder ein Zucken, oder einen Druck, gleichsam wie von einem fremden Körper unter dem Augenslide; bey heftigern, ein starkes Brennen, einen spannenden, stechenden, klopfenden Schmerz. Wenn dem Kranken zu Muth ist, als wenn die Augenhöhle zu klein ist, der Augapfel in derselben nicht Platz hat, und aus derselben hervordringt, wenn er vorzüglich in der Gegend der Augenbraunen einen heftigen druckenden spannenden Schmerz empfindet, der sich auf der leidenden Seite zuweilen bis in den Hinterkopf erstreckt, dann kann man sicher glauben, daß die Entzündung den größten Grad der Heftigkeit erreicht hat, und die Gefahr der Entering sehr nahe ist.

§. 4.

Jedoch auch dem Schmerz darf man nicht immer als einem beständigen und zuverlässigen Zeichen der Augenentzündung trauen. Es giebt heftige Augenentzündungen mit sehr gelinden, ja ohne alle Schmerzen; und gelinde Entzündungen, die mit heftigen Schmerzen verbunden sind. Die Fälle dieser Art sind verschieden. Abgehärtete und unempfindlichere Kranke achten oft heftige Schmerzen wenig, und der Wundarzt, der sich auf ihre Versicherung, daß die Schmerzen erträglich oder unbedeutend sind, verläßt, findet, wenn er nach einiger Zeit die Augenlider öffnet, oft ganz unvermuthet das Auge auß heftigste entzündet, ja wohl gar in Entering. Empfindlichere Kranke hingegen finden oft geringe Schmerzen unerträglich, und veranlassen

oft den Wundarzt Mittel zu gebrauchen, die wirklich unnöthig sind. — Die Erfahrung zeigt ferner, daß in den meisten Fällen der Schmerz im Anfange der Entzündung, ja gleichsam in dem Augenblicke, in welchem sie entsteht, am allerheftigsten ist, in der Folge sich mindert, ja gänzlich verliert, obgleich die Entzündung immer gleich heftig ist. Es ist nichts seltnes, daß nach Operationen am Auge Kranke die erste Nacht nur wenige Stunden Schmerzen empfinden, und nachher immer schmerzlos bleiben. Man darf dieser kurzen Dauer, und der bald darauf erfolgenden gänzlichen Verschwindung der Schmerzen nie trauen; sehr oft wird man das Auge in diesem Falle aufs heftigste entzündet finden. — Endlich sind bey Augenentzündungen die Schmerzen zuweilen periodisch. In den meisten Fällen dieser Art empfinden die Kranken bloß des Nachts ein paar Stunden lang Schmerzen, bey Tage sind sie völlig frey davon. Auch diese kurzen Anfälle von Schmerzen und langen schmerzlosen Zwischenzeiten darf man nicht als Zeichen der Gelindigkeit der Entzündung betrachten. Das Auge ist oft heftig entzündet. — Daß übrigens das Auge zuweilen sehr schmerzhaft ist, ohne entzündet zu seyn, wird in der Folge erhellen. — Keinem Zeichen allein darf also der Wundarzt trauen; immer muß er alle in Betrachtung ziehen.

§. 5.

Außer den bisher angezeigten Zufällen gesellen sich zu Augenentzündungen zwar nicht gewöhnlich,
doch

doch oft genug mancherley andere Zufälle, die die Aufmerksamkeit des Wundarztes erfordern. Zuweilen empfindet und verträgt das entzündete Auge das Licht wie im gesunden Zustande; dies ist gemeinlich der Fall bey gelinden und gutartigen Entzündungen. Zuweilen ist das Auge gegen das Licht dergestalt empfindlich, daß ein Thränen, und eine schmerzhaftre Empfindung erfolgt, so oft nur ein wenig Licht ins Auge fällt. Dieser Zufall ereignet sich bey heftigern Augenentzündungen, vornemlich bey solchen, die durch eine scharfe reizende Materie verursacht werden, z. E. bey catarrhalischen, rheumatischen u. s. w. und bey denen sogenannten feuchten Ophthalmien, die mit dem Ausflusse einer Menge scharfer Thränen verbunden sind. Zuweilen ist die Augenentzündung mit einer gänzlichen Blindheit verbunden. Dies ist der übelste Fall. Diese Blindheit, welche jederzeit eine sehr heftige und gefährliche Entzündung anzeigt, rührt entweder von einer Verdunkelung der Hornhaut, oder völligen Verschließung der Pupille, zwey gewöhnlichen Folgen heftiger Augentzündungen her, oder sie ist der Wirkung des Entzündungszustandes auf die retina zuzuschreiben, und in diesem Falle hinterläßt die Krankheit gemeinlich den schwarzen Staar.

§. 6.

Geschwulst, ein gewöhnliches Symptom der Entzündungen an andern Theilen, bemerkt man auch zuweilen bey Entzündungen der Augen. Am häufigsten und stärksten erscheint sie an dem Theile

der Conjunctiva, der das Weiße im Auge bedeckt. Bey heftigen Entzündungen schwillt diese Haut dergestalt an, daß sie gleich einer dicken Falte zwischen den Augenlidern liegt, aus denselben hervorhängt, und sie zu schließen hindert. Auch die durchsichtige Hornhaut schwillt bey heftigen Augenentzündungen zuweilen bis zur vier — ja achtfachen Vermehrung ihrer natürlichen Dicke auf. Gemeiniglich wird sie zugleich ganz weiß und weich. Dringt diese Anschwellung stark einwärts, so vermindert, ja verschließt sie ganz die vordere Augenkammer, und die innere Ueberfläche der Hornhaut berührt die Regenbogenhaut. Gemeiniglich hinterläßt die Entzündung in diesem Falle eine widernatürliche Vereini- gung der Hornhaut mit der Regenbogenhaut (Syn- nechia). Dringt die Anschwellung nach auswärts, so bleibt oft ein Staphylom zurück. Indessen zeigt die Erfahrung, daß sich diese Verdickung und Ver- dunkelung der Hornhaut zuweilen mit der Entzün- dung gänzlich verliert, und daß nach geendigter Entzündung die Hornhaut ihre vorige natürliche Beschaffenheit wieder erhält. — Auch die Augen- liden nehmen sehr oft Antheil an der Entzündung des Augapfels, und schwellen dergestalt auf, daß sie auf keine Art und Weise geöffnet werden können. — Man hat gesehen, daß bey heftigen Augenent- zündungen der ganze Augapfel widernatürlich aufge- schwollen ist.

§. 7.

Auch ein Fieber bemerkt man oft bey Augen- entzündungen. Wohl zu merken aber ist, daß dies Fieber

Fieber nicht immer ein und eben dasselbe, sondern überhaupt von dreynfacher Art ist. Zuweilen ist es die Mitwirkung derselben Ursache, die die Entzündung erregt, und in diesem Falle fordert die Entzündung und das Fieber einerley Mittel, diejenigen nemlich, die gegen die Ursache beyder Wirkungen gerichtet sind. Dieser Fall ereignet sich z. E. bey gallichten Augenentzündungen, wo Brech- und Purgirmittel so wohl das Fieber, welches hier ein Gallenfieber ist, als die Entzündung heben. Zuweilen ist das Fieber die Folge der Entzündung, oder vielmehr die consensuelle Folge des Schmerzens und Entzündungsreizes. In diesem Falle entsteht die Entzündung eher, als das Fieber, und dieses ist immer in Gleichmaasse mit jener, das ist, gelinde, wann jene gelinde ist, heftig, wenn es jene ist. Dieses Fieber erfordert überhaupt den Gebrauch antiphlogistischer Mittel, wodurch die Entzündung, seine Ursach, gehoben wird, und verdient eigentlich den Namen des Entzündungsfiebers. Nach chirurgischen Operationen am Auge entsteht oft ein Fieber, ehe noch die geringste Entzündung bemerkt wird. Dieß Fieber scheint bloß der Furcht des Kranken vor der Operation, und denen Schmerzen, die er bey der Operation erlitten hat, zuzuschreiben zu seyn, und erfordert bloß besänftigende reizmindernde Mittel, vorzüglich den Mohnsaft in Verbindung mit Spießglasmitteln. — Daß übrigens das Fieber, welches bey Entzündungen ist, nicht immer unverändert, und so bleibt, wie es ursprünglich ist, sondern in der Folge oft einen complicirten Charakter

rakter erhält, dessen Grund in der Leibesbeschaffenheit des Kranken, in der epidemischen, oder endemischen Constitution, oder in andern zufälligen Ursachen liegt, ist bereits anderswo (s. Anfangsgründe der Wundarzneekunst, erster Band, S. 18 2c.) erinnert worden.

S. 8.

Augenentzündungen, auch diejenigen sogar, die nicht sehr heftig sind, hinterlassen oft unheilbare Augenfehler, welches bey der zarten Bildung des Auges nicht zu bewundern ist. Die gewöhnlichsten Folgen heftiger Augenentzündungen sind Verdunkelungen durchsichtiger Theile, vorzüglich der Hornhaut, und der Kapsel der Krystallinse, die Verschließung der Pupille, der schwarze Staar, das Staphylom, u. s. w. Nicht selten geht die Entzündung in Eiterung über. Oft veranlaßt sie Geschwüre auf der durchsichtigen Hornhaut, oder dem Rande der Augenlider. Selten bleibt, wenn das eine Auge entzündet ist, das andre ganz fehlerfrey; auch wenn die Entzündung des einen Auges von einer örtlichen äußern Ursache herrührt, nimmt oft das andre Auge Antheil an derselben. Ein Auge, welches aus irgend einer Ursache einigemal heftig entzündet gewesen ist, behält in vielen Fällen auf immer eine Disposition zu neuen Entzündungen, vermöge welcher es von sehr geringen Ursachen entzündet wird. — Bey heftigen Augenentzündungen beobachtet man oft zwey verschiedne Zeiträume. Im ersten sind sie hitzig, mit vielen Schmerzen und Fieber

ber verbunden. Im zweiten Zeitraume ist die Krankheit chronisch, ohne Schmerz und ohne Fieber. Das Auge ist bloß schwach, feucht, und mehr oder weniger roth. Oft ist die Krankheit in diesem zweiten Zeitraume sehr langwierig, und weit schwerer zu heben, als im ersten.

S. 9.

Man theilt die Augenentzündungen in verschiedene Gattungen ein, und sieht bey dieser Eintheilung, auf den verschiedenen Sitz; auf den verschiedenen Grad der Hestigkeit; auf die verschiedene Dauer; auf die verschiedenen äußern Zufälle; vorzüglich aber auf die verschiedenen Ursachen der Entzündung. — In Absicht des Sitzes der Entzündung ist überhaupt zu bemerken, daß kein Theil im Auge ist, der nicht entzündet werden kann, und daß bey sehr heftigen Entzündungen zuletzt alle Theile des Auges wirklich entzündet sind. In gelindern Fällen indessen leidet zuweilen ein Theil mehr und eher als der andre. Zuweilen sind bloß oder vorzüglich die innern Theile des Auges entzündet (phlegmone oculi). Gemeinlich empfindet der Kranke in diesem Falle einen spannenden Schmerz, der sich durch die ganze Augenhöhle, bis in die Gegend der Augenbraunen erstreckt, es ist ihm zu Muth, als wenn das Auge bersten wollte; wirklich findet man auch zuweilen den ganzen Augapfel widernatürlich angeschwollen und ausgedehnt; oft ist die Pupille geschlossen, die wässerichte Feuchtigkeit blutig, die Krystallinse verdunkelt. Noch öfter ist der Kranke blind, obgleich
die

die Pupille klar und offen ist. Außerlich erscheint wenig Röthe am Augapfel. Selten aber bleibt die Krankheit lange in diesem Zustande, denn gar bald gesellt sich auch eine äußere heftige Entzündung dazu. Zuweilen ist die innere Entzündung die Folge der äußern. Immer ist diese innere Entzündung mit großer Gefahr einer unheilbaren Blindheit verbunden.

§. 10.

Heftige Augenentzündungen erstrecken ihre Wirkung zuweilen auch auf die durchsichtige Hornhaut: diese schwillt in diesem Falle auf, und wird ganz weich und weiß; oder man sieht mehrere oder weniger deutliche Blutgefäße über dieselbe hinlaufen, oder man erblickt Blutblasen auf derselben. Auch die Augenlider leiden oft bey Augenentzündungen. Zuweilen ist bloß die innere Ueberfläche derselben entzündet, und in diesem Falle ist die Entzündung gemeiniglich sehr schmerzhaft; zuweilen ist vorzüglich der Rand der Augenlider entzündet, und dann erfolgt oft eine Exulceration des Randes, und der Verlust der Haare auf demselben. Zuweilen ist das ganze Augenlid entzündet, und dann kann man gemeiniglich das Auge schwer oder gar nicht öffnen.

§. 11.

Der Hauptsitz der Augenentzündung ist gemeiniglich der Theil der Conjunctiva, der das Weiße im Auge bedeckt. Er ist, wenn er entzündet wird, verschiedentlich beschaffen. Zuweilen bemerkt man in dem einem oder andern Augenwinkel bloß einen
gleich

gleich rothen umgränzten Fleck, von verschiedner Größe, und Gestalt. Er scheint von einer kleinen Blutergießung in das Zellengewebe unter der Conjunctiva zu entstehen. Diese gelinde Augenentzündung ist oft ganz ohne Schmerzen, mehrentheils nur wenig schmerzhaft, und verliert sich gemeiniglich nach einigen Tagen von sich selbst. Ihre gewöhnlichen Belegenheitsursachen sind eine starke Anstrengung bey dem Erbrechen, oder Husten, ein Schreck, ein spiziger fremder Körper, der ins Auge fällt, u. s. w. — Zuweilen siehet man blos einen Pütschel angeschwollner Blutgefäße im äußern oder innern Augenwinkel in horizontaler Richtung nach der durchsichtigen Hornhaut hinlaufen. Erreichen diese Gefäße die Hornhaut nicht, so hat der Kranke, außer einem Thränen des Auges, und der Empfindung eines Drucks, als wenn ein fremder Körper unter den Augenlidern läge, keine Beschwerden. Zuweilen aber laufen einige von diesen Gefäßen über die durchsichtige Hornhaut hinweg, und dann bemerkt man gemeiniglich, daß eine neblichte Trübheit jedes dieser Gefäße zu beyden Seiten begleitet, wodurch das Gesicht sehr gehindert wird. Diese Augenentzündung, (*ophthalmia varicosa*) ist sehr hartnäckig, selten ohne eine chirurgische Operation zu heilen, und gemeiniglich die Folge heftiger hitziger Augenentzündungen.

S. 12.

Zuweilen ist das Weiße im Auge in seinem ganzen Umfange (*taraxis*); zuweilen nur in dem
einem

einen oder andern Augenwinkel (ophthalmia angularis) mit vielen kleinern und größern Blutgefäßen durchwebt, die mehr oder weniger deutlich von einander zu unterscheiden sind. Der Kranke hat dabei die Empfindung von einem Brennen im Auge, und gemeiniglich ein ungewöhnliches Thränen. Diese Entzündung ist zwar nicht sehr heftig, jedoch auch nicht unbedeutend. Je mehrere rothe Gefäße im Auge bemerkt werden, je weniger sie von einander zu unterscheiden sind, jemehr das Auge egal roth aussieht, desto heftiger ist sie. Zuweilen ist das Weiße im Auge in seinem ganzen Umfange nicht allein egal roth, sondern die Conjunctiva ist zugleich auch dergestalt aufgeschwollen, daß sie zwischen die Augenlider dringt, ja aus denselben hervorragt; in der Mitte des Augapfels eine tiefe Grube bildet, in welcher die Hornhaut liegt, ja von allen Seiten her, dergestalt über die Hornhaut ragt, daß sie dieselbe ganz bedeckt. Im letzten Falle gleicht der ganze Augapfel einem rothen Stücke Fleisch. Diese Augenentzündung (Chemosis) ist gemeiniglich mit der Entzündung aller innern und äußern Theile des Auges, mit den heftigsten Schmerzen, und Fieber, und der nahen Gefahr der Entzündung verbunden. Die Geschwulst der Conjunctiva scheint von einer wirklichen Blutergießung in das Zellengewebe unter derselben herzurühren.

§. 13.

In Absicht der Dauer theilt man die Augenentzündungen in hitzige und langwierige ein. Die mehr-

mehresten hitzigen Augenentzündungen verwandeln sich, wenn sie nur einigermaßen heftig sind, am Ende in langwierige. Die Anfälle der Hitzigen sowohl als der Langwierigen erscheinen und verschwinden zuweilen wechselsweise zu gewissen Zeiten, und dann erhalten sie den Namen der periodischen Augenentzündung. Aus allen diesen Verschiedenheiten im Verlaufe der Krankheit läßt sich nichts sicheres auf die Kurart schließen. Dieselbe Ursach erregt zuweilen eine hitzige, zuweilen eine chronische, zuweilen eine periodische Augenentzündung. Ja dieselbe Augenentzündung verändert oft ihren Lauf, und wird abwechselnd hitzig, chronisch, periodisch. Auch läßt sich aus diesen Veränderungen nichts gewisses in Absicht auf die Prognosis schließen. Es ist zuweilen übel, wenn sich eine hitzige Augenentzündung in eine chronische, und in andern Fällen eben so übel, wenn sich eine chronische in eine hitzige Augenentzündung verwandelt. Ueberhaupt aber sind chronische Augenentzündungen zwar eben nicht mit einer so nahen Gefahr des Verlusts des Auges verbunden, aber mehrentheils schwerer zu heilen, als hitzige, weil ihre Ursachen mehrentheils sehr verwickelt, eingewurzelt, und schwer zu entdecken sind.

S. 14.

Auch in Rücksicht auf verschiedene äußere Erscheinungen theilt man die Augenentzündungen in verschiedene Gattungen ein. Zuweilen ist das entzündete Auge so trocken, daß die Conjunctiva gleichsam

sam schuppicht ist, und das Auge und die Augenlider nicht ohne Schmerzen bewegt werden können (xerophthalmia). Zuweilen fließt aus dem entzündeten Auge eine ungeheure Menge Thränen (ophthalmia humida). Zuweilen ist das entzündete Auge weder zu trocken, noch zu unmäßig feucht. Ein gelinderer Entzündungsreiz, wenn er auf secernirende Organen wirkt, vermehrt die Secretion, indem er die Gefäße zu einer lebhaftern Oscillation reizt; ein heftiger Entzündungsreiz hemmt die Secretion, indem er die Gefäße krampfhaft verschließt. Die trockne Augenentzündung ist daher immer sehr heftig; gelinder ist die feuchte. Ein Zeichen einer großen Gelindigkeit ist, wenn die Absonderung der Thränen weder sehr vermehrt, noch vermindert wird. Die trockne veranlaßt leicht eine Entering im Auge, die feuchte leicht Geschwüre auf der durchsichtigen Hornhaut, oder dem Rande der Augenlider. Zuweilen findet man in entzündeten Augen bloß eine dicke enterartige Materie (ophthalmia purulenta), die des Nachts die Augenlider zusammen klebt; und zum Theil sich verhärtet, und in den Haaren der Augenlider hängen bleibt. Es scheint, daß in diesem Falle die Meibomschen Drüsen auf dem Rande der Augenlider vorzüglich leiden, und diese enterartige Materie absondern. — Die wichtigste Eintheilung der Augenentzündungen in verschiedne Gattungen gründet sich auf die Ursachen derselben, wovon jede besonders unter der Kur angezeigt werden soll.

§. 15.

Bei der Heilung der Augenentzündungen hat der Wundarzt verschiedene Kuranzeigen zu befolgen. Die wichtigste Kuranzeige gründet sich auf die Ursache der Entzündung. Alle andre Anzeigen sind dieser nachzusehen. So mannichfaltig also die Ursachen der Augenentzündungen sind, so mannichfaltig ist vermöge dieser Anzeige die Kurmethode derselben. Die wichtigste Kuranzeige nach dieser ist diejenige, die sich auf den Character der Krankheit gründet. Dieser ist inflammatorisch, und die Kurmethode die diese Anzeige fordert, ist überhaupt die antiphlogistische. Außer diesen zwey Hauptanzeigen, die den Wundarzt bei der Behandlung der Augenentzündungen vorzüglich und beständig leiten müssen, erhält derselbe von den verschiednen Erscheinungen bei der Krankheit, von dem verschiednen Grade der Hefigkeit, von dem verschiednen Sitze derselben, von der Leibesbeschaffenheit des Kranken u. s. w. oft Nebenanzeigen, die zwar nie die Hauptbehandlung hindern, jedoch aber dem Wundarzte oft Anlaß zu nützlichen und nöthigen Nebenbehandlungen geben.

§. 16.

Zuerst einige allgemeine Kurregeln; und dann von der Heilung jeder Gattung der Ophthalmie besonders. — Von einem entzündeten Auge, die Entzündung entstehe von welcher Ursache sie wolle, muß Licht und Luft abgehalten werden. Beyde wirken als ein Reiz, der die Entzündung vermehrt, und sind vorzüglich dann schädlich, wenn das Auge sehr

Richt. Wundarzneyk. III. B. B schmerz=

schmerzhaft, und empfindlich gegen das Licht ist. Der gewöhnliche Verband, der in einer Kompresse besteht, die man aufs Auge legt, und mittelst einer Binde befestigt, erfüllt zwar diese Absicht, drückt und reizt aber leicht das Auge. Dazu kommt, daß die Kompresse durch die ausfließenden Thränen bald feucht wird, und die nahen Theile sowohl als auch das Auge selbst immer feucht hält, welches bey verschiedenen Augenentzündungen sehr schädlich ist. Der Vorschlag statt der Kompresse einen weichen Schwamm aufs Auge zu legen, den man dergestalt ausgehöhlt hat, daß er den Augapfel nicht drückt, scheint gleichfalls ohne Nutzen zu seyn; der Schwamm drückt zwar das Auge nicht, erhält es aber immer gleichsam in einem warmen Bade. In den meisten Fällen ist gar nicht nöthig einen Verband aufs Auge selbst zu legen, denn wenn die Entzündung nur einigermaßen beträchtlich ist, kleben gemeinlich die Ränder der Augenlider gar bald zusammen; und dann ist es immer am besten, daß man eine Kompresse auf der Stirne an eine Binde, oder an die Nase befestigt, und über das Auge herab hängen läßt. So lange die Augenlider nicht geschlossen sind, muß, einige wenige besondere Fälle ausgenommen, die nachher werden angezeigt werden, die Kompresse aufs Auge gelegt, und mittelst einer Binde auf demselben behutsam befestigt werden. Es ist nicht genug, daß bloß Licht und Luft vom Auge abgehalten werden, auch die Bewegung des Auges und der Augenlider muß gehindert werden, da durch dieselbe das entzündete Auge offenbar gereizt

gereizt wird; und daher ist der Vorschlag einiger, immer nur eine dünne Kompresse über das Auge herab hängen zu lassen, durchaus nicht in allen Fällen hinreichend.

S. 17.

Beide Augen, auch wenn nur eines entzündet ist, müssen jederzeit auf diese Art verbunden werden. Der Reiz des Lichts auf's gesunde Auge wirkt auch auf's kranke, und dieses bewegt sich gemeinlich unter der Binde, so wie sich jenes bewegt, wenn es offen ist. — Es versteht sich, daß die Kompresse oft geändert werden muß, weil sie von den Feuchtigkeiten und Unreinigkeiten hart und spröde wird, und alsdann das Auge reibt, und belästigt. — Zuweilen kleben die Augenlider dergestalt zusammen, daß die Thränen ganz und gar nicht heraußfließen können, und sich unter den Augenlidern dergestalt anhäufen, und dieselben dergestalt ausdehnen, daß sie gleichsam wie ein Sack herab hängen. Der Fall ereignet sich nicht oft, aber er ereignet sich zuweilen wirklich, und wird von dem unachtsamen Wundarzte leicht für eine ödematöse Anschwellung der Augenlider gehalten. Wenn man die Augenlider im innern Augenwinkel ein wenig von einander ziehet, so fließen die zurückgehaltne Thränen in einem kleinen Strome heraus, und die Geschwulst der Augenlider verschwindet in dem Augenblicke. Dieser Handgriff muß zuweilen täglich einigemal wiederholt werden, zumal wenn die Thränen zugleich sehr scharf sind.

S. 18.

Zuweilen schwillt bey Augenentzündungen das obere Augenlid dergestalt an, daß es über das untere herabhängt, und dasselbe ganz oder größtentheils bedeckt. Es sammeln sich in diesem Falle oft, zumal bey gewissen Gattungen von Augenentzündungen, eine Menge schleimiger, zäher, verdickter Unreinigkeiten unter dem obern Augenlide auf der bedeckten äußern Ueberfläche des untern Augenlides an, die allmählig scharf werden, und das Thränen, Brennen, Zucken, ja selbst die Entzündung und Geschwulst der Augenlider unterhalten und vermehren. Selbst der Augapfel leidet von diesen Unreinigkeiten. Es ist keine unwichtige Regel, in solchen Fällen das obere Augenlid dann und wann aufzuheben, und die auf dem untern befindlichen Unreinigkeiten behutsam abzuwischen. Gemeinlich wird der Kranke darauf eine merkliche Linderung seiner unangenehmen Empfindungen bemerken. — Die Eröffnung der zusammengeklebten Augenlider im Falle einer Augenentzündung erfordert einige Behutsamkeit, damit, vorzüglich wenn die Entzündung die Folge einer chirurgischen Operation ist, das Auge dabey nicht gereizt wird, oder sonst auf irgend eine Art Gewalt leidet. Gemeinlich wird man finden, daß bloß die Haare des obern Augenlides auf die äußere Haut des untern Augenlides angeklebt sind, und daß, um das Auge zu öffnen, es bloß darauf ankommt, diese Haare abzulösen. Und dies geschieht am besten, wenn man die Unreinigkeiten, die sie ankleben, mit warmer Milch, oder etwas

etwas ähnlichem erweicht, und dann die Haare einzeln und allmählig mit der Spitze einer feinen Sonde aufhebt. So bald dies geschehen ist, öffnet sich gemeiniglich das Auge sehr leicht.

§. 19.

Außer den Hauptmitteln, die bey Augenentzündungen vermöge obiger Kuranzeigen angewendet werden, kann man auch äußerliche örtliche Mittel mit Nutzen anwenden. Am besten wendet man sie überhaupt in der Gestalt eines Augewassers an. Pulver, ins Auge geblasen oder gestrichen reizen immer das Auge. Salben haften nicht am Auge, das mehrentheils mit vielen wässerichten Feuchtigkeiten umgeben und benezt ist, bleiben höchstens nur in den Haaren oder auf der äußern Haut der Augenlider hängen, und erregen, zumal wenn sie nicht frisch bereitet sind, Röthe, Jucken, Brennen. Nie aber dürfen einem Augewasser erdige unauflösbare Theile beygemischt werden: sie bleiben nach dem Gebrauche desselben im Auge, und reizen es immer mehr oder weniger. Nicht zugedenken, daß sie unwirksam sind. — Die gewöhnliche Art dergleichen Augewasser zu gebrauchen, nämlich Kompressen damit zu befeuchten, und auf die verschlossnen Augenlider zu legen, ist ohne Nutzen, und schädlich. Ohne Nutzen; denn wie kann die Wirkung des Augewassers durch die Augenlider, die überdies noch oft sehr dick und geschwollen sind, auf den Augapfel sich erstrecken? Schädlich, denn die feuchte Kompresse wird leicht kalt; und kalte Masse ist bey

vielen Augenentzündungen sehr schädlich. So oft die Kompresse trocken wird, wird sie hart, rauh, und spröde, und reibt, und belästigt das Auge. Am besten thut man, wenn man, indem der Kranke auf dem Rücken liegt, dann und wann einige Tropfen von dem Augewasser in den innern Augwinkel fallen läßt. Auf diese Art gelangt das Mittel nicht allein zu dem Theil, auf den es wirken soll, denn es ziehet sich, zumal wenn der Kranke die Augenlider bewegt, und den Kopf seitwärts beugt, über den ganzen Augapfel nach dem äußern Augwinkel hin; sondern es bleibt auch eine Zeitlang auf dem leidenden Theile, wenn der Kranke eine Zeitlang auf dem Rücken liegen bleibt, und man von Zeit zu Zeit ein paar Tropfen herabfallen läßt.

§. 20.

Es giebt Fälle, wo das entzündete Auge durchaus keine feuchten äußerlichen Mittel verträgt. Diese Fälle lassen sich nicht immer zum voraus bestimmen. Ein kurzer Versuch zeigt bald die widrige Wirkung dieser Mittel, und die Nothwendigkeit davon abzusehen. Indessen scheinen sie sich dennoch am häufigsten bey gichtischen und rheumatischen Kranken zu ereignen. Man steht in diesen Fällen entweder von dem Gebrauche aller äußern Mittel gänzlich ab, oder bedient sich trockner, z. E. einer Mischung aus Kampfer, Hollunder- und Kamillenblumen in Kräutersäckchen, welche dergleichen Kranken gemeiniglich sehr zuträglich sind. — Die äußerlichen Mittel selbst, welche in jedem Falle erforderlich sind, werden in der
 Folge

Folge bey jeder besondern Gattung der Augenentzündungen angezeigt werden; hier also nur einige allgemeine Regeln, die dem Wundarzt in der Wahl dieser Mittel eine allgemeine Anleitung geben.

S. 21.

Die äußerlichen Mittel, welche man bey Augenentzündungen zu gebrauchen pflegt, lassen sich in zwey Klassen eintheilen; sie sind entweder zertheilend, zusammenziehend; oder besänftigend, erweichend. Hitzige Augenentzündungen vertragen im Anfange, so lange noch nicht hinreichend zur Ader gelassen worden, und das Auge noch sehr schmerzhaft ist, die Mittel der erstern Art nicht, sie wirken als reizende Mittel, und vermehren den Schmerz und die Entzündung. Je mehr die Anzeige zum Aderlasse und die Schmerzen sich mindern, je mehr die Entzündung ein chronisches Ansehen gewinnt, desto zuträglicher sind diese Mittel; je schmerzhafter und hitziger sie ist, desto zuträglicher sind die Mittel der zweyten Gattung. — Auch nicht sehr heftige und hitzige Augenentzündungen die mit einer großen Empfindlichkeit des Auges verbunden sind, erfordern besänftigende Mittel, vertragen die Mittel ersterer Art nicht. Je mehr man im entzündeten Auge unschmerzhaftes Röthe und Geschwulst bemerkt, desto zuträglicher sind gemeiniglich stärkende, zusammenziehende Mittel. Augenentzündungen, die mit einem häufigen Ausfluß scharfer Thränenfeuchtigkeiten verbunden sind, vertragen keine reizende zusammenziehende, erfordern erweichende mildernde Mittel.

Zuweilen verträgt das entzündete Auge ohne eine scheinbare Ursache, und wider Vermuthen, keine zusammenziehende, zuweilen keine erweichende, zuweilen ganz und gar keine äußere Mittel. Der aufmerksame Wundarzt merkt dies bald, und unterläßt den Gebrauch dieser Mittel. — Ein mehreres unter der besondern Kur.

S. 22.

Es giebt Fälle, wo der Wundarzt die Augenentzündung vorhersehen, und durch eine zeitige prophylaktische Kur verhüten, oder vermindern kann. Dieser Fall ereignet sich vorzüglich bey chirurgischen Augenoperationen, nach welchen immer eine Entzündung zu fürchten ist, die nicht selten den glücklichen Erfolg der Operation vereitelt. Der Endzweck der sogenannten Zubereitung zu Operationen ist vorzüglich, ja einzig und allein die Verminderung oder gänzliche Verhütung der zu fürchtenden Entzündung. Um diesen Endzweck zu erreichen, läßt man den Kranken eine Zeitlang vor der Operation eine ungewohnte schwächende sogenannte antiphlogistische Diät führen, sich der freyen Luft enthalten, schwächende auflösende, abführende Mittelsalze nehmen, auch wohl eine Ader öffnen, und durch alle diese Mittel vermehrt man die Empfindlichkeit und Reizbarkeit des Kranken, und dadurch zuverlässig auch die zu fürchtende Entzündung und alle üble Zufälle. Außerdem vermehrt und verkürzt die solenne lange Zubereitung die Furcht und Unruhe, in der sich der Kranke jederzeit vor der Operation befindet; der fortgesetzte Gebrauch der abführenden Mittel-

Mittelsalze mindert die Ausdünstung, schwächt die ersten Wege, und disponirt den Kranken zu gastrischen Unreinigkeiten, die alsdann nach der Operation alle Zufälle vermehren. Wiederholte Erfahrungen zeigen, daß dergleichen Operationen bey Kranken, die stark, abgehärtet, mit guten Säften versehen, wenig empfindlich und reizbar sind, am allerbesten gelingen, und daß bey solchen Kranken der Erfolg immer desto glücklicher ist, je weniger sie auf obige Art zubereitet werden. Alles was man bey solchen Kranken, in Rücksicht auf die inflammatorischen Folgen, vor der Operation thun kann und muß, besteht darinnen; daß man von der Operation allen Anschein von Wichtigkeit und Ungewißheit zu entfernen sucht, um die Unruhe des Kranken zu mindern; daß man nach genommenem Entschlusse zur Operation dieselbe nicht lange aufschiebt, um die Unruhe des Kranken zu verkürzen; daß man durch Bewegung in freyer Lust und allenfalls den innern Gebrauch der Spießglasmittel die Ausdünstung frey unterhält, wodurch die Gefahr der Entzündung vorzüglich gemindert wird; und daß man endlich allenfalls, dem Kranken, wenn er sehr unruhig ist, eine halbe Stunde vor der Operation ein gelindes Mohnsaftsmittel giebt, um ihn zu beruhigen. — Dies alles gilt indessen nur von dem Falle, wo der Kranke übrigens gesund ist: denn es versteht sich, daß andre Krankheiten oder Fehler, die dem glücklichen Erfolge der Operation hinderlich seyn können, vorher so viel als möglich gehoben werden müssen.

S. 23.

Nach der Operation ist eben sowohl alles zweckwidrig, was nicht wirklich angezeigt ist. Befindet sich der Kranke wohl, so hat man durchaus weiter nichts zu thun, als ihm den Gebrauch gelinder Spießglasmittel, um die Ausdünstung zu unterhalten, und täglich einmal ein erweichendes Klystier, um die Leibesöffnung zu unterhalten, zu verordnen. Stellen sich nach der Operation krampfhafte Zufälle, z. E. Niedergeschlagenheit, ein öfteres Trösteln, Unruhe, Kopfschmerzen u. s. w. ein, und ist der Kranke während oder vor der Operation sehr furchtsam gewesen, so kann man zu den Spießglasmitteln ein Mohnsaftsmittel mischen, z. E. von einer Mischung aus drey Quentchen Huxhamschen Spießglaswein und einem Quentchen Thebaischer Tinktur alle vier Stunden 16 bis 24 Tropfen nehmen lassen. Schlägt der Puls voll und hart, und ist der Kranke vollblütig, so kann man eine Ader öffnen. Gemeiniglich verbindet man das Auge sogleich nach der Operation mit zertheilenden, zurücktreibenden Mitteln, z. E. einer Mischung aus Brandwein und Wasser, dem Goulardschen Bleywasser u. s. w. Alle diese Mittel sind zwecklos und schädlich. Zwecklos; denn was sollen zertheilende Mittel thun, da noch keine Entzündung da ist; schädlich; denn diese Mittel reizen das durch die Operation bereits gereizte Auge, und schaden, wenn sie feucht sind, durch die kalte Masse, die sie im ganzen Umfange des Auges veranlassen. Zuverlässige Erfahrungen beweisen es, daß jederzeit heftigere und hartnäckigere Augenentzündungen erfolgen,

folgen, wenn man das Auge nach Operationen mit solchen Mitteln verbindet; und daß die Zufälle der Entzündung mehrentheils unbedeutend sind, wenn man bloß einen trocknen Verband auflegt, der den Eintritt der Luft und des Lichts ins Auge, und die Bewegungen des Augapfels und der Augenlider hindert. — Erfolgt ungeachtet dieser Vorsicht den zweyten oder dritten Tag nach der Operation eine Entzündung, so müssen nun die Mittel angewendet werden, die die Entzündung nach Verschiedenheit ihrer Beschaffenheit und Zufälle erfordert. — Dies in allgemeinen, und nun von jeder Gattung der Augenentzündung besonders.

S. 24.

Die einfache inflammatorische Augenentzündung. Man nennt sie einfach, theils weil sie außer dem inflammatorischen keinen andern bennegmischtem Fiebercharacter hat; theils weil keine Ursach Antheil daran hat, die eine eigne besondere Behandlung erfordert, und folglich zu ihrer Heilung bloß die einfache antiphlogistische Kurmethode erforderlich ist. Sie ist zuweilen ohne Fieber, zuweilen mit Fieber, zuweilen mehr oder weniger feucht, zuweilen mehr oder weniger trocken, zuweilen schränkt sie sich bloß aufs Weiße des Auges ein, zuweilen erstreckt sie sich auch auf die andern Theile des Augapfels. Alle diese Verschiedenheiten hängen bloß von dem verschiednen Grade der Hestigkeit ab, und ändern die Hauptkurmethode nicht. Gemeiniglich ist sie die Folge äußerlicher Verletzungen, vornemlich chirurgischer

gischer Operationen, jedoch kann sie auch von allen denen Ursachen entstehen, von welchen Entzündungen in andern Theilen entstehen. Sie erfordert überhaupt den Gebrauch der antiphlogistischen Mittel, die jedoch nach Verschiedenheit der Umstände verschiedentlich angewendet werden müssen.

S. 25.

Die einfache inflammatorische Augenentzündung erfordert, sie sey sehr, (chemosis) oder wenig (taraxis) heftig, wenn sie mit einem vollen, harten, und geschwinden Puls verbunden ist, jederzeit ein Aderlaß. Dieß muß immer desto häufiger seyn, je heftiger die Entzündung, und je stärker, voller und härter der Puls ist; und so oft wiederholt werden, bis der Puls weicher kleiner und weniger geschwind ist. Dieselben allgemeinen Regeln, die in Absicht des Aderlasses bey Entzündungen anderer Theile zu beobachten sind, müssen übrigens auch bey Augenentzündungen beobachtet werden. Ein starkes Aderlaß, so bald als möglich gemacht, nugt mehr als viele kleinere und spätere. Immer muß beym ersten Aderlasse das Blut so lange fließen, bis eine merkliche Minderung der Härte, Stärke und Geschwindigkeit des Pulses erscheint. Die Heftigkeit der Entzündung giebt keine ganz sichere Anzeige zur Quantität und Wiederholung des Aderlasses, da ein allgemeines Aderlaß oft nur sehr wenig oder auch sehr langsam auf das entzündete Auge wirkt; und der Puls oft so geschwächt ist, daß kein fernerer Blutverlust statt findet auch wenn die Heftigkeit der Ent-

Entzündung nur sehr wenig nachgelassen hat. Ein Aderlaß am Fuße scheint bey Augenentzündungen wirksamer zu seyn, als am Arme. Ist der Puls zugleich mit der Entzündung sehr heftig, so muß eine große Oeffnung in die Ader gemacht werden, damit das Blut schnell, und in einem starken Strohne ausfließt: die Erfahrung zeigt, daß plötzliche Blutausleerungen Entzündungen stärker mindern, als langsame und allmälige.

§. 26.

Ist die Stärke des Pulses dergestalt gemäßiget, daß man keine fernere Anzeige zum Aderlasse darinnen findet, und dennoch die Entzündung noch immer sehr heftig, so sind örtliche Aderlässe von Nutzen. Nie sind diese dienlich, wenn eine Anzeige zu einem allgemeinen Aderlasse im Puls ist; immer müssen sie, auch dann, wenn sie statt finden, stark seyn, wenn sie nutzen sollen. Kleine örtliche Aderlässe scheinen oft die Kongestion in den entzündeten Theil, und die Entzündung selbst zu vermehren. Unter denen verschiednen örtlichen Aderlässen, welche von jeher gegen Augenentzündungen empfohlen worden sind, ist die Durchschneidung der Conjunctiva das aller- vorzüglichste. Bey heftigen Augenentzündungen schafft diese Operation nach hinreichenden Aderlässen jederzeit die schnellste Hülfe. Am besten schneidet man in beyden Augenwinkeln ein Stück von der Conjunctiva ab. Da diese Haut gleich einer dicken Falte zwischen den Augenlidern liegt, läßt sie sich mit einer gebognen Scheere leicht von der Seite derge-

dergestalt fassen, daß ein Stück abgeschnitten wird. Bloße Stiche oder Einschnitte mit einer Lanzette oder Scheere fruchten wenig; sie geben wenig Blut, und schließen sich bald wieder. Einige rathen die Conjunctiva mittelst einer Scheere rings um die durchsichtige Hornhaut herum zu durchschneiden; dieß ist unnöthig, und bey der starken Geschwulst der Augenlider und des Augapfels mehrentheils schwer, ja unmöglich. Einige (Bell System of Surgery. Vol. 10.) wollen so gar auch ein Stück von der innern Haut der Augenlider abschneiden: dieß ist aber wegen der Geschwulst der Theile mehrentheils sehr schwer zu bewerkstelligen, und ohne Nutzen. Die starke Geschwulst der Conjunctiva in dem Falle, wovon jetzt die Rede ist, (Chemosis) rührt höchstwahrscheinlich größtentheils von extravasirtem Blute in dem Zellengewebe unter der Conjunctiva her. Wahrscheinlich nußt diese Operation vorzüglich dadurch, daß sie dieses Blut ausleert. Was nußt es also ein Stück aus der innern Haut der Augenlider auszuschnneiden! Deswegen sind bloße Stiche in die Conjunctiva nicht hinreichend. — Man kann übrigens diese Operation ganz dreist verrichten; sie verursacht nicht die geringste Unbequemlichkeit. Nach geendigter Entzündung bemerkt man keine Spur davon im Auge.

S. 27.

Die Ophthalmoxylis ist eine alte verwerfliche Operation. Man verrichtete sie sonst mit einem gleichfalls höchst verwerflichen Instrumente; dem
Wool-

Woolhoufischen Kornährenpinfel (s. Plattneri Diff. de scarificatione oculorum, Lipsiae, 1728 in dessen Oper. p. 68. Fig. H.). Ist dieser Pinfel weich und weich, so fassen die an den Kornähren befindlichen kleinen Haaken bey dem Gebrauche nicht ein, geben nach, und erregen keine Blutung. Ist er hart und trocken, so brechen die Haaken ab, bleiben im Auge, und reizen dasselbe unter heftigen Schmerzen, und mit einer großen Vermehrung der Entzündung. Jedoch auch, wenn diese Operation mit dem Plattnerischen Instrumente, (siehe l. c. Fig. F.) verrichtet wird, ist sie ganz verwerflich. Sie ist äußerst schmerzhaft, vermehrt laut vielfältiger Erfahrung die Entzündung äußerst, und erregt nur eine ganz geringe Blutung, von der sich wenig Hülfe erwarten läßt. Die Absicht bey dieser Operation ist die ganze äußere Ueberfläche des Augapfels und die innere Haut der Augenlider mit den eben angezeigten Werkzeugen blutig zu kraken. Mehrentheils ist es wegen der starken Anschwellung der Augerlider unmöglich, diese Absicht zu erreichen. Da man nur die äußere Ueberfläche der Conjunctiva verwundet, leert man durch diese Operation das im Zellengewebe unter der Conjunctiva befindliche extravasirte Blut, welches den vorzüglichsten Antheil an der Geschwulst hat, nicht aus; und da oft eine Eytterung der verwundeten Ueberflächen erfolgt, hat man immer eine Verwachsung der Augenlider mit dem Augapfel (ancyloblophorum) zu fürchten.

S. 28.

Alle übrigen örtlichen Aderlässe, die von einigen empfohlen werden, namentlich die Eröffnung der Schlafpulsader, der Kehllader (*vena iugularis*) der Gefäße im innern Augenwinkel, die Anlegung der Blutigel u. s. w. sind theils mit Schwierigkeiten verbunden, theils leisten sie auch das bey weitem nicht, was die Einschnidung der *Conjunctiva* leistet. Sie leeren das Blut unter der *Conjunctiva* nicht aus, und sind im genauen Verstande nicht wirklich örtliche Augenaderlässe. Blutigel erregen oft einen sehr unbestimmten Blutverlust, da die Wunden oft wenig, oft sehr stark nachbluten. Wenige Blutigel scheinen oft die Kongestion nach dem Kopf zu vermehren; der Kranke wird schwindlich, und die Entzündung nimmt zu. Mehrere anzulegen erfordert oft viele Mühe und Schwierigkeiten.

S. 29.

Purgirmittel können, so sehr sie auch von einigen empfohlen werden, bey dieser Augenentzündung, an welcher gastrische Reize keinen Antheil haben, nichts nutzen. Den Endzweck, den inflammatorischen Zufluß der Säfte in das entzündete Auge zu mindern, muß man durch Aderlässe, nicht durch Purgirmittel, welche die Stelle eines Aderlasses nicht vertreten können, zu erreichen suchen; und wann Aderlässe nicht mehr statt finden, kommt es nicht mehr darauf an, die Säfte vom Auge abzuziehen. Indessen giebt es dennoch zwey Fälle, wo Purgirmittel statt finden, ja erfordert werden; nämlich
gleich

gleich zu Anfang der Krankheit, um die Rothanhäufungen in den Därmen, die sich etwan vermuthen lassen, wegzuräumen, damit sie nicht als ein Nebenreiz das Fieber und die Entzündung vermehren: und während dem Verlaufe der Krankheit, so oft sich zufällige Darmunreinigkeiten zeigen, die durch Fieber, Unruhe, Schmerz oft veranlaßt werden, und wenn sie nicht weggeschafft werden, das Fieber mit allen seinen Zufällen vermehren. So unnöthig übrigens überhaupt die Purgirmittel sind, so nöthig ist es, darauf zu achten, daß der Kranke täglich Leibesöffnung hat, und wenn sie nicht erfolgt, sie durch ein Klystier zu befördern, da bey Leibesverstopfung gemeiniglich eine Vermehrung aller fieberhaften Zufälle bemerkt wird.

§. 30.

Unter den innern entzündungswidrigen Mitteln empfiehlt man bey heftigen Augenentzündungen vorzüglich den Salpeter. So lange der Kranke einen ansehnlichen Grad von Fieber, einen inflammatorischen heftigen Schmerz im Auge, einen vollen, gespannten, geschwinden Puls hat, mit einem Worte, so lange noch eine Anzeige zum Aderlassen da ist, ist dies Mittel ohne alle Widerrede nöthig und nützlich. Aber sehr oft hält die Augenentzündung noch sehr lange an, nachdem alle Anzeige zum Aderlasse bereits verschwunden, der Kranke entkräftet, der Puls natürlich, ja schwach ist, und dann ist der Salpeter nicht allein nicht mehr zuträglich, sondern sogar auch schädlich. — Uebrigens muß der Kranke

Richt. Wundarzneyk. III. B. E wä-

während dem Gebrauche aller bisher genannten Mittel eine antiphlogistische Diät beobachten; auch muß das Auge, wenn es nicht zugeklebt, oder zugeschwollen ist, verbunden werden, damit die Entzündung nicht durch die Bewegung der Augenlider und des Augapfels, wie auch durch den Reiz der Luft und des Lichts vermehret wird. Auch ist es rathsam, daß der Kranke eine jede niedere abhängige Lage des Kopfs vermeidet.

§. 31.

Gemeiniglich durchläuft die Augenentzündung, wovon jetzt die Rede ist, zwey verschiedene Zeiträume; den hitzigen, und den chronischen. Den hitzigen, den man im Anfange der Krankheit bemerkt, bezeichnen Hitze, Unruhe, ein fieberhafter voller, gespannter, geschwinder Puls, Schmerzen, die Gefahr der Exsternung, die Nothwendigkeit auszuleeren, zu kühlen, zu besänftigen. Sehr oft aber dauert die Röthe des Auges noch fort, nachdem alle diese Zufälle verschwunden sind, keine Anzeige zu kühlen und auszuleeren mehr da, der Puls schwach, der Kranke entkräftet ist; und dies ist der chronische Zeitraum der Krankheit. Der hitzige Zeitraum wird durch den gehörigen Gebrauch der bisher angezeigten Mittel gemeiniglich gar bald geendigt; der chronische hingegen ist oft sehr langwierig und hartnäckig, verträgt den fortgesetzten Gebrauch der oben angezeigten antiphlogistischen Mittel ganz und gar nicht, und erfordert eine verschiedene Behandlung nach der Verschiedenheit der Umstände, in welchen sich der Kranke befindet.

§. 32.

S. 32.

Ist der Kranke ohne Fieber, oder nur ganz wenig fieberhaft, der Puls weich und klein, aber gereizt und unruhig, das Auge feucht, empfindlich, so sind Quecksilber- Mohnsaft- und Spießglasmittel nebst Blasenpflastern gemeiniglich sehr zuträglich. Man kann in diesem Falle dem Kranken Morgens und Abends ein Gran Calomel, und des Tages über drey bis viermal von einer Mischung aus drey Quentchen Huxhamschen Spießglaswein und einem Quentchen thebaischen Tinktur 16 bis 30 Tropfen nehmen lassen. Das Blasenpflaster legt man in den Nacken. — Hat der Kranke einen vollsaftigen Körper, ist das Auge noch etwas schmerzhaft, der Puls aber fieberfrey, so thut das versüßte Quecksilber vortrefliche Dienste. Man kann es abwechselnd in kleinen Dosen, und zuweilen in Verbindung mit Purgirmitteln, oder in so starken Dosen geben, daß es gelinde laxirt. — Hat die Krankheit lange gedauert, ist der Kranke bleich und schwach, das Auge roth, feucht, aber unschmerzhaft, oder nur zu gewissen Zeiten schmerzhaft, so ist die China mit dem versüßten Quecksilber vorzüglich nützlich. Man kann dem Kranken Morgens und Abends ein Gran Calomel, und den Tag über einigemal ein paar Eßlöffel voll von dem gewöhnlichen Chinadekott nehmen lassen. — Manchmal wirft sich bey Gelegenheit dieser Augenentzündung ein im Körper schon längst befindlicher verborgner Krankheitsstoff außs Auge, und dann ist die Krankheit im letzten Zeitraume complicirt, sehr hartnäckig, und durch

die gewöhnlichen Mittel nicht zu heilen. Alles kommt hier darauf an, die hinzukommende innere Ursache zu entdecken, und ihrer Natur gemäß zu behandeln. Die innere Krankheitsstoffe, die am häufigsten Antheil an dieser Augenentzündung nehmen, sind die Gichtmaterie, das venerische, und Kräsgift.

S. 33.

Außer den bisher angezeigten allgemeinen Mitteln tragen auch äußerliche örtliche Mittel zur Heilung dieser Augenentzündung bey, jedoch muß bey der Wahl derselben der Wundarzt auf die Verschiedenheit der Umstände sorgfältig Rücksicht nehmen. So lange die Augenentzündung noch in dem hitzigen Zeitraume befindlich ist, und der Wundarzt in allen Zufällen der Krankheit, vorzüglich im Puls Anzeigen Ader zu lassen, und zu fühlen findet, so lange das Auge sehr entzündet und schmerzhaft ist, schaden alle äußere zertheilende, zusammenziehende Mittel. Sie wirken gemeinlich als Reize, die den Schmerz und die Entzündung vermehren. Am besten thut man, wenn man, so lange noch nicht hinreichend zur Ader gelassen ist, entweder gar keine, oder bloß erweichende, besänftigende, lindernde Mittel auflegt. Ein Brey aus Malvenblüten, Allthäablättern und Mohnköpfen mit etwas Leinsaamenmehl, Bleyzucker, und weißen Liliendl, (Boerhaave de morbis oculorum, p. 54) thut in diesem Falle gemeinlich vortrefliche Dienste. Beynahe noch zuträglicher in den meisten Fällen ist ein Brey aus drey Theilen Schierlingkraut, einem Theile von den Blät-

Blättern des hyosciamus albus und etwas Leinsamenmehle. Man legt von diesen Breyen alle Stunden etwas lauwarm aufs Auge.

S. 34.

Ist im Puls weiter keine Anzeige zum Ueberlaß, hat sich das Fieber, die Hitze, die Entzündung, der Schmerz zwar merklich gemindert, aber bey weiten noch nicht gänzlich verlohren, so verträgt das Auge gemeinlich die Bleymittel am besten; diese Mittel wirken ohne Reiz, sie mindern nicht allein die Entzündung sondern auch den Schmerz und die Empfindlichkeit des Auges. Man kann das so sehr berufne Goulardsche Bleywasser, oder eine Auflösung von Bleyzucker in diesem Falle mit großem Nutzen anwenden. Ist das entzündete Auge in diesem Falle sehr feucht, so ist eine Mischung aus einer halben Unze Silberglätteßig, sechs Unzen Rosenwasser, anderthalb Quentchen lap. divin. und zwey Quentchen rektificirten Weingeiste zuträglich; ist das Auge hingegen trocken, so ist eine Mischung aus einer halben Unze Silberglätteßig, sechs Unzen Rosenwasser, einem halben Quentchen Salmiak, und zwey Quentchen rektificirten Weingeiste zuträglicher.

S. 35.

Fängt die Krankheit an chronisch zu werden, ist der Kranke ohne Fieber und Hitze, der Puls weich und Fieberfrey, das Auge aber noch immer empfindlich, und etwas schmerzhaft, so ist der äußere Gebrauch des Mohnsafts oft von großem Nutzen.

Nutzen. Man kann in diesem Falle von einer Emulsion, die man aus sechs Gran Quittenkernen, vier Gran Mohnsaft, zwey Gran Bleyzucker, drey Unzen Rosenwasser und einem Quentchen Safrantinktur (Boerhaave) bereitet, dann und wann einen Tropfen ins Auge fallen lassen, auch etwas davon auf die Augenlider streichen; oder man kann von der Tinctura thebaica (Ware, on the ophthalmy) täglich ein, oder zweymal ein paar Tropfen ins Auge fallen lassen. Das letztere Mittel veranlaßt mehrentheils, indem es gebraucht wird, eine Vermehrung des Schmerzes und ein Thränen, die aber nur ein paar Minuten dauert, und gemeiniglich eine sichtbare Besserung zur Folge hat. Man kann zugleich das Auge mit einem Dekokt von Mohnköpfen und Schierling bähnen.

§. 36.

Hat die Krankheit schon ziemlich lange gedauert, ist das Auge roth, feucht, schlaff, unschmerzhaft, so thut eine Auflösung von zwey Quentchen Alaun, und einem Scrupel Bleyzucker in acht Unzen Wasser; oder ein Dekokt von der Weiden- oder Chinarinde, und das öftere Waschen des Auges mit kaltem Wasser sehr gute Dienste. Dies ist vorzüglich der Fall, wo man das Auge nicht weiter verbinden und warm halten, sondern öffnen, und der Luft und dem Lichte aussetzen muß. — Zuweilen ist in dem eben angezeigten Falle das Auge voll einer zähen, klebrichten, enterartigen Materie, die so oft das Auge auch gereinigt wird, sich immer wieder von

von neuen erzeugt, vertrocknet, in den Haaren der Augenlider hängen bleibt, und des Nachts die Augenlider zusammenklebt. In diesem Falle ist eine Salbe von zwey Quentchen frischer ungesalzner Butter, einem Quentchen weißem Wachs, einem halben Quentchen rothem Pracipitat und 2 Gran Mohnsaft über einem gelinden Feuer zusammengesmolzen, und täglich viermal mittelst eines kleinen Pinsels einer Linse groß ins Auge gestrichen von besonderm Nutzen.

S. 37.

Zuweilen bleibt, nach dem alle Röthe verschwunden ist, eine Erschlaffung des Theils der Conjunctiva, der die Hornhaut bedeckt, und eine daher rührende Trübheit der Hornhaut zurück. Eine Auflösung von zwey Gran weißem Vitriol in zwey Unzen Wasser, oder von zwey Gran lap. divin. in zwey Unzen Wasser hebt diese Trübheit, und klärt das Gesicht gemeiniglich in kurzer Zeit wieder auf. — Zuweilen bleibt ein Brennen und Zucken der Augenlider, welches vorzüglich des Abends lästig wird, ohne merkliche Röthe zurück. Der äußere Gebrauch einer Auflösung von einem Grane Sublimat in vier Unzen destillirten Wasser hebt diese kleine Beschwerde gemeiniglich in kurzer Zeit. — Das Thränen der Augen ohne alle Röthe und schmerzhaftige Empfindung, welches zuweilen eine Zeitlang zurück bleibt, erfordert keine besondere Mittel, und verliert sich allmählig von sich selbst, so wie sich das Auge an die Luft und das Licht gewöhnt. Allenfalls

kann man das Auge zuweilen mit 2 Theilen Wasser und einem Theile Brandwein waschen. — Von den ausgedehnten varicosen Gefäßen, die nach heftigen Entzündungen im Weißen des Auges zurück bleiben, wird als von einer besondern Augenentzündung in der Folge besonders gehandelt werden.

S. 38.

Zuweilen entsteht dennoch diese einfache Augenentzündung von Ursachen, die bey der Kur eine besondere Rücksicht erfordern. Eine der häufigern Ursachen dieser Art sind fremde Körper, die zufälligerweise unter die Augenlider kommen. Diese Körper sind oft die unerkannte Ursache hartnäckiger langwieriger Augenentzündungen. Daher es eine sehr wichtige Regel ist, bey allen Augenentzündungen, die ohne irgend eine bemerkliche Ursach den gewöhnlichen Mitteln widerstehen, den Umfang der innern Seite der Augenlider, und die Ueberfläche des Augapfels wohl zu untersuchen, um zu entdecken, ob etwa ein solcher Körper daselbst befindlich ist. — Mehrentheils erregt derselbe, sobald er ins Auge kommt, sogleich heftige Schmerzen, Thränen, Entzündung, und dann ist die Erkenntniß des Falles und seiner Ursache nicht schwer. — Der Reiz, den der fremde Körper erregt, so bald er ins Auge kommt, veranlaßt die mehresten Kranken, das Auge zu reiben, wodurch der fremde Körper keinesweges herausgeschafft, sondern vielmehr fester eingedrückt, oder gar eingestochen, oder hin und her bewegt, und folglich das Auge nebst den Augenlidern gar bald

schmerz-

schmerzhaft und entzündet wird. Besser thut man in jedem Falle wenn man sogleich das Auge schließt, und verbindet. Gemeiniglich wird der fremde Körper, wenn er nicht groß ist, oder fest liegt, durch die häufig zufließenden Thränen gar bald nach dem innern Augenwinkel getrieben, und ausgespült. Allenfalls kann man, dies zu befördern die Augenlider mit der Spitze des Fingers gelinde vom äußern nach den innerm Augenwinkel hin streichen. Geschieht dies nicht bald, und werden die Schmerzen heftig, so muß das Auge untersucht, und der fremde Körper heraus geschafft werden.

S. 39.

Gemeiniglich liegt der fremde Körper unter dem obern Augenlide; wenigstens ist der Fall ohne alle Schwierigkeit, wenn er unter dem untern Augenlide liegt; da dasselbe mit den Fingern leicht dergestalt herabgezogen werden kann, daß die innere Ueberfläche desselben, und der untere Theil des Augapfels ganz entblößt wird, wird er daselbst immer leicht entdeckt, und ausgezogen. Um zu untersuchen, ob er unter dem obern Augenlide liegt, ziehet man dasselbe; indem man die Haare am Rande desselben mit dem Daumen und Zeigefinger der beyden Hände faßt, ein wenig herunterwärts dergestalt vom Augapfel ab, daß man, indem der Kranke den Kopf zurückbeugt, die ganze innere Ueberfläche desselben übersehen kann. Um die Ueberfläche des Augapfels besichtigen zu können, läßt man den Kranken zu gleicher Zeit das Auge so stark als möglich herunterwärts,

wärts, und wechselsweise zu der einen und andern Seite drehen, so daß die ganze Ueberfläche des Augapfels übersehen werden kann.

§. 40.

Diese fremden Körper sind von verschiedner Art. Zuweilen sind es Materien, die durch ihre Härte, oder eckichte und spitzige Gestalt, zuweilen Materien, die bloß durch ihre scharfe Eigenschaft das Auge reizen, und entzünden; von der erstern Art sind Holzsplitter, Spitzen von Kornähren, Sandkörner u. s. w.: von der zweiten Gattung sind alle Schärfen, Schnupftoback, Pfeffer u. s. w. Diese letztern verursachen dem Wundarzte gemeinlich weniger Mühe, denn mehrentheils werden sie durch die häufig zufließenden Thränen gar bald gemildert, und ausgespült. Sind die Schmerzen sehr heftig, und verlihren sie sich nicht bald, so kann man allenfalls mittelst eines kleinen Pinsels, den man zu wiederholten malen in lauwarme Milch taucht, und unter das obere Augenlid bringt, das Auge zu reinigen, und die Schärfe auszuwischen suchen; man kann das Auge in lauwarmer Milch, oder in irgend einer andern schleimichten Feuchtigkeit, z. B. einem Dekokt von Nialvenblättern u. s. w. baden; oder man kann dergleichen Feuchtigkeiten, z. B. eine Auflösung von Arabischen Gummi, verdünnten Quittenschleim u. s. w. ins Auge, im innern Augenwinkel tröpfeln. Zuweilen aber sind in diesem Falle die Augenlider krampfhaft verschlossen, so daß keines von diesen Mitteln gehdrig angewendet werden kann. In diesem

diesem Falle kann man dem Kranken oft baldige Linderung schaffen, wenn man mittelst einer kleinen Spritze, die man im äußern Augenwinkel unter die Augenlider bringt, zu wiederholten malen lauwarme Milch, oder ähnliche Feuchtigkeiten einspritzt. — Auch die fremden Körper der erstern Art kann man oft durch dergleichen Einspritzungen aus dem Auge schaffen. Sind diese aber nicht hinreichend, so muß man das Augenlid auf oben angezeigte Art aufheben, und den Körper mittelst der Spitze einer Sonde, oder eines kleinen Ohrlöffels, oder wenn er fest steckt, mittelst einer pincette herausnehmen. Dies geschieht oft mit vieler Schwierigkeit, zumal wenn die Augenlider krampfhaft zusammengezogen, oder bereits entzündet und geschwollen sind. In diesem Falle ist man oft genöthigt, die Operation aufzuschieben, bis sich der Krampf und die Entzündung mindern.

S. 41.

Auch in der durchsichtigen Hornhaut stecken zuweilen fremde Körper von einer ganz eignen Art. Immer bemerkt man eine kleine Grube in der Hornhaut, in welcher dieser fremde Körper fest liegt. Gemeinlich hat er die Größe eines kleinen Stecknadelknopfs, ist schwarz, glänzend, und gleichsam steinicht, wenigstens ganz hart. Immer haben die Kranken eine schmerzhaftige Augenentzündung, die sich aber von sich selbst verliert, wenn man den kleinen Körper mit der Spitze einer Staarnadel aushebt. Die kleine Grube in der Hornhaut verliert sich nach der Operation allmählig. Die Operation selbst aber
ist

ist gemeiniglich sehr schmerzhaft; denn die Hornhaut zeigt sich dabey äußerst empfindlich. (Chirurg. Bibl. VIII. Band p. 422.) Es ist ungewiß, ob dies ein fremder Körper ist, der von außen ins Auge kommt, wie einige glauben (Wenzel Traité de la Cataracte), wenigstens ist es sonderbar, daß dieser Körper, in den Fällen, die man bisher beobachtet hat, (Chir. Bibl. l. c.) immer von einer Art gewesen ist. — Daß die Haare auf dem Rande der Augenlider, wenn sie einwärts nach dem Augapfel gerichtet sind, das Auge reizen, und eine heftige Augenentzündung veranlassen, ist bereits im vorhergehenden (s. diese Anfangsgründe, 2 Band, p. 483) bemerkt worden. — Zuweilen ist der Reiz, der auf das Auge wirkt, und dasselbe entzündet, an einem entfernten Orte. Man hat gesehen, (Journal de Medecine Tom. 36.) daß eine hartnäckige und heftige Augenentzündung von schadhaften Backenzähnen herrührte, und nachdem sie mancherley Mitteln widerstanden hatte, sogleich verschwand, als diese Zähne ausgezogen wurden. Eine heftige Augenentzündung entstand von einer Bohne, (Act. N. C. T. VII.) die der Kranke in die Nase gesteckt hatte.

S. 42.

Die hitzige feuchte Augenentzündung (ophthalmia acuta humida) durchläuft gemeiniglich zwey verschiedene Zeiträume. Im ersten fließt eine große Menge dünner wässerichter scharfer Thränen aus dem Auge, die nicht allein ein beständiges schmerzhaftes Brennen im Auge, sondern auch Geschwulst
und

und Röthe in allen nahen Theilen veranlassen. Vorzüglich schwellen gemeiniglich die Augenlider an. Der Theil der Thränen, der durch die Thränenwege in die Nase gelangt, erregt durch seine Schärfe ein öfteres Niesen, und eine Entzündung der Nasenlöcher, und Oberlippe, ja nicht selten eine Thränenfistel; der Theil der Thränen, der über die Wangen herabfließt, verursacht oft eine rosenartige Anschwellung des Angesichts. Das Auge ist äußerst empfindlich gegen das Licht, übrigens aber mäßig roth (taraxis). Zugleich hat der Kranke ein weniger oder mehr merkliches Fieber, welches immer von catarrhalischer Art ist. Diese Zufälle dauern einige Tage, worauf die ausfließenden Thränenfeuchtigkeiten allmählig dick und gekocht, und zuletzt einem dicken weißen Exter ähnlich werden; zu gleicher Zeit werden sie milde, und verlihren alle Schärfe allmählig. So wie dies geschieht, verliehrt sich das Fieber mit allen schmerzhaften Empfindungen im Auge, so wie auch die Geschwulst der nahen Theile, deren ganzer Umfang sich nicht selten desquamirt. Die Augenlider kleben zusammen, und öffnen sich nach einigen Tagen von sich selbst wieder. Dies ist das Ende des zweiten Zeitraums und der ganzen Krankheit.

S. 43.

Am häufigsten beobachtet man diese Entzündung bey Kindern. Sie ist mehrentheils die Folge der gestörten Ausdünstung des ganzen Körpers, oder eines einzelnen Theils, oder auch selbst des Auges. Im letzten Fall entsteht sie oft, wenn man mit

mit offenen Augen gegen einen scharfen strengen Wind geht. Sie wird bey feuchter kalter Witterung sehr häufig beobachtet. Oft ist sie epidemisch. Man kann sie die catarrhalische Augenentzündung nennen. Auch ist sie wirklich zuweilen mit einem Brustcatarrh, oder Schnupfen verbunden. Sie ist mehrentheils ohne alle Gefahr. Bey übler Behandlung veranlaßt sie indessen leicht Geschwüre auf dem Augapfel, oder den Augenlidern. Oft bedarf sie kaum der Hülfe der Kunst; die Natur heilt sie wie jeden einfachen Schnupfen innerhalb acht Tagen. Indessen erfordert sie dennoch die Aufmerksamkeit des Wundarztes, und nach Verschiedenheit der Umstände nicht selten auch den Gebrauch verschiedener innerer und äußerer Mittel.

S. 44.

Im ersten Zeitraume ist die Krankheit fieberhaft, und erfordert eine antiphlogistische Diät, und eine sorgfältige Vermeidung alles dessen, was die Ausdünstung hindern kann. Ist das Fieber merklich, so ist der innere Gebrauch des Salmiaks und Brechweinsteins sehr zuträglich. Man kann in diesem Falle von einer Auflösung von zwey Gran Brechweinstein und drey Quentchen Salmiak in sechs Unzen Wasser alle Stunden einen Eßlöffel voll nehmen lassen. Ist das Fieber sehr heftig, und der Puls voll und hart, so verdient der Salpeter den Vorzug, auch ist in diesem Falle zuweilen wohl ein Aderlaß nöthig. Jedoch ist dies ein sehr feltner Fall. Ist das Fieber sehr geringe und kaum merklich,

lich, so thut ein Bolus aus drey Gran Kampfer, zwey Gran versüßten Quecksilber, und einem Grane mineralischen Kermes alle Abend mit einigen Laffen Hollunderblüthen-tee genommen vortrefliche Dienste. Zuweilen, jedoch nur in ungewöhnlichen Fällen nehmen gastrische gallichte Schärfe, die man aus einem gänzlichen Mangel an Appetit, einem übeln bittern Geschmacke, einer unreinen Zunge, einer Spannung und Beängstigung in der Magengegend u. s. w. erkennt, an der Entzündung und dem Fieber Antheil, und dann sind gelinde Abführungen, oder auch wohl Brechmittel nöthig. — Außerlich schaden alle reizende Mittel; sie vermehren den Zufluß der Thränen und die schmerzhaften Empfindungen im Auge. Trocknende, zusammenziehende Mittel stopfen den Ausfluß und vermehren die Entzündung. Alles was man in Absicht des Außerlichen thun kann, besteht darinnen, daß man durch eine von der Stirne herabhängende Kompresse das Licht und die Luft vom Auge abhält, und öfters schleimichte Mittel, z. E. warme Milch, ein Dekokt von der Althäawurzel, oder von Malvenblüthen, Eyweiß mit etwas Rosenwasser geschlagen, verdünnten Quittenschleim, eine Auflösung vom Arabischen Gummi u. s. w. ins Auge tröpfelt oder streicht. Diese Mittel mindern die Schärfe der Thränenfeuchtigkeiten, und folglich das Brennen und die schmerzhaften Empfindungen des Auges, und alle Zufälle an den nahen Theilen, die von dieser Schärfe herühren. Nichts ist schädlicher, als ein fester Verband, wodurch der Ausfluß der Feuchtigkeiten gehemmt,

hemmt, und die Entzündung mit allen ihren Zufällen vermehrt wird. Ist der Ausfluß der Thränen sehr häufig und lästig, so thun spanische Fliegenpflaster in dem Nacken sehr gute Dienste.

S. 45.

Im zweiten Zeitraume kann der Wundarzt weiter keinen Nutzen stiften, er hat keine Anzeige irgend etwas zu thun, die Krankheit verliert sich von sich selbst. Aber Schaden kann er, wenn er die verdickte eyterartige Materie für Eyter hält, und in der Meynung demselben einen freyen Ausfluß zu verschaffen, oder sonst nöthige Mittel anzuwenden, die zusammengeklebten Augenlider öffnet, wodurch er oft eine neue Entzündung erregt, und die Krankheit in den ersten Zeitraum zurück führt. — Zuweilen ist im ersten Zeitraume die Krankheit ganz ohne Fieber, und dann ist die bereits oben empfohlne Mischung von drey Quentchen huyhamschen Spießglaswein, und einem Quentchen thebaischer Tinktur, wovon der Kranke drey mal täglich 16 bis 30 Tropfen nimmt, nebst dem äußern Gebrauche der spanischen Fliegenpflaster sehr zuträglich. Gemeinlich endigt sich die Krankheit bey dem Gebrauche dieser Mittel allmählig, ohne in den zweyten Zeitraum überzugehen. — Zuweilen ist diese Augenentzündung nicht allein ohne Fieber, sondern auch sehr langwierig, und bleibt immer im ersten Zeitraume. Von diesem Falle wird bey der chronischen rheumatischen Augenentzündung gehandelt werden.

S. 46.

Zuweilen bemerkt man in dem einen oder andern Augenwinkel im Weißen des Auges einen Pütschel aufgeschwollner Blutgefäße, (ophthalmia varicosa) der nach der durchsichtigen Hornhaut hin läuft. Zuweilen laufen einige von diesen Gefäßen über die Hornhaut hin. Oft ist dieser Fehler ein Ueberbleibsel heftiger Augenentzündungen, vorzüglich der Che-mosis; zuweilen entsteht er ohne vorhergehende Augenentzündung. Gemeiniglich empfindet der Kranke ein Drucken im Auge, als von einem fremden Körper. Zuweilen wirkt der Reiz, der von dieser Anschwellung herrührt, auf die Sehkraft, und mindert dieselbe gar sehr; zuweilen macht er das Auge gegen das Licht empfindlich; mehrentheils erregt er ein Thränen des Auges, und nicht selten bey mancherley kleinen Gelegenheiten allgemeine Entzündung des Auges. Die Gefäße, welche über die durchsichtige Hornhaut hin laufen, sind zu beyden Seiten mit einer neblichten Trübheit umgeben, wodurch das Gesicht sehr gemindert, ja wenn dieser Gefäße viele sind, gänzlich gehindert wird. Zuweilen verlihren sich diese Gefäße allmählig, wenn man stark zusammenziehende Mittel, z. E. eine starke Auflösung von Alaun mit Brandwein, oder eine schwache Auflösung vom Höllenstein u. s. w. anwendet. Am besten berührt man sie öfters des Tages mit einem kleinen Pinsel, der mit einem solchen Mittel befeuchtet ist. In den mehresten Fällen sind indessen diese Mittel nicht hinreichend, gemeiniglich muß man diese Gefäße durchschneiden. Dies geschiehet mit der Spitze

Richt. Wundarzneyl. III. B. D eines

eines Staarmessers, oder einer Lanzette. Immer müssen die Gefäße durch und durch geschnitten werden; d. i. der Schnitt muß ganz durch die Conjunctiva dringen, wenn er etwas nutzen soll. Um zu verhindern, daß sich die Enden der zerschnittenen Gefäße nicht wieder vereinigen, kann man sie nach geschehenen Schnitte mit der Spitze des Messers ein wenig von einander schieben. Man durchschneidet sie queer zunächst am Augenwinkel, und wenn sie über die Hornhaut laufen, zugleich auch zunächst an der Hornhaut. Erscheinen die Gefäße einige Tage nach der Operation wieder, so muß der Schnitt wiederholt werden.

S. 47.

Es entsteht zuweilen im Weißen des Auges plötzlich ein umgränzter tief rother Fleck von verschiedner Größe; manchmal färbt sich sogar der ganze innere oder äußere Augenwinkel plötzlich blutroth. Man hat diesem Zufalle den Namen einer besondern Augenentzündung gegeben, er rührt aber eigentlich bloß von einer Blutergießung ins Zellengewebe unter der Conjunctiva her. Eine heftige Anstrengung beim Husten, Erbrechen, Stuhlgange, u. s. w. und alles was den Trieb der Säfte nach dem Kopfe, vorzüglich nach den Augen vermehrt, veranlaßt ihn. Man hat gesehen, daß er bey einem heftigen Erschrecken entstand. Auch fremde Körper, die von außen ins Auge kommen, erregen ihn zuweilen. Er ist gewöhnlich ohne alle Beschwerden, ein Thränen der Augen, und eine unbedeutende unangenehme Empfin-

Empfindung im Auge ausgenommen; auch verliert er sich gemeiniglich in wenig Tagen von sich selbst. Allenfalls kann man die Zertheilung zu befördern, eine gelinde Auflösung von Borax, oder Salmiak, oder Bleyzucker äußerlich brauchen lassen.

§. 48.

Die gallichte Augenentzündung ist bloß eine consensuelle Wirkung gallichter gastrischer Reize aufs Auge. Sie ist zuweilen hitzig und fieberhaft, zuweilen ohne Fieber, und langwierig, zuweilen feucht, zuweilen trocken, zuweilen gelinde (taraxis) zuweilen sehr heftig (chemosis). Alle diese örtlichen Verschiedenheiten ändern in der Heilmethode nichts, welche einzig und allein gegen die gallichten Schärpen gerichtet seyn muß. Das Aderlaß, und die sonst gewöhnlichen entzündungswidrigen Mittel fruchten nichts, oft vermehren sie sogar die Entzündung. Die Zufälle dieser Entzündung sind oft periodisch; und wenn die Röthe immer gleich stark ist, so entsteht doch der Schmerz nur immer zu gewissen Zeiten des Tages. Die Entzündung ist oft epidemisch, und zu einer Zeit häufig, wo andre Gallenkrankheiten häufig sind. Der Kranke hat gemeiniglich ein gelbes Ansehen, eine unreine gelbe Zunge, einen ekelhaften bitteren Geschmack im Munde; eine Vollheit, Spannung, Schwere, Beängstigung in der Gegend der Herzgrube, gänzlichen Mangel an Eßlust, und andre Zufälle, welche die Gegenwart gallichter Schärpen im Unterleibe verrathen. Alles kömmt bey der Heilung darauf an, diese Schärpen durch Brech-

und Purgirmittel auszuleeren. Die erstern verdienen in den meisten Fällen bey weitem den Vorzug; die Erfahrung zeigt, daß wiederholte Purganzen die Krankheit oft nicht im geringsten mindern, und ein einziges Brechmittel nicht selten sie gänzlich hebt. Indessen müssen auch diese zuweilen einigemal wiederholt werden, denn oft ist eine einzige Ausleerung nicht hinreichend, die Schärfen zu erschöpfen. Zwischen dem Gebrauche dieser Mittel sind gelinde Mittelsalze, z. E. der Tartarus tartarifatus täglich viermal zu einem halben Quentchen in Verbindung mit dem Brechweinsteine in so kleinen Dosen, daß kein Erbrechen erfolgt, erforderlich, um die gastrischen Unreinigkeiten zur jedesmaligen Ausleerung zuzubereiten.

S. 49.

Zuweilen ist dennoch ein Aderlaß nützlich. Wenn der Kranke stark und vollblütig, der Puls voll und gespannt, das Fieber und die Entzündung heftig ist, kann man wider die allgemeine Regel mit großem Nutzen eine Ader am Fuße öffnen; nur darf man nie so viel Blut lassen, als bey der einfachen inflammatorischen Augenentzündung, das Aderlaß nicht als ein Hauptkurmittel, sondern nur als ein Lindermittel beobachten, und den Gebrauch der Hauptmittel, nämlich der Brech- und Purgirmittel nicht verabsäumen. Ein Aderlaß von 6 bis 8 Unzen ist bey der gallichten Augenentzündung ein starkes Aderlaß. — So lange noch gallichte Unreinigkeiten auszuleeren sind, findet der Gebrauch äußerlicher Mittel ganz und gar nicht statt. Sind diese Unrei-

nigkeiten

nigkeiten völlig ausgeleeret, so verliert sich die Entzündung von sich selbst; und dann sind äußere Mittel unnöthig. Zuweilen bleibt indessen, nachdem weiter keine Anzeige zu fernern Ausleerungen mehr da ist, mehr oder weniger Entzündung im Auge zurück, und denn kann man, um auch diese vollends zu heben, allenfalls ein Blasenpflaster in den Nacken legen, und gelinde stärkende Augenwasser, von Alaun, Bley, u. s. w. brauchen lassen. — Zuweilen ist der Rest der Entzündung, der nach der völligen Ausleerung der Unreinigkeiten zurück bleibt, dem gemischten Character der Krankheit zuzuschreiben; die Entzündung war z. E. gallicht catarrhalisch, und dann erfordert dieser Rest der Entzündung, die Mittel, die der brennende Character erfordert; in dem eben angezeigten Falle z. E. die Mittel, welche unter der catarrhalischen Augenentzündung bereits empfohlen worden sind.

§. 50.

Es giebt alte, langwierige Augenentzündungen, die einzig und allein von Stockungen in den Eingeweiden des Unterleibes entstehen, und bloß durch den fortgesetzten Gebrauch auflösender, und den wiederholten Gebrauch der Brech- und Purgiermittel geheilt werden. Diese Stockungen sind von verschiedner, am häufigsten aber von atrabilärischer Art. Die Kranken haben gemeinlich ein gelbes Ansehen, eine gestörte Eßlust, und unordentliche Verdauung, mancherley hypochondrische Beschwerden, Beängstigungen, unordentliche Leibesöffnung,

nung, unruhigen Schlaf, Flatulenz u. s. w. Die auflösenden Mittel, die in diesem Falle vorzüglich zu-
 träglich sind, sind der Tartarus solubilis, der Tar-
 tarus emeticus in kleinen Dosen, das Kermes mi-
 nerale, das versüßte Quecksilber, das Extractum
 Saponariae, tarax. gramin. der Honig, u. s. w.
 Unter den Purgiermitteln verdient die ialappa, aloë
 der helleborus und das versüßte Quecksilber den
 Vorzug. — Oft entstehen heftige und hartnäckige
 Augenentzündungen von Würmern im Darmka-
 nale. Diese lassen sich durch ihre eignen Zeichen
 entdecken, und erfordern ihre eignen Mittel, unter
 welchen in diesem Falle das versüßte Quecksilber so-
 wohl allein in kleinen Dosen, als in Verbindung
 mit Purgiermitteln das vorzüglichste ist. — Aeu-
 serliche Mittel sind sowohl in diesem, als in dem
 vorhergehenden Falle ohne Nutzen, ausgenommen
 am Ende, wenn die Ursache gehoben ist.

§. 51.

Die Verstopfung der monatlichen Reini-
 gung ist eine nicht seltne Ursach hitziger und lang-
 wieriger Augenentzündungen. Wenn dieselbe wäh-
 rend dem Flusse durch irgend eine Ursach plößlich
 gehemmt wird, erfolgt gemeinlich eine sehr hitzige
 Entzündung mit Fieber und einer nahen Gefahr der
 Ecyterung. Die Diagnostik ist in diesem Falle ohne
 Schwierigkeit, da die Wirkung gar bald auf die
 deutliche vorhergehende Ursach erfolgt. Diese Ent-
 zündung erfordert dieselbe Behandlung, welche die
 einfache inflammatorische Augenentzündung erfordert,
 jedoch

jedoch mit Rücksicht auf die Ursache, die Verstopfung der monatlichen Reinigung, welche der Wundarzt sogleich wieder herzustellen suchen muß. Da die Verstopfung frisch ist, und in diesem Falle durch äußerliche zufällige Ursachen veranlaßt wird, gelingt der Versuch, den Blutfluß wieder herzustellen, gar oft. Die vorzüglichsten Mittel, die der Wundarzt zu Erreichung dieses Endzwecks anwenden kann, sind Aderlässe am Fuße, Blutigel an die äußern Geburtstheile gelegt, blutige Schröpfköpfe an die innere Seite der Schenkel gesetzt, warme Fußbäder, Dampfbäder an die äußern Geburtstheile, warme Bähungen, und erweichende Breye auf den Bauch und die Geburtstheile, warme erweichende Klystiere u. s. w. Wenn nach dem Gebrauche dieser Mittel die monatliche Reinigung nicht wieder erscheint, die Entzündung aber und das Fieber sehr gemildert ist, so kann man ein Brechmittel, oder Klystiere von fixer Luft versuchen, Mittel, die laut vieler Erfahrungen zur Wiederherstellung der monatlichen Reinigung sehr wirksam sind.

§. 52.

Langwierig ist die Augenentzündung, die zuweilen nach der Verstopfung der monatlichen Reinigung erfolgt, wenn diese nicht plößlich während dem Flusse gehemmt wird, sondern sich allmählig verliert, oder ausbleibt. Da in diesem Falle die Entzündung selten sogleich, sondern oft eine geraume Zeit nachdem sich die Reinigung verlohren hat, erscheint, und also die Wirkung von ihrer Ursache oft

ziemlich entfernt ist, ist die Diagnostik nicht so leicht, als im ersten Falle. Auch ist wohl zu merken, daß die Entzündung und Verstopfung der monatlichen Reinigung, nicht immer da, wo sie beyde bemerkt werden, Ursach und Wirkung, sondern gar oft beyde Wirkungen eines dritten fehlerhaften Zustandes sind, gegen den man bey der Kur wirken muß, um beyde zu heben. Dieser Fall ereignet sich z. E. bey der verlarvten Lustseuche, welche nicht selten zu gleicher Zeit langwierige Augenentzündung und eine Verstopfung der monatlichen Reinigung veranlaßt. Alle Bemühungen, die monatliche Reinigung durch die gewöhnlichen Mittel wieder herzustellen, sind hier fruchtlos; und heben, falls sie gelingen, die Augenentzündung nicht: das Quecksilber allein hebt die Augenentzündung, und stellt die monatliche Reinigung wieder her. — Zuweilen ist dennoch die Diagnostik dieser Entzündung und ihrer Ursache nicht schwer. Oft nämlich bemerkt man eine monatliche Verschlimmerung der Entzündung; gemeiniglich fallen diese Verschlimmerungen in die Zeit, wo die Kranke sonst ihre monatliche Reinigung hatte, nicht selten empfindet die Kranke zugleich einen Trieb zu dieser Blutaussleerung, und allerhand Beschwerden in der Gegend der Geburtstheile, da man denn nicht zweifeln kann, daß beyde Fehler, Entzündung und Verstopfung der monatlichen Reinigung, als Ursache und Wirkung mit einander in Verbindung stehen. Da indessen die Verstopfung der monatlichen Reinigung in diesem Falle von mancherley innern Ursachen herrührt, deren Erkenntniß und Heilung

das

daß Geschäfte eines Arztes ist, kann von der Behandlung dieser Ophthalmien hier nicht vollständig gehandelt werden.

S. 53.

Eben so, wie mit der monatlichen Reinigung verhält sich auch mit dem güldnen Aderflusse. Wird derselbe, indem er fließt, plötzlich gehemmt, so ist die Augenentzündung, welche zuweilen erfolgt, heftig, und die Behandlung derselben so wie in dem gleichen Falle der monatlichen Reinigung. — So entstehen auch zuweilen hartnäckige Augenentzündungen, wenn die güldne Ader unordentlich fließt, oder nicht zum Flusse gelangt. Da hier in Absicht der Augenentzündung alles darauf ankommt, die Hämorrhoidalbeschwerden nach der Verschiedenheit der Umstände verschiedentlich zu behandeln, kann hier nichts weiter davon gesagt werden. — So verursacht auch die Kindbetterreinigung (lochia), und eine jede andre Blutausleerung, die der Natur zur Gewohnheit worden ist, wenn sie gestopft, oder unterlassen wird, manchmal Augenentzündungen, wobey es immer vorzüglich darauf ankommt, die gestopfte Blutausleerung wieder herzustellen, oder wenn dies nicht geschehen kann, durch eine andre zu ersetzen.

S. 54.

Unter die häufigern Augenentzündungen gehören vorzüglich die venerischen. Sie sind von verschiedner Art: manchmal ein Symptom der offenkundigen allgemeinen Lustseuche; manchmal ein Zufall

der so genannten verlarbten Lustseuche; manchmal die Folge eines gestopften Trippers. Die Augenentzündung, welche ein Symptom der allgemeinen Lustseuche ist, hat nichts besonders. Ihre Diagnose ist ohne Schwierigkeit. Das Quecksilber heilt die Lustseuche, und mit ihr das Symptom derselben, die Augenentzündung. Jedoch sind in Absicht der Entzündung folgende Regeln zu beobachten. Ist die Entzündung heftig, der Kranke vollblütig, und fieberhaft, so ist es rathsam vorher eine Ader zu öffnen, auch wohl eine antiphlogistische Diät zu beobachten, und einige gelinde Mittelsalze nehmen zu lassen, ehe man zu den Gebrauch des Quecksilbers schreitet. Die Verbindung des Quecksilbers mit schweißtreibenden erhitzen Pflanzlichen, z. E. einem Decoct der Sarsaparilla, oder dem Guajacholz, die sonst sehr gewöhnlich und nützlich ist, findet, so lange die Entzündung nur einigermaßen heftig ist, nicht statt. Besser läßt man schleimichte kühlende Pflanzlichen, eine Abkochung von Gerstengraupen, oder Habergrüße mit dem Quecksilber nehmen. Ist die Entzündung chronisch, und unschmerzhaft, so ist die Verbindung des Calomels mit dem Kampfer vorzüglich nützlich. Ist die Entzündung chronisch, aber schmerzhaft, und das Auge sehr empfindlich und feucht, so kann man den Calomel etwas Mohnsaft und Spießglas beymischen; z. E. dem Kranken alle Morgen und Abend ein Pulver aus ein oder zwey Gran Calomel, einem Grane Spießglaschwefel und eben so viel Mohnsaft extract nehmen lassen. Immer thut man auch wohl, wenn man das Quecksilber

silber nicht allein innerlich, sondern auch zugleich äußerlich aufs Auge anwendet, und das entzündete Auge z. E. täglich einigemal mit einer Mischung aus einer Unze mercurius gummosus, und einem Pfund Milch bähnen läßt.

§. 55.

Zuweilen ist die Augenentzündung eine Wirkung der verlarvten Lustseuche. Sie ist in diesem Falle von verschiedner Art, feucht, trocken, eytzig (purulenta) zuweilen periodisch, mehrentheils chronisch, oft aber mit untermischten hitzigen Verschlimmerungen, die jedoch mehrentheils von zufälligen Ursachen herrühren. Die Erkenntniß der Ursache ist in diesem Falle nicht so leicht, wie in dem vorhergehenden; indessen wird man bey genauer Untersuchung gemeiniglich eine Reihe von mancherley Beschwerden, die gemeiniglich bey einem ursprünglichen offenbar venerischen Symptom, z. E. bey einem Chanker, anfängt, und sich bey der Entzündung der Augen endigt, entdecken, und daraus leicht auf die Veranlassung der Entzündung einen Argwohn schöpfen können. Außerdem hat diese Entzündung auch das besondere, daß sie des Nachts vorzüglich schmerzhaft ist, und auch dann, wenn sie gelinde ist, gemeiniglich die durchsichtige Hornhaut stark verdunkelt. Quecksilber ist auch hier das einzige Mittel, wovon sich die Heilung der verlarvten Lustseuche, und ihres Symptoms, der Augenentzündung, erwarten läßt. Da in diesem Falle die Lustseuche gemeiniglich veraltet, oder übel behandelt ist,

ist, trifft man den Krankheitszustand selten einfach, sondern oft vermischt mit andern Krankheitszuständen an, worauf bey der Kur Rücksicht genommen werden muß. Es ist hier nicht der Ort, die Kur der verlarvten Lustseuche, und aller Krankheitszustände, mit denen sie zuweilen verwickelt ist, vollständig anzuzeigen. Nur von denen Verwickelungen, die vorzüglich häufig beobachtet werden, ein paar Worte.

S. 56.

Es giebt Kranke, die durch lange fortgesetzte Ausschweifungen sich nicht allein die verlarvte Lustseuche, sondern auch eine große Schwäche aller Eingeweide des Unterleibes zugezogen haben. Bey diesen findet man den Unterleib gar oft mit verdickten, scharfen, schadhafsten, stockenden Feuchtigkeiten angefüllt, und die Augenentzündung, die sie haben, ist nicht bloß venerisch, sondern wirklich zugleich gastrisch. Quecksilber, gleich zu Anfange der Kur, hebt in diesem Falle nicht allein oft die Augenentzündung, an welcher auch die gastrischen Unreinigkeiten Antheil haben, nicht, sondern verursacht auch nicht selten mancherley Beschwerden, die den Kranken nicht allein belästigen, sondern auch den Wundarzt zuweilen zu mancherley Irrthümern verleiten. Immer müssen in diesem Falle die Eingeweide des Unterleibes zuerst durch auflösende, und Brech- und Purgiermittel von Unreinigkeiten und Stockungen befreuet werden, ehe man zur Quecksilberkur schreitet. — Wenn neben der verlarvten Lust-

Lustseuche zugleich eine scrophulöse Kachymie beobachtet wird, muß der Wundarzt die Mittel, die diese erfordert, mit dem Quecksilber vereinigen, wann er die Augenentzündung und die andern Zufälle gründlich heben will. Ein Pulver aus einem Gran Calomel, eben so viel Spießglaschwefel, und acht Gran Schierlingspulver thut in diesem Falle oft vortreffliche Dienste. Ist der Kranke zugleich schwach, ein häufiger Fall, so kann er zugleich ein Dekokt von der Chinarinde nehmen. — Zuweilen hat nicht allein das venerische, sondern auch zugleich das Kräsgift Antheil an der Augenentzündung. Die Erkenntniß dieses Falls erhellet aus der Geschichte des Kranken. Ueberdies haben die Kranken von Zeit zu Zeit gemeiniglich an diesem oder jenem Theile mehr oder weniger von einem Kräsausschlag. Das Quecksilber fruchtet in diesem Falle nicht das geringste, obgleich der Kranke offenbar venerisch ist, ehe nicht das Kräsgift gedämpft ist. Und dies geschieht durch den ein paar Wochen lang fortgesetzten äußerlichen Gebrauch der Zasserschen Krägsalbe, die aus gleichen Theilen Schwefelblumen, Lorbeerpulver und weißen Vitriol mit einer hinreichenden Menge Olivendl zu einer Salbe gemischt, besteht. Allenfalls kann man zu gleicher Zeit auch innerlich schweißtreibende Mittel, z. E. Schwefelblumen, Kampfer, ein Dekokt von der Bardana u. s. w. nehmen lassen. — Zuweilen ist der mit der verlarvten Lustseuche behaftete Kranke sehr entkräftet, und dann ist die Verbindung der Chinarinde mit dem Quecksilber sehr zuträglich. — Zuweilen ist er
äußerst

äußerst reizbar und empfindlich, und dann ist es rathsam, den Mohnsaft mit dem Quecksilber zu vereinigen. — Daß das Quecksilber immer sehr widrige Wirkungen hervorbringt, wenn die Lustseuche mit dem Scorbut verbunden ist, und daß in diesem Falle immer die scorbutische Verderbniß der Säfte durch zweckmäßige Mittel gehoben werden muß, ehe man an den Gebrauch des Quecksilbers denkt, ist bekannt. — Mehrerer Fälle der complicirten Lustseuche hier nicht zu gedenken.

S. 57.

Die Augenentzündung, welche von einem gestopften Tripper entsteht, ist von der einfachen venerischen dadurch unterschieden, daß sie oft dem Gebrauche des Quecksilbers allein nicht weicht, sondern mehrentheils zu ihrer Heilung die Wiederherstellung des Tripperflusses erfordert. Sie ist in ihren Zufällen verschieden. Zuweilen ist sie von der heftigen einfachen inflammatorischen Augenentzündung (S. 24) durch nichts, als allenfalls bloß durch die Schnelligkeit unterschieden, wonit sie in Ecyterung übergeht, und den gänzlichen Verlust des Auges verursacht. — Zuweilen schwillt die Conjunctiva rings um die Hornhaut herum, wie bey der Chemosis auf, und diese Anschwellung rührt einzig und allein von einer wirklichen Trippermaterie her, die sich ins Zellengewebe und die Conjunctiva ergossen hat, und wenn man diese Haut durchschneidet, ausfließt (Alexandri Camerarii Dissertatio de ophthalmia venerea et peculiari in illa operatione, Tubing.

Tubing. 1734). — Zuweilen findet man bey dieser Entzündung eine tripperartige Materie in der vordern Augenkammer. — Zuweilen fließt, statt der sonst gewöhnlichen Thränenfeuchtigkeit aus der ganzen Ueberfläche der entzündeten Theile eine Materie, die völlig der Trippermaterie ähnlich ist, so daß man in diesem Falle die Krankheit wirklich einen Augentripper nennen kann. — Mehrentheils entsteht die Entzündung bald, ja sogleich nachdem der Tripper gestopft worden ist, und dann ist sie gemeinlich hitzig, und auf die eine oder andre eben angezeigte Art beschaffen. Zuweilen entsteht sie erst einige Wochen, ja Monate, nach dem gestopften Tripperflusse, und dann ist sie mehrentheils chronisch. Im ersten Falle ist die diagnosis leicht; im zweyten Falle erfordert sie mehrere Aufmerksamkeit. — Was übrigens bisher vom Tripper gesagt worden ist, gilt auch vom venerischen weißen Flusse der Weibspersonen, der wenn er gestopft wird nicht selten ähnliche Augenentzündungen erregt. — Die Ophthalmie, die mit einem Tripperausflusse aus dem Auge verbunden ist, wird zuweilen durch eine örtliche Ansteckung veranlaßt. Man hat gesehen, daß sie durch die Berührung des Auges mit einem Finger, an welchem Trippermaterie befindlich war, verursacht worden ist.

§. 58.

Die Heilung dieser Ophthalmie, wenn sie hitzig ist, erfordert den Gebrauch der gewöhnlichen antiphlogistischen Mittel, den Gebrauch des Quecksilbers,

bers, und die Wiederherstellung des Tripperflusses. Bey der chronischen ist der Gebrauch der erstern Mittel unnöthig. Das erste Geschäfte des Wundarzts ist, die Heftigkeit der Entzündung, und die Gefahr der Entierung durch antiphlogistische Mittel zu mindern, die hier eben so wie bey der einfachen inflammatorischen Augenentzündung, und da hier die Gefahr der Entierung sehr dringend ist, so eilig und ernstlich als möglich, angewendet werden müssen. Auch hier sind wiederholte Aderlässe die Hauptmittel, wodurch dieser erste Endzweck zu erreichen ist. Bey der Entzündung, die mit einer Ergießung einer Trippermaterie unter die Conjunctiva verbunden ist, muß diese Haut, wie bereits oben gesagt worden ist, durchschnitten, und die Materie ausgeleeret werden. Bemerket man ein Tripperextravasat in der vordern Augenkammer, so muß die Hornhaut geöffnet werden, wie bey dem Enterauge. Ist die Entzündung mit einem tripperartigen Ausflusse aus dem Auge verbunden, so müssen, um den Reiz dieser Materie zu mildern, schleimige Mittel, vorzüglich die kurz vorhergenannte Mischung aus einer Unze mercur. gummosus und einem Pfunde Milch, welche nicht allein als ein milderndes, sondern auch als ein specifisches Mittel wirkt, aufs Auge angewendet werden.

S. 59.

So bald durch diese Mittel die Heftigkeit der Entzündung, und die Gefahr der Entierung gehoben ist, beschäftigt sich der Wundarzt mit der Wiederherstel-

herstellung des Tripperflusses, und der Tilgung des venerischen Giftes durch Quecksilber. Erweichende Einspritzungen in die Harnröhre, warme erweichende, vorzüglich Milchbäder der Zeugungstheile, ähnliche Bädungen und Breye, vorzüglich der herba cicutae und hyosciami auf die Schamgegend und das Mittelfleisch gelegt, Dampfbäder, erweichende Klystiere stellen den Tripperfluß, in diesem Falle, wo derselbe vor kurzen durch äußere Ursachen gestopft worden ist, gemeiniglich wieder her. Innerlich giebt man den Kranken Calomel, mit abführenden Mitteln verbunden, wenn die Entzündung noch etwas hitzig ist, mit Mohnsaft, wenn sich das fieberhafte gemindert hat, und das Auge noch empfindlich ist. Erscheint der Tripperausfluß nicht wieder, hat sich das fieberhafte verlohren, und dauert die Entzündung fort, so empfiehlt man (Störck ann. med. II. p. 225) den Gebrauch einer Mischung aus milleped. scammon. und antim. diaphoretico, oder (Schmucker, chirurg. Wahrnehmungen, 1 B.) eine Mischung aus Rhabarber und Salpeter, die gemeiniglich die Absonderung des Urins vermehrt, und mehr nützt, als das Quecksilber selbst.

§. 60.

Wenn im Falle einer hitzigen Augenentzündung ungeachtet aller dieser Mittel der Tripperausfluß nicht wieder erscheint, und die Augenentzündung zwar nicht mehr hitzig ist, aber doch immer noch mit einiger Hefigkeit fortbauert, oder wenn die Entzündung gleich vom Anfange an chronisch ist, und

dem innern Gebrauche des Quecksilbers allein nicht weichen will, so hat der Wundarzt noch ein Mittel, das den Tripperaußfluß gewiß wiederherstellt, und dadurch den hartnäckigen Keß der Augenentzündung gewiß hebt, ein Mittel das in den neuern Zeiten erst empfohlen ist, (Lange Commentatio de Ophthalmia, Tyrnau, 1777) die Inoculation des Trippers. Man steckt einen gewöhnlichen Wachs bougie in die Harnröhre eines mit dem Tripper behafteten Kranken, so daß derselbe mit der Trippermaterie gehörig befeuchtet wird, und legt ihn alsdann in die Harnröhre des Kranken, dem man den Tripper inoculiren will. Nie darf man ihn über einen Zoll tief einlegen, und immer läßt man ihn so lange liegen, bis der Kranke ein Brennen empfindet. Oft ist man genöthigt die Einlegung zwey bis drey mal zu wiederholen, um einen Ausfluß zu erregen, und gehörig zu unterhalten. So bald der Ausfluß entstanden ist, wird er wie der gewöhnliche venerische Tripper behandelt, und immer verliehrt sich während demselben die Augenentzündung. Verliehrt sie sich nicht, so hat man Ursach, sie einer Nebenursach zuzuschreiben, die wie bey der venerischen Ophthalmie aufgesucht und behandelt werden muß.

§. 61.

Da der Tripperaußfluß aus der Harnröhre blos die Wirkung eines Reizes ist, der die Schleimdrüsen der Harnröhre zu einer vermehrten Schleimabsonderung reizt; da ein jeder anderer Reiz also diesen Ausfluß erregen kann; und da vielleicht mancher
Kranker

Kranker Bedenken tragen möchte, sich das venerische Gift inoculiren zu lassen; fragt sichs, ob man nicht diesen Tripperaußfluß durch andre gutartige, weniger widrige Reize erregen könnte? Man hat wirklich Versuche gemacht, und bloß eine reine Wachskerze eingelegt, (Morigues, Journal de Medecine Tome 36) oder dieselbe mit der rothen Präcipitatsalbe bestrichen, und einen wirklichen Tripperaußfluß, und die völlige Heilung der Augenentzündung erfolgen sehen. Indessen da der glückliche Erfolg bey Versuchen dieser Art, nicht ganz gewiß und zuverlässig ist, (Lange l. c.) scheint es rathsam zu seyn, den Tripper durch Trippermaterie zu erregen, bis fernere Erfahrungen etwas gewisses bestimmt haben. — Sobald die Augenentzündung anfängt chronisch zu werden, kann man äußerlich die rothe Präcipitatsalbe aufs Auge anwenden, welche nicht allein den Nest der Entzündung, sondern auch die Verdunkelung der Hornhaut, welche dieselbe oft veranlaßt, hebt.

§. 62.

Die scrophulöse Ophthalmie ist eine Wirkung der scrophulösen Kachochymie. Die damit behafteten Kranken sind gemeiniglich schwach, haben ein bleiches Ansehen, geschwollne Drüsen am Halse, oft eine dicke Oberlippe, einen kurzen Hals, eine breite Unterkinnbacke, eine schorfichte feuchte Nase, den Mund voll Wasser, einen dicken Bauch, verstopfte Gefäßdrüsen, u. s. w. Die Augenentzündung ist langwierig, bald etwas gelinder, bald etwas

heftiger, verschlimmert sich nach allen warmen, erweichenden, schwächenden äußern und innern Mitteln, die Augenlider sind dick, gleichsam ödematös, das Auge giebt sehr viele schleimichte Feuchtigkeiten von sich u. s. w. Alle diese Zufälle der scrophulösen Kachochymie scheinen theils von einer Schwäche der festen Theile, theils von einer schleimichten Beschaffenheit der Säfte, - und daher rührender Verstopfung der drüsichten Theile, theils auch von einer Schärfe der Säfte, die vielleicht von eigener Art ist, herzurühren. Alle sogenannte antiphlogistische Mittel nutzen nicht allein bey dieser Augenentzündung nichts, sondern schaden auch offenbar. Die Kur der Entzündung hängt einzig und allein von der Kur der scrophulösen Kachochymie ab, und diese erfordert ihre eignen Mittel, die bewährtesten unter denselben sind: die Chinarinde, die Eichenrinde, der Eisenvitriol, das kalte Wasser; die venedische Seife, das Quecksilber, die assa foetida, der Schierling im Extrakt, oder Pulver, oder der frisch ausgepreßte Saft desselben; das Spießglas, die digitalis purpurea, die Blasenpflaster u. s. w. nebst einer nahrhaften, gewürzhaften, stärkenden Diät, und öftern mäßigen Bewegungen des Körpers. In der Wahl des in jedem Falle vorzüglich zweckmäßigen Mittels aus diesen verschiedenen, leitet den Wundarzt die aufmerksame Beurtheilung des oben angezeigten dreifachen Charakters der Krankheit. Zuweilen siehet er aus allen Zufällen, daß vorzüglich Schärfe in den Säften obwaltet; das Auge ist sehr empfindlich, die Entzündung schmerzhaft, der Kranke hat
einen

einen Ausschlag, oder Geschwüre an verschiedenen Theilen des Körpers. In diesem Falle wählt er unter den oben angezeigten Mitteln, vorzüglich die Spießglasmittel, den Schierling, die digitalis purpurea, und die Blasenpflaster. Eine Mischung aus einer Unze Hurhamschen Spießglaswein, und einem Quentchen von dem Extrakt der digitalis purpurea täglich dreymal zu 16 bis 50 Tropfen genommen, thut in diesem Falle oft vortrefliche Dienste. Auch die vorhergenannte Mischung aus einem Gran Kalomel, eben so viel Spießglaschwefel, und acht Gran Schierlingpulver täglich zweymal genommen, ist hier sehr zuträglich. Außerlich verdient die thebaische Tinktur, wovon man ein paar Tropfen ins Auge fallen läßt, den Vorzug. — Zuweilen ersiehet der Wundarzt aus den Zufällen, daß Schwäche und Erschlaffung der festen Theile die vorzüglichste Aufmerksamkeit erfordert: der Kranke ist sehr bleich, der Puls schwach, das Auge feucht und wenig schmerzhaft, die Augenlider ödematös u. s. w. In diesem Falle ist er berechtigt, aus obigen Mitteln vorzüglich die stärkenden zu wählen; z. E. zum innern Gebrauch, die China und Weidenrinde, den Eisenvitriol; zum äußerlichen Gebrauche ein Dekokt von der China oder Weidenrinde, das kalte Wasser, die Alaunauflösung, Bleymittel u. s. w. — Bemerkt der Wundarzt vorzüglich Stockungen und Anschwellungen drüsichter Theile, so wählt er vorzüglich die auflösenden Mittel, den Spießglaschwefel, das Kalomel, den Schierling, die alla foetida, die venedische Seife u. s. w. — Uebrigens gehören

in vielen Fällen die scrophulösen Augenentzündungen zu den hartnäckigsten.

§. 63.

Eben so hartnäckig, ja in vielen Fällen noch weit hartnäckiger sind die Augenentzündungen, die bey oder nach der Blatternkrankheit entstehen. Es giebt verschiedene Aerzte, welche behaupten, daß die verschiedenen Augenfehler, welche die Blatternkrankheit veranlaßt, gemeiniglich von einer Blatter, die auf dem Augapfel selbst entsteht, herrühren, und um die Entstehung einer solchen Blatter zu verhüten, den Rath geben, sowohl kurz vor, als auch während der Eruption einen mit Kampfer bestrichenen wollenen Lappen über die Augen herabhängen zu lassen. Andre glauben, daß diese Augenfehler vorzüglich von dem Reize der scharfen Feuchtigkeiten herrühren, welche, wann im dritten Zeitraume der Blatternkrankheit die Augenlider anschwellen, und zusammenkleben, zurückgehalten werden; und diese geben den Rath die Augenlider täglich zu öffnen, um diese Augenfehler zu verhüten. In den allermeisten Fällen entstehen diese Augenfehler einige Tage, ja Wochen nach völlig geendigter Blatternkrankheit, und daraus erhellet offenbar, daß sie weder von der ersten, noch von der zweyten Ursache herrühren. Am wahrscheinlichsten sind sie einer Metastase zuzuschreiben; wenigstens ereignen sie sich am häufigsten nach schlimmern Blattern, wenn im dritten und vierten Zeitraume der Krankheit, die Ausleerungen durch die Haut, den Urin, und Stuhl-

Stuhlgang verabsäumet werden. — Daß zuweilen auf dem Augapfel Blattern zum Vorschein kommen, ist wohl möglich, aber doch selten. Der Gebrauch des Kampherlappens ist übrigens unschädlich. Aber die tägliche Eröffnung der angeschwollenen und zusammengeklebten Augenlider ist ohne Widerrede schädlich. Die Erfahrung zeigt, daß gerade diejenigen, denen man die Augenlider täglich öffnet, am allerhäufigsten Augenschler nach den Blattern bekommen: und die Ursache läßt sich leicht einsehen, da das Auge bey dieser Operation immer belästigt und gereizt wird. Auch unnöthig ist die Eröffnung der Augenlider; denn man wird immer bemerken, daß die Feuchtigkeiten, die sich unter denselben erzeugen, im innern Augenwinkel frey ausfließen. Endlich ist sie auch wirklich unmöglich, da die Augenlider nicht bloß zusammengeklebt, sondern zugleich geschwollen sind. — Aber die verdickten Unreinigkeiten im innern Augenwinkel, und in den Haaren der Augenlider mit warmer Milch behutsam, und ohne das Auge zu belästigen, täglich abzuwischen, ist unschädlich und rathsam.

S. 64.

Am sichersten verhütet man diese Augenentzündungen, wenn man im dritten und vierten Zeitraume der Blatternkrankheit, auch noch eine Zeitlang nach völliger Endigung derselben dafür sorgt, daß alle Ausleerungen gehörig von statten gehen, vorzüglich aber die Leibesöffnung, durch gelinde Purgiermittel, und vornemlich durch den innern Gebrauch

des Kalomels unterhält und befördert. Auch wenn diese Entzündung bereits entstanden ist, thut das Kalomel, abwechselnd in kleinern, und größern Dosen, so daß ein gelinder Durchfall erfolgt, die besten Dienste. Erfolgt keine Besserung, so verdient der Hurhamsche Spießglaswein mit der Thebaischen Tinktur, mit dem untergemischten Gebrauch der Brechmittel, und warmen Bäder vorzüglich empfohlen zu werden. Auch das kurz vorher angezeigte Pulver aus Schierling, Spießglasschwefel und Kalomel ist zuweilen sehr dienlich.

§. 65.

Auch nach der Masernkrankheit bleiben oft hartnäckige Augenentzündungen zurück, die sowohl in Absicht ihrer Entstehungsart, als ihrer Kurart der vorhergehenden Gattung völlig ähnlich sind. Indessen zeigt die Erfahrung, daß so wie bey jenen vorzüglich Vermehrung der Leibesöffnung, bey diesen vorzüglich Beförderung der Hautausdünstung zuträglich ist. Desters wiederholte gelinde Brechmittel, und Blasenpflaster, der innere Gebrauch der Spießglasmittel mit Kampfer oder Mohnsaft, oder Moschus sind gemeiniglich vorzüglich nützlich. Vermögen diese Mittel nichts, so leisten zuweilen urintreibende Mittel Hülfe.

§. 66.

Zurückgetretne Hautkrankheiten veranlassen gar oft auch hartnäckige Augenentzündungen. Unter diesen verdient die Krätze eine vorzügliche Aufmerksamkeit.

samkeit. Oft ist die Diagnostik dieser Ursache sehr schwer; sie ist nicht selten so weit von ihrer Wirkung, der Augenentzündung entfernt, daß man in der Lebensgeschichte des Kranken verschiedene Monate, ja Jahre zurückgehen muß, um sie zu entdecken. Indessen erleichtern sie dennoch die bereits (S. 56) angeführten Zeichen. Am gewissten heilt man diese Augenentzündung, wenn man die Krätze hervorbringen sucht. Dies geschieht durch den innern Gebrauch gelinder schweißtreibender Mittel, des Schwefels, des Kampfers, der Rußessenz, des Defokts der Bardana, mit untermischten warmen Bädern, und Brechmitteln, welche letztere zur Hervorbringung zurückgetretner Hautausschläge sehr wirksam sind; oder durch eine neue Ansteckung, welche jedoch nicht selten fehlschlägt; oder durch den äußerlichen Gebrauch der Jasserschen Krätzsalbe, welche nicht allein die gegenwärtige Krätze heilt, sondern auch die zurückgetretne wieder hervorbringt.

S. 67.

Auch andre Hautkrankheiten, die Flechten, der böse Kopf, alte Geschwüre u. s. w. können, wenn sie unrecht behandelt, oder unvorsichtig getrocknet werden, heftige und hartnäckige Augenentzündungen verursachen. In allen solchen Fällen findet eine allgemeine, oder specielle Kurart statt. Bey der allgemeinen Kurart wendet der Wundarzt Mittel an, die die von der Haut zurückgetretne Materie wieder nach der Haut hinziehen oder treiben. Hieher gehören die schweißtreibenden Mittel, von welchen

chen der Schwefel, verschiedene Spießglaszubereitungen, Kampfer, Moschus, Ruß, und verschiedene schweißtreibende Prisanen vorzüglich in Gebrauch sind. Ein Brechmittel dann und wann gegeben befördert die Wirkung dieser Mittel vorzüglich. Der öftere Gebrauch warmer, vorzüglich Schwefelbäder ist gleichfalls von großem Nutzen. Endlich kann man auch von den künstlichen Geschwüren, Blasenpflastern, Fontanellen hier vieles erwarten. Die letztern Mittel müssen entweder so nahe als möglich an den leidenden Theil, das Auge, oder an die Stelle gelegt werden, an welcher die Hautkrankheit befindlich war. — Die specielle Kurart besteht in dem Gebrauch derer besondern Mittel, welche jede besondre Hautkrankheit besonders erfordert; wovon hier aber nicht gehandelt werden kann.

§. 68.

Die periodische Augenentzündung ist nicht immer von einer und eben derselben Art; sie ist in ihren Zufällen verschieden, entsteht von verschiedenen Ursachen, und erfordert eine verschiedene Kurart. In ihren Zufällen ist sie auf eine dreifache Art verschieden; sie hat nämlich entweder bloß periodische Verschlimmerungen; diese haben beynah alle fieberhafte, ja sogar viele chronische Augenentzündungen; — oder der Schmerz erscheint und verschwindet zu gewissen Zeiten, die Röthe nebst den übrigen Zufällen leidet keine Veränderung; auch dies geschieht bey mancherley Arten von Augenentzündungen; — oder endlich die Entzündung mit
allen

allen ihren Zufällen erscheint zu gewissen Zeiten, und verschwindet wechselsweise wieder. Und nur in diesem Falle verdient sie den Namen der periodischen Augenentzündung. Aber auch hier ist sie verschieden sowohl in ihren Ursachen, als auch in ihrer Kurart. Die gastrische Augenentzündung, diejenige, welche von Würmern entsteht, diejenige welche den verstopften Monatsfluß zum Grunde hat, selbst die venerische Augenentzündung, mehrerer nicht zu gedenken, ist oft von dieser Art. Die Behandlung der periodischen Augenentzündung ist also verschieden. Immer kommt es vorzüglich darauf an, die Ursach derselben ausfindig zu machen, und zu heben. Nur wenn diese gehoben ist, und die Entzündung noch fortdauert, oder wenn ganz und gar keine besondre Ursache ausfindig zu machen ist, ist der Wundarzt berechtigt, zu dem Mittel, das gegen die periodische Natur der Entzündung unmittelbar wirkt, und das bey periodischen Krankheiten so oft gemißbraucht wird, zur Chinarinde, seine Zuflucht zu nehmen.

S. 69.

Die gichtische Augenentzündung ist so wie die Gicht selbst hitzig, fieberhaft, oder chronisch. Sie entsteht auf verschiedene Art. Zuweilen ist sie mit der offenbaren Gicht verbunden, und entsteht und verschwindet, verschlimmert und vermindert sich mit dieser, dergestalt daß ihre Natur nicht verkannt werden kann. Zuweilen ist sie die Folge einer unordentlichen, oder zurückgetretenen Gicht; der Kranke hat

hat nämlich die ihm sonst gewöhnlichen Gichtzufälle nicht mehr, und statt deren die Augenentzündung; die Gichtmaterie, die sich sonst auf andre äußere Theile warf, hat sich in diesem Falle aufs Auge geworfen. Die vorhergehenden, und oft mit der Entzündung abwechselnden Gichtbeschwerden geben in diesem Falle dem Wundarzt gemeiniglich gar bald Licht. Im dritten Falle aber ist die Diagnose oft sehr schwer. Der Kranke nämlich hat nie wirklich Gichtschmerzen gehabt, die Gichtmaterie, die sich in seinem Körper zum erstenmal erzeugt, wirft sich sogleich und zuerst aufs Auge. Der Kranke ist wirklich gichtisch, ohne die Gicht zu haben. Die Diagnose dieses Falls erfordert das Auge eines Arztes. Manchmal wechselt auch hier die Augenentzündung mit wahren Gichtbeschwerden ab, oder diese erscheinen bey der Entzündung manchmal auf eine kurze Zeit; die Entzündung entsteht oder verschlimmert sich vorzüglich bey kalter feuchter Witterung, oder überhaupt zu einer Zeit wo Gichtbeschwerden häufig sind; der Kranke hat zugleich allerhand andre Beschwerden, die mit der wahren Gicht oft verbunden sind, u. s. w.

S. 70.

Die gichtische Augenentzündung wird wie eine Gichtbeschwerde irgend eines andern Theils behandelt. Davon vollständig zu handeln ist hier nicht der Ort. Also nur folgende allgemeine Regeln für den Wundarzt. — Ist die Augenentzündung hitzig und fieberhaft, so muß, so wie bey der inflammatorischen

torischen einfachen Augenentzündung, nach Maaßgabe der Entzündung, des Pulses und Fiebers zur Ader gelassen, und der Kranke antiphlogistisch behandelt werden. Darauf ist es gemeiniglich nöthig auf die ersten Wege zu sehen, und den Gebrauch gelinder Abführungen so lange fortzusetzen, als die Ausleerungen widernatürlich beschaffen sind. Ist das Fieber gemindert, oder ist die Entzündung gleich vom Anfange ohne Fieber, so besteht das Hauptgeschäfte der Kur darinne, die Gichtmaterie durch spanische Fliegenpflaster, Bäder, künstliche Geschwüre u. s. w. von Auge abzuführen, oder aus dem Körper auszuleeren. Die Mittel, welche die Erfahrung zu Erreichung der letzten Absicht vorzüglich bewährt hat, sind: alle Spießglasmittel, das gummii guaiaci, das aconitum, die dulcamara, die Eilerschen Tropfen u. s. w. Aeußerliche Mittel verträgt diese Augenentzündung selten, am allerwenigsten feuchte; die rhebaische Tinktur ausgenommen, welche zuweilen sehr viel Linderung schafft.

S. 71.

Die rheumatische Augenentzündung hat mit der gichtischen sehr viel Aehnlichkeit. Sie ist gleichfalls hitzig, oder chronisch. Die hitzige erfordert den Gebrauch der antiphlogistischen und darauf der diaphoretischen Mittel. Ist sie ohne Fieber, so wird sie größtentheils wie die chronische arthritische behandelt. — Die scorbutische Augenentzündung erkennt man aus den eignen Zeichen des Scorbutus; auch heilt man sie durch die antiscorbutischen Mittel.

Mittel. — Von der entzigen Entzündung ist bereits (s. diese Anfangsgründe 2 Band, S. 560) gehandelt worden. — Dies sind die vorzüglichsten Ursachen und Gattungen der Augenentzündungen.

S. 72.

Wenn der Wundarzt keine von den angezeigten häufigern, und andern möglichen seltnern Ursachen entdeckt, wodurch er zu der erforderlichen Kurmethode der Augenentzündung geleitet wird, findet er zuweilen in der allgemeinen Leibesbeschaffenheit des Kranken eine Kuranzeige. Ist der Kranke jung, stark, vollblütig, von einem thätigen Temperamente, und einer geschäftigen Lebensart, liebt er nahrhafte, gewürzhafte Speisen, starke erhitzen Getränke, hat er einen starken Appetit, eine gute Verdauung u. s. w. so erreicht man gar oft den Kurendzweck, wenn man ihm die Beobachtung einer sparsamern, kühlenden vegetabilischen Diät, öftere kühlende Abführungen, den Gebrauch kühlender Arzneymittel, der Molken, des Quekendekokts, gelinder Mittelsalze, ja wohl gar dann und wann ein Aderlaß empfiehlt. — Ist der Kranke bleich, schwach, mit wenigen oder übelbereiteten Säften versehen, so bessert eine nahrhafte Diät, nebst dem Gebrauche stärkender Arzneymittel nicht allein seine Konstitution, sondern hebt auch oft die Augenentzündung.

S. 73.

Wenn der Wundarzt nach allen bisher erwähnten Anzeigen die Augenentzündung behandelt hat,
und

und dieselbe weicht dennoch nicht, oder wenn er keine der erwähnten Anzeigen entdeckt, so ist er berechtigt seine Zuflucht zu empirischen Mitteln zu nehmen. Dies sind Mittel, deren heilsame Wirkungen bey hartnäckigen Augenentzündungen die Erfahrung bestätigt hat; bey deren Gebrauche aber dennoch der Wundarzt gar oft auf Anzeigen, und Gegenanzeigen zu achten hat. — Eines der vorzüglichsten Mittel dieser Art ist das Quecksilber, dies große Mittel, welches gegen Entzündungen von mancherley Art, vorzüglich gegen Augenentzündungen, eine ganz vorzügliche, ja beynahe specifische Kraft hat. Nie ist es zuträglich, so lange noch eine Anzeige zum Aderlassen da ist. Sind einige Unreinigkeiten in den ersten Wegen, oder ist nach hinreichenden Aderlassen die Entzündung noch ziemlich heftig, so kann man es dergestalt geben, daß es als ein Purgiermittel wirkt. Ist das Auge sehr empfindlich, der Körper des Kranken sehr reizbar, oder erregt das Quecksilber gegen die Absicht einen Durchfall, so verdient eine Mischung aus Kalomel und Mohnsaft den Vorzug. Ist der Kranke schwach, das Auge unschmerzhaft, schlaff, roth, feucht, oder ist der Schmerz periodisch, so ist es rathsam, die Chinarinde dem Quecksilber beyzufügen. (Warner on the Eye.)

S. 74.

Auch äußerlich gebraucht ist das Quecksilber ein kräftiges Mittel gegen hartnäckige Augenentzündungen. Der äußerliche Gebrauch einer Auflösung eines

eines Grans Sublimat in vier Unzen destillirten Wasser thut oft, vorzüglich bey der Augenentzündung, wobey der Kranke vornemlich gegen Abend ein Brennen und Jucken im Auge empfindet, vortrefliche Dienste. — Ist die Entzündung chronisch, das Auge unschmerzhaft, die ausfließende Materie dick, schleimicht, breyartig, enterartig, so ist gemeiniglich eine Salbe aus drey Unzen frischer ungesalzner Butter, einer halben Unze weißen Wachs, zwey und einem halben Quentchen rothen Präcipitat, einem Quentchen tutia, und einem halben Quentchen in Eyeröl aufgelöstem Kampfer, welches alles über einem gelinden Feuer gemischt wird, sehr nützlich. — Auch folgende Salbe (Dawson Account on a safe and efficacious Medecine in sore Eyes, London, 1782) thut, wo keine Anzeige zu einem Aderlasse ist, oft ganz vortrefliche Dienste: R. Butyr. Unc. viij. Aq. fort. Merc. viv. aa Unc. j. Camphor. drachm. ij. Butyro liquefacto et in coagulum denuo tendenti iniice argentum vivum in aqua forti solutum, et camphoram in olei olivar. Unc. ij. solutam, agitando in mortario vitreo, vt F. vnguentum.

§. 75.

Der Mohnsaft ist gleichfalls eines der wahrtesten und kräftigsten Mittel (Boerhaave de morbis oculorum, p. 49) gegen Augenentzündungen. Der Gebrauch dieses Mittels findet indessen nur dann statt, wenn keine Anzeigen zum Aderlassen, und keine Unreinigkeiten in den ersten Wegen
da

da sind. Am besten giebt man ihn in Verbindung mit dem Quecksilber. (Hamilton medical Commentaries Vol. IX.) Man kann z. E. den Kranken Morgens und Abends einen Bolus aus ein oder zwey Gran Kalomel, und einem halben oder ganzen Gran Mohnsafft nehmen lassen. Ist das Auge schwach, unschmerzhaft, der Kranke bleich, so verbindet man ihn besser mit der Chinarinde. Ist das Auge sehr feucht, so verdient die Vereinerung des Quecksilbers mit dem Spießglase den Vorzug.

S. 76.

Auch als ein äußerliches Mittel verdient der Mohnsafft bey Augenentzündungen empfohlen zu werden. Vorzüglich empfiehlt man den äußerlichen Gebrauch der Tinctura thebaica, wovon man täglich einmal zwey bis drey Tropfen ins Auge fallen läßt. Gemeinlich entsteht sogleich einiger Schmerz, der aber nur einige Minuten dauert, und worauf sogleich eine merkliche Linderung erfolgt. Allenfalls kann man auch bey der ersten Anwendung das Mittel mit etwas Rosenwasser verdünnen. Sowohl bey frischen als alten Augenentzündungen, jedoch immer nur nach hinreichenden Ausleerungen, wenn dieselben nöthig waren, thut dies Mittel gute Dienste. Oft erfolgt die Besserung sehr schnell; oft langsam. Zuweilen, jedoch selten fruchtet es nichts. Schon aus den ersten Versuchen kann man schließen, ob man etwas davon zu erwarten hat, oder nicht. Scheint es dem Falle nicht angemessen zu seyn, so muß man es aussetzen, und entweder

Richt. Wundarzneyk. III B. F nach

nach wiederholten Ausleerungen es zum zweytenmale, oder aber ein andres Mittel versuchen. Man hat übrigens dies Mittel bey mancherley Augenentzündungen, bey Entzündungen nach den Masern, Blattern, nach Erkältungen, nach Operationen mit gleich guten Erfolge gebraucht. — Das Dekokt von weißen Mohrköpfen thut oft, auf ähnliche Art, gute Dienste, doch steht es der Tinctura thebaica weit nach.


S. 77.

Die Chinarinde verdient einen vorzüglichen Platz unter denen Mitteln, die hartnäckige Augenentzündungen heben. Nur bey chronischen Entzündungen findet ihr Gebrauch statt. Je langwieriger die Entzündung, je feuchter, matter das Auge, je bleicher und schwächer der Kranke ist, desto gewisser hilft die China. Von dem Gebrauche derselben bey periodischen Augenentzündungen ist bereits gehandelt worden. Man kann das Dekokt derselben innerlich, und auch zugleich äußerlich, als ein Augenwasser gebrauchen lassen. — Man hat hartnäckige Augenentzündungen durch die Elektrizität geheilt: ein, wo nicht immer heilsames, doch wahrscheinlich unschädliches Mittel. — Das Spießglas nebst seinen verschiednen Zubereitungen, vermag sehr viel bey Augenentzündungen. Der Brechweinstein abwechselnd in kleinen, und vollen Dosen hat die hartnäckigsten Augenentzündungen (Gregory Elements of Practice § 252) gehoben. Die Mischung aus dem Hurhamschen Spießglasweine und der Thebai-

Thebaischen Tinktur, so wie auch die aus Schierlingspulver, Kalomel und Spießglaschwefel ist bereits im vorhergehenden empfohlen worden. — Auch der innere Gebrauch des Schierlings, und der Pulsatilla ist von einigen (Störk libellus de usu medico pulsatillae nigriantis; eiusd. medicinischer Unterricht T. I. p. 82) empfohlen worden. Mehr noch verdient das aconitum empfohlen zu werden, welches dem Huxhamschen Spießglasweine beygemischt, ein sehr wirksames Mittel ist.

S. 78.

Die Sloanische Augensalbe, eine Mischung aus einer Unze tut. ppt. zwey Scrupel lap. haematit. zwölf Gran Aloe, vier Gran Perlenpulver und so viel Vipernfett als zur Consistenz eines Linniments erfordert wird, ist, so berühmt sie auch sonst war, ein unwirksames, ja oft schädliches Mittel bey Augenentzündungen. — Zuverlässiger ist, der öftere äußere Gebrauch des kalten Wassers; eine Auflösung von einem Grane weißen Vitriol in einer Unze Wasser; das Goulardsche Bleywasser; eine Salbe aus Zinkblüthen und frischer ungesalzener Butter u. s. w. Auch die künstlichen Geschwüre, die spanischen Fliegenpflaster im Nacken und hinter den Ohren, die Seidelbastrinde auf dem Arme, thun zuweilen bey entzündeten vorzüglich triefenden Augen gute Dienste.



Das zweyte Kapitel.

Von dem Eytterauge.

S. 79.

Die Eytterung des Auges, eine Folge der Augenentzündung, ist theils in Rücksicht auf den Ort, wo sich das Eytter befindet, theils in Rücksicht auf die Entstehungsart des Eytters verschieden. In Rücksicht auf den Ort, wo sich das Eytter befindet, giebt es fünf verschiedene Gattungen von Augenentertungen. Entweder nämlich die äußere Ueberfläche der Hornhaut steht in Eytterung; oder es erzeugt sich zwischen der Hornhaut und der Conjunctiva, die sie bedeckt, oder zwischen den Blättern der Hornhaut, oder in der vordern, oder hintern Augenkammer Eytter. Von jeder dieser Gattungen besonders.

S. 80.

Der Theil der Conjunctiva, der die durchsichtige Hornhaut bedeckt, und im gesunden Zustande dünn, zart, durchsichtig und mit der Hornhaut sehr genau verbunden ist, nimmt zuweilen an heftigen Augenentzündungen einen großen Antheil, und wird in diesem Falle dick, weiß, undurchsichtig, oder von einer großen Menge Blutgefäße, die in demselben anschwellen, und sichtbar werden, ganz roth. Es geschie-

geschiehet in diesem Falle nicht selten, daß die ganze äußere Ueberfläche der Hornhaut in eine superficielle Entzündung geräth. Der Sitz dieser Entzündung ist bloß dieser entzündete Theil der Conjunctiva. Die Ueberfläche der Hornhaut ist in diesem Falle ungleich, an einigen Stellen erhaben, an einigen vertieft, und mit einer eytrigen Materie bedeckt. Je mehr die Conjunctiva angeschwollen ist, desto sichtbarer sind die Vertiefungen an denen Stellen, wo die Conjunctiva durchs Eyter verzehrt, und die Hornhaut entblößt ist. Zuweilen siehet man sogar die Ränder der durchfressnen Conjunctiva gleich kleinen Lappen auf der Hornhaut liegen, oder herabhängen. — Ein Liniment aus 20 bis 30 Gran weißem Vitriol, je nachdem das Auge weniger oder mehr empfindlich ist, mit einem Eyweiß so lange gerieben, bis das Eyweiß seine Fähigkeit verliert, und mittelst eines kleinen Pinsels des Tages verschiedene mal aufs Auge gestrichen, trocknet, unter dem fortgesetzten Gebrauche der antiphlogistischen Mittel, die die gegenwärtige noch fortdauernde Entzündung natürlicher weise erfordert, nicht allein die eyternde Ueberfläche gar bald, sondern stellt auch in den mehresten Fällen die Durchsichtigkeit der Hornhaut gänzlich, oder größtentheils wieder her. Die zurückbleibende Trübheit erfordert den Gebrauch der Mittel, die in einem besondern Kapitel gegen die Verdunkelungen der Hornhaut werden empfohlen werden. — Daß verschiedene Operationen, z. E. die sonst gewöhnliche Operation des Pterygiums eine ähnliche Entzündung veranlassen, wird in der Folge erhellen.

§. 81.

Die zweite Gattung der Augenentzündung. Zuweilen erhebt sich während einer, oft nicht sehr heftigen Augenentzündung eine kleine weiße spitzige Blatter auf der Hornhaut, die selten größer, als ein kleiner Stecknadelpfopf ist. Es ist ein wirklicher kleiner Absceß, der durch eine geringe Quantität Eiter verursacht wird, welche sich zwischen der Hornhaut und Conjunctiva erzeugt hat, und die letztere Haut in eine kleine spitzige Geschwulst aufhebt. Wiederholte Erfahrungen bezeugen, daß dieser kleine Absceß mit der Entzündung sich allmählig von sich selbst verliert, und selten eine Spur zurückläßt, und daß im Gegentheil die Eröffnung desselben mit der Spitze einer Lanzette immer üble Folgen hat, die Entzündung und den Umfang der Verdunkelung vermehrt, oft ein Geschwür veranlaßt, immer aber eine undurchsichtige Narbe zurückläßt, die schwer wegzuschaffen ist. Am besten thut man daher, wenn man diesen kleinen Absceß sich ganz und gar selbst überläßt, und bloß die Entzündung durch dienliche Mittel behandelt. Bleibt ja nach völlig zertheilter Entzündung eine geringe Verdunkelung zurück, so weicht sie mehrentheils den Mitteln, welche gegen die Verdunkelungen der Hornhaut werden empfohlen werden, gar bald.

§. 82.

Die dritte Gattung der Augenentzündung. Zuweilen erzeugt sich eine beträchtliche Eitersammlung zwischen der Hornhaut und der Conjunctiva.

Das

Das Enter liegt in diesem Falle immer am untern Rande der Hornhaut, und breitet sich zuweilen in der Gestalt eines halben Mondes aus, der nicht selten ein Viertel oder gar ein Drittel der Hornhaut einnimmt. Die Stelle sieht weiß aus, und ist, wenn man das Auge von der Seite betrachtet, deutlich erhabner, als der übrige Theil der Hornhaut. Mit der Spitze einer Sonde bemerkt man zuweilen eine unzweifelhafte Schwappung darinnen. Indem sie zunimmt, steigt sie mehr aufwärts; sie verändert ihre Gestalt und Stelle nicht, der Kranke mag die Lage des Kopfs verändern, wie er will. Das Janinsche Mittel, wovon unter der fünften Gattung des Enterauges mehr gesagt werden wird, ein Dekokt von Malvenblüten, worinnen man das Auge öfters lauwarm badet, thut hier sehr gute Dienste; wahrscheinlich indem es durch seine erweichende Kraft, eine Deffnung in der Conjunctiva bewirkt, wodurch das Enter ausfließt. Thut dies Mittel diese Wirkung nicht, und ist die Entersammlung beträchtlich, so muß man am untern Theile des Abscesses die Conjunctiva mit der Spitze eines Messers öffnen, das Enter mit einer Sonde, oder dem Davielschen Löffel gelinde austreichen, und durch fleißiges Baden im Malvendekokt, ausspühlen. Es versteht sich, daß man, da das Auge immer zugleich entzündet ist, den Gebrauch der antiphlogistischen Mittel ununterbrochen fortsetzt. Dieser Absceß hinterläßt gern eine Verdunkelung, die jedoch nicht sowohl von zurückgebliebenem Enter, als vielmehr von einer Verdickung der Conjunctiva an dieser

Stelle herrührt, und gemeiniglich dem äußerlichen Gebrauch der weißen Vitriolauflösung, oder anderer dienlicher Mittel allmählig weicht.

S. 83.

Die vierte Gattung der Augenentzündung. Zuweilen erzeugt sich wirklich Eyster zwischen den Blättern der Hornhaut; ein Fall, den man onyx, vnguis nennt. Dieser Absceß gleicht einem weißen Fleck auf der Hornhaut, der dadurch von den vorhergehenden unterschieden ist, daß er nach auswärts wenig ja gar nicht erhaben ist. Zuweilen ändert der Fleck allmählig seine Stelle, und senkt sich herunterwärts; zuweilen verändert er, indem er sich senkt, auch seine Gestalt. Drückt man äußerlich mit der Spitze einer Sonde auf den Fleck, so bemerkt man zuweilen mehr oder weniger deutlich eine Bewegung der eytrigen Materie in demselben, der Fleck wird etwas breiter, ändert auch wohl seine Gestalt. — Ist der Fleck klein, und des darinnen befindlichen Eysters wenig, so verliert sich derselbe nicht selten gänzlich, ohne eine Spur zu hinterlassen; wahrscheinlich, indem das Eyster eingesaugt wird. — Zuweilen, vielleicht vorzüglich alsdann, wenn das Eyster häufig und scharf ist, durchfrißt es die Hornhaut nach außen, und erregt eine Fistel, oder nach innen, und veranlaßt eine Eysterergießung in die vordere Augenkammer. Ein Fall, der sich jedoch wohl selten ereignet. Häufiger geschieht es, daß der dünnere Theil des Eysters eingesaugt wird, der dickere vertrocknet, und einen undurchsichtigen Fleck erzeugt,

erzeugt, der den Gebrauch eigner Mittel erfordert, mehrentheils aber schwer zu heben ist. — Auch dieser Absceß ist gemeiniglich die Folge einer Ophthalmie, jedoch eine seltnerer Folge derselben. Immer dauert in diesem Falle die Ophthalmie mit allen ihren Zufällen noch fort, nachdem der Absceß bereits entstanden ist. Indessen entsteht er zuweilen auch ohne alle Entzündung, vorzüglich bey venerischen und scrophulösen Kranken. Er scheint hier zunächst von einer wirklichen Metastasis einer Materie zwischen die Blätter der Hornhaut herzurühren, auf deren Quelle und Beschaffenheit der Wundarzt bey der Kur durchaus Rücksicht nehmen muß.

S. 84.

Die antiphlogistischen Mittel, die die gegenwärtige Augenentzündung erfordert, befördern manchmal die Zertheilung des Abscesses, wenigstens kann man in dem Falle, wo man dieselbe erwarten kann, d. i. wenn der Absceß klein ist, zur Zertheilung des Eytters weiter nichts besonders thun, als die Entzündung so bald als möglich heben. Außerliche sogenannte zertheilende Mittel, den Borax, das Salmiak u. s. w. verträgt das entzündete Auge nicht. Das warme erweichende Augenbad, von Malvendekoft, welches einige hier empfehlen, scheint vielmehr die Eytterung, und den Durchbruch des Eytters nach außen, und die Entstehung einer Fistel zu befördern. Unter den antiphlogistischen Mitteln trägt vielleicht der fortgesetzte Gebrauch gelinder kühlender Purgirmittel zur Zertheilung des Eytters das meiste

F 5

bey.

bey. Entsteht der Absceß ohne Entzündung durch eine scrophulöse oder venerische u. s. w. Metastase, so sind die Mittel, die gegen den Charakter der Ursache gerichtet sind, auch die kräftigsten zur Zertheilung des Eytters.

§. 85.

Bermindert oder verliehrt sich der Absceß bey allmäliger Abnahme der Entzündung nicht, oder ist er so groß, daß man zum voraus siehet, daß er sich nicht von sich selbst verliehren wird, so muß das Eyter durch eine Operation ausgeleeret werden. Zu dieser Operation muß sich der Wundarzt bald entschließen, denn so bald das Eyter vertrocknet ist, und dies geschiehet oft bald, kann sie weiter keinen Nutzen leisten. Und der Wundarzt kann sich desto leichter dazu entschließen, da sie gänzlich schmerz= kunst= und gefahrlos ist. Sonst pflegt man mit einer gewöhnlichen runden Neh= oder Staarnadel die ganze Ueberfläche der Hornhaut, unter welcher das Eyter liegt, zu wiederholten malen zu durchbohren und zu durchlöchern. Aber mit Recht ist diese Operationsart in Vergessenheit gerathen; denn das Eyter, welches gemeiniglich dick ist, dringt durch diese kleinen Oeffnungen nicht aus, die äußern Mittel, wodurch man es zu verdünnen sucht, dringen nicht ein, die Oeffnungen schließen sich gar bald wieder, die Operation muß folglich verschiedne mal wiederholt werden, und die Folge davon ist gemeiniglich, daß die ganze durchlöcherete Stelle der Hornhaut trübe wird, oder gar zusammenschrumpft.

§. 86.

Besser ist's daher, daß man den Absceß durch einen Schnitt an seinem niedern Theile, oder an einer Stelle, wo die vielleicht erfolgende Narbe der Pupille nicht gegenüber ist, öffnet. Dies geschieht am bequemsten mit dem Messerchen, dessen man sich zur Ausziehung des grauen Staars bedient. Indessen hat man wohl darauf zu sehen, daß der Schnitt bis aufs Enter dringt, und groß genug ist; und aus dieser Ursache thut man wirklich am besten, wenn man da, wo das Enter liegt, die Hornhaut ganz durchsticht, so daß die Spitze des Messers bis in die vordere Augenkammer dringt. Man hat von dieser Operationsart den Vortheil, daß nicht allein die Deffnung groß genug ist, ganz gewiß den Sitz des Enters erreicht, sondern auch daß das Enter einwärts und auswärts fließen kann, und durch die auströpfelnde wässerichte Feuchtigkeit verdünnt, und ausgespült wird. Der Schnitt, der durch und durch dringt, ist übrigens so unbedeutend, als der, der bloß bis zum Enter dringt. Um die Ausleerung des Enters zu befördern, kann man allenfalls das Auge nach gescheneher Operation öfters in Malvendekoft, oder etwas ähnlichem baden, auch den Absceß mit der Spitze einer Sonde oder dem Davielschen Löffel streichen. Zuweilen wird man bemerken, daß auch sogar ein solcher Schnitt zur Ausleerung des Enters nicht hinreicht, und dann muß sich der Wundarzt entschließen, einen Kreuzschnitt zu machen. — Auch wenn diese Behandlung den vollkommensten Erfolg hat, bleibt dennoch meh-

rentheils

rentheils eine Trübigeit zurück, die nachher durch dienliche Mittel allmählig gehoben werden muß. — Von dem Falle, wo das Euter bereits vertrocknet ist, wird im Kapitel von den Flecken der Hornhaut gehandelt werden.

S. 87.

Die fünfte Gattung der Augeneyterung. Hier erzeugt sich Euter in der vordern oder hintern Augenkammer; die wichtigste Gattung der Augeneyterung; das eigentliche Euterauge; hypopium, empyesis oculi. Einige machen einen Unterschied unter dem Falle, wo das Euter in der vordern, und dem Falle, wo es in der hintern Augenkammer ist, und nennen die Krankheit im ersten Falle hypopyum, im zweyten empyesis oculi. Aber da beyde Augenkammern durch die Pupille beständig eine freye Gemeinschaft mit einander haben; da in der vordern Augenkammer nie viel Euter seyn kann, ohne daß ein Theil davon in die hintere Augenkammer fließt; und umgekehrt; da durch dieselbe Oeffnung das Euter so wohl aus der hintern, als der vordern Augenkammer ausgeleeret werden kann, so ist in beyden Fällen kein wirklicher Unterschied in der Krankheit. — Auch in diesem Falle ist das Euterauge gewöhnlich die Folge einer heftigen Augenentzündung; zuweilen jedoch bloß im ungewöhnlichern Falle entsteht sie auch ohne vorhergehende Entzündung. Nur sehr heftige Augenentzündungen veranlassen dieses Euterauge, und zwar mehrentheils unter folgenden Zufällen. Der Schmerz, der pochend und bohrend wird,

wird, und nicht allein im Augapfel und obern Rande des Stirnbeins wüthet, sondern sich auch bis in den Hinterkopf erstreckt, mindert sich unter einem merklichen Frösteln plötzlich, worauf mehrentheils der erste Tropfen Euter im Boden der vordern Augenkammer in der Gestalt eines halbmondförmigen weißen Flecks erscheint, der, so wie sich das Euter vermehrt, allmählig größer wird, in die Höhe steigt, die Pupille bedeckt, und die ganze vordere Augenkammer einnimmt, so daß nunmehr die ganze durchsichtige Hornhaut weiß erscheint. Der Ausgang ist nun verschieden. Wird die Krankheit sich selbst überlassen, so wird nun der Schmerz von neuem äußerst heftig, und dauert ununterbrochen fort, bis das Euter die Hornhaut öffnet, und sammt der wässerichten Feuchtigkeit, und gemeinlich einem ansehnlichen Theile der gläsernen Feuchtigkeit ausfließt, worauf der Schmerz sogleich verschwindet. Das Auge ist in diesem Falle unwiederbringlich verlohren. — In günstign Fällen, und bey dem Gebrauche dienlicher Mittel zertheilt sich das bereits erzeugte Euter und verschwindet gänzlich; in weniger günstigen Fällen, wird nur der dünnere Theil desselben zertheilt und eingesaugt, der dickere bleibt zurück und legt sich gleich einer Haut auf die innere Ueberfläche der Hornhaut, oder auf die vordere Ueberfläche der Kapsel der Krystallinse, oder verstopft die Pupille, und verursacht eine gänzliche Blindheit, oder Verminderung des Gesichtes.

S. 88.

So wenig auch die Erkenntniß dieses Enterauges einem Zweifel unterworfen zu seyn scheint, giebt es dennoch Fälle, wo der Wundarzt irren kann. So lange nur wenig Enter in der Gestalt eines halbmondförmigen weißen Flecks im Boden der vordern Augenkammer liegt, gleicht dies Enterauge der dritten Gattung, dem größern Abscesse der Hornhaut, welcher gleichfalls seinen Sitz gewöhnlich am untern Theile der Hornhaut, und eine ähnliche halbmondförmige Gestalt hat. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diejenigen Wundärzte, welche durch das Janiusche Malvendekoft, wovon weiter unten mehr gesagt werden wird, das wahre Enterauge zertheilt zu haben glauben, in diesen Irrthum gefallen sind, und durch den Gebrauch dieses erweichenden Mittels nicht das Enter in der vordern Augenkammer zertheilt, sondern das unter der Conjunctiva befindliche Enter durch eine Oeffnung ausgeleeret haben, welche der Gebrauch dieses erweichenden Augenbades in der Conjunctiva befördert hat. Und dennoch sind diese zwey Gattungen der Augeneyterung nicht schwer von einander zu unterscheiden. Der weiße Fleck, der von dem in der vordern Augenkammer befindlichen Enter herrührt, verändert, wenn der Kranke den Kopf zur Seite beugt, seine Stelle, und Gestalt; der Absceß in der Hornhaut natürlicherweise nicht; dieser verursacht immer an der Stelle, wo er ist, eine Anschwellung nach außen, der Absceß in der vordern Augenkammer nicht; an der Stelle, wo der Absceß der Hornhaut ist, fühlt sich diese mit der Spitze

Spitze einer Sonde widernatürlich weich an, bey'm Absceß in der vordern Augenkammer nicht.

§. 89.

Bei heftigen Augenentzündungen wird die durchsichtige Hornhaut, wahrscheinlich durch Anhäufung und Stockung lymphatischer Feuchtigkeiten ganz weiß, undurchsichtig, weich und nach außwärts angeschwollen (§. 6). Dieser Fall gleicht dem Eytterauge in dem Zeitraume, wo die ganze vordere Augenkammer mit Eytter angefüllt, und folglich gleichfalls die ganze Hornhaut weiß ist. Ein Irrthum ist hier von übeln Folgen, da dieses die Operation erfordert, welche bey der Verdunkelung der Hornhaut unnütz, ja schädlich ist. Indessen vermeidet ihn dennoch der aufmerksame Wundarzt leicht. Die durch Entzündung verdunkelte Hornhaut ist nicht allenthalben gleich weiß; dies ist sie hingegen wenn die weiße Farbe derselben von dem Eytter in der vordern Augenkammer herrührt. Das Eytter in der vordern Augenkammer sammelt sich zuerst im Boden derselben, und steigt allmählig höher; so auch die weiße Farbe der Hornhaut, die es verursacht; die inflammatorische Verdunkelung der Hornhaut hingegen erscheint in der ganzen Hornhaut sogleich, ist anfänglich trübe, bleich, und wird allmählig weißer; zugleich wird die Hornhaut dicker und weicher. Die Farbe des Eytterauges ist gleich anfangs ganz weiß und bleibt unverändert.

§. 90.

§. 90.

Zuweilen erzeugt sich in der vordern oder hintern Augenkammer eine eyterartige Materie ohne vorhergehende Augenentzündung; ein Fall, der von dem eben beschriebenen sowohl in Absicht seiner Entstehung, als auch der Kurmethode, die er erfordert, ganz verschieden ist, und allenfalls das unächte Eyterauge (hypopyum spurium) genannt werden könnte. Er ist von dreysacher Art. Zuweilen erzeugt sich eine eyterartige Materie zu gewissen Zeiten im Auge, und verschwindet zu gewissen Zeiten wieder; das periodische Eyterauge. — Ein Mann von einer katochymischen Leibesbeschaffenheit wurde die ersten zwey Wochen eines jeden Monats blind. Man bemerkte alsdann jederzeit in der vordern Augenkammer eine gelbe Materie, die so dick und undurchsichtig war, daß man die Regenbogenhaut nicht unterscheiden konnte. Die Conjunctiva war jederzeit zugleich entzündet, aber ohne Schmerzen. Den vierzehnten Tag jedes Monats verschwanden alle diese Zufälle, und der Kranke erhielt das Gesicht wieder. (Janin p. 360.) — Ein Mann ward alle Morgen blind. Immer bemerkte man während dem Anfalle, daß die wässerichte Feuchtigkeit ganz trübe wurde. Auch empfand der Kranke jedesmal einen Schmerz unter den kurzen Rippen der rechten Seite. Der Anfang endigte sich jedesmal mit dem Abgange vieler Winde.

§. 91.

Zuweilen ergießen sich in die vordere oder hintere Augenkammer fremde Materien, die zwar nichts eyter-

enterartiges, oder enterähnliches haben, dennoch aber dieselbe Behandlung erfordern, als das Enterauge. Man könnte diesen Fall das metastatische Enterauge nennen. Bey der Entzündung, die von einem gestopften Tripper entsteht, bemerkt man zuweilen eine Tripperartige Materie in der vordern Augenkammer. Man hat gesehen, daß sich bey Wöcherinnen bey Gelegenheit eines Milchabsatzes Milch in die vordere Augenkammer ergossen hat. Man hat bey starken Quecksilberkuren Quecksilberkügelchen, bey starken Windgeschwülsten. Luftblasen in der wässerichten Feuchtigkeit beobachtet. Ein Schlag aufs Auge, die Staaroperation mittelst der Nadel, eine heftige Anstrengung bey dem Erbrechen, Husten u. s. w. veranlaßt zuweilen eine Blutergießung in die vordere und hintere Augenkammer. Wenn alle diese Fälle in Absicht ihrer Ursache, und der in den Augenkammern befindlichen Materie keine Aehnlichkeit mit dem wahren Enterauge haben, so hat es wenigstens die Kurmethode, die sie erfordern. — Mehr Aehnlichkeit mit dem wahren Enterauge hat die dritte Gattung des unmächtigen Enterauges, welche von einem Absceß oder Geschwür in der Hornhaut entsteht, das die Hornhaut einwärts durchfrißt, und einen Theil seiner eytrigen Feuchtigkeiten in die vordere Augenkammer ausleert. Indessen kommt es dennoch hier vorzüglich auf die Heilung des Geschwürs der Hornhaut an; das wenige Enterauge, welches die wässerichte Feuchtigkeit trübt, verliert sich allmählig von sich selbst, und erfordert keine besondere Behandlung.

S. 92.

Die Kurart des Enterauges ist doppelst; man sucht nämlich das Enten in den Augenkammern zu zertheilen, oder man leert es durch eine chirurgische Operation aus. Ob man gleich zuverlässige Beispiele von einer gänzlichen Zertheilung des Enters in den Augenkammern zu haben versichert; und obgleich die Methode der Zertheilung sich durch ihre Gelindigkeit zu empfehlen scheint, verdient dennoch die Operation in den meisten Fällen den Vorzug. Sie schafft das Enten ganz gewiß und zuverlässig aus dem Auge, da hingegen der Erfolg der Zertheilungsmethode ungewiß, und der Wundarzt nach einem vergeblichen Versuche am Ende dennoch genöthigt ist, die Operation zu machen: die Operation schafft das Enten bald aus dem Auge; die zertheilenden Mittel wirken langsam, und bey dem längern Aufenthalt des Enters ist ohne Widerrede immer zu fürchten, daß die innern zarten Theile des Auges Schaden leiden: endlich schafft die Operation das Enten gänzlich aus dem Auge, da hingegen bey der Zertheilungsmethode immer zu fürchten ist, daß bloß der dünnere Theil des Enters zertheilt wird, der Dicke aber eine Verstopfung der Pupille, oder Verdunkelung der Hornhaut oder Kapsel (S. 87) verursacht. Nicht zu gedenken, daß die Operation ganz schmerz- und gefahrlos ist, und daß die Beispiele der glücklichen Zertheilung des Enters nicht ganz außer allen Zweifel sind, da es nicht unwahrscheinlich ist, daß man Abscesse der Hornhaut für das wahre Entenauge gehalten hat.

§. 93.

Indessen ist der Versuch, das Enter zu zertheilen, unschädlich, so lange nur wenig Enter im Auge ist; auch rathsam, weil er wirklich zuweilen gelingt. Sobald aber beyde Augenkammern voll Enter sind, ist jeder Aufschub der Operation mit der Gefahr des unerseßlichen Verlustes des Auges verbunden, findet die Zertheilung des Enters, die immer nur langsam bewirkt wird, nicht mehr statt. Zuweilen hingegen ist sie das einzige Mittel, von dem sich etwas erwarten läßt; nämlich wenn die Augenlider und die Conjunctiva dergestalt geschwollen sind, daß das Auge nicht hinreichend geöffnet werden kann, und die Hornhaut durch die angeschwollne Conjunctiva größtentheils, oder ganz bedeckt ist; ein Fall, wo es nicht möglich ist, die Operation zu verrichten. — Das unächte Enterauge wird mehrtheils ohne Operation geheilt. Doch davon nächstens ein mehreres.

§. 94.

Die Mittel, welche man zur Zertheilung des Enters empfiehlt, sind von verschiedner Art. Hr. Janin (s. dessen Memoires et Observations sur l'Oeil) behauptet, daß das Enter im Auge, wenn es zertheilet wird, nicht eingesaugt werde, sondern durch die Oeffnungen (poros) der Hornhaut durchschwize; und daß man folglich um das Enter zu zertheilen, die Oeffnungen der durchsichtigen Hornhaut durch äußere erweichende Mittel erweitern, und dadurch das Durchschwizen des Enters durch die

Hornhaut befördern müsse. Er empfiehlt zu dieser Absicht ein Decoctum malvae als ein zuverlässiges Mittel. Er läßt das Auge des Tages öfters darinnen baden, und legt in der Zwischenzeit Kompressen auf das Auge, die mit dieser Abkochung befeuchtet sind. In Fällen, wo beyde Augenkammern mit Eiter angefüllt waren, und das Auge zu bersten drohete, leistete, seiner Versicherung gemäß, dies Mittel Hülfe. Gemeiniglich zertheilt es das Eiter innerhalb 12 bis 14 Tagen. — Es läßt sich freylich nicht wohl zweifeln, daß dies Mittel wirklich von Nutzen gewesen ist, zumal da auch andre (Pellier u. m.) versichern, es mit dem besten Erfolge angewendet zu haben; indessen fragt sich dennoch: hat man bey der glücklichen Anwendung dieses Mittels irgend eine Erscheinung beobachtet, die die Vermuthung von dem Durchschwitzen des Eiters bestätigt? Hat man bey Blutergießungen in die wässerichte Feuchtigkeit dergleichen Erscheinungen, wo sie sehr bemerklich seyn würden, wirklich bemerkt? Da in andern ähnlichen Fällen äußerliche erweichende Mittel die Eiterung befördern, und den Aufbruch des Abscesses beschleunigen; hat man diese Wirkung nicht auch hier zu fürchten? Sind die Beyspiele von der glücklichen Wirkung dieses Mittels wirklich so deutlich und bestimmt, daß man gewiß ist, daß es nicht einen Absceß der Hornhaut geöffnet, sondern wirklich ein wahres Eiterauge zertheilt hat? Und endlich, läßt sich von der Anwendung dieses äußern Mittels etwas erwarten, wenn, wie es im Falle dieses Eiterauges oft geschieht, die Augenlider

lider so geschwollen sind, daß sie nicht geöffnet werden können; die Conjunctiva dergestalt geschwollen ist, daß sie die Hornhaut bedeckt, und folglich das Mittel nicht zu der Hornhaut gelangen kann?

§. 95.

Andre Wundärzte empfehlen zur Zertheilung des Enters im Auge dieselben geistigen, gewürzhaf-ten, zusammenziehenden Mittel, die man in ähnlichen Zufällen andrer Theile, die von Stockungen und Anhäuffungen der Feuchtigkeiten herrühren, zu gleicher Absicht gebraucht; z. E. einen Brey von gebratenen Aepfeln und Kampfer (Woolhouse); ein Augenwasser aus Rosenwasser, Salmiak, Aloe und Myrrhe (Guerin); ein Dekokt vom herb. serpill. organ. hyssop. flor. lavendul. sambuc. Saffran, Kampfer u. s. w. (Mauchart) zum Bähnen und Dampfbade u. s. w. Da aber das Enterauge gemeiniglich mit einer heftigen Entzündung verbunden ist, findet der Gebrauch dieser reizenden Mittel, die indem sie die Entzündung vermehren, auch zugleich die Gefahr der Entterung vermehren, nicht statt. Von denen Mitteln, die äußerlich auf die Augenlider gelegt werden, wie z. E. der Woolhouse'sche Brey ist, läßt sich wohl schwerlich etwas erwarten. Ueberhaupt wirken diese Mittel, sie mögen gebraucht werden wie sie wollen, wohl schwerlich auf die Theile, von denen die Einsaugung des Enters zu erwarten ist.

§. 96.

Mehr läßt sich wahrscheinlicher weise von dem Gebrauche allgemeiner ausleerer Mittel, der Aderlässe, der oft wiederholten und fortgesetzten Purgiermittel, der Blasenpflaster im Nacken und hinter den Ohren u. s. w. erwarten, die nicht allein die Einsaugung des Enters befördern, indem sie eine allgemeine Ausleerung bewirken, sondern überdies auch die noch immer gegenwärtige Entzündung mindern und heben, und folglich beyden Kuranzeigen, die der Wundarzt immer vor Augen haben muß, Genüge leisten.

§. 97.

Wenn diese Mittel nichts fruchten, das Enter sich mehrt, und allmählig beyde Augenkammern anfüllt, darf die Operation nicht länger aufgeschoben werden. Es verdient kaum bemerkt zu werden, daß auch dann noch einige (Deshais Gendron, *Maladies des Yeux*, Tom. II. p. 69) die Operation widerathen, und behaupten, daß man besser thue, wenn man das Enterauge sich selbst überläßt, und erwartet, daß es sich von sich selbst öffnet, als wenn man es öffnet. Die Gründe, womit man diese Behauptung zu unterstützen glaubt, sind: das Enter in den Augenkammern verursacht keine Schmerzen; (heftige Schmerzen verursacht es, bis es einen Ausgang gewinnt) es ist sehr dick, und kann durch eine gemachte Oeffnung nicht ausfließen; (deswegen muß man eine große Oeffnung machen; eben deswegen ist die Oeffnung, die von sich selbst entsteht, zu klein,

klein, und muß oft erweitert werden) die gemachte Oeffnung schließt sich bald, und dann muß sich das Entter dennoch selbst einen Weg schaffen; (man muß verhindern, daß sich die gemachte Oeffnung nicht schließt) die Narbe, die die gemachte Oeffnung hinterläßt, wird größer und unförmlicher, als die Narbe der freywillig entstandnen Oeffnung. (Dies ist wider alle Erfahrung. Der gänzliche Verlust des Auges ist die gewöhnliche Folge des freywilligen Ausbruchs des Enterauges; da hingegen durch die Operation, wenn sie bey Zeiten gemacht wird, das Gesicht oft vollkommen wieder hergestellt wird.)

S. 98.

Einige machen einen Unterschied zwischen dem Falle, wo das Entter in der vordern, und dem Falle, wo es in der hintern Augenkammer ist, und rathen im ersten Falle bey der Operation die vordere, im letztern die hintere Augenkammer zu öffnen. (Mauchart Dissert. de Hypopyo- de Empyeli oculi.) Die hintere Augenkammer öffnen sie mittelst einer zweyschneidigen Staarnadel, welche sie eine kleine Linie breit vom Rande der durchsichtigen Hornhaut durch die Conjunctiva in die hintere Augenkammer stoßen. Da aber das Entter im Auge viel zu zähe ist, als daß es durch eine so kleine Oeffnung ausfließen könnte, die Oeffnung auch gemeinlich gar bald wieder zusammenfällt, thut man den Vorschlag, statt einer Nadel einen kleinen Troikart an dem bemeldeten Orte in die hintere Augenkammer zu stoßen, und die Röhre desselben einige Tage im

Auge liegen zu lassen, bis alles Eyster durch dieselbe
 ausgeflossen ist. Einige wollen sogar durch die
 Röhre Einspritzungen machen, um das Eyster zu
 verdünnen und auszuspihen. Andre wollen es mit
 einer kleinen Spritze aussaugen. — Alle die Ope-
 rationsarten sind ohne Widerrede unnütz und schäd-
 lich. Schädlich: denn ist es wohl möglich ein
 Instrument in die hintere Augenkammer zu stoßen,
 ohne die processus ciliares ganz gewiß, und die Re-
 genbogenhaut oder Krystallhaut höchst wahrscheinlich
 zu verletzen? Ist es wahrscheinlich, daß ein so
 schleimiges klebriges Eyster durch eine so feine Röhre
 ausfließen, oder sich aussaugen lassen werde? Ist
 es möglich, daß ein harter Körper, dergleichen die
 Röhre eines Troikarts ist, eine Zeitlang in der hin-
 tern Augenkammer zwischen der Regenbogenhaut und
 Krystallhaut liegen kann, ohne die heftigsten Schmer-
 zen, Entzündung und Verdunkelung, ja den gänz-
 lichen Verlust des Auges zu verursachen? u. s. w.
 Unnütz sind sie auch: denn ein Einschnitt in die
 durchsichtige Hornhaut ist nicht allein ganz schmerz-
 und gefahrlos, sondern verschafft auch dem Eyster
 aus beyden Augenkammern einen freyen Ausfluß,
 da der Weg, durch welchen das Eyster aus der hin-
 tern in die vordere Augenkammer gelangen kann,
 die Pupille, frey und offen ist.

§. 99.

Immer also, das Eyster sey bloß in einer, oder
 in beyden Augenkammern befindlich, öffnet man
 bloß die Hornhaut. Da das Eyster im Auge immer
 sehr

sehr zähe und dick ist, darf der Schnitt in der Hornhaut nicht klein seyn. Er muß völlig dem Schnitte gleichen, den man bey der Ausziehung des grauen Staars macht. Nur darf er nicht ganz so groß seyn. Er ist groß genug, wenn er sich in einer halbmondförmigen Gestalt durch den dritten Theil des Umfangs der Hornhaut erstreckt. Hinterläßt dieser Schnitt ja eine Narbe, so ist sie der Pupille nicht gegenüber, und hindert folglich das Gesicht nicht. Dieser Schnitt wird unter der Beobachtung derselben Regeln, die bey dem Staarschnitte zu beobachten sind, und mit demselben Messer gemacht, dessen man sich bey der Ausziehung des grauen Staars bedient. Auch der Wundarzt und der Kranke müssen sich bey der Operation in der Lage befinden, die in der Folge bey der Staaroperation wird empfohlen werden.

§. 100.

So groß auch dieser Schnitt ist, fließt dennoch nicht alles Enter auf einmal aus. Immer dringen nur einige Tropfen hervor, sobald der Schnitt gemacht ist. Einige geben den Rath es auszusaugen, oder durch Einspritzungen auszuspihlen; aber dies kann nicht geschehen, ohne daß das Auge dabey leidet, und ist über dies nicht nöthig. Die elastischen Häute des Auges ziehen sich nach der Operation zusammen, und drücken das Enter allmählig aus; und die wässerichte Feuchtigkeit, die sich beständig fort erzeugt, verdünnt dasselbe und spühlt es aus. Innerhalb 24 Stunden nach der Operation

tion leert sich auf diese Art gemeiniglich alles Eyter von sich selbst aus. Der Wundarzt hat dabey weiter nichts zu thun, als den Weg, durch welchen es sich ausleert, immer offen zu erhalten. In dieser Absicht thut man am besten, wenn man sogleich nach der Operation das Auge verbindet, und alle 4 bis 6 Stunden öffnet und untersucht. Findet man jedesmal, wenn man das Auge öffnet, an der Kompresse, womit das Auge bedeckt ist, ein wenig Eyter, und siehet man, daß sich das Eyter hinter der Hornhaut ein wenig vermindert und gesenkt hat, so kann man schließen, daß die Wunde noch offen ist, und die allmähliche Ausleerung des Eyters noch vor sich geht; und da in diesem Falle nichts zu thun ist, das Auge wieder verbinden. Findet man, und dies geschiehet mehrentheils den Morgen nach der Operation, bey der Untersuchung des Auges auf der Kompresse kein Eyter, und hat sich seit dem letztern Verbande das Eyter hinter der Hornhaut nicht vermindert und gesenkt, so ist die Wunde zugeliebt, und muß wieder geöffnet werden. Dies geschiehet ohne alle Schwierigkeit mit der Spitze des Staarmessers, welche man in die Mitte der Wunde einbringt, und womit man den Lappen der Hornhaut ganz leicht aufhebt, und solchergestalt die Wunde wieder öffnet. Und diese Behandlung setzt der Wundarzt fort, bis alles Eyter ausgeleert ist.

S. 101.

Es ist kaum möglich, das Eyter auf eine zuverlässigere, leichtere, und geschwindere Art aus beyden

henden Augenkammern zu schaffen. Es versteht sich, daß der Wundarzt, indem er mit der Ausleerung des Enters beschäftigt ist, den Gebrauch der allgemeinen antiphlogistischen Mittel ununterbrochen fortsetzen muß, da immer Entzündung zugegen ist, und die Enterung vermehrt. Wiederholte Erfahrungen zeigen, daß auf diese Art das Gesicht oft aufs vollkommenste wieder hergestellt wird. Selbst die Wunde hinterläßt zuweilen keine sichtbare Narbe. Indessen ist dennoch zuweilen, zumal wenn die Operation lange aufgeschoben wird, der Erfolg nicht immer ganz so glücklich. Zuweilen bleibt eine Trübheit, ja eine starke Verdunkelung der Hornhaut zurück, die den Gebrauch der Mittel erfordert, die gegen die Flecken der Hornhaut werden empfohlen werden. In den meisten Fällen weicht dieselbe dem äußern Gebrauche des weißen Vitriols. Zuweilen zerstört das Enter die vordere Haut der Krystallkapsel. Die Linse glitscht in diesem Falle gemeinlich aus ihrem natürlichen Sitze und drängt sich in die Pupille. Man wird dies nicht ehr. gewahr, als bis das Enter so weit abgeflossen ist, daß man die Pupille sehen kann, welche in diesem Falle gemeinlich in die Queere ausgedehnt, und länglicht ist. Es ist in diesem Falle durchaus nöthig, die Wunde der Hornhaut mittelst der Scheere zu erweitern, und die Linse auszuführen. Zuweilen bleibt eine Verdunkelung der Kapsel, oder der Krystalllinse zurück, die ihre eigne Behandlung erfordert. — Zuweilen erfolgt eine undurchsichtbare Narbe. Die Mittel gegen die Flecken der Hornhaut mindern sie zuweilen;

len; wo nicht, so hindert sie das Gesicht wenig, da sie der Pupille nicht gegen über ist. Zuweilen veranlaßt die Narbe eine Unebenheit der Hornhaut, die jedoch sehr ofte dem Gesichte nicht hinderlich ist.

S. 102.

Die verschiedenen Gattungen des unächten Enterauges erfordern jede ihre eigne Behandlung. Gegen das periodische Enterauge empfiehlt man so, wie gewöhnlich gegen alle andre periodische Krankheiten den Gebrauch der Chinarinde. Indessen hat man wohl zu merken, daß obgleich diese Krankheiten in Absicht ihrer periodischen Wiederkehr einander ähnlich, dennoch in Absicht ihrer Ursachen einander oft sehr unähnlich sind. So können periodische Krankheiten von Würmern, von einem venerischen Gifte, von zurückgetretenen Hautausschlägen u. s. w. entstehen. Am allerhäufigsten entstehen sie von Reizen und Stockungen in den Eingeweiden des Unterleibes. Es ist leicht begreiflich, daß in allen diesen Fällen es vorzüglich darauf ankommt, die jedesmalige besondere Ursach aufzusuchen, und zu heben. Die Chinarinde vermag in allen diesen Fällen nichts; sie schadet so gar oft. Nur wenn der Wundarzt ganz und gar keine besondere Ursach ausfindig machen kann, oder wenn er sie ausfindig gemacht, und gehoben hat, die Krankheit demungeachtet immer noch fort dauert, ist er berechtigt seine Zuflucht zu der Chinarinde zu nehmen.

S. 103.

Das venerische Eytterauge, welches die Folge eines gestopften Trippers ist, (S. 91.) ist immer mit einer heftigen Entzündung verbunden. Weicht diese dem bereits unter dem Abschnitte von den venerischen Augenentzündungen empfohlenen Mitteln nicht, so muß die Hornhaut gedffnet, und die in der vordern Augenkammer befindliche Tripperartige Materie ausgeleeret werden. — Blutergießungen in die wässerichte Feuchtigkeit des Auges verlihren sich allmählig von sich selbst, bey dem Gebrauch eines Aderslasses, gelinder Abführungen, und kühlender Mittelsalze, die ohnedem die Entzündung erfordert, welche von der gewöhnlichen Ursache der Blutergießung, der Verletzung des Auges, zu fürchten ist. Ist des Blutes so viel extravasirt, daß die wässerichte Feuchtigkeit ganz dunkelroth gefärbt, und der Kranke des Gesichts gänzlich beraubt ist, so thut man am besten, wenn man sogleich die Hornhaut öffnet, und die wässerichte Feuchtigkeit samt dem extravasirten Blute ausfließen läßt. Es ist nicht nöthig, daß der Schnitt hier völlig so groß ist, als bey dem ächten Eytterauge. Diese Operation ist auch rathsam, wenn in dem gelindern Falle der Blutergießung nach Zertheilung des ausgetretenen Blutes kleine geronnene Fasern oder Klumpen zurück bleiben.

S. 104.

Auf dieselbe Art verfährt der Wundarzt, wenn andre fremde Körper, Luftblasen, Milch, Quecksilberkugeln

berkugeln in der vordern oder hintern Augenkammer bemerkt werden; oder wenn, wie zuweilen geschiehet, sich trübe, verdickte, undurchsichtige Materien, Fasern, Faden u. s. w. in der wässerichten Feuchtigkeit erzeugen, und dieselbe trüben, oder indem sie bey den Bewegungen des Auges herum schwimmen, dem Gesichte hinderlich sind. Oft verliehren sie sich allmählig von sich selbst. Geschiehet dies nicht, und sind sie dem Gesichte sehr hinderlich, so thut man am besten, wenn man sie durch die Operation ausleert. Nur ist zu merken, daß diese Trübheit der wässerichten Feuchtigkeit zuweilen von einer Kakochymie herrührt die man heben muß, wenn man die Secretion einer klaren wässerichten Feuchtigkeit wieder herstellen will.



Das dritte Kapitel.

Von den künstlichen Augen.

§. 105.

Wenn das ächte Enterauge sich selbst überlassen wird, öffnet das Eyter zuletzt die Hornhaut, und fließt sammt der wäßerichten und einem Theile der gläsernen Feuchtigkeit aus, die durchsichtige Hornhaut wird zum Theil verzehrt, der Rest bleibt undurchsichtig, die Pupille schließt sich, die Regenbogenhaut wächst an die Hornhaut, und der ganze Augapfel fällt mehr oder weniger zusammen. Die Folge von allem diesem ist gänzlicher Verlust des Gesichts, und eine große Ungestaltheit. Der erstere ist unheilbar; die letztere kann man durch den Gebrauch der künstlichen Augen heben.

§. 106.

Künstliche Augen sind concave Tellerchen, die die vordere Hälfte des Augapfels vorstellen. Auf ihrer vordern convexen weißen Fläche ist in der Mitte die durchsichtige Hornhaut, die Pupille und Regenbogenhaut aufs ähnlichste bezeichnet. In ihrer hinten ausgehöhlten Fläche liegt, wenn sie eingelegt werden, der Rest des natürlichen Augapfels. Man bereitet sie von Glas oder Email. Die gläsernen sind zwar wohlfeil, aber zerbrechlich. Die emailirten zerbrechen nicht, und können, wie in der Folge deut-

deutlicher erhellen wird, besser als die gläsernen, an ihrem hintern Rande mittelst der Feile zugerichtet werden, daß sie gut und bequem in der Augenhöhle liegen. Bey der Wahl des künstlichen Auges in jedem besondern Falle, siehet der Wundarzt darauf, daß das künstliche Auge dem gesunden natürlichen in Absicht der Farbe der Regenbogenhaut, der mehrern oder geringern Convexität der durchsichtigen Hornhaut, der stärkern oder geringern Hervorragung des ganzen Auges aus der Höhle, und der größern oder geringern Breite des Augapfels zwischen den beyden Augenwinkeln aufs möglichste gleicht. Man hat künstliche Augen von verschiedner Gestalt, und Tiefe. Einige haben eine längliche enfförmige Gestalt; diese wählt man bey Kranken, die lang gespaltne Augenlider haben; andre nähern sich mehr einer runden Gestalt; diese wählt man bey Kranken, welche kurzgespaltne Augenlider haben. Kranken, die ein stark hervorstehendes Auge haben, legt man ein tiefes Tellerchen; denen aber, die ein kleines tiefliegendes natürliches Auge haben, ein flaches Tellerchen ein. Tiefe Tellerchen legt man auch ein, wenn von dem natürlichen Augapfel nur wenig; flache, wenn viel davon übrig ist. Immer sucht der Wundarzt die möglichste Aehnlichkeit zwischen dem künstlichen und noch übrigen natürlichen Auge, um den Betrug unmerklich zu machen.

S. 107.

Wenn der Rest des vurch die Entering verzehrten natürlichen Augapfels von mittler Größe ist,
sist

sist das künstliche Auge am besten. Es hat Platz genug, und verursacht folglich keinen schmerzhaften Druck, und liegt doch auch nicht zu tief in der Augenhöhle. Außerdem theilt der Rest des natürlichen Augapfels, dem immer noch einige Bewegung übrig bleibt, und der mehr oder weniger in der Höhle des künstlichen Auges liegt, demselben einige Bewegung mit, so daß in diesem Falle der Betrug am allerunmerklichsten ist. Ist der Rest des natürlichen Augapfels zu klein oder zu groß, so tritt er nicht in die Höhlung des künstlichen Auges, dies liegt folglich unter den Augenlidern ganz unbeweglich, und der Kranke hat das Ansehen, als wenn er schielte, in einem weit höhern und sichtbarern Grade, als im vorhergehenden Falle. Hat der Rest des natürlichen Augapfels von seiner natürlichen Größe so wenig verlohren, daß für das künstliche Auge nicht Platz genug ist, so kann man allenfalls den Augapfel öffnen, einen Theil der gläsernen Feuchtigkeit ausdrücken, und solchergestalt bequemen Raum für das künstliche Auge schaffen. Diese Operation ist unschmerzhaft und ohne Gefahr, nur geschiehet es zuweilen, daß sich die gläserne Feuchtigkeit von neuem bis zu ihrer vorigen Quantität anhäuft, und den Raum für das künstliche Auge beenget, da dann die Operation wiederholt werden muß.

§. 108.

Ist der Augapfel bey irgend einer Gelegenheit ganz und gar verlohren gegangen, z. E. wegen eines Krebses ausgerottet worden, so ist es nicht wohl

möglich ein künstliches Auge einzulegen. Zwar füllt sich die Augenhöhle in diesen Fällen gemeiniglich mehr oder weniger mit Fleische an, welches dem künstlichen Auge einige Unterstützung giebt, gemeiniglich aber verlihren die Augenlider ihre natürliche Bewegung und schrumpfen dergestalt zusammen, daß sie gleich einer Falte am obern und untern Rande der Augenhöhle liegen, und das künstliche Auge nicht bedecken. Vielleicht könnte man indessen dies Einschrumpfen der Augenlider verhüten, wenn man gleich nach der Ausrottung des Augapfels die Augenhöhle mit Charpie anfüllte, und die Augenlider über derselben mit Heftpflastern zusammenzöge, und in einer beständigen Ausdehnung erhielt.

§. 109.

Die Handgriffe bey der Einlegung und Ausnehmung eines künstlichen Auges sind so leicht, daß der Kranke gemeiniglich gar bald sich diese Operation selbst verrichtet. Man faßt den Rand des obern Augenlides mit dem Daumen und Zeigefinger der einen Hand, und ziehet dasselbe ein wenig abwärts vom Augapfel, um das künstliche Auge, welches man vorher befeuchtet, mittelst der andern Hand unter dasselbe schieben zu können. Dies geschiehet am leichtesten, wenn man den schmalern Winkel des künstlichen Auges zuerst unter das Augenlid schiebt, es dann in die Queere stellt, so hoch unter das obere Augenlid herauf drückt, daß der untere Rand des künstlichen Auges höher liegt, als der obere Rand des untern Augenlids; das untere Augenlid

genlid alsdann mit einem Finger etwas abwärts ziehet, und dann das künstliche Auge herab, unter das untere Augenlid sinken läßt. — Wenn man das künstliche Auge ausnehmen will, darf man nur den Rand des untern Augenlides mit einem Finger ein wenig abwärts ziehen, den Kopf einer Stecknadel unter den untern Rand des künstlichen Auges bringen, und denselben ein wenig aufheben, und hervorziehen, da dann das künstliche Auge sogleich aus der Augenhöhle herabglitscht.


S. 110.

Die vordere Ueberfläche des durch die Entzündung verminderten Augapfels ist oft ungleich, an einer Stelle vertieft, an der andern erhaben; der Rand des gläsernen Auges liegt folglich an einigen Stellen fester auf als an andern, und verursacht daselbst schmerzhaftige Empfindungen, die den Kranken nöthigen, das künstliche Auge auszunehmen. Der Wundarzt hebt diese Beschwerden, wann er an denen Stellen, welche zu fest aufliegen, und zu stark drücken, mittelst eines Schleifsteins, oder einer Feile etwas von dem Rande des künstlichen Auges abnimmt. — Schmerzt der Augapfel nach Einlegung des gläsernen Auges im ganzen Umfange, so ist das eingelegte Tellerchen wahrscheinlich zu tief, und der Rand desselben im ganzen Umfange drückt zu stark. Der Wundarzt muß in diesem Falle ein flacheres Tellerchen einlegen. — Schmerzt das Auge demungeachtet noch, so hat man Ursach zu glauben, daß der Augapfel überhaupt zu empfindlich ist. Man thut in diesem Falle am besten, wenn

man das Tellerchen wieder ausnimmt, und das Auge eine Zeitlang mit kaltem Wasser, Brandwein, oder Alaunauflösung wäscht. Nach einiger Zeit verträgt der Augapfel den Druck des Tellerchen gemeiniglich ohne Schmerzen. Es giebt Kranke, die so empfindlich sind, daß sie das künstliche Auge durchaus nicht ohne Schmerzen tragen können. Diese thun am besten, wenn sie dem Gebrauche desselben ganz und gar entsagen.

S. III.

Es versteht sich, daß in dem Falle eines Entzuges man nie an die Einlegung eines künstlichen Auges eher denken darf, als bis sich alle Entzündung und schmerzhaftige Empfindlichkeit des Auges gänzlich verlohren hat; auch in der Folge, so oft aus irgend einer Ursache eine Entzündung in dem Augapfel entsteht, das künstliche Auge so lange ausnimmt, bis die Entzündung gänzlich gehoben ist. — Man thut wohl, wenn man den Kranken mit mehrern künstlichen Augen von derselben Art versieht, damit er, wenn etwa eins verlohren geht, sogleich ein anderes bey der Hand hat. — Uebrigens ist es rathsam, daß der Kranke das künstliche Auge täglich einmal ausnimmt, und dasselbe vorzüglich aber die Augenhöhle, von allerhand Unreinigkeiten säubert, die sich in derselben erzeugen, anhäuffen, und oft scharf werden, und eine Entzündung erregen, die den Gebrauch des gläsernen Auges auf eine Zeitlang unterbricht.



Das vierte Kapitel.

Von den

undurchsichtigen Flecken der Hornhaut.

§. 112.

Die undurchsichtigen Flecken der Hornhaut unterscheidet man sehr leicht durch ihre Farbe; sie sind nämlich neblig oder bleichweiß, und in diesem Falle nicht ganz undurchsichtig; oder sie sind kreideweiß, und dann immer ganz undurchsichtig. Die Verschiedenheit, die man an diesen Flecken bemerkt, hängt von ihrem Umfange, dem Grade ihrer Verdunkelung, und der Stelle ab, wo sie sich befinden. In Absicht ihres Umfangs theilt man sie in drey Gattungen ein. Entweder nämlich die durchsichtige Hornhaut ist in ihrem ganzen Umfange oder größtentheils, oder sie ist nur an einer einzigen kleinern oder größern Stelle verdunkelt; im ersten Falle nennt man die Krankheit leucoma, im letztern eigentlich macula corneae. Bey alten Personen verdunkelt sich der untere Rand der Hornhaut in einer bogenförmigen Gestalt, wodurch die Hornhaut das Ansehen erhält, als wenn sie kleiner würde; ein Fall, den man arcus senilis, gerontoxon nennt. — In Absicht des Grades der Verdunkelung theilt man die einzelnen Flecken der Hornhaut gleichfalls in drey Gattungen

ein; entweder der verdunkelte Fleck hat eine rauchrichte oder neblichte Farbe, und ist nicht ganz undurchsichtig, (achlis); oder der Fleck ist kreideweis und ganz undurchsichtig, aber eben und nicht nach auswärts erhaben (nephelium); oder der Fleck ist nicht allein kreideweis, sondern auch nach auswärts erhaben, und stellt einen weißen Hügel vor, der auf der Ueberfläche der Hornhaut liegt (aigis). Auch bey dem Leucom bemerkt man diese verschiednen Grade der Verdunkelung. — Endlich ist die Verdunkelung in Absicht ihres Sitzes zuweilen superficiell, oder sie dringt tief in die Hornhaut, ja ganz durch dieselbe. Im ersten Falle hat sie ihren Sitz in der Conjunctiva; oder unmittelbar unter derselben; im zweyten Falle in den Lamellen der Hornhaut selbst. Es giebt Fälle, wo man dies sehr deutlich unterscheiden kann, zumal, wenn man das Auge von der Seite ansieht; aber auch Fälle, wo man keinesweges bestimmen kann, wie tief die Verdunkelung liegt, oder wie tief sie in die Hornhaut eindringt.

S. 113.

Höchstwahrscheinlich entstehen die Verdunkelungen der Hornhaut zunächst von stockenden und verdickten Feuchtigkeiten in den Gefäßen der Hornhaut, und der Conjunctiva, die sie bedeckt. Manchmal mag wohl ein wirkliches Extravasat zwischen den Blättern der Hornhaut oder unter der Conjunctiva daran schuld seyn. Mit einiger Wahrscheinlichkeit läßt sich dies vermuthen, wenn die verdunkelte Stelle der Hornhaut zugleich widernatürlich dick, oder auswärts

wärts erhaben ist. Indessen läßt sich nicht immer mit Gewißheit bestimmen, ob die Ursache des Fleckens eine bloße Stockung der Feuchtigkeiten in den Gefäßen, oder ein verdicktes Extravasat ist; sie sey aber welches von beuden sie wolle, darinnen ist der Wundarzt gewiß, daß bey der Kur dieser Flecken alles darauf ankommt, verdickte Feuchtigkeiten zu erweichen, aufzulösen, zu zertheilen. — Auch dies ist gewiß, daß der gewöhnlichste Sitz der Stockungen sowohl als des Extravasats die Conjunctiva und das Zellengewebe unter derselben ist.

§. 114.

Die entfernten Ursachen der Flecken der Hornhaut lassen sich in zwey Klassen eintheilen. Es sind nämlich entweder örtliche Ursachen, die bloß eine Verdickung der durchsichtigen Feuchtigkeiten in der Hornhaut veranlassen; oder es sind allgemein durch den Körper verbreitete Krankheitsstoffe, die indem sie auf die Hornhaut wirken, dieselbe verdunkeln. Zu der ersten Gattung gehören alle Augenentzündungen, die wenn sie die Hornhaut ergreifen, gemeiniglich inflammatorische Verdickungen zurück lassen; alle Geschwüre und Wunden der Hornhaut, die undurchsichtige Narben zur Folge haben; heiße Körper, Funken, die die Hornhaut berühren, vertrocknetes Eyter zwischen den Blättern der Hornhaut, oder unter der Conjunctiva u. s. w. Zu der zweyten Klasse gehört das venerische Gift, die Materie der Scropheln, der Gicht, zurückgetretner Hautkrankheiten, unterdrückter Ausleerungen u. s. w.

Die Heilung der Verdunkelungen der erstern Art erfordert bloß äußerliche und innerliche erweichende, auflösende zertheilende Mittel; die zweyte Gattung hingegen erfordert außer diesen allgemeinen Mitteln, noch die besondern, die der innern Ursache derselben angemessen sind. — Die Flecken der erstern Art, welche von einer örtlichen nicht fortwirkenden Ursache entstehen, bleiben, wenn sie einmal entstanden sind, und sich selbst überlassen werden, unverändert; die hingegen von der zweyten Gattung, welche von einer noch fortwirkenden Ursache herrühren, verändern zuweilen ihre Gestalt, werden größer, ja vermindern oder verlihren sich manchmal von freyen Stücken.

S. 115.

Die nächste Wirkung der undurchsichtigen Flecken der Hornhaut ist Verminderung des Gesichtes, jedoch von verschiedner Art, nach der verschiednen Beschaffenheit des Fleckens. Kranke, die eine geringe nicht ganz undurchsichtige Verdunkelung der Hornhaut (achlis) haben, erblicken alle Gegenstände gleichsam in Rauch und Nebel: diejenigen hingegen, welche einzelne ganz undurchsichtige Flecken haben, sehen den Gegenstand rein, aber schwach; und desto schwächer, je größer der Fleck ist. Flecken in der Mitte der Hornhaut, der Pupille gegen über hindern das Gesicht mehr, als die Flecken zur Seite am Rande der Hornhaut. Kranke, die ganz undurchsichtige Flecken von mäßiger Größe in der Mitte der Hornhaut haben, sehen im Dunkeln besser als im hellen.

hellen. Nämlich am einem hellen Orte verengert sich die Pupille dergestalt, daß sie der Fleck ganz bedeckt, und alle Lichtstrahlen von vornen her in dieselbe zu dringen hindert; an einem dunklern Orte hingegen, erweitert sie sich, und wird größer als der Fleck, so daß zur Seite des Fleckens Lichtstrahlen von vornen her in dieselbe gelangen können. Die Behauptung einiger, daß einzelne Flecken, indem sie einen Schatten auf die retina werfen, die Erscheinung eines schwarzen Flecks vor dem Auge, oder auf dem Gegenstande, den der Kranke betrachtet, (Scotoma) veranlassen, ist ungegründet; der Fleck schwächt das ganze Bild des Gegenstandes, ra von allen Puncten desselben Lichtstrahlen auf den Fleck fallen, und nicht ins Auge gelangen. — Flecken am untern Rande der Hornhaut sind dem Gesichte mehr hinderlich, als Flecken am obern Rande. — Kranke, denen die Hälfte der Hornhaut verdunkelt ist, sehen nahe Gegenstände nur halb, entfernte aber ganz. Die gänzliche Verdunkelung der Hornhaut (leucoma) verursacht eine völlige Blindheit. Ist an der einen oder andern Seite eine durchsichtige Stelle übrig, so schielen die Kranken gemeiniglich.

§. 116.

Die undurchsichtigen Flecken der Hornhaut sind zuweilen sehr leicht, zuweilen schwer zu heben; zuweilen sind sie ganz unheilbar. Flecken, die von innern venerischen, scrophulösen, gichtischen u. s. w. Ursachen entstehen, sind überhaupt leichter zu heben, als die, welche von örtlichen Ursachen herrühren.

Flecken, die ein Geschwür der Hornhaut, oder eine Eyttersammlung zwischen den Blättern der Hornhaut (unguis) hinterläßt, sind wirkliche Narben, und lassen sich zwar mindern, aber nie ganz zertheilen. Flecken, die die Folge einer Augenentzündung sind, haben ihren Sitz mehrentheils in der Conjunctiva, und sind im ganzen heilbarer, als die ebengenannten. Je jünger der Kranke, und je frischer der Fleck ist, desto gewisser kann man eine vollkommene Heilung versprechen. Bey ganz jungen Kindern sind sie gemeiniglich leicht wegzuschaffen. Alte Flecken sind unheilbar. Je dichter der Fleck, je undurchsichtiger die Verdunkelung ist, desto ungewisser ist der Erfolg der Kur. Neblichte Trübigkeiten der Hornhaut weichen dem Gebrauche zweckmäßiger Mittel gemeiniglich. Je größer der Fleck ist, desto größer ist die Schwierigkeit der Kur. Das Leucom hält man gemeiniglich für unheilbar. Jedoch kommt es nicht sowohl auf die Größe, als auf den Grad der Verdunkelung an, und überhaupt erhält man durch Beharrlichkeit in dem Gebrauche dienlicher Mittel oft einen glücklichen Erfolg in Fällen, wo man ihn nicht erwartete. — Superficielle Flecken, d. i. solche die ihren Sitz in der Conjunctiva haben, sind leicht leichter zu heben, als diejenigen, die in die Blätter der Hornhaut tief eindringen, weil dahin die Wirkung der äußerlichen Mittel nicht leicht gelangt. Indessen kommt es überhaupt nicht so sehr auf den Sitz, als auf den Grad der Verdunkelung an, auch ist der Wundarzt bey der genauesten Untersuchung nicht immer im Stande, mit Gewißheit

heit zu unterscheiden, ob die Verdunkelung in die Blätter der Hornhaut dringt, oder nicht. — Uebrigens erfordert die Heilung aller Verdunkelungen der Hornhaut auch unter den günstigsten Umständen immer eine geraume Zeit, und eine anhaltende Beharrlichkeit in dem Gebrauche der zweckmäßigen Mittel.

§. 117.

Die Heilmethode der Verdunkelungen der Hornhaut ist verschieden, je nachdem dieselben von einer innern allgemeinen, oder von einer bloß örtlichen Ursache herrühren. Im ersten Falle wendet der Wundarzt bloß die Mittel sowohl innerlich als äußerlich an, die der besondern Natur der jedesmaligen Ursache angemessen sind, ohne Rücksicht auf ihre Wirkung, die Verdunkelung der Hornhaut zu nehmen. Diese verliert sich von sich selbst, wenn ihre innere Ursache gehoben wird. Entstehen also diese Verdunkelungen von einer venerischen, gichtischen, scrophulösen, rheumatischen erythematischen u. s. w. Schärfe, so braucht der Wundarzt bloß die Mittel, die in diesen Anfangsgründen im Kapitel von den Geschwülsten, Geschwüren, Augenentzündungen gegen diese Krankheitsstoffe empfohlen worden sind. Im zweyten Falle hingegen, wo diese Verdunkelungen von örtlichen Ursachen herrühren; oder auch im ersten Falle, wenn der Krankheitsstoff, der die Verdunkelung zuerst verursachte, getilgt ist, und diese zurück bleibt, braucht er innere und äußere Mittel, die stockende und verdickte Säfte erweichen, auflösen, zertheilen.

§. 118.

S. 118.

Unter dieser Gattung von Mitteln sind einige, deren heilsame Wirkungen gegen die Verdunkelungen der Hornhaut wiederholte Erfahrungen auf eine vorzügliche Art bestätigt haben, und diese verdienen den Vorzug vor allen andern. Man kann sie insgesammt in zwey Klassen theilen; sie sind nämlich erweichend, oder zertheilend, auflösend. Es ist nicht gleichviel, aus welcher von diesen beyden Klassen der Wundarzt in jedem besondern Falle ein Mittel wählt; nicht in jedem Falle hilft jedes Mittel. Bey seiner Wahl können ihm folgende Regeln einigermaßen zur Leitung dienen. Zuweilen siehet man es dem Flecken deutlich an, daß er von einer Erschlaffung und Anschwellung der Conjunctiva herührt, er hat gleichsam ein breyartiges feuchtes Ansehen; zuweilen hingegen sieht er hart, glänzend, trocken, knorpelartig aus. Der Anschein lehrt, daß hier erweichende, dort wahrscheinlich stärkende, reizende Mittel zuträglich sind. — Wenn das Aeußere des Fleckens dem Wundarzte keine Anleitung giebt, so erhält er sie oft durch einen Versuch. Hat er eine Zeitlang Mittel der einen Gattung ohne sonderlichen Erfolg gebraucht, so ist er berechtigt Mittel der andern Gattung zu versuchen, und nun diejenigen zum fortgesetzten Gebrauche zu wählen, die bey diesem Versuche am wirksamsten zu seyn schienen.

S. 119.

Das was von den verschiednen Gattungen der Mittel gilt, gilt oft sogar auch von einzelnen Mitteln.

teln. Man wird oft bemerken, daß ein Mittel, welches sich in einem andern Falle sehr kräftig bewies, in dem gegenwärtigen nichts vermag: und daß ein Mittel in diesem Falle von vorzüglicher Wirkung ist, da andre eben so bewährte es nicht sind. Um dies Mittel in jedem Falle ausfündig zu machen, muß der Wundarzt die Regel beobachten, die Mittel, wenn sie keine merkliche Hülfe leisten, oft abzuändern, und den Gebrauch eines einzigen nicht allzuhartnäckig fortzusetzen. Aus eben dieser Ursach ist es auch rathsam, immer mehrere wirksame Mittel zugleich zu brauchen. — In allen übrigen Fällen, wo der Wundarzt zur Wahl eines besondern Mittels keine besondre Anzeige hat, wird er mehrentheils wohl thun, wenn er zuerst eine Zeitlang erweichende, und denn zertheilende, oder während dem ganzen Verlaufe der Kur abwechselnd erweichende und zertheilende, oder aber beyderley Mittel zugleich gebraucht.

S. 120.

Die äußerlichen Mittel müssen dem Augapfel selbst applicirt, d. i. ins Auge getröpfelt oder gestrichen, nicht etwa mittelst Kompressen auf die Augenlider gelegt werden. — Die zertheilenden Mittel müssen so stark seyn, als sie das Auge, ohne entzündet zu werden, verträgt, und da sich das Auge an den Reiz derselben gemeiniglich allmählig gewöhnt, von Zeit zu Zeit verstärkt werden. — Rührt der Fleck von örtlichen Ursachen her, so läßt sich von äußerlichen Mitteln, die unmittelbar auf den Sitz der Krankheit wirken, das meiste erwarten; indessen können

können auch innerliche Mittel angewendet werden, die zu gleichem Endzwecke mit wirken. Unter diesen sind nur solche zweckmäßig, die gleichfalls eine auflösende und zertheilende Kraft haben.

§. 121.

Unter den innern Mitteln dieser Art empfiehlt die Erfahrung folgende: vorzüglich das versüßte Quecksilber, in kleinen Dosen, und dann und wann dergestalt, daß es einen Durchfall erregt. Man hat (Boerhaave, Rowley) durch öftere Quecksilberabführungen allein, ohne alle äußerliche Mittel starke Verdunkelungen der Hornhaut gehoben. Auch der innere Gebrauch des Sublimats ist von Nutzen gewesen. — Der Schierling, allein oder in Verbindung mit Spießglas- und Quecksilbermitteln; namentlich, die bereits im Vorhergehenden angezeigte Mischung aus einem Grane Kalomel, eben so viel Spießglaschwefel, und acht Gran Schierlingpulver, alle Abend und Morgen genommen. — Das Spießglas, oder verschiedne Zubereitungen desselben; vorzüglich der Brechweinstein in kleinen Dosen, oder die im Vorhergehenden gleichfalls bereits angezeigte Mischung aus einer Unze hurhamschen Spießglaswein, und einem halben Quentchen Extract. aconiti, täglich drey mal zu 16 bis 50 Tropfen genommen. — Das Aconitum, täglich zu zwey bis zwölf Granen einmal ja mehrere male im Extract, allein oder in Verbindung mit Spießglasmitteln. — Die belladonna täglich zu fünf bis acht Gran. — Das Extractum hyoseiami albi täglich

lich zu zwey bis funfzehn Gran. — Das Extractum pulsatillae nigricantis, von einem halben Grane bis zu drey Granen, (Sidr.) die Arnica, die Kelleresel, u. s. w.

§. 122.

Unter den vielen äußerlichen zertheilenden Mitteln, die von jeher gegen die Flecken der Hornhaut empfohlen worden sind, scheinen folgende den Vorzug zu verdienen. Zuerst allerley Salze. Der Zucker in Verbindung mit verschiednen andern Mitteln, oder allein im Pulver, oder auf einem zinnernen Teller zu einem schwärzlichen Pulver gerieben, mittelst eines feuchten Pinsels des Tages einigemal auf die Hornhaut gestrichen. — Der Borax, ein vorzügliches Mittel. Man löst ein halbes Quentchen davon (und allmählig etwas mehr) nebst einem Quentchen Zucker in einer Unze Rosenwasser auf, und läßt dem Kranken, indem er auf dem Rücken liegt, täglich 4 bis 6 mal einige Tropfen davon ins Auge fallen. Es giebt wenige Augen, die dieses wirksame Mittel nicht vertragen. — Der lapis divinus. (Pellier, Schmucker). Man braucht ihn wie den Borax in einer Auflösung, die man schwächer oder stärker macht, nach dem das Auge mehr oder weniger empfindlich ist. — Auf gleiche Art wendet man auch den Salmiak in einer Auflösung an. Einige empfehlen vorzüglich (Janin) eine Auflösung von einer halben oder ganzen Quente Salmiak in sechs Unzen frischbereitetem Kalkwasser, die man eine Nacht in einem kupfernen Geschirr stehen läßt,

läßt, und dann filtrirt. — Der gebrannte Alaun mit gleichen Theilen, oder auch etwas weniger Zucker in ein feines Pulver gerieben, und mittelst eines feuchten Pinsels des Tages einigemal auf die Hornhaut gestrichen thut oft, vorzüglich bey schlaffen Verdunkelungen vortreffliche Dienste.

S. 123.

Der weiße Vitriol ist bey leichten neblichten superficiellen Trübigkeiten der Hornhaut, die zuweilen nach Augenentzündungen zurück bleiben, ein zuverlässiges Mittel. Man löst einen Gran davon in einer Unze Wasser auf, und tröpfelt es ins Auge, oder läßt das Auge darinnen baden. — Einige (Baldinger, Pharmacop. Edinburg.) empfehlen eine Mischung aus gleichen Theilen Zucker, Cremor Tartari und weißen Bolus zu einem feinem Pulver gerieben, und mittelst eines feinen Pinsels ins Auge gestrichen, als eines der kräftigsten Mittel gegen die Verdunkelungen der Hornhaut. — Der Brechweinstein in einer so starken Auflösung als das Auge vertragen kann, ins Auge getröpfelt, oder als Augenbad gebraucht, hat in einigen Fällen (Hirschel) sehr gute Dienste gethan. So auch ein ähnliches Mittel, das aqua benadicta Rulandi, vorzüglich (Selle, Med. Cl.) in folgender Mischung. R. Aqu. flor. camomill. Unc. vj. Aqu. benedict. Ruland. Unc. ij. Essent. aloës, Liquam myrrh. aa drachm. ij. M. — Auch das Hirschhornsalz ist oft mit einem sehr guten Erfolge angewendet worden. Einige (Pellier) rathen von dem Hirschhorngest
dann

dann und wann einen Tropfen fallen zu lassen. Wenn derselbe das Auge zu stark reizt, muß er mit Wasser verdünnt werden. Ein durch viele Erfahrungen sehr bewährtes Mittel ist eine Mischung aus drey Quentchen Nußöl, einem Quentchen Ochsen-galle und acht bis zehn Gran flüchtigen Hirschhorn-salz; oder eine ähnliche Mischung aus drey Quent-chen Honig, einem Quentchen Ochsen-galle und zwölf Gran Hirschhornsalz, welche mittelst eines Pinsels des Tages einigemal auf den Fleck gestrichen wird.

§. 124.

Unter allen auflösenden Mitteln dieser Art ver-dienen die Quecksilbermittel ganz vorzüglich em-pfohlen zu werden. Eine Auflösung von einem Grane Sublimat in vier Unzen destillirten Brunnen-wasser, des Tages einigemal ins Auge getropfelt, oder als Augenbad gebraucht, hat bey fortgesetztem Gebrauche oft (Bell, Ware) die stärksten Ver-dunkelungen der Hornhaut gehoben. — Ein Pul-ver aus zwey Quentchen Zucker vier Gran Aloe, und eben so viel versüßtem Quecksilber nach vorgän-gigem Gebrauch erweichender Augenbäder täglich ei-nigemal mit einem feuchten Pinsel auf die Hornhaut gestrichen thut vortreffliche Dienste (Boerhaave). Einigen ist das unguentum citrinum der Edinb. Pharm. vorzüglich im Gebrauche. Bey sehr em-pfindlichen und entzündlichen Augen kann man den Plencschschen Quecksilberschleim auf die Hornhaut strei-chen, oder mit Malvendekoft verdünnt als Augen-bad brauchen. Von dem allgemeinsten Gebrauch

Richt. Wundarzneyk. III. B. J aber

aber ist die bekannte rothe Präcipitatsalbe, die man aus drey Unzen frischer ungesalzner Butter, einer halben Unze Wachs, zwey und einem halben Quentchen rothen Präcipitat, einem Quentchen tutia, und zwey Scrupel in Eyeröl aufgelösten Kampfer bereitet, und einer Linse groß des Tages drey mal ins Auge streicht. Da diese Salbe nicht auf der Hornhaut haftet, sondern bloß auf den Rändern der Augenlider kleben bleibt, thut man wohl, wenn man sie durch ein gelindes Reiben der Augenlider über den Augapfel zu verbreiten sucht.

§. 125.

Außer diesen salzigen Mitteln haben sich bey wiederhohltten Versuchen auch folgende wirksam bewiesen. — In einem sehr alten und verdienten guten Rufe steht die Galle. Man braucht vorzüglich die Ochsen- oder Hechtgalle, allein mit Wasser und Honig verdünnt, als ein Augenbad, oder ins Auge getröpfelt, oder mit einigen von den bisher genann- Mitteln vermischt. — Das Schierlingextract mit Wasser verdünnt allein, oder vereinigt mit dem Sublimat, dem Hirschhornsalze u. s. w. — Die Tinctura Thebaica (Ware) täglich ein paarmal ins Auge getröpfelt. — Die Aloe in einem feinen Pulver allein oder mit Zucker, Kalomel u. s. w. — Das Extract der Belladonna, des chelidon. maior. mit Wasser verdünnt allein, oder in Verbindung mit andern Mitteln.

§. 126.

Von jeher hat man Pulver von harten unauflösbaren Substanzen mancherley Art gegen die Flecken der Hornhaut empfohlen; und noch behaupten diese Mittel den guten Ruf in welchem sie stehen; auch kann man wirklich nicht leugnen, daß sie oft sehr gute Dienste thun. Indessen kann man sich doch höchstwahrscheinlich nur in dem einzigen Falle etwas von dieser Gattung von Mitteln versprechen, wo der Fleck superficiell ist, d. i. seinen Sitz in der Conjunctiva hat, oder auswärts dick ausliegt; auch hat man wohl darauf zu achten, daß diese Pulver so fein als möglich sind. Grobe Pulver dieser Art erregen Entzündungen des Auges, und dadurch leicht eine Zunahme der Verdunkelung. — Das berühmteste Mittel dieser Art ist das Glaspulver, das von vielen Bundärzten (Warner, Ware, Mead) sehr empfohlen wird. Man bedient sich gemeiniglich des breyartigen Abgangs, der sich beim Glas schleifen erzeugt. Er enthält den feinsten Glasstaub, und wird mittelst eines Pinsels auf die Hornhaut gestrichen. Andre empfehlen Glas in einem Mösser mit lebendigen Quecksilber gestoßen, bis es in ein aschgraues Pulver verwandelt wird, welches man durch ein Stück Leinwand stäubt, und gleichfalls mit einem Pinsel aufs Auge bringt. — Eben so bekannt ist auch die Zinnfeile. Gegen die hartnäckigsten Verdunkelungen der Hornhaut empfiehlt man (Börshaave) folgendes als ein sehr wirksames Mittel:

℞. sacch. cand. drachm. ij. limatur. stann. puriss. subt. drachm. j. vitriol. comm. gran. iv. M. F. pulv.

§ 2

tenuiss.

tenuiss. per linteolum cribrandus. — Sonst brauchte man auch die ossa sepiae in einem feinen Pulver allein, oder mit Aloe und andern Mitteln vermischt.

S. 127.

Unter den erweichenden Mitteln verdienen folgende vorzüglich empfohlen zu werden. — Das Vipernfett, ein altes bekanntes Mittel; ein Hauptbestandtheil der berühmten Sloanischen Augensalbe, die noch immer sehr empfohlen wird (Fr. Home). Man betrügt sich, wenn man glaubt, daß dies Fett desto kräftiger ist, je frischer es ist. Die Erfahrung scheint vielmehr das Gegentheil wahrscheinlich zu machen. — Ein ähnliches Mittel, das Alaquapenfett (liquor hepaticus mustellae fluviatilis) ist in den neuern Zeiten (Haen Rat. medend. Tom. IX. p. 244. Tom. X. p. 283) berühmt worden. Es ist nicht zu leugnen, daß dies Mittel zuweilen gute Dienste thut, es ist aber auf die gewöhnliche Art bereitet, so scharf, daß es reizbare Augen nicht wohl vertragen. — Von einem allgemeinen Gebrauch ist jetzt das gemeine Nussöl, ein Mittel, dessen Gebrauch ohne alle Unbequemlichkeit ist, und dessen Wirksamkeit, in denen Fällen, wo erweichende Mittel überhaupt zuträglich sind, durch eine Menge Erfahrungen bestätigt worden ist. Man läßt des Tages einigemal ein paar Tropfen davon ins Auge fallen, und reibt die Augenlider ein wenig, um es über den Augapfel zu verbreiten. — Auch das gewöhnliche Eyeröl, das Mark aus den Knochen frisch geschlachteter Thiere ist mit Nuzen (Heuermann)

mann) gebraucht worden. — Einige haben gleichfalls gute Wirkung von dem Malvendekoft, als Augenbad gebraucht, beobachtet.

§. 128.

In schwerern Fällen, wo die bisher angezeigten Mittel nichts vermögen, kann der Wundarzt seine Zuflucht noch zu einigen kräftigern Mitteln nehmen, wodurch das Gesicht, wo nicht ganz wiederhergestellt, doch merklich gebessert wird. — Unter diesen sind zuerst die Ezmittel, welche von einigen (Nowley) sehr empfohlen werden, zu bemerken. Man taucht in eine schwache Auflösung von Höllenstein einen feinen Mahlerpinsel, berührt den Fleck damit, und wischt alsdann mit einem etwas größern zu wiederhohlten malen in Milch getauchten Pinsel die berührte Stelle sorgfältig ab, daß nichts vom Höllensteine zurück bleibt. Immer muß man sorgfältig verhüten, daß während dieser kleinen Operation, und ehe die Hornhaut vom Höllensteine ganz gereinigt ist, das obere Augenlid nicht herabglitscht; und daher ist es rathsam, dasselbe mittelst des stumpfen platten Haakens aufzuheben, und fest zu halten. Die Operation kann von Zeit zu Zeit, doch nie eher, als bis die Entzündung, die etwa erfolgen könnte, völlig verschwunden ist, wiederholt werden. Man siehet indessen leicht ein, daß dies Mittel blos in dem Falle mit der Hoffnung eines glücklichen Erfolgs angewendet werden kann, wo die Verdunkelung stark, und offenbar superficial ist, d. i. ihren Sitz auf der äußern

Ueberfläche der Hornhaut hat. Auch darf man nicht hoffen, durch dies Mittel die Verdunkelung ganz zu heben, sondern sie bloß zu mindern. — Statt des Höllensciens kann man auch die Spießglasbutter gebrauchen.

§. 129.

Wenn der Fleck äußerlich dick aufliegt, kann man ihn, so weit er über die äußere Ueberfläche der Hornhaut hervorragt, mit der Scheere abnehmen. Man hebt durch diese kleine Operation nicht allein das unangenehme und oft schmerzhaftes Reiben des Flecks gegen die Augenlider, sondern mindert auch die Masse der Stockungen, und macht den Rest oft heilbar. — Eine alte Operationsart ist das öftere Reiben des Flecks mit etwas hartem und rauhen, z. E. mit einem Stücke von den oss. sepiae, wodurch man den erhabnen Theil des Flecks allmählig abzukragen host. — Einige wollen, daß man mittelst einer Nadel einen Faden durch den Fleck ziehe, und ihn mittelst eines Messers von der Hornhaut absondre. — Handgriffe, die mit unndthiger Mühe und Weitläufigkeit verbunden sind, und bey weitem nicht so leicht und vollkommen gelingen, als der Gebrauch der Scheere. — Allenfalls findet bey diesen erhabnen Flecken auch der Gebrauch des Exmittels statt.

§. 130.

Eine gleichfalls bekannte und von manchen (Bidloo) empfohlne Operation ist die Durchbohrung des Flecken mit einer runden Nadel. Man
setzt

setzt nämlich eine gewöhnliche runde Staarnadel, oder eine gewöhnliche Nethnadel auf den Fleck, und drehet dieselbe zwischen zwey Fingern und unter einem gelinden Drucke so lange, bis die Spitze derselben in die Hornhaut so tief eindringt, daß sie den Sitz der Verdunkelung ganz durchbohrt. Man setzt die Nadel so oft auf den Fleck, daß der ganze Fleck ganz durchlöchert ist, worauf man das Auge in einer erweichenden auflösenden Feuchtigkeit baden läßt. Die Operation muß nach ein paar Tagen wiederholt werden. Oft ist es nöthig, sie zum dritten und viertenmale zu wiederholen. — Man sieht leicht ein, daß sich von dieser Operation bloß bey denen Flecken etwas erwarten läßt, die von einem vnguis entstehen. Die Absicht dabey ist, einen Weg zu bahnen, wodurch die äußerlichen Mittel zu dem verdickten Eyter gelangen, und dasselbe erweichen, und auflösen können. Aber durch die eben beschriebene Operation wird man diese Absicht schwerlich erreichen. Die Oeffnungen die man mit einer runden Nadel macht, sind zu klein, und schließen sich zu schnell wieder, als daß die äußerlichen Mittel dadurch zu dem verdickten Eyter gelangen könnten. Auch kann man nicht genau bestimmen, wie tief der Fleck in der Hornhaut liegt, und ob die Nadel wirklich bis zu demselben eindringt; nicht zu gedenken, daß bey der großen Beweglichkeit des Augapfels es schwer ja unmöglich ist, so viele Oeffnungen mit einiger Genauigkeit zu bohren. — Besser thut man daher in diesem Falle, wenn man den Fleck mit der Spitze eines Staarmessers einige-

mal dergestalt durchsicht, daß die Spitze die Hornhaut ganz durchdringt, und bis in die vordere Augenkammer gelangt. Man ist auf diese Art nicht allein versichert, daß die Wunde wirklich bis zu dem Sitz des Flecks dringt, und groß genug ist, daß äußere Mittel durch dieselbe eindringen können, sondern man kann auch hoffen, daß die wässerichte Feuchtigkeit, die durch den Stich auströpfelt, das verdickte Eiter auflöst, und ausspült. Man kann auch diese Operation, wenn man merkt, daß sie einigen Nutzen hat, wiederholen. Uebrigens ist auch der Erfolg bey dieser Operationsart zweifelhaft, da man nie gewiß ist, ob die Verdunkelung, die ein vnguis hinterläßt, bloß von verdicktem Eiter, und nicht etwa von einer Vernarbung der exulcerirten Stelle herrührt. Die Operation ist indessen ohne alle Gefahr.

S. 131.

Das Leukom, oder die Verdunkelung der ganzen Hornhaut hält man gemeiniglich für unheilbar; indessen findet dennoch nicht selten einige Hülfe statt. Zuweilen ist zwar die ganze Hornhaut, aber nur schwach, verdunkelt, rauchrich, nebligh; in diesem Falle ist es gar nichts seltnes, daß die Hornhaut durch die angezeigten Mittel zu ihrer vorigen vollkommenen Durchsichtigkeit hergestellt wird. — Zuweilen ist zwar die ganze Hornhaut, aber nicht an allen Stellen gleich stark, an einigen mehr, an andern weniger verdunkelt; an einigen ganz weiß, an andern nur trübe, nebligh. Nicht selten erhalten beym

beym Gebrauche der angezeigten Mittel die letztern Stellen ihre Durchsichtigkeit wieder. — Auch wenn die ganze Hornhaut gleich stark verdunkelt, und ganz weiß ist, bemerkt man dennoch gar oft, vornehmlich wenn die Krankheit nicht alt, und der Kranke jung ist, daß sich bey dem fortgesetzten Gebrauche dienlicher Mittel die Verdunkelung im Umfange der Hornhaut mindert, und der Kranke einige Sehkraft wieder erhält. — Zuweilen ist, mehrentheils in der Nähe des Randes der Hornhaut eine einzelne kleinere oder etwas grössere Stelle ganz durchsichtig, indem der übrige Theil der Hornhaut aufs stärkste verdunkelt ist. Man hat beobachtet, daß Kranke durch eine solche durchsichtige Stelle, wenn sie nicht allzuweit von der Pupille entfernt war, ganz erträglich sehen konnten. Könnte man in dem Falle, wo diese Stelle nahe am Rande der Hornhaut, und also von der Pupille sehr entfernt, und der ganze übrige Theil der Hornhaut auf eine unheilbare Art verdunkelt ist, nicht vielleicht oft dem Kranken einen ziemlich ansehnlichen Grad des Gesichts verschaffen, wenn man die Regenbogenhaut durchbohrte und dem durchsichtigen Fleck gegenüber eine künstliche Pupille machte?

§. 132.


Wenn die ganze Hornhaut so stark verdunkelt ist, daß man nicht hoffen kann, durch eines der bisher angezeigten Mittel etwas auszurichten, schafft man zuweilen durch eine Fontanelle, die man auf der Hornhaut selbst erregt, noch einige Hülfe. In-

langwierig, und zweifelhaft. Man berührt die Hornhaut an irgend einer Stelle mit der Spitze eines feinen Mahlerpincels, den man in einen dünnen Brey von Höllenstein getaucht hat, und reinigt alsdann die berührte Stelle mit einem in Milch getauchten Pincel sorgfältig, so daß nichts vom Höllenstein daran sitzen bleibt. Es ist unsicher, sich statt des Pincels eines zugespitzten Stückes vom Höllenstein zu bedienen; es weicht sich leicht etwas davon los, glitscht auf der Hornhaut herunter, und erregt heftige Schmerzen und Entzündung. Das obere Augenlid muß während dieser Operation mit dem stumpfen Haaken aufgezo-gen und wohl befestigt werden, damit es nicht etwa herabglitscht, ehe man mit dem Milchpincel den Höllenstein abgewischt hat. Die Stelle, welche man berührt, muß am untern Theile der Hornhaut, der Pupille nicht gegenüber, nicht zu nahe am Rande der Hornhaut, und eine von denenjenigen seyn, wo die Verdunkelung vorzüglich stark und dick ist. Man unterhält das auf diese Art erregte kleine Geschwür durch erweichende und reizende Mittel, die man mittelst der Spitze eines kleinen Pincels applicirt, und so wie das Geschwür mehr oder weniger feucht ist, wechselsweise wählt. Unter den reizenden Mitteln sind der gebrannte Alaun, der rothe Präcipitat, die schwächere Auflösung des Höllensteins; unter den erweichenden der arabische Schleim, der Schleim von den sem. pyllii, die Althäsalbe die gebräuchlichsten. So lange die Verdunkelung im Umfange der Fontanelle sich mindert, erhält man dieselbe offen. Sobald
man

man aber weiter keine Verminderung der Verdunkelung wahrnimmt, läßt man das Geschwür sich schließen, und erregt ein neues, an einer ähnlichen Stelle. Immer muß man wohl darauf merken, daß das Geschwür nicht zu tief in die Hornhaut eindringt und dieselbe ganz und gar durchfrißt.

S. 133.

Sowohl in dem Falle, wo nur eine einzelne Stelle der Hornhaut, als auch wo die ganze Hornhaut verdunkelt ist, laufen zuweilen weniger oder mehrere rothe angeschwollne Blutgefäße von einer Seite, oder von mehrern Seiten in die Verdunkelung der Hornhaut. Man nennt diese Gefäße unrichtig nährende Gefäße, (*vasa nutrientia*) da die Verdunkelung keiner Nahrung fähig ist. Aber gewiß ist es, daß durch diese Gefäße die Verdunkelung unterhalten und vermehrt wird, und daß alle bisher gegen diese Verdunkelungen empfohlne Mittel nichts vermögen, ehe diese Gefäße sämtlich abgeschnitten sind. Man schneidet sie in diesem Falle am besten zunächst am Rande der Hornhaut ab. Die Regeln, die bey dieser Operation zu beobachten sind, sind im vorhergehenden (S. 46) bereits angezeigt worden.



Das fünfte Kapitel.

Von dem

Felle auf dem Auge.

§. 134.

Zuweilen wird der Theil der Conjunctiva, der das Weiße im Auge bedeckt, widernatürlich dick, und das Zellengewebe, welches ihn an die Sclerotica befestigt, zugleich dergestalt erschlaft, daß sich diese Haut ungewöhnlich leicht und frey auf dem Augapfel hin und herschieben, und aufheben läßt, ja sich in Falten legt, und runzelt. Diese Verdickung und Erschlaffung der Conjunctiva bemerkt man zuweilen im ganzen Umfange des Weißen im Auge, zuweilen nur in einem Augenwinkel, zuweilen auch nur an einer kleinen Stelle in dem einen oder andern Augenwinkel. Gemeiniglich verliehrt das Auge daselbst seine glänzende Weiße, und bekommt eine schmutzig gelbe Farbe. Diese widernatürliche Beschaffenheit der Conjunctiva ist eine nicht ungewöhnliche Folge heftiger hitziger, oder langwieriger Augenentzündungen, da sie aber weiter keine Beschwerde verursacht, wird sie von wenigen bemerkt.

§. 165.

Wenn die Conjunctiva nahe am Rande der Hornhaut diese Veränderung leidet, hebt sie sich daselbst

dieselbst oft in eine kleine schmutzigweiße Falte in die Höhe, die über den Rand der Hornhaut hervorsteht, ja sich zum Theil auf denselben legt; und nun erregt der Fall gemeiniglich Aufmerksamkeit. — Man hat gesehen, daß sich die Conjunctiva rings um die Hornhaut herum in eine solche Falte erhoben hat. — Zuweilen erstreckt sich dieser Fehler auch in den Theil der Conjunctiva, der die Hornhaut bedeckt; und nun nennt man die Krankheit das Fell auf dem Auge (pterygium): auch scheint es wirklich beym ersten Anblicke, als wenn die Hornhaut mit einem widernatürlichen Felle bedeckt wäre. Dieser Fehler nimmt nur einen Theil, oder die ganze Conjunctiva der Hornhaut ein; im letzten Falle ist der Kranke ganz blind; im erstern sieht er noch mehr oder weniger, nachdem der Umfang der fehlerhaften Stelle größer oder kleiner ist. Die Verdickung der Conjunctiva der Hornhaut ist zuweilen die Folge desselben Fehlers der Conjunctiva im Weißen des Auges, und dann siehet man deutlich, daß diese Verdickung allmählig aus dem Weißen des Auges sich auf die Hornhaut erstreckt, und daß beide Theile des Augapfels eine und eben dieselbe Haut bedeckt. Zuweilen aber bemerkt man die Verdickung der Conjunctiva zuerst und allein auf der Hornhaut; das Weiße im Auge ist ganz unfehlerhaft.

§. 136.

Die Veränderungen, die die Conjunctiva der Hornhaut im Falle des so genannten Felles auf dem Auge leidet, sind verschieden; und eben so verschieden

den ist auch das äußere Ansehen der Krankheit. Undurchsichtig ist in diesem Falle die Conjunctiva immer; immer mindert oder hindert sie daher das Gesicht gänzlich. Zuweilen ist sie weißlich, und wenig verdickt; der Fall, den man eigentlich pterygium nennt. — Zuweilen ist sie dick und lederartig. — Zuweilen hart, wie Pergament, ja ganz knorpelartig, oder flechsig. Zuweilen ist sie mit einer Menge rother Blutgefäße durchwebt; der Fall, den man pannus nennt. — Das Zellengewebe unter der Conjunctiva nimmt zuweilen Antheil an der Krankheit der Conjunctiva, zuweilen nicht. Im ersten Falle wird es dergestalt erschlast, daß die Conjunctiva ganz beweglich ist, sich auf der Hornhaut hin und her, und in Falten und Runzeln schieben, ja mehr oder weniger aufheben läßt; im letzten Falle liegt die verdickte Conjunctiva fest auf der Hornhaut, und ist ganz unbeweglich.

S. 137.

Dies ist die wahre Natur und Entstehungsart des sogenannten Felles auf dem Auge. Es ist eine alte und irrige Meynung, daß dies Fell eine wider-natürliche Haut ist, die als eine Excrescenz, aus der Thränenkarunkel oder der halbmondförmigen Haut entspringt, sich allmählig ausbreitet, und an die Hornhaut anwächst. Das bloß was bisher von der Entstehungsart der Krankheit gesagt worden ist, widerlegt sie schon hinlänglich. Ueberdies ist es schwer zu begreifen, wie eine Excrescenz aus der Thränenkarunkel, sich in eine Haut ausbreiten, an den
Auge.

Augapfel anlegen, und anwachsen kann. Wenn die Verdickung der Conjunctiva zuerst im Weißen des Auges anfängt, und allmählig über die Hornhaut sich erstreckt, könnte diese Meinung allenfalls einen Schein von Wahrheit bekommen; aber selbst in diesem Falle fängt die Verdickung der Conjunctiva nicht immer im innern sondern auch sehr oft im äußern Augenwinkel an, da man sie also keinesweges der Thränenkarunkel zuschreiben kann; und dann auch wenn sie im innern Augenwinkel ihren Anfang nimmt, siehet man jederzeit ganz deutlich, daß sie mit der Karunkel und halbmondförmigen Haut in gar keiner Verbindung steht. Nicht zu gedenken, daß sich diese Verdickung oft ganz allein auf die Conjunctiva der Hornhaut einschränkt, und das Weiße im Auge ganz unfehlbar ist, in welchem Falle man die Karunkel unmöglich als die Quelle der Krankheit ansehen kann. — Es entstehen wirklich zuweilen Auswüchse aus der Karunkel (encanthis) die aber mit dem Felle auf dem Auge nicht die geringste Aehnlichkeit haben. — Allgemein hält man Augenentzündungen für die gewöhnliche Ursache des Fells auf dem Auge. Aber wie können Entzündungen einen Fleischauswuchs veranlassen? Verdickungen hingegen und Verdunkelungen durchsichtiger feiner Häute hinterlassen sie gewöhnlich. Wie oft bleiben nach heftigen Entzündungen rothe ausgedehnte Blutgefäße im Weißen des Auges zurück. Hinterläßt die Entzündung mehrere solche Gefäße in der Conjunctiva der Hornhaut, so verliert dieselbe ihre Durchsichtigkeit, und so entsteht das Fell, welches

welches man pannus nennt, bey dem nicht der geringste Argwohn eines Auswuchses statt findet. — Aus eben diesen Gründen irren auch diejenigen, die das Fell auf dem Auge für einen Auswuchs aus einem Geschwüre halten. Man siehet bey dem gewöhnlichen Felle auf dem Auge kein Geschwür; und oft siehet man Geschwüre ohne einen so sonderbaren Auswuchs aus demselben zu bemerken.

S. 138.

Die gewöhnlichste Ursach des Fells auf dem Auge ist eine Augenentzündung; sie sey hitzig oder langwierig. Indessen scheint es doch, daß langwierige überhaupt, und besonders venerische, scrophulöse, und diejenigen Augenentzündungen, die nach der Blatternkrankheit erfolgen, dasselbe vorzüglich oft veranlassen. Immer ist in diesem Falle die nächste Ursache des Felles eine inflammatorische Anhäufung und Verdickung der Säfte in der Conjunctiva der Hornhaut. Zuweilen entsteht indessen das Fell ohne alle vorhergehende Entzündung. Es ist in diesem Falle gemeiniglich der Wirkung eines innern Krankheitsstoss auf die Hornhaut, am häufigsten der venerischen, scrophulösen, arthritischen, und Blatternmaterie zuzuschreiben. Dies ist wohl zu bemerken, da in diesem Falle die Heilung des Fells die Mittel erfordert, die dem Krankheitsstoffe, welcher dasselbe erregt, angemessen sind. Eben dieselben Mittel werden auch erfordert, wenn das Fell die Folge einer Entzündung ist, die durch einen solchen specifischen Krankheitsstoff erregt wird.

S. 139.

Die Prognosis ist bey dem Felle auf dem Auge überhaupt immer übel; immer ist es eine Krankheit die überhaupt schwer, selten ganz vollkommen zu heilen ist. Indessen ist doch die Schwierigkeit der Heilung zuweilen grösser, zuweilen geringer. Das Fell, welches von einem specifischen Krankheitsstoffe veranlaßt wird, ist gemeiniglich leichter zu heilen, als dasjenige, welches die Folge einer einfachen Entzündung ist. Ist das Fell dünn und weich, so ist es heilbarer, als wenn es lederartig, flechicht, knorpelartig ist. Je frischer die Krankheit ist, desto mehr Hoffnung hat man, sie zu heilen. Je mehr die Conjunctiva in dieser Krankheit von ihrem natürlichen Zustande entfernt ist, d. i. je dicker und härter sie ist, je mehr sie mit rothen Blutgefäßen durchwebt ist, je weniger der Kranke durch dieselbe Licht und Finsterniß unterscheiden kann, desto wahrscheinlicher ist es, daß nicht blos die Conjunctiva, sondern auch die Hornhaut selbst schadhast ist, und desto geringer ist die Hoffnung der Heilung. Man findet die Hornhaut in solchen Fällen oft widernatürlich dick, undurchsichtig, weich, fleischartig und voll Blutgefäße. — Zuweilen bedeckt das Fell nur einen Theil der Hornhaut, und bleibt zeitlebens unverändert; zuweilen wächst es beständig fort, bis es die ganze Hornhaut bedeckt. Zuweilen wächst es langsam, zuweilen schnell. Zuweilen steht es eine Zeitlang stille, und fängt dann wieder an zu wachsen.

S. 140.

Anhäufung, Stockung, Verdickung der Säfte in sonst durchsichtigen Theilen ist die nächste Ursache des Fells auf dem Auge, so wie auch der undurchsichtigen Flecken der Hornhaut. Dieselben Mittel also, welche gegen diese empfohlen worden sind, erfordert auch jenes; erweichende nämlich, zertheilende, auflösende Mittel. Durch wiederholte Erfahrungen sind folgende vorzüglich empfohlen: eine starke Auflösung von weißem Bitriol, z. E. von einem Scrupel Bitriol in drey bis vier Unzen Wasser; eine schwache Auflösung vom Höllestein, oder vom lapis causticus; die Spießglasbutter; eine starke Auflösung von Salmiak; eine Sublimatauflösung; eine starke Auflösung des lapis divinus; eine schwache Auflösung vom viride aeris; ein Pulver aus gebranntem Alaun, weißem Bitriol und Zucker; eine Salmiakauflösung in Kalkwasser, die eine Zeitlang in einem kupfernen Gefäße gestanden; das Glaspulver; die Zinnfeile u. s. w.

S. 141.

Da das Auge im Falle eines Fells gemeiniglich weniger als gewöhnlich empfindlich ist, müssen alle diese Mittel in starken wirksamen Dosen angewendet, auch so lange man merkt, daß sie das Auge ohne entzündet zu werden, verträgt, allmählig verstärkt werden. Die stark reizenden müssen mittelst eines Pinsels auf die Hornhaut gestrichen, und ehe das Auge sich schließt, mit dem Milchpinsel wieder abgewischt werden. Je dünner und weicher das Fell ist,

ist, und je mehr der Kranke Empfindung von Licht und Schatten hat, desto mehr begründete Hoffnung hat man, durch den fortgesetzten Gebrauch dieser Mittel die Verdunkelung ganz oder größtentheils zu heben. — Entsteht die Krankheit von einer besondern specifiquen Ursache, so muß die Heilung durch Mittel bewirkt werden, die dieser Ursache ganz angemessen sind.

S. 142.

In Fällen, wo diese Mittel nichts helfen, kann man oft durch eine chirurgische Operation noch Hülfe schaffen. Man hat wirklich die verdunkelte Conjunctiva von der Hornhaut abgesondert, und dadurch das Gesicht wieder hergestellt. Wenn die ganze Conjunctiva der Hornhaut verdunkelt, und lederartig, schnicht, cartilagos ist, so ist diese Operation das einzige Mittel, von dem sich etwas erwarten läßt. Indessen findet die Hoffnung eines guten Erfolgs dennoch nur dann statt, wenn die Conjunctiva beweglich ist, und sich auf der Hornhaut mehr oder weniger hin und her schieben läßt; und wenn die Hornhaut unter der Conjunctiva, nicht so starken Antheil an der Krankheit ihrer natürlichen Decke genommen hat, nicht so sehr verdickt, verdunkelt, verhärtet, erweicht ist, daß man hoffen kann, sie nach der Operation zu ihrer vorigen natürlichen Beschaffenheit wieder herzustellen. — Ob die Conjunctiva beweglich ist, oder nicht, unterscheidet man leicht mit der Spitze einer Sonde, oder des Fingers. Je beweglicher sie ist, desto leichter

R 2

ist

ist die Operation; je unbeweglicher sie ist, desto weniger findet die Hoffnung eines guten Erfolgs statt. Die Beschaffenheit der Hornhaut kann man vor der Operation schwerlich mit Gewißheit bestimmen; und immer muß man daher die Operation unter einer zweifelhaften Prognosis unternehmen. Je deutlicher der Kranke durchs Fell Licht und Finsterniß unterscheidet, desto mehr kann man hoffen, daß die Hornhaut wenig verändert ist.

S. 143.

Am besten verrichtet man die Operation auf folgende Art. Mit einer feinen Pinzette hebt man die Conjunctiva, da wo sie am beweglichsten ist, in eine kleine Falte in die Höhe, die man mit einem feinen Scalpel abschneidet. Findet man an dieser entblößten Stelle die Hornhaut wenig schadhast, und empfindet der Kranke durch dieselbe Licht oder andre Gegenstände, so ist man berechtigt in der Operation fortzufahren, und die ganze Conjunctiva allmählig und behutsam, und dergestalt abzusondern, daß man die Hornhaut dabey so wenig als möglich verlegt. Am gewishesten erreicht man diesen Endzweck, wenn man die Conjunctiva mittelst der Pinzette an der Stelle, wo man sie absondert, von der Hornhaut abziehet. Findet man Stellen, die sehr fest an der Hornhaut ansitzen, so thut man am besten, wenn man dieselben nicht absondert, sondern sitzen läßt. Man kann sie nicht wohl absondern, ohne die Hornhaut zu verletzen, und die Erfahrung zeigt, daß sich diese

diese Ueberbleibsel der Conjunctiva in der Folge oft von sich selbst allmählig absondern. Gemeiniglich ist diese Operation mit einer geringern oder stärkern Blutung verbunden. Man thut wohl, wenn man dieselbe nicht hemmt. Ein Liniment aus dreßßig Gran weißem Vitriol mit einem Eyweiß zu Schaum geschlagen, mittelst eines kleinen Pinsels des Tages einigemal auf die Hornhaut gestrichen, trocknet die superficielle Exterung der Hornhaut, die gemeiniglich nach der Operation erfolgt, gemeiniglich in wenig Tagen, und stellt bey fortgesetztem Gebrauche die Durchsichtigkeit der Hornhaut wieder her.

S. 144.

Sist das Fell so fest auf der Hornhaut, daß man die Absonderung desselben von der Hornhaut nicht mit der Hoffnung eines guten Erfolgs unternehmen kann, so findet manchmal eine andre Operationsart statt, die zuweilen den allervollkommensten Erfolg gehabt hat. Man sondert nämlich durch einen Zirkelschnitt der am äußern Rande der Hornhaut die ganze Hornhaut umgiebt, die Conjunctiva der Hornhaut, von der Conjunctiva, die das Weiße des Auges bedeckt, ab. Dieser Zirkelschnitt muß nahe am Rande, aber an der äußern Seite desselben, im Weißen des Auges geschehen. Am bequemsten geschieht er mit einer feinen Scheere. Die erste Deffnung in die Conjunctiva macht man, indem man sie an irgend einer Stelle mit einer Pinzette in eine Falte aufhebt, und die Falte durchschneidet.

Sehr oft geschiehet es, daß nach dieser Operation die verdunkelte Conjunctiva der Hornhaut zusammenschumpft, und sich in einen Klumpen zusammenziehet, der von der Hornhaut leicht vollends abgenommen werden kann. (Mcrells chirurgische Vorfälle.)

S. 145.

Man hat sogar gesehen, (Bell) daß das Fell auf gleiche Art zusammengeschrumpft ist, nachdem man bloß die Blutgefäße, die zuweilen von verschiedenen Seiten her aus dem Weißen des Auges in dasselbe laufen, sämtlich abgeschnitten hat. Es kommt dabey darauf an, daß man die Gefäße ganz durchschneidet, und dennoch die Sclerotica nicht verlegt. Zuweilen muß die Operation wiederholt werden. Zuweilen indessen fruchtet sie nichts. — In dem Falle, wo keine von den bisher angezeigten Operationsarten statt findet, oder etwas fruchtet, kann man allenfalls so wie bey dem Leucom eine Fontanelle auf das Fell legen, und dadurch zuweilen vielleicht einigen Nutzen schaffen. — Wenn das Fell die ganze Hornhaut bedeckt, dick, roth und schmerzhaft ist, und bössartig zu werden drohet, muß das Auge ausgerottet werden.

S. 146.

Zuweilen bedeckt das Fell nur einen kleinen Theil der Hornhaut nahe am Rande im innern oder äußern Augenwinkel. Wiederholte Erfahrungen zengen, daß diese Verdunkelung unverändert bleibt,
und

und nicht weiter zunimmt, wann man die Con-
 junctiva, so weit sich die Verdunkelung derselben
 auf der Hornhaut erstreckt, im Weißen des Auges
 nahe am Rande der Hornhaut durchschneidet. Nur
 muß man wohl darauf sehen, daß der Schnitt ganz
 durch die Conjunctiva bis auf die Sclerotica dringt.
 Zuweilen muß auch diese kleine Operation wieder-
 holt werden. — Die kleine Falte, in die sich die
 verdickte und angeschwollne Conjunctiva zuweilen
 nahe am Rande der Hornhaut legt, kann man
 dreust mit der Scheere abschneiden, wenn sie sich
 bey dem Gebrauche der vorher empfohlenen zusam-
 menziehenden und zertheilenden Mittel nicht bald
 verlihet. — Die Verdickung und Erschlaffung der
 Conjunctiva im Weißen des Auges (S. 134) ver-
 ursacht zwar keine Unbequemlichkeit, und erregt
 daher selten Aufmerksamkeit; indessen ist es doch
 immer rathsam auch gegen diese die oben empfohlen
 zertheilenden und zusammenziehenden Mittel zu ge-
 brauchen, da man immer befürchten muß, daß sie
 sich nach und nach bis auf die Hornhaut ausbreitet.

S. 147.

Zuweilen bemerkt man im Weißen des Auges
 einen Flecken, der ein wenig erhaben, weich anzu-
 fühlen, gemeiniglich schmutzig gelb von Farbe, selten
 größer als eine kleine Linse, zuweilen nur so groß als
 ein Stecknadelknopf, nur nicht so dick ist. Man sagt,
 daß sich dieser Fleck zuweilen in eine Haut ausbreitet,
 die allmählig die Hornhaut bedeckt, und die man,

vermuthlich wegen der Aehnlichkeit, die sie in Absicht ihrer Farbe und Consistenz mit dem Fette hat, das Fettfell, *pterygium pingue* nennt. Ganz zuverlässig ist auch dieses Fell kein widernatürlicher Auswuchs, sondern eine Anschwellung und Erschlaffung der *Conjunctiva*, die dieselben Mittel erfordert, als die vorhergehende Gattung des Fells. Da in dessen Erschlaffung in diesem Falle den vorzüglichsten Antheil an der Krankheit zu haben scheint, ist wohl das meiste von reizenden zusammenziehenden Mitteln zu erwarten.



Das sechste Kapitel.
 Von dem Staphylom.

S. 148.

Bey heftigen Augenentzündungen schwillt zuweilen die durchsichtige Hornhaut widernatürlich auf. Sie ist gemeiniglich zugleich undurchsichtig, weiß, und so weich wie Speck. Es ist kaum zu zweifeln, daß die nächste Ursach dieser Veränderung in einer Anhäufung, Stockung und Verdickung der Säfte zu suchen sey. Dringt die Geschwulst der Hornhaut einwärts, so vermindert, ja verschließt sie ganz die vordere Augenkammer, und berührt die Regenbogenhaut. Dringt sie auswärts, so ragt die Hornhaut gleich einem spitzigen Kege! zwischen den Augenlidern hervor, und erregt nicht allein eine völlige Blindheit, sondern auch eine auffallende Ungestaltheit. Zuweilen verliehrt sich diese Anschwellung und Verdunkelung der Hornhaut mit der Entzündung gänzlich, und diese Haut erhält ihre vorige Gestalt und Durchsichtigkeit vollkommen wieder. Drang die Anschwellung so stark einwärts, daß sie die Regenbogenhaut berührte, so bleibt zeitlebens eine widernatürliche Vereinerung der Hornhaut und Regenbogenhaut, die sich während der inflammatorischen Anschwellung, und wechselseitigen Berührung dieser zwey Häute erzeugte, (Synechia) zurück. Zuweilen

bleiben einzelne verdunkelte Flecken der Hornhaut zurück. Zuweilen verliert sich bloß die Anschwellung nicht aber die Verdunkelung der Hornhaut, und der Kranke behält ein Leukom. Zuweilen bleibt auch die Geschwulst der Hornhaut zurück, und der Kranke behält ein Staphylom. Man nennt es in diesem Falle Staphyloma totale, weil die Geschwulst die ganze Hornhaut einnimmt.

S. 149.

Aus dem eben gesagten erhellet, daß Verdickung, Anschwellung und Verdunkelung der Hornhaut die nächste Ursach des Staphyloms ist, und daß zwischen dem Leukom und diesem Staphylom kein Unterschied ist, den ausgenommen, daß bey jenem die Hornhaut bloß verdunkelt, bey diesem aber zugleich verdickt ist; daß folglich bey diesem die Anhäufung und Stockung der Säfte in der Hornhaut beträchtlicher, und die Kur schwerer und zweifelhafter ist. Die gewöhnliche Meynung, daß dieses Staphylom zunächst bloß von einer widernatürlichen Erweiterung der vordern Augenkammer, und Ausdehnung der Hornhaut herrühre, ist wo nicht immer, doch zuverlässig in den meisten Fällen ungegründet. Wenn man ein solches Staphylom spaltet, fließt jederzeit sehr wenig Wasser aus der vordern Augenkammer; und wenn es ausgeflossen ist, senkt sich die Hornhaut wenig, ja gar nicht. Zuweilen findet man bey sehr großen Staphylomen gar keine vordere Augenkammer, und die Regenbogenhaut mit der Hornhaut verwachsen. Gemeinlich

niglich findet man im Staphylom viele ausgedehnte Gefäße; ein Schnitt ins Staphylom giebt Blut, und zeigt deutlich, daß die Hornhaut widernatürlich dick und hart ist. Auch läßt sich nicht wohl einsehen, wie Entzündung, die gewöhnliche Ursache dieses Staphyloms, eine widernatürliche Ausdehnung der Hornhaut, und Erweiterung der vordern Augenkammer veranlassen könnte. Verdickungen und Verhärtungen der Häute hinterläßt sie gemeiniglich.

S. 150.

Man hat, wie man sagt, (Burgmann, Epitola ad Heisterum; in Haller. Diss. chir. Tom. I. p. 253) Staphylome dieser Art von ungewöhnlicher Größe, Staphylome, die einen Zoll lang und drüber, zwischen den Augenlidern hervorrugten, beobachtet. Es ist freylich kaum glaublich, daß sich die Hornhaut so sehr verdicken kann; und daher wahrscheinlich, daß in solchen Fällen widernatürliche Ausdehnung wohl die nächste Ursach der Krankheit war. Indessen ist dennoch zu vermuthen, daß selbst in solchen Fällen die Hornhaut unmöglich so sehr ausgedehnt werden könnte, ohne zu bersten, wenn sie nicht zugleich Zeit verdickt wäre. Uebrigens sind so ungewöhnlich große Staphylome selten. — Auch bey dem Staphylom von gewöhnlicher Größe ist widernatürliche Ausdehnung, aber diese ist nicht die nächste Ursach der Krankheit, sie ist bloß die Folge der Anschwellung, und nicht stärkende, zusammenziehende, sondern zertheilende Mittel sind die wahren Kurmittel. — Endlich giebt es wirklich Fälle, wo bloß die

die vordere Augenkammer widernatürlich erweitert, und die Hornhaut ausgedehnt, und ganz und gar nicht verdickt ist, aber dieser Fall hat mehr Aehnlichkeit mit der Augenwassersucht, als mit dem Staphylom.

S. 151.

Das bisher beschriebene sogenannte Staphyloma totale corneae verursacht außer einer großen Unge-
stalttheit mancherley Beschwerden. Immer ist die
Hornhaut zu gleicher Zeit undurchsichtig, immer ist
daher der Kranke des Gesichts mehr oder weniger
beraubt. Zwar sagt man, daß das Staphylom
zuweilen durchsichtig sey; indessen scheint dies doch
ein sehr seltner Fall zu seyn. Anfänglich ist das
Staphylom weich, allmählig wird es härter, zuletzt
wird es pergamentartig, ja zuweilen knorpelartig.
Man hat gesehen, (Chir. Bibl. Band 8, S. 76)
daß die Hornhaut einem knorpelartigen Auswuchse
gleich. — Zuweilen wächst das Staphylom eine
zeitlang, und dann steht es still; zuweilen fährt es
immer fort, größer zu werden. — Immer drückt
die konische zwischen den Augenlidern hervorstehende
Hornhaut das untere Augenlid nieder, und verur-
sacht ein Ectropium. Natürlicherweise können bey die-
ser widernatürlichen Lage des Augenlides die Thränen
nicht durch die Thränenpunkte in die Nase eingesaugt
werden, und der Kranke hat folglich ein beständiges
Thränen des Auges. — Da das Staphylom zwi-
schen den Augenlidern hervorsticht, und wenn es groß
ist, durch die Augenlider nicht wohl bedeckt werden
kann,

kann, reibt es sich, bey allen Bewegungen des Auges gegen die Haare auf den Rändern der Augenlider, und die äußere Haut des untern Augenlides. Die Folgen davon sind Schmerzen, Entzündungen, Geschwüre, die zuletzt oft sehr bössartig werden, und die Ausrottung des Auges erfordern.

S. 152.

Außer der bisher beschriebenen allgemeinen Anschwellung der ganzen Hornhaut beobachtet man zuweilen auch einzelne Geschwülste an derselben, die nicht die ganze Hornhaut einnehmen, sondern nur an einer Stelle derselben befindlich, und von verschiedner Größe; zuweilen so groß als der Kopf einer größern Stecknadel, zuweilen drey und mehrmal größer sind. Auch diese Geschwülste, die man *staphylomata partialia* nennt, hält man für widernatürliche Ausdehnungen einzelner Stellen der Hornhaut, und folglich für kleine Beutel, die mit der vordern Augenkammer Gemeinschaft haben. Man sagt, daß sie zuweilen durchsichtig, zuweilen undurchsichtig, zuweilen einfach sind, zuweilen aus mehrern Knoten bestehen. Im letztern Falle sollen sie einer kleinen Weintraube gleichen; eine Aehnlichkeit, die vermuthlich zu dem Namen *staphyloma*, Traubengeschwulst, Gelegenheit gegeben hat. Gemeiniglich sollen diese Beutel ein wenig von der wässerichten Feuchtigkeit enthalten; zuweilen soll sogar ein Theil der Regenbogenhaut darinnen liegen. Gemeiniglich soll eine Wunde oder ein Geschwür, das bloß die äußern Blätter der Hornhaut durchdringt, und dadurch

ver-

veranlaßt, daß die innern Blätter dem Drucke der Feuchtigkeiten des Auges nachgeben, und sich in einen kleinen Beutel ausdehnen lassen, Gelegenheit dazu geben.

S. 153.

Dies alles mag sich vielleicht zuweilen wirklich so verhalten, wenigstens versichern neuere Beobachter (Pellier) dergleichen Beutel an der Hornhaut beobachtet zu haben; in den meisten Fällen aber verhält sich nicht also. In den meisten Fällen findet man, daß diese Knoten nicht hohle Beutel sind, sondern vielmehr einem hornartigen oder warzartigen Auswuchse aus der Hornhaut gleichen. Zuweilen wachsen sie, nachdem sie abgeschnitten sind, von neuem wieder. Oft bemerkt man diese Knoten in Fällen, wo keine Spuhr von einem vorhergehenden Geschwür, oder einer Wunde zu entdecken ist, und sehr oft siehet man Geschwüre auf der Hornhaut, ohne daß dies Staphylom erfolgt. Uebrigens wird es in jedem besondern Falle gemeiniglich leicht zu unterscheiden seyn, ob ein solches staphyloma partiale hohl ist, oder nicht, weil es sich im ersten Falle immer zusammendrücken läßt, im letztern nicht. — Diese staphylomata partialia sind übrigens überhaupt weit seltner, als das zuerst beschriebene staphyloma totale.

S. 154.

Man spricht in Büchern auch von einem staphyloma scleroticae; und versichert, daß es eine um-

umgränzte Geschwulst im Weißen des Auges, im innern oder äußern Augenwinkel sey, die von einer widernatürlichen Ausdehnung der Häute des Auges daselbst entsteht, und von der Größe eines größern oder kleinern Stecknadelknopfs ist. Es gibt wirklich dergleichen umgränzte Geschwülste im Weißen des Auges. Sie sind gemeiniglich dunkel, ja ganz schwarz von Farbe, und schmerzhaft. Gemeiniglich fühlen sie sich ganz weich an. Es sind derselben oft drey und mehrere nahe beysammen. Zuweilen bleiben sie lange in diesem Zustande unverändert. Ein paarmal hat man gesehen, daß Kranke, die dergleichen Knoten eine geraume Zeit gehabt hatten, allmählig das Gesicht verlohren, und ein krebshaftes Auge bekamen, welches ausgerottet werden mußte. Diese Umstände zusammen betrachtet, läßt sich mit Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß diese eben beschriebenen schwarzen Knoten wohl nicht zum Staphylom zu rechnen sind, und wohl nicht von einer Ausdehnung der Häute, sondern von einem weit wichtigern Fehler im Augapfel herrühren. Indessen läßt sich nicht leugnen, daß wohl zuweilen umgränzte Ausdehnungen im Weißen des Auges, entstehen mögen, jedoch scheint es, daß sie ein sehr seltner Zufall sind.

§. 155.

Auch diese Gattungen des Staphyloms erregen eine Ungestaltheit, hindern das Gesicht mehr oder weniger, verursachen bey den Bewegungen des Auges ein unangenehmes Reiben gegen die Augenlider, entzünd-

entzündet, ja ulceriren sich u. s. w. — Die häufigste Ursach der Staphylome überhaupt sind Augenentzündungen vorzüglich solche, die durch den Absatz irgend einer specifischen, z. B. der venerischen, arthritischen, scrophulösen, vorzüglich aber der Blatternmaterie erregt werden. Indessen auch Entzündungen, die von örtlichen äußern Ursachen entstehen, hinterlassen gar oft ein Staphylom. Ein Schlag aufs Auge veranlaßt es oft. — Die Heilung des Staphyloms ist jederzeit sehr schwer und zweifelhaft. Auch wenn sie am besten gelingt, erhält dennoch die Hornhaut ihre vödlige vorige gesunde Beschaffenheit selten wieder. Je kleiner, frischer, und weicher die Anschwellung ist, desto mehr Hoffnung hat der Wundarzt, daß die Heilung gelingt. Große, alte, harte Staphylome sind unheilbar. Das Staphylom, welches von einem specifischen Krankheitsstoff veranlaßt worden ist, ist überhaupt leichter zu heilen, als dasjenige, welches bloß von einer örtlichen Ursache herrührt. Das Staphylom der erstern Art erfordert den Gebrauch derjenigen Mittel, die gegen die specifische Natur der Materie, wodurch es veranlaßt worden ist, wirken. Wenn diese Mittel nach hinlänglichem Gebrauche keine Wirkung aufs Staphylom äußern, oder auch wenn das Staphylom bloß von einer örtlichen Ursache herrührt, so kann der Wundarzt die Mittel versuchen, die überhaupt gegen das Staphylom empfohlen werden. — Die vorzüglichsten derselben sind folgende.

S. 156.

Äußerliche stärkende, zusammenziehende Mittel. Der äußerliche Gebrauch des kalten Wassers ist oft von großem Nutzen gewesen. Eine starke Auflösung von Vitriol, oder Alaun; eine schwache Auflösung von Höllenstein; ein Pulver von gebranntem Alaun und Zucker, und andre ähnliche Mittel, hat man zuweilen mit einem sehr guten Erfolge angewendet. Alle diese Mittel dürfen aber nicht als Augenbad gebraucht, oder ins Auge getropft werden; sie müssen, wenn sie wirksam seyn sollen mit einem Pinsel des Tages öfters aufs Staphylom selbst gestrichen werden. Das Staphylom verträgt gemeinlich starke Mittel ohne Schmerz und Entzündung; immer müssen daher diese Mittel allmählig verstärkt, und überhaupt immer so stark und oft gebraucht werden, als es ohne Entzündung geschehen kann. Uebrigens kann man von diesen Mitteln nur bey kleinen, weichen und frischen Staphylomen etwas erwarten; bey alten und harten vermögen sie nichts.

S. 157.

Die Kompression; ein altes verwerfliches Mittel. Man bewerkstelligt sie entweder mittelst eines besondern Instruments, (Plattners Einleitung in die Chirurgie, Tab. VI. Fig. XIII.) dessen Druck mittelst einer Schraube auf den nöthigen Grad gemindert oder vermehrt werden kann; oder nach der Woolhousischen Methode (Emboitement) mittelst eines hohlen Tellerchens, das unter die Augenlider geschoben, und durch die Wirkung der Augenlicht. Wundarzneyk. III. B. L genli-

genlider auf den Augapfel angedrückt wird. (Mauchhart Diff. de staphylomate, in Haller. Diff. chir. Tom. I. p. 350.) Die einstimmige Erfahrung aller neuern Wundärzte verwirft diese Kurmethode: sie verursacht jederzeit sogleich Schmerzen und Entzündung, und bey fortgesetztem Gebrauche den gänzlichen Verlust des Auges; mehrerer Mängel und Fehler derselben nicht zu gedenken. Auch sieht man leicht, daß diese Kurart sich bloß auf die Meinung von einer widernatürlichen Ausdehnung der Hornhaut gründet, welche die einzige Ursach des Staphyloms selten, ja nie ist.

S. 158.

Der Schnitt wird nach Verschiedenheit des Staphyloms auf verschiedene Art gemacht. Einige (Heuermann) rathen das staphyloma totale der Länge nach zu spalten, und die wässerichte Feuchtigkeit außfließen zu lassen; durch diese Ausleerung, sagt man, bekommt die Hornhaut Zeit und Gelegenheit, sich zusammen zu ziehen; und die darauf erfolgende Narbe giebt ihr so viel Festigkeit, daß sie sich nicht wieder von neuem ausdehnen läßt. Aber in den meisten Fällen geschiehet keines von beyden. Man hat dies Staphylom zu wiederholten malen durchschnitten, und gesehen, daß es immer wieder von neuem erschien, so bald sich die Wunde geschlossen hatte. Auch läßt sich von dieser Operation nicht wohl etwas erwarten. Der Schnitt in der Hornhaut schließt sich gemeiniglich so gleich wieder, und hinterläßt keine merkliche Narbe, und die Augenfam-

genkammern füllen sich sogleich wieder an. Könnte man den Schnitt in Entering sehen, so ließe sich vielleicht hoffen, daß durch die Entering die stockenden verdickten Feuchtigkeiten in der Hornhaut in Bewegung gesetzt, und ausgeleeret werden möchten; könnte man die Augenkammern eine zeitlang beständig in einem Zustande der Ausleerung erhalten, so ließe sich vielleicht hoffen, daß alles was widernatürlich ausgedehnt ist, sich in seine natürliche Gestalt und Größe wieder zusammen ziehen möchte. Das erste ist nicht wohl möglich, auch nicht rathsam, ja so gar unnöthig, da die Fontanelle auf der Hornhaut, die nachher als ein wirksames Mittel empfohlen werden wird, dieselbe Absicht auf eine weit bequemere und sicherere Art bewirkt. Das zweyte hat man wirklich einmal gethan, und mit einem sehr gutem Erfolge. Man (Möhrenheims Beobachtungen, zweyter Band) schnitt zur Seite des Staphyloms ein kleines Stück aus der Hornhaut, die wässerichte Feuchtigkeit floß einige Tage nach einander beständig aus, und als sich endlich die Wunde schloß, und die Augenkammern sich wieder füllten, wurde das Staphylom nicht wieder so groß, als es vorher war. — Wiederholte Erfahrungen müssen zeigen, ob auf diese Art auch in andern ähnlichen Fällen etwas ausgerichtet ist. — Wenn man ein frisches Staphylom, zumal das, welches nach den Blattern entsteht, durchschneidet, fließt zuweilen eine Feuchtigkeit aus, und das Staphylom mindert sich. Dies geschieht aber nur so lange es sich weich anfühlt. — Verdient dieser Fall vielleicht mehr den Namen eines Abscesses?

§. 159.

Bey dem *staphyloma parziale* findet der Gebrauch des Messers auch nach Verschiedenheit des Falls auf verschiedene Art statt. Die massiven Knoten auf der Hornhaut, die einer Excrescenz gleichen, kann man, zumal wenn sie auf einem dünnen Stiel sitzen, mit der Scheere oder dem Scalpel abschneiden. Sitzen sie mit einer breiten Grundfläche auf, so ist der Gebrauch des Messers mit Schwierigkeiten verbunden. Zuweilen wachsen sie, nachdem sie abgeschnitten sind, von neuem wieder, und dann muß man sie abermals abschneiden, und die Stelle, wo sie gesessen haben mit Höllenstein berühren. Dadurch verhütet man, daß sie nicht abermals von neuem entstehen. Zuweilen aber wachsen sie, so oft man sie auch abschneidet, und was man auch, ihre neue Entstehung zu verhüten, unternimmt, immer wieder von neuem, und werden, da sie anfänglich schmaal waren, immer breiter und breiter; und da sie anfänglich hornartig waren, zuletzt schwammicht, fleischicht, schmerzhaft, bödsartig, dergestalt, daß zuletzt die Ausrottung des ganzen Augapfels nothwendig wird; ein Fall, von dem im Kapitel vom Krebse am Auge mehr gesagt werden wird.

§. 160.

Auch die hohlen *staphylomata partialia* kann man abschneiden, wenn sie auf einem dünnen Fuße sitzen. Man hat dies in Fällen, wo sie die Größe einer Erbse hatten, mit gutem Erfolge (Pellier) gethan. Die Oeffnung in der Hornhaut schloß sich bald

bald nach der Operation. Die Unterbindung, welche einige dem Messer vorziehen, wirkt langsam, erregt jederzeit eine Art von Entzündung, und gemeinlich eine Verdunkelung der Hornhaut von einem nicht unbeträchtlichen Umfange. Sitzt das Staphylom auf einem breitem Stiele, so ist zu fürchten, daß die Deffnung in der Hornhaut, die in diesem Falle immer größer ist, sich nach Abschneidung des Staphyloms entweder gar nicht, oder sehr langsam schließt, und daß während der langen Ausleerung der vordern Augenkammern, und der gegenseitigen Berührung der Hornhaut, Regenbogenhaut und Kapsel der Krystallinse, eine widernatürliche Anklebung dieser Theile an einander, und eine allgemeine Zusammenschrumpfung des Augapfels erfolgt, die nachher schwer zu heben ist. Am besten thut man daher in diesem Falle, wenn man um den hohlen Fuß des Staphyloms eine Ligatur legt, und dieselbe nur so fest zuzieht, daß sie die Höhle des Fußes bloß schließt, nicht aber eine Entzündung erregt. Man vermindert oder schließt dadurch die Deffnung in der Hornhaut, und kann nach einigen Tagen das Staphylom abschneiden, ohne die eben angezeigten Folgen einer langsamen Heilung der Wunde zu fürchten. Sitzt das Staphylom mit einer sehr breiten Grundfläche auf der Hornhaut, so darf es auf keine Art und Weise abgeschnitten werden; die Folge einer solchen Operation würde eine sehr große Deffnung in der Hornhaut seyn, die sich sehr spät, ja nie schließen, und folglich den Verlust des Auges nach sich ziehen würde.

S. 161.

Die Fontanelle an der Haut, die bereits (S. 132) gegen das Leukom empfohlen worden ist, ist auch gegen das Staphylom (Günz Diff. de staphylomate) mit Nutzen angewendet worden. — Das wirksamste und zuverlässigste unter allen bisher genannten Mitteln, ist die neuerlich (Janin) empfohlne Spießglasbutter; ein Mittel, das auch in den hoffnungslosesten Fällen nicht selten unerwartete Wirkung leistet. Freylich giebt es Fälle, wo es nichts leistet; da man aber diese Fälle nicht zum Voraus sehen kann, verdient es jederzeit versucht zu werden. — Man sehe sich wohl vor, daß sich während der Anwendung des Mittels die Augenlider nicht etwa schließen, wodurch heftige Schmerzen veranlaßt werden würden. Immer ist es daher rathsam, daß obere Augenlid nicht mittelst des Fingers, sondern mittelst des stumpfen Haakens aufzuziehen. Das Mittel selbst applicirt man mittelst eines feinen Mahlerpinsels, den man in die Spießglasbutter taucht, und an das Staphylom gelinde andrückt. Alles kommt hiebey darauf an, daß der Pinsel feucht genug, und nicht zu feucht ist. Ist er zu feucht, so fließt von der kaustischen Feuchtigkeit gar bald etwas über die Hornhaut herunter, und erregt, so bald es das Weiße im Auge erreicht, fürchterliche Schmerzen, wenn der Wundarzt es nicht aufs eiligste mit dem Milchpinsel abwischt. Ist der Pinsel nur wenig befeuchtet, so kann man wenig Wirkung erwarten. Hat der Pinsel den gehörigen Grad von Feuchtigkeit, so kann man ihn ziemlich lange auf
der

der Hornhaut liegen lassen, ehe der Kranke von der herabfließenden Feuchtigkeit Schmerzen empfindet.

§. 162.

Sobald der Kranke anfängt heftigere Schmerzen zu empfinden, ist es Zeit, den Pinsel abzunehmen, und das Auge mittelst eines größern zu wiederholten malen in Milch getauchten Pinsels von allen scharfen anklebenden Theilen zu reinigen. Je sorgfältiger man bey dieser Operation verfährt, desto weniger Entzündung erfolgt darauf. Zuweilen erfolgt nicht die geringste Entzündung. Man wiederholt die Anwendung dieses Mittels so lange man Besserung bemerkt, und das Staphylom noch nicht ganz weg ist. Aber nicht eher findet die Wiederholung statt, als bis die von der vorhergehenden Anwendung erregte Entzündung sich gänzlich verlohren hat. Zuweilen muß das Mittel öfters wiederholt werden, ehe die Krankheit ganz weicht; zuweilen weicht sie, auch wenn das Staphylom sehr groß ist, nach einer zweymaligen Anwendung gänzlich. Wenn es nach einer dreyimaligen Anwendung noch nicht die geringste Wirkung äußert, kann man glauben, daß es in diesem Falle nichts fruchtet, und von der fernern Anwendung desselben absehen. Zuweilen erfolgt die Wirkung nach jedesmaliger Anwendung spät; oft erst den dritten, vierten, fünften Tag, nachdem man die ersten zwey Tage nicht den geringsten Schein einer Besserung bemerkt hat.

§. 163.

Man hat dies Mittel bey allen Gattungen des Staphyloms, bey dem totale sowohl als bey dem partiale,

und bey dem letztern sowohl in dem Falle, wo es hohl ist, als wo es nicht hohl ist, mit gutem Erfolge gebraucht. Seine gewöhnliche Wirkung besteht darinnen, daß es die Geschwulst wegnimmt. So bald diese weg ist, muß der Wundarzt die Durchsichtigkeit der Hornhaut durch die Mittel wieder herzustellen suchen, die gegen das Leukom empfohlen worden sind. Jedoch bemerkt man zuweilen, daß die Spießglasbutter auch die Verdunkelung mindert, und die Durchsichtigkeit der Hornhaut an einigen Orten wieder herstellt. — Man hat gesehen, daß das Staphylom, nachdem es durch die Spießglasbutter gehoben worden war, einige Zeit nachher von freyen Stücken wieder entstanden ist. Der Gebrauch der Spießglasbutter muß in diesem Falle wiederholt werden.

§. 164.

Wenn das Staphylom sehr groß ist, keinem der bisher angezeigten Mittel weicht, eine große Ungestalttheit, und mancherley andere Beschwerden erregt, wenn es sich öfters entzündet und schmerzhaft wird, wenn es sich exulcerirt, und ein bößartiges Ansehen bekommt, so thut man am besten, wenn man die Hornhaut kreuzweis durchschneidet, die Feuchtigkeiten des Auges ausleert, und ein künstliches Auge einsetzt. Da das Auge in solchen Fällen auf keine Art und Weise wieder hergestellt werden kann, findet diese Operation, welche alle Beschwerden hebt, kein Bedenken.

Das siebente Kapitel.

Von dem grauen Staare.

§. 165.

Eine undurchsichtige Verdunkelung nahe hinter der Pupille mit einer Verminderung oder dem gänzlichen Verluste des Gesichtes zeigt den grauen Staar an. Der Sitz dieser Verdunkelung ist, wenige Fälle ausgenommen, die Krystalllinse und ihre Kapsel. Meistentheils entsteht diese Verdunkelung allmählig, und vermehrt sich nach und nach. Zuweilen erscheint sie plötzlich in einem hohen Grade. Die erste Wirkung der anfangenden Verdunkelung, ist ein Nebel vor den Augen, der alle Gegenstände umgiebt, und indem er allmählig dicker wird, sie zuletzt ganz verbirgt. In eben dem Grade, in welchem der Nebel vor den Augen zunimmt, nimmt auch die undurchsichtige Verdunkelung hinter der Pupille zu. Da die Krystalllinse in ihrer Mitte dick, in ihrem Umfange am Rande dünn ist, erscheint äußerlich die Verdunkelung in der Mitte der Pupille immer am ersten und stärksten; der dünnere und folglich weniger undurchsichtige Rand der Krystalllinse zeigt sich äußerlich wie ein schwarzer Ring, der hinter dem Rande der Pupille, den mehr oder weniger bleichen Kern der Krystalllinse umgiebt. Durch diesen dünnern Rand der Krystalllinse dringen, auch wenn die

Linse völliig verdunkelt ist, noch immer einige Lichtstrahlen ins Auge; der Kranke unterscheidet daher, auch bey dem vollkommensten grauen Staare immer Licht und Dunkelheit. Aus diesem läßt es sich leicht erklären, warum Kranke, die einen anfangenden grauen Staar haben, Gegenstände die gerade vor ihnen stehen, am wenigsten, diejenigen hingegen die seitwärts befindlich sind, weit deutlicher erkennen. Von jenem fallen die Lichtstrahlen auf den Mittelpunkt, den dicksten und undurchsichtigsten Theil der Krystalllinse; von diesen fallen sie auf den dünneren durchsichtigern Rand der Linse. — Eben daher kommt es auch, daß Kranke dieser Art an einem etwas dunkeln Orte deutlicher sehen, als an einem hellern; wenn sich die Pupille an einem dunkeln Orte erweitert, fallen mehrere Lichtstrahlen auf den dünneren Umfang der Krystalllinse. — Convexe Brillengläser sind diesen Kranken eine Zeitlang von einigem Nutzen; sie machen die im Nebel befindlichen Gegenstände sichtbarer und deutlicher; indem sie sie vergrößern. — Seltner geschiehet es, daß Kranken, die einen anfangenden grauen Staar haben, zu Muthe ist, als wenn sie durch Horn sähen. Diese bemerken keinen Nebel vor den Augen. Die Krankheit der Krystalllinse hat übrigens keine Wirkung auf die Regenbogenhaut; die Pupille erweitert und verengert sich wie gewöhnlich.

S. 166.

Neblichte Verdunkelungen in der Mitte der Hornhaut, scheinen, wenn man das Auge von vornen her

her betrachtet, hinter der Pupille zu seyn, und verleiten den Wundarzt leicht zu dem Irrthum, die Krankheit für einen anfangenden grauen Staar zu halten. Man vermeidet oder entdeckt diesen Irrthum leicht, wenn man das Auge von der Seite her betrachtet. — Bey Kranken, die einen anfangenden oder vollendeten schwarzen Staar haben, ist, wie im Kapitel vom schwarzen Staare weitläuftiger erörtert werden wird, die Pupille zuweilen so bleich und nebligt, daß ein unachtsamer Wundarzt wirklich in den Irrthum gerathen kann, die Krankheit für einen anfangenden grauen Staar zu halten. Bey genauerer Untersuchung aber wird man bald finden, daß diese bleiche Farbe weit hinter der Pupille ist, und folglich ihren Sitz nicht in der Krystallinse haben kann; und daß sie sich nicht gleichmäßig mit der Schwäche des Gesichts verhält; denn gemeinlich sind diese Kranken ganz oder beynah blind, und die bleiche Farbe gleicht nur einem dünnen Nebel.

Verschiedene Gattungen des grauen Staars.

S. 167.

Der Sitz der Verdunkelung, die man den grauen Staar nennt, ist verschieden. Nach der Verschiedenheit desselben theilt man den grauen Staar in verschiedne Gattungen ein. Es ist nämlich zuweilen die Krystallinse allein verdunkelt; die häufigste und beste Gattung des grauen Staars, die man den Krystallstaar nennt; oder die Kapsel der Krystallinse

stallinse ist allein verdunkelt, (cataracta membranacea, der häutige Staar). Zuweilen ist bloß die vordere Haut der Kapsel, (cataracta membranacea anterior) zuweilen bloß die hintere Haut der Kapsel (cataracta membranacea posterior) zuweilen ist die ganze Kapsel verdunkelt. Zuweilen ist die Kapsel samt der Krystallinse verdunkelt (cataracta mixta). Zuweilen häuft sich die Feuchtigkeit in der Kapsel (liquor Morgagni) widernatürlich an, und wird milchweiß und undurchsichtig, und verursacht einen eignen Staar. Alle diese bisher genannte Gattungen des grauen Staars haben ihren Sitz in der Krystallinse oder ihrer Kapsel, und werden daher unter dem Namen des ächten grauen Staars begriffen. Zuweilen hat die Verdunkelung ihren Sitz außerhalb der Krystallinse und ihrer Kapsel, und dann nennt man die Krankheit den unächtten grauen Staar.

§. 168.

Es giebt vier Gattungen des unächtten grauen Staars. Wenn im Falle des Enterauges Enter in den vordern Augenkammern, oder in andern ähnlichen Fällen andre trübe Materien befindlich sind, wird der dünnere Theil derselben nicht selten eingesaugt und zertheilt; der dickere bleibt zurück, und verdickt sich zuweilen in einen Klumpen, der die Pupille verstopft, oder legt sich auf die vordere Haut der Kapsel der Krystallinse, und bedeckt dieselbe dergestalt, daß der Eintritt des Lichts ins hintere Auge gänzlich gehindert wird. Die erste Gattung des unächtten Staars. — Zuweilen verdunkelt sich der
Theil

Theil der Haut der gläsernen Feuchtigkeit, welcher diejenige Vertiefung im Körper der gläsernen Feuchtigkeit bedeckt, in welcher die Krystalllinse nebst ihrer Kapsel liegt; die zweyte Gattung des unächten Staars (*cataracta hyaloidea*). — Zuweilen findet man eine widernatürliche braune Haut im Auge, die auf der vordern Haut der Kapsel liegt, und das Gesicht hindert. Da sie einigermaßen der choroidea gleicht, glauben einige, sie sey eine widernatürliche Verlängerung der choroidea, und nennen sie *cataracta choroidalis*. Wahrscheinlich entsteht sie bloß vom pigmentum. — Endlich kommen Kinder zuweilen mit einer verschloßnen Pupille auf die Welt; ein Fall, den einige *cataracta pupillaris* nennen, den man aber vielmehr *synizesis congenita* nennen sollte. — Alle diese Gattungen des unächten Staars werden nur selten beobachtet.

§. 169.

Der Krystallstaar ist von verschiedner Consistenz. Zuweilen zerschmilzt die Krystalllinse gleichsam, indem sie sich verdunkelt, und verwandelt sich in eine Feuchtigkeit, die einer Milch, oder dem Eyer, oder einer dünnen Gallerte gleicht. Man nennt in diesem Falle den Staar den Milchstaar, *cataracta purulenta, lactea*. Gemeiniglich hat dieser Staar eine milchweiße Farbe. Oft bemerkt man auf demselben unregelmäßige Streifen und Flecken, die von andrer Farbe sind, als der übrige Theil des Staars, und bey öftern und schnellen Bewegungen des Auges, oder wenn man das Auge reibt, oder druckt,

druckt, ihre Figur und Stelle verändern; auch wohl manchnial verschwinden, und dann wieder erscheinen. — Gemeiniglich scheint die Pupille unterwärts mehr verdunkelt zu seyn als oberwärts, vermuthlich, weil sich die undurchsichtigern und schwerern Theile der milchichten Feuchtigkeit heruater auf den Boden der Kapsel senken. — Gemeiniglich schwillt die Krystallinse auf, und dehnt sich aus indem sie sich erweicht. Immer ist daher der flüssige Staar dick; immer daher die Verdunkelung nahe hinter der Pupille. Zuweilen bemerkt man ganz und gar keinen Zwischenraum zwischen dem Staare und Rande der Pupille. — Im letzten Falle ist die Pupille gemeiniglich sehr ausgedehnt, und bewegt sich sehr langsam und träge. Der Staar nämlich berührt die Regenbogenhaut, und hindert sie in ihren Bewegungen. — Der flüssige Staar ist zuweilen so dick, daß er in die Pupille tritt, und die Regenbogenhaut dergestalt vorwärts druckt, daß sie convex wird. — Kranke, die einen Milchstaar haben, unterscheiden gemeiniglich Licht und Dunkelheit sehr schwach und undeutlich; ja ganz und gar nicht; theils weil der Staar, da er dick ist, so nahe an der Regenbogenhaut liegt, daß zwischen demselben und dieser wenig, oder gar keine Lichtstrahlen ins Auge gelangen können; theils weil der flüssige Staar immer mehr oder weniger eine kugelrunde Gestalt annimmt, und daher keine dünnen Ränder hat, durch welche die Lichtstrahlen dringen können.

§. 170.

Alle diese Zeichen des Milchstaars bemerkt man zwar mehrentheils, bey weitem aber nicht immer. Ueberhaupt kann man daher diesen Staar nicht immer mit Gewißheit vor der Operation erkennen. Nicht immer hat dieser Staar eine milchweiße Farbe; nicht immer bemerkt man an demselben Streifen und Flecken, die ihre Gestalt und Lage verändern: nicht immer ist derselbe ungewöhnlich groß und dick. Man hat dergleichen Staare sammt der Kapsel ausgezogen: die Kapsel enthielt nur sehr wenig milchichte Feuchtigkeit, und der Staar war sehr klein. Es ist glaublich daß von dieser milchichten Feuchtigkeit zuweilen allmählig etwas eingesaugt, und dadurch eine Verminderung des Staars veranlaßt wird. Die Behauptung einiger, daß der graue Staar bey jungen Leuten, und derjenige, der von innern Ursachen entsteht, immer flüssig ist, ist unzuverlässig. Zuverlässiger ist es, daß der angeborne graue Staar immer flüssig ist.

§. 171.

Indem sich die Krystallinse in eine milchichte Feuchtigkeit auflöst, verdunkelt und verdickt sich zuweilen zu gleicher Zeit ihre Kapsel. Oft trennt sie sich zugleich dergestalt von den Theilen, mit welchen sie natürlicher weise verbunden ist, daß sie bey der Operation der Ausziehung des grauen Staars in Gestalt eines runden mit Milch angefüllten Sacks aus dem Auge tritt; der sogenannte Balgstaar, *cataracta cystica*. — Zuweilen sondert sich in diesem

sem Falle die Kapsel von sich selbst so sehr von dem Körper der gläsernen Feuchtigkeit ab, daß der Staar im Auge ganz beweglich wird, bey den geringsten Bewegungen des Auges oder des Körpers hinter der Pupille zittert; in gewissen Stellungen des Körpers oder Auges so tief auf den Boden der hintern Augenkammer herabsinkt, daß der obere Theil der Pupille klar wird, und der Kranke sehen kann, bey einer gegenseitigen Stellung sich wieder erhebt; ja so gar wenn der Kranke den Kopf vorwärts beugt, durch die Pupille zum Theil, ja größtentheils in die vordere Augenkammer ragt, und wieder zurück tritt, wenn der Kopf zurück gebeugt wird. Man nennt ihn in diesem Falle den zitternden Staar.

§. 172.

Zuweilen behält die Krystallinse, indem sie sich verdunkelt, ihre natürliche Consistenz, nur mit dem Unterschiede, daß in diesem Falle ihre äußere Ueberfläche mehrentheils erweicht und breyartig ist. Zuweilen wird sie härter als natürlich, hornartig, ja steinern und knöchern. Je härter sie wird, desto dünner und kleiner ist sie. Gemeiniglich sieht der Staar in diesem Falle aschgrau, gelb, bräunlich aus. Die Entfernung des Staars von der Pupille ist sehr ansehnlich. Der Kranke unterscheidet Licht und Dunkelheit sehr deutlich, ja wohl gar größere hellere Gegenstände. Der bereits oben (§. 165) bemeldete schwarze Ring im Umfange des Staars ist, zumal bey erweiterter Pupille sehr bemerklich. Die Pupille bewegt sich frey und leicht. Die vor-

dere

dere Fläche des Staars scheint platt, nicht convex zu seyn. — Jedoch alle diese Zeichen sind nicht ohne alle Ausnahme so zuverlässig und beständig, daß man sich nicht auch in der Erkenntniß dieses Staars zuweilen irren könnte. Noch weniger zuverlässig ist es, daß der Staar bey fetten Leuten, und derjenige, der nach einem Schlage aufs Auge, oder irgend einer andern äußerlichen Verletzung entsteht, immer hart ist.

S. 173.

Zuweilen ist die verdunkelte Krystalllinse von mittler Consistenz, nicht hart, nicht flüssig, sondern weich, wie eine dicke Gallerte, wie geronnene Milch, wie frischer Käse. Man nennt den Staar in diesem Falle, den weichen, den käsichten Staar. Da die Linse, indem sie weich wird, auch in diesem Falle gemeiniglich dick und groß wird, bemerkt man auch hier alle kurz vorher genannte Zeichen des flüssigen Staars, ausgenommen, daß die Streifen und Flecken, die man auch an diesem Staare zuweilen beobachtet, ihre Gestalt und Stelle nicht verändern. Der weiche Staar ist gemeiniglich noch weit größer als der flüssige; vielleicht daß von diesem der dünnere Theil zuweilen eingesaugt wird. Es ist nichts ungewöhnliches, daß der weiche Staar noch einmal so groß ist, als die gesunde Krystalllinse. Vorzüglich und mehr als der flüssige hindert er die Bewegungen der Pupille, wenn er nahe an der Regenbogenhaut liegt. — Uebrigens findet man nicht selten alle bisher genannte Gattungen der Consistenz zu gleicher Zeit in der Staarlinse.

S. 174.

Der Kapselstaar besteht in einer Verdunkelung der Kapsel der Krystalllinse. Zuweilen ist die ganze Kapsel verdunkelt, zuweilen bloß die vordere, zuweilen bloß die hintere Haut derselben. Zuweilen, und zwar mehrentheils ist die Krystalllinse zugleich verdunkelt, zuweilen ist sie durchsichtig und ohne Fehler. Die Verdunkelung der hintern Haut der Kapsel allein ist selten; öfter findet man die vordere Haut allein verdunkelt. Wenn die Verdunkelung hinter der Pupille glänzend weiß aussieht; wenn man weiße glänzende Punkte oder Streifen, die gleichsam erhaben, auf der vordern Ueberfläche derselben liegen, wahrnimmt; wenn die Verdunkelung im Umfange eben so stark ist, als in der Mitte, und der schwarze Ring im Umfange nicht bemerkt ist; wenn die Verdunkelung plötzlich entsteht; oder wenn sie nur einen Theil der Pupille verdunkelt (*cataracta partialis*), so hat man große Ursache zu vermuthen, daß sie ihren Sitz in der Kapsel hat. Ist die Verdunkelung unter diesen Erscheinungen nahe hinter der Pupille, und convex, so hat sie ihren Sitz wahrscheinlich in der vordern Haut der Kapsel. Ist sie weit hinter der Pupille, und scheint sie concav zu seyn, so ist sie vermuthlich in der hintern Haut der Kapsel befindlich. — Uebrigens ist bey dem zitternden, angewachsenen, und halben (*partialis, dimidiata*) Staar jederzeit die Kapsel verdunkelt.

S. 175.

Der Nachstaar (*cataracta secundaria*) ist ein Kapselstaar, der erst nach der Operation der Ausziehung

ziehung oder Niederdrückung des Staars entsteht. Gemeiniglich wird, vorzüglich durch die erste Operationsart nur die Staarlinse ausgezogen, die Kapsel aber, wenn sie durchsichtig ist, zurück gelassen. Und diese verdunkelt sich nun zuweilen in der Folge bald oder spät nach der Operation, und raubt dem Kranken das Gesicht von neuem. Die Ursache dieser Verdunkelung ist gemeiniglich Entzündung, eine nicht ungewöhnliche Folge der Staaroperation, die wenn sie heftig wird, auch die innern Theile des Auges ergreift, und dann oft diese neue Blindheit veranlaßt. Gemeiniglich ist in diesem Falle die verdunkelte Kapsel zugleich an die Regenbogenhaut mehr oder weniger angeklebt; gemeiniglich findet man daher bey diesem Nachstaare die Pupille klein, eckigt, unbeweglich. — Nicht immer rührt die Verdunkelung, die man einige Tage nach der Operation hinter der Pupille wahrnimmt, von einem Nachstaare her; zuweilen verursachen sie zurückgebliebene Stücke des Staars, die bey der Operation der Ausziehung, im äußern Umfange der Kapsel zurück, und hinter der Regenbogenhaut unbemerkt bleiben, einige Zeit nachher aber sich in die Mitte der Pupille senken, und das Gesicht hindern; nach der Operation der Niederdrückung rührt sie oft von der-wiederaufgestiegenen Staarlinse her. Man kann indessen den wahren Nachstaar von diesen Arten von Verdunkelungen mehrentheils gar leicht unterscheiden. Jener entsteht allemal unter Schmerzen und Entzündung und erregt eine gleichartige Trübheit hinter der Pupille, die von der Verdunkelung, die

die Krystallinse ganz oder stückweise erregt, sehr verschieden ist. — Auch lange nach der Operation können Kranke das Gesicht durch eine Verdunkelung der zurückgebliebenen Kapsel verlieren. Man kann diese Blindheit den späten Nachstaar nennen. Er ist vorzüglich in denen Fällen zu fürchten, wo der Staar von innern Ursachen entsteht, die nach der Operation fort dauern, und nun früh oder spät auf die Kapsel wirken. Indessen kann auch manchmal eine zufällige Entzündung diesen späten Nachstaar veranlassen.

S. 176.

Der sogenannte angewachsene graue Staar ist jederzeit ein Kapselstaar mit oder ohne Verdunkelung der Krystallinse. Immer ist die Kapsel mit den nahen Theilen bey diesem Staare widernatürlich vereinigt, immer ist daher die Kapsel verdunkelt; denn dieselben Ursachen, welche die widernatürliche Vereinigung der Kapsel mit den nahen Theilen veranlassen, veranlassen nothwendiger weise auch eine Verdunkelung derselben. Der Staar ist auf eine dreyfache Art verwachsen. Es ist nämlich die Kapsel bloß mit der Krystallinse, oder sie ist hinterwärts mit der Haut der gläsernen Feuchtigkeit, oder vorwärts mit der Regenbogenhaut verwachsen. Die erste Art der Adhäsion ist vor der Operation auf keine Art und Weise zu entdecken. Auch ist sie, wenn sie nicht mit der zweyten und dritten Gattung der Adhäsion verbunden ist, weder bey der Ausziehung noch bey der Niederdruckung hinderlich; bey der
erstern

erstern Operationsart kommt gemeiniglich die Linse samt ihrer Kapsel hervor, da man denn diese Adhäsion entdeckt; bey der zweyten Operationsart wird die Kapsel samt der Linse niedergedrückt, und diese Adhäsion folglich gar nicht entdeckt.

S. 177.

Die Adhäsion der Kapsel an die Regenbogenhaut, die zweyte Art, ist sowohl bey der Ausziehung als auch bey der Niederdrückung sehr hinderlich, aber auch vor der Operation sehr leicht zu entdecken. Zuweilen ist die vordere Haut der Kapsel in ihrem ganzen Umfange an die hintere Ueberfläche der Regenbogenhaut angeklebt; zuweilen aber nur an einer einzigen, oder an ein paar Stellen. Im ersten Falle liegt der Staar so nahe hinter der Pupille, daß zwischen dem Rande derselben und dem Staare ganz und gar kein Zwischenraum bemerkt wird; man bemerkt im Umfange des Staars keinen dunkeln Ring; der Kranke unterscheidet Licht und Dunkelheit ganz und gar nicht, oder nur äußerst wenig; die Pupille ist ganz unbeweglich. Im zweyten Falle liegt der Staar nur an der Seite, an welcher die einzelne Adhäsion ist, nahe am Rande der Pupille, an der Gegenseite bemerkt man einigen Zwischenraum zwischen demselben und dem Rande der Pupille; durch diesen Zwischenraum fallen einige Lichtstrahlen auf den dünnern Rand der Linse, der Kranke unterscheidet also Licht und Dunkelheit deutlicher als im vorhergehenden Falle; die Pupille ist gemeiniglich ungleich, länglich, schief, eckigt; sie bewegt sich,

sich, aber unordentlich, und nur wenig, und verändert ihre Gestalt indem sie sich bewegt. Ueberdem bemerkt man sowohl in diesem als im vorhergehenden Falle alle Kennzeichen eines Kapselstaars, denn immer ist die vordere Haut der Kapsel verdunkelt.

S. 178.

Die dritte Gattung, die Adhäsion der hintern Haut der Kapsel an die Haut der gläsernen Feuchtigkeit, ist vor der Operation auf keine Art und Weise zu erkennen. Wenn, nachdem bey der Operation der Ausziehung, die Hornhaut gehdrig aufgeschnitten, und die Kapsel geöffnet worden, bey einem gelinden und allmählig etwas vermehrten Drucke außs Auge der Staar nicht hervortritt, sondern gleichsam von der Pupille entfernt bleibt, und man kein Hinderniß, keinen Umstand, der den Ausgang des Staars erschweren könnte, bemerkt, so hat man Ursach zu vermuthen, daß die Staarlinse an ihre Kapsel, und diese an die Haut der gläsernen Feuchtigkeit widernatürlich angeklebt ist. — Wenn man unter ähnlichen Umständen bey der Niederdruckung bemerkt, daß der Staar nicht weichen will, oder wenn er weicht, sich immer sogleich wieder erhebt, und in seine vorige Lage begiebt, sobald man die Nadel aufhebt, hat man gleichfalls Ursache, diese Adhäsion zu vermuthen. — Uebrigens bemerkt man alle diese Gattungen des angewachsenen Staars gemeiniglich und vorzüglich nach vorhergehenden Augenentzündungen; welche gemeiniglich nicht allein die Adhäsion sondern auch die Verdunkelung der Kapsel zugleich

zugleich veranlassen. Immer sind daher Abhässionen zu fürchten, wenn der Staar unter öftern und heftigen Augenentzündungen, oder nach einer äußern Verletzung, z. E. einem Schlag aufs Auge entsteht. — Mehrentheils ist daher der Nachstaar, der bald nach der Operation entsteht, angewachsen.

S. 179.

Der Staar, der bloß durch die widernatürliche Anhäufung und Verdunkelung des liquor Morgagni entsteht, ist selten. Gemeiniglich ist die Linse und Kapsel zugleich verdunkelt. Indessen hat man doch wirklich Fälle beobachtet, wo er ganz allein die Ursach der Blindheit, und die Krystalllinse nebst ihrer Kapsel durchsichtig war; so unglaublich es auch ist, daß die Linse mit einer schadhafteu Feuchtigkeit umgeben seyn, und dennoch unfehlerhaft bleiben kann. Vor der Operation kann man ihn auf keine Art und Weise erkennen; er gleicht dem gewöhnlichen Milchstaar. Auch selbst bey der Niederdruckung entdeckt man ihn nicht; man drückt den Staar nieder, und weiß nicht von welcher Beschaffenheit er war. Bloß bey der Operation der Ausziehung entdeckt man die wahre Beschaffenheit dieses Staars. Sobald die Kapsel geöffnet wird, kommt er in der Gestalt eines Tropfen Milch zum Vorschein; und die Pupille ist, sobald dieser Tropfen ausgeflossen ist, klar und rein. Daß diese milchichte Feuchtigkeit in diesem Falle nicht von der aufgelösten äußern Ueberfläche der Krystalllinse herrührt, erhellet daraus, daß die Linse durchsichtig und unfehlerhaft ist. Und das sie

nicht, wie der gewöhnliche Milchstaar, von der gänzlich aufgelösten Krystalllinse herrührt, zeigt ihre geringe Quantität. Man findet bey der Ausziehung des Staars diese milchichte Feuchtigkeit zuweilen in einer sehr großen Quantität, und dennoch die Krystalllinse von natürlicher Größe und Gestalt. Es scheint also in diesem Falle, den einige die Wassersucht der Kapsel nennen, der liquor Morg. nicht allein verdunkelt, sondern auch widernatürlich angehäuft zu seyn.

S. 180.

Die verschiedenen Gattungen des unächten Staars werden inßgesamt nur selten beobachtet. Die Verdunkelung der hyaloidea ist selten allein, sondern mehrentheils mit einer Verdunkelung der hintern Haut der Kapsel, und der Krystalllinse verbunden, und daher mehrentheils schwer, ja gar nicht zu erkennen. Es giebt nur drey Fälle, wo man sich von der Gegenwart dieses Staars überzeugen kann. Der erste Fall ist bey der hintern Adhäsion des Staars. Immer läßt sich höchst wahrscheinlich vermuthen, daß dieselbe Ursach, welche die widernatürliche Adhäsion der hintern Haut der Kapsel an die hyaloidea verursacht hat, jederzeit auch zu gleicher Zeit eine Verdunkelung nicht allein der hintern Haut der Kapsel, sondern auch der hyaloidea verursacht hat. — Der zweynte Fall ist, wenn man die Linse samt ihrer Kapsel ausgezogen hat, und noch eine Verdunkelung nahe hinter der Pupille bemerkt; oder wenn sich in diesem Falle ein Nachstaar erzeugt. — Im dritten und seltensten Falle ist gleich vom An-
fange

fange die hyaloidea allein verdunkelt, die Linse samt ihrer Kapsel unfehlhaft. Man bemerkt in diesem Falle die Verdunkelung in einer ungewöhnlichen Entfernung hinter der Pupille in der Gestalt einer concaven Ueberfläche. Jedoch ist man in diesem Falle nie gewiß, ob diese Verdunkelung ihren Sitz in der hyaloidea, oder in der hintern Haut der Kapsel hat — Der Staar, der aus dem pigmentum besteht, hat gemeiniglich die allgemeinen Zeichen des vordern Kapselstaars, nur daß er von dunkler Farbe ist. Selten überzeugt man sich von der Gegenwart desselben eher als bey der Operation.

S. 181.

Dies sind die vorzüglichsten Gattungen des grauen Staars, welche bey der Operation eine besondere Aufmerksamkeit erfordern. Andre Verschiedenheiten, die theils zufällig, oder in Absicht der Diagnostik unzuverlässig sind, theils dem Wundarzt in Absicht der Kurmethode keine besondere Anleitung geben, verdienen weniger bemerkt zu werden. Hieher gehört z. E. die Verschiedenheit der Farbe des Staars. Er ist zuweilen milchweiß, zuweilen perlfarbig, aschgrau, braun, gelb, grünlich, ja sogar schwarz. Man kann von der Farbe des Staars allein nichts gewisses auf die wahre Beschaffenheit des Staars schließen. Gewöhnlich zeigt wohl die milchweiße Farbe einen flüssigen oder weichen, die glänzend weiße Farbe einen häutigen, und jede dunklere Farbe einen harten Saar an; jedoch findet man häufig Ausnahmen, und Fälle vom Gegentheil.

§. 182.

Man glaubte sonst, daß die Krystalllinse, indem sie sich verdunkelt, zuerst immer bis auf einen gewissen Grad erweicht werde, und dann allmählig sich wieder verhärte. Man nannte den Staar unreif, so lange er in dem Zustande der Erweichung war; und reif, sobald er eine gewisse Härte erreicht hatte. Es folgte daraus, daß ein junger Staar allezeit weich, ein alter immer hart seyn mußte. Dies alles aber scheint ganz ungegründet zu seyn. Man hat Staare, die nur wenige Monate alt waren, ausgezogen, und hart gefunden, da hingegen ganz alte Staare weich waren. Die Weiche oder Härte der Linse hängt nicht von dem Alter des Staars, sondern höchst wahrscheinlich von der Ursache desselben ab. Es giebt Ursachen, die die Linse, indem sie sie verdunkeln, jederzeit zugleich auflösen oder erweichen; und andre Ursachen, welche die Linse jederzeit verhärten, indem sie sie verdunkeln. Ob aber eine Krystalllinse, die anfangs flüssig oder weich war, sich nicht etwa mit der Zeit verdicken oder verhärten kann, läßt sich nicht mit Gewißheit bestimmen. Die Fälle des Milchstaars, wo man in der Kapsel keine Spuhr von Krystalllinse, und nur sehr wenig von einer milchichten Feuchtigkeit findet, machen es sehr wahrscheinlich, daß von der aufgelösten Krystalllinse wohl manchmal der dünnere und flüssigere Theil eingesaugt werden könne.

§. 183.

Zuweilen verdunkelt der Staar nicht die ganze Pupille, sondern nur die Hälfte, oder einen kleinen
Theil

Theil derselben. Man nennt ihn in diesem Falle *cataracta dimidiata, partialis*. Zuweilen bemerkt man bloß einen weissen undurchsichtigen Streif hinter der Pupille; der sogenannte Balkenstaar (*cataracta barrée*). Alle diese einzelnen Verdunkelungen haben ihren Sitz in der Kapsel der Krystalllinse. - Man hat kein zuverlässiges Beispiel, von einer solchen partiellen Verdunkelung der Linse: immer verdunkelt sich dieselbe in allen Punkten durchaus zugleich, und gleich stark. Diese partiellen Verdunkelungen der Kapsel sind zuweilen mit der Verdunkelung der Krystalllinse verbunden; und in diesem Falle siehet man ganz deutlich, daß sie vor der verdunkelten Krystalllinse liegen, und eine ganz andre Farbe, gemeiniglich eine glänzendere Weisse als diese haben. Haben sie ihren Sitz in der hintern Haut der Kapsel, so entdeckt man sie nicht eher, als nachdem die Linse ausgezogen, oder niedergedrückt ist. Zuweilen bemerkt man diese einzelne Verdunkelungen der Kapsel doch auch ohne Verdunkelung der Linse, und in diesem Falle sind sie gemeiniglich durch ihre glänzende Weisse, und durch ihre Lage nahe oder weit hinter der Pupille, je nachdem sie ihren Sitz in der vordern oder hintern Haut der Kapsel haben, leicht zu erkennen.

S. 184.

Der complicirte Staar ist von mehrerer Wichtigkeit. Der Staar kann mit allen andern Augenkrankheiten complicirt seyn, die alle insgesammt theils leicht zu erkennen, theils der Heilung
des

des Staars nicht hinderlich sind; den schwarzen Staar ausgenommen, welcher nicht allein den Erfolg der Staaroperation vereitelt, sondern auch oft schwer zu erkennen ist. Gemeiniglich glaubt man berechtigt zu seyn, den schwarzen Staar zu vermuthen, wenn der mit dem grauen Staar behaftete Kranke weder Licht noch Dunkelheit unterscheidet; aber man betrügt sich oft. So lange der schwarze Staar noch nicht ganz vollendet ist, unterscheidet der damit behaftete Kranke noch Licht und Schatten; und auch bey dem grauen Staar unterscheidet der Kranke zuweilen weder Licht noch Schatten, zumal wenn der Staar an die Regenbogenhaut angewachsen, oder wenn er sehr dick und rund ist. — Ebenso unsicher ist auch das zweyte gewöhnliche Zeichen des schwarzen Staars, die Unbeweglichkeit der Pupille. Bey dem angewachsenen und widernatürlich dicken grauen Staare ist die Pupille auch oft unbeweglich; und oft ist sie bey dem vollkommensten schwarzen Staare beweglich. — Auch das dritte gewöhnliche Zeichen, die widernatürliche Erweiterung der Pupille, trügt oft. Bey dem angewachsenen und großen Staare ist die Pupille oft sehr ausgedehnt; oft ist sie bey dem vollkommensten schwarzen Staare ganz und gar nicht erweitert. — Auf die übrigen weniger wichtigen Zeichen des schwarzen Staars, das öftere anhaltende Kopfsweh, den druckenden Schmerz in der Gegend der Augenbraunen, das Spannen im Boden der Augenhöhle, die Erscheinung feuriger Funken oder andrer Gestalten vor den Augen u. s. w. kann man sich noch weniger verlassen; man

man bemerkt alle diese Zufälle gar oft in Fällen, wo der schwarze Staar nicht erfolgt; oft bemerkt man sie beim schwarzen Staar nicht. — Nur alsdann also beweisen die Zeichen insgesammt etwas mit einiger Gewißheit, wenn sie alle zusammen gegenwärtig sind, und der graue Staar weder an die Regenbogenhaut gewachsen, noch ungewöhnlich groß ist.

§. 185.

Die Erkenntniß dieser Complication des grauen Staars mit dem schwarzen ist indessen vorzüglich in Absicht der Vorhersagung nöthig. Die Operation des grauen Staars hindert aber der schwarze Staar nicht. Diese kann vollkommen gelingen; nur die Blindheit, die vom schwarzen Staare entsteht, kann sie nicht heben. Eben so kann die Operation des grauen Staars auf den schwarzen Staar keine üble Wirkung haben. Bekanntlich ist derselbe zuweilen heilbar; und dann ist er es nach der Operation eben so wohl, als vor derselben. Die Operation erschwert die Heilung des schwarzen Staars nicht; im Gegentheil, man kann mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß die Ausleerung eines Theiles der Feuchtigkeiten des Auges, die bey der Ausziehung des grauen Staars jederzeit erfolgt, in einigen Fällen, z. E. in dem nicht seltenen Falle, wo der Kranke eine Spannung im Augapfel empfindet, oder wenn sich der Augapfel ungewöhnlich hart anfühlt, ein gleichfalls nicht seltner Fall, u. s. w. wohl eine heilsame Wirkung auf den schwarzen Staar haben könne. Auf keinen Fall also hindert, der schwarze Staar

Staar die Operation des grauen, nur darf der Kranke nicht die Wiederherstellung des Gesichts von derselben allein erwarten.

Die Ursachen des grauen Staars.

§. 186.

Die Ursachen des grauen Staars sind von verschiedner Art. In Rücksicht auf dieselben ist der Staar zuweilen eine örtliche Krankheit, zuweilen aber die Folge einer allgemeinen Krankheit des Körpers. Eine örtliche Krankheit ist er, wenn er nach einem Schläge, einer Erschütterung, oder irgend einer äußerlichen Verletzung entsteht. Vielleicht ist in diesen Fällen bloß die Entzündung, welche die äußere Verletzung erregt, die nächste Ursach der Verdunkelung der Linse; vielleicht ist es auch zuweilen die Erschütterung, wodurch die Linse aus ihrer natürlichen Lage gebracht wird, oder ihre Nahrungsgefäße zerrissen werden. Man hat wenigstens gesehen, daß nach einem heftigen Erbrechen, einen Fall auf den Hintern eine Verdunkelung der Linse erfolgte. Zuweilen verdunkelt sich die Linse während eines hitzigen Fiebers; inflammatorische Verdickung durchsichtiger Feuchtigkeiten scheint hier die nächste Ursache des Staars zu seyn. Auch die durchsichtige Hornhaut verdunkelt sich bey dergleichen Fiebern zuweilen; wahrscheinlich aus derselben Ursache. Zuweilen entsteht der graue Staar am Ende solcher Fieber; vermuthlich rührt er alsdann von einer Metastase her. Uebrigens ist es oft sehr schwer, die Ursache

Ursachen des örtlichen Staars zu entdecken; auch ist eine sorgfältige Untersuchung derselben mehrentheils unnöthig, da dieselbe bey der Kur selten eine besondere Rücksicht und Behandlung erfordert. Genug, wenn der Staar in einem Körper entsteht, der übrigens vollkommen gesund ist, oder an den man keinen Fehler bemerkt, der Antheil an der Verdunkelung der Linse und ihrer Kapsel haben könnte, so ist man berechtigt, ihn für einen örtlichen Staar zu halten, und als einen solchen zu behandeln.

§. 187.

Zuweilen entsteht der Staar in arthritischen, venerischen, scrophulösen u. s. w. Körpern, ohne alle äußere Gelegenheitsursachen, und dann hat man Ursach, ihn nicht für eine örtliche Krankheit, sondern für die Folge des allgemeinen Fehlers der Säfte zu halten. Die Operation des Staars hat in diesem Falle selten den erwünschten Erfolg; gemeiniglich erfolgt nach derselben eine heftige Entzündung, die den glücklichen Erfolg derselben vereitelt, oder über lang oder kurz eine neue Blindheit; beydes Folgen des Fehlers der Säfte, der nach der Operation auß Auge zu wirken fortfährt. Immer muß man daher in diesem Falle den Fehler der Säfte vor der Operation bestmöglichst zu verbessern suchen, und die Operation unter einer zweyfelhaften Vorhersagung unternehmen. Weit glücklicher ist, wenn alle übrige Umstände günstig sind, gemeiniglich der Erfolg der Operation des örtlichen Staars.

§. 188.

§. 188.

Der Staar kann bey jeder Leibesbeschaffenheit und Lebensart, und in jedem Alter entstehen. Indessen bemerkt man ihn dennoch bey bejahrten Personen häufiger als bey jungen. Diejenigen, welche ihre Augen auf irgend eine Art stark angreifen, diejenigen, welche vor einem starken Feuer oder Lichte arbeiten, Brandweinsäufer u. s. w. scheinen vorzüglich dazu geneigt zu seyn. Wenn aus irgend einer innern oder äußern Ursach der Staar auf einem Auge entsteht, erzeugt er sich gemeinlich über lang oder kurz allmählig auch im andern Auge. Freylich ist dies vorzüglich alsdann zu fürchten, wenn er aus innern Ursachen entsteht; denn die Wirkung dieser Ursache, die den Verlust des ersten Auges veranlaßt hat, kann wenn sie fortdauert, auch den Verlust des zweyten Auges veranlassen. Indessen bemerkt man doch, daß das zweyte Auge zuweilen auch in solchen Fällen verlohren geht, wo das erste offenbar durch eine äußere örtliche Ursache verdunkelt worden ist; und in diesen Fällen ist man wirklich berechtigt, den Verlust des zweyten Auges bloß dem Consensus zuzuschreiben, der zwischen beyden Augen obwaltet. Uebrigens giebt es auch Fälle genug, wo das zweyte Auge zeitlebens unschadhaft bleibt.

§. 189.

Es giebt wahrscheinlich auch eine erbliche Anlage zum grauen Staar: wenigstens hat man Fälle beobachtet, wo die meisten Glieder einer Familie in einem gewissen Alter staarblind wurden. — Endlich giebt

giebt es auch einen angeborenen Staar; er ist nach allen Beobachtungen gemeiniglich flüssig, übrigens aber eben so heilbar, wie ein jeder anderer Staar.

Heilung des Staars durch Arzneymittel.

§. 190.

Gemeiniglich erfordert die Heilung des Staars eine chirurgische Operation. Indessen giebt es doch wirklich Fälle, wo derselbe ohne Operation blos durch Arzneymittel geheilt worden ist. Freylich sind die Fälle dieser Art selten; freylich ist es glaublich, daß diejenigen, welche dergleichen Fälle oft beobachtet zu haben, vorgeben, sich wohl manchmal geirrt, und Verdunkelungen in der Hornhaut für Verdunkelungen hinter der Pupille gehalten haben mögen; freylich ist es in den meisten Fällen unmöglich, den Staar durch Arzneymittel zu heilen, da die Krystalllinse mehrentheils nicht allein verdunkelt, sondern auch in Absicht ihrer Consistenz und Organisation gänzlich zerstöhret ist; indessen giebt es dennoch Fälle, wo man hoffen kann, den Staar durch Arzneymittel zu heben, und glauben darf, daß er wirklich schon oft durch Arzneymittel wirklich gehoben worden ist. Dieser Fälle giebt es vorzüglich zwey: nämlich wenn der Staar offenbar von innern Ursachen herrührt, die durch Arzneymittel gehoben werden können, z. E. wenn er gichtischen, venerischen scrophulösen u. Ursprungs ist; und wenn der Staar einzig und allein von einer Verdunkelung der Kapsel herrührt. Schwerlich ist der Krystallstaar

Richt. Wundarzneyk. III. B. R durch

durch Arzneymittel zu heilen; denn schwerlich kann man die verdunkelte Linse zu ihrer vorigen Durchsichtigkeit, Consistenz und Organisation wieder herstellen, wenn sie flüssig, gallertartig, brehartig, steinern oder knöchern ist, indessen läßt sich dennoch glauben, daß der Milchstaar zertheilt werden kann; dies machen wenigstens Fälle wahrscheinlich, wo in der Kapsel keine Spuhr von der Krystalllinse, und nur sehr wenig von einer milchichten Feuchtigkeit gefunden wurde.

§. 191.

Zweyerley Gattungen von Arzneymitteln können zur Heilung des Staars angewendet werden; solche nämlich, welche, wenn der Staar von innern Ursachen herrührt, gegen diese innern, venerische, gichtische, scrophulöse u. s. w. Ursache wirken; und wenn keine innere Ursache entdeckt wird, und der Staar örtlich zu seyn scheint, solche, die eine auflösende Kraft haben; denn stockende verdickte Feuchtigkeiten sind ohne Zweifel die nächste Ursach der Verdunkelung durchsichtiger Theile. Unter der erstern Gattung von Mitteln ist keines so oft mit gutem Erfolge angewendet worden, als das Quecksilber; vermuthlich weil das venerische Gift eine der häufigsten innern Ursachen des grauen Staars ist. Eine vollkommene Verdunkelung hinter der Pupille, von gichtischen Ursachen wurde innerhalb 4 Wochen durch den innern Gebrauch des Spießglasweins und des aconitum, und die Anwendung der Seidelbastrinde gänzlich gehoben. — Man hat wirklich durch
die

die China und den Schierling graue Staare zertheilt; vermuthlich waren sie scrophulöser Art. — Ein grauer Staar verlohr sich während dem Gebrauche der Jasserschen Schwefelsalbe, und ein Krähenschlag kam zum Vorschein. Dies sind diejenigen innern Ursachen, die am häufigsten beobachtet werden; es giebt ihrer aber mehrere, und alle verdienen eine sorgfältige Aufmerksamkeit. Die Mittel, die man in Rücksicht auf dieselben anwendet, heben nicht allein zuweilen die schon gegenwärtige Wirkung derselben, die Verdunkelung, sondern und hauptsächlich verhüten sie die zu fürchtenden Wirkungen derselben nach der Operation, heftige Entzündung, und den Nachstaar.

§. 192.

Unter den Mitteln der zweiten Art hat die Erfahrung vorzüglich den Schierling, das Quecksilber, verschiedene Zubereitungen von Spießglas, das flüchtige Laugensalz, das Extractum hyoscyami albi u. s. w. bewährt. Vorzüglich hat eine Mischung aus einem Gran Calomel, eben so viel Spießglaschwefel und acht bis zwanzig Gran Schierlingpulver, täglich zweymal genommen, sehr gute Dienste gethan. — Das Extractum hyoscyami albi hat man allmählig bis zu acht Gran in einer Dose mit Nutzen gegeben (Vellier). Auch die Electricität soll zuweilen gute Wirkung geleistet haben (Medical Comment. Vol. IX). Die Kellereisel, so wie auch die künstlichen Geschwüre gehören zu denen Mitteln, welche gewöhnlich versucht werden, und wenigstens

nicht schaden. — Bey dem Gebrauche der stärkern auflösenden Mittel ist einige Vorsicht nöthig; sie schwächen wenn sie unbehutsam gebraucht werden, die Constitution, zerstören die Mischung der Säfte, und vereiteln dadurch den Erfolg der Operation, die am Ende gemeiniglich dennoch erfordert wird. — Man hat bey Kranken, die das flüchtige Hirschhornsalz und das Quecksilber im Uebermaaß genommen hatten, gefunden, daß bey der Operation die gläserne Feuchtigkeit widernatürlich aufgelöst war, und sehr leicht ausfloß.

Die Operation.

S. 193.

Die Operation bleibt also in den allermeisten Fällen das einzige Mittel. Aber nicht immer findet sie statt; zuweilen ist sie mit Schwierigkeiten verbunden; zuweilen ist ihr Erfolg zweifelhaft; zuweilen mehr oder weniger wahrscheinlich. Der Wundarzt muß vor der Operation wohl untersuchen, zu welchen von diesen Fällen der gegenwärtige gehört, und dieß dem Kranken vorher sagen. Das Publikum, welches in Absicht dieser Operation sich seit langer Zeit in den Händen der umherziehenden Augenärzte befunden hat, ist gewohnt, den glücklichen Erfolg der Operation nicht zu wünschen und zu erwarten, sondern vom Wundarzte zu fordern, und jeden unglücklichen Erfolg als einen Beweis der Ungeschicklichkeit desselben anzusehen. — Auch unter den günstigsten Umständen mißlingt zuweilen die Operation.

tion. Zufällige Ursachen, unvorhergesehene Fehler der Constitution u. s. w. sind Schuld daran. Eine Klugheitsregel von Wichtigkeit ist es folglich, auch unter den günstigsten Umständen nichts mit Gewißheit vorher zu versprechen.

S. 194.

Ganz und gar findet die Operation nicht statt; wenn der Kranke ein Kind ist; alle lebhaftere Bewegungen des Auges, Kopfs und Körpers hindern die Operation, und sind bey Kindern nicht zu verhüten; — wenn der Kranke öftere langwierige Kopfschmerzen, ein rothes kupfriges Gesicht, entzündete, schmerzhaft, lichtscheue Augen lange gehabt hat, und noch hat; immer erfolgen in diesem Falle heftige Entzündungszufälle nach der Operation, die den Kranken des hergestellten Gesichts wieder berauben; — wenn der Kranke jetzt eben rheumatische oder gichtische herumziehende oder in irgend einem Theile festsetzende Schmerzen oder Zufälle hat; höchstwahrscheinlich wirft sich nach der Operation der Gichtschmerz aufs Auge, wenigstens muß also die Operation so lange verschoben werden, bis diese Beschwerden gehoben sind; — wenn der Kranke den Husten hat; denn er hindert nicht allein die Operation, sondern kann auch nach derselben, durch die Erschütterung, womit er verbunden ist, üble Zufälle erregen; — wenn das staarblinde Auge wider natürlich groß, das ist, wassersüchtig, oder wider natürlich klein, d. i. atrophisch ist; die Erfahrung lehrt, daß in diesen Fällen die Operation nie ge-

lingt: — wenn der Staar mit der Regenbogenhaut gänzlich und in allen Punkten verwachsen ist; denn schwerlich kann man die zusammengeklebten Theile von einander absondern, ohne eine Entzündung zu erregen, die den Erfolg der Operation vernichtet.

§. 195.

Wie muß man, wenn nicht besondere Ursachen dazu nöthigen, ein staarblindes Auge operiren, so lange der Kranke noch etwas damit siehet. Der Erfolg der Operation ist immer ungewiß. Ist der Kranke ganz blind, so kann er nichts bey der Operation verlieren. Ist ihm noch einige Sehkraft übrig, so lauft er Gefahr, sie durch die Operation zu verlieren. — Eben so ist es, wenn nicht besondere Ursachen das Gegentheil rathen, nicht rathsam, die Operation zu verrichten, wenn der Kranke nur auf einen Auge blind ist, mit dem andern Auge noch vollkommen gut siehet; theils weil die Operation in diesem Falle wirklich nicht nothwendig ist, theils auch, weil sie, wenn sie gelingt, dem Kranken keinen großem Vortheil verschafft; er sieht nicht allein nach der Operation mit zwey Augen nicht viel schärfer, als vor der Operation mit einem Auge, sondern er sieht auch oft undeutlicher, da das operirte Auge nicht ohne Brille, das gesunde aber vielleicht ohne Brille scharf siehet. — Gemeiniglich widerathet man die Operation, wenn der Kranke neben dem grauen Staare auch den schwarzen Staar hat; aber im vorhergehenden (§. 185) sind bereits die Gründe vom Gegentheil angezeigt worden.

§. 196.

Zweifelhaft ist der Erfolg der Operation, und mit Schwierigkeiten ist dieselbe verbunden, wenn der Kranke ohne Anzeige des schwarzen Staars Licht und Finsterniß undeutlich, oder ganz und gar nicht unterscheidet; weil dann der Staar entweder angewachsen, oder ungewöhnlich groß, oder häutig ist: — wenn der Staar von äußern Ursachen, einer Quetschung, einem Stöße, oder bloß von einer heftigen Entzündung herrührt; weil immer zu fürchten ist, daß diese Ursachen außer dem Staare auch andre Veränderungen im Augapfel veranlassen, die dem glücklichen Erfolge der Operation hinderlich sind: — wenn der Staar unter östern heftigen Kopfschmerzen und Augenentzündungen entstanden ist; denn immer ist hier zu vermuthen, daß eine Krankheitsursache auf den Kopf und die Augen wirkt, und zu fürchten, daß dieselbe nach der Operation heftige Entzündungszufälle, oder eine neue Blindheit erregt: — wenn der Staar häutig, oder an der einen oder andern Stelle angewachsen ist; in beyden Fällen sind Handgriffe nöthig, die leicht eine heftige Entzündung erregen: — wenn der Kranke von einer ungesunden Leibesbeschaffenheit, und der Staar von einer innern Ursach entstanden ist, die vor der Operation nur gemindert, nicht gänzlich getilgt werden kann. Uebrigens ist es eine üble Vorbedeutung, wenn bereits an einem Auge die Operation mit einem unglücklichen Erfolge verrichtet worden ist, zum voraus gesetzt, daß nicht eine zufällige Ursache daran schuld ist.

S. 197.

Mit gegründeter Hoffnung eines glücklichen Erfolgs kann der Wundarzt die Operation unternehmen, wenn der Kranke übrigens vollkommen gesund ist; wenn der Staar nicht von einer innern fortwirkenden Ursache entstanden ist; wenn der Kranke Licht und Finsterniß deutlich unterscheidet; wenn während der Entstehung des Staars der Kranke nicht mit öftern Kopfschmerzen und Augenentzündungen beschweret gewesen ist; wenn sich die Pupille frey und lebhaft bewegt, und ihre natürliche runde Gestalt hat; wenn der Staar in gehöriger Entfernung hinter der Pupille, und das Auge übrigens vollkommen gesund und unfehlhaft ist. — So glücklich aber auch der Erfolg der Operation ist, erhält dennoch der Kranke nie die Schärfe des Gesichts wieder, welche er vor der Krankheit hatte; da ihm nach der Operation die Krystalllinse fehlt, welche zur Brechung der Lichtstrahlen natürlicherweise sehr vieles be trägt. Immer ist daher der Kranke auch nach der glücklichsten Operation genöthigt, den Mangel der Krystalllinse durch eine Staarbrille zu ersetzen. Die Staarbrillen sind stark convexe Brillen, von 4 bis 7 Zollen. Es giebt wenige, die nach der Operation ohne eine solche Brille lesen können. Indessen ist der Grad des Gesichts nach der Operation sehr verschieden. Am besten sehen diejenigen, die vorher kurzsichtig waren. Bey alten Personen, und bey solchen, die vor der Operation langssichtig waren, oder überhaupt ein schwaches Gesicht hatten, läßt sich freylich nach der Operation kein scharfes Gesicht erwarten.

S. 189.

S. 198.

Es giebt verschiedne Wundärzte die den Kranken einige Tage, ja Wochen, durch eine genaue antiphlogistische Diät, durch Aderlässe, und den wiederhohlten Gebrauch kühlender, auflösender, abführender Mittel zu der Operation vorbereiten. Der Endzweck dieser Vorbereitung ist, der Entzündung, die jederzeit nach der Operation zu fürchten ist, vorzubauen, und die Disposition des Körpers zur Entzündung zu mindern. Wiederhohlte Erfahrungen beweisen, daß diese sorgfältige und lange Vorbereitung, wenn der Kranke gesund ist, nicht allein unadthig, sondern auch höchst schädlich ist. Wahr ist es, daß unter allen möglichen Zufällen nach der Operation die Entzündung am meisten zu fürchten, und am sorgfältigsten zu verhüten ist; aber unwahr ist es, daß sie durch diese Vorbereitungsmittel verhütet wird. Die Erfahrung zeigt, daß Entzündung bey starken und gesunden Körpern am wenigsten, bey denen hingegen, welche sehr reizbare feste Theile und scharfe Säfte haben, am meisten zu fürchten ist. Wirklich also, und laut wiederhohlter Erfahrungen wird durch diese Gattung der Vorbereitungskur, die Gefahr der Entzündung vermehrt. Je länger und feyerlicher die Anstalten und Vorbereitungen zur Operation sind, desto länger befindet sich der Kranke in einem Zustande der Furcht, und ängstlichen Unruhe, in welchem die Absonderungen mehr oder weniger gestöhrt, und Schwäche und Unruhe im Nervensystem, und Schärfe in den Säften erzeugt wird. Eine ungewöhnliche schwächende

N 5

Diät,

Diät, Mangel an gewohnter Bewegung, die Vermeidung der freyen Luft, alles Hauptstücke der gewöhnlichen Vorbereitungskur, erzeugen Schwäche und Reizbarkeit in den festen Theilen, und Schärfe in den Säften. In einem Hospitale ist der lange Aufenthalt in der Hospitalluft noch von weit üblern Folgen. Nichts aber ist schädlicher, als der lange Gebrauch auflösender und purgirender Mittelsalze, den man gemeiniglich vorzüglich vor der Operation empfiehlt, um vermuthliche Stockungen und Schärfen in den Eingeweiden des Unterleibes, die freylich die Gefahr der Entzündung sehr vermehren können, aufzulösen, und auszuleeren. Nichts schwächt den Körper, nichts hindert die Ausdünstung, nichts vermehrt die Reizbarkeit mehr als der Mißbrauch dieser Mittel. Gemeiniglich bekommen Kranke, die solche Mittel vor der Operation häufig gebraucht haben, ein wirkliches gastrisches oder gallichtes Fieber, das bloß diesen Mitteln, welche den Zufluß der Säfte nach den Därmen hinleiten, die Ausdünstung mindern, und den Darmkanal schwächen und reizbar machen, zuzuschreiben ist. Gerade also das Gegentheil von dem, was sie thun sollen, thun diese Mittel; sie reinigen den Unterleib nicht, sondern ziehen Unreinigkeiten dahin, die die Natur durch die Haut ausgeleeret haben würde.

S. 199.

Alles was der Wundarzt, in dem Falle, wo der Kranke übrigens gesund ist, in Absicht der Vorbereitung zur Operation, mit Recht und Absicht
und

und zum wahren Nutzen des Kranken thun kann, begreifen folgende kurze Regeln: 1) Er muß die ängstliche Unruhe und Besorgniß des Kranken auf alle mögliche Art mindern und verkürzen; und in der Absicht, die Operation, wenn sie einmal beschloffen ist, nicht lange aufschieben; auch bey der Ungewißheit des Erfolgs, dem Kranken Hoffnung eines höchstwahrscheinlich guten Erfolgs machen; den Kranken auf die bestmögliche Art zerstreuen, und ihn von dem Gedanken an die Operation abziehen; alles mögliche entfernen, was in den Augen des Kranken der Operation ein Ansehen von großer Wichtigkeit geben könnte; dem Kranken die zur Operation bestimmte Stunde nicht lange vorher sagen; ihm, wenn er furchtsam ist, eine halbe Stunde vor der Operation 15 Tropfen Sydenhamsches Laudanum mit etwas Wein geben, und endlich die Operation ohne alle solenne Weitläufigkeit, und ohne alles Gepränge verrichten. 2) Nur wenn der Kranke wirklich und sehr vollblütig, und an das Aderlassen gewöhnt ist, kann man ihm allenfalls eine Ader öffnen. 3) Eine weniger nahrhafte Diät, und sorgfältige Vermeidung dessen, was erhitzt, Leibestopfung, oder eine Verderbniß in den ersten Wegen veranlassen kann, ist ohne Zweifel vor der Operation ein paar Tage lang anzurathen. Vorzüglich muß der Kranke alle Gelegenheitsursachen zu rheumatischen und catharrhalischen Beschwerden meiden. 4) Hat man Ursache Unreinigkeiten oder Anhäufungen im Darmkanale zu vermuthen, so ist freylich ein gelindes Purgiermittel nöthig, jedoch ist, wenn
nicht

nicht besondere Umstände gegenwärtig sind, ein Quecksilbermittel dieser Art den gewöhnlichen Purgiersalzen weit vorzuziehen.

§. 200.

Dies alles gilt nur von dem Falle, wo der Kranke völlig gesund ist. Hat er Beschwerden, die einen Einfluß auf den Erfolg der Operation haben können, so müssen diese vorher bestmöglichst durch Mittel gehoben werden, die der Ursache und Beschaffenheit derselben angemessen sind; eine wichtige Regel, deren Beobachtung freylich die Fähigkeiten der gewöhnlichen Augenärzte übersteigt. — Es ist übrigens gleichviel, zu welcher Jahreszeit die Operation verichtet ist; alles kommt darauf an, daß sich der Kranke in einer gemäßigten Wärme befindet; und diese kann man ihm zu jeder Jahreszeit verschaffen. Man betrügt sich, wenn man glaubt, daß der Frühling und Herbst, wegen der gemäßigten Witterung am bequemsten dazu sind. Gemeinlich herrschen in diesen Jahreszeiten die mehresten epidemischen Krankheiten, und man hat daher immer zu befürchten, daß der Kranke, so gesund er auch dem Anscheine nach ist, indem er sich der Operation unterwirft, dennoch bereits den Saamen zu einer solchen epidemischen Krankheit in sich hat, die vielleicht bald nach der Operation ausbricht. Die Jahreszeit, wo die wenigsten epidemischen Krankheiten herrschen, ist die bequemste zu jeder wichtigen chirurgischen Operation. Rheumatische und gichtische Personen operirt man am besten im Sommer, weil man in
dieser

dieser Jahrszeit von ihren Beschwerden gemeiniglich am wenigsten zu fürchten hat.

§. 201.

Die Operation des grauen Staars ist eine der feinsten in der Chirurgie, und erfordert eine große Genauigkeit. Es kommt daher sehr viel auf die bequeme Stellung des Wundarztes und Kranken dabey an. Der Wundarzt kann die Arme nicht stark aufheben, oder stark ausstrecken, ohne die Festigkeit und Sicherheit der Hand zu verlieren, die bey dieser Operation erfordert wird. Es muß daher derselbe während der Operation auf einem so hohen, und der Kranke auf einem so niedrigen Stuhle sitzen, daß der Kopf des letztern den Schultern des erstern gegenüber ist. In dieser Stellung darf der Wundarzt den Arm weder aufheben, noch sinken lassen, um die Hand an das Auge des Kranken zu bringen. — Die Füße des Kranken müssen unter dem Stuhle, worauf der Wundarzt sitzt, ausgestreckt seyn, und der Kopf des erstern muß der Brust des letztern ganz nahe seyn. So darf der Wundarzt den Vorderarm nur ein wenig ausstrecken, um die Operation zu verrichten. Um der Hand noch mehrere Festigkeit zu geben, muß der Wundarzt den einen Fuß auf den Rand des Stuhls setzen, worauf der Kranke sitzt, den Ellenbogen des Arms, womit er operirt, auf das Knie stützen, und die Hand, fest an die Wange des Kranken drücken. Auch eine unsichere Hand bekommt bey Beobachtung dieser Regeln eine hinlängliche Sicherheit und Festigkeit.

§. 202.

S. 202.

Zubiel Licht, und ein doppeltes Licht ist bey der Operation hinderlich. Am besten setzt sich der Wundarzt nahe an ein Fenster, und läßt, wenn mehrere im Zimmer sind, die übrigen durch Gardinen schließen. Der Kranke muß so sitzen, daß ihm das Licht schief über die Nase ins Auge fällt. Sitzt er dem Fenster gerade gegenüber, so sitzt sich der Wundarzt theils selbst im Lichte, theils hindert ihn in dieser Lage der Widerschein im Auge, genau zu unterscheiden, ob die Pupille rein ist. Der Stuhl, auf welchem der Kranke sitzt, muß eine hohe Lehne haben, an welcher der Kopf des Kranken fest anliegt, damit ihn der Kranke während der Operation nicht zurückziehen kann. Die Lehne muß senkrecht stehen, nicht wie gewöhnlich schief, rückwärts gebeugt, damit der Kopf des Kranken nicht zu weit von der Brust des Wundarztes entfernt ist.

S. 203.

Das Auge, welches nicht operirt wird, muß vorzüglich wenn der Kranke damit siehet, verbunden werden. Die Bewegungen dieses Auges veranlassen Bewegungen des zu operirenden Auges, welche die Operation erschweren. Ein Gehülfe der hinter den Kranken steht, legt die eine Hand, z. E. die rechte, wenn das linke Auge operirt wird, unter das Kinn des Kranken, hebt dasselbe ein wenig auf, so daß das Gesicht des Kranken ein wenig aufwärts gerichtet ist, und drückt dem Kopf desselben an die Stuhllehne. Wenn der Kranke auf einem Stuhle ohne,

ohne, oder mit niedriger Lehne sitzt, drückt der Gehülfe den Kopf des Kranken an seine Brust; indessen ist in diesem Falle die Operation sehr unsicher, da die geringste Bewegung des Gehülfs den Kopf des Kranken in Bewegung setzt, und es bey nahe unmöglich ist, daß der Gehülfe ganz unbeweglich steht. — Die andre Hand legt der Gehülfe auf die Stirn des Kranken; und mit dem Zeige- und Mittelfinger derselben ziehet er das obere Augenlid in die Höhe. Dieses Geschäft erfordert eine sorgfältige Genauigkeit. Immer muß der Gehülfe die Spitzen der Finger unter den Rand des obern Augenlides legen, und so dasselbe fassen und aufziehen. Legt er die Finger bloß auf die äußere Haut des Augenlides nahe am Rande desselben, und ziehet es auf solche Art in die Höhe, so entwischt es ihm während der Operation, wenn es feucht wird, und der Kranke die Augenlider zusammenziehet, höchstwahrscheinlich, und verursacht eine sehr große Störung in der Operation. Immer muß er ferner die Spitzen der Finger, womit er das Augenlid aufzieht, auf den obern Rand der Augenhöhle, ja nicht auf den Augapfel legen, und andrücken; die Unterlassung dieser Regel würde vornemlich bey der Ausziehung des Staars sehr üble Folgen haben. — Das untere Augenlid ziehet der Wundarzt selbst mit dem Zeige- oder Mittelfinger der Hand, womit er nicht operirt, nieder.

S. 204.

Wenn die Augenlider des Kranken wenig gespalten sind, der Kranke sehr unruhig, und der Gehülfe

Gehülfe unerfahren und unzuverlässig ist, thut man am besten, wenn man das obere Augenlid mittelst des breiten silbernen Haaken (siehe Tab. I. Fig. 1) in die Höhe ziehen läßt. Bey dem Gebrauche dieses Haaken ist man völlig sicher, daß das Augenlid während der Operation nicht herabfällt, und der Augapfel nicht gedrückt wird; jedoch ist in Absicht seiner Gestalt und Anwendung mancherley zu bemerken. Der Haaken muß an der Stelle, die bey Anlegung desselben auf den obern Rande der Augenhöhle liegt (lit. a.) ein wenig gebogen seyn. Ist er gerade, so zieht er das Augenlid auswärts, und verursacht Schmerzen, und macht den Kranken, und das Auge unruhig. Da der obere Rand der Augenhöhle bey dem einen mehr, bey dem andern weniger hervorragt, muß der Haaken biegsam seyn, damit ihn der Wundarzt den in jedem besondern Falle erforderlichen Grad der Biegung an dieser Stelle geben kann. — Der Haaken (b) darf nicht zu lang seyn, sonst ziehet er mittelst der Conjunctiva, gegen welche er drückt, den Augapfel in die Höhe, und erschwert die Operation. Hat er die gehörige Länge, so befestigt er den Augapfel mittelst der Conjunctiva, die er anspannt. — Der obere Theil des Haaken (lit. c.) muß, wenn er angelegt ist, platt auf der Stirne liegen. Hält ihn der Gehülfe in der Hand, so wird leicht das Augenlid heftig gezerrt, und gespannt, wenn der Gehülfe die Hand nicht recht auflegt; oder sich vergißt. — Noch bequemer ist dieser Haaken, wenn er nicht aus einem Silberblech, sondern aus einem biegsamen doppelten silbernen Draht gemacht ist. (siehe

(siehe Tab. I. Fig. 2.) Dieser Haaken hebt nicht allein das obere Augenlid in die Höhe, sondern befestigt auch den Augapfel, dessen oberer Theil zwischen den beyden Aesten des Haaken liegt. — Einige (Casaamata, Feller Dissert. de Methodis suffusionem oculorum curandi etc. Lipsiae, 1782) ziehen auch das untere Augenlid mittelst eines doppelten Haaken (s. Tab. I. Fig. 3) herunter. Den obern Haaken b, legen sie ans Augenlid, an den untern d, befestigen sie ein Gewicht von mäßiger Schwere. Nur in dem einzigen Falle, wo der Wundarzt die zwente Hand, zu irgend einem besondern Handgriffe bey der Operation, z. E. zur Befestigung des Augapfels nöthig hat, könnte dieser Haaken von einigem Nutzen seyn. In allen übrigen Fällen zieht man am besten das Augenlid mit den Finger herunter. — Von den Mitteln das Auge zu befestigen, wird bequemer weiter unten bey der Ausziehung des Staars gehandelt werden.

S. 205.

Die Operation verrichtet der Wundarzt auf eine doppelte Art; er druckt nämlich entweder die verdunkelte Linse aus ihrer natürlichen Stelle herunter in den Boden des Augapfels, so daß sie der Pupille nicht mehr gegenüber ist, und folglich den Eintritt der Lichtstrahlen ins Auge nicht mehr hindern kann; oder er ziehet dieselbe durch eine Oeffnung in den Häuten des Augapfels ganz aus dem Auge heraus. Die erstere Operationsart, die Niederdruckung ist seit langer Zeit bekannt und gewöhn-


wöhnlich; die zweyte, die Ausziehung des Staars ist eine Erfindung neuerer Zeiten. Jede derselben hat ihre Vorzüge und Unvollkommenheiten. Zuerst von der ältern, der Niederdruckung.



Die Niederdruckung des Staars.

§. 206.

Das vorzüglichste Instrument, welches zu dieser Operation erfordert wird, ist die Nadel. Man hat verschiedene, vorzüglich aber runde (s. Tab. I. Fig. 4) und zweyschneidige (s. Tab. I. Fig. 5) Staarnadeln. Die zweyschneidigen scheinen den Vorzug zu verdienen; sie dringen leichter und sanfter ins Auge, und fassen die Linse besser als die runden. In Fällen, wo große Oeffnungen in die Kapsel der Krystalllinse, oder andre Häute im Auge gemacht werden müssen, z. E. bey dem flüssigen weichen, oder häutigen Staar, verdienen sie unleugbar den Vorzug. Die besten zweyschneidigen Staarnadeln haben die Gestalt, die auf der eben genannten Kupfertafel abgezeichnet ist. Man hat Nadeln, deren Spitzen weit breiter, die aber eben deswegen verwerflich sind. Gemeiniglich sind die Staarnadeln auch länger, als die auf der ersten Tafel. Aber die zu beträchtliche Länge der Nadel nußt zu nichts, und hindert den Wundarzt, der die Nadel am Griffe anfaßt, die Hand, in welcher er bey der Operation die Nadel hält, fest an das Gesicht des Kranken anzudrücken. Der Griff der Nadel muß so lang seyn, daß der hintere Theil desselben auf dem Rücken
der

PLATE





der Hand liegt, indem sie der Wundarzt faßt. Auf der Seite des Griffes, auf welcher die eine Fläche der zweiseitigen Nadel ist, ist ein schwarzer Strich, oder irgend ein andres Merkmal befindlich, woraus der Wundarzt, wenn die Nadel im Auge hinter dem Staare ist, ersehen kann, ob die zwey Flächen der Nadel aufwärts und unterwärts, oder vorwärts und hinterwärts gerichtet sind.

S. 207.

Die runden Nadeln erfordern gemeiniglich einen starken Druck der Hand, wenn sie in den Augapfel eindringen sollen. So lange der Druck zu schwach ist, machen sie bloß eine Vertiefung an der Stelle des Augapfels, die sie berühren; und wenn der Druck vermehrt wird, dringen sie gemeiniglich plötzlich, oft zu tief, und in einer unrichtigen Richtung ein. Man kann zwar diese Unbequemlichkeit verhüten, wenn man die Nadel, indem man sie ansetzt, und andrückt, zwischen den Fingern umdreht, denn alsdann dringt sie gemeiniglich leicht und allmählig ein; aber man wird finden, daß dieser Handgriff un bequem ist. — Man hat der runden Nadel eine dreieckigte Spitze, und dadurch gleichsam die Gestalt eines kleinen Troikarts gegeben, in der Meynung die Mängel derselben dadurch zu verbessern; aber diese verbesserte runde Nadel hat nicht den geringsten Vorzug vor der gewöhnlichen. — Man hat gegen die zweiseitigen Nadeln angewendet, daß sie jederzeit eine Schnittwunde von einiger Länge machen, und daher weit leichter ein

Blutgefäß in der Choroidea verletzen, und eine innere Blutung erregen, als die runden Nadeln. Aber die Erfahrung zeigt, daß bey dem Gebrauche der zweyschneidigen Nadeln höchst selten eine Blutung entsteht; und entsteht sie ja, so kann das Blut durch die offne Schnittwunde nach auswärts dringen; da hingegen, wenn sie bey dem Gebrauche der runden Nadeln entsteht, der Stich zu klein ist, als daß das Blut durch denselben auswärts dringen könnte, daher es ins Auge dringt, und oft üble Zufälle erregt. — Man hat die eine Fläche der zweyschneidigen Staarnadel ausgehöhlt, und glaubt, daß man mit dieser hohlen Fläche der Nadel bey der Operation den Rand der Krystallinse besser fassen und dirigiren kann, als mit der convexen Fläche der gewöhnlichen zweyschneidigen Nadel. — Wenn diese Verbesserung ihrer Absicht auch nicht ganz entspricht, so ist sie wenigstens unschädlich. In einigen besondern Fällen kann sie wirklich von einigem Nutzen seyn. — Mehrere Veränderungen an der Staarnadel, die von jeher gemacht worden, und ohne wahren Nutzen sind, verdienen kaum bemerkt zu werden.

S. 208.

Der Wundarzt thut wohl, wenn er die Nadel, ehe er sie ins Auge stoßt, mit Del oder irgend einer andern Feuchtigkeit befeuchtet; sie dringt sanfter und leichter ein. Allenfalls ist es genug, wenn er sie nur einen Augenblick in den Mund nimmt, und mit Speichel benetzt. Er faßt sie wie eine Schreibfeder
zwischen

zwischen dem Daumen, und Zeige- und Mittelfinger, ganz nahe am vordern Ende des Griffs. Die Hand legt er fest zur Seite außs Gesicht des Kranken. Je fester er die Hand andruckt, desto mehr Festigkeit verschafft er ihr. Gemeiniglich ist, wenn man die Hand ans Gesicht bringt, das Auge einige Augenblicke unruhig. Man hüte sich, den Kranken, durch heftiges Zureden, das Auge still zu halten, zu beunruhigen: die Bewegungen des Auges sind unwillkürlich, der Kranke kann sie nicht hemmen. Je heftiger man ihm zuredet, desto furchtsamer und ängstlicher wird er, und desto unruhiger wird das Auge. Am besten thut man daher immer, wenn man, nachdem man die Hand mit der Nadel an die Wange des Kranken gelegt hat, und nun völlig bereit ist, sie ins Auge zu stoßen, den Kranken und das Auge, falls man es unruhig findet, einige Augenblicke sich selbst überläßt. Nach wenigen Augenblicken, wenn die erste Bestürzung vorüber ist, wird man sehen, daß das Auge ruhig wird, und still steht. Steht es in einer zur Operation bequemen Richtung still, so stoße man nun die Nadel geschwind, doch behutsam ins Auge. Sobald sie eingestoßen ist, wird das Auge gemeinlich sogleich ganz unbeweglich, und ist es ja noch unruhig, so kann man es nunmehr mit der Nadel fest halten.

§. 209.

Die Stelle am Augapfel, in welche die Nadel eingestoßen werden muß, ist im Weissen des Auges,

D 3

im

im äußern Augenwinkel, eine Linie vom Rande der durchsichtigen Hornhaut, eine starke halbe Linie unter der Mitte. Näher am Rande der Hornhaut, als in der Entfernung einer Linie darf die Nadel nicht eingestochen werden, wenn man nicht den orbic. ciliar. verletzen will. Ein wenig unter der Mitte sticht man sie ein, weil in der Mitte, und über derselben vorzüglich die größern Nerven- und Blutgefäße in der Choroida befindlich sind, deren Verletzung man bestmöglichst vermeiden muß. Aus eben derselben Ursache sticht man die zweyschneidige Nadel dergestalt ein, daß die eine Fläche derselben unterwärts, die andre aufwärts, der eine scharfe Rand vorwärts, der andre hinterwärts gerichtet ist. In dieser Richtung der Nadel wird der Schnitt horizontal und verletzt nicht leicht eines der Blutgefäße der Choroida, welche größtentheils parallel in horizontaler Richtung laufen. Diejenigen, welche die Nadel zwey, ja drittehalb Linien vom Rande der durchsichtigen Hornhaut einstecken, setzen sich einer doppelten Schwierigkeit aus. Je weiter hinter nämlich die Nadel ins Auge gestochen wird, desto mehr ist die Spitze derselben, wenn sie auf die Staarlinse gelegt wird, vorwärts nach der Regenbogenhaut gerichtet, und kann kaum herunterwärts bewegt werden ohne diese Haut zu verletzen. Auch drückt in diesem Falle die Nadel, deren Spitze nach vorwärts gerichtet, und indem sie auf die Staarlinse gelegt wird, weit höher ist, als der Griff, vermöge dieser Richtung die Staarlinse gemeiniglich herunterwärts und vorwärts in die hintere, oder wohl

gar

gar vordere Augenkammer, und also gerade dahin, wohin sie, wie sogleich weiter erhellen wird, am wenigsten gedrückt werden darf. — Diejenigen, welche die Nadel noch weiter hinten einstecken lassen noch überdem Gefahr, die Aponeurose des äußern Augenmuskels zu verletzen, und dadurch mancherley üble Zufälle zu erregen.

§. 210.

Wenn man die Nadel in der Entfernung einer Linie vom Rande der durchsichtigen Hornhaut gerade ins Auge sticht, so trifft die Spitze derselben wahrscheinlich auf die Staarlinse, und stößt dieselbe, wenn sie hart ist, in den innern Augenwinkel. Um dies zu verhüten, muß die Nadel jederzeit nicht ganz gerade, sondern ein wenig nach hinterwärts gerichtet ins Auge gestoßen werden, so daß ihre Spitze hinter dem Staare befindlich ist, und hinter der Pupille nicht gesehen wird. Von der Befolgung dieser Regel hat man sich drey Vortheile zu versprechen; nämlich die Spitze der Nadel ist, wenn sie auf die Staarlinse gelegt wird, nicht nach der Regenbogenhaut gerichtet, deren Verletzung man also nicht zu fürchten hat; die Nadel liegt auf der Staarlinse ein wenig in die Queere, und faßt folglich dieselbe weit besser, als wenn sie ganz in paralleler Richtung auf derselben liegt; und endlich faßt sie sie in einer Richtung, in welcher sie dieselbe leicht herunter und hinterwärts, d. i. dahin, wohin sie gedrückt werden muß, drückt. — Einige (Bell) geben den Rath, die Nadel so einzustecken, daß sie

sogleich bey ihrem Eintritt ins Auge hinter der Pupille vor der Staarlinse gesehen wird. Die Nadel tritt bey Befolgung dieses Rathes jederzeit in die hintere Augenkammer, und dahin kann sie nicht gelangen, ohne die processus ciliar. die Regenbogenhaut, oder die vordere Haut der Kapsel der Krystalllinse zu verletzen. Die Verletzung der erstern Theile muß nothwendig üble Folgen haben; die Folge der Verletzung der Kapsel wird in den meisten Fällen diese seyn, daß die Linse, indem sie niedergedrückt wird, nicht herunter und hinterwärts weicht, sondern vorwärts in die Pupille dringt. Alles wesentliche Nachtheile; nicht zu gedenken, daß nicht der geringste Vortheil davon zu erwarten ist, daß sich die Nadel gleich zu Anfange der Operation vor der Staarlinse befindet.

S. 211.

Bey der gewöhnlichen Methode der Niederdrückung des Staars hat der Wundarzt die Absicht, die Linse dergestalt herunter, und zu gleicher Zeit hinterwärts zu drücken, daß sie nach geschehener Operation in der gläsernen Feuchtigkeit, auf dem Boden des Auges, ihre vordere Fläche unterwärts und ein wenig vorwärts, ihre hintere Fläche aufwärts und ein wenig hinterwärts; ihr unterer Rand hinterwärts und unterwärts, und ihr oberer Rand vorwärts und ein wenig aufwärts gerichtet liegt. Gerade senkrecht herunterwärts kann und darf er die Linse nicht drücken; theils weil hier so wenig Raum für die Staarlinse ist, daß sie, falls sie auch so tief
als

als möglich gedruckt wird, dennoch, wenn sie nur ein wenig groß ist, nicht ganz bis unter die Pupille; oder wenn sie klein ist, höchstens nur eben bis unter den untern Rand der Pupille gedruckt werden kann; immer aber mit ihrem oben Rande ihrem vor-maligen natürlichen Sitze so nahe bleibt, daß sie bey der geringsten Gelegenheit wieder in denselben hinaufsteigt, und eine neue Blindheit verursacht; theils weil der Wundarzt, wenn er um dieses zu verhüten, die Staarlinse tief herunter druckt, Gefahr lauft mittelst der Staarlinse die retina und choroidea zu quetschen und zu zerreißen. Man hat die niedergedruckte Staarlinse zuweilen wirklich zwischen der retina und choroidea, oder zwischen dieser und der scleroticica gefunden. — Es ist sehr wahrscheinlich, daß in allen denen Fällen, wo die Linse nach der Operation so gar leicht wieder aufsteigt, oder wo nach der Operation ungewöhnlich heftige Zufälle entstehen, der Wundarzt gegen die eben gegebne Regel, die Staarlinse senkrecht herunter druckt, folglich nicht weit von ihrer vorigen Stelle entfernt, oder die retina und choroidea gequetscht oder zerrissen hat. Drückt man die Linse schief herunter und hinterwärts, so entfernt man sie weit von ihrer vorigen Stelle; der Weg in der gläsernen Feuchtigkeit, durch welchen sie herunter steigt, schließt sich nach der Operation wieder, und hindert die Linse wieder in die Höhe zu steigen, und man lauft nicht Gefahr die retina oder choroidea zu verletzen.

S. 212.

Diese wichtige Regel, die Krystalllinse herunter und hinterwärts zu drücken, wird der Wundarzt leicht befolgen, wenn er der bereits gegebenen Vorschrift gemäß die Nadel nicht in allzu großer Entfernung, sondern nur eine Linie vom Rande der durchsichtigen Hornhaut einsticht. So bald die Nadel durch die Häute des Auges gestochen ist, thut der Wundarzt wohl, wenn er einen Augenblick wartet, bis das Auge, welches durch den Stich gereizt worden ist, sich beruhigt, alsdann wendet er die Nadel, welche er, die eine Fläche aufwärts, die andre unterwärts gekehret eingestochen hat, allmählig und indem er sie tiefer ins Auge stoßt dergestalt, daß nun eine Schneide aufwärts, die andre unterwärts gerichtet ist. Er stoßt die Nadel schief hinterwärts und so tief ein, daß ihre Spitze hinter der Krystalllinse, ein wenig jenseits des Mittelpunkts derselben liegt. Stoßt er die Nadel um vieles tiefer ein, so lauft er Gefahr die retina und choroidea mit der Spitze derselben, indem er sie aufhebt, und auf die Staarlinse legt, zu verletzten. Stoßt er sie weniger tief ein, so faßt die Nadel, indem sie aufgehoben, und auf die Staarlinse gelegt wird, nicht den obern Rand der Krystalllinse in der Mitte sondern zur Seite, und drückt entweder die Staarlinse ganz und gar nicht nieder, oder sie drückt sie seitwärts in den innern Augenwinkel, da sie denn, wenn der Kranke den Kopf seitwärts beugt, leicht wieder in die Mitte hinter die Pupille fällt. Der geübte Wundarzt urtheilt aus der ihm bekannten Länge der Nadel leicht,

wie

wie tief die Nadel im Auge ist: ob er den Theil der Nadel, der im Auge hinter der Staarlinse liegt, gleich nicht sehen kann. Er urtheilt desto sicherer, wenn er sich einer kurzen Nadel bedient. Je länger die Nadel ist, desto schwerer und unsicherer urtheilt er. Der ungeübte kann allenfalls vor der Operation die Nadel einen Augenblick vors Auge halten, und die Länge des Theils der Nadel, der ins Auge treten muß, abmessen und bemerken.

S. 213.

So bald die Nadel tief genug eingestoßen ist, hebt der Wundarzt die Spitze derselben auf, und legt sie auf den obern Rand der Krystalllinse dergestalt, daß die eine Fläche der Nadel aufwärts, die andre unterwärts gerichtet ist, und auf der Krystalllinse liegt. Der schwarze Strich am Griffe leitet ihn bey diesen Wendungen der Nadel. Und nun drückt er die Staarlinse in der bereits angezeigten Richtung herunter und hinterwärts. Indem dies geschieht, sieht er hinter der Pupille die Verdunkelung sinken, und die Nadel ihr folgen. Wohl zu merken aber ist, daß man die Spitze der Nadel im Auge nur dadurch aufheben kann, daß man den Griff derselben äußerlich sinken läßt: und umgekehrt, die Spitze im Auge nur dadurch niederdrückt, daß man den Griff aufhebt. Alle Bemühungen die Nadel im Auge wirklich geradezu mittelst den Fingern aufzuheben, zerrren und drucken die Wunde in den Häuten des Auges, und sind fruchtlos. — Sobald der Wundarzt die Staarlinse tief genug herunter gedrückt hat,

wartet

wartet er einige Augenblicke, ehe er sie wieder in die Höhe hebt. Eben so wartet er, nachdem er sie bis in die Mitte der Pupille aufgehoben hat, einige Augenblicke, ehe er sie aus dem Auge zieht, um zu sehen, ob die Staarlinse der Nadel wieder nachfolgt; und falls sie folgt, den Handgriff der Niederdrückung so gleich zu wiederhohlen. Folgt sie nicht, so zieht er die Nadel in derselben Richtung, in welcher er sie eingestochen hat, was ist, eine Fläche aufwärts, die andre unterwärts gerichtet, langsam aus dem Auge.

§. 214.

Zuweilen dringt die Staarlinse sobald und so oft man mit der Nadel auf dieselbe drückt, vorwärts in die Pupille, so sehr man sich auch bemühet, sie hinterwärts und herunter zu drücken. Man thut in diesem Falle am besten, wenn man sich sogleich zu einer andern Operationsart entschließt, wovon in der Folge Erwähnung geschehen wird. Verfährt man unbehutsam, so dringt wirklich die Staarlinse zuweilen durch die Pupille in die vordere Augenkammer, und dann muß sie ausgezogen werden. — Alle Vorschläge zu Handgriffen, die Staarlinse mittelst der Nadel durch die Pupille wieder zurück zu ziehen, und dann niederzudrücken, sind verwerflich. — Zuweilen geschieht es, daß die Staarlinse, nachdem sie niedergedrückt worden, jederzeit mit der Spitze der Staarnadel zugleich wieder in die Höhe steigt. Es ist glaublich, daß in diesem Falle die Spitze der Nadel wohl manchmal in die Linse

oder

oder ihre Kapsel eingestochen ist, und diese daher jederzeit mit sich aufhebt. Am leichtesten mag dies wohl geschehen, wenn die Nadel nicht tief genug ins Auge gestoßen wird; und wenn es geschieht, wird man immer die Linse zugleich mit der Spitze der Nadel herauf kommen sehen. Man darf, um diese kleine Schwierigkeit zu heben, die Nadel nur ein wenig aus dem Auge ziehen, und dann den Handgriff der Niederdrückung wiederhohlen.

S. 215.

Man hat in den neuern Zeiten, (Willburg, Betrachtung über die Operation des Staars, Nürnberg, 1785) eine andre Art, den Staar niederzudrücken in Vorschlag gebracht. Man soll nämlich die Linse nicht sowohl niederdrücken als vielmehr umlegen; sie aus ihrer perpendiculären Lage, in eine horizontale niederlegen, dergestalt, daß ihre vordere Fläche aufwärts, ihre hintere gerade herunterwärts, ihr unterer Rand vorwärts gerichtet ist. Man hebt, um dies zu thun, die Spitze der Nadel, nachdem sie wie bey der bisher beschriebnen Methode ins Auge gestoßen worden ist, auf, bewegt sie um den obern Rand der Staarlinse, und legt sie, die eine Fläche nach der Regenbogenhaut, die andre nach der Linse gerichtet, auf die vordere Fläche der Krystalllinse, ein wenig über der Mitte, drückt zuerst die ganze Linse gelinde und ein wenig zurück, um ihre Verbindungen zu lösen; dann legt man die Nadel ein wenig höher und näher an den obern Rand der Linse, und drückt den obern Theil der Linse

Linse herunter und hinterwärts, und legt auf diese Art die ganze Linse auf den Boden des Auges in eine horizontale Richtung. Man kann bey dieser Methode sich allenfalls, wenn man will, der runden Staarnadel mit eben der Bequemlichkeit bedienen, als der zweyschneidigen; nur ist es rathsam, sie nicht so nahe am Rande der durchsichtigen Hornhaut als bey der erstern Operation, sondern wenigstens in der Entfernung von zwey Linien einzustoßen, damit die Spitze der Nadel dem obern Rande der Krystalllinse während der Operation hinter ins Auge folgen kann. Oder noch rathsamer ist es, die Nadel wie gewöhnlich eine Linie vom Rande der durchsichtigen Hornhaut einzustoßen, um zu verhindern, daß die Spitze derselben (§. 209) indem sie über und vor die Linse gebracht wird, die Regenbogenhaut nicht verletzt; dann aber, indem man den obern Theil der Linse umlegt, die Nadel allmählig tiefer ins Auge zu stoßen, damit ihre Spitze dem obern Theil der Linse hinterwärts ins Auge gehörig folgt.

§. 216.

Es ist nicht zu leugnen, daß diese neuere Methode mancherley Vorzüge vor der bisher gewöhnlichen zu haben scheint, welche freylich durch fernere Erfahrungen bestätigt werden müssen. Ueberhaupt sind die Handgriffe bey der Umlegung der Linse weit leichter, und einfacher, als bey der gewöhnlichen Niederdruckung derselben. Man sieht die Nadel beynahe vom Anfange der Operation an hinter der Pupille vor dem Staar, und ist dadurch in den
Stand

Stand gesetzt, die erforderlichen Handgriffe genauer und vollkommner zu bewerkstelligen. Man hat, wann man die Linse auf die gewöhnliche Art niederdrückt, auch bey dem Gebrauche der zweyschneidigen Nadel, und der Beobachtung aller gegebenen Regeln, doch gar oft die Linse nicht so sehr in seiner Gewalt, daß man sie in der vorgeschriebenen Richtung herunterdrücken könnte; sie weicht oft vorwärts, oft gerade herunterwärts, und steigt in diesem Falle entweder leicht wieder in die Höhe, oder quetscht und zerreißt die retina u. s. w. und erregt Zufälle, welche bey der Umlegung ganz und gar nicht zu fürchten sind. Es ist beynahe unmöglich, daß eine umgelegte Staarlinse sich wieder erhebt, und die Pupille von neuem verdunkelt. Für eine große Staarlinse ist wirklich kaum Platz genug im Boden des Auges, daß sie auf die gewöhnliche Art niedergedrückt werden könnte, ohne mit ihrem obern Rande der Pupille ganz nahe zu bleiben, oder mit dem untern Rande die innern Häute des Auges zu verletzen. Endlich ist man bey der Umlegung weit sicherer als bey der gewöhnlichen Niederdrückung, daß man allemal die Linse samt ihrer Kapsel niederdrückt, und folglich keinen Nachstaar zu fürchten hat. — Das einzige, was dieser Methode zum Vorwurf gereichen könnte, ist die Zerrüttung des vordern Theils der gläsernen Feuchtigkeit, die vorzüglich stark seyn muß, wenn die Linse groß ist. Aber Erfahrungen berechtigen zu glauben, daß diese Zerrüttung mehrentheils ohne üble Folgen aufs Gesicht ist. Bey der gewöhnlichen Niederdrückung wird

wird dieser Theil der gläsernen Feuchtigkeit durch die zuweilen wiederhohlstten Bewegungen der Nadel auf und nieder hinter der Staarlinsse oft gleichfalls nicht wenig zerrüttet, und der Erfolg ist dennoch glücklich. Der Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit nach der Ausziehung des Staars hindert das Gesicht nicht, ob er gleich nicht ohne eine ähnliche Zerrüttung geschehen kann.

S. 217.

Das linke Auge des Kranken operirt der Wundarzt mit der rechten, das rechte, mit der linken Hand. Man hat allerhand Vorschläge gethan, um den Wundarzt die Bequemlichkeit zu verschaffen, auch das rechte Auge des Kranken mit der rechten Hand zu operiren. Einige wollen, er soll, in dem er die Operation verrichtet, hinter dem Kranken stehen; andre empfehlen den Gebrauch einer gebognen Nadel, (s. Heister, womit er das rechte Auge über die Nase operiren kann, u. s. w.) aber durch alle diese Vorschläge wird die Operation vielmehr erschwert. Allenfalls kann der Wundarzt auch mit der gewöhnlichen Staarnadel das rechte Auge über die Nase im innern Augenwinkel, und folglich mit der rechten Hand operiren, wenn er nur das Auge während der Operation stark auswärts wenden läßt, der Kranke müste denn ein sehr tiefliegendes Auge, und eine sehr hohe Nase haben. Aber immer thut er am besten, wenn er die Fertigkeit zu erhalten sucht, auch mit der linken Hand zu operiren; und er erhält sie durch eine kleine Übung leicht.

S. 218.

§. 218.

Man hat von jeher der Operation der Niederdrückung den Vorwurf gemacht, daß sie mehrentheils nur eine Palliativoperation sey; und daß die Staarlinse bald oder spät nach derselben wieder aufsteigen, in ihre vorige Stelle treten, und eine neue Blindheit erregen könne. Es ist nicht zu leugnen, daß dies zuweilen wirklich, manchmal bald, manchmal lange, ja verschiedne Jahre nach der Operation geschehen ist, aber es ist auch gewiß, daß, wenn die Operation nach den oben angezeigten Regeln mit Genauigkeit gemacht, vorzüglich wenn die Staarlinse umgelegt wird, diese Gefahr einer neuen Blindheit sehr geringe ist; daß diese Gefahr, allmählig abnimmt, und zuletzt oft ganz verschwindet; daß sie nur in dem ersten Zeitraume nach der Operation vorzüglich zu fürchten ist; daß sie in diesem Zeitraume sowohl als auch in dem folgenden durch gehörige Vorsorge leicht verhütet werden kann; daß der Staar, wenn er ja wieder aufsteigt, leicht, ja leichter als bey der ersten Operation wieder niedergedrückt werden; ja daß er, wenn er, wie zuweilen geschieht, indem er aufsteigt, in die vordere Augenkammer fällt, mit dem besten Erfolge ausgezogen werden kann.

§. 119.

Je mehr Zeit nach der Operation verfließt, desto mehr mindert sich die Gefahr dieser neuen Blindheit, desto mehr gewöhnt sich die Linse an ihre neue Stelle, desto mehr verschließt sich der Weg, durch

welchen sie wieder aufsteigen könnte. Mit der Zeit verliert sich zuweilen diese Gefahr gänzlich, denn in vielen Fällen löst sich die in der gläsernen Feuchtigkeit liegende Staarlinsc allmählig auf, und verliert sich gänzlich, so daß man auch nicht die geringste Spuhr von derselben nach einigen Jahren im Auge findet. Indessen geschiehet dies nicht immer, und ganz zuverlässig. Viele Jahre nach der Operation hat man die Staarlinsc noch unverändert im Auge gefunden. Vielleicht hängt dieser verschiedene Erfolg von der verschiedenen Consistenz der Staarlinsc, und dem Zustande der Kapsel ab: schwerlich löst sich die Krystallinsc auf, wenn sie sehr hart, knöchern, steinern ist; wenn die Kapsel zugleich mit niedergedrückt worden, und ganz unverleßt ist, so daß keine Feuchtigkeit in dieselbe dringen kann. Dem sey, wie ihm wolle, genug der Kranke ist nie, auch lange nach der Operation nicht ganz sicher für der Gefahr einer neuen Blindheit, hat immer Ursach, einige Regeln zu beobachten, um diese mögliche Gefahr abzuwenden.

§. 220.

Es giebt dieser Regeln, die der Kranke, vorzüglich die ersten Tage und Wochen nach der Operation, jedoch auch in der Folge beständig zu beobachten hat, zwey: nämlich er muß alle heftige und schnelle Bewegungen, oder Erschütterungen des Kopfs und Körpers vermeiden: er muß sich hüten, den Kopf in eine niedrige abhängende Lage, am wenigsten nach vorwärts zu bringen. Husten und Schnu-

Schnupfen hindert daher die Niederdrückung, und muß auch nach der Operation sorgfältig vermieden werden. Das Erbrechen, welches oft eine consensuelle Folge der Operation ist, muß durch Mohnsaftmittel verhütet werden. Es ist nicht nöthig, daß der Kranke die ersten Tage nach der Operation beständig auf dem Rücken liegt; er kann gehen, stehen, sitzen, liegen, nur aber immer sich allmählig und behutsam aus einer Stellung in die andre begeben.

S. 221.

Zuweilen steigt demungeachtet, allmählig und von freyen Stücken die Staarlinse wieder in die Höhe; zuweilen ist ein unvorhergesehner plötzlicher Zufall, ein Fall, ein Sturz vom Pferde, u. s. w. daran schuld. Die Pupille ist in diesem Falle wieder eben so, als vor der Operation verdunkelt. Geschiehet dies einige Monate nach der Operation bey Gelegenheit irgend einer heftigen Ursache, plötzlich, so ist kein Zweifel, daß die neue Verdunkelung von der Staarlinse herrührt. Geschiehet es aber einige Tage nach der Operation, indem das Auge verbunden und entzündet ist ohne eine äußere Gelegenheitsursache, so kann man sich leicht irren, und die wiederaufgestiegne Staarlinse für einen Nachstaar, oder auch umgekehrt, halten. Indessen bey einiger Aufmerksamkeit vermeidet man diesen Irrthum leicht. Die Farbe des Nachstaars ist von der Farbe der Krystalllinse, und folglich die Verdunkelung, die jener erregt, von der Verdunkelung, die man vor der Operation wahrnahm, sehr verschieden.

Der Nachstaar hat alle Zeichen eines häutigen Staars. Mit dem Nachstaar ist gemeiniglich eine heftige Entzündung des Auges, eine Verengerung der Pupille, oder eine Unbeweglichkeit derselben verbunden. Die Staarlinsc steigt zuweilen nicht sogleich ganz, sondern oft nur zur Hälfte zc. in die Höhe, so daß man ihren obern Stand deutlich siehet, und die Pupille nur zur Hälfte verdunkelt findet. Und endlich wird man, wenn die Staarlinsc wieder aufgestiegen ist, bey jeder heftigern Bewegung oder Erschütterung des Körpers oder des Kopfs gemeiniglich eine Bewegung der Verdunkelung hinter der Pupille wahrnehmen, die man bey dem Nachstaare nicht wahrnimmt.

§. 222.

Man hat gesehen, daß Personen, die staarblind waren, bey Gelegenheit eines Falles von einer ansehnlichen Höhe auf die Füße oder den Hintern, oder irgend einer andern heftigen Erschütterung des Körpers plößlich ihr Gesicht erhielten. Man fand bey ihnen die Pupille rein, und den Staar herab auf den Boden des Auges gesunken. Könnte man in dem Falle, wo die Staarlinsc nach der Operation wieder in die Höhe steigt, nicht um so viel mehr etwas ähnliches erwarten, da durch die vorhergehende Operation der Staar von allen seinen Verbindungen getrennt, und der Weg herunter in den Boden des Auges gebahnt ist. Da manche Kranke eine zweyte Operation fürchten, finden Versuche dieser Art gar wohl statt: sie sind unschädlich, und die

die Hoffnung, daß sie gelingen, ist vorzüglich alsdann nicht gering, wenn der Staar nicht ganz, sondern nur zur Hälfte u. s. w. in die Höhe gestiegen ist; wenn er sehr beweglich ist, so oft der Kranke den Kopf oder Körper bewegt; und wenn er erst vor kurzem in die Höhe gestiegen, und folglich der Weg, durch welchen er wieder herab in den Boden des Auges sinken kann, noch offen ist. — Wenn diese Versuche nicht gelingen, oder wenn man aus den Umständen zum voraus vermuthen kann, daß sie nicht gelingen werden, muß die Operation wiederholt werden. Sie ist in diesem Falle gemeiniglich sehr leicht, und immer glücklich; die Staarlinsse weicht dem gelindesten Drucke der Nadel. Nur ist es rathsam die Operation so lange aufzuschieben, bis die Entzündung nach der ersten Operation sich gemindert, oder verlohren hat: und dann bey dieser zweiten Operation die Staarlinsse tiefer und mehr hinterwärts ins Auge zu drucken, als vermuthlich bey der ersten Operation geschehen ist. Ist das Auge nicht entzündet, so kann die Operation sogleich wiederholt werden. Jeder Aufschub ist zweckwidrig. Man hat (Warner) sie innerhalb vierzehn Tagen fünfmal wiederholt, und der Erfolg war glücklich.

S. 223.

Zuweilen fällt die Staarlinsse, indem sie wieder aufsteigt, durch die Pupille in die vordere Augenkammer, und erregt daselbst so heftige Schmerzen, daß sie sogleich ausgezogen werden muß. Beym geringsten Aufschube verliert der Kranke nicht selten

das Gesicht. — Auch wenn der Staar, indem er wieder aufsteigt, hinter die Pupille in seine vorige Stelle tritt, kann er ausgezogen werden. Man hat keine Ursach den Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit, die freylich durch die vorhergehende Operation der Niederdrückung zum Theil gelitten hat, mehr als in andern Fällen zu fürchten; aber man hat auch mehrentheils in diesem Falle keine Ursache die Ausziehung des Staars der Niederdrückung vorzuziehen, da die letztere bey der Wiederhohlung gemeiniglich vorzüglich leicht und glücklich von statten geht.

S. 224.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß durch die Umliegung jederzeit, und durch die Niederdrückung, wenn sie nach den vorgeschriebenen Regeln verrichtet wird, wo nicht jederzeit, doch mehrentheils die Staarlinsc samt ihrer Kapsel in den Boden des Auges gedrückt wird. Die Gründe, die dies wahrscheinlich machen, sind folgende: die Kapsel der Krystallinsc hängt mit der Haut der gläsernen Feuchtigkeit, und den processibus ciliaribus so schwach zusammen, daß sie sich in den gewöhnlichen Fällen leicht davon absondern läßt. Man kann bey Versuchen mit einiger Behutsamkeit fast immer die Linsc samt ihrer Kapsel durch eine Oeffnung in der durchsichtigen Hornhaut ausziehen. Eben so leicht, ohne Zweifel, und vermuthlich noch leichter, läßt sie sich sammt ihrer Kapsel niederdrücken. Man hat verschiedentlich, (Janin und andre) Staarlinsen, welche niedergedrückt worden, und nach einiger Zeit
wieder

wieder aufgestiegen waren, durch die gewöhnliche Operation ausgezogen, und gefunden, daß sie mit ihrer Kapsel umgeben waren. Jämmer liegt, sowohl bey der Operation der Umlegung als auch der gewöhnlichen Niederdrückung die Nadel außerhalb der Kapsel auf der Staarlinse, immer muß sie also diese sammt jener niederdrücken. Und gesetzt, daß in einem besondern Falle die Nadel in die Kapsel einsticht, so ziehet sie dennoch dieselbe vornemlich wenn es eine zweyschneidige Nadel ist, mit sich in den Boden des Auges herab. Wenn nach der Operation der Niederdrückung, die Kapsel an ihrer Stelle bleibt, läßt sich nicht einsehen, wie es möglich ist, daß die niedergedrückte Linse lange nach der Operation wieder aufsteigen kann; da die leere Kapsel nothwendig nach der Operation zusammenschrumpft, durch die wässerichte und gläserne Feuchtigkeit zusammen gepreßt wird, und sich schließt. In die Kapsel kann folglich die Linse einige Zeit nach der Operation nie wieder treten. Und ist es wohl glaublich, daß sie vor die Kapsel oder zwischen die Kapsel und die gläserne Feuchtigkeit tritt? Dies zum vorausgesetzt, wie ist es möglich, daß sie zuweilen durch die Pupille in die vordere Augenkammer fällt?

S. 225.

Die Meynung einiger ältern Wundärzte, welche glaubten, daß bey dem Drucke der Nadel auf den obern Rand der Staarlinse, die Kapsel unten und hinten zerreisse, die Linse durch diese Oeffnung aus der Kapsel herunter in den Boden des Auges

trete, die Kapsel oben an ihrer Stelle zurück bleibe, ist also wahrscheinlich in den meisten Fällen ungegründet. Nur in einigen besondern Fällen, wo die Kapsel ungewöhnlich dünn und schwach, und die Verbindung derselben mit der Haut der gläsernen Feuchtigkeit ungewöhnlich stark ist, ist es allenfalls glaublich, daß die Kapsel beym Drucke der Nadel springt, und durch die Nadel zwar herunter gezogen wird, sogleich nachher aber sich wieder in die Höhe zieht. Jedoch kann sich dieser Fall nie bey der Umlegung, sondern allenfalls nur bey der gewöhnlichen Niederdrückung ereignen.

S. 226.

Aus diesem erhellet nun die Unbrauchbarkeit der vormals so berühmten Ferrenschen Methode der Niederdrückung (s. Henkels chir. Operat. erstes Stück, S. 14). Die Absicht bey derselben ist, jederzeit bey der Operation zuerst den untern und hintern Theil der Kapsel mit der Spitze der Nadel zu öffnen, und dann erst die Nadel aufzuheben, und die Staarlinse aus ihrer Kapsel durch die gemachte Oeffnung herunter zu drücken. Vorzüglich hielt man diesen Handgriff in dem Falle für nothwendig, den man den elastischen Staar (cataracte à ressort) nannte. Es geschieht nämlich zuweilen, daß die Staarlinse einem gelinden Drucke der Nadel Widerstand leistet, bey einem vermehrten Drucke zwar weicht, und in den Boden des Auges herabsteigt, jederzeit aber, so oft auch der Handgriff wiederholt wird, sogleich wieder in die Höhe steigt, wenn die Spitze der Nadel wieder aufgehoben wird. Man glaubte,

glaubte, daß in diesem Falle die Kapsel widernatürlich zähe sey, bey dem Drucke der Nadel und der Staarlinse gegen den untern Theil derselben nicht zerreiße, sondern sich bloß so sehr verlängere, daß zwar die Linse bis unter die Pupille herabsteige, dennoch aber immer noch in der Kapsel befindlich sey; und so bald der Druck der Nadel aufhöret, durch die Kapsel, die sich alsdann wieder verkürzt, und zusammen ziehet, wieder herauf gezogen werde. Diesem Falle war nun die Ferrensche Methode, wobey mittelst der Nadel die Kapsel unten und hinten geöffnet wird, angemessen; sie erleichterte, so glaubte man, die Niederdrückung der Linse, verhütete das Wiederaufsteigen derselben, und die Verletzung, welche die innern Theile des Auges bey der gewaltsamen Verlängerung der Kapsel leiden mußten. Da aber diese angebliche Zähigkeit der Kapsel, dieser sogenannte elastische Staar nie vor der Operation zu erkennen ist, da die Erscheinungen, wodurch er während der Operation entdeckt wird, jederzeit mit einer heftigen Ausdehnung und Spannung, ja wohl gar Zerreißung der innern Theile des Auges, und folglich mit der Gefahr einer heftigen Entzündung verbunden sind, hielt man es für rathsam, die Ferrensche Methode nicht bloß auf diesen Fall einzuschränken, sondern als eine allgemeine Methode bey der Operation eines jeden grauen Staars zu empfehlen. Ist, sagte man, der Staar kein elastischer Staar, so ist der Handgriff unschädlich; ist er elastisch, so verhütet derselbe die gewaltsame Ausdehnung der Kapsel, die nie ohne Gefahr ist.

§. 227.

Man hat sogar, um das Auge bey der Operation der Niederdrückung noch mehr zu schonen, (Henkel, chir. Operat. erstes Stück, §. 19. 20) den Vorschlag gethan, bey der Operation eines jeden Staar bloß die Kapsel unten und hinten zu öffnen, und die Nadel sogleich wieder aus dem Auge zu ziehen, ohne die Linse niederzudrücken. Fälle, in welchen die Staarlinse bey Gelegenheit einer heftigen Erschütterung des Körpers sich von freyen Stücken in den Boden des Auges senkte, machten es wahrscheinlich, daß sie sich nach Eröffnung der Kapsel gleichfalls, und noch viel gewisser herabsenken würde. — Man siehet leicht den Ungrund dieser Vorschläge ein. — Wozu nützt es die Kapsel zu öffnen, da sie vermöge obiger Beweise in den meisten Fällen sammt der Staarlinse niedergedrückt wird? — Man würde, falls dieser Handgriff wirklich die Absicht erfüllte, den Kranken der Gefahr des Nachstaars aussetzen, und folglich die Operation auf eine unvollkommenere Art verrichten. — Der sogenannte elastische Staar entsteht nicht auf obenbeschriebene Art, ist weiter nichts als ein angewachsener Staar, wie sogleich im folgenden erhellen wird, folglich ist der Ferrensche Handgriff zwecklos. — Die Kapsel bloß öffnen, und erwarten, daß die Staarlinse von sich selbst herabsteigt, heißt den glücklichen Erfolg der Operation, den der Wundarzt in dem Augenblicke der Operation durch einen einzigen, leichten, unschädlichen Handgriff völlig in seiner Gewalt hat, einem ungewissen Ohngefähr überlassen. — Man hat

hat noch allerhand andre Handgriffe und Operationsarten vorgeschlagen, (Henkel) die aber kaum verdienen, besonders bemerkt zu werden.

§. 228.

Der häutige Staar, der von einer Verdunkelung der Kapsel herrührt, wird zuweilen weder vor, noch während der Operation entdeckt. Man drückt die Staarlinse nebst ihrer Kapsel nieder, ohne zu wissen, ob die letztere verdunkelt ist, oder nicht. Auch wenn man vor der Operation die Verdunkelung der Kapsel zuverlässig entdeckt, hat man doch keine Ursach die gewöhnliche Operationsart im geringsten zu ändern, da bey derselben, vorzüglich bey der Umlegung der Krystalllinse die Linse jederzeit mit ihrer Kapsel niedergedrückt wird. Dies geschieht so gewiß, daß man sich zur Regel machen kann, jederzeit wenn die Kapsel verdunkelt ist, die Umlegung allen andern Operationsarten vorzuziehen. Wenn ja in ungewöhnlichen Fällen die Kapsel während der Niederdrückung zerspringt, und nicht zugleich mit der Linse ganz niedergedrückt wird, so muß dieselbe nachher besonders niedergedrückt werden. Eine zweyschneidige Nadel ist in diesem Falle der runden weit vorzuziehen, da sie die Kapsel besser faßt, als die runde.

§. 229.

Der Nachstaar (*cataracta secundaria*) entsteht selten nach der Niederdrückung, weil gemeiniglich die Kapsel sammt der Linse niedergedrückt wird.

Ent-

Entsteht er ja, so darf man sich mit der zweyten Operation nicht übereilen, da die Erfahrung zeigt, daß er sich oft ziemlich lange nach der ersten Operation allmählig und von freyen Stücken verliehrt, oft auch dem Gebrauche innerer Arzneymittel weicht. Man hat desto mehr Ursach, diesen Rath zu befolgen, da die Operation des Nachstaars immer mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Der Nachstaar ist entweder die Folge der Entzündung der Kapselfel, und in diesem Falle entsteht er bald nach der Operation, und gemeiniglich unter einer heftigen Entzündung des ganzen Auges; oder er ist die Wirkung der nach der Operation fortwirkenden gichtischen, venerischen, scrophulösen u. s. w. Ursache der ersten Verdunkelung, und in diesem Falle entsteht er gemeiniglich spät, ja einige Jahre nach der Operation, zuweilen mit, zuweilen ohne Entzündung des Auges. Im ersten Falle verliehrt er sich zuweilen mit der Entzündung, oder weicht, wenn er zurück bleibt den spanischen Fliegenpflastern, und dem innern Gebrauche auflösender Mittel, vorzüglich der Spießglasmittel, des Kampfers, des Schierlings, des flüchtigen Hirschhornsalzes u. s. w. In dem zweyten Falle sind die Mittel, die der besondern gichtischen, scrophulösen u. s. w. Ursache der zweyten Verdunkelung angemessen sind, zuweilen von einigem Nutzen.

S. 230.

Wenn diese Mittel nicht fruchten, so kann der Wundarzt eine zweyte Operation versuchen. Es kommt

kommt dabey darauf an, die verdunkelte Kapsel niederzudrücken, oder wenn dies nicht möglich ist, zu zerreißen, zu durchbohren, und den Lichtstrahlen, so gut, als es sich thun läßt, einen Weg ins Auge zu bahnen. Die zweyschneidige Nadel ist hier weit bequemer als die runde. Nur muß man sich erinnern, daß die verdunkelte Kapsel gemeinlich an die Regenbogenhaut, und die Haut der gläsernen Feuchtigkeit widernatürlich angeklebt ist, wodurch alle diese Handgriffe sehr erschweret werden. — Dieselbe Operation erfordern auch die verschiedenen Gattungen des sogenannten unächten Staars, vorzüglich die Verdunkelung der Krystallhaut. Es kommt hier aber nicht darauf an, sie niederzudrücken, sondern vielmehr sie zu zerreißen, und zu durchbohren, und solchergestalt eine Oeffnung für die Lichtstrahlen zu machen. Die Ränder der gemachten-Oeffnung, schrumpfen allmählig zusammen, ziehen sich zurück, verwelken, und vergrößern solchergestalt die gemachte Oeffnung allmählig.

§. 231.

Der angewachsene Staar erregt, so wie er von verschiedner Art ist, verschiedene, und bald mehr bald weniger Schwierigkeiten bey der Operation. Die erste Gattung desselben, die widernatürliche Zusammenklebung der Kapsel mit der Linse verursacht ganz und gar keine Schwierigkeiten bey der Operation der Niederdrückung; ja sie wird nicht einmal entdeckt. Der Wundarzt drückt die Linse sammt der Kapsel nieder, ohne zu bemerken, ob diese

diese beyden Theile zusammen geklebt sind oder nicht. — Die Adhäsion der Kapsel an die Haut der gläsernen Feuchtigkeit veranlaßt bey der Operation die Erscheinungen, die man dem elastischen Staare (S. 226) sonst zuzuschreiben pflegte. Es kommt hier alles darauf an, die Kapsel von dem Körper der gläsernen Feuchtigkeit abzusondern, und dies bewerkstelligt man durch einen von folgenden zwey Handgriffen. Man bewegt nämlich die Nadel hinter der Staarlense einigemal aufwärts bis an den obern Rand der Linse, und unterwärts bis an den untern Rand derselben. Man sondert dadurch offenbar die Linse von der gläsernen Feuchtigkeit ab, zumal wenn man sich einer zweyschneidigen Nadel bedient, und während dieses Handgriffs die eine Schneide aufwärts die andre unterwärts richtet. Einige (Warner) rathen die Nadel nicht allein hinter der Staarlense aufwärts und niederwärts zu bewegen, sondern auch wechselseitig auf den obern und untern Rand der Staarlense zu legen, und dieselbe wechselseitig ein wenig aufzuheben und niederzudrücken, um ihre widernatürlichen Verbindungen zu lösen. Indessen ist bey der Art der Adhäsion, wovon jetzt die Rede ist, dieser Handgriff wohl überflüssig, da durch die bloßen Bewegungen der Nadel auf und nieder die Verbindung der Linse mit dem Körper der gläsernen Feuchtigkeit hinlänglich getrennt wird. — Wenn im Falle dieser zweyten Gattung der Adhäsion die Kapsel dünn und an die Linse nicht angeklebt ist, zerspringt sie zuweilen bey den ersten Versuchen der Niederdrückung; die Linse tritt alsdann herunter, und die

leere

leere Kapsel ziehet sich in ihre vorige Stelle zurück, und muß nachher besonders so wie bey Gelegenheit des Kapselstaars gezeiget worden ist, weggeschafft werden.

S. 232.

Die Adhäsion des Staars an die Regenbogenhaut erkennt der Wundarzt aus den bereits angeführten Zeichen (S. 177 vor der Operation ganz deutlich. Ist die ganze vordere Ueberfläche des Staars an die Regenbogenhaut angeklebt, so sollte man die Operation lieber ganz und gar nicht unternehmen. Wahrscheinlich ist die Absonderung des Staars von der Regenbogenhaut nicht möglich; und bewerkstelligt sie der Wundarzt allenfalls, so hat er eine heftige Entzündung zu befürchten, die die Operation fruchtlos macht. Ist aber der Staar nur an der einen oder andern Stelle an die Regenbogenhaut angeklebt, so hat die Operation einen glücklichen Erfolg. Am besten thut man hier, wenn man diese Adhäsion durch den kurz vorher (S. 231) beschriebenen Warnerschen Handgriff zu lösen sucht. Man giebt zwar den Rath, die Nadel um den obern Rand der Staarlinse herum in die hintere Augenkammer zu bringen, und zwischen dem Staar und der Regenbogenhaut herunter zu drücken, und dadurch die Vereinigung dieser beyden Theile zu trennen, da aber dieser Handgriff immer mit der Gefahr, die Regenbogenhaut zu verletzen, verbunden ist, sollte man zu demselben seine Zuflucht nicht eher nehmen, als bis man sich überzeugt hat, daß der erste Handgriff unzureichend ist.

S. 223.

S. 233.

Sonst war man allgemein der Meinung, daß der flüssige Staar mittelst der Nadel keinesweges operirt werden könne; neuere Erfahrungen haben indessen das Gegentheil gezeigt. Zuweilen drückt man die Kapsel samt der aufgeloßten Staarlense nieder, und die Operation gelingt aufs vollkommenste und leichteste, ohne daß der Wundarzt vielleicht die wahre Beschaffenheit des Staars bemerkt. Indessen geschieht dies wahrscheinlich nur alsdann, wenn die Kapsel ungewöhnlich fest und zähe ist, und mit dem Körper der gläsernen Feuchtigkeit schwach zusammen hängt. — In den meisten Fällen erblickt man gleich zu Anfange der Operation die Nadel mitten in der Kapsel zwischen der gallerartigen oder milchichten Staarlense; es sey nun, daß die Nadel gleich beym ersten Einstich in die Kapsel dringt, oder daß sie die Kapsel entzwey drückt, indem sie auf dieselbe gelegt wird. In diesem Falle ist es am rathsamsten, die vordere Haut der Kapsel mit der Nadel sogleich zu öffnen, und die aufgeloßte Linse in die wässerichte Feuchtigkeit fließen zu lassen. Dies geschieht sehr leicht, und bey geringer Behutsamkeit, ohne Verletzung der Regenbogenhaut, da man die Spitze der Nadel deutlich siehet. Indessen ist es nicht genug, daß man die Krystallhaut bloß durchsticht; man muß durch die Bewegung der Nadelspitze aufwärts, niederwärts und seitwärts eine ansehnliche Oeffnung in dieselbe machen, und sie wo nicht ganz, doch größtentheils zerreißen und vernichten, damit alles was in der
Kapsel

Kapsel ist, in die vordere und hintere Augenkammer, und die wässerichte Feuchtigkeit frey und ungehindert in die Kapsel tritt; und falls eine Verdunkelung der vordern Haut der Kapsel nach der Operation erfolgt, nicht eine neue Blindheit erregt wird. Dieser Handgriff läßt sich gleichfalls mit einer zweyschneidigen Nadel vollkommener verrichten, als mit einer runden. Zuweilen springt die Kapsel, indem man sie niederdrückt, und die milchichte Feuchtigkeit ergießt sich in die hintere und vordere Augenkammer; da dann alle andre Handgriffe unnöthig sind.

S. 234.

Sobald die Krystallhaut durchbohrt wird, dringt der milchichte oder gallertartige Staar aus der Kapsel in die wässerichte Feuchtigkeit, und macht dieselbe mehr oder weniger trübe, ja zuweilen so undurchsichtig, daß die Pupille nebst der Nadel hinter derselben unsichtbar wird. Erfahrungen (Pott) zeigen, daß diese Trübigkeit sich gemeiniglich allmählig, ja oft innerhalb wenig Tagen verliert, und der Kranke das Gesicht vollkommen erhält: ja daß sich sogar die festern Ueberbleibsel der Krystalllinse, wenn deren einige vorhanden sind, allmählig auflösen und verlihren. Indessen wenn der milchichten Feuchtigkeit so viel ist, daß die wässerichte Feuchtigkeit davon ganz undurchsichtig wird, oder wenn man in derselben, wie zuweilen geschieht, Fasern, Flocken oder andre kleine feste Ueberbleibsel wahrnimmt, so scheint es rathsamer zu seyn, durch eine Oeffnung in der Hornhaut die wässerichte Feuchtigkeit samt allen

Richt. Wundarzneyk. III. B. D trüben

trüben Ueberbleibseln des Staars sogleich auszuleeren, als die langsame und ungewisse Zertheilung und Auflösung derselben zu erwarten. Die Oeffnung in der Hornhaut ist ohne alle, auch die mindeste Gefahr. Sie schafft dem Kranken das Gesicht sogleich, und sogleich eine große Beruhigung. Sie schafft es ihm gewiß, da man hingegen unwidersprechlich bemerkt hat, daß die festern Ueberbleibsel der Staarlinse (und man kann nie sicher seyn, daß dergleichen nicht da sind) nicht selten viele Jahre unverändert bleiben, das Gesicht auf mancherley Art stöhren, und am Ende dennoch durch eine Oeffnung in der durchsichtigen Hornhaut ausgezogen werden müssen.

§. 235.

Siehet man mit Gewißheit zum voraus, daß der Staar flüssig ist, so kann man, um die Verletzung der gläsernen Feuchtigkeit hinter dem Staare ganz und gar zu vermeiden, und die Handgriffe bey der Operation zu vermindern, die Nadel sogleich dergestalt ins Auge stechen, daß sie geradezweges in die Kapsel dringt, und dann die vordere Haut derselben auf vorbemeldete Art durchbohren. Ja man könnte in diesem Falle die Operation auf eine noch einfachere Art verrichten, und die Nadel durch die durchsichtige Hornhaut und Pupille stoßen, die vordere Haut der Kapsel öffnen, und den Staar ausfließen lassen. — Zuweilen ist im Falle des flüssigen Staars die Kapsel zugleich verdunkelt. Bemerket man dies vor der Operation, so muß man, nachdem die

die vordere Haut der Kapsel durchbohret, und der Milchstaar in die wässerichte Feuchtigkeit ausgeleeret ist, ehe man die Nadel aus dem Auge ziehet, noch die Handgriffe machen, die beym Kapselstaar empfohlen worden sind. Freylich bleibt der Erfolg hier immer ungewiß, da man durch die trübe wässerichte Feuchtigkeit die Pupille und Nadel nicht unterscheidet, und folglich nicht erkennen kann, ob die letztere an der gehörigen Stelle, und die erstere klar und rein ist. Erfolgt nach der Operation eine Verdunkelung der Kapsel, oder war sie vor derselben schon da, aber nicht bemerklich, so entdeckt sie der Wundarzt nicht eher, als nachdem die wässerichte Feuchtigkeit wieder klar und durchsichtig worden ist.

S. 236.

Der weiche (käsigte) Staar verhält sich bey der Operation gleichfalls verschiedentlich. Ist er von einiger Festigkeit, und ist die Kapsel nicht sehr dünn und zerreiblich, so weicht der Staar zugleich mit seiner Kapsel herunter in den Boden des Auges, und die Operation geht auf die gewöhnliche Art leicht und glücklich von statten. Freylich ist in diesem Falle, da der weiche Staar gemeiniglich groß ist, die Zerrüttung der gläsernen Feuchtigkeit auch immer größer, als in den gewöhnlichen Fällen, vornehmlich, wenn man den Staar umlegt, und da dieselbe in einem gewissen Grade nicht ohne üble Folgen seyn kann, der Erfolg der Operation immer zweyfelhaft. — Ist der Staar sehr weich, und die Kapsel sehr dünn, so erblickt man gemeiniglich die

Nadel gar bald hinter der Pupille mitten im Staare. Sonst gab man den Rath, den weichen Staar, der beim gelindesten Drucke gemeinlich in mehrere Stücke zerbricht, stückweise niederzudrücken, und den Handgriff so oft zu wiederholen, bis alle Stücke niedergedrückt sind; ein Rath, der von allen Seiten betrachtet verwerflich ist. Am besten thut man, wenn man, wie im Falle des flüssigen Staars, sobald man die Nadel in der Kapsel erblickt, die vordere Haut der Kapsel mit der Spitze der Nadel durchbohrt, die Oeffnung hinlänglich erweitert, damit die wässerichte Feuchtigkeit frey und ungehindert in die Kapsel treten, und den Staar auflösen kann; und dann die Nadel zwischen den Fingern umrollt, um den Staar in mehrere kleine Stücke zu zerbrechen, und dadurch die Erweichung und gänzliche Auflösung desselben zu befördern. Merkt der Wundarzt mit Gewißheit zum voraus, daß der Staar weich ist, so sollte er, um die Zerrüttung der gläsernen Feuchtigkeit hinter dem Staar, die wenn der Versuch der Niederdrückung gelingt, unvermeidlich ist, zu vermeiden, lieber die Nadel sogleich so einstecken, daß sie in die Kapsel dringt, und den Staar zermalmen, und die Kapsel öffnen. — Wiederholte Erfahrungen beweisen, daß nach dieser Behandlung auch der weiche Staar allmählig aufgelöst und zertheilt wird. Bemerkt man ja nach einiger Zeit festere Ueberbleibsel des Staars, die sich nicht auflösen scheinen, so kann man noch immer die Hornhaut öffnen, und sie ausziehen.

§. 237.

Dies sind die wichtigsten Verschiedenheiten des Staars, die bey der Operation eigene Handgriffe und Behandlungsarten erfordern. Alle andre minder wichtige können nach diesen beurtheilt werden. — Von denen Folgen der Operation, die die Niederdrückung mit der Ausziehung des Staars gemein hat, wird nachher, wenn von der letztern gehandelt worden ist, vollständig gehandelt werden. Hier also nur von einigen Zufällen und Folgen, die der Niederdrückung eigen sind. — Die Blutung, welche sich zuweilen während, oder gleich nach der Operation ereignet, entspringt entweder aus einem verletzten Gefäße in der Conjunctiva, oder choroidea, oder aber sie rührt von einer Verletzung der Regenbogenhaut oder process. ciliarium her. Die Blutung aus der Conjunctiva kann man zuweilen verhüten, wenn man einen Augenblick vorher, ehe man die Nadel ins Auge stoßt, das Auge im äußern Augenwinkel mit dem Finger ein wenig reibt. Die größern Gefäße in der Conjunctiva werden dadurch sichtbar, und können vermieden werden. Indessen ist diese Blutung immer von geringer Bedeutung. Die einzige Unbequemlichkeit, die sie erregt, rührt davon her, daß das Blut gemeiniglich ins Zellengewebe unter die Conjunctiva dringt, und eine Ecchymosis erregt, die zuweilen den Umfang des Nadelstichs in einen kleinen Berg aufhebt, zuweilen auch wohl sich über den ganzen äußern Augenwinkel und untern Theil des Augapfels ausbreitet, übrigens aber mehrentheils sich allmählig, und ohne andre üble Zufälle zu erregen, verliert.

§. 238.

Die Blutung aus der Choroidea entsteht freylich bey dem Gebrauche der zweiseitigen Nadel am leichtesten, ist aber auch gerade alsdann am wenigsten zu fürchten, weil das Blut durch die kleine Schnittwunde in der Sclerotica, immer nach auswärts dringt, und außer denen Erscheinungen, die die Blutung aus der Conjunctiva verursacht, selten irgend eine andre Beschwerde erregt. Uebrigens ist auch bey dem Gebrauche der zweiseitigen Nadel diese Blutung ein seltner Zufall, wenn der Wundarzt, die bereits oben gegebne Regel beobachtet, und die Nadel ein wenig unter der Mitte, die eine Fläche aufwärts, die andre unterwärts gerichtet, einsticht. — Bey dem Gebrauche der runden Nadel entsteht zwar überhaupt diese Blutung seltner, ist aber, wenn sie entsteht, mehr zu fürchten, als im vorhergehenden Falle, weil das Blut durch den feinen Nadelstich nicht auswärts dringen kann, und folglich in die gläserne Feuchtigkeit dringt. Da aber in diesem Falle die Blutung selten beträchtlich ist, verliert sich das wenige ausgetretne Blut, ohne widrige Zufälle zu erregen, gemeinlich bey dem Gebrauche der allgemeinen entzündungswidrigen Mittel gar bald.

§. 239.

Wenn bey der Operation der Niederdrückung eine Blutung aus der Regenbogenhaut, oder dem process. ciliar. entsteht, dringt das Blut gemeinlich sogleich in die vordere und hintere Augenkammer, und färbt die wässerichte Feuchtigkeit mehr oder weniger

weniger roth. Im ersten Falle wird die Pupille unsichtbar, und der Wundarzt ist genöthigt, den Handgriff der Niederdrückung blindlings zu machen, unwissend, ob er gelingt oder nicht, und ob die Pupille rein wird, oder nicht. Im letztern Falle, wo die wässerichte Feuchtigkeit noch einige Durchsichtigkeit behält, unterscheidet der Wundarzt die Pupille, und die Nadel hinter derselben, und der Erfolg der Operation ist weniger zweifelhaft. — Zuweilen ist die Blutung stark, und dauert fort. Ein Fall, der sich übrigens nur sehr selten ereignet. Das erste erkennt der Wundarzt aus der starken undurchsichtigen; das zweyte aus der immer zunehmenden Röthe der wässerichten Feuchtigkeit. Der Wundarzt thut in diesem Falle wohl, wenn er die Nadel sobald als möglich aus dem Auge ziehet, die durchsichtige Hornhaut öffnet, und die wässerichte Feuchtigkeit sammt dem ausgetretenen Blute ausfließen läßt. Er verhütet dadurch eine heftige Entzündung, die von der schnellen widernatürlichen Anfüllung und Ausdehnung der vordern Augenkammern zu fürchten ist, und schafft das Blut aus dem Auge, das in diesem Falle gemeiniglich feste Massen bildet, die sich schwerlich auflösen, und in der Folge das Gesicht hindern. Ist die Blutung geringe, so hindert sie die Operation nicht, und das ausgetretne Blut verliert sich bey dem Gebrauche der entzündungswidrigen Mittel gemeiniglich gar bald. Da indessen diese Art der Blutung immer eine Verletzung der Regenbogenhaut, oder der processuum ciliar. zum Grunde hat, hat der Wundarzt immer Ursach

aufmerksam zu seyn, um einer möglichen heftigen Entzündung vorzubauen.

§. 240.

Die kleine Stichwunde in den Häuten des Auges heilt gemeiniglich ohne alle Weitläufigkeit. Zuweilen erzeugt sich ein kleiner schwammichter Auswuchs, der aber dem Gebrauche zusammenziehender Mittel gemeiniglich gar bald weicht. — Manchmal erfolgt der schwarze Staar nach der Niederdrückung (Mohrenheims Beiträge erster Band). Vielleicht rührt derselbe von dem Drucke des unter den glasförmigen Körper geschobnen Staars auf die retina her. Vielleicht ist diese üble Folge vorzüglich alsdann zu fürchten, wenn der Staar groß, und hart, und sehr tief herunter ins Auge gedrückt worden ist. Nach der Umlegung der Staarlinse möchte er wahrscheinlich wohl am wenigsten zu fürchten seyn. Man hat bemerkt, daß sich dieser schwarze Staar zuweilen allmählig wieder verliert; vermuthlich so wie sich die niedergedruckte Staarlinse allmählig auflöst, und folglich der Druck auf die retina aufhört. Wie nun aber, wenn dies nicht geschiehet? Könnte man nicht durch eine lebhafte Bewegung oder Erschütterung des Kopfs in vorgebeugter abhängender Lage die Lage des Staars vielleicht so ändern, daß er der retina nicht mehr lästig ist, oder daß er völlig wieder in die Höhe steigt, und ausgezogen werden kann?

Die Ausziehung des Staars.

§. 241.

Daviel, ein französischer Wundarzt hat diese Operationsart in der Mitte des jezigen Jahrhunderts zuerst in allgemeinen Gebrauch gebracht; ob gleich schon vor ihm mehrere sie erfunden und vorgeschlagen haben wollen. Sie erhielt gar bald bey nahe den allgemeinen Beyfall der Wundärzte. Viele suchten sie zu verbessern, und zu vervollkommenen. Und so entstanden gar bald eine Menge Methoden, den Staar auszuziehen, welche insgesammt hier unmöglich weiläuftig beschrieben werden können. Nur von den vorzüglichern soll eine vollständige Nachricht gegeben werden. — Das eigenthümliche dieser Operationsart besteht darinnen, daß die Staarlinse nach Eröffnung der durchsichtigen Hornhaut, und vordern Haut der Kapsel durch die Pupille ganz aus dem Auge gedruckt wird.

§. 242.

Die mehrere oder mindere Hoffnung des glücklichen Erfolgs der Operation der Ausziehung hängt überhaupt von denenselben Umständen ab, von welchen sie bey der Operation der Niederdruckung (§. 193. 194. 195. 196. 197) abhängt; insbesondre aber hat der Wundarzt hiebey folgendes zu bemerken. Bey Kranken, welche sehr tiefliegende Augen, und wenig gespaltne Augenlider haben, ist die Operation immer mit einiger Schwierigkeit verbunden; immer ist sie desto leichter, je offner die Augenlider, und je hervorstehender das Auge ist. — Da das Messer,

womit die durchsichtige Hornhaut geöffnet wird, jederzeit zwischen der Hornhaut und Regenbogenhaut durch die vordere Augenkammer geführt wird, sieht man leicht ein, daß bey denen, die eine stark convexe Hornhaut, und folglich eine große vordere Augenkammer haben, die Operation vorzüglich leicht und sicher ist; bey denen hingegen, die eine platte Hornhaut haben, immer mit der Gefahr der Verletzung der Regenbogenhaut verbunden ist. — Die Operation der Ausziehung erfordert sehr viele Genauigkeit, und feine Handgriffe, immer ist sie daher bey sehr unruhigen Augen schwer und unsicher; bey Kindern aus dieser Ursache beynah ganz unthunlich.

§. 243.

Man kann den Staar ausziehen, er sey von welcher Consistenz er wolle. Indessen ist dennoch der harte Staar zur Ausziehung der Beste. Er ist gemeinlich klein, und dehnt daher bey seinem Austritte die Pupille nur wenig aus, erfordert keinen starken Druck aufs Auge, und tritt gemeinlich ganz und auf einmal hervor, ohne Ueberbleibsel in der Kapsel zurück zu lassen, die besonders ausgezogen werden müssen. Der flüssige Staar fließt gemeinlich sobald die Kapsel geöffnet wird, sogleich hervor, ohne die Pupille im mindesten ausdehnen, läßt aber gern einen Theil des trüben Schleims in der Kapsel zurück, der besonders ausgezogen werden muß. Der weiche oder käsichte Staar, ist der allerübelste. Er tritt entweder ganz und auf einmal hervor, und dann dehnt

dehnt er, da er gemeiniglich sehr groß ist, die Pupille sehr aus, und erfordert einen starken und anhaltenden Druck aufs Auge; oder er zerbricht, und dann muß er stückweise ausgenommen werden.

§. 244.

Da der Staar bey dieser Operationsart immer durch die Pupille aus dem Auge tritt, erfordert diese vor der Operation immer einige Aufmerksamkeit. Ist die Pupille weit, offen, und beweglich, so kann man sich von dieser Seite eine glückliche und leichte Operation versprechen. Zuweilen ist sie sehr klein, aber beweglich; dies hindert die Operation nicht; mehrentheils dehnt sie sich bey der Operation ohne Widerstand aus; zuweilen indessen erschwert sie dennoch den Durchgang der Linse. Auch wenn sie klein und unbeweglich ist, findet die Operation statt; zum vorausgesetzt, daß sie nicht zugleich an den Staar angeklebt ist: sie dehnt sich gemeiniglich bey der Operation aus; und thut sie dies nicht, so kann man sie dreust durch einen Schnitt erweitern. Man hat (Pellier, Wenzel) dies mit dem besten Erfolge gethan. Ist die Pupille weit und unbeweglich, so findet, zum vorausgesetzt, daß dies nicht vom schwarzen Staare herrührt, die Operation kein Bedenken. Man hat sogar gesehen, daß die Pupille durch die Operation ihre Beweglichkeit wieder erhalten hat.

§. 245.

Man hat immer geglaubt, daß man eine so feine Operation als der Staarschnitt ist, an einem
so

so beweglichen Theile, als das Auge ist, unmöglich mit der nöthigen Genauigkeit verrichten könne, und daher auf mancherley Mittel gedacht, das Auge während der Operation zu befestigen. Lafaye (Mem. de l'Acad. de Chir. de Paris T. VI. p. 314) gab den Rath, den Mittelfinger der Hand, womit das untere Augenlid niedergezogen wird, im innern Augenwinkel auf den Augapfel zu legen, und durch einen gelinden Druck, denselben zu befestigen. Da aber dieser Finger zuviel Raum einnimmt, und wenn das Auge klein ist und tief liegt, die Hornhaut im innern Augenwinkel, wo die Spitze des Messers aus der vordern Augenkammer kommt, bedeckt, überdem auch, wenn er nur wenig angedrückt wird, das Auge nicht befestigt, und wenn er zu stark angedrückt wird, die wässerichte Feuchtigkeit zu früh ausdrückt, sahe man bald die Unzulänglichkeit dieses Handgriffs ein. — Beranger (s. Sabatier Theses de variis cataractum extrahendi methodis, Paris. 1759) bediente sich, um das Auge zu befestigen, eines doppelten Haakens, den er in einiger Entfernung vom untern Rande der Hornhaut, in die Conjunctiva befestigte; le Cat faßte die Conjunctiva an eben diesem Orte mit einer kleinen Zange, die der Zange des Helvetius zur Abnehmung der Brüste gleich. Ein paar Werkzeuge, die das Auge auf eine sehr gewaltsame Art befestigen, heftig reizen, und entzündeten.

S. 246.

Unschädlicher und zugleich zweckdienlicher schien der Gebrauch des bekannten Pamarischen Spießes
(siehe

(siehe Tab. II. Fig. 1) zu seyn. Seine Spitze darf nicht über eine kleine halbe Linie lang seyn. Der kleine Querbalken hindert, daß sie nicht zu tief ins Auge dringt. Man setzt die Spitze desselben zur Seite des obern Randes der Hornhaut im innern Augenwinkel auf die Conjunctiva. Die Hand, in der man den Spieß hält, muß fest auf der Nase des Kranken liegen, man drückt sonst das Instrument leicht allzustark auf den Augapfel. Sobald die Spitze des Wassers im innern Augenwinkel aus der vordern Augenkammer hervortritt, muß das Instrument vom Auge abgenommen werden, theils weil es nun nicht mehr nöthig ist, theils weil der fortdauernde Druck desselben aufs Auge leicht einen plötzlichen Vorfall des Staars oder der gläsernen Feuchtigkeit, oder wenigstens einen zu frühen Ausfluß der wässerichten Feuchtigkeit veranlassen könnte, welcher, wie in der Folge erhellen wird, jederzeit sorgfältig zu vermeiden ist. — Da die Hand, in welcher der Wundarzt den Pamarischen Spieß hält, dem Kranken auf die Nase gelegt wird, welches in mancherley Absicht beschwerlich ist, hat man (Casaanata, s. Feller Dissert. de methodis suffusionem oculorum curandi etc. Lipsiae, 1782) diesem Instrumente die Gestalt eines römischen S (siehe Tab. II. Fig. 2) gegeben. Man erhält dadurch die Bequemlichkeit, daß man die Hand, welche das Instrument faßt, auf die Wacke des Kranken legen, und den Druck des Instruments aufs Auge mehr mäßigen kann.

S. 247.


Indessen ist dennoch der Gebrauch des letztern Instruments auch nicht ohne alle Unbequemlichkeit, da es jederzeit eine Hand für sich allein erfordert. Wenn man sich daher desselben bedient, sind jederzeit vier Hände zur Operation nöthig, eine für das Messer, eine für den Augenthalter, eine, die das obere Augenlid aufhebt, und eine, die das untere niederziehet; wenn man nicht etwa das letztere mittelst eines Haaften, an dem ein Gewicht hängt, herabziehen will. Alle diese Hände liegen auf dem Gesichte des Kranken, diesem und dem Wundarzte zur Last und im Wege. Um diese Unbequemlichkeit zu heben, hat man den Spieß auf einen Fingerhut (Tab. 2. Fig. 3) oder an einen Ring (Tab. 2. Fig. 4) befestigt, den man an den Mittelfinger der Hand setzt, womit man das untere Augenlid niederziehet. Dadurch wird eine Hand entbehrlich; der Wundarzt thut mit einer Hand zweyerley: mit dem Zeigefinger ziehet er das untere Augenlid herab; mit dem Mittelfinger befestigt er den Augapfel. Aber auch dies Werkzeug schien mangelhaft zu seyn. Der Wundarzt ist bey dem Gebrauche desselben genöthigt, mit einer Hand zweyerley zu thun, und lauft Gefahr, zumal da die rechte Hand seine ganze Aufmerksamkeit zu gleicher Zeit erfordert, das eine oder das andre nicht mit der gehörigen Genauigkeit zu thun, wenn er nicht sehr geübt, und aufmerksam ist; nicht zu gedenken, daß es wirklich, wie jeder bey dem ersten Versuche selbst merken wird, sehr schwer ist, den Spieß mittelst des Mittelfingers gehörig zu appliciren.

S. 248.


1111



11-22



TAB. II.



Jh. Da. Sc. del.

Richter Anfangsgr. 3 Band.

S. 248.

Man hat (Demours, Journal de medecine Tome LXIII.) daher auch diesen Mangel durch ein Werkzeug (Tab. 2. Fig. 5) zu verbessern gesucht, das wirklich vor allen bisher erfundenen Werkzeugen dieser Art, große Vorzüge zu haben scheint. Es gleicht einigermaßen einem vornen und hinten stark offenen Fingerhute, der, wenn er an den Finger gelegt wird, bloß die zwey Seiten desselben bedeckt, den Rücken, und die innere Seite des Fingers ganz entblößt läßt. Aus der obern mittlern Spitze des Fingerhuts steigt ein kleiner Haaken auf, der zuerst senkrecht aufwärts, und dann in einer horizontalen Richtung seitwärts geht. Die äußerste Spitze dieses Haakens ist ein wenig einwärts gebogen, damit sie das Auge desto leichter faßt, und nicht zu tief eindringt, und damit bey dem Gebrauche der Haaken am Auge liegt, und der Spitze des Messers nicht hinderlich ist, indem sie aus der Hornhaut tritt. Wegen dieser lehtern kleinen Biegung kann das Instrument, welches am linken Auge gebraucht wird, nicht am rechten Auge gebraucht werden. Der Vortheil, der mit dem Gebrauche dieses Werkzeugs verbunden ist, besteht darinnen, daß derselbe Finger, der den Haaken applicirt, auch zugleich das untere Augenlid mederziehet, und daß folglich zu diesen beyden Geschäften nicht zwey verschiedene Finger erfordert werden. Da der Finger auf der Backe fest liegt, hat man es in seiner Gewalt, den Druck des Instruments aufs Auge zu mäßigen. Die innere Seite des Fingers, die das Augenlid und den Aug-

apfel

apfel berührt, ist bloß, und vom Fingerhute nicht bedeckt, und liegt daher weich auf dem Augenslide.

S. 249.

Man kann wirklich im allgemeinen behaupten, daß alle diese bisher beschriebenen, und mehrere andre Instrumente dieser Art, welche nicht weitläufig angezeigt werden können, so vollkommen und zweckmäßig sie auch zu seyn scheinen, in den meisten Fällen weit mehr schädlich und unbequem, als nützlich und brauchbar sind. Je einfacher die Operation, je weniger die Aufmerksamkeit auf verschiedene Handgriffe zerstreut wird, je weniger das Auge dabey leidet, desto gewisser ist der glückliche Erfolg der Operation. Die Werkzeuge aber, die zur Befestigung des Auges dienen, reizen und drücken ohne Ausnahme das Auge, erregen Schmerzen, und theilen die Aufmerksamkeit des Wundarztes. Die Augenmuskeln, welche, sobald das Messer ins Auge gestochen wird, sich krampfhaft verkürzen, drücken die gläserne Feuchtigkeit, und durch diese die Regenbogenhaut gemeiniglich so stark hervor, daß sie gleichsam convex wird, und leicht unter die Schneide des Messers tritt. Der Reiz, den der Gebrauch des Augenhalters jederzeit verursacht, vermehrt die krampfhaftige Zusammenziehung der Augenmuskeln, und folglich das Hervordringen der Regenbogenhaut, welches überdem auch noch durch den Druck vermehrt wird, womit der Augenhalter applicirt wird. Der Wundarzt wird folglich in die Nothwendigkeit gesetzt, entweder die Regenbogenhaut zu verletzen, oder die

die Spitze und Schneide des Messers stark auswärts zu wenden, und folglich den Schnitt in der Hornhaut zu klein zu machen. — Es ist immer schwer, den Grad des Drucks zu treffen, der bey der Anwendung des Instruments erforderlich ist. Seht man es zu leicht auf, so reizt man bloß das Auge, und macht es unruhiger; nicht selten entwischt das Auge dem Instrumente, und verletzt sich in der Spitze desselben. Drückt man es zu stark auf, so erregt man den zu frühen Ausfluß der wässerichten Feuchtigkeit, und vermehrt das Hervordringen der Regenbogenhaut. Zieht man das Instrument nicht zu rechter Zeit vom Auge ab, so drückt man den Staar plötzlich durch die Pupille, und die gläserne Feuchtigkeit hinter ihm her. Uebrigens ist es für den Wundarzt immer schwer, mit zwey Händen zugleich zu operiren, und auf jede die nöthige Aufmerksamkeit zu haben.

§. 250.

Auch wirklich überflüssig und unnöthig sind diese Instrumente in den meisten Fällen. Es giebt eine doppelte Art von Bewegung des Auges, die dem Wundarzte bey der Operation beschwerlich fällt. Die erste ist die willkührliche. Die Angst und Furcht, in der sich der Kranke in dem Augenblicke der Operation befindet, vermehrt diese Bewegung, so daß sie beynah unwillkührlich wird. Gemeiniglich wird man, sobald man sich mit dem Messer dem Auge nähert, sehen, daß sich das Auge heftig im Kopfe herum wälzt, und daß der Kranke gar oft es nicht in seiner Gewalt hat, das Auge still zu
 Richt. Wundarzneyk. III. B. R halten,

halten, oder es dahin zu wenden, wohin er will. Diese Bewegung indessen, so heftig sie auch ist, ist bey weitem bey der Operation nicht so hinderlich, als man glauben sollte. Wenn man das Auge, welches nicht operirt wird, fest verbindet, und dadurch die Bewegung desselben, und folglich auch des Auges, welches man operiren will, mindert; wenn man das obere Augenlid mit dem oben empfohlenen Haaken von Draht, der zugleich auch den Augapfel ein wenig befestigt, aufhebt; wenn man den Finger, womit man das untere Augenlid niederzieht, zugleich ein wenig unten an den Augapfel andrückt; wenn man dem oben gegebenen Rathe zu folge, alles verhütet, was den Kranken furchtsam und unruhig machen kann; und wenn etwa das Auge unruhig ist, durch heftiges Zureden, es ruhig zu halten, seine Angst und Unruhe nicht vermehrt; wenn man dem Kranken eine halbe Stunde vor der Operation einige Tropfen Laudanum giebt, wird man das Auge bey der Operation gemeiniglich ruhig finden. Und wenn ja, indem man die Hand mit dem Messer ans Auge setzt, dasselbe unruhig wird, darf man nur einige Augenblicke warten, bis die erste Bestürzung des Kranken vorüber ist. Gar bald wird das Auge ruhig, und steht still. Steht es in einer zur Operation bequemen Richtung still, so stoße man das Messer geschwind und behutsam ins Auge. Sobald dies geschiehet, wird das Auge ganz unbeweglich, und sollte es sich ja bewegen wollen, so kann man es nunmehr mit dem Messer fest halten. — Aus allem diesen ersiehet man, daß diese erste

erste Art der Bewegung des Auges den Gebrauch der obigen Werkzeuge nicht erfordert.

S. 251.

Es giebt noch eine andre Bewegung des Auges, die das Messer, womit die Hornhaut durchschnitten wird, dem Auge mittheilt, und die man deswegen die unwillkührliche nennen kann. Zuweilen nämlich schiebt und wendet das Messer, indem es von dem äußern nach dem innern Augenwinkel hin durch die vordere Augenkammer gestoßen wird, das Auge dergestalt nach der Nase hin, daß sich ein großer Theil der Hornhaut im innern Augenwinkel verbirgt, und der Schnitt nicht vollendet werden kann. Man darf sich darüber nicht wundern, denn die Hornhaut ist zuweilen so zähe und hart, daß man eine ziemliche Gewalt anwenden muß, das Messer durchzustößen, ja daß man zuweilen, indem dies geschieht, ein Geräusch hört, als wenn man Pergament durchschneidet. Wenn man sich des bereits empfohlenen Haaken von Draht zur Aufhebung des Augenlides bedient, wenn man den Finger, der das untere Augenlid nieder ziehet, ein wenig an den Augapfel andrückt, wenn man dafür sorgt, daß das Messer gut schneidend und spizig ist, und ein Messer wählt, dessen Klinge nicht zu dick und breit ist, wird man durch diese Bewegung des Auges selten bey der Operation gehindert werden. — Gesezt aber, das Auge wendet sich demungeachtet bey jedem Versuche, das Messer fortzustößen nach den innern Augenwinkel hin, so bleiben dem Wundarzte drey

Wege zur glücklichen Endigung der Operation übrig, wovon er einen wählen muß. Entweder er ziehet mit dem Messer den Augapfel, so oft er sich in den innern Augenwinkel verbirgt, aus demselben jedesmal wieder hervor, und endigt allmählig den Schnitt; ein Handgriff, der weiter unten genauer beschrieben werden wird: oder er macht den Schnitt so lang als er vermöge der Lage des Auges kann, und vollendet ihn mittelst der Scheere, auf die Art und Weise, wie gleichfalls im folgenden weitläufiger gezeigt werden wird: oder aber er versieht den Finger gleich zu Anfange der Operation mit dem Demourschen Augenthalter, und setzt denselben, sobald er merkt, daß das Auge nach dem innern Augenwinkel weicht, außs Auge, und befestiget es.

Der Schnitt in der Hornhaut.

S. 253.

Der Wundarzt sowohl als der Kranke setzt sich bey dieser Operation eben so wie bey der Niederdrückung. Eben so werden auch die Augenlider gedffnet und befestiget. Es ist gut, wenn während des Schnitts in der Hornhaut viel Licht ins Auge fällt; indem sich die Pupille stark zusammenziehet, tritt die Regenbogenhaut nicht so leicht unter die Schneide des Messers, und man hat nicht zu fürchten, daß die Staarlense nach geendigten Schnitte plöglich hervorspringt; ein Zufall der immer verhütet werden muß; nicht zu gedenken, daß der Wundarzt bey diesem Theile der Operation wirklich

viel

viel Licht nöthig hat, um deutlich zu sehen. — Das Messer faßt der Wundarzt wie eine Schreibfeder. Die Hand, in welcher er es hält, drückt er fest auf die Wange des Kranken. Je fester er sie andrückt, desto mehr Sicherheit hat sie. — Sobald sich das Auge in der zur Operation bequemen Stellung befindet, muß das Messer eben so wie die Nadel plötzlich eingestochen werden. Das Licht muß dem Kranken schief über die Nase, oder seitwärts über den äußern Augenwinkel ins Auge fallen, so wie es der Wundarzt am bequemsten findet.

S. 253.

Der Schnitt in der Hornhaut, durch welchen die Staarlinse ausgezogen wird, muß einem halben Birkel gleichen, der im äußern Augenwinkel in der Mitte der Hornhaut anfängt, und durch die untere Hälfte derselben sich bis in die Mitte derselben im innern Augenwinkel erstreckt, in allen Punkten eine viertel Linie vom Weissen des Auges entfernt ist, und die untere Hälfte der Hornhaut dergestalt absondert, daß sie einen halbmondförmigen Lappen bildet. Man sticht, um einen solchen Schnitt zu machen, das Messer, die Schneide unterwärts, den Rücken aufwärts gerichtet, im äußern Augenwinkel eine viertel Linie vom Weissen des Auges, in die durchsichtige Hornhaut, stoßt es in der Richtung des Queerdurchmessers der Hornhaut durch die vordere Augenkammer, dergestalt, daß die Spitze desselben im innern Augenwinkel in eben der Entfernung vom Weissen des Auges aus der Hornhaut

hervor tritt. Dieser Schnitt schafft eine Oeffnung, die so groß ist, als der Querdurchmesser der Hornhaut, d. i. also, die so groß ist, als sie seyn muß und kann: und ist nirgends der Pupille gegenüber, folglich, falls er eine Narbe hinterläßt, dennoch nie dem Gesichte hinderlich. —

§. 191.

Es kommt bey diesem Theile der Operation alles darauf an, daß die Oeffnung in der Hornhaut die möglichste Größe hat. Je größer sie ist, desto leichter und sanfter tritt bey dem gelindesten Drucke des Fingers auf den Augapfel die Staarlinse durch die Pupille hervor; ist sie ein wenig zu klein, so wird ein starker und anhaltender Druck erfordert, um die Linse aus dem Auge zu schaffen, und nichts ist dem Auge schädlicher, nichts hat gewisser üble Folgen, als ein solcher Druck. Ist die Oeffnung um vieles zu klein, so tritt der Staar auch bey starken und anhaltenden Drucken ganz und gar nicht hervor; ist der Druck zu heftig, so springt die gläserne Feuchtigkeit hervor, der Staar bleibt zurück, die Pupille schließt sich, und der Kranke ist auf ewig blind. — Um dem Schnitte eine ansehnliche Größe zu verschaffen, rathen einige (Daviel) nicht die Hälfte, sondern zwey Drittel der Hornhaut abzuschneiden, d. i. die beyden Enden des Schnitts zu beyden Seiten aufwärts ohngefähr eine Linie hoch über den Querdurchmesser der Hornhaut zu erstrecken. Aber dadurch vergrößert man nicht allein die Oeffnung in der Hornhaut ganz und gar nicht, sondern

sondern man setzt sich auch mancherley Beschwerlichkeiten aus. In der Gegend des Queerdurchmessers ist die Oeffnung der Hornhaut so groß, als sie seyn kann, größer kann sie nicht seyn. Der Theil der Oeffnung, der sich über den Queerdurchmesser erstreckt, wird wieder enger, und ist also ohne Nutzen. Der Staar tritt durch den weitesten Theil der Oeffnung, der in der Mitte der Hornhaut befindlich ist; warum sollte er durch den engeren Theil derselben, der über der Mitte befindlich ist, treten? Es hilft also zu nichts, daß man den Schnitt höher als die Mitte der Hornhaut erstreckt. Auch erschwert man sich dadurch die Operation, weil es alsdann unmöglich ist, den Schnitt mit einem einzigen Instrumente zu vollenden, welches wie weiter unten erhellen wird, zum glücklichen Erfolg der Operation durchaus erfordert wird. Auch wird weiter unten erhellen, daß man, wenn man zwey Drittel der Hornhaut abschneidet, den Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit, und Regenbogenhaut weit mehr zu fürchten hat, als wenn man nur die Hälfte der Hornhaut abschneidet.

S. 255.

Der einzige Weg, dem Schnitte die möglichste Größe zu geben, ist, das Messer im Laufe des Queerdurchmessers der Hornhaut so nahe als möglich am Rande der Hornhaut im äußern Augenwinkel ein, und im innern Augenwinkel auszustossen. Je mehr der Eintritt und Austritt des Messers in die vordere Augenkammer vom Weißen des Auges ent-

fernt ist, desto kürzer wird die Deffnung. Indessen siehet man auch leicht ein, daß man immer um desto mehr in Gefahr ist, die Regenbogenhaut sowohl gleich bey dem ersten Einstiche, als auch während dem Durchgange des Messers durch die vordere Augenkammer zu verletzen, je näher man das Messer am Rande der Hornhaut einsticht, und je näher man es folglich an der Regenbogenhaut durch die vordere Augenkammer durchstoßt. Um beyderley Gefahren, nämlich die Gefahr den Schnitt zu klein zu machen, oder die Regenbogenhaut zu verletzen, möglichst zu vermeiden, geht der Wundarzt am sichersten, wenn er das Messer nicht zu nahe am Rande, aber auch nicht zu weit von demselben, d. i. in den gewöhnlichen Fällen eine starke viertel Linie von dem Weißen des Auges einstoßt. Indessen giebt es Fälle, wo er von dieser allgemeinen Regel abweichen kann und muß. Siehet er zum Exempel mit Gewißheit zum voraus, daß der Staat hart und klein, oder daß er flüssig oder sehr weich ist, und daß folglich eine große Deffnung zu seinem Austritte aus dem Auge nicht nöthig ist, so kann er das Messer eine halbe Linie vom Rande der Hornhaut ein, und austoßen, und dadurch die Gefahr die Regenbogenhaut zu verletzen, sehr vermindern. Ist die Hornhaut sehr platt, die Entfernung derselben von der Regenbogenhaut sehr geringe, und folglich die vordere Augenkammer sehr schmal, so ist die Gefahr, die Regenbogenhaut zu verletzen sehr groß, und der Wundarzt folglich bey dem Einstich in die Hornhaut genöthigt, sich so viel als möglich von

der

der Regenbogenhaut zu entfernen. Ist hingegen der Staar sehr groß, so hat der Wundarzt mehr Rücksicht auf eine hinreichende Oeffnung in der Hornhaut, als auf die mögliche Verletzung der Regenbogenhaut zu nehmen.

S. 256.

Einige (Wenzel) stechen das Messer oben und auswärts in die Hornhaut, so daß es in einer Richtung von oben nach unten, und ein wenig von außen nach innen durch die vordere Augenkammer geht, und unten und einwärts aus derselben wieder hervordringt, und nicht die untere, sondern die äußere Hälfte der Hornhaut absondert. Man glaubt, daß man bey diesem Schnitte den Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit nicht so sehr zu fürchten hat, als wenn man die untere Hälfte der Hornhaut abschneidet, die der unterwärts hervordringenden gläsernen Feuchtigkeit alsdann nicht Widerstand thun kann. Da aber die gläserne Feuchtigkeit, wenn sie nach der Operation vorfällt, nie bloß durch ihre Schwere hervorsinkt, sondern jederzeit durch irgend einen Druck, wovon in der Folge mehr gesagt werden wird, ausgepreßt wird, siehet man leicht ein, daß sie, wenn ein solcher Druck auf sie wirkt, eben so leicht seitwärts hervordringt, und daß folglich durch den Seitenschnitt der Vorfall derselben auf keine Art verhütet werden kann. Außerdem ist dieser Schnitt mit mancherley Schwierigkeiten verbunden. Bey tiefliegenden Augen ist er bennah ganz unthunlich: daß stark hervorstehende Stirnbein hindert

durchaus das Messer oberwärts in der Richtung in die Hornhaut zu stoßen, daß man es unterwärts wieder hervorbringen kann. Und bringt man es ja heraus, so verletz die Spitze desselben gewiß das untere Augenlid oder die Backe. Bey Personen, deren Augenlider nur wenig gespalten sind, wird man auch das Messer schwerlich von oben herab durch die vordere Augenkammer stoßen können, ohne das obere oder untere Augenlid zu verletzen. Und wie kann man endlich das Messer von oben herab ins Auge stoßen, ohne von den Fingern des Gehülften, der das obere Augenlid aufhebt, gehindert zu werden? Mehrerer Schwierigkeiten, die jeder leicht bey Versuchen bemerken wird, nicht zu gedenken.

§. 257.

Leichter wäre es beynah, die obere Hälfte der Hornhaut abzuschneiden. Man würde wenigstens alle die kurz vorher angezeigten Schwierigkeiten nicht antreffen, da das Messer hier, wie bey der gewöhnlichen Operation in horizontaler Richtung, nur die Schneide aufwärts gekehrt, durch die vordere Augenkammer gestoßen wird. Auch scheint bey diesem Schnitte der Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit noch weniger zu fürchten zu seyn, als beym Seitenschnitte. Indessen möchten auch bey diesem Schnitte sich mancherley Schwierigkeiten ereignen. Wenn der Staar nicht auf einmal und ganz hervor tritt, wird man es sehr schwer finden, den Löffel, das Instrument, womit die Ueberbleibsel desselben, die gemeiniglich im obern Theile der Kapsel befindlich sind, aus dem
 Auge

Auge geschafft werden müssen, von oben herab durch die Pupille ins Auge zu bringen. Eben so schwer wird es in allen Fällen seyn, das Instrument, womit die Kapsel der Krystalllinse geöffnet wird, von oben herab in die Pupille zu bringen. Außerdem spühlt die wässerichte Feuchtigkeit die nach der Operation eine Zeitlang ausfließt, den trüben Schleim, der oft zurück bleibt, und nicht weggeschafft werden kann, gar oft durch die untere Wunde der Hornhaut aus. Schwerlich läßt sich dies erwarten, wenn die Wunde am obern Theile der Hornhaut ist. Dazu kommt, daß das Auge bey der Operation sich gemeiniglich stark aufwärts drehet, und den obern Theil der Hornhaut verbirgt, die untere Hälfte derselben aber gemeiniglich frey ist.

S. 258.

Da der Schnitt in der Hornhaut zuweilen eine Verdunkelung derselben veranlaßt, und die gewaltsame Ausdehnung der Pupille bey dem Durchgange der Staarlinse manchmal üble Folgen hat, hat man (Bell, System of Surgery, Vol. III.) den Vorschlag gethan, den Schnitt nicht wie gewöhnlich in der durchsichtigen Hornhaut, sondern hinter derselben, zu machen, und solcher Gestalt nicht die vordere, sondern die hintere Augenkammer zu öffnen. Man soll nach diesem Vorschlage den Schnitt am obern Theile des Augapfels, ohngefähr den zehnten Theil eines Zolls hinter dem Rande der durchsichtigen Hornhaut, im Weißen des Auges so groß machen, daß die Staarlinse bequem durchgehen kann; und

und die Linse mittelst des Davielschen Löffels hervorziehen. Versuche an Kaninchen, die man gemacht hat, lassen, sagt man, vermuthen, daß man nicht Ursach hat, eine stärkere Entzündung zu fürchten, als nach der gewöhnlichen Operation. — Indessen ist es sehr zu zweifeln, daß dieser Vorschlag je allgemein bewerkstelligt werden wird. Der Handgriff selbst, von oben herab eine Linie hinter der Hornhaut ein schneidendes Instrument in senkrechter Richtung ins Auge zu bringen, ist mit großen Schwierigkeiten verbunden. Ueberdem ist es unmöglich ein schneidendes Instrument an dieser Stelle in die hintere Augenkammer zu stoßen, ohne die sclerotica, choroidea, retina, die processus ciliares, vielleicht das lig. ciliar. und höchst wahrscheinlich die Regenbogenhaut zu verletzen, und unmöglich kann die Verletzung dieser Theile ohne üble Folgen seyn. Und endlich ist der Grund, worauf dieser Vorschlag beruhet, unbedeutend: die Ausdehnung der Pupille, hinterläßt, wenn sie nicht plößlich und unbehutsam geschieht, sehr selten üble Folgen: und der Schnitt in der Hornhaut verursacht selten eine Undurchsichtigkeit, die das Gesicht hindert. — Nach allem diesem thut man wohl am besten, wenn man nach der gewöhnlichen Art, die untere Hälfte der Hornhaut durch den Schnitt auf oben beschriebene Art absondert.

§. 259.

Die Hauptregel, die der Wundarzt bey diesem Schnitte aufs sorgfältigste zu beobachten hat, ist diese:

II. III. C.



1800

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.




Fig. V.



Jh. Dam. D. del

Richter Anfangsgr. 3 Band.

diese: die wässerichte Feuchtigkeit darf nicht eher ausfließen, als bis der Schnitt in der Hornhaut vollendet ist. Fließt diese Feuchtigkeit eher aus, so fällt die vordere Augenkammer, indem das Messer noch in derselben ist, zusammen, die Hornhaut wird welk und schalff, die Regenbogenhaut legt sich an die Hornhaut an, tritt vor die Spitze, und unter die Schneide des Messers; es ist unmöglich das Messer durch die vordere Augenkammer zu bringen ohne die Regenbogenhaut zu verletzen, der Schnitt in der welken Hornhaut wird ungleich, und die ganze Operation mislingt. Um dieses zu verhüten muß man zur Durchschneidung der Hornhaut nur ein einziges Instrument anwenden. Braucht man mehrere, (wie Daviel) so fließt, so bald das erste Instrument die Hornhaut geöffnet hat, die wässerichte Feuchtigkeit aus, die vordere Augenkammer fällt zusammen, und das zweyte und dritte Instrument, womit die erste Deffaung erweitert wird, kann nicht ohne Reiz, Quetschung und Verletzung ins Auge gebracht werden. Nicht zu gedenken, daß der Schnitt in der Hornhaut, wenn er mit mehreren Instrumenten gemacht wird, gemeiniglich zackigt und ungleich werden wird.

S. 260.

Ferner muß, wenn die wässerichte Feuchtigkeit nicht zu früh ausfließen soll, das Messer (s. Tab. III. Fig. 1.) womit die Hornhaut durchschnitten wird, nothwendig folgende Eigenschaften haben. — Die Klinge desselben muß von der Spitze nach
dem

dem Griffe zu, allmählig und unterbrochen sowohl in der Breite als in der Dicke zunehmen, damit sie, so wie sie tiefer in die Hornhaut und vordere Augenkammer dringt, die Wunde in der Hornhaut nicht allein nach und nach verlängert, sondern auch immer so genau anfüllt, daß die wässerichte Feuchtigkeit neben derselben nicht durchdringen kann. Auch hat man wohl darauf zu achten, daß beym Schleifen das Messer diese Eigenschaft nicht verliert. — Die Klinge muß ferner an dem Orte, wo sie am breitesten ist, so breit als die Hälfte der Hornhaut, d. i. drey Linien breit seyn. Wenn man dies Messer in äußern Augenwinkel in der Mitte nahe am Rande in die Hornhaut sticht, und durch die vordere Augenkammer stoßt, so ist, so bald der Theil der Klinge, der drey Linien breit ist, in die vordere Augenkammer tritt, die Hälfte der Hornhaut abgelöst. Man vollendet also den Schnitt in einem Zuge, d. i. indem man bloß das Messer so weit ins Auge stoßt, bis der breitere Theil der Klinge in die vordere Augenkammer tritt. — Bedient man sich eines schmaalern Messers, so ist, wenn der breiteste Theil der Klinge in die vordere Augenkammer tritt, die Hälfte der Hornhaut noch nicht abgelöst: um sie vollends abzulösen, ist man genöthigt, das Messer wieder zurück zuziehen, um in diesem zweyten Zuge die Hornhaut vollends durchzuschneiden. Indem man aber das Messer zurück zieht, tritt der schmalere Theil der Klinge nun wieder in die Wunde der Hornhaut, läßt die Winkel der Wunde offen, die wässerichte Feuchtigkeit springt hervor,

hervor, die Regenbogenhaut fällt unter die Schneide, und die Operation mißlingt noch am Ende. — Durch unvorsichtiges Schleifen verliert das Messer auch diese Eigenschaft leicht.

S. 261.

Die Klinge des Messers muß von der Spitze an nicht schnell, sondern langsam breiter werden, so daß sich der breiteste Theil der Klinge in einer ziemlichen Entfernung von der Spitze befindet, und der vordere Theil der Klinge ganz schmaal nach der Spitze hinläuft. Ein solches Messer dringt leicht und sanft ins Auge. Die Messer hingegen, deren Klinge schnell breit wird, erfordern einen starken Druck, und dieser schiebt gemeiniglich das Auge in den innern Augenwinkel, wodurch der Wundarzt gehindert wird, den Schnitt zu vollenden. Außerdem schneiden diese Messer, indem sie in die Hornhaut dringen, schnell, und setzen den Wundarzt außer Stand, kleine Fehler in Absicht der Richtung des Messers und des Schnitts bey Zeiten zu verbessern. Ein Messer dessen Klinge in der Breite langsam zunimmt, wirkt langsam; der Wundarzt hat bey dem Gebrauche desselben Zeit, auf alles aufmerksam zu seyn, und kleine Fehler in der Richtung des Schnitts zu verbessern. Je langsamer die Breite der Klinge zunimmt, desto entfernter ist der breiteste Theil der Klinge von der Spitze, desto tiefer muß das Messer ins Auge gestochen werden, ehe es die Hälfte der Hornhaut ablst, desto länger ragt natürlicherweise bey der Operation seine Spitze im innern

innern Augenwinkel aus der Hornhaut hervor. Und nun fragt sich: kann diese lang hervorragende Spitze, vornemlich wenn das Auge, welches operirt wird, tief liegt, nicht leicht etwas im innern Augenwinkel verletzen, und vielleicht dadurch eine plötzliche Bewegung von Seiten des Kranken erregen, die die Operation stöhrt? Dies ist nicht zu fürchten, wenn man nur das Auge, ehe man das Messer einsticht, ein wenig nach den äußern Augenwinkel wenden läßt, oder es, wenn es sich während der Operation zu sehr nach dem innern Augenwinkel hinwendet, mittelst des Messers wieder auswärts wendet. Dies ist, sobald die Spitze des Messers im innern Augenwinkel aus der Hornhaut hervorrage, sehr leicht zu bewerkstelligen.

§. 262.

Die Klinge des Messers ist anderthalb bis zwey Zoll lang. Länger darf sie nicht seyn, sonst kann man die Hand, in der man das Messer hält zu Anfange der Operation nicht fest auf die Wange des Kranken legen. Der Griff muß so lang seyn, daß er, wenn man das Messer wie eine Schreibfeder anfäßt, fest auf dem Rücken der Hand liegt. Beyde Seiten der Klinge müssen gelinde conveß seyn; theils damit die Klinge eine gewisse Stärke erhält; denn wenn sie zu dünn und Lanzettenartig ist, biegt sie sich im Auge, ja bricht wohl gar ab; theils damit die Klinge die Wunde der Hornhaut genau anfüllet, denn diese nimmt natürlicherweise eine ovale Gestalt an. Immer dringt daher die
wässe-

wässerichte Feuchtigkeit zur Seite der Klinge heraus, wenn sie flach und platt ist. Man wird dies nicht bezweifeln, wenn man bedenkt, daß sich indem das Messer im Auge ist, die Augenmuskeln mehrentheils krampfhast zusammenziehen, und die wässerichte Feuchtigkeit, sobald sich nur irgendwo ein Weg öffnet, gewaltsam ausdrücken.

S. 263.

Der Rücken des Messers muß stumpf, aber ja nicht dick und breit seyn. Ist er schneidend, so schneidet das Messer, wenn es in die Mitte der Hornhaut eingestochen wird nicht allein unterwärts, sondern auch aufwärts, und löst folglich die untere Hälfte der Hornhaut nicht ab. Auch ist während der Operation, wie nachher erhellen wird, der Rücken des Messers immer ein wenig nach der Regenbogenhaut gerichtet, und würde folglich diese, wenn er schneidend wäre, verletzen. — Aber dick darf er nicht seyn. Ein dicker Rücken dehnt den obern Winkel der Wunde der Hornhaut aus, und füllt ihn nicht, und erzeugt dadurch eine kleine Oeffnung, wodurch die wässerichte Feuchtigkeit hervorspringt. Je dünner daher der Rücken ist, ohne schneidend zu seyn, desto besser ist es. Indessen hat man wohl darauf zu sehen, daß beim Schleifen aus Unachtsamkeit dieser dünne Rücken nicht etwa schneidend wird. — Der Rücken des Messers muß ferner geradlinicht, nicht krumm und gebogen seyn. Ein Messer mit geraden Rücken darf man nur in der Richtung des Querdurchmessers der Hornhaut

Richt. Wundarzneyk. III. B. S durch

durch die vordere Augenkammer stoßen, so schneidet man gewiß die ganze untere Hälfte der Hornhaut ab; denn die Spitze des Messers kommt im innern Augenwinkel eben da wieder aus der Hornhaut, wo sie im innern Augenwinkel eingestochen worden ist. Dahingegen, wenn man sich eines Messers bedient, dessen Rücken gebogen ist, und dasselbe gleichermaßen im äußern Augenwinkel in die Mitte der Hornhaut gerade durch die vordere Augenkammer stößt, es nicht anders möglich ist, als daß der Ort, aus welchem die Spitze des Messers im innern Augenwinkel hervorkommt, niedriger ist, als der Ort, in welchen sie im äußern Augenwinkel eingestochen worden ist; und immer desto niedriger ist, je mehr der Rücken des Messers gekrümmt ist. Die Folge davon ist, daß nicht die Hälfte der Hornhaut, sondern weit weniger als die Hälfte abgelöst, und die Oeffnung zu klein wird. Man kann zwar diesen Fehler vermeiden, wenn man die Spitze des Messers in der vordern Augenkammer sobald sie sich im innern Augenwinkel der Hornhaut nähert, ein wenig aufhebt, und dann durchsticht. Dies ist indessen ein besondrer Handgriff, der eine besondre Aufmerksamkeit erfordert, und dessen man überhoben ist, wenn man sich eines Messers mit einem geraden Rücken bedient.

§. 264.

Es giebt Messer, wie z. E. das Lafayische, deren Klinge auf die Seite gebogen ist. Die Absicht dieser Krümmung ist, daß die Spitze des Messers beym Durchgange durch die vordere Augenkammer

mer von der Regenbogenhaut abgekehrt ist, und folglich diese Haut nicht leicht faßt, und verlegt. Ein solches Messer ist unbrauchbar: freylich sticht die Spitze desselben nicht leicht in die Regenbogenhaut, aber desto leichter in die innere Ueberfläche der Hornhaut. Nie kann man verhindern, daß sie nicht im innern Augenwinkel in einer zu großen Entfernung vom Weißen des Auges aus der Hornhaut dringt, und folglich die Wunde zu klein wird. Und drückt man, um dies zu verhüten, die Klinge zurück auf die Regenbogenhaut, so dringt diese unter die Schneide, und wird bey der geringsten Bewegung des Messers verlegt. — Endlich muß die Spitze des Messers zwenschneidig und nicht zu schwach seyn. Ist sie zu dünn, so biegt sie sich und dringt nicht durch. Vorzüglich geschiehet dies, wenn sie im innern Augenwinkel durch die Hornhaut von innen nach außen gestoßen wird. Zwenschneidig muß sie seyn, damit sie leicht und sanft eindringt. Man sehe ja darauf, daß die Spitze des Messers wohl beschaffen ist. Ist sie nicht recht scharf, so dringt sie schwer in die Hornhaut; und drückt man stärker, so fährt sie plötzlich in die vordere Augenkammer, und verlegt die Regenbogenhaut.

§. 265.

Man faßt das Messer wie die Nadel, und legt die Hand wie bey der Niederdruckung auf die Backe des Kranken. Sobald das Auge sich in einer zur Operation bequemen Lage befindet, stoßt man die Spitze des Messers plötzlich ins Auge. In der

bequemsten Stellung zur Operation befindet sich das Auge, wenn es gerade vorwärts, jedoch ein wenig aufwärts und auswärts gerichtet ist. Man steche ja das Messer nicht ins Auge, wenn es nicht wenigstens ohngefähr in dieser Richtung ist. Die Ungeduld verleitet zuweilen den Wundarzt, wenn das Auge lange unruhig ist, das Messer einzustoßen, obgleich das Auge nicht in dieser Stellung ist, in der Hoffnung, das Auge mittelst des Messers hervorzu ziehen, und in die gehörige Stellung zu bringen. Gemeiniglich aber steht das Auge, sobald das Messer eingestochen ist, fest und unbeweglich, und läßt sich auf keine Art und Weise in eine andre Stellung bringen. Der Kranke ist eben so wenig Herr über das Auge; alles Zureden, es herunter oder aufwärts zu bewegen, hilft nichts. Zuweilen geschieht es auch wohl, daß nachdem er sich lange umsonst bemühet hat, das Auge in die gehörige Stellung zu bringen, dasselbe auf einmal gleichsam beweglich wird, und sich plötzlich herunter oder seitwärts bewegt. Ist der Wundarzt nicht sehr auf seiner Hut, so fährt in diesem Augenblicke das Messer in die Regenbogenhaut, und die Operation mißlingt. — Schnell muß das Messer aus eben den Gründen eingestochen werden, welche oben beim Gebrauche der Staarnadel angezeigt worden sind.

S. 266.

Das Messer muß zuerst gerade, das ist, so, daß seine Spitze gerade nach der Regenbogenhaut gerichtet ist, und mit dem Orte an der Hornhaut,
in

in welchen sie eingestochen wird, einen rechten Winkel macht, eingestochen werden. Wird es schief eingestochen, d. i. so, daß seine Spitze nach dem innern Augenwinkel hingerichtet ist, so wird der Schnitt in der Hornhaut sehr schief, die Oeffnung in der vordern Augenkammer sehr klein; ja es kann wohl gar geschehen, daß die Spitze des Messers nicht in die vordere Augenkammer, sondern zwischen die Blätter der Hornhaut dringt. Am leichtesten geschieht es, wenn die Hornhaut sehr platt, und wenig gewölbt ist. Aus dem ungewöhnlich starken Widerstande, den man empfindet, indem man das Messer in der Hornhaut weiter fortstoßt, entdeckt man diesen Fehler gar leicht. Entdeckt man ihn bey Zeiten, so kann man ihn verbessern, wenn man das Messer sogleich wieder zurückziehet, und in einer andern Richtung einstoßt. Ist das Messer schon tief zwischen die Blätter der Hornhaut eingedrungen, so ist eine Verdunkelung der Hornhaut zu befürchten.

S. 267.

Sobald die Spitze des Messers in die vordere Augenkammer gelangt ist, verändert man die Richtung des Messers, so, daß nunmehr seine Spitze gerade nach dem Orte hin gerichtet ist, durch welchen sie im innern Augenwinkel aus der Hornhaut hervordringen soll. Und in dieser Richtung stoßt man nun das Messer langsam, und ohne seine Richtung weiter zu ändern gerade durch die vordere Augenkammer: langsam, nicht übereilt, damit man alle Schwierigkeiten, die etwa von dem Vordringen der

Regenbogenhaut, der Beweglichkeit des Auges, der unrichtigen Richtung des Messers entstehen, sogleich bemerken, verhüten, heben kann; bloß durchstoßen, und zwar in der Richtung des Queerdurchmessers muß man das Messer, nicht zugleich niederdrücken; ein Handgriff zu welchen der Ungeübte so sehr geneigt ist, zu welchen ihn der Gedanke, die untere Hälfte der Hornhaut abzuschneiden veranlaßt, wodurch er sich die Operation erschwert, und wodurch er Gelegenheit giebt, daß die wässerichte Feuchtigkeit über den Rücken des Messers aus dem obern Winkel der Wunde hervorspricht. Ist das Messer einmal in der vordern Augenkammer, so darf seine Richtung weiter nicht verändert, d. i. die Schneide nicht abwärts, der Rücken nicht einwärts gewendet werden; sobald dies geschieht, gehet das Messer schwer durch, und stoßt das Auge in den innern Augwinkel, und die wässerichte Feuchtigkeit spritzt hervor, weil jederzeit durch eine veränderte Wendung des Messers die Wunde verzerret, und geöffnet wird. Nie darf der Wundarzt das Messer, wenn es einmal eingestochen ist, auch nur um ein wenig zurückziehen, weil dies nie geschehen kann, ohne daß die wässerichte Feuchtigkeit ausfließt. Immer muß das Messer in einem ununterbrochnen Zuge durch die vordere Augenkammer gestoßen werden. — Es ist vorher gesagt worden, daß man, sobald beym ersten Einstich die Spitze des Messers in die vordere Augenkammer gedrungen ist, die Richtung des Messers ändern, und die Spitze desselben nach dem innern Augwinkel richten muß. Ehe man aber
dies

dies thut, muß man wohl überzeugt seyn, daß die Spitze wirklich in der vordern Augenkammer ist. Man glaubt zuweilen, daß sie drinnen ist, und sie ist es nicht, man wendet das Messer, und stoßt es zwischen die Lamellen der Hornhaut.

S. 268.

Das Messer muß dergestalt in die Hornhaut eingestochen werden, daß der Rücken ein wenig nach der Regenbogenhaut hin, die Schneide aber vorwärts von der Regenbogenhaut abgewendet ist. Es ist beynahe unmöglich, die Spitze des Messers eine viertel Linie vom Rande der Hornhaut und die Klinge in paralleler Richtung mit der Regenbogenhaut, das ist, die Schneide gerade herunterwärts gerichtet, durch die vordere Augenkammer zu stoßen, ohne die Regenbogenhaut zu verletzen. Die Schneide geht so nahe an der Regenbogenhaut vorbei, und diese wird während der Operation durch die krampfhafte Verkürzung der Augenmuskeln gemeiniglich so stark hervorgedrängt, daß sie unausbleiblich unter die Schneide tritt. Um dies zu verhüten, muß die Schneide ein wenig abwärts gewendet seyn. Freylich entfernt man dadurch den untern Theil des Schnitts ein wenig mehr vom Rande der Hornhaut, als die beyden Enden desselben, und der Schnitt wird nicht ganz genau halbmondförmig. Dies geschieht aber ohne Nachtheil; der Schnitt bleibt demungeachtet groß genug, daß auch der größte Staar leicht durch denselben treten kann, wenn nur der eine und andre Winkel desselben im äußern und

innern Augenwinkel nicht über eine Viertel Linie vom Rande der Hornhaut entfernt ist; und der mittlere und untere Theil des Schnitts ist zwar etwas höher als er nach der strengen Regel seyn sollte, aber doch bey weitem nicht so hoch, daß er der Pupille gegenüber wäre, und falls er eine undurchsichtige Narbe hinterließe, dem Gesicht hinderlich seyn könnte. — Hat der Wundarzt diese Regel verabsäumt, d. i. hat er aus Versehen, und in der Geschwindigkeit, womit der erste Einstich geschehen muß, die Klinge in einer fehlerhaften Richtung eingestoßen, so muß er diese Richtung sogleich verbessern, ehe er das Messer weiter fortstoßt. Denn, ist die Schneide zu stark außwärts gekehrt, so wird der Schnitt zu klein, ist sie gerade herunterwärts oder wohl gar einwärts gerichtet, so wird die Regenbogenhaut zuverlässig verletzt. Nur muß er sich hüten, das Messer nicht zu schnell zu drehen, sonst lauft sicher die wässerichte Feuchtigkeit zu früh aus. Nur allmählig, und in langsamen Fortstoßen muß er die fehlerhafte Richtung des Messers verbessern.

§. 269.

Ungeachtet aller bisher gegebenen Regeln wird dennoch der Schnitt, zuweilen aus Versehen, zuweilen durch einen Zufall, der den Wundarzt in Verlegenheit setzt, zu klein. Das was den Wundarzt in Verlegenheit setzt, und veranlaßt, den Schnitt zu klein zu machen, ist entweder die Bewegung des Auges nach den innern Augenwinkel, oder die Regenbogenhaut, wenn sie vor die Spitze oder Schneide
des

des Messers tritt. Zuerst von der letztern. Derer Fälle, wo die Regenbogenhaut vorzüglich leicht vor die Spitze, oder unter die Schneide des Messers fällt, giebt es drey: nämlich wenn die Spitze des Messers zu nahe am Rande der Hornhaut eingestochen wird; wenn die wässerichte Feuchtigkeit zu früh ausfließt, und wenn durch einen heftigen Druck aufs Auge, oder durch einen Reiz, der aufs Auge wirkt, und einen Krampf in den Augenmuskeln erregt, die Regenbogenhaut stark vorwärts gedrückt wird. Es giebt folglich drey Hauptwege, diesen sehr beschwerlichen Zufall zu verhüten: man muß nämlich, wie im vorhergehenden bereits oft erinnert worden ist, allen unnöthigen Reiz und Druck vom Auge entfernen; das Messer, wie gleichfalls bereits erinnert worden ist, nicht zu nahe am Rande der Hornhaut einstößen, und den zu frühen Ausfluß der wässerichten Feuchtigkeit durch die Beobachtung der im vorhergehenden gegebenen Regeln bestmöglichst zu verhüten suchen.

S. 270.

Tritt dem ungeachtet die Regenbogenhaut vor die Spitze des Messers, so darf man dasselbe nicht zurückziehen, weil sonst die wässerichte Feuchtigkeit ausfließt, und die Regenbogenhaut noch stärker vorfällt; aber auch nicht tiefer einstößen, weil sonst die Regenbogenhaut verletzt wird. Kann der Wundarzt in diesem Falle die Spitze des Messers, indem er sie ein wenig vorwärts nach der Hornhaut bewegt, nicht über die Regenbogenhaut hinweg bringen, so

thut er am besten, wenn er das Messer, ohne dasselbe vorwärts oder rückwärts zu bewegen, gerade herunterwärts drückt, und solcher Gestalt nur den halben Schnitt vollendet, d. i. einen Schnitt macht, der einem Viertel von einem Zirkel gleicht, und diesen nachher mit der Scheere erweitert. — Fällt die Regenbogenhaut unter die Schneide, so muß man den Rücken des Messers stark nach der Regenbogenhaut, die Schneide vorwärts nach der Hornhaut wenden, um die Schneide von der Regenbogenhaut zu befreien, und den Schnitt zu vollenden. Freylich steigt alsdann der Schnitt nie so tief herab als er sollte, indessen kann man ihn erweitern, wenn er zu enge ist, und hoffen, daß er keine undurchsichtige Narbe hinterläßt, die in diesem Falle freylich dem Gesichte ein wenig hinderlich seyn würde.

S. 271.

Einige (Pellier) rathen das Messer, wenn die Regenbogenhaut vor die Spitze oder Schneide fällt, sogleich ganz aus dem Auge zu ziehen, ein Instrument, das einer schmaalen Messerklinge gleicht, vornen aber eine stumpfe runde Spitze hat, in die vordere Augenkammer zu bringen, das vordere Ende desselben inwendig an die Hornhaut zu setzen, wo sie im innern Augenwinkel geöffnet werden muß, daselbst die Hornhaut von außen nach innen zu öffnen, denn das Instrument durch die Oeffnung zu stoßen, und mittelst desselben den Schnitt herunterwärts zu vollenden. Ein schwerer, mißlicher Handgriff. Und wie kann man, wenn die Regenbogen-

bogen-

Bogenhaut vor der Schneide liegt, das Messer aus dem Auge ziehen, ohne die Regenbogenhaut zu zerschneiden. Und wie kann man das zweyte stumpfspitzige Messer, nachdem die wässerichte Feuchtigkeit ausgeflossen ist, ins Auge bringen, ohne von neuem in Gefahr zu kommen, mit der Schneide desselben die Regenbogenhaut zu verletzen? — Andre (Wenzel) geben den Rath, sobald die Regenbogenhaut unter die Schneide tritt, das Messer still zu halten, und mit dem Mittelfinger der Hand, womit das untere Augenlid niedergezogen wird, die Hornhaut gelinde zu reiben, und zu drucken, wobei die Regenbogenhaut gemeiniglich zurück tritt. Ein guter Handgriff, dem Anscheine nach: aber doch nicht ohne Schwierigkeiten. Lauft man nicht Gefahr die wässerichte Feuchtigkeit auszudrucken; zumal wenn sich das Auge bey Empfindung des Fingers nur ein wenig bewegt, oder der Wundarzt das Messer nur ein wenig rührt?

§. 272.

Weicht, indem das Messer durch die vordere Augenkammer gestoßen wird, das Auge in den innern Winkel, so kann der Wundarzt den Schnitt nicht auf die gehörige Art endigen. Er hat in diesem Falle unter drey Mitteln eines zu wählen. Er kann nämlich, sobald er merkt, daß das Auge zu weichen anfängt, den Augenhalter, wenn er ihn gleich vom Anfange der Operation in Bereitschaft gehalten hat, sogleich einsetzen, und das Auge befestigen; oder er sucht mittelst des Messers im Auge das Auge wieder aus.

aus dem innern Augenwinkel hervorzuziehen, und dann den Schnitt zu vollenden; ein Handgriff, der eine geübte und behutsame Hand erfordert; oder aber er vollendet den Schnitt nicht mit dem Messer, sondern drückt das Messer gerade herunter, löst bloß ein Viertel der Hornhaut ab, und erweitert den Schnitt mit der Scheere.

S. 273.

Der Fall, wo die Wunde in der Hornhaut zu klein ist, ist von dreysacher Art. Entweder die Wunde ist nur ein Viertel eines Zirkels (s. Tab. III. Fig. 1) dessen Anfang äußerlich in der Mitte (lit. a) das Ende unten in der Mitte der Hornhaut (lit. b) ist; oder der Schnitt nähert sich mehr oder weniger einer geradlinichten Gestalt (Tab. III. Fig. 3) das ist: seine Mitte ist vom untern Rande zu sehr entfernt und der Pupille zu nahe: oder aber endlich das Ende des Schnitts im innern Augenwinkel (s. Tab. III. Fig. 4) ist zwar in der Mitte der Hornhaut, aber zu sehr vom Rande derselben entfernt, zu nahe an der Pupille. Der erste Fall ist der beste, theils weil es sogleich in die Augen fällt, daß der Schnitt zu klein ist, und der Wundarzt folglich keinen Fehler begehen kann, theils weil es hier bloß darauf ankommt den Schnitt in der gewöhnlichen Richtung zu verlängern, und derselbe, wenn er verlängert ist, seine gesetzmäßige Gestalt vollkommen erhält. Die Erweiterung geschiehet hier durch einen doppelten Schnitt; der erste ist horizontal (Tab. III. Fig. 2. lit. b. h.) der zweyte ist schief aufwärts und auswärts

wärts gerichtet (Tab. III. Fig. 2. lit. h. i.). Die zwey letzten Fälle sind die übelsten; theils weil es hier schwerer ist, dem Schnitte die gehörige Weite zu geben; theils weil die Wunde der Pupille immer nahe ist, und bleibt, und falls sie eine verdunkelte Narbe hinterläßt, das Gesicht hindert. Um der Wunde im zweyten Falle die möglichste Weite und schicklichste Gestalt zu geben, muß man beyde Winkel derselben gerade aufwärts (Tab. III. Fig. 3. c. k. d. l.) erweitern. Im dritten Falle thut man am besten, wenn man den innern Winkel der Wunde schief aufwärts (Tab. III. Fig. 4. lit. f. m.) verlängert. — Ist der Schnitt so unformlich, daß er auf keine Art und Weise verlängert werden kann, so thut man am besten, wenn man von der Operation ganz absteht, die Wunde heilen läßt, und die Operation nach einigen Tagen wiederholt.

S. 274.

Am besten geschieht die Erweiterung der Wunde in jedem dieser Fälle mit der Scheere. Es ist ein Vorurtheil, wenn man glaubt, daß die Scheere eine Wunde mache, welche leicht entert, und gemeinlich eine undurchsichtige Narbe hinterläßt. Wiederholte Erfahrungen beweisen unwiderlegbar, daß Schnitte mit der Scheere gemacht eben so leicht und gut heilen, als Schnitte, die mit einem Messer gemacht werden. Aber der Daviellschen Scheeren (Memoires de l'Acad. de Chir. de Paris Tom. V. Edit. 8. p. 400. Tab. XIX. Fig. 3.) die zu diesem Handgriffe eigentlich erfunden worden sind, kann man

man sich nicht ohne Gefahr und Schwierigkeit bedienen. Weit bequemer sind diejenigen welche Tab. III. Fig. 5 und 6 abgebildet sind. Die Griffe müssen kurz seyn, damit die Hand, womit sie der Wundarzt faßt, während der Anwendung fest auf der Backe des Kranken liegen kann. Die Spitzen müssen glatt und rund seyn, damit sie die Regenbogenhaut nicht verletzen, wenn sie in die vordere Augenkammer eingebracht werden. Muß der Schnitt schief aufwärts verlängert werden, wie Tab. III. Fig. 4. lit. f. m. so ist die Scheere Fig. 5 vorzüglich bequem. Muß der Schnitt in einer horizontalen Richtung verlängert werden, wie in Tab. III. Fig. 2 lit. b. h. so verdient die Scheere Fig. 6 den Vorzug.

S. 275.

Ist der Schnitt nur um ein wenig zu klein, so ist der Fehler oft ohne üble Folgen, zumal wenn die Staarlinse klein, oder flüssig ist. Ist er aber um vieles zu klein, und siehet man nicht mit völliger Gewißheit zum voraus, daß der Staar flüssig oder sehr klein ist, so hüte man sich ja vor dem Versuche, den Staar ohne vorgängige Erweiterung der Wunde auszudrücken. Gesetzt auch, der Staar wird endlich und mit Mühe ausgedrückt, so ist doch der Erfolg der Operation gemeiniglich unglücklich. Heftige Entzündung und ewige Blindheit sind die unausbleiblichen Folgen eines langen und starken Drucks aufs Auge. Nichts verträgt das Auge weniger als einen starken Druck dieser Art. Aller Reiz, alle Beschädigung der Regenbogenhaut, die bey der
Erwei-

Erweiterung der Wunde mittelst der Scheere etwa möglich ist, hat bey weitem so üble Folgen nicht, als dieser Druck. Immer muß man daher lieber die Wunde erweitern, als sich in die Nothwendigkeit setzen, das Auge auch nur ein wenig stärker zu drucken, als nöthig ist, wenn der Schnitt die gehörige Größe hat. — Ist die Wunde um vieles zu klein, und man wagt den Staar durch einen starken Druck zum Ausgange zu zwingen, so springt die gläserne Feuchtigkeit hervor, der Staar bleibt zurück, die Pupille schließt sich, und der Kranke ist auf ewig blind. Es hilft zu nichts, den Staar niederzudrücken, oder mittelst eines Haakens oder Löffels hervorzuziehen, weil auf diesen Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit allezeit eine Verschließung der Pupille erfolgt.

S. 276.

Zuweilen ist die Wunde so offenbar zu klein, daß der Wundarzt an der Nothwendigkeit, sie zu erweitern, gar nicht zweifeln kann. Zuweilen aber ist der Wundarzt zweifelhaft; die Wunde hat zwar nicht die gehörige Größe, scheint aber doch groß genug zu seyn, um den Staar durchzulassen; er wagt einen Versuch, ihn durchzudrücken, und bereuet es gemeiniglich. Wenn die Wunde nur um etwas zu klein ist, wird jederzeit ein stärkerer Druck erfordert, und dieser ist immer schädlich. Je leichter die Staarlinse bey dem gelindesten Drucke hervorkommt, desto gewisser ist der glückliche Erfolg der Operation. Daß die Erweiterung der Wunde in diesem

diesem zweyfelhaften Falle nöthig ist, ersiehet der Wundarzt, wenn der Schnitt nicht die oben beschriebne Größe und Gestalt hat; wenn der Staar nicht flüssig, oder nicht hart und klein ist; und wenn der Staar nicht, sobald die wässerichte Feuchtigkeit ausgeflossen ist, sich freywillig in die Pupille drängt, und dieselbe ausdehnt. Wenn der Schnitt in der Hornhaut gut gerathen ist, legt sich, sobald die wässerichte Feuchtigkeit ausgeflossen ist, die Krystalllinse an die Regenbogenhaut, und drängt sich gleichsam in die Pupille. Wenn aber der Schnitt zu klein ist, so bleibt die Linse gleichsam zurück, und die Pupille bleibt klein.

Die Eröffnung der Kapsel.

S. 277.

So bald der Schnitt in der Hornhaut geschehen ist, muß die Kapsel geöffnet werden. Zwar ist die Kapsel so fein und zart, daß sie gemeiniglich bey einem geringen Drucke außs Auge zerspringt. Ja zuweilen springt sie, indem das Messer durch die vordere Augenkammer gestoßen wird, von sich selbst, und die Staarlinse tritt sogleich nach vollbrachtem Schnitte durch die Pupille hervor. Ob man gleich daraus schließen könnte, daß die besondere Eröffnung der Kapsel durch ein Instrument um desto mehr unnöthig sey, da der Handgriff, wodurch sie geöffnet wird, nicht ohne Schwierigkeiten ist, ist sie dennoch aus folgenden Gründen unumgänglich nöthig, und rathsam. Immer ist, auch wenn die Kapsel
sehr

sehr dünn und zart ist, ein stärkerer Druck aufs Auge nöthig, wenn man den Staar ohne vorhergehende Eröffnung der Kapsel ausdrücken will, als wenn man vorher die Kapsel öffnet. Und bereits im vorhergehenden ist angezeigt worden, daß nichts dem Auge mehr schädlich ist, als ein starker Druck dieser Art, und daß die Operation immer desto weniger üble Folgen hat, je leichter und sanfter der Staar bey dem gelindesten Drucke aufs Auge hervortritt. Außerdem ist die Krystallhaut, auch wenn sie durchsichtig und unfehlerhaft ist, zuweilen so zähe, daß sie auch bey einem ansehnlichen Drucke aufs Auge nicht zerspringt. Man vermehrt in diesem Falle, wenn man sieht, daß der Staar nicht hervortritt, den Druck aufs Auge allmählig immer mehr und mehr, und endlich, ehe man sich versieht, zerreißt die Krystallhaut, und der Staar springt plöblich und auf einmal hervor; und ein großes Glück ist es, wenn die gläserne Feuchtigkeit nicht hinter ihm her kommt. In der Folge wird erhellen, was für üble Folgen dieser schnelle Durchgang des Staars durch die Pupille haben kann.

S. 278.

Man hat (Janin, Mohrenheim) ferner bemerkt, daß sich die Kapsel, wenn sie durch einen Druck aufs Auge gewaltsam zersprengt wird, nach der Operation gemeiniglich verdunkelt, und ein schwaches Gesicht, oder wohl gar eine zweene völlige Blindheit verursacht: da sie hingegen, wenn sie mit einem schneidenden Instrumente geöffnet wird, falls

nicht etwa eine starke Entzündung erfolgt, gemeinlich klar und durchsichtig bleibt. Man kann sich die Ursachen dieses verschiedenen Erfolgs sehr leicht erklären. Wenn man, ohne vorher die Krystallhaut zu durchschneiden, das Auge drückt, drängt die gläserne Feuchtigkeit die Krystalllinse sammt ihrer Kapsel vorwärts in die Pupille, wodurch natürlich die Kapsel gespannt, gequetscht, ausgedehnt wird, und eine Gewalt leidet, welche leicht eine Verdunkelung veranlaßt. Wird hingegen die Krystallhaut durchschnitten, so tritt die Linse leicht durch die gemachte Oeffnung, und erweitert dieselbe, und die Kapsel leidet bey weitem so viel nicht, als im ersten Falle. — Ja zuweilen geschiehet es, daß die Kapsel auch einem sehr starken Drucke widersteht; und der Wundarzt siehet sich nach langen vergeblichen Versuchen am Ende dennoch genöthigt, die Kapsel mit einem schneidenden Instrumente zu öffnen; oder er wagt es noch stärker zu drücken, und dann springt oft die gläserne Feuchtigkeit hervor, und der Staar bleibt zurück. Der übelste Zufall, der sich bey dieser Operation ereignen kann.

§. 279.

Man muß also ohne Widerrede die Kapsel, sobald der Schnitt in der Hornhaut vollendet ist, durch ein schneidendes Instrument öffnen. Es ist aber nicht genug, daß man die Krystallhaut bloß durchsticht; man muß, so viel als möglich durch wiederholte Stiche und kleine Schnitte eine große Oeffnung in dieselbe zu machen suchen. Es geschiehet

het zuweilen, daß die Linse, in dem sie aus dem Auge fällt, einen undurchsichtigen Schleim, oder ein abgebrochnes Stück zurück läßt, welches besonders, und oft nicht ohne viele Mühe ausgenommen werden muß. Dies geschiehet selten, wenn bey der Operation der vordere Theil der Kapsel wohl durchschnitten, und zerstöhret worden ist; denn alsdann ist der Weg, durch welchen alles was in der Kapsel ist, austreten kann, weit und offen; nichts hindert, daß alles aus der Kapsel heraus tritt. Deffnet man die Krystallhaut nur durch einen einzigen Stich, so erweitert sich derselbe zwar, so bald man das Auge drückt, dergestalt, daß die Linse durchtreten kann, ein großer Theil dieser Haut aber bleibt unverfehrt, und hinter demselben kann leicht ein Ueberbleibsel vom Staare liegen bleiben. Man kann sich davon in dem Falle am deutlichsten überzeugen, wo man in der Krystallhaut einzelne Verdunkelungen wahrnimmt. Man erblickt sie nach der Operation mehrentheils noch eben so, und eben da, wo man sie vor der Operation sahe.

§. 280.

Daß undurchsichtige, was in der Kapsel zurück bleibt, muß, wie weiter unten angezeigt werden wird, mittelst eines kleinen Löffels ausgenommen werden. Wenn dieser Löffel das undurchsichtige Stück fassen soll, muß er nothwendig durch die Deffnung der Krystallhaut in die Höhle der Kapsel gelangen. Ist die Deffnung der Krystallhaut weit und groß, so wird er ohne Schwierigkeit dahin

gelangen, und den undurchsichtigen Körper fassen; ist sie hingegen klein, so bewegt man oft vergeblich den Löffel in der Pupille hin und her, und versucht umsonst das undurchsichtige Ueberbleibsel zu fassen und auszuziehen. Der Löffel ist außerhalb der Kapsel, und findet den Weg in dieselbe nicht. — Ein zweyter Grund die Krystallhaut wohl zu durchschneiden. — Kann oder will man aus besondern Ursachen das undurchsichtige Ueberbleibsel nicht mit dem Löffel ausnehmen, so hat man, kraft wiederholter Erfahrungen, gegründete Hoffnung, daß die wässerichte Feuchtigkeit, indem sie in die Kapsel tritt, das undurchsichtige nach und nach auflöst. Dies geschieht desto gewisser, je größer die Oeffnung in der Krystallhaut ist: dahingegen man immer fürchten muß, daß die Krystallhaut, wenn sie größtentheils unversehrt ist, sich nach der Operation auf die hintere Haut anlegt, und das undurchsichtige Ueberbleibsel dergestalt umgiebt und einschließt, daß die wässerichte Feuchtigkeit nicht dazu gelangen kann.

S. 281.

Man kann zu diesen Gründen noch ein paar andere hinzufügen. Es ist zuweilen bemerkt worden, daß die Ränder der Oeffnung der Krystallhaut sich nach der Operation verdunkeln, und wie undurchsichtige Lappen hinter der Pupille erscheinen, die das Gesicht mehr oder weniger hindern. Man hat zwar gesehen, daß sie sich zuweilen wieder verliehren, auch könnte man sie allenfalls durch einen Handgriff wegschaffen; da aber das erstere nicht
immer

immer geschieht, das letztere mit Schwierigkeiten verbunden ist; so ist immer am besten, den Zufall bestmöglichst zu verhüten. Und dies geschieht am gewisesten, wenn man die Oeffnung in der Krystallhaut groß macht. — Wenn außer der Krystalllinse auch die Krystallhaut ganz oder zum Theil, vorzüglich in der Mitte verdunkelt ist, so ist es durchaus nothwendig, daß man diese Haut so viel als möglich vernichtet, sonst bleibt der Kranke ganz oder zum Theil blind, obgleich die verdunkelte Krystalllinse ausgezogen ist. Man kann es nicht immer mit Gewißheit zum voraussehen, ob die Krystallhaut dunkel oder durchsichtig ist, und in dieser Ungewißheit handelt man offenbar am vorsichtigsten, wenn man diese Haut allezeit so viel als möglich vernichtet. Man hat zwar auch alsdann, wenn die Krystalllinse ausgezogen ist, und die undurchsichtige Krystallhaut das Gesicht noch hindert, Mittel, dieses zurückgebliebne Hinderniß wegzuschaffen, aber diese Mittel sind nicht immer so leicht und sicher, daß man nicht wünschen sollte, ihrer nicht nöthig zu haben.

S. 282.

Um die Krystallhaut hinlänglich zu öffnen, zerschneiden einige (Tenon, Thel. de cataracta, Paris 1757) dieselbe mit einem Kreuzschnitte; andre (Daviel, Memoir. de l'Acad. de Chir. de Paris T. V. Edit. 8. p. 335.) machen einen Zirkelschnitt, so daß der mittlere Theil der Krystallhaut ganz ausgeschnitten wird; aber es ist schwer, einen Schnitt von einer bestimmten Gestalt zu machen, und hin-

E 3 . reichend,

reichend, wenn man nur das Instrument, womit man die Kapsel öffnet, zu wiederholtenmalen in dieselbe einsticht, und indem man es einsticht, dasselbe hin und her bewegt. Man thut wohl, wenn man, ehe man das Instrument, womit man die Kapsel öffnen will, ins Auge bringt, den Finger, womit man das untere Augenlid niederziehet, unter der Hornhaut ein wenig ans Auge drückt. Dieser gelinde Druck macht nicht allein, daß sich die Krystallinse nebst ihrer Kapsel der Pupille nähert, sondern auch daß sich die Pupille erweitert, das Instrument leicht und ohne Gefahr in dieselbe gebracht, und ein großer Theil der Krystallhaut zerschnitten werden kann. — Zuweilen ziehet sich, sobald die Hornhaut durchschnitten und die wässerichte Feuchtigkeit ausgeflossen ist, die Pupille krampfhaft zusammen, so daß das Instrument zur Eröffnung der Kapsel auf keine Art und Weise eingebracht werden kann. Der Druck des Fingers aufs Auge, auch wenn er ziemlich heftig ist, erweitert die Pupille in diesem Falle wenig oder gar nicht. Man thut in diesem Falle am besten; wenn man das Auge sich schließen läßt, und die Eröffnung der Kapsel einige Augenblicke aufschiebt. Gemeiniglich verliert sich die krampfhafte Wirkung des Reizes, den das Messer verursacht hat, gar bald, und die Pupille zeigt sich, wenn das Auge wieder geöffnet wird, beweglich, offen und folgsam.

S. 283.

Das sicherste und bequemste Instrument zur Eröffnung der Kapsel scheint der Lafanische Costi-
tom

tom (s. Tab. IV. Fig. 1.) zu seyn. Die Klinge dieses Instruments so wohl als die Scheide, in welcher sie verborgen liegt, muß schmaal und dünne seyn, damit sie leicht in die Pupille gebracht werden kann, ohne die Regenbogenhaut zu verletzen. Das Instrument ist zwar leichter und bequemer zu gebrauchen, wenn seine Klinge und Scheide ein wenig gebogen ist, als wenn sie gerade ist. Im letzten Falle muß der Wundarzt, wenn er das Instrument ins Auge bringt, die Hand aufheben, und daraus entsteht eine doppelte Schwierigkeit: nämlich die Hand verliert ihre Festigkeit, und hindert den Wundarzt, das Auge zu sehen. Dies geschieht nicht, wenn die Klinge gebogen ist, denn alsdann kann die Hand, indem sie das Instrument applicirt, auf dem Gesichte des Kranken liegen. Nur muß man bedenken, daß die Spitze der Klinge in der gebognen Scheide leicht stumpf wird, wodurch der Wundarzt leicht zu einem großem Fehler veranlaßt wird. Er glaubt nämlich die Kapsel geöffnet zu haben, und drückt, wenn der Staar nicht kommt, so stark, daß die Kapsel, welche das stumpfe Instrument nicht geöffnet hat, plötzlich springt, und die Staarlinse sammt der gläsernen Feuchtigkeit schnell hervorspringt; oder er fängt an, zu glauben, daß der Staar angewachsen ist, und wendet allerley Handgriffe an, die unnütz und schädlich sind. — An die beyden Seiten des Instruments sind ein paar Ringe befestigt. Man legt bey dem Gebrauche desselben den Zeigefinger in den einen, den Mittelfinger in den andern Ring, den Daumen unten auf

L 4

den

den Knopf, und hält auf diese Art das Instrument fest und sicher.

S. 284.

Man ergreift das Instrument mit der rechten Hand so wie eben gesagt worden ist, legt es auf die Wange des Kranken, hebt mittelst der Scheide den abgeschnittenen Lappen der Hornhaut in die Höhe, bringt es in die Pupille, und drückt die Klinge zu wiederholtenmalen aus der Scheide, und bewegt, indem man dies thut, das Instrument hin und her, aufwärts und unterwärts. Ist dies geschehen, so läßt man die Klinge in die Scheide völlig zurück springen, und ziehet das Instrument aus dem Auge. Mit einem und eben demselben Instrumente hebt man also den Lappen der Hornhaut auf, und öffnet die Kapsel. Nur eine Hand hat man zu diesen doppelten Geschäfte nöthig, die andre bleibt während dieser Zeit am untern Augenlide liegen. Man hat nicht zu fürchten, daß man die Regenbogenhaut verlegt; denn die Hand, die diesen Theil der Operation verrichtet, liegt fest auf der Wange des Kranken, und die Klinge des Instruments liegt in der Scheide bedeckt.

S. 285.

Man muß sich bey der Anwendung dieses Instruments wohl in acht nehmen, daß man dasselbe nicht zu stark gegen die Staarlinse andrückt; man setzt sich sonst einer dreyfachen Gefahr aus. Man schiebt nämlich entweder mit der Spitze des Instruments

ments die Staarlinse aufwärts oder zur Seite dergestalt, daß sie nur einen Theil der Pupille bedeckt; in welchem Falle, sobald das Auge mit dem Finger gedrückt wird, nicht der Staar, sondern die gläserne Feuchtigkeit durch den unbedeckten Theil der Pupille hervor dringt; oder man drückt die Staarlinse dergestalt gerade zurück, daß zur Seite derselben die gläserne Feuchtigkeit hervordringt; oder man theilt mit der Spitze des Instruments den Staar, wenn er weich ist, in zwey oder mehrere Stücke, in welchem Falle jederzeit, so bald das erste Stück heraus ist, bey fortdauernden Drucke mit dem Finger die gläserne Feuchtigkeit folgt, nicht der Rest des Staars, welcher mit Instrumenten besonders ausgezogen werden muß. Es giebt vorzüglich zwey Fälle, wo der Wundarzt bey aller Vorsicht das Instrument leicht zu stark an die Staarlinse andrückt; nämlich wenn die Feder, welche die Klinge wieder zurück in die Scheide ziehet, zu stark ist; und wenn bey dem Druck auf den Knopf die Spitze der Klinge zu weit aus der Scheide hervor tritt. Im ersten Falle wird ein ansehnlicher Druck, auf den Knopf erfordert, um die Spitze der Klinge aus der Scheide hervor zu drucken; und durch eben diesen Druck wird leicht das ganze Instrument tiefer ins Auge gedrückt. Im letztern Falle ist leicht einzusehen, daß wenn, nachdem das vordere Ende der Scheide in die Pupille eingesetzt ist, die Klinge zu lang aus derselben hervor tritt, diese nothwendig den Staar, wenn er hart ist, zurückstoßen oder verschieben, oder wenn er weich ist, in denselben eindringen, und ihn

zertheilen muß. Dies zu verhindern dient das Stellrad (Tab. IV. Fig. i. lit. a.) mittelst dessen man, indem man es herauf oder herabwärts schraubt, genau abmessen kann, wie weit die Klinge aus der Scheide hervor treten soll.

S. 286.

Verschiedne Wundärzte bedienen sich zur Eröffnung der Kapsel andrer Instrumente. Tenon (l. c.) hat ein eignes Instrument dazu erfunden. Andre öffnen die Kapsel mit einer zweyschneidigen Staarnadel; andre mit der Spitze des Messers, womit der Schnitt in der Hornhaut gemacht worden ist, u. s. w. Es ist nicht zu leugnen, daß man die Kapsel mit jedem schneidenden schmaalen Werkzeuge allenfalls ganz bequem öffnen kann, indessen hat man doch folgendes dabey zu bemerken. Unmöglich kann man ein solches Instrument gerade zu unter den Lappen der Hornhaut schieben, und in die Pupille bringen, ohne die Regenbogenhaut zu verletzen; immer muß man daher entweder den Lappen der Hornhaut mittelst einer Zange, oder des Daviel'schen Löffels, oder irgend eines andern bequemen Instruments aufheben, um die Spitze des Instruments gerade zu, und ohne die Hornhaut und Regenbogenhaut zu berühren, in die Pupille zu bringen; oder man muß, z. E. wenn man sich der zweyschneidigen Staarnadel bedient, den Theil derselben, der hinter der Spitze befindlich ist, in horizontaler Richtung unter den Lappen der Hornhaut schieben, alsdann die Nadel zurück, d. i. nach den äußern Augen-



TAB. N.




Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.

Richter Anfangsgr. 3 Band.

Jh. Dam. D. del.

Augenwinkel hin ziehen, bis sich die Spitze derselben, die sich außerhalb der vordern Augenkammer im innern Augenwinkel befindet, der Pupille gegenüber befindet, und diese alsdann in die Pupille senken, und die Kapsel öffnen. Das erste ist unbequem, weil der Wundarzt zur Aufhebung des Lappens die Hand nöthig hat, welche das untere Augenlid niederziehet; das zweite läßt sich auch sehr schwer bewerkstelligen, wenn das Auge nicht in einer sehr guten Stellung, und ganz ruhig ist. — Ueberhaupt ist es immer gefährlich ein bloßes spitziges zweyschneidiges Instrument ins Auge zu bringen, das bey der geringsten Bewegung des Auges, oder Unsicherheit der Hand zuverlässig die Regenbogenhaut verlegt. Immer ist der Gebrauch des Cystitoms sicherer, dessen Klinge in der Scheide verborgen liegt, und nur wenn das Instrument bereits ins Auge gebracht ist, auf einen Augenblick ausgedrückt wird.

S. 287.

Indessen ist es dennoch nicht zu leugnen, daß auch bey dem Gebrauche des Cystitoms dieser Theil der Operation, vornemlich wenn das Auge unruhig ist, mit so viel Schwierigkeit und Gefahr verbunden ist, daß es wohl eine sehr wünschenswerthe Sache wäre, denselben ganz entbehrlich zu machen. Dies ist der Endzweck einer neuen Erfindung, des Siegeristischen Staarnadelmessers (Siegerist Beschreibung eines Staarnadelmessers, Wien, 1763). Es ist ein Messer (s. Tab. IV. Fig. 2.) mit einem
geraden

geraden Rücken, und einer in der Breite allmählig zunehmenden Klinge, deren beyde Flächen gelinde convex sind; das also alle Eigenschaften hat, die ein gutes Staarmesser haben muß; darinnen aber von allen andern unterschieden ist, daß sich seine Spitze in eine, einen starken halben Zoll lange schmaale zweyschneidige Nadel endigt, die von ihrer Spitze bis zum Anfange der Messerklinge von gleicher Dicke und Breite ist. Vorzüglich aber kommt es bey diesem Instrumente darauf an, daß die Stelle, wo die Nadel aufhört, und die Schneide der Klinge anfängt (s. lit. b.) sehr scharf ist, und keinen starken Winkel macht, sondern daß die Nadel sich allmählig in die Klinge ausbreitet, und verliert, weil sonst das Instrument sehr schwer durchzustößen ist, wenn es bis an diese Stelle in die Hornhaut eingedrungen ist.

S. 288.

Man stoßt dies Messer wie gewöhnlich durch die Hornhaut so tief in die vordere Augenkammer, bis die Spitze desselben der Pupille gegenüber ist, senkt alsdann die Spitze in die Pupille, und öffnet die Kapsel, worauf man, indem man das Messer ein wenig zurück zieht die Spitze wieder aus der Pupille erhebt, und dann den Schnitt in der Hornhaut auf die gewöhnliche Art vollendet. Mit einem und eben demselben Instrumente und Handgriffe öffnet man also die Hornhaut und Kapsel, und ist der Mühe und Gefahr überhoben, nach Durchschneidung der Hornhaut die Kapsel durch ein eignes Instrument, und einen besondern Handgriff zu öffnen.

S. 289.

§. 289.

Einige (Vellier; Wenzel) öffnen die Kapsel auf gleiche Art, indem sie die Hornhaut durchschneiden mit der Spitze ihres gewöhnlichen Staarmessers. Aber man wird finden, daß man die Spitze des Messers, vorzüglich wenn der Staar klein, von der Pupille entfernt, und das Messer folglich ziemlich tief in die hintere Augenkammer eingetreten, und über dem die Pupille klein ist, nicht wieder aus der Pupille herausbringen kann, ohne das Messer ein wenig zurückzuziehen. Da nun aber die Klinge eines jeden guten Staarmessers von der Spitze an breiter wird, kann man das Messer unmöglich zurückziehen, ohne daß die wässerichte Feuchtigkeit ausfließt, wodurch die Beendigung des Schnitts in der Hornhaut sehr erschwert, ja gänzlich gehindert wird. Dies ist bey dem Gebrauche des Siegeristischen Staarnadelmessers nicht zu fürchten. Die Nadel ist von ihrer Spitze an bis zum Anfange des Messers gleich dick und breit, und so lang, daß indem die Spitze der Nadel in die Kapsel gestoßen wird, das Messer noch nicht in die Hornhaut eingetreten ist. Man kann also die Spitze der Nadel in die Pupille senken, die Kapsel öffnen, die Nadel wieder aus der Pupille zurückziehen, ohne daß ein Tropfen von der wässerichten Feuchtigkeit ausfließt, und dann den Schnitt der Hornhaut vollenden.

§. 290.

Indessen ist diese Methode dennoch nicht ohne alle Einschränkung und in jedem Falle gleich empfehlungs-

lungswürdig. Wenn die Kapsel nach vollendetem Schnitte der Hornhaut gedffnet wird, erweitert sich die Pupille theils von sich selbst, theils auf einen gelinden Druck des Fingers aufs Auge, und der Wundarzt hat nicht allein den Vortheil, das Instrument leicht und ohne Gefahr, die Pupille zu verletzen, einzubringen, sondern auch einen größern Schnitt in die Kapsel zu machen, die Krystallhaut in einem größern Umfange zu vernichten. Es ist nicht zu leugnen, daß sich während dem Durchgange das Messers durch die vordere Augenkammer die Pupille gemeiniglich sehr zusammen zieht, so daß das Instrument nicht ohne Gefahr, den Rand derselben zu verletzen, in dieselbe gebracht, und in derselben nicht hin und her bewegt werden kann. Indessen folgt daraus weiter nichts, als daß man wohl thut, wenn man in dem Falle, wo die Krystallhaut verdunkelt ist, oder die Pupille während dem Durchgange des Messers sich sehr verengert, oder wo man irgend ein Hinderniß findet, die Kapsel während dem Schnitte in der Hornhaut zu öffnen, die Eröffnung derselben bis nach geschehenem Schnitte verschiebt.

S. 227.

Ist der Staar flüssig, so dringt freylich bey dieser neuen Methode die Staarseuchtigkeit, sobald die Kapsel durchstochen ist, in die wässerichte Feuchtigkeit, und trübt dieselbe oft dergestalt, daß der Wundarzt das Messer im Auge nicht deutlich sehen, und den Schnitt in der Hornhaut mit der gehdrigen Genauig-

Genauigkeit vollenden kann. Indessen ereignet sich dieser Fall selten, und wenn er sich ereignet, ist es kaum nöthig, den Schnitt in der Hornhaut ganz zu vollenden. Der Wundarzt ziehet das Messer ganz aus dem Auge, und läßt die Staarfeuchtigkeit sammt der wässerichten Feuchtigkeit ausfließen. — In allen übrigen Fällen bleibt dies immer ein Hauptvorthail bey dieser Methode, daß das Auge, indem das Messer in der vordern Augenkammer ist, immer ruhig ist, und durchs Messer selbst fest gehalten wird, wodurch die Einbringung der Nadel in die Pupille sehr erleichtert und gesichert wird.

Der Durchgang des Staars durch die Pupille.

S. 292.

So bald die Krystallhaut durchschnitten ist, drängt sich die Staarlinse in die Pupille, und tritt bey einem gelinden Drucke des Fingers auf den untern Theil des Augapfels durch die Pupille aus dem Auge. Bey diesem Theile der Operation schadet alle Eyl. Die Krystalllinse kann nicht durch die Pupille treten, ohne sie gewaltsam auszudehnen. Diese Ausdehnung hat keine üble Folgen, wenn sie allmählig geschieht. Tritt die Krystalllinse plözlich aus dem Auge, so dehnt sie die Pupille plözlich aus, und zerreißt, oder lähmt sie. Im letztern Falle verliert die Pupille ihre Bewegung, oder verändert ihre Gestalt, und beydes geschieht selten ohne Verminderung des Gesichts. Je langsamer die Pupille ausgedehnt wird, desto weniger leidet sie, und desto
stärker

stärker läßt sie sich ohne alle üble Folgen ausdehnen. Alles also kommt bey diesem Theile der Operation darauf an, den Druck des Fingers aufs Auge zu mäßigen, und nur gelinde und allmählig zu vermehren.

§. 293.

Gemeiniglich erhebt sich, sobald man das Auge drückt, der untere Theil der Krystallinse und tritt zuerst in die Pupille. Ehe er dies thut, dehnt er den untern Theil der Regenbogenhaut stark aus, drückt ihn vorwärts und herunterwärts, so daß derselbe oft aus der Wunde der Hornhaut hervorragt, bis endlich der untere Rand der Linse über den untern Rand der Pupille herabglitscht. Bey dem Durchgange des Staar leidet also der untere Rand der Pupille, und untere Theil der Regenbogenhaut immer am meisten. Wenn man gleich, nach dem der Staar ausgefallen ist, das Auge betrachtet, findet man gemeiniglich die Pupille eyförmig, und unter der Mitte der Regenbogenhaut nahe am untern Theile der Wunde der Hornhaut. Einige rathen, sie mit einem kleinen Löffel in die Höhe zu schieben; dies ist nicht nöthig, wenn sie nicht etwa ganz aus der Wunde heraus hängt; denn gemeiniglich erhält sie nach wenigen Augenblicken ihre vorige Stelle und Gestalt wieder. — Wenn der Staar flüssig ist, leidet die Pupille nichts; er springt gemeiniglich, sobald die Kapsel geöffnet ist, hervor, ohne die Pupille im geringsten auszudehnen.

§. 294.

Zuweilen springt der Staar, sobald die Hornhaut aufgeschnitten ist, unvermuthet, und wider Willen des Wundarzts plözlich aus dem Auge. Dies geschieht, wenn der Gehülfe den Finger, womit er das obere Augenlid in die Höhe hebt, oder der Wundarzt selbst den Finger, womit er das untere Augenlid niederziehet, stark auf den Augapfel druckt. Auch die Instrumente, die man zur Befestigung des Auges während der Operation anzuwenden pflegt, veranlassen diesen plözlichen Vorfall gar oft durch Druck und Reiz. Indessen beobachtet man diesen plözlichen Durchtritt des Staars doch auch in Fällen, wo keine von den eben angezeigten Ursachen zugegen ist, und dann ist er wahrscheinlich einem Krampfe der Augenmuskeln zuzuschreiben, der durch den mit der Operation verbundenen Reiz erregt wird. Dies ist wenigstens gewiß, daß dieser Zufall immer desto mehr zu fürchten ist, je mehr das Auge bey der Operation leidet, und je furchtsamer und empfindlicher der Kranke ist.

§. 295.

Zuweilen ziehet sich die Pupille, nachdem die Hornhaut durchschnitten ist, heftig zusammen. Dies ist ein sehr übler Zufall. Die Pupille erweitert sich nicht, wenn man gleich das Auge stark druckt; und erweitert sie sich ja endlich, und läßt den Staar durch, so ist der Druck aufs Auge gemeiniglich so heftig gewesen, daß man üble Folgen davon zu fürchten hat. Zuweilen erweitert sie sich auch bey einem

Richt. Wundarzneyk. III. B. U heftigen

heftigen Druck nicht, und wenn derselbe vermehrt wird, springt die gläserne Feuchtigkeit hervor, und der Staar bleibt zurück. Man hat sogar gesehen, daß die Regenbogenhaut in einem solchen Falle zerissen ist. Gemeiniglich beobachtet man diese Verengerung, wenn der Schnitt in der Hornhaut zu klein ist, wenn die Krystalllinse sehr hart, knöchern oder steinern ist, und wenn das Auge während der Durchschneidung der Hornhaut auf irgend eine Art sehr gereizt worden ist. Durch Gewalt erreicht man in diesem Falle seine Absicht selten. Am besten schließt man die Augenlider auf einige Augenblicke; denn zuweilen öffnet sich die Pupille nach einer kurzen Zeit freywillig, oder erweitert sich bey einem gelinden Drucke. Findet man sie noch immer hartnäckig zusammengezogen, so kann man allenfalls einen Brei von Safran, Kampfer, Milch, fol. cicut. hyosciam. alb. capit. pap. alb. auflegen; und wenn, ein seltner Fall, nach einigen Stunden die Verengerung noch immer fortdauert, und sich durch einen mäßigen Druck nicht heben läßt, so thut man wirklich besser, wenn man sich entschließt, entweder den Staar niederzudrücken, oder die Pupille zu beyden Seiten durch einen kleinen Schnitt mit der Scheere erweitert, als daß man sich durch einen stärkern Druck aufs Auge der bereits oben angezeigten Gefahr aussetzt; zumal da man Beyspiele hat (Daviel, Janin) daß diese Erweiterung der Pupille mit einem schneidenden Instrumente mit dem besten Erfolge geschehen ist (§. 244).

§. 296.

Indem man den Staar aus dem Auge drückt, ist es allenfalls rathsam, das Zimmer ein wenig zu verdunkeln: sobald aber der Staar aus dem Auge ist, muß es möglichst hell seyn, damit der Wundarzt genau untersuchen kann, ob die Pupille völlig rein ist. Es geschiehet zuweilen, vorzüglich wenn der Staar weich, oder die Kapsel nicht hinreichend geöffnet ist, daß etwas Undurchsichtiges, ein Stück von der Linse, oder ein trüber Schleim, vielleicht die verdunkelte Morgagnische Feuchtigkeit, oder die aufgeloßte äußere Ueberfläche der Krystalllinse zurückbleibt, welches, wenn es nicht ausgenommen wird, in der Folge das Gesicht mehr oder weniger hindert. Dies undurchsichtige Ueberbleibsel ist nicht immer sogar leicht zu finden; es verbirgt sich oft im äußern Umfange der Kapsel hinter der Regenbogenhaut, und die Pupille selbst erscheint klar und rein. Das Auge muß daher sorgfältig untersucht werden; man muß wechselsweise bald viel, bald wenig Licht in dasselbe fallen lassen; viel Licht, damit man die Pupille genau untersuchen kann; wenig Licht, damit sich die Pupille erweitert, und der Umfang der Kapsel so viel als möglich sichtbar wird. Das Licht muß von der Seite ins Auge fallen, damit der Widerschein in der Pupille den Wundarzt nicht hindert, das Undurchsichtige zu entdecken.

§. 297.

Ungeachtet der genauesten Untersuchung bleibt dennoch zuweilen ein undurchsichtiges Ueberbleibsel

unentdeckt im Auge zurück. Vorzüglich verbirgt es sich leicht im obern Theile der Kapsel, weil die Pupille gemeiniglich gleich nach der Operation stark herunter gezogen ist. Ziehet sich nach einiger Zeit die Pupille wieder herauf in die Mitte, so wird es sichtbar, und dem Gesichte hinderlich. Oder es senkt sich nach einigen Tagen herunter in die Mitte. Zuweilen bleibt es auch nach der Operation unentdeckt, löst sich in der wässerichten Feuchtigkeit auf, und macht dieselbe so trübe, daß der Wundarzt, wenn er nach einigen Tagen das Auge zuerst öffnet und untersuchet, leicht auf die Gedanken geräth, daß diese Trübigkeit von einer Verdunkelung der Kapsel oder Hornhaut herrührt. Indessen verliert sich dieselbe gemeiniglich in wenig Tagen.

§. 298.

Das was zurück bleibt, muß sogleich mittelst des Daviellschen Löffels (Tab. IV. Fig. 3) ausgezogen werden. Der Löffel muß ein wenig gekrümmt seyn, damit man das Undurchsichtige besser damit fassen kann, und ja allenthalben glatt und eben seyn. Man läßt ihn von Gold oder Silber verfertigen, damit er nicht rostet. Indem man den Löffel einbringt, drückt man das Auge unterhalb der Hornhaut ein wenig, jedoch so behutsam, daß nicht etwa die gläserne Feuchtigkeit vordringt, um die Pupille zu erweitern, und die Einbringung des Löffels zu erleichtern. Während der Einbringung muß die hohle Seite des Löffels vorwärts nach der Hornhaut, die convexe hinterwärts nach der Kapsel gerichtet seyn.

seyn. Wenn man den undurchsichtigen Nest in die Höhle des Löffels gefaßt hat, läßt man den vordern und obern Rand des Löffels auf der innern Ueberfläche der Hornhaut herab, und aus dem Auge glitschen. Dies alles geschieht oft geschwind und leicht. Manchmal aber muß man, um die Pupille völlig zu reinigen, den Löffel zu wiederholten malen einbringen. Manchmal bemüht man sich umsonst, das undurchsichtige zu fassen; man bewegt den Löffel in der Pupille hin und her, der undurchsichtige Körper bleibt unbewegt, und scheint vom Löffel gar nicht berührt zu werden. Wahrscheinlich ist in diesem Falle der Löffel gar nicht in der Kapsel. Um ihn dahin zu bringen, muß man ihn jederzeit zuerst in den untersten Theil der Pupille einsenken, und dann erst aufheben: denn immer ist die Oeffnung der Kapsel an ihrem untern Theile. Selten faßt man den undurchsichtigen Nest, wenn man den Löffel gerade zu auf ihn einbringt; mehrentheils liegt er im obern Theile der Kapsel, und selten ist daselbst die Kapsel offen.

S. 299.

Zuweilen ist es nicht nöthig, den Löffel ins Auge zu bringen. Ein gelindes Streichen der Hornhaut mit der convexen Seite des Löffels von oben herab, vereinigt mit einem gelinden Drucke des Fingers unterhalb der Hornhaut auf den Augapfel schafft oft alle trübe Nester ohne allen Reiz aus dem Auge. Nur muß man sehr behutsam dabey verfahren, um nicht etwa einen Vorfall der gläsernen

Feuchtigkeit zu verursachen. — Einige rathen die trüben Reste durch Einspritzungen aus dem Auge zu schaffen. Aber es ist beynahe gefährlicher eine feine Spritze durch die Pupille in die Kapsel zu bringen, als den Löffel. Und dahin muß sie gebracht werden, sonst spühlt sie die trüben Ueberbleibsel gar oft nicht aus. Sehr oft werden wiederholte Einspritzungen nöthig seyn, wo sie der Löffel auf einmal weggeschafft hätte. Sehr oft ist der trübe Schleim so zähe, und die festern Ueberbleibsel sitzen so fest, daß höchst wahrscheinlich die Spritze manchmal wohl ganz unzureichend seyn möchte. — Der Haaken, den einige (Mohrenheim) statt des Löffels empfehlen, ist dem Löffel in aller Absicht nachzusetzen. Der Löffel ist wirklich Haakenförmig, und da er breit ist, faßt er die undurchsichtigen Reste weit leichter, und verletzt das Auge nicht so leicht, als der Haaken. Bleibt trüber Schleim zurück, der gewöhnlichste Fall, so ist der Haaken ganz unbrauchbar. Bloss beim häutigen Staar kann er von einigen Nutzen seyn: doch davon nachher besonders.

S. 300.

Es giebt Fälle, wo es rathsamer ist, die trüben Ueberbleibsel des Staars im Auge zu lassen, als auszuführen. Die vorzüglichsten Fälle dieser Art sind: wenn das Auge so unruhig ist, daß der Löffel nicht ohne Verletzung der innern Theile des Auges eingebracht werden kann; wenn verschiedne Versuche, das zurückgebliebne undurchsichtige mit dem Löffel zu fassen, und auszuführen, fruchtlos gewesen sind; wenn

der

der Löffel schon einigemal eingebracht, und das meiste zurückgebliebne Undurchsichtige nicht ohne Reiz und Schwierigkeit ausgezogen ist, und nun noch ein kleiner Ueberrest zurück ist. In allen diesen Fällen ist es besser, den Rest des Staars im Auge zu lassen, als durch die wiederhohlte Einbringung und Bewegung des Löffels im Auge, sich der Gefahr einer heftigen Entzündung, und des gänzlichen Verlustes des Auges auszusetzen; zumal da wiederhohlte Erfahrungen zeigen, daß diese undurchsichtigen Reste sehr oft nach und nach aufgelöst werden, und verschwinden, so wie die Ueberbleibsel des Staars nach der Niederdrückung, ja die ganze niedergedrückte Staarlinse. Vielleicht befördern auflösende Mittel, z. E. der Borax, das Allthåadekott, u. s. w. die Auflösung und Zertheilung derselben. Am gewissensten kann man hoffen, daß die Pupille ganz rein wird, wenn man sichs bewußt ist, daß man die vordere Haut der Kapsel hinreichend geöffnet hat, so daß die wässerichte Feuchtigkeit, von der die Erweichung und Auflösung des Zurückgebliebenen vorzüglich zu erwarten ist, frey und ungehindert in dieselbe eindringen kann.

S. 301.

Es giebt einige Wundärzte (Pott), die sich auf die Zertheilung des Zurückgebliebenen so sehr verlassen, daß sie den Gebrauch des Daviellschen Löffels gänzlich widerrathen, und alle Undurchsichtigkeiten, die nach dem Durchgange des Staars im Auge zurückbleiben, in demselben unangerührt lassen.

Eine Behandlungsart, die keinesweges zu befolgen ist; theils weil der Gebrauch des Löffels sehr oft leicht ist, und nicht die geringste Vermehrung der Zufälle veranlaßt; theils weil es nicht in jedem Falle gleich ist, ob der Kranke das Gesicht sogleich nach der Operation, oder lange Zeit nach derselben wieder erhält, da die Zertheilung des Zurückgebliebenen oft sehr langsam vor sich geht; und endlich weil der Löffel ein gewisseres Mittel, die Zertheilung aber immer ungewiß ist. Zuverlässige Erfahrungen zeigen, daß diese verdunkelten Ueberreste des Staars oft zeitlebens unverändert im Auge bleiben, und das Gesicht mehr oder weniger hindern.

Der Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit.

§. 302.

Sobald die Hornhaut geöffnet, und die Staarlinsen aus dem Auge ist, hindert nun nichts mehr die gläserne Feuchtigkeit hervorzudringen, als die Regenbogenhaut, und die Haut der gläsernen Feuchtigkeit; ein schwacher Widerstand, der der geringsten Gewalt weicht. Und dennoch fällt diese Feuchtigkeit weit seltner als man fürchtet, und nur bey gewissen besondern Gelegenheiten hervor. Die vorzüglichsten Veranlassungen dazu während der Operation sind: die Unvorsichtigkeit des Gehülfsen, der mit dem Finger, womit er das obere Augenlid aufzieht, den Augapfel drückt; eine ähnliche Unvorsichtigkeit des Wundarzte, der mit dem Finger, womit er das untere Augenlid niederziehet, den Aug-

Augapfel drückt; der Gebrauch solcher Instrumente zur Befestigung des Auges, die das Auge sehr drücken und reizen; wenn der Schnitt in der Hornhaut zu klein ist, und der Wundarzt wider die Regel versucht, den Staar auszudrücken; oder wenn der Staar durch das Instrument, womit die Kapsel geöffnet wird, verschoben ist, so daß er nicht die ganze Pupille bedeckt, und der Wundarzt sucht den Staar durch einen Druck aus dem Auge zu schaffen; oder wenn ein Theil der Staarlinsse bereits aus dem Auge ist, und der Wundarzt versucht es den Rest aus dem Auge zu drücken, so dringt gemeiniglich die gläserne Feuchtigkeit hervor, und der Staar, oder der Rest des Staars bleibt im Auge zurück. Wenn der Wundarzt den Druck aufs Auge, in jedem, auch in dem besten Fall, übereilt stark macht, so schießt die Krystallinsse gemeiniglich plößlich hervor, und mehrentheils die gläserne Feuchtigkeit hinter ihr her.

S. 303.

Der Balgstaar geht mehrentheils schwer durch die Pupille, und erfordert einen langen und ziemlich starken Druck. Endlich springt er gemeiniglich plößlich hervor, und wenn der Wundarzt nicht sehr auf seiner Huth ist, die gläserne Feuchtigkeit hinter her.

— Zuweilen dringt ohne allen besondern Anlaß die gläserne Feuchtigkeit hinter dem Staare her aus dem Auge. Gemeiniglich findet man sie in diesem Falle widernatürlich dünn und aufgelöst, und wahrscheinlich ist der Vorfall derselben in diesem Falle einzig

der widernatürlichen Auflösung derselben zuzuschreiben. Und diese scheint zuweilen die Wirkung der auflösenden Mittel zu seyn, die der Kranke, die Verdunkelung der Krystalllinse zu heben, vorher gebraucht hat. — Auch wenn die Kapsel der Krystalllinse nicht durch ein schneidendes Instrument, sondern absichtlich oder wider Willen durch den Druck des Fingers zersprengt wird, fällt oft die gläserne Feuchtigkeit vor.

S. 304.

Dies sind die vorzüglichsten Veranlassungen zu dem Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit während der Operation. Indessen ist man auch nach der Operation nicht sicher vor demselben. Er ereignet sich oft einige Stunden, ja einige Tage nach derselben. Die Ursache dieses späten Vorfalls sind entweder ein unvorsichtiger Druck aufs Auge, und eine krampfhafte Verkürzung der Augenmuskeln, und daher rührende Zusammenpressung des Augapfels. Wenn die Binde aufs Auge, und zu fest angelegt wird; wenn der Kranke des Nachts im Schlafe sich das Auge reibt, oder wenn er sich aufs Auge legt; wenn der Wundarzt die zusammengeklebten Augenlider gleich in den ersten Tagen nach der Operation und auf eine unbehutsame Weise auseinander ziehet und öffnet, mehrerer zufälligen Gelegenheiten, wo das Auge gedrückt wird, nicht zu gedenken, öffnet sich zuweilen noch den vierten Tag nach der Operation die bereits zusammengeklebte Wunde der Hornhaut wieder, und die gläserne Feuchtigkeit dringt hervor.

hervor. Die krampfhafte Zusammenziehung des Augapfels ist zuweilen die unmittelbare Folge des Reizes, den das Auge während der Operation erlitten hat. Wenn daher der Kranke sehr reizbar und furchtsam ist; wenn die Operation mit Schwierigkeiten verbunden gewesen, oder auf eine unsanfte Art gemacht worden ist; wenn der Kranke bald nach der Operation klagt, daß sich das operirte Auge wider seinen Willen bewegt, wenn er allerhand andre krampfhafte Zufälle in verschiedenen Theilen des Körpers empfindet; so hat man diesen Vorfall immer zu fürchten. Zuweilen ist die krampfhafte Zusammenschnürung die Folge einer heftigen Leidenschaft. Man hat gesehen, daß ein heftiges Schrecken den vierten Tag nach der Operation einen plötzlichen Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit verursachte.

§. 305.

Man hat verschiedene Vorschläge gethan, diesen Vorfall zu verhüten. Einige (Wenzel) rathen in dieser Absicht nicht die untere sondern die obere Hälfte der Hornhaut, oder die Hälfte zur Seite abzuschneiden; andre (Poyet) wollen, man soll den Kranken auf dem Rücken liegend operiren; andre machen sich zur Regel, sogleich nach der Operation den Kranken auf den Rücken zu legen, und einige Tage liegen zu lassen, u. s. w. Aber da die gläserne Feuchtigkeit nicht aus dem Auge fließt, oder durch ihre Schwere herabsinkt, sondern durch einen Druck oder Krampf aus dem Auge gepreßt wird, und also eben sowohl oberwärts als unterwärts,
eben

eben sowohl im Stehen als im Liegen hervordringt, siehet man leicht ein, daß diese Vorschläge unzureichend sind. Die Hauptsache ist, die oben angezeigten Veranlassungen dazu bestmöglichst zu verhüten, und die meisten sind von der Art, daß sie sich gar wohl verhüten lassen; wenn sich nach der Operation das Auge in einem krampfhaften Zustande befindet, lindernde besänftigende Mittel aufs Auge zu legen, und ähnliche Mittel innerlich zu verordnen; das Auge in den ersten Tagen nach der Operation nicht ohne besondere Ursache zu öffnen; und wenn eine besondere Ursache ist, es mit Vorsicht und Behutsamkeit zu thun, und endlich die ersten Nächte nach der Operation auf den Kranken wohl Licht zu haben, um zu verhüten, daß er sich nicht das Auge reibt, oder auf irgend eine Art drückt.

S. 306.

Es ist indessen nicht zu leugnen, daß auch bey der größten Vorsicht und Geschicklichkeit man doch nicht immer sicher vor diesem Vorfalle ist. Jedoch ist er, wenn er sich ereignet, in den meisten Fällen ohne üble Folgen, ja wohl gar mit einigen Vortheilen verbunden, und mehrentheils leicht zu heben. Der Verlust eines geringen Theils der gläsernen Feuchtigkeit, wird gemeiniglich in wenigen Tagen wieder ersetzt. Man hat Fälle beobachtet, wo die Hälfte der gläsernen Feuchtigkeit verlohren gegangen ist, und dennoch das Auge nach einiger Zeit seine natürliche Größe, und der Kranke das Gesicht vollkommen erhalten hat. Freylich wenn ein an-

seh-

sehnlicher Theil derselben verlohren gegangen ist, währt es oft ziemlich lange, ehe die Kranken die Augen öffnen und brauchen können; ja wenn ein zu großer Theil verlohren gegangen ist, bleibt das Auge zeitlebens klein, und das Gesicht mehr oder weniger schwach. — Indem die gläserne Feuchtigkeit aus dem Auge fällt, drückt sie gemeiniglich die Pupille nieder, und verändert dadurch ihre Gestalt. Aber dieser Fehler verliert sich, nachdem die gläserne Feuchtigkeit abgesondert ist, nach und nach gar oft. — Man hat beobachtet, daß diejenigen, denen ein mäßiger Theil der gläsernen Feuchtigkeit vorfällt, nach der Operation ein weit schärferes Gesicht erhalten, als diejenigen, denen diese Feuchtigkeit nicht vorgetreten ist. Vielleicht ersetzt diese Feuchtigkeit, die in Absicht ihrer Consistenz der Krystallinse am nächsten kommt, den Verlust der Linse einigermaßen, indem sie vordringt, und die ganze hintere Augenkammer anfüllt. — Auch hat man beobachtet, daß diejenigen gemeiniglich eine sehr unbedeutende Entzündung bekommen, denen die gläserne Feuchtigkeit während der Operation vorfällt.

S. 307.

Einige rathen (Daviel), den während der Operation vorgefallnen Theil der gläsernen Feuchtigkeit sogleich mit der Scheere nahe an der Hornhaut abzuschneiden. Dies ist indessen in den meisten Fällen schwer, ja unmöglich, unnöthig, und nachtheilig. In dem Augenblicke, wo man sieht, daß die gläserne Feuchtigkeit hervordringt, kann man,
um

um das allzustarke Hervordringen derselben zu verhüten, nichts bessers thun, als die Augenlider sogleich schließen. Sobald man nun, um die vorgefallne Feuchtigkeit abzusondern, die Augenlider öffnet, dringt gemeiniglich ein neuer Theil derselben hervor, und jeder Versuch die Scheere unter den vorgefallnen Theil der Feuchtigkeit zu bringen, und ihn zu fassen und abzuschneiden, vermehrt den Vorfall, und drückt und ziehet immer mehr und mehr von dieser Feuchtigkeit aus dem Auge hervor. — Auch unnöthig ist die Absonderung des vorgefallnen Theils der gläsernen Feuchtigkeit. Der vorhängende Theil drückt und belästigt das Auge nicht, und kann daher an demselben hängen bleiben. Glaubt man, daß der in der Wunde liegende Theil der gläsernen Feuchtigkeit die Vereinigung der Wunde der Hornhaut hindere, und deswegen abgeschnitten werden müsse, so muß man bedenken, daß man allenfalls nur den außerhalb der Wunde hervorstehenden Theil abschneiden kann, und alles, was in der Wunde liegt nach dieser Absonderung liegen bleibt, folglich das angebliche Hinderniß der Heilung durch diese Absonderung nicht gehoben wird.

S. 308.

Am besten thut man, wenn man, sobald man sieht, daß die gläserne Feuchtigkeit hervordringt, das Auge sogleich schließt, und ohne an die Absonderung des Vorfalls zu denken, verbindet. Die Wunde der Hornhaut verengert sich nach und nach, und schnürt gleich einer Ligatur den vorgefallnen Theil

Theil der gläsernen Feuchtigkeit zusammen, und sondert ihn ab. Dies geschiehet zuweilen in kurzer, zuweilen in längerer Zeit. In den meisten Fällen wird man den zwölften Tag keine Spuhr von dem Vorfalle mehr finden. Deffnet man das Auge den sechsten oder achten Tag, so findet man gemeiniglich die Wunde der Hornhaut schon geschlossen, den untersten und mittlern Theil derselben ausgenommen, wo sie offen, und durch die gläserne Feuchtigkeit ausgedehnt und angefüllt ist. Aus diesem Theile der Wunde hängt die vorgefallne gläserne Feuchtigkeit gleich einem weißen undurchsichtigen Schleime an einem dünnen Stiele. Man kann sie sehr leicht absondern, wenn man diesen Stiel zerreißt oder zerschneidet. Dies ist aber nicht rathsam; theils weil sich der Kranke zuweilen fürchtet, und dies kleine Geschäfte wohl gar als eine zweyte Operation betrachtet; theils weil sich der Vorfall ganz zuverlässig von sich selbst absondert, und bis dahin das Auge nicht belästigt.

§. 309.

Die Wunde der Hornhaut bleibt an dem Orte, wo sie bis zuletzt von der hervorhängenden gläsernen Feuchtigkeit offen erhalten wird, gemeiniglich eine Zeitlang trübe, weiß, dick, unförmlich; aber diese kleine Unförmlichkeit verschwindet gemeiniglich zuweilen eher zuweilen später bey dem äußerlichen Gebrauche des weissen Vitriols gänzlich. — Bereits oben ist gesagt worden, daß die gläserne Feuchtigkeit, indem sie aus dem Auge fällt, die Pupille aus
der

der Mitte der Regenbogenhaut herabziehet, und länglicht macht. Diese widernatürliche Stelle und Gestalt behält nun freylich die Pupille zuweilen auf immer, jedoch gemeiniglich ohne großen Nachtheil des Kranken. Die mehresten Kranken sehen mit einer solchen Pupille deutlich und gut. Nicht selten geschieheth es aber auch, daß die Pupille allmählig ihre vorige Gestalt und Stelle ganz vollkommen wieder erhält, und daß also dieser Vorfall nicht die allergeringste Spur zurück läßt.

S. 310.

Wenn die gläserne Feuchtigkeit erst nach der Operation, und nachdem das Auge verbunden ist, vorfällt, merkt man es oft nicht eher, als wenn man das Auge um die gewöhnliche Zeit, d. i. den achten oder zehnten Tag, öffnet. Indessen kann man dennoch zuweilen bey einiger Aufmerksamkeit aus allerhand Umständen schließen, daß die gläserne Feuchtigkeit vorgefallen ist. Wenn z. E. die wässerichte Feuchtigkeit, die gemeiniglich den zweyten oder dritten Tag aus dem Auge zu fließen, aufhört, den dritten oder vierten oder fünften Tag wieder von neuem zu fließen anfängt, kann man schließen, daß die Wunde der Hornhaut wieder aufgerissen worden, und vielleicht die gläserne Feuchtigkeit, oder die Regenbogenhaut vorgefallen ist. Diese Vermuthung wird noch wahrscheinlicher, wenn irgend eine Ursach vorhergegangen ist, die die Wunde der Hornhaut aufzureißen vermag, und wenn bald nach dieser vorhergegangenen Ursach der Kranke plötzlich anfängt, einen

einen Schmerz, oder sonst eine unangenehme Empfindung im Auge zu fühlen, die er vorher nicht fühlte. Wenn die wässerichte Feuchtigkeit den dritten Tag nicht auszufließen aufhört, kann man sicher schließen, daß irgend etwas da ist, welches die Wunde der Hornhaut hindert sich zu schließen, und das ist mehrtheils nichts anders, als ein Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit, oder der Regenbogenhaut. Immer ist wenigstens der Wundarzt berechtigt, wenn diese Erscheinungen beobachtet werden, das Auge zu öffnen, da er denn den Vorfall entdeckt, wenn er da ist. Indessen sind diese Zufälle oft so unmerklich, daß sie der Wundarzt nicht beobachtet, und folglich den Vorfall nicht eher entdeckt, als wenn er zur gewöhnlichen Zeit das Auge öffnet. Selten aber ist etwas daran gelegen, da er, wenn er ihn auch entdeckt, doch nichts thun kann, sondern, wie kurz vorher gesagt worden ist, alles der Natur überlassen muß.

Der angewachsene Staar.

§. 311.

Wenn der Kranke weder Licht noch Schatten unterscheiden kann, wenn der Staar dicht hinter der Pupille liegt, und diese schief, eckigt, wider natürlich klein, und ganz unbeweglich ist, so ist der Staar so stark an die Regenbogenhaut angewachsen, und der Erfolg der Operation so mißlich, daß man am besten sie ganz und gar nicht unternimmt. Wenn aber der Kranke von der einen oder andern Seite

Richt. Wundarzneyk. III. B. K noch

noch einiges Licht empfindet, der Staar an dieser Seite nicht ganz dicht an der Pupille liegt, die Pupille an dieser Seite einige Beweglichkeit hat, und indem sie sich bewegt, schief, eckigt, runzlicht wird, so ist die Verwachsung des Staars mit der Regenbogenhaut so groß nicht, daß man die Operation nicht mit der Hoffnung eines guten Erfolgs unternehmen könnte. Nur muß man nicht vergessen, dem Kranken die Schwierigkeiten, die mit der Operation verbunden sind, zum voraus anzuzeigen, und da das Auge bey der Absonderung des Staars von der Regenbogenhaut immer leidet, zeitige und sorgfältige Anstalt machen, um der Entzündung vorzubauen; vornemlich aber zugleich Zeit in Betrachtung ziehen, daß bey dieser Gattung des angewachsenen Staars gemeiniglich die vordere Haut der Kapsel verdunkelt ist. Endlich muß man in Absicht der Vorhersagung bedenken, daß gar oft die andern Gattungen des angewachsenen Staars mit dieser vereinigt sind.

§. 312.

Die Absonderung des Staars von der Regenbogenhaut suchen einige mit einem schneidenden Instrument z. E. einer zweisehnidigen Staarnadel zu bewerkstelligen. Aber wie kann man ein spitziges zweisehnidiges Instrument zwischen diese zwey zusammengewachsene Theile bringen, ohne beyde Theile heftig zu verletzen? Wie kann man mit einem geraden Instrumente die ganze vordere Ueberfläche der Staarlinsse vom Staare absondern? Man wird es durch die Wunde der Hornhaut zwar zwischen die obere

obere Hälfte, aber unmöglich zwischen die untere Hälfte dieser beyden Theile bringen können. Und wie nun, wenn sich die Stelle der widernatürlichen Zusammenklebung an der untern Hälfte dieser Theile befindet? — Besser bringt man eine etwas platte, am vordern Ende ziemlich stark gebogne Sonde in die hintere Augenkammer zwischen den Staar und die Regenbogenhaut, und sucht, indem man theils die Sonde um ihre Aze drehet, theils indem man sie gerade gegen den Staar drückt, und dadurch den Staar zurück und von der Regenbogenhaut abstoßt, diese beyden Theile, da wo sie zusammenhängen, von einander abzusondern. Wenn die Verwachsung nicht stark ist, gelingt dieser Handgriff oft ganz leicht. Je fester, und in je mehrern Punkten diese Theile zusammen hängen, desto schwerer ist die Absonderung.

§. 313.

Die Verwachsung der Staarlense mit ihrer Kapsel kann man vor der Operation auf keine Art und Weise erkennen; auch wenn man sie entdeckte, auf keine Art und Weise lösen. Zuweilen kommt die Staarlense bey einem leichten Drucke sammt ihrer Kapsel hervor; und dann erfordert diese Art des angewachsenen Staars auch in Absicht der Operation keine besondre Rücksicht. — Zuweilen aber ist der Staar nicht allein mit seiner Kapsel, sondern auch diese auf eine widernatürliche Art mit der Haut der gläsernen Feuchtigkeit zusammenklebt. Die dritte Gattung des angewachsenen Staars.

Wenn, nachdem die Hornhaut geöffnet worden, und der Schnitt wohl gerathen ist, das Lafayische Instrument gehörig angewendet, und man versichert ist, daß es die Kapsel geöffnet hat, wenn, indem die Pupille ausdehnbar ist, und dem Staare kein Hinderniß legt, bey einem anfangs gelinden und allmählig vermehrten Drucke aufs Auge der Staar gar keine Neigung bezeigt, hervor zu treten, so hat man Ursach, diese Gattung des angewachsenen Staars zu vermuthen. Man irrt sehr, wenn man in diesem Falle seine Absicht durch einen stärkern Druck aufs Auge zu erreichen host; der Staar bleibt eine Zeitlang unbewegt im Auge, und springt endlich sammt seiner Kapsel und der gläsernen Feuchtigkeit plöblich hervor; ja zuweilen dringt die gläserne Feuchtigkeit hervor, und der Staar bleibt zurück.

S. 314.

Der beste Handgriff, diese Gattung des angewachsenen Staars zu lösen, ist folgender. Man bringt die Spitze einer runden Staarnadel durch die Pupille in die hintere Augenkammer, und schiebt sie, indem man sie zwischen den Fingern rollt, in die Mitte der Staarlinse; bewegt alsdann mittelst der Nadel die Staarlinse, anfangs gelinde, allmählig ein wenig stärker, nach allen Seiten, aufwärts und niederwärts, linker- und rechter Hand, worauf man die Nadel wieder aus dem Auge ziehet, und nun das Auge mit dem Finger auf die gewöhnliche Art andrückt, um den Staar zum Durchgange durch die Pupille zu befördern. Oft tritt nun der Staar
leicht

leicht hervor. Thut er es nicht, so wiederhohlt man den Handgriff; und wenn er alsdann unbeweglich ist, steht man am besten von der Operation ab. Vielleicht bedient man sich noch mit mehrern Nutzen einer zweyschneidigen Nadel zu diesem Handgriffe. Man würde mittelst derselben den Staar nicht allein hin und her bewegen, sondern auch gleichsam ein wenig um seine Aye drehen können, und durch diese letztere Bewegung zu seiner Absonderung vielleicht viel beytragen. — Alle andre Handgriffe, die man, den angewachsenen Staar zu lösen vorgeschlagen hat, sind dem eben beschriebenen nachzusetzen. Mit der goldnen Nadel, die einige empfehlen (Wenzel), kann man allenfalls wohl die vordere, aber keinesweges die hintere Adhäsion heben: denn wie ist es möglich, dies Instrument zwischen die Staarlinse und die gläserne Feuchtigkeit zu bringen? Mit der Zange kann man den Staar nicht fassen, wenn er hart, und mit seiner Kapsel verwachsen ist; und könnte man ihn fassen, so würde man nebst dem Staare die gläserne Feuchtigkeit hervorziehen.

Der häutige Staar.

§. 315.

Diejenigen, welche nach der oben gegebenen Regel bey Eröffnung der Kapsel die Krystallhaut wohl zerschneiden, haben die Verdunkelung derselben wenig zu fürchten, da sie durch diesen Theil der Operation größtentheils zerstöhrt wird, und der Rest, vermöge seiner Elasticität sich gemeiniglich zu-

rück rollt, daß er dem Gesichte ganz und gar nicht hinderlich ist. Die Verdunkelung der vordern Haut der Kapsel ändert also die gewöhnliche Staaroperation in nichts, allenfalls bloß darinnen, daß man die Krystallhaut bey Eröffnung der Kapsel mehr als gewöhnlich zerschneidet. Sobald dies geschehen ist, fällt die Krystalllinse in die Pupille, und muß ausgezogen werden, sie mag durchsichtig, oder undurchsichtig seyn. Läßt man sie im letzten Falle im Auge, so ist offenbar zu fürchten, daß sie sich nach dem Verluste ihrer vordern Haut mit der Zeit verdunkelt, und einen Krystallstaar verursacht.

§. 316.

Wenn nachdem die Krystalllinse ausgezogen ist, die Oeffnung in der verdunkelten Haut der Kapsel nicht groß genug ist, und die verdunkelten Ränder derselben in der Pupille deutlich bemerkt werden, kann man es allenfalls versuchen, sie mit einer feinen Zange zu fassen und auszuziehen. Da sie ganz deutlich sichtbar sind, ist dieser Handgriff oft ganz leicht. Auch ist er mit dem besten Erfolge verrichtet worden (Janin). Entdeckt man vor der Operation mit Gewißheit, daß die vordere Haut verdunkelt ist, so kann man allenfalls auch dem Rathe einiger (Wenzel) zu folge, sobald die Hornhaut geöffnet ist, eine kleine Zange in die Pupille bringen, die vordere Haut der Kapsel damit fassen und ausziehen, und dann die Linse ausdrücken. Oft findet man mehrere Schwierigkeiten, wenn man zuerst die Linse, und dann die Kapsel ausziehet. Man
faßt

faßt leicht die Haut der gläsernen Feuchtigkeit sammt der Kapsel mit der Zange. Dies hat man nicht zu fürchten, wenn man die Krystallhaut eher ausziehet, als die Linse, denn alsdann giebt die Krystalllinse der Zange einen Unterstützungspunkt ab, auf welchem man die Haut bequem fassen kann. Nur setzt dieser Handgriff zum voraus, daß man die Verdunkelung der Krystallhaut gewiß erkennt, und daß dieselbe nicht mit der Staarlinse zusammengeklebt ist: in welchem Falle die Linse sogleich sammt der Kapsel ausgezogen werden muß.

S. 317.

Wenn nachdem die Krystalllinse ausgezogen ist, die Pupille noch eben so dunkel ist, als vorher, diese Dunkelheit weiter hinter der Pupille ist, als sie vor der Operation war; wenn die widernatürliche Farbe der Pupille nach der Operation nicht völlig dieselbe ist, die sie vor der Operation war; wenn die Dunkelheit vor der Operation einer convexen, Fläche glich, und nun nach der Operation einer concaven Fläche gleicht; oder wenn die Krystalllinse, die man ausgezogen hat, durchsichtig, und die Pupille nach der Operation eben so undurchsichtig ist, als sie vor der Operation war, so hat man Ursache zu glauben, daß die hintere Haut der Kapsel, oder die Haut der gläsernen Feuchtigkeit verdunkelt ist, nur muß man sich wohl versichern, daß die Dunkelheit der Pupille nicht etwa von einem in der Kapsel zurückgebliebenen trüben Schleime herrührt. Die hintere Haut der Kapsel mit der Zange fassen

K 4

ist

ist schwer; man faßt sicherlich die Haut der gläsernen Feuchtigkeit zugleich mit, und ziehet sammt der Kapsel die gläserne Feuchtigkeit hervor; es müßte denn die vordere Haut der Kapsel zugleich verdunkelt, und der Rand der in ihr gemachten Oeffnung sichtbar seyn, so daß man diesen fassen könnte. — Am besten durchsticht man wohl die hintere verdunkelte Haut der Kapsel mit dem Ensitome oder irgend einem andern bequemen Instrumente zu wiederholtenmalen, und so viel als möglich, indem man zugleich das Auge unterhalb der Hornhaut mit dem Finger gelinde drückt, um die verdunkelte Haut der Pupille zu nähern, die Pupille zu erweitern, den größten Theil der verdunkelten Haut zu entblößen, und eine desto größere Oeffnung in dieselbe machen zu können. Freylich mag wohl die gläserne Feuchtigkeit bey diesem Handgriffe oft vordringen. Aber das Vordringen derselben hat den Vortheil, daß die gemachte Oeffnung in der hintern Haut der Kapsel dadurch außgedehnt, und gehindert wird, sich etwa wieder zu verschließen. Es scheint sogar rathsam zu seyn, diesen Vorfall, wenn er sich nicht von freyen Stücken ereignet, eben bemeldeter Vortheile wegen, durch einen gelinden Druck des Fingers außs Auge auf eine behutsame Art zu erregen.

Der Nachstaar.

S. 318.

Der Nachstaar ist zuweilen die Folge der Entzündung, die nicht selten nach der Operation erfolgt, sich

sich bis in die Kapsel erstreckt, und eine Verdunkelung derselben hinterläßt; oder er ist die Wirkung eines innern Krankheitsstoffs, der nach der Operation auf die zurückgebliebne Kapsel wirkt, und dieselbe verdunkelt, der oft vorher schon im Körper gewesen, und die Verdunkelung der Krystalllinse verursacht hat. Im ersten Falle entsteht derselbe bald, oft wenige Tage, im letztern Falle aber später, oft Monate ja Jahre nach der Operation. Zuweilen entsteht wenige Tage nach der Operation von zurückgebliebenen trüben Schleime, der sich während der Operation im Umfange der Kapsel hinter der Regenbogenhaut verbirgt, bald nach der Operation aber sich in der Mitte der Kapsel zusammenziehet; oder aber von einem zurückgebliebenen Stück der Krystalllinse, das sich bald nach der Operation in der wässerichten Feuchtigkeit auflöst, eine neue Verdunkelung der Pupille, die vom Nachstaar, wohl zu unterscheiden ist, auch durch ihr äußeres Ansehen, und die Verschiedenheit der Farbe gemeiniglich leicht zu unterscheiden ist. Daß nach der Niederdrückung des Staars die Linse zuweilen wieder aufsteigt, und eine neue Verdunkelung der Pupille verursacht, die von dem unerfahrenen und unachtsamen Wundarzte zuweilen für einen Nachstaar gehalten werden kann, ist bereits im vorhergehenden gesagt worden.

§. 319.

Der Nachstaar der erstern Art entsteht immer während einer heftigen Entzündung, und oft verliehrt er sich auch zugleich mit derselben. Gemeinlich

lich nimmt die Dunkelheit ab, so wie die Röthe abnimmt, und sobald diese verschwunden ist, ist auch die Pupille rein und klar. Alles also was die Entzündung des Auges nach der Operation verhütet, oder wenn sie entstanden ist, aufs geschwindeste und Kräftigste hebt, verhütet und hebt den Nachstaar. So lange das Auge noch roth ist, darf man immer hoffen, daß sich der Nachstaar mit der Entzündung und bey dem Gebrauche entzündungswidriger Mittel verlihren wird. Und auch alsdann, wenn, wie nicht selten geschiehet, derselbe nach völlig geendigter Entzündung zurück bleibt, darf man noch hoffen, daß sich derselbe bey dem Gebrauche innerlicher zertheilender Mittel, vornemlich des Spießglaschwefels, Quecksilbers, Schierlings u. s. w. allmählig verlihren wird. Man hat gesehen, daß bey dem Gebrauche dieser Mittel die Pupille verschiedene Monate nach der Operation ganz vollkommen rein und klar worden ist.

S. 320.

Wenn nun aber der Gebrauch dieser Mittel fruchtlos ist, findet alsdann nicht eine Operation statt? Man hat (Wenzel, Janin) wirklich die Hornhaut abermals geöffnet, und wie man versichert, die verdunkelte Kapsel mittelst einer Zange leicht und glücklich ausgezogen. Dies mag wohl zuweilen geschehen seyn, indessen, da die Verdunkelung der Kapsel in diesem Falle immer die Folge einer heftigen Entzündung ist, ist dieselbe mehrentheils mit der Regenbogenhaut und der Haut der gläsernen Feuch-

Feuchtigkeit so stark verwachsen, daß sich von dieser Operation wohl selten ein glücklicher Erfolg erwarten läßt. Ueberdies ist die Pupille gemeinlich so sehr verengert, daß man kaum eine Zange durch dieselbe einbringen kann. — Der späte Nachstaar, der die Wirkung einer innern Ursache ist, erfordert die Mittel, welche dieser Ursach angemessen sind. Am häufigsten ist sie gichtischer Art. In dem Falle, wo diese Mittel nichts fruchten, läßt sich von der Operation beynah mehr als in dem vorhergehenden Falle erwarten, da keine Entzündung vorhergegangen, und folglich die Adhäsion der Kapsel an die nahen Theile nicht so sehr zu fürchten ist.

Die Ausziehung der Staarlinse samt der Kapsel.

S. 321.

Da die Verdunkelung der Kapsel nach der Operation der Ausziehung nicht selten, und mehrentheils schwer zu heben ist; fragt sich, ob man nicht am besten thäte, wenn man um diese zweyte Blindheit zu verhüten, bey der Operation jederzeit die Linse samt der Kapsel auszdge. In der That ist es fast widersinnig, daß man die Kapsel zurück läßt. Sie leidet bey der Operation so viel, und es ist so wahrscheinlich, daß die Krankheit der Linse auch mit auf die Kapsel wirkt, daß man sich wirklich wundern muß, daß es noch Fälle giebt, wo die Kapsel nach der Operation durchsichtig bleibt. — Die Zeichen des häutigen Staars sind oft sehr unsicher. Die

Die Verdunkelung der hintern Haut der Kapsel kann vor der Operation, wenn die Linse zugleich verdunkelt ist, auf keine Art und Weise entdeckt werden; immer bleibt also, auch unter dem besten Anscheine der Erfolg der Staarauszziehung ungewiß. Ziehet man jederzeit die Linse samt der Kapsel aus, so fällt auch diese Ungewißheit gänzlich weg. — Wie oft bleibt bey der Operation etwas von der Linse in der Kapsel zurück, das oft mittelst des Löffels sehr schwer, und nicht ohne Verletzung des Auges ausgenommen wird; oft auf keine Art und Weise ausgenommen werden kann. Alle Gefahren und Schwierigkeiten, die daher entstehen, würde man vermeiden, wenn man jederzeit die Kapsel samt der Linse auszüge.

S. 322.

Aber kann man denn auch die Kapsel uneröffnet samt der Linse ausziehen? Verschiedene Erfahrungen (Heuermann Bemerkungen, I Band, S. 261. — Janin Observations sur l'Oeil p. 255. — Richter Observ. chirurg. Fascic. II.) machen es glaublich, daß dies zuweilen sehr leicht geschehen könne. Wenn die Kapsel nicht gehdrig geöffnet ist, tritt sie zuweilen wider Willen des Wundarzts samt der Linse hervor; so leicht sondert sie sich zuweilen von der Haut der gläsernen Feuchtigkeit ab. Der Erfolg der Operation ist in diesen Fällen so glücklich, wie in den gewöhnlichen. Im vorhergehenden ist erweislich gemacht, daß bey der Niederdrückung des Staars wohl mehrentheils die Kapsel samt der Linse
nieder-

niedergedrückt wird. Kann die Kapsel niedergedrückt werden, warum sollte sie nicht eben so leicht ausgezogen werden? Es ist zur Erreichung dieser Absicht weiter nichts nöthig, als die Eröffnung der Kapsel zu unterlassen, und nach geschehener Eröffnung der Hornhaut, sogleich durch einen behutsamen Druck die Linse und Kapsel allmählig auszudrücken. Zuweilen hängt die Kapsel, nachdem sie samt der Linse bereits gänzlich aus der Oeffnung der Hornhaut hervorgetreten ist, noch ein wenig an der Haut der gläsernen Feuchtigkeit. Man sondert sie in diesem Falle mittelst des Davielschen Löffels behutsam ab, und hütet sich, daß man nicht etwa die gläserne Feuchtigkeit hervorziehet.

S. 323.

Indessen so leicht und glücklich auch dieser Handgriff zuweilen von statten gehet, so ist er dennoch auch gar oft mit so mancherley Schwierigkeiten verbunden, daß er wohl schwerlich in allgemeinen Gebrauch kommen wird. Die Verbindung der Kapsel mit der Haut der gläsernen Feuchtigkeit ist oft so ansehnlich, daß ein sehr starker und anhaltender Druck erfordert wird, die uneröffnete Kapsel und Linse auszudrücken; ein Druck, der, wie im vorhergehenden bereits erinnert worden ist, dem Auge immer ganz vorzüglich zuwider ist, und gern eine heftige Entzündung, und den Verlust des erhaltenen Gesichts zur Folge hat; immer auch, da die Linse in diesem Falle gemeiniglich zuletzt plözlich hervortritt, mit der Gefahr des Vorfalls der gläsernen
Feuch=

Feuchtigkeit verbunden ist. Man hat zwar in jedem Falle diese Operationsart bloß zum Versuch empfohlen; man soll nämlich, jederzeit bey der Operation der Ausziehung zuerst versuchen, die Kapsel uneröffnet auszudrücken, und wenn man Schwierigkeiten merkt, die Kapsel alsdann noch öffnen. Auf diese Art würde man sich der Vortheile, die mit diesem Handgriffe verbunden sind, in jedem Falle, wo er statt findet, theilhaftig machen, und dennoch alle die Gefahren vermeiden, die man in dem Falle zu fürchten hat, wo derselbe mit Schwierigkeiten verbunden ist. Aber auch dieser Vorschlag wird selten mit Vortheil bewerkstelligt werden können. Siehet man sich am Ende genöthigt, die Kapsel zu öffnen, und zurück zu lassen, so hat das Auge einen so starken Druck erlitten, und die Kapsel ist so gespannt und verzogen worden, daß man eine Entzündung des erstern, und eine Verdunkelung der letztern gar sehr zu fürchten hat. Eben dies hat man auch zu fürchten, wenn, wie sehr oft geschiehet, die Kapsel, während dem Versuche, sie samt der Linse auszudrücken, zerspringt, die Linse allein hervortritt, und die Kapsel zurückbleibt. — Endlich in dem Falle, wo man am mehresten Ursach hat, zu wünschen, daß diese Methode gelingt, d. i. in dem Falle, wo die Kapsel verdunkelt ist, gelingt sie gemeinlich am wenigsten; denn gemeinlich hängt in diesem Falle die Kapsel widernatürlich fest mit der Haut der gläsernen Feuchtigkeit zusammen.

Die Verletzung der Regenbogenhaut.

S. 324.

Die Regenbogenhaut dringt während der Operation immer mehr oder weniger vorwärts, nähert sich der Hornhaut, und wird zuweilen ganz deutlich convex. Je mehr dies geschieht, je mehr ist der Wundarzt in Gefahr, die Regenbogenhaut zu verletzen. Er vermeidet diese Gefahr am sichersten, wenn er das Messer nicht zu nahe am Rande der Hornhaut einsticht, und wenn er das Auge bey der Operation so wenig als möglich drückt und reizt. Je mehr das Auge gedrückt und gereizt wird, desto stärker dringt die Regenbogenhaut vorwärts. Jedoch ungeachtet dieser Vorsicht tritt dennoch die Regenbogenhaut zuweilen, zumal wenn etwas von der wässerichten Feuchtigkeit verlohren geht, vor die Spitze oder unter die Schneide des Messers. Und wie kann alsdann der Wundarzt die Verletzung derselben verhüten? Man (Wenzel) giebt den Rath, in diesem Falle das Messer still zu halten, und mit dem Mittelfinger der Hand, womit man das untere Augenlid niederziehet, die Hornhaut gelinde zu reiben und zu drücken, und versichert, daß bey diesem Handgriff die Regenbogenhaut jederzeit wieder zurücktritt. Dies mag nun wohl zuweilen geschehen; aber lauft man nicht Gefahr die wässerichte Feuchtigkeit auszudrücken? Hat man nicht zu fürchten, daß bey der geringsten Bewegung der Hand, die das Messer hält, oder des Auges, während dem Handgriffe, wobey die Hornhaut bedeckt wird, das
Messer

Messer tiefer eindringt, und die Regenbogenhaut verletzt, oder sich ein wenig zurückziehet, und die wässerichte Feuchtigkeit ausfließen läßt?

S. 325.

In den meisten Fällen wird man zum Zwecke gelangen, wenn man, sobald man merkt, daß die Regenbogenhaut unter die Schneide tritt, die Schneide des Messers ein wenig auswärts wendet, und so dem Schnitt vollendet; der zwar in diesem Falle nicht ganz die halbmondförmige Gestalt erhält, die er haben sollte, mehrentheils aber doch immer groß genug ist, den Staar durchzulassen. Tritt die Regenbogenhaut vor die Spitze des Messers, so darf man nur die Spitze ein wenig auswärts nach der Hornhaut hin bewegen, um sie von der Regenbogenhaut zu entfernen, und so bald dies geschehen ist, ein wenig weiter vorwärts stoßen, alsdann aber wieder hinterwärts bewegen, und in der gewöhnlichen Richtung vollends durchstoßen. Läßt sich dies nicht wohl bewerkstelligen, so thut man am besten, wenn man (S. 273) das Messer gerade herunterwärts drückt, ohne es vorwärts zu stoßen, auf diese Art den halben Schnitt macht, und das übrige mit der Scheere vollendet.

S. 326.

Sind denn nun aber die Verletzungen der Regenbogenhaut bey der Operation der Ausziehung wirklich so häufig, und von so übeln Folgen, wie verschiedene Wundärzte behaupten? Keinesweges.
Wenn

Wenn man bey der Operation die Regeln, die im vorhergehenden gegeben worden sind, beobachtet, und vornemlich darauf achtet, daß die wässerichte Feuchtigkeit nicht eher, als bis der Schnitt in der Hornhaut vollendet ist, ausfließt, wird man nicht leicht in Gefahr kommen, die Regenbogenhaut zu verletzen. Nur in dem einzigen Falle, wo das Auge sehr unruhig; die Hornhaut sehr platt, und folglich die vordere Augenkammer sehr klein ist, befindet man sich in einiger Gefahr von dieser Art. Ueberdem haben die Verletzungen der Regenbogenhaut selten sehr üble Folgen. Man hat laut vielfältiger Erfahrungen diese Haut auf mancherley Art verletzt, ohne daß eine beträchtliche Entzündung erfolgte. Einmal trat der untere Rand der Pupille unter die Schneide, und wurde ganz abgeschnitten, und es erfolgte nicht die geringste Entzündung. In einigen Fällen zerriß während des Durchgangs der Staarlinse die Pupille, und der Erfolg war glücklich. Verschiedne Wundärzte haben den Rath des Daviel, die Pupille, wenn sie zu enge ist, durch einen Schnitt zu erweitern ohne alle üble Zufälle befolgt. — Endlich hinterlassen Wunden, die diese Haut ganz durchbohren, auch selten eine widernatürliche Oeffnung, so verschieden auch ihre Gestalt und Richtung ist, sondern schließen sich gemeinlich gar bald.

S. 327.

Zuweilen verliert die Pupille nach der Operation ihre natürliche Stelle und runde Gestalt, und
Richt. Wundarzneyk. III. B. D wird

wird eckigt, schief, enfförmig. Die Erfahrung lehrt, daß dieser Fehler sehr oft wenig oder gar keine üble Wirkung aufs Gesicht hat, ja sich nicht selten allmählig ganz und gar verliehrt. Indem das Licht ins Auge fällt, und die Pupille sich zu bewegen zwingt, nimmt dieselbe allmählig ihre vorige Gestalt und Stelle wieder ein. Beides gilt indessen nur von einem mäßigen Grade dieses Fehlers: ein stärker Grad desselben ist gemeiniglich mit einer Verengerung der Pupille, und folglich einer Verminderung des Gesichtes verbunden, die sich selten ganz wieder verliehrt. Der Vorfall der Regenbogenhaut, wovon in der Folge die Rede seyn wird, der Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit, und der zu schnelle und übereilte Durchgang einer großen Staarlinse sind die vorzüglichsten Veranlassungen zu dieser fehlerhaften Beschaffenheit der Pupille.

S. 328.

Der untere Theil der Regenbogenhaut leidet bey dem Durchgange der Krystalllinse am meisten. So bald man, nachdem die Hornhaut und Krystallhaut geöffnet ist, das Auge drückt, steigt gemeiniglich der untere Rand der Linse in die Höhe, und drückt so stark gegen den untern Theil der Regenbogenhaut, daß derselbe zuweilen aus der Wunde der Hornhaut hervorragt. Wenn man daher das Auge, sogleich nach dem die Staarlinse ausgeglitscht ist, betrachtet, findet man gemeiniglich die Pupille herunter gesenkt, nahe an der Wunde der Hornhaut, und von enfförmiger länglicher Gestalt. Einige (Daviel) rathen daher,

daher, jederzeit sogleich nach der Operation den untern Theil der Regenbogenhaut mittelst des Davielschen Löffels gelinde herauf zu streichen, und zu drücken. Wenn derselbe so tief herab gedrückt ist, daß er gleich einer kleinen Falte aus der Wunde der Hornhaut hervorragt, mag dies wohl dienlich seyn; wenn aber bloß die Pupille aus der Mitte herunter gedrückt und länglicht ist, ist's nicht nöthig; denn die Pupille steigt, wenn nicht besondere Hindernisse eintreten, gemeiniglich von sich selbst wieder in die Mitte; und der Handgriff ist doch immer mit einigem Reize verbunden.

§. 329.

Einige behaupten fälschlich, daß nach der Operation der Ausziehung des Staars die Pupille allezeit ihre Bewegung verliert. Zwar wenn die Staarlinse groß ist, und schnell und plötzlich durch die Pupille tritt, leidet diese eine gewaltsame und plötzliche Ausdehnung, und verliert gemeiniglich die Kraft sich zu bewegen; aber dies ist ein seltner Fall, der nicht zu befürchten ist, wenn der Wundarzt bey diesem Theile der Operation mit der Vorsicht und Behutsamkeit verfährt, die im vorhergehenden empfohlen worden ist. Ueberdem erhält auch in diesem Falle die Pupille gar oft ihre Beweglichkeit wieder, wenn das Auge geöffnet wird, und das Licht auf dieselbe wirkt. Und erhält sie sie nicht wieder, so zeigt die Erfahrung, daß die Unbeweglichkeit der Pupille, wenn sie nicht mit einer widernatürlichen Erweiterung oder Verengerung verbunden ist, selten

dem Gesicht sehr hinderlich ist. — Von der Verengerung und Verschließung der Pupille, wie auch von dem Vorfalle der Regenbogenhaut wird in einem besondern Kapitel gehandelt werden.

Die Zufälle nach der Operation.

S. 330.

Unter den Zufällen, welche nach der Operation vorzüglich zu fürchten sind, ist die Entzündung der vornehmste; da sie eine der häufigsten Folgen der Operation ist, oft auch in einem geringen Grade das durch die Operation wiederhergestellte Gesicht schwächt, in einem stärkern Grade nicht selten völlig wieder raubt, und wenn sie einmal entstanden ist, gemeinlich sehr langsam und spät wieder verschwindet. Man geht daher einen weit sicherern Weg, wenn man bey Zeiten darauf bedacht ist, sie zu verhüten, als wenn man sich auf die Mittel verläßt, die zu ihrer Zertheilung empfohlen werden. Um sie bestmöglichst zu verhüten, hat man außer den bereits im vorhergehenden (S. 198 = 200) bey der Vorbereitung zur Operation gegebenen, vorzüglich folgende allgemeine Regeln zu beobachten.

S. 331.

Sobald die Staarlinse aus dem Auge, und die Pupille rein ist, verbinde man das Auge. Alle, vornemlich wiederholte Versuche, die Sehkraft des Kranken zu erforschen, und den Erfolg der Operation zu bestätigen, reizen das Auge, und vermehren die

die Gefahr der Entzündung. Auch läßt sich aus diesen Versuchen auf den künftigen Grad der Sehkraft nichts schließen. Kranke sehen oft in den ersten Augenblicken nach der Operation sehr wenig und undeutlich, und erhalten dennoch in der Folge ein sehr starkes und deutliches Gesicht. Ja man findet Kranke, die beim ersten Versuche nach der Operation gar nichts erkennen, und dennoch ein sehr gutes Gesicht erhalten. Dies kann man in diesem Falle immer mit Gewißheit hoffen, wenn die Pupille rein ist, wenn vorher keine Zeichen des schwarzen Staars bemerkt worden sind, und wenn keine heftige Entzündung erfolgt. Daß Kranke gleich nach der Operation sehr gut, und in der Folge sehr schlecht sehen, oder gar das Gesicht gänzlich wieder verlihren, ist leider ein gar häufiger Fall.

S. 332.

Zuweilen ist der abgeschnittene Lappen der Hornhaut umgebogen, zumal wenn man den Davielschen Löffel gebraucht hat. Man muß ihn in diesem Falle mittelst des Löffels in seine natürliche Lage bringen, so daß er allenthalben gut anliegt. Ragt etwas z. E. der untere Theil der Regenbogenhaut, aus der Wunde ein wenig hervor, so muß dasselbe mittelst des Davielschen Löffels gelinde zurückgedrückt werden, damit die Wundränder genau auf einander liegen. Immer ist es übrigens, wenn man das Auge sich schließen läßt, rathsam, daß man das obere Augenlid zuerst so tief als möglich herabfallen läßt, damit es die ganze Hornhaut bedeckt, ehe man das

untere Augenlid in die Höhe treten läßt: das untere Augenlid tritt sonst zuweilen unter den Lappen der Hornhaut, und reizt das Auge heftig. Es entsteht in diesem Falle gar bald heftige Schmerzen, die keinem Mittel weichen, wenn man nicht die Ursache derselben entdeckt, und hebt.

S. 333.

Durch den äußern Verband sucht der Wundarzt eine doppelte Absicht zu erreichen. Das Auge muß sogleich nach der Operation geschlossen werden, und einige Tage geschlossen bleiben, weil der Reiz des Lichts und der Luft, die Bewegungen des Auges, und das Reiben desselben gegen die Augenlider Entzündung veranlassen, und Gelegenheit zu allerhand andern übeln Zufällen geben. Dies ist die erste Absicht, die man durch den Verband zu erreichen sucht. Jedoch zu dieser Absicht darf das Auge nur den ersten Tag verbunden werden. Schon die erste Nacht kleben die Augenlider gemeiniglich dergestalt zusammen, daß man den zweyten Tag nicht mehr nöthig hat, das Auge zu dieser Absicht zu verbinden. Eine jede Art von Verband, wodurch man den Kranken hindert, die Augenlider zu öffnen, ohne das Auge zu drücken und zu reizen, ist dieser Absicht angemessen. Gemeiniglich legt man eine weiche Kompresse auf beyde Augen, und drückt dieselbe mittelst einer Binde gelinde an. Da sich aber die Binde leicht verrückt, und die Augenlider nicht schließt, wann sie zu locker angelegt wird, und wann sie zu fest angelegt wird, die Hornhaut, als den hervor-

hervorstehenden Theil des Augapfels drückt, und die Wunde in Unordnung bringt, thut man wirklich am besten, zum voraus gesetzt, daß man weiter keine andre Absicht bey dem Verbande hat, wenn man das obere Augenlid mittelst ein paar schmalen Streifen Heftpflaster ans untere befestigt. Den Morgen nach der Operation kann man diese Pflaster wieder abnehmen, weil alsdann die Augenlider gemeiniglich zusammengeklebt sind. Indessen thut man immer wohl, wenn man sowohl den ersten Tag als auch die folgenden eine Kompresse mittelst einer Binde auf der Stirn, oder mittelst einer Nadel an der Nase befestigt, und über das Auge herabhängen läßt, um das Licht vom Auge abzuhalten, welches sonst durch die Augenlider ins Auge fällt, und dem Kranken gemeiniglich sehr lästig ist. Die Kompresse verdient zu der Absicht, wovon jetzt die Rede ist, den Pflastern auch deswegen nachgesetzt zu werden, weil sie durch die ausfließenden Thränen mehrentheils naß erhalten, und wenn sie trocknet, hart und spröde wird; und folglich dem Auge bald durch ihre kalte Masse, bald durch ihre Härte lästig und schädlich ist.

S. 334.

Zuweilen hat der Wundarzt auch die Absicht durch den Verband äußere Arzneymittel aufs Auge zu appliciren; wodurch er die Entzündung zu verhüten, oder zu heben sucht. In diesem Falle rathen einige das Auge mit einem feinen Schwamme, der etwas größer als der Umfang des Auges, rund, in der Mitte ein wenig vertieft, und an eine Binde

genähet ist, zu bedecken. Dieser Verband scheint den Vorzug zu haben, daß er das ganze Auge sanft und gleichförmig drückt, und immer ohne abgenommen zu werden, feucht erhalten werden kann. (Abhandlungen für Wundärzte, 2 Stück.) Andre rathen (Bell) das Auge mit einem Beutel aus feiner weicher Leinwand, der mit Baumwolle gefüllt ist, zu bedecken. Das gewöhnliche Verbandstück ist eine Kompresse, die man mittelst einer Binde auf dem Auge befestigt. Es mag seyn, daß der Beutel, und Schwamm, indem sie weich sind, sanft auf dem Auge liegen, einigen Vorzug verdienen; indessen belästigt auch die Kompresse, wenn sie dick und weich ist, das Auge weniger, als man vorgiebt. Zudem hängt die Hauptsache bey diesen Verbandstücken eben sowohl, wie bey der Kompresse von der Binde ab, wodurch sie auf dem Auge befestigt werden. Liegt diese zu fest, so drücken sie das Auge eben so wie die Kompresse. Es giebt Fälle, wo es schädlich ist, das Auge warm zu halten, und dann würden diese zwey Verbandstücke wirklich zweckwidrig seyn. In denen Fällen, wo erweichende Breye aufs Auge gelegt werden, sind sie unnütz.

§. 335.

Gleich nach der Operation lassen einige den Kranken ins Bett auf den Rücken legen, und in dieser Lage die ersten Tage bleiben. Man entfernt, sagt man, dadurch nicht allein alle mögliche Erschütterungen, und äußere Zufälle, die dem Auge schädlich seyn könnten, verhütet den Vorfall der gläsernen

nen Feuchtigkeit, sondern befördert auch die Heilung der Wunde, da in dieser Lage die wässerichte Feuchtigkeit früher aufhört, auszufließen. Ueberhaupt ist diese Vorsicht nicht zu tadeln, am wenigsten, wenn etwa während der Operation die gläserne Feuchtigkeit vorgefallen ist. Wenn indessen diese Lage dem Kranken lästig ist, kann man ihm gar wohl erlauben, auf dem Stuhle zu sitzen, nur mit der Warnung, alle Erschütterungen und heftige Bewegungen des Kopfs und Körpers zu meiden, und den Kopf nicht vorwärts sinken zu lassen. — Durchaus nöthig aber ist es, daß die ersten Nächte jemand bey dem Kranken wacht, und verhindert, daß er sich im Schlafe nicht auf das operirte Auge legt, oder dasselbe auf irgend eine andre Art verlegt. Die geringste Empfindung im Auge veranlaßt den Kranken im Schlafe dahin zu greifen, und dasselbe zu reiben, oder zu drucken; und dies geschiehet nie ohne üble Folgen.

S. 336.

Gemeiniglich pflegt man sogleich nach der Operation äußerliche Mittel aufs Auge zu legen, um die zu fürchtende Entzündung zu verhüten. Einige, und beynabe die mehresten wählen geistige Mittel, gewöhnlich Brandwein mit Wasser vermischt, andre empfehlen erweichende besänftigende Mittel, einen Brey von gebratnen Aepfeln, Semmelkrumen, Hollunderblüten. Alle diese äußern Mittel sind unnöthig und schädlich. Unnöthig: wozu dienen geistige, zusammenziehende, zurücktreibende Mittel,

Da sogleich nach der Operation das Auge noch nicht entzündet, und folglich nichts zurückzutreiben ist? Wozu dienen erweichende besänftigende Mittel da sogleich nach der Operation das Auge nicht schmerzhaft, folglich nichts zu besänftigen, zu lindern ist. Schädlich sind sie: denn wiederhohlte Erfahrungen zeigen (Wenzel, Janin, Pellier) daß gemeinlich eine weit stärkere und hartnäckigere Entzündung erfolgt, wenn das Auge nach der Operation feucht verbunden wird, als wenn es trocken verbunden wird. Es giebt Augen, die durchaus keine Masse nach der Operation vertragen, ohne sogleich schmerzhaft zu werden. Die erweichenden Breye erschlaffen gemeinlich die Augenlider, und verursachen eine Mattigkeit der Augen, und ein langwieriges Thränen.

S. 337.

Immer ist der Zustand des Auges nach der Operation von einer doppelten Beschaffenheit. Entweder der Kranke hat ganz und gar keine unangenehme Empfindung an demselben, und die Operation ist leicht und glücklich gewesen, oder er bemerkt allerhand Zufälle an demselben, die die Aufmerksamkeit des Wundarztes verdienen. Im ersten Falle ist offenbar keine Anzeige zu irgend einem äußerlichen Mittel vorhanden, ist es ohne Widerrede am besten, trocken zu verbinden. Im zweyten Falle sind freylich äußerliche Mittel nöthig; aber diese müssen jederzeit dem besondern Zustande des Auges angemessen seyn. Sie sind folglich, wie weiter unten angezeigt werden wird, sehr mannigfaltig. Keines-

weges

weges kann man also überhaupt erweichende oder geistige Mittel allgemein empfehlen.

S. 338.

Eben so verhält sich auch mit dem Gebrauche der innern Mittel. Einige lassen sogleich nach der Operation eine Ader öffnen; andre (Urcell) empfehlen den fortgesetzten Gebrauch gelinder kühlender Abführungen; andre empfehlen Salpetermittel; andre Krampfstillende, besänftigende Mittel; andre rathen sogleich nach der Operation ein spanisches Fliegenpflaster in den Nacken zu legen, und acht Tage im Flusse zu erhalten (de Witt). Wozu dienen alle diese Mittel, wenn keine besondere Anzeige dazu da ist? Wozu Krampfstillende Mittel, wenn keine krampfhaftige Zufälle da sind? Wozu Purgiermittel, wenn keine Darmunreinigkeiten da sind? Wozu Aderlässe und kühlende Mittel, wenn der Puls ruhig ist? Auch die Wahl dieser innern allgemeinen Mittel hängt von den Zufällen ab, die nach der Operation bemerkt werden; keines derselben kann allgemein anempfohlen werden. Und bemerkt man nach der Operation gar keine Zufälle, befindet sich der Kranke vollkommen wohl, so ist keines derselben nöthig. Alles was man in diesem Falle thun kann und muß, um Entzündung und andre Zufälle zu verhüten, besteht darinnen, daß man dem Kranken Ruhe empfiehlt, alle zufällige Reize entfernt, eine genaue entzündungswidrige Diät beobachten, und täglich einige gelinde öffnende Klystiere nehmen läßt. Alles was der Wundarzt überdem thut, in dem Falle,
wo

wo der Kranke ohne alle Zufälle ist, ist überflüssig, ja wohl gar schädlich.

S. 339.

Die Wunde der Hornhaut klebt gemeiniglich innerhalb 48 Stunden zusammen. Bis dahin fließt die wässerichte Feuchtigkeit aus. Der Ausfluß der wässerichten Feuchtigkeit unterscheidet sich von dem Ausflusse der Thränen dadurch, daß er gemeiniglich mit einem gelinden Schmerz verbunden ist. Immer empfindet der Kranke einen Druck oder sonst irgend eine Unannehmlichkeit im Auge kurz vorher, die sogleich verschwindet, so bald ein paar Tropfen aus dem Auge fallen. Fließt die wässerichte Feuchtigkeit länger aus, so hat der Wundarzt Ursach etwas widernatürliches im Auge zu vermuthen, und dasselbe zu öffnen, um das Hinderniß ausfündig zu machen, welches die Heilung der Wunde stöhr. Dies ist entweder ein Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit, oder der Regenbogenhaut, oder der Haut der wässerichten Feuchtigkeit, oder eine Verschiebung der Wunde, oder eine Anschwellung, Entzündung und Epyterung der Wundlefsen. Was in allen diesen Fällen zu thun ist, wird bald nachher gesagt werden. Hört die wässerichte Feuchtigkeit zur gehörigen Zeit auf auszuströmen, und hat der Kranke keine Schmerzen oder irgend einen andern Zufall am Auge, der etwas widernatürliches vermuthen läßt, so darf das Auge vor dem achten Tage nicht geöffnet werden.

S. 340.

Verschiedene Augenärzte von Ansehen (Acrell, Hellmann, Mohrenheim, Wenzel) geben den Rath, das Auge bis zum vierten Tage uneröffnet zu lassen, alsdann aber es täglich zu öffnen, theils um zu untersuchen, ob am Auge etwas ist, dem abgeholfen werden muß, theils um den Schmutz abzuwischen, der sich an den Haaren der Augenlider sammelt, scharf wird, und reizt, theils auch um den Thränenfeuchtigkeiten einen beständig freyen Ausfluß zu unterhalten, der durch das Zusammenkleben der Augenlider zuweilen gehemmt wird. Dieser Rath ist zum Theil unnütz, zum Theil schädlich. Unnütz: den Schmutz, der sich zwischen den Haaren der Augenlider anhäuft, kann man, wenn man es nöthig findet, sehr wohl mit einem kleinen Pinsel erweichen und abwischen, ohne das Auge zu öffnen. Die Thränen fließen, auch wenn die Augenlider stark zusammengeklebt sind, gemeiniglich im innern Augenwinkel ungehindert aus; und hemmt sich daselbst der Ausfluß, so kann man ihn durch Erweichung des Schmutzes, und eine gelinde Auseinanderziehung der Augenlider an dieser Stelle sehr gut wieder herstellen, ohne das Auge zu öffnen. Nach dem vierten Tage entsteht nicht leicht ein Vorfall am Auge; will man das Auge in Rücksicht auf diesen täglich öffnen, so muß man es die ersten drey Tage öffnen. Und gemeiniglich giebt sich der Vorfall durch allerhand Zufälle zu erkennen, so daß man gar nicht nöthig hat, das Auge zu öffnen, um ihn zu entdecken. Eben dies gilt auch von der Entzündung. Aus allem

allem diesem erhellet, daß es unndthig ist, das Auge in den ersten acht Tagen nach der Operation zu öffnen, - wenn keine Zufälle erscheinen, die etwas widernatürliches vermuthen lassen. Erscheinen aber dergleichen Zufälle, so muß man das Auge öffnen, auch wenn es der erste Tag ist, um die Ursach derselben ausfündig zu machen.

S. 341.

Auch schädlich ist es, das Auge vor dem achten Tage ohne besondre Ursach zu öffnen. In den meisten Fällen wird man sehen, daß das Auge nach einer frühern Eröffnung mehr oder weniger schmerzhaft wird, auch wenn es bis dahin ganz unschmerzhaft gewesen ist. Immer leidet bey der ersten Eröffnung das Auge mehr oder weniger Reiz: bis zum achten Tage ist die Wunde der Hornhaut gemeinlich ungleich, und hervorstehend, und verursacht bey den Bewegungen des Augapfels ein Reiben, das nicht ohne Reiz ist; wenn das Auge einmal geöffnet ist, kleben die Augenlider ganz und gar nicht, oder erst nach einiger Zeit wieder zusammen, und das Auge muß folglich, damit es nicht offen steht, von neuem wieder bedeckt und verbunden werden, welches in mancher Absicht übel ist; hat man nicht genau Acht, so legt sich, wenn das Auge wieder geschlossen wird, etwas verhärteter Schmutz, oder das eine oder andre Haar am untern Augenlide einwärts, und drückt und reizt das Auge. Alles mögliche Ursachen, die bey der ersten Eröffnung des Auges eine Entzündung veranlassen können, und oft
wirk-

wirklich veranlassen. Und man darf nicht glauben, daß den vierten Tag die Gefahr der Entzündung vorüber ist. Man hat Fälle beobachtet, (Acrell) wo am sechsten und achten Tage nach Eröffnung des Auges eine heftige Entzündung entstand.

S. 342.

Indessen darf das Auge auch nicht allzulange verbunden bleiben, und auch diejenigen irren daher, die (Janin) es bis zum funfzehnten Tage uneröffnet lassen. Den achten, oder höchstens den zehnten Tag ist in den gewöhnlichen Fällen die Gefahr der Entzündung vorüber, und die Wunde der Hornhaut fest verschlossen, und eben: die Ursachen also, welche die Eröffnung des Auges bis dahin unrathsam machten, fallen nun weg. Außerdem zeigt die Erfahrung, daß eine gar zu sorgfältige, und zu lange fortgesetzte Verbindung des Auges, die Entzündung, Schwäche und das Thränen des Auges gar sehr vermehrt und unterhält. — Den zehnten Tag höchstens muß also das Auge, auch wenn gar keine widrige Zufälle da sind, mit der Behutsamkeit, welche im vorhergehenden (Kap. von der Augenentzündung) empfohlen worden ist, und nachher täglich geöffnet, und wie sogleich angezeigt werden wird, allmählig an Luft und Licht gewöhnt werden.

S. 343.

Diese allgemeinen Regeln, die Entzündung und andre üble Zufälle, welche nach der Operation zu befürchten sind, zu verhüten, sind indessen nicht
immer

immer hinreichend. Immer und ganz vorzüglich muß der Wundarzt auch auf den Zustand Rücksicht nehmen, in welchem sich der Kranke nach der Operation befindet. Und dieser ist verschieden. Zuweilen empfinden die Kranken bald nach der Operation allerhand Spannungen und Krämpfe, die eine Unruhe und unordentliche Bewegung im ganzen Nervensystem verrathen. Einige Kranke sind bald nach der Operation sehr matt und entkräftet; andre sind ohne die geringste Ursach, und obgleich die Operation sehr glücklich gewesen ist, niedergeschlagen, traurig. Einige klagen über eine starke Beängstigung, andre erbrechen sich, oder bekommen Kolikschmerzen, oder einen aufgetriebnen verstopften Leib. Verschiedene überfällt ein öfteres krampfhaftes Schaudern. Unter diesen krampfhaften Zufällen, beklagen sich die meisten, daß das operirte Auge sehr unruhig ist, sich hin und her bewegt. Einige sehen Licht, oder allerhand Erscheinungen vor dem operirten Auge, obgleich dasselbe verbunden ist. Zuweilen öffnen sich die Augenlider wider Willen des Kranken.

S. 344.

Es kann kein Zweifel seyn, daß bey diesem krampfhaften Zustande des Kranken äußere und innere beruhigende krampfstillende Mittel erfordert werden. Sie werden ohne Zweifel durch die Unruhe und Furcht, in welcher sich der Kranke vor und bey der Operation befindet, verursacht. Bey Kranken, welche bleich, furchtsam, empfindlich, zart, reizbar sind, hat man sie am meisten zu fürchten.

Alles

Alles was die Furcht und Unruhe des Kranken vor und bey der Operation vermindert, vermindert und verhütet diese Zufälle, und deren Folgen. Ein lauwarmes Fußbad, öftere erweichende Klystiere, warme Bähungen auf den Unterleib, innerlich eine Mischung aus Hurhamschen Speißglaswein und Thebaischer Tinktur, oder dem Extract. hyosc. albi u. s. w. mindern und heben diese Zufälle gemeiniglich gar bald. Ist das Auge sehr unruhig, so thut man wohl, wenn man einen warmen Brey aus Semmelkrumen, Hollunderblüten, Safran u. s. w. dünn auflegt, oder die Kompresse oft mit einer warmen Abkochung von weißen Wohnköpfen und Malvenblüten u. s. w. befeuchtet.

S. 345.

Zuweilen, vorzüglich, wenn das Auge bey der Operation viel gelitten hat, wird es sogleich nach der Operation schmerzhaft: der Puls ist gereizt, voll, geschwind, der Kranke unruhig, erhist u. s. w. Dies ist der Fall, in welchem sogleich nach der Operation ein Aderlaß nebst Salpetermitteln, und kühlenden gelinden Abführungen, Klystiere u. s. w. die Heftigkeit der drohenden Entzündung mindert. — Zuweilen zeigen sich nach der Operation Symptome, die eine Gallenergießung verrathen, die zuweilen die Hauptursach der Entzündung wird. Am häufigsten bemerkt man dieselbe bey furchtsamen, zärtlichen Kranken. Sie bekommen eine unreine Zunge, einen bittern unangenehmen Geschmack im Munde, einen druckenden Schmerz in der Stirne, Schwindel u. s. w.

Alles kommt darauf, daß man diese gallichten Reize bey Zeiten durch Purgir- und Brechmittel ausleert, um Fieber und Entzündung zu verhüten.

S. 346.

Wenn ungeachtet der genauen Beobachtung aller dieser Regeln dennoch eine Augenentzündung erfolgt, so muß dieselbe, so wie im vorhergehenden (Kap. von der Augenentzündung) gezeigt worden ist, behandelt werden. Sie entsteht auf verschiedene Art. Zuweilen empfindet der Kranke die erste Nacht schon ein paar Stunden lang heftige Schmerzen, und hernach nie wieder die geringsten, oder höchstens nur ganz gelinde. Man darf dieser kurzen Dauer und baldigen Nachlassung der Schmerzen nie trauen. Gemeiniglich findet man den Tag drauf das Auge stark entzündet. Und daß es entzündet ist, kann man sicher schließen, wenn man den Rand des obern Augenlides roth und dicke findet. — Zuweilen ist der Schmerz die erste Nacht gelinde, die zweyte heftiger, und die dritte und vierte vorzüglich heftig. Zuweilen ist das Auge bis zum sechsten, achten Tage unschmerzhaft und unentzündet, und dann entzündet sichs noch erst. Zuweilen findet man das Auge entzündet, obgleich der Kranke nie über sonderliche Schmerzen geklagt hat. In den ersten zwey Fällen ist die Entzündung gemeiniglich hitzig und fieberhaft, in den letzten zwey Fällen unsieberhaft und langwierig.

S. 347.

Zuweilen bleibt, nachdem die Entzündung durch die gewöhnlichen Mittel größtentheils gehoben ist, lange eine matte, feuchte Röthe zurück. Einen Tag um den andern wird das Auge schmerzhaft, der Puls schnell, der Kranke unruhig u. s. w. Dies bemerkt man vorzüglich bey empfindlichen und schwächlichen Personen. Die peruvianische Rinde hebt diese Zufälle gemeiniglich gar bald. — Zuweilen bleibt lange eine matte Röthe im Auge zurück, das Gesicht ist schwach, die Hornhaut trübe, das Auge thränt. Daran ist gemeiniglich ein zu lange und sorgfältig fortgesetzter Verband des Auges schuld. Das beste Mittel gegen diese Zufälle ist die Luft. Man öffne das Auge, wasche es mit frischem Wasser, und man wird sehen, daß sich alle diese Beschwerden bald verlihren. — Zuweilen fließt am Ende der Entzündung eine scharfe wässerichte Feuchtigkeit aus dem Auge, die dasselbe lange roth, schmerzhaft und empfindlich gegen das Licht erhält. Der innere Gebrauch einer Mischung von Spießglaswein und Thebaischer Tinktur, und äußerliche schleimichte Mittel, eine Auflösung von arabischen Gummi, verdünnter Quittenschleim u. s. w. heben dies Ueberbleibsel der Entzündung mehrentheils in kurzer Zeit.

S. 348.

Zuweilen (Wenzel) sind bey dem grauen Staare die Gefäße der retina und choroidea varicos. Es entsteht in diesem Falle zuweilen kurz nach der Operation eine Blutung, die beträchtlich ist, gemeiniglich

aber von sich selbst aufhört. Die Operation ist in diesem Falle mehrentheils ohne glücklichen Erfolg. Die Zeichen dieses widernatürlichen Zustandes des Auges sind folgende: der Augapfel fühlt sich weit härter an, als gewöhnlich, die Hornhaut ist klein, und stark hervorragend, die Pupille ist weit, und unbeweglich, und der Kranke hat öftere Schmerzen im Grunde der Augenhöhle, und den nahen Theilen, siehet nach der Operation wenig oder gar nicht. Zuweilen siehet man auch äußerlich in beyden Augewinkeln ausgedehnte Gefäße. — Zuweilen hängt einige Tage nach der Operation eine kleine Blase voll Wasser, die durchsichtig, sehr gespannt, und empfindlich ist, aus der Wunde der Hornhaut hervor (Wenzel, Pellier): dies ist ein Vorfall der Haut der wässerichten Feuchtigkeit, den man nur mit der Scheere nahe an der Hornhaut abschneiden darf. Zuweilen entsteht sie von neuem wieder. Man hat gesehen, (Wenzel) daß dieser Vorfall sieben Monate lang unentdeckt blieb, und während der ganzen Zeit heftige Schmerzen erregte. — Von dem Vorfalle der gläsernen Feuchtigkeit nach der Operation ist bereits gehandelt worden. Von dem Vorfalle der Regenbogenhaut wird in der Folge gehandelt werden.

S. 349.

Zuweilen werden die Ränder, vorzüglich aber die obere Lefze der Wunde der Hornhaut weiß, dick und weich; ein Fall, den man zuweilen für ein Eytterauge angesehen hat. Ja zuweilen gerathen sie
wirk-

wirklich in eine geringe Eysterung. In beyden Fällen sind Bleymittel äußerlich zuträglich. — Die Trübigeit der Hornhaut nach der Operation hebt der weiße Vitriol. — Des wiederhergestellten Gesichts muß sich der Kranke anfangs mit Behutsamkeit bedienen. Das Auge verträgt nicht sogleich ein starkes Licht. Am besten läßt man zu Anfange das Auge nur Morgens und Abends eine Stunde, oder so lange offen, bis der Kranke fühlt, daß es matt, empfindlich, ja schmerzhaft wird. Nach einigen Tagen kann sich der Kranke den ganzen Tag mit offenen Augen in einem Zimmer aufhalten, das nicht gar zu helle ist; und wenn er sich endlich in die freye Luft begiebt, kann er eine Zeitlang das Auge mit einem schwarzen Flor bedecken. Am besten leitet den Kranken seine eigne Empfindung; so oft das Auge matt und empfindlich wird, muß er ihm Ruhe schaffen. Verfährt er übereilt und unbehutsam, so schwächt er das Auge gar oft gleich Anfangs dergestalt, daß es hernach nie einen ansehnlichen Grad von Stärke erhält.

Verschiedene andre Methoden, den Staar auszuziehen.

§. 350.

Alle mehr oder weniger von einander verschiedene Methoden, dem Staar auszuziehen, die von jeher vorgeschlagen und empfohlen worden sind, weitläufig zu beschreiben und zu beurtheilen, würde unnöthig und überflüssig seyn. Hier also nur eine

Kurze Anzeige und Beurtheilung der vorzüglichsten derselben. Alles, was an diesen Methoden mangelhaftes oder fehlerhaftes ist, wird sich aus den im vorhergehenden gegebenen Regeln und Grundsätzen, leicht einsehen, und beurtheilen lassen.

§. 351.

Daviel (s. Memoires de l'Acad. de Chirurg. de Paris. Tom. V. p. 369. Edit. 8.) löst zwey Drittel der Hornhaut ab, und verrichtet den Schnitt mit drey verschiedenen Werkzeugen. — Das Messer des la Faye (Mem. de l'Acad. de Chir. l. c.) ist zu schmal, hat einen gebognen Rücken, und ist auf die Seite gebogen, folglich auf eine dreyfache Art fehlerhaft. Sein Cystitom ist noch jetzt im Gebrauche. — Die Lanzette des Poyet (Mem. de l'Acad. de Chir. de Paris. l. c. p. 399) ist zu schmal und zwenschneidig. Der Faden, womit er das Auge zu befestigen sucht, ist nicht eher brauchbar, als bis die Operation beynahe geendigt ist, d. i. wenn man nicht mehr Ursach hat, das Auge zu befestigen. — Das Berangersche Messer (Sabatier, Thes. de variis cataractam extrahendi methodis, Paris, 1759) hat einen zu dicken Rücken, und seine Klinge wird zu schnell breit. — Warner's (Cases in Surgery p. 91. Pl. 2. F. 1.) Messer ist nicht breit genug, und hat einen gebognen Rücken. — Guevin's Werkzeug (desselben Traité des Maladies des Yeux) womit nicht allein die Hornhaut gedffnet, sondern auch zugleich das Auge befestigt wird, ist unbequem und unsicher. — Janin (Observations
sur

sur l'Oeil) schneidet zwey Drittel der Hornhaut ab. — Wenzel (Traité de la Cataracte) schneidet nicht die untere, sondern die Seitenhälfte der Hornhaut ab, und öffnet die Kapsel mit der Spitze des Messers, indem er die Hornhaut durchschneidet. — Pellier (des Maladies de l'Oeil) öffnet gleichfalls die Kapsel mit der Spitze des Messers während der Durchschneidung der Hornhaut, veranlaßt aber leicht den zu frühen Ausfluß der wässerichten Feuchtigkeit. — Das neuere Guerinische Instrument (Chirurg. Bibl. Vol. 8. p. 689) erfordert bey dem Gebrauche sehr viel Aufmerksamkeit, und ist dennoch sehr unsicher.

Vergleichung der zwey Hauptmethoden, der Niederdruckung und Ausziehung des Staars.

§. 352.

Sobald die Ausziehung des Staars als eine neue Erfindung bekannt wurde, nahm man sie bey nahe allgemein an, und gab ihr den Vorzug vor der Niederdruckung. Es war bald der herrschenden Mode gemäß, den Staar auszuziehen, nicht niederzudrücken. Indessen ging man offenbar im Lobe und Tadel zu weit. Keine dieser Methoden verdient immer vorgezogen, keine immer hintangesetzt zu werden. Jede derselben hat ihre Vorzüge und Mängel. Es giebt Fälle, wo die eine, Fälle, wo die andre den Vorzug verdient.

S. 353.

Als Mängel und Unvollkommenheiten wirft man der Niederdrückung vor: daß dieselbe bloß eine Palliativkur bewirkt, indem durch dieselbe der Staar bloß niedergedrückt wird, und derselbe immer wieder aufsteigen, und eine neue Blindheit erregen kann; daß dieselbe bloß bey einem harten; nicht wohl bey weichen, und ganz und gar nicht beym flüssigen Staare statt findet; daß es schwer ist, die Consistenz des Staars vor der Operation mit einiger Gewißheit zu bestimmen, daß also der Erfolg dieser Operation immer sehr ungewiß ist; daß bey dieser Operation jederzeit alle Häute durchstoßen, der Körper der gläsernen Feuchtigkeit durch die Linse, indem sie niedergedrückt wird, jederzeit zerrissen, oft auch die Aponeurose des abziehenden Muskels, das ligamentum ciliare, die nervi ciliares verletzt werden; und daß endlich die Staarlinse, indem sie niedergedrückt wird, leicht und ohne Wissen und Schuld des Wundarztes gegen die choroidea und retina gedrückt wird, und dieselbe quetscht, ja zerreißt.

S. 354.

Verschiedene dieser angeblichen Mängel und Unvollkommenheiten sind zum Theil oder gänzlich ungegründet. Die Erfahrung zeigt, daß die Zerreißung der gläsernen Feuchtigkeit durch die Staarlinse ohne alle üble Folgen ist. Aus dem vorhergehenden erhellet, daß man jede Gattung von Staar, auch den weichen und flüssigen leicht und glücklich mit der Nadel operiren kann; und daß die Staarlinse,

linse, wenn sie gehörig niedergedrückt worden ist, selten ja nie wieder in die Höhe steigt; daß sie sich oft in der gläsernen Feuchtigkeit ausdehnt, und gänzlich verliert, in welchem Falle der Kranke für einer neuen Blindheit ganz gesichert ist; und daß, wenn ja die Linse wieder aufsteigt, sie jedesmal leicht wieder niedergedrückt werden kann. — Außerdem erreicht es der Niederdrückung offenbar zu einem großen Vorzüge, daß durch dieselbe wahrscheinlich in den meisten Fällen die Linse samt der Kapsel niedergedrückt, und folglich der Kranke vor der Gefahr eines Nachstaars in Sicherheit gesetzt wird; daß laut der Erfahrung der Kranke gemeiniglich ein schärferes Gesicht erhält als nach der Ausziehung; und daß überhaupt nicht so häufige und heftige Entzündungen erfolgen, als nach der Ausziehung; daß die Niederdrückung im ganzen leichter ist als diese, und endlich daß bey derselben, die zwey Theile des Auges, von deren Integrität das Gesicht nach der Operation vorzüglich abhängt, die Hornhaut und Pupille gemeiniglich keinen Schaden leiden.

§. 355.

Die Hauptvorzüge der Ausziehung sucht man gemeiniglich darinnen, daß bey dieser Methode kein einziger empfindlicher Theil des Auges, bloß die unempfindliche Hornhaut verletz, und der Staar gründlich geheilt, d. i. gänzlich aus dem Auge gezogen wird. — Aber mit Recht läßt sich dagegen bemerken, daß die Heilung des Staars durch die Ausziehung mit nichten gründlich zu nennen ist, da

die Kapsel im Auge zurück bleibt, der Sitz, des möglichen, und nicht seltenen Nachstaars; daß nach der Ausziehung weit mehrere widrige Zufälle, z. E. Verdunkelungen der Hornhaut, Verengerungen und Verschließungen der Pupille, der Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit und Regenbogenhaut u. s. w. zu fürchten sind, als nach der Niederdruckung; daß die Ausziehung weit schwerer ist, und weit öfter Entzündungen zur Folge hat, als die Niederdruckung.

§. 356.

Auß allem diesem erhellet, daß jede dieser Methoden ihre Vorzüge und Mängel hat, jede derselben in gewissen Fällen den Vorzug vor der andern verdient. Den Vorzug verdient ohne Widerrede die Niederdruckung, wenn auß irgend einer Ursach eine heftige Entzündung zu fürchten ist; wenn der Kranke sehr furchtsam und das Auge sehr unruhig ist; wenn die Hornhaut sehr platt, und die vordere Augenkammer sehr klein ist; wenn die Pupille sehr empfindlich ist, und sich stark zusammenziehet, und wann nebst der Linse auch die Kapsel verdunkelt ist. In allen andern Fällen kann man allenfalls der Ausziehung den Vorzug verstatten.



Das achte Kapitel.

Von dem

Vorfalle der Regenbogenhaut.

S. 357.

Zwey Ursachen haben jederzeit an dem Vorfalle der Regenbogenhaut Antheil, die erste ist eine widernatürliche Deffnung der Hornhaut; die zweyte, irgend eine Gewalt, welche die Regenbogenhaut durch die Deffnung herausdrückt. Die Deffnung in der Hornhaut veranlaßt ein Geschwür oder eine Wunde. Je größer die Deffnung ist, und je mehr sie an einer niedern Stelle der Hornhaut ist, desto leichter giebt sie Gelegenheit zu einem Vorfalle der Regenbogenhaut. Indessen beobachtet man dennoch zuweilen Fälle, wo die Regenbogenhaut durch eine sehr kleine Deffnung in der Mitte der Hornhaut tritt, und äußerlich eine kleine Geschwulst bildet, die sich allmählig verhärtet, und leicht für einen fremden Körper angesehen wird. Dieser Irrthum kann üble Folgen haben; wenn man diesen Knoten mit einer Zange oder Nadel weg zu schaffen sucht, in der Meynung, daß es ein fremder Körper ist, ziehet man die Regenbogenhaut hervor, und erregt eine Verschließung der Pupille, und Entzündung des Auges. — Häufiger als Geschwüre erregen zufällige Wunden der Hornhaut den Vorfall der Regenbogen-

bogenhaut. Die Gewalt, welche die Regenbogenhaut durchdrückt, ist ein jeder äußerer Druck, der dem Auge auf irgend eine Art applicirt wird, oder ein Krampf in den Augenmuskeln.

S. 358.

Die allerhäufigste Gelegenheit zu diesem Vorfalle giebt die Ausziehung des grauen Staars. Er entsteht entweder während dieser Operation, oder nach derselben. Während derselben entsteht er selten; es müßte denn das Auge sehr unvorsichtig behandelt, gedrückt und gereizt, vorzüglich aber die Krystalllinse übereilt und unbehutsam aus dem Auge gedrückt werden. Und entsteht er ja, so ist er von weniger Bedeutung, weil er sogleich bemerkt wird, und da die Wunde weit und offen ist, mit dem Löffel leicht und unverzüglich zurückgedrückt werden kann. Am häufigsten entsteht er nach der Operation bald oder spät. Man hat gesehen, daß die Regenbogenhaut den fünften Tag nach der Operation, als die Wunde bereits zugeklebt war, vorge-
drungen ist. Ein unvorsichtiger Druck aufs Auge durch die angelegte Binde, bey Eröffnung der Augenlider oder bey irgend einer andern zufälligen Gelegenheit veranlaßt ihn gewöhnlich. Zuweilen scheint die Ursach bloß krampfhaft zu seyn. Man hat gesehen, daß er durch einen heftigen Schrecken verursacht worden ist. Wahrscheinlich drücken die Augenmuskeln in diesen Fällen, indem sie sich krampfhaft verkürzen, den Augapfel gegen die Augenhöhle, und veranlassen dadurch diesen Vorfall. Wenn
nach

nach der Operation das Auge unter der Binde sich wider Willen des Kranken beständig bewegt, und die Augenlider sich öffnen, hat man diesen Vorfall immer zu fürchten. Vielleicht ist er zuweilen bloß die Wirkung der Elasticität der Sclerotica, welche sich nach der Operation zusammenziehet.

§. 359.

Gemeiniglich erregt der Vorfall der Regenbogenhaut anfangs Schmerzen, oft sehr heftige Schmerzen, die sich vorzüglich vermehren, wenn sich das Auge bewegt, und der vorgefallne Theil der Regenbogenhaut gegen die Augenlider gerieben wird. Zuweilen schwillt der vorgefallne Theil der Regenbogenhaut auf, entzündet sich, und ist bey der geringsten Berührung äußerst schmerzhaft. Man will sogar beobachtet haben, daß er brandig worden ist. Dies geschieht vorzüglich in denen Fällen, wo die Deffnung in der Hornhaut klein, die Regenbogenhaut durch dieselbe mit Gewalt durchgepreßt worden, und nun in derselben gleichsam eingeklemmt ist. Allmählig aber verliert der Vorfall alle Empfindlichkeit, und zuletzt verhärtet sich derselbe dergestalt, daß er ganz seine ursprüngliche Bildung verliert. Inimer ist die Pupille auß der Mitte nach der Seite hin gezogen, wo der Vorfall ist, und zu gleicher Zeit eyförmig, länglich, ja ganz geschlossen. Gar bald klebt auch die Regenbogenhaut nicht allein an den Rand der Deffnung der Hornhaut, sondern auch im nahen Umfange der Deffnung an die innere Seite der Hornhaut an.

§. 360.

§. 360.

Die Diagnostik dieses Vorfalles ist ohne Schwierigkeit, wenn sich derselbe sogleich in dem Augenblicke der Verwundung, oder während der Operation der Ausziehung des Staars ereignet. Ereignet er sich aber spät, d. i. nachdem das Auge bereits verbunden ist, so entdeckt man ihn oft spät: und es kommt sehr darauf an, ihn baldigst, und ehe die vorgefallne Regenbogenhaut angeschwollen, angeklebt, verhärtet ist, zu entdecken. Je älter der Vorfall ist, desto schwerer ist er zurückzubringen. Wenn das Auge nach geschehener Verwundung sehr unruhig ist, so hat man Ursach, diesen Vorfall zu fürchten. Wenn das Auge seit der Verwundung wenig gethränt hat, und nun plözlich anfängt stark zu thränen; wenn es seit der Verwundung wenig geschmerzt hat, und nun plözlich anfängt heftig zu schmerzen, so ist der Wundarzt, zumal wenn sich irgend etwas ereignet hat, was einen Vorfall veranlassen könnte, befugt, das Auge zu öffnen.

§. 361.

Am besten sucht man, den vorgefallnen Theil der Regenbogenhaut sogleich wieder zurückzubringen. Dies geschieht gemeiniglich ohne Schwierigkeit, wenn der Vorfall frisch, und die Wunde groß und offen ist. Man läßt den Kranken sich auf den Rücken legen, hebt, z. E. nach der Staaroperation, den abgeschnittnen Lappen der Hornhaut mit einer Sonde auf, und drückt und streicht den vorgefallnen Theil der Regenbogenhaut mit dem Daviellschen Löffel

Löffel zurück und herauf. Da die Regenbogenhaut, wenn sie einmal vorgefallen ist, leicht wieder vorfällt, thut man wohl, wenn man, um dies zu verhüten, den Kranken ein paar Tage auf dem Rücken liegen läßt, und das Auge ja nicht mit einem Verbande, der es nur im geringsten drücken könnte, bedeckt, sondern die Augenlider mit ein paar Heftpflastern schließt, und den Kranken dann und wann ein starkes Licht durch die Augenlider ins Auge fallen läßt.

S. 362.

Ist der vorgefallne Theil der Regenbogenhaut entzündet, bey der geringsten äußern Berührung sehr schmerzhaft und geschwollen, so thut man am besten, wenn man zur Ader läßt, den Kranken auf den Rücken liegen, abwechselnd ein starkes Licht ins Auge fallen läßt, und den vorgefallnen Theil der Regenbogenhaut mittelst eines kleinen Pinsels öfters mit einem zusammenziehenden Mittel, z. E. mit einer starken Alaunauflösung berührt. Man hat in mehreren Fällen einem frischen Vorfall unter diesen Umständen glücklich zurück gebracht.

S. 363.

Zuweilen läßt sich der vorgefallne Theil der Regenbogenhaut bloß deswegen nicht zurück drücken, weil er größer als die Oeffnung ist, durch welche er hervorgetreten ist. Die Oeffnung ist in diesem Falle entweder vom Anfange sehr klein, und die Regenbogenhaut ist mit Gewalt durchgedrückt worden;
oder

oder die Wunde der Hornhaut ist zwar groß gewesen, aber bereits zusammen geklebt, und nur ein kleiner Theil derselben ist durch den Vorfall wieder gedoffnet worden; oder der vorgefallne Theil der Regenbogenhaut ist angeschwollen, ohne entzündet und schmerzhaft zu seyn, und bereits angeklebt. In allen diesen Fällen hat man durch einen anhaltenden gelinden Druck zuweilen den Endzweck erreicht. Man läßt nämlich die Augenlider schließen, legt den Finger aufs Augenlid, und bewegt ihn auf dem Augapfel gelinde hin und her, und drückt auf diese Art den Vorfall allmählig zurück. Auch der fortgesetzte Gebrauch zusammenziehender Mittel hat in diesen Fällen oft hinreichende Dienste gethan. Im zweyten Falle kann man mit der Spitze eines feinen Messers die Wunde gar oft wieder von einander ziehen, und dadurch die Zurückbringung des Vorfalls sehr erleichtern. Im lezten Falle hat man die Blutigel mit gutem Erfolge (Pellier) angewendet. Man setzte sie auf den vorgefallnen Theil der Regenbogenhaut, und bald darauf zog sich derselbe von sich selbst zurück. Bequemer ist es in diesem Falle, den Vorfall mit der Spitze einer Lanzette gelinde zu scarificiren.

S. 364.

Weicht der Vorfall diesen Mitteln nicht, und ist er unschmerzhaft und unentzündet, so kann man ihn mit Spießglasbutter berühren. Man hat dies Mittel auch bey ziemlich veralterten Vorfällen dieser Art, mit einem ganz vortrefflichen Erfolge angewendet.

Bey

Bei der ersten Anwendung erregt es zuweilen einige Schmerzen, die sich aber bei den folgenden mindern und verlieren. Sehr oft ist eine zweymalige, ja manchmal eine einmalige Anwendung des Mittel völlig hinreichend. Es wird übrigens eben so, wie beim Staphylom angewendet. — Wenn auch dies Mittel den Vorfall nicht zurück bringt, und derselbe hart und alt ist, so kann man ihn zuweilen sehr leicht nahe an der Hornhaut mit der Scheere abschneiden. Man hebt dadurch bloß das lästige oft schmerzhaftes Reiben des Knoten gegen die Augenlider, bei den Bewegungen des Auges. Die Pupille behält in diesem Falle ihre widernatürliche Gestalt und Stelle; da sie sie hingegen, wenn der Vorfall zurückgebracht wird, gemeiniglich zum Theil oder ganz verliert. Die Operation selbst ist ohne üble Folgen. Man hat in diesem Falle den vorgefallnen Theil der Regenbogenhaut sogar mit einem glücklichen Erfolge abgebunden (Pellier): die Scheere aber verdient den Vorzug in aller Rücksicht vor der Unterbindung.



Das neunte Kapitel.

Von der verschloßnen Pupille.

S. 365.

Die widernatürliche Verengerung der Pupille (Myosis, Phthisis pupillae) veranlaßt jederzeit eine Nachtblindheit (hemeralopia) und überhaupt eine Verminderung des Gesichts; die Folge der völligen Verschließung der Pupille (Synizelisis) ist eine gänzliche Blindheit. Beyde Fehler sind nur dem Grade nach von einander unterschieden, und entstehen von denselben Ursachen. Diese sind verschieden. Die häufigste derselben ist eine heftige Entzündung der Augen, alsdann vorzüglich, wenn sie sich bis in die Regenbogenhaut erstreckt, und zu einer Zeit entsteht, wo die vordere und hintere Augenkammer leer von der wässerichten Feuchtigkeit ist. Dieser letztere Fall ereignet sich vorzüglich nach der Ausziehung des Staars. Immer erstreckt sich in diesem Falle die Entzündung auch bis in die Kapsel des Staars, immer ist diese zugleich verdunkelt, und, welches wohl zu merken ist, hinter der Pupille an die Regenbogenhaut angeklebt. Jedoch ist es auch nichts seltnes, daß sich die Pupille während einer Entzündung verschließt, obgleich beyde Augenkammern von der wässerichten Feuchtigkeit angefüllt sind. — Wunden der Regenbogenhaut veranlassen
zuwei-

zuweilen, und zwar vorzüglich alsdann, wenn sie sich nicht wieder schließen sondern offen bleiben, eine Verschließung der Pupille. Am häufigsten ist dies der Erfolg derjenigen Wunden, welche die strahllichten Fasern der Regenbogenhaut in die Quere trennen. Nicht immer bleiben indessen dergleichen Wunden offen; zuweilen schließen sie sich, und dann bleibt die Pupille unverändert. Und auch dann, wenn sie offen bleiben, schließt sich die Pupille nicht immer auf beständig. Man hat gesehen, daß in solchen Fällen die natürliche Pupille, so oft Licht ins Auge fiel, sich schloß, und die widernatürliche Oeffnung in der Regenbogenhaut sich erweiterte; und umgekehrt, so bald man das Licht minderte, die natürliche Pupille sich erweiterte, und die widernatürliche Oeffnung sich verengerte, ja schloß. — Wunden, die die Pupille der Länge nach spalten, mindern die natürlichen Bewegungen der Pupille, auch wenn sie offen bleiben, oft wenig, ja gar nicht.

§. 366.

Zuweilen sondert sich die Regenbogenhaut an irgend einer größern oder kleinern Stelle vom Rande der Hornhaut ab, und bildet daselbst eine ensförmige Oeffnung, wodurch das Licht ins Auge fällt. Die Folge dieser Absonderung ist gemeiniglich eine völlige Verschließung der Pupille. Ein Schlag aufs Auge, ein Sturz vom Pferde, oder irgend eine äußere Gewalt, die mit einer heftigen Erschütterung aufs Auge wirkt, ist die gewöhnliche Ursache dieser Absonderung. Einmal (Janin) veranlaßte sie ein starker

Vorfall der Regenbogenhaut, durch eine Oeffnung in der Hornhaut, die ein Geschwür verursacht hatte. Die Regenbogenhaut wurde dadurch gespannt, und der Kranke empfand beständig heftige Schmerzen im Auge. Als nach einiger Zeit diese Schmerzen plötz- lich verschwanden, sahe man, daß sich die Regen- bogenhaut an fünf verschiedenen Orten vom obern Rande der Hornhaut abgesondert hatte. Der Kranke, der durch die Verschließung der Pupille sein Gesicht verlohren hatte, erhielt es nun wieder. Gemeiniglich sehen die Kranken durch die Oeffnung, welche die Absonderung der Regenbogenhaut von der Hornhaut erzeugt, obgleich dieselbe nicht in der Mitte, und unbeweglich ist, entfernte Gegenstände ziemlich deutlich, nahe aber gemeiniglich nur halb. — Zuweilen bleibt im Falle einer solchen Absonde- rung die Pupille offen. Einmal (Janin) bemerkte man eine wechselseitige Bewegung in beyden Oeff- nungen. Die Regenbogenhaut zwischen beyden war runzlicht und faltig. Sobald ein starkes Licht ins Auge fiel, verminderten sich die Falten, die Pupille zog sich zusammen, und ward länglich, und die wider- natürliche Oeffnung ward weiter und größer. Im Dunkeln ward die Oeffnung kleiner, die Pupille größer, die Regenbogenhaut zwischen beyden wieder runzlicher.

S. 367.

Zuweilen wirkt ein reizender Krankheitsstoff dergestalt auf die Regenbogenhaut, daß sich die Pu- pille krampfhaft verschließt. Anfangs verengert sich bloß die Pupille, das Gesicht mindert sich, und dennoch

dennoch ist das Auge zugleich sehr empfindlich gegen das Licht, ohne entzündet zu seyn. Endlich schließt sich die Pupille gänzlich. Am häufigsten ereignet sich dieser Fall bey gichtischen Personen, nach der Staaroperation. Ohne allen besondern Anlaß, ohne Entzündung, ohne Schmerzen, zuweilen einige Wochen, zuweilen einige Monate, ja Jahre nach der Operation verengert sich bey diesen die Pupille allmählig, und schließt sich zuletzt gänzlich. — Einst entstand diese Krankheit nach einem unvorsichtig getrockneten bösen Kopfe. Ein andermal (Guerin) nach einem geheilten alten Geschwür. — Diejenigen, welche glänzende, helle, stark erleuchtete Gegenstände oft und lange mit Aufmerksamkeit betrachten, setzen sich der Gefahr dieser Krankheit aus. Die Pupille, welche beym Anschauen solcher Gegenstände sich stark verengert, gewöhnt sich zuletzt an diese Verengung, und verliert das Vermögen sich zu erweitern. Man nennt die Krankheit in diesem Falle *synizesis ex consuetudine*.

S. 368.

Kinder werden zuweilen ohne Pupille geboren. Die Stelle der Pupille ist in diesem Falle durch die sogenannte *membrana pupillaris* verschlossen. Irrig nennen einige die Krankheit in diesem Falle *cataracta pupillaris*; der Name *synizesis congenita* kommt ihr zu. — Der Vorfall der Regenbogenhaut ist gemeiniglich mit einer Verengung, ja gänzlichen Verschließung der Pupille verbunden. Wird er bey Zeiten zurückgebracht, so öffnet sich die Pupille wieder:

geschiehet dies spät, so bleibt sie verschlossen, auch wenn der Vorfall vollkommen zurückgebracht wird. — Auch der Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit veranlaßt und hinterläßt zuweilen eine Verengerung der Pupille. — Jede anhaltende Abwesenheit der wässerichten Feuchtigkeit, oder starke Verminderung der gläsernen Feuchtigkeit, sie entstehe woher sie wolle, ist mit der Gefahr einer fortdauernden Verengerung, ja gänzlichen Verschließung der Pupille verbunden. — Oft ist sie aus derselben Ursache ein Symptom der atrophia oculi.

S. 369.

Zuweilen ist die Pupille zwar von gehöriger Größe und Weite, aber durch irgend eine fremde Materie angefüllt, und verstopft. Man nennt die Krankheit in diesem Falle *synizelisis spuria*. Die Materie, welche dieselbe verstopft, ist entweder ein Stück geronnenes Blut, welches nach einer Blutergießung in die vordere Augenkammer zurückbleibt; oder vertrocknetes Eiter nach einem Eiterauge; verdickter Schleim; ein Rest vom Staar, der nach der Ausziehung zurückgeblieben ist. Man hat gesehen, daß eine weiße undurchsichtige Haut gleich einem Sack durch die Pupille in die vordere Augenkammer hervorhing. Der Balgstaar ist zuweilen so beweglich, daß er, wenn der Kopf vorwärts geneigt wird, in die Pupille tritt, und zum Theil in die vordere Augenkammer hervorhängt, sobald der Kopf zurückgeschlagen wird, sich wieder zurückziehet. — Man (Mauchart) will beobachtet haben, daß aus dem Rande

Rande der Pupille zuweilen ein schwammichtes Fleisch entsteht, welches die Pupille anfüllt, und verstopft.

§. 370.

Wenn die Verengerung oder Verschließung der Pupille alt ist, kann sie nie ohne Operation gehoben werden; sie entstehe von welcher Ursache sie wolle. Die Pupille verliehrt, wenn sie lange verschlossen oder verengert ist, das Vermögen, sich zu erweitern, klebt zusammen, und bleibt, auch wenn nun die Ursach ihrer Verschließung gehoben wird, dennoch verschlossen. — Ist die Verschließung angebohren, oder ist sie die Folge einer Entzündung u. s. w. so kann sie nie, auch wenn sie ganz frisch ist, ohne Operation gehoben werden. — Entsteht sie von einer reizenden Materie, die auf die Regenbogenhaut wirkt, oder rührt sie vom Anschauen heller Gegenstände her, so kann sie, so lange sie nicht alt ist, ohne Operation gehoben werden. — Auch da, wo die Operation erfordert wird, muß sie nach Verschiedenheit des Falles auf verschiedene Art verrichtet werden.

§. 371.

Diejenigen, welche sich die Krankheit durch öfteres Anschauen heller glänzender Gegenstände zugezogen haben, können sich davon befreyen, wenn sie zeitig genug alles zu starke Licht meiden, sich so oft als möglich an einem mäßig hellen Orte aufhalten, eine grüne Brille tragen, durch eine Röhrenbrille sehen, die Augen öfters in einer warmen

erweichenden Feuchtigkeit, vorzüglich in einem Defekt von Malven, Schierling, und Mohnköpfen baden u. s. w. — Dieselben Mittel sind auch in dem Falle nöthig, wo die Krankheit durch eine reizende Materie verursacht wird. Außerdem aber müssen auch solche Mittel gebraucht werden, die jedesmal der Natur dieser Materie angemessen sind, und sie entweder verbessern, ausleeren, oder von den Augen nach andern unwichtigern Theilen hinleiten. Die Erfahrung zeigt, daß scrophulöse, gichtische, rheumatische Schärfe, und die Materie des bösen Kopfs vorzüglich oft Antheil an der Krankheit haben. — Einmal, wo man Ursach hatte, eine rheumatische Schärfe zu vermuthen, wurde die Krankheit, als sie bereits einen sehr hohen Grad erreicht, und lange gedauert hatte, durch den Spießglaswein mit dem Extract. aconit. warme Bäder und Blasenpflaster gehoben.

§. 372.

Es giebt eine widernatürliche Verengerung der Pupille, die abwechselnd entsteht, und wieder aufhört. Der Anfall dauert zuweilen nur einige Stunden, zuweilen einige Tage. Während dem Anfalle sehen die Kranken schwächer als gewöhnlich, oder sehr wenig, je nachdem die Verengerung geringer oder stärker ist. Zuweilen kommen die Anfälle zu gewissen Zeiten, und die Krankheit ist periodisch. Während dem Anfalle scheint die Pupille in einem krampfhaften Zustande zu seyn. Zuweilen erscheinen zu gleicher Zeit krampfhafte Zufälle an andern Theilen. — Gemeinlich rührt die Krankheit in diesem Falle

Falle von irgend einem Reize im Unterleibe her, und erfordert aufßsende und ausleerende Mittel, und unter den letztern vorzüglich Brechmittel. Weicht die Krankheit diesen Mitteln nicht, so sind am Ende äußerliche und innerliche nervenbesänftige Mittel, die Valeriana, die China, die Ipecacuanha in kleinen Dosen erforderlich. — Man hat gesehen, daß die Krankheit in diesem Falle ein Symptom der hysterischen Krankheit war. — Einmal entstand sie nach einer Erkältung.

S. 373.

Der berühmte Cheselden (Sharp's Operations of Surgery) ist der erste, der die Durchbohrung der Regenbogenhaut vorgeschlagen, und bewerkstelligt hat. Er stach ein schmales Messer eine kleine Linie vom Rande der Hornhaut durch die Häute des Auges in die hintere Augenkammer, stieß es von hinten zu durch die Regenbogenhaut an der Stelle der verschloßnen Pupille, und machte daselbst einen kleinen länglichen Schnitt durch die Regenbogenhaut. Man hat diese Operation nach Cheselden verschiedentlich, und mehrentheils mit einem unglücklichen Erfolge gemacht: nie erweiterte sich der Schnitt, und gemeiniglich (Janin, Warner) schloß er sich bald nach der Operation wieder. Einmal (Janin) entstand eine Blutung, welche die wässerichte Feuchtigkeit trübte, und hinderte, die Operation mit Genauigkeit zu vollenden. Auch scheint es tadelhaft zu seyn, daß nach dieser Methode das Messer in die hintere, und nicht in die vordere Augenkammer gestoßen

stoßen wird; es gelangt auf diesem Wege weit geschwinder zur Regenbogenhaut, und verlezt nichts als die unempfindliche Hornhaut; da es hingegen auf jenem Wege alle Häute des Auges, die Linse und ihre Kapsel, die processus ciliares u. s. w. verlezt. Dazu kommt, daß die Spitze des Messers hinter der Regenbogenhaut verborgen ist, und man nicht gewiß bestimmen kann, ob sie an dem Orte ist, den man durchbohren will.

S. 374.

Janin (Memoires sur l'Oeil) behauptet, daß der Schnitt in der Regenbogenhaut, wenn er so gerichtet ist, daß er mit den strahllichten Fibern dieser Haut parallel läuft, allezeit gar bald sich wieder schließt, und daß er hingegen sich nicht allein immer erweiteret, sondern auch beständig offen bleibe, wenn er so gerichtet ist, daß er die strahllichten Fibern queer durchschneidet. Er verrichtet deswegen die Operation auf folgende Art. Er sondert zuerst so wie bey der Staaroperation die untere Hälfte der Hornhaut ab, stößt alsdann eine feine spitzige Scheere ungefähr eine Linie vom untern Rande der Hornhaut und eine halbe Linie neben der verschloßnen natürlichen Pupille in die Regenbogenhaut, und durchschneidet sie aufwärts ohne die Pupille zu berühren. Der Schnitt erweitert sich gemeiniglich sogleich, und bleibt offen. Immer aber soll man die Regenbogenhaut an der Seite der Pupille nach dem innern Augenwinkel zu, nie am gegenseitigen Rande der Pupille im äußern Augenwinkel durchschneiden, weil sonst ein Schielen erfolgt.

S. 375.

S. 375.

Die Wenzelsche Methode (*Traité de la Cataracte*) ist die neueste und vorzüglichste. Man sticht nach derselben das Messer wie bey der Staaroperation in die Hornhaut, senkt die Spitze desselben, wenn sich dieselbe bis auf eine halbe Linie der Stelle der verschloſſnen Pupille genähert, eine halbe Linie tief in die Regenbogenhaut, hebt sie drey Viertel Linien vom Einstich nach dem innern Augwinkel hin aus derselben, und vollendet, wie bey der Staaroperation den Schnitt der Hornhaut. Auf diese Art macht man in der Regenbogenhaut einen Schnitt, der im Kleinen dem Schnitte in der Hornhaut ähnlich ist, d. i. halbmondförmig ist, und, wie dieser einen kleinen Lappen bildet, der aber nun freylich selten, so eben und gleich ist, als der in der Hornhaut. Diesen Lappen nun schneidet man mit einer kleinen Scheere ab, und dadurch bildet man eine Oeffnung in der Regenbogenhaut, die ziemlich rund ist, und sich gewiß nie wieder schließt. Manchmal verkürzt sich durch die Zurückziehung der zerschnittnen Fibern dieser kleine Lappen dergestalt, daß man ihn mit der Scheere nicht fassen kann. In diesem Falle muß man ein kleines Stück aus der Regenbogenhaut ausschneiden.

S. 376.

Es ist unleugbar, daß die Wenzelsche Methode in den allermeisten Fällen den Vorzug vor der Cheseldenschen und Janinschen verdient; theils weil sie in sich leichter und einfacher ist, als diese; theils

theils weil sie in weit mehrern Fällen den Absichten des Wundarztes Gnüge thut, als diese; theils weil man überhaupt bey derselben eines glücklichen Erfolgs weit mehr versichert ist, als bey den andern zwey Methoden. Bey diesen wird die Regenbogenhaut bloß gespalten, bey der letztern wird ein Stück von derselben ausgeschnitten; bey dieser bleibt also die gemachte Deffnung weit gewisser offen, als bey den erstern. In allen Fällen, wo die Regenbogenhaut sich nicht in ihrer gewöhnlichen Spannung befindet, sondern erschlaft ist, z. E. in dem Falle, wo das Auge atrophisch, wo die Regenbogenhaut vom Rande der Hornhaut abgesondert, wo eine widernatürliche Deffnung in derselben ist, kann man nicht erwarten, daß ein einfacher Schnitt durch die Regenbogenhaut sich erweitert, und offen bleibt, kann man allein von der Benzelschen Methode, wobey ein Stück von der Regenbogenhaut abgeschnitten wird, einen glücklichen Erfolg erwarten. In allen Fällen, wo die Verschließung der Pupille die Folge einer Entzündung ist, läßt sich vom einfachen Schnitte, er geschehe nach der Cheseldischen oder Janinschen Methode nichts erwarten, da in diesem Falle gemeinlich die Regenbogenhaut an die Kapsel der Krystalllinse angeklebt, und diese verdunkelt ist. Der Schnitt kann sich nicht ausdehnen, da die Regenbogenhaut an die Kapsel angeklebt ist; und durch den Schnitt kann kein Licht ins Auge fallen, weil die verdunkelte Kapsel hinter demselben befindlich ist. Weit mehr Hoffnung eines glücklichen Erfolgs hat man in diesem Falle bey der Benzelschen Methode,

wobey

wobey nicht allein ein Stück aus der Regenbogenhaut, sondern auch aus der verdunkelten Kapsel ausgeschnitten, und folglich eine Oeffnung gemacht wird, wodurch dem Lichte wirklich der Eingang ins Auge gebahnt wird, und die offen bleibt.

S. 377.

In einigen wenigen Fällen scheint der einfache Schnitt den Vorzug vor der Benzelschen Methode zu verdienen. Der erste Fall ist, wenn die Pupille durch einen Vorfall der Regenbogenhaut, oder der gläsernen Feuchtigkeit, oder durch irgend eine äußere Verletzung aus der Mitte gezogen, nahe am Rande der Hornhaut befindlich, und verengert, verschlossen, oder auch offen ist. Immer ist es hier rathsam eine künstliche Pupille in der Mitte der Regenbogenhaut zu machen, auch wenn die natürliche noch offen ist, weil diese so nahe am Rande der Hornhaut ist, daß der Kranke nur sehr unvollkommen durch dieselbe sehen kann, und sich gemeiniglich vollends schließt, so bald die Regenbogenhaut in der Mitte durchbohrt ist, und folglich dem Gesicht nicht hinderlich ist. Der bloße einfache längliche Schnitt nach der Cheseldenschen Methode verdient hier den Vorzug; theils weil die Regenbogenhaut widernatürlich gespannt ist, und der Schnitt folglich gewiß offen bleibt; theils weil die herabgezogene natürliche Pupille gemeiniglich so nahe an der Hornhaut liegt, ja die Regenbogenhaut mehrentheils nahe an derselben an die Hornhaut angeklebt ist, so daß die Hälfte der Hornhaut, weder nach der Zaninschen noch nach

nach der Wenzelschen Methode abgeschnitten werden kann. Dazu kommt, daß da an dieser Berrückung der Pupille mehrentheils eine äußere Verletzung schuld ist, oft ein Theil der Hornhaut verdunkelt ist, und man Gefahr laufen würde, den noch durchsichtigen Theil derselben zu verdunkeln, wenn man die Hälfte der Hornhaut ablösen wollte, um die Wenzelsche oder Janinsche Methode zu bewerkstelligen. Nur muß das Messer, womit man die Regenbogenhaut spaltet, nicht in die hintere, sondern in die vordere Augenkammer eingestochen werden. Ist die natürliche Pupille herunter oder heraufwärts gezogen, so ist es rathsam den Schnitt durch die Regenbogenhaut in horizontaler Richtung zu machen; ist sie aber zu der einen oder andern Seite gezogen, so giebt man ihm am besten eine senkrechte Richtung.

S. 378.

Es geschiehet zuweilen im Falle eines Leukoms, daß eine größere oder kleinere Stelle nahe am Rande der Hornhaut noch durchsichtig ist. Obgleich durch diese Stelle Licht ins Auge fällt, sieht dennoch der Kranke nichts, weil diese Stelle zu sehr von der Pupille entfernt ist. Aber man kann ihm das Gesicht verschaffen, wenn man die Regenbogenhaut nahe hinter der durchsichtigen Stelle der Hornhaut durchbohrt. Erfahrungen (Dohelius, Schwed. Ak. Abhandl. 29 Band) lehren, daß Kranke in diesem Falle sehr gut sehen. Aber man siehet leicht ein, daß weder die Janinsche noch Wenzelsche Methode hier statt findet; da es nicht rathsam, ja kaum möglich

möglich ist, die halbe Hornhaut in diesem Falle abzusondern. Die Cheseldensche Methode allein ist hier thunlich, nur muß das Messer nicht in die durchsichtige Stelle der Hornhaut, die bey dieser Gelegenheit leicht ihre Durchsichtigkeit verlieren könnte, sondern nahe an derselben eingestochen werden. Da in diesem Falle die natürliche Pupille offen, und die Regenbogenhaut nicht in widernatürlicher Spannung ist, hat man freylich einige Ursach zu fürchten, daß der Schnitt sich wieder schließt. Und um dies zu verhüten, muß man suchen den Schnitt, so groß als möglich zu machen. Da die Hornhaut hier größtentheils verdunkelt ist, hat man nicht zu fürchten, daß falls die künstliche Pupille zu groß wird, zu viel Licht ins Auge fällt, und das Gesicht gestöhrt wird. Erfahrungen (Abhandl. der Schwed. Akad. der Wissenschaften 34 Band. Chir. Bibl. 4 Band p. 344) zeigen, daß große Schnitte in der Regenbogenhaut sich nicht wieder schließen. Zudem durchschneidet man in diesem Falle die strahllichten Fibern der Regenbogenhaut in die Queere.

§. 379.

Ueberhaupt wenn man keine Ursach hat eine Verdunkelung hinter der Regenbogenhaut, oder eine Anklebung dieser Haut an die Kapsel zu vermuthen, wenn die Regenbogenhaut sich in einer widernatürlichen Spannung befindet, mag der einfache länglichte Schnitt wohl mehrentheils hinreichend seyn; zum vorausgesetzt, daß er groß genug gemacht wird, und daß man dafür sorgt, daß sich die Wunde
der

der Hornhaut bald möglichst wieder schließt, und die vordere und hintere Augenkammer von der wasserichten Feuchtigkeit ausgedehnt wird. Und in diesen Fällen scheint die Cheseldensche Methode, die nur eine kleine Oeffnung in die Hornhaut macht, und überhaupt leicht und einfach ist, der Janinschen vorzuziehen zu seyn, bey der jederzeit die Hälfte der Hornhaut abgeschnitten werden muß, und die daher immer mit weit mehrern Schwierigkeiten verbunden ist.

S. 380.

Wenn man aber Ursach hat, zu vermuthen, daß die Kapsel und Linse hinter der Regenbogenhaut verdunkelt, oder an die Regenbogenhaut angeklebt ist, und dies ist gemeiniglich der Fall, wenn die Verengerung der Pupille durch eine Entzündung veranlaßt wird, so ist der einfache Schnitt wohl selten hinreichend, er geschehe nach der Cheseldenschen oder Janinschen Methode; da die Regenbogenhaut an die Kapsel angeklebt und die Kapsel schwerlich abgefondert und ausgezogen werden kann, erweitert sich der Schnitt nicht, und schließt sich wahrscheinlich wieder. Die Wenzelsche Methode wodurch nicht allein ein Stück aus der Regenbogenhaut, sondern auch aus der verdunkelten Kapsel ausgeschnitten wird, ist in diesem Falle durchaus nothwendig. Oder man kann auch die Hälfte der Hornhaut absondern, die Regenbogenhaut kreuzweis durchschneiden, und die Ecken des Schnitts mit der Scheere abschneiden. Es giebt Fälle, wo diese Methode, welche bereits (Guerin) mit sehr gutem

gutem Erfolge bewerkstelligt worden ist, so gar den Vorzug vor der Wenzelschen verdient.


§. 381.

Findet man die Krystalllinse verdunkelt, so muß dieselbe sogleich durch die ebengemachte künstliche Pupille ausgezogen werden. Man hat dies wirklich einigemal (Janin, Wenzel) mit dem besten Erfolge gethan. Einige (Wenzel) behaupten so gar, daß die Krystalllinse immer, auch wenn sie nicht verdunkelt ist, ausgezogen werden müsse. Die Entfernung der Regenbogenhaut, sagen sie, von der Krystalllinse ist so geringe, daß die Spitze des Instruments, womit man die Regenbogenhaut durchbohrt, wahrscheinlich immer die Krystalllinse und ihre Kapsel verlegt. Immer hat man daher nach dieser Operation eine Verdunkelung der Krystalllinse zu fürchten; immer ist es daher besser, die Linse sogleich nach derselben auszuziehen, als die Verdunkelung derselben zu erwarten, und den Kranken in die Nothwendigkeit einer zweiten Operation zu setzen.

§. 382.

Wenn man aus irgend einer Ursach die künstliche Pupille nicht genau an der Stelle der verschloßnen natürlichen macht, soll man sie jederzeit an der Seite derselben nach dem innern Augenwinkel hin machen. Man versichert, (Janin) daß jederzeit ein Schielen erfolgt, wenn man sie an die äußere Seite der natürlichen Pupille macht. — Man muß sich hüten, daß die künstliche Pupille nicht zu groß,
 Richt. Wundarzneyk. III. B. B b aber

aber auch nicht zu klein ist; und kann man die Größe derselben nicht immer genau abmessen, so ist es immer besser, sie ein wenig zu groß, als zu klein zu machen, weil die im ersten Fall entstehenden Unbequemlichkeiten sich leichter haben lassen, als die Folgen einer zu kleinen Oeffnung. — Auch bey der bloßen Verengerung der natürlichen Pupille, wenn das Gesicht dabey in einem hohen Grade gemindert ist, findet diese Operation statt. — Selten folgen auf diese Operation heftige Zufälle der Entzündung, selten blutet, oder entert die Wunde der Regenbogenhaut merklich. — Gemeiniglich erhalten die Kranken durch dieselbe ein ganz gutes Gesicht, obgleich die neue Pupille weder egal rund, noch beweglich ist. — Fremde undurchsichtige Körper, die die Pupille verstopfen, kann man zuweilen mit der Spitze einer Nadel, die man in die Hornhaut sticht, wegschaffen. Liegen sie fest, oder kann man zum voraus merken, daß sie sich in der wässerichten Feuchtigkeit nicht auflösen, so thut man am besten, wenn man die Hornhaut, wie bey der Ausziehung des Staars öffnet, und die Materie, welche die Pupille verstopft, mit einer kleinen Zange ganz aus dem Auge nimmt.



Das zehnte Kapitel.

Von der widernatürlichen Erweiterung der Pupille.

S. 383.

Die widernatürliche Erweiterung der Pupille (Mydriasis) ist gemeiniglich ein Symptom einer andern Krankheit, selten eine Krankheit für sich. Man beobachtet sie in einem sehr verschiedenen Grade. Zuweilen ist die Pupille so außerordentlich erweitert, daß man die Regenbogenhaut bloß als eine kleine Falte im innern Umfange des Randes der Hornhaut erblickt. Zuweilen ist die Pupille zugleich unbeweglich, zuweilen hat sie noch einige Beweglichkeit. Nicht selten hat dieselbe zugleich ihre runde Gestalt verlohren, und ist länglich, oder eckigt. Zuweilen bemerkt man diese Krankheit nur an einem Auge, in den mehresten Fällen jedoch an beyden Augen. Oft ist sie mit einer gänzlichen Blindheit verbunden, zuweilen, jedoch weit seltner, nicht. Im letztern Falle ist der Kranke lichtscheu, oder hat eine vöilige Tageblindheit (nyctalopia). Immer ist er in der Gefahr das Gesicht durch einen schwarzen Staar allmählig gänzlich zu verlohren. Einige Kranke dieser Art sehen alle Gegenstände kleiner und in einer größern Entfernung, als sie wirklich sind.

S. 384.

Die Krankheiten, deren Symptom die Mydriasis gemeinlich ist, sind: 1) der schwarze Staar. Indessen ist sie nicht ein unzertrennliches und beständiges Symptom desselben; man findet schwarze Staare mit beweglicher und unfehlhafter Pupille; und in Fällen, wo sie erweitert und unbeweglich ist, erhält sie zuweilen ihre natürliche Größe und Beweglichkeit wieder, obgleich der schwarze Staar unverändert bleibt. 2) Der graue Staar; und zwar in einem doppelten Falle; nämlich wenn derselbe an die Regenbogenhaut anhängt, und wenn die Staarlinse widernatürlich dick und groß ist. Im ersten Falle ist die Pupille gemeinlich zugleich unbeweglich und ungleich; im zweyten hat sie zuweilen noch einige Bewegung, und die Regenbogenhaut ist vorwärts nach der Hornhaut hin gedrückt, und convex. 3) Die Augentwassersucht. Die Erweiterung der Pupille rührt hier unmittelbar von der Ausdehnung des ganzen Augapfels her, und nimmt mit dieser zu und ab. 4) Bey Kranken, die mit Würmern beschweret sind, die in Ohnmacht liegen, die die Kopfwassersucht haben; die apoplektische, soporöse Krankheiten haben, findet man gemeinlich die Pupille widernatürlich ausge dehnt. — In allen diesen Fällen kommt es einzig und allein auf die Kur der Hauptkrankheit an, zu der sich die Mydriasis als Symptom gesellt.

S. 385.

S. 385.

In dem Falle, wo man die Mydriasis als eine Krankheit für sich betrachten kann, scheint eine Schwäche oder Lähmung derer Kräfte, wodurch sich die Pupille verengert, die nächste Ursach derselben zu seyn. Sie ist in diesem Falle gemeiniglich die Folge einer apoplektischen Krankheit, oder eines Schlags außs Auge, oder einer starken und plötzlichen Ausdehnung der Pupille, wie z. E. bey der Ausziehung des grauen Staars. Ist die Krankheit alt, so hat man wenig Hoffnung sie zu heben, sie entstehe von welcher Ursach sie wolle; ist sie neu so kann man zuweilen durch reizende und stärkende innere und äußere Mittel der Pupille, die Kraft sich zu bewegen, und zu verengern, wieder verschaffen. Die vorzüglichsten Mittel dieser Art sind, spanische Fliegenpflaster über die Augenbraunen gelegt, ätherische Oele in die Gegend der Augenbraunen eingerieben, die Electricität, Brechmittel in kleinen und vollen Dosen, andrer ähnlicher Mittel, die bey paralytischen Zufällen andrer Theile pflegen gebraucht zu werden nicht zu gedenken. Nutzen diese Mittel nichts, so muß man sich mit dem Gebrauche der Palliativmittel begnügen, welche im folgenden werden angezeigt werden. — Zuweilen entsteht die Lähmung der Pupille von einem besondern Krankheitsstoff, der außs Auge wirkt, und eine eigne Behandlung erfordert. Ein Knabe, der einen bösen Kopf hatte, bekam die Mydriasis in einem sehr hohen Grade, als ihm der Ausschlag durch trocknende Mittel war geheilt worden, und verlorh sie wieder, als der Ausschlag

beym äußern Gebrauch der Schwefelsalbe wieder zum Vorschein kam.

S. 386.

Da im Dunkeln die Pupille sich erweitert, entsteht bey einem langen Auffenthalte an einem dunkeln Orte eine Mydriasis ex consuetudine; indem sich die Pupille an die Erweiterung gewöhnt, und das Vermögen sich zu verengern verliert. In den meisten Fällen erhält sie ihre Bewegung allmählig wieder, so wie das Licht von neuem wieder ins Auge fällt; nur muß dies allmählig geschehen, sonst wird das Auge bey so erweiterter Pupille, und des Lichts entwöhnt, geblendet, und seine Sehkraft geschwächt oder gänzlich vernichtet. Erhält die Pupille ihre Beweglichkeit nicht wieder, so muß sich der Kranke mit den Palliativmitteln behelfen. — Man hat beobachtet, daß die Mydriasis zuweilen ein angeborener Fehler ist. Schwerlich ist in diesem Falle wohl an eine gründliche Heilung zu denken. Fällt dem Kranken das Licht beschwerlich, so muß er sich der Palliativmittel bedienen. Ein Stoß aufs Auge zerreißt zuweilen die Pupille. Mehrentheils bleibt der Riß offen, und der Kranke befindet sich in denselben Umständen, als wenn er eine Mydriasis hätte. Da man den Spalt nicht schließen kann, kommt es auch hier darauf an, durch Palliativmittel, wo nöthig, zu hindern, daß die Sehkraft des Auges durch das zu starke Licht nicht Schaden leidet.

S: 387.

S. 387.

Durch die widernatürlich erweiterte Pupille fällt des Lichts so viel ins Auge, daß der Kranke, wenn er nicht des Gesichts beraubt ist, geblendet wird. Er sieht nicht allein an einem hellen Orte undeutlich, sondern lauft auch Gefahr, durch die allzustrarke Wirkung des Lichts aufs Auge, das Gesicht allmählig gänzlich zu verliehren. Dies zu verhindern, ist der Endzweck der Palliativkur. Man mindert durch dieselbe das Licht, welches ins Auge fällt, und setzt dadurch den Kranken nicht allein in den Stand, an einem hellen Orte deutlich und ohne Beschwerde zu sehen, sondern auch außer Gefahr, das Gesicht gänzlich zu verliehren. Die gewöhnlichen Mittel, die man zu dieser Absicht empfiehlt, sind: alle Augenschirme, wodurch vorzüglich das Licht von oben herab von den Augen abgehalten wird; der schwarze Flor, den man über das Gesicht herab hängen läßt; die grüne Brille, die die Menge der Lichtstrahlen, von dem Gegenstande, den der Kranke ansieht, mindert; die Brille mit schwarzen Kartenblättern, in deren Mitte eine Oeffnung von der natürlichen Größe der Pupille ist. Das beste und bequemste Mittel ist die Röhrenbrille; eine gewöhnliche Brille, die aber statt der Gläser in ihren zwey Ringen zwey Conische Röhren enthält, deren Grundfläche nach dem Auge, die Spitze nach den Gegenständen, die man sehen will, gerichtet ist. Die Röhren sind aus schwarzen Leder verfertigt, drey bis vier Quersfinger lang. Ihr Durchmesser in der Grundfläche ist so groß, als der Umfang der Augenhöhle,

höhle, an der Spitze ein wenig kleiner. Der Rand der Grundfläche ist so ausgeschnitten, daß er an den Umfang der Augenhöhle allenthalben genau anliegt. Die Hauptwirkung dieser Röhren besteht darinnen, daß sie alle Lichtstrahlen, die von der Seite kommen, abhalten, und nur diejenigen ins Auge fallen lassen, die von dem Gegenstande kommen, der in der Sehaxe befindlich ist. — Jeder Wundarzt kann nach Verschiedenheit derer Umstände, in welchen sich der Kranke befindet; diese Mittel auf mancherley Art vervielfältigen, und verändern.



Das eilfte Kapitel.

Von der Augenwassersucht.

§. 388.

Die Wassersucht des Auges ist eine widernatürliche Anschwellung des Augapfels, die von einer widernatürlichen Anhäufung der natürlichen Feuchtigkeiten im Auge entsteht. Zuweilen ist es die wässerichte Feuchtigkeit, die sich widernatürlich anhäuft, und in diesem Falle hat die Krankheit ihren Sitz vorzüglich in den beyden vordern Augenkammern: zuweilen hat die gläserne Feuchtigkeit den vorzüglichsten Antheil an der Krankheit, die jedoch in diesem Falle sich nicht allein widernatürlich anhäuft, sondern gemeinlich zugleich auch ihre natürliche Consistenz verliert, und widernatürlich dünn und wässericht wird. — Im Anfange der Krankheit bemerkt der Kranke außer einer gewissen Spannung im ganzen Umfange des Augapfels, einer Steifigkeit bey den Bewegungen desselben, und einer verminderten Schärfe des Gesichtes keine Beschwerde. Allmählig schwillt der Augapfel sichtbarlich auf, und fühlt sich härter als gewöhnlich an, die Pupille erweitert sich, und bewegt sich schwach, das Gesicht nimmt merklich ab, und der spannende Schmerz wird heftiger. Zuletzt schwillt der Augapfel so stark an, daß er aus der Augenhöhle tritt, der Kranke verliert das Gesicht

gänzlich. Die Schmerzen werden äußerst heftig, erstrecken sich durch den halben Kopf, oft herunter bis in die Zähne, und stöhren die Ruhe des Kranken Tag und Nacht. Da die Augenlider nicht mehr geschlossen werden können, fließen die Thränen über die Wangen herab: die Haare auf den Rändern der Augenlider reizen den Augapfel, entzünden und ulceriren ihn. Man nennt die Krankheit in diesem letzten Grade, in welchem der Augapfel oft die Größe eines Hühnereyes erreicht, Ochsenauge (buphthalmos).

§. 389.

Hat die Krankheit ihren Sitz vorzüglich in den zwey vordern Augenkammern, so wird die durchsichtige Hornhaut nicht allein vorwärts ausgedehnt, und von der Regenbogenhaut entfernt, sondern auch in die Breite und Länge dergestalt verlängert, daß die natürliche Länge ihres Durchmessers oft zweyfach, ja dreyfach vermehrt wird, und die vordere Augenkammer oft von einer ungeheuren Größe ist. Hat die gläserne Feuchtigkeit den vorzüglichsten Antheil an der Krankheit, so bemerkt man diese widernatürliche Vergrößerung der durchsichtigen Haut nicht, und die Regenbogenhaut ist nicht allein von derselben nicht mehr als gewöhnlich entfernt, sondern sogar zuweilen derselben ungewöhnlich nahe.

§. 390.

Die Ursachen der Augenwassersucht sind ohne Zweifel eben so mannigfaltig, als die Ursachen der
Wasser-

Wassersucht an andern Theilen. Indessen sind sie mehrentheils sehr schwer mit Gewißheit zu bestimmen. So mannigfaltig sie aber auch sind, so ist ihre nächste Wirkung, wodurch sie die Absonderung und Einsaugung der Feuchtigkeiten des Auges stören, und die Wassersucht des Auges veranlassen, wahrscheinlich doch nur dreyfach; sie erregen nämlich entweder Verstopfung, oder eine Schwäche, oder einen widernatürlichen Reiz. Es giebt keine bekannte entfernte Ursach der Wassersucht, die nicht auf eine, von diesen drey Arten, wirkte. Einige (Janin) welche behaupten, daß die wässerichte Feuchtigkeit beständig durch die Oeffnungen der durchsichtigen Hornhaut durchschwitzt, und den größten Theil der Feuchtigkeit ausmacht, die man Thränen nennt, suchen es wahrscheinlich zu machen, daß die Verstopfung der Oeffnungen der durchsichtigen Hornhaut, und das gehinderte Durchschwitzen der wässerichten Feuchtigkeit durch dieselbe, die Hauptveranlassung der Augenwassersucht sey. Da aber im Falle der Augenwassersucht die durchsichtige Hornhaut mehrentheils ganz klar und durchsichtig, und dem Anscheine nach völlig unfehlerhaft ist; und da in Fällen, z. E. beym Leucom, wo dieselbe ganz verdunkelt, verhärtet, und verdickt ist, ihre Oeffnungen also wahrscheinlich verstopft sind, nicht die geringste Spuhr einer Augenwassersucht bemerkt wird, bleibt diese Behauptung sehr zweifelhaft.

S. 391.

Die Augenwassersucht ist überhaupt sehr schwer zu heilen, oft unheilbar. Ist die Krankheit einmal so

so weit gekommen, daß das Gesicht gänzlich verlohren ist, so findet eine gründliche Kur keinesweges mehr statt. Es ist leicht einzusehen, daß der Schaden, den die innern Organen des Augapfels durch die starke Ausdehnung leiden, nicht wieder gut zu machen ist, und daß man daher die zu starke Anschwellung des Augapfels durchaus verhüten muß, wenn man Hoffnung haben will, die Krankheit gründlich zu heilen. — Die Krankheit kann sogar bey fortdauernder Zunahme tödlich werden (Louis, Memoir. de l'Acad. de Chir. de Paris, Tom. V. Terras, Journal de Medecine, Tom. 45). Man findet in diesem Falle gemeiniglich die Knochen der Augenhöhle cariös. — Wenn die Krankheit gehoben wird, kommt sie gemeiniglich wieder; und es ist sehr schwer, ihre Rückfälle zu verhüten. Die Schwierigkeiten der Heilung sind dieselben, die Krankheit habe ihren Sitz in den vordern Augenkammern, oder in der gläsernen Feuchtigkeit.

S. 392.

Bey der Kur kommt es vorzüglich darauf an, die entfernten Ursachen der Krankheit ausfindig zu machen, und zu heben. Dies ist der einzige Weg zu einer gründlichen und dauerhaften Kur. Indem die Ursach der Wassersucht gehoben wird, vrrliehrt sich die widernatürlich angehäuften Feuchtigkeit von sich selbst, und kommt nicht wieder. Alle Ursachen, die an andern Theilen des Körpers wassersüchtige Zufälle erregen, können sie auch am Auge erregen: alle diese Ursachen muß daher der Wundarzt in Verdacht

dacht haben. Vier von diesen Ursachen scheinen nach Erfahrungen an der Augenwassersucht vorzüglich Antheil zu haben; nämlich eine übelbehandelte Krätze, ein unvorsichtig geheilter böser Kopf, die scrophulöse Kakochymie, und das venerische Gift. Jede dieser Ursachen muß er durch die ihr angemessenen eignen Mittel behandeln. Eine Augenwassersucht, die nach einer übelbehandelten Krätze entstanden war, verlor sich von sich selbst, und kam nicht wieder, als durch eine neue Ansteckung die Krätze wieder hervor gebracht wurde. Die gute Wirkung des Quecksilbers gegen diese Krankheit läßt vermuthen, daß sie oft venerischen Ursprungs ist. Man hat gesehen, daß die Augenwassersucht nach einem Schlag aufs Auge entstanden ist; der Wundarzt kann mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß Schwäche oder Stockungen in diesem Falle die nächste Ursach der Krankheit sind, und ist berechtigt, auslösende und stärkende Mittel anzuwenden. — Selten aber entdeckt er die Ursach der Krankheit, und dann ist er freylich genöthigt, sich mit der empirischen Kur zu begnügen.

§. 393.

Der Endzweck der empirischen Kur ist bloß die Ausleerung der widernatürlich angehäuften Feuchtigkeiten. Zwar sucht man durch dieselbe nach geschehener Ausleerung auch eine neue Anhäuffung zu verhüten, und wendet zu dieser Absicht, in der Voraussetzung, daß die durch die widernatürliche Ausdehnung verursachte Schwäche der innern Theile des Auges

Auges vorzüglich den Rückfall der Krankheit veranlasse, stärkende Mittel an, da aber diese muthmaassliche Schwäche bloß eine Folge der Krankheit ist, und die ursprüngliche Ursach derselben bey dieser Kurmethode gar nicht gehoben wird, folglich fortwirkt, siehet man leicht ein wie selten der Wundarzt die letzte Absicht, nämlich die Verhütung der Wiederkehr der Krankheit, durch diese Kurmethode zu erreichen hoffen kann.

S. 394.

Die ausleerenden Mittel, die man zur Erreichung der ersten Absicht anwendet, sind entweder allgemeine, oder örtliche. Die allgemeinen sind, die Brech-, Purgier-, Schweiß-, und Urintreibenden Mittel. Die Wahl dieser Mittel hängt von der Leibesbeschaffenheit des Kranken ab. Zuweilen verträgt der Kranke Purgier- oder Schweißtreibende Mittel nicht sowohl als Urintreibende; zuweilen wirken diese leicht, und stark, und ohne Beschwerde, jene wenig oder gar nicht. Ein Versuch unterrichtet den aufmerksamen Wundarzt gar bald, und zeigt ihm, welches Mittel er wählen muß. Die Urintreibenden Mittel sind indessen die gewöhnlichsten, und unter diesen ist die squilla, vornemlich in Verbindung mit Salpeter vorzüglich im Gebrauche. Auch die Wacholderbeeren in Pulver, oder in einem Dekokte, und die mit vegetabilischen Säuren gesättigten Laugensalze sind dienlich. Einmal hat die digitalis purpurea, namentlich bey der Augenwassersucht sehr gute Dienste gethan. Unter den Purgiermit-

teln

teln verdient der Cremor Tartari in den gewöhnlichen Fällen den Vorzug. In hartnäckigen Fällen sind Brechmittel oft von großem Nutzen. Sie wirken oft ganz allein die Zertheilung der wassersüchtigen Feuchtigkeiten; oft befördern sie die Wirkung der Urintreibenden, oder Purgiernittel dergestalt, daß sie nach dem Gebrauche des Brechmittels die erwünschteste Wirkung thun, nachdem sie vorher ganz fruchtlos gebraucht worden sind.

S. 395.

Wenn keines dieser Mittel die erwünschte Wirkung thut, so erreicht man zuweilen seine Absicht, wenn man die ausleerenden Mittel mit denen Mitteln vereinigt, die der vermuthlichen nächsten Ursache der Krankheit angemessen sind. Hat man aus den vorhergehenden Umständen oder gegenwärtigen Zufällen irgend einen Anlaß, zu vermuthen, daß vielleicht Verstopfungen die Absonderung und Einsaugung der Augenfeuchtigkeiten stöhren, so thut man wohl, wenn man auflösende Mittel mit den ausleerenden vereinigt. Vorzüglich empfiehlt die Erfahrung in diesem Falle den Gebrauch des Quecksilbers, und der Spießglasmittel. Man thut am besten, wenn man diese Mittel abwechselnd mit den ausleerenden gebrauchen läßt. Eine Mischung aus einem Grane Calomel, eben soviel Spießglaschwefel und acht Gran Schierlingpulver dient zur Absicht des Wundarztes hier vorzüglich. — Hat man aus den vergangnen oder gegenwärtigen örtlichen oder allgemeinen Zufällen Anlaß zu vermuthen, daß
irgend

irgend ein Reiz, des Absonderungsgeschäft der Feuchtigkeiten des Auges in Unordnung bringt, so ist die Verbindung reizmildernder und krampfstillender Mittel, des Mohnsafts, des Biebergeißs, des Safrans mit den ausleerenden Mitteln von großem Nutzen. — Kann man vermuthen, daß örtliche oder allgemeine Schwäche Antheil an der Krankheit hat, so muß man stärkende, gewürzhafte, bittere Mittel, China, Stahl, Pomeranzenschalen, den Calamus aromaticus mit den Urintreibenden Mitteln verbinden.

S. 396.

Die örtlichen Mittel, wodurch man die Ausleerung des Wassers aus dem Auge zu bewirken sucht, sind: 1) spanische Fliegenpflaster. Man legt sie hinter die Ohren, oder über die Augenbraunen, und hält sie lange im Flusse. 2) Fontanelen und Haarseile am Arme und im Nacken, wovon aber wenig zu erwarten ist, wenn sie nicht etwa der besondern Ursache der Krankheit angemessen sind. 3) Nießmittel, die die Feuchtigkeiten im Augapfel mindern, indem sie einen Ausfluß aus der Nase erregen. Eine hartnäckige Augenwassersucht verlorh sich innerhalb wenig Tagen bey dem Gebrauche einer Mischung aus hellebor. alb. gran. X: und herb. maioran. Scrup. IV. wovon der Kranke des Tages einigemal etwas in die Nase zog. 4) Die Electricität, die auch bey der Augenwassersucht mit einigem Nutzen soll angewendet worden seyn. 5) Erweichende Augenbäder, um die Deffnungen der durchsichtigen Hornhaut zu erweitern, (Janin) und
das

das Verdünsten der wässerichten Feuchtigkeit zu befördern. 6) Geistige, gewürzhafte äußere Augenmittel, um die Wirkung der einsaugenden Gefäße zu befördern; vorzüglich der Salmiakgeist. 7) Auflösende Augenmittel, vorzüglich der Borax, Salmiak, u. s. w. um Stockungen aufzulösen, und die Gefäße zu öffnen.

S. 397.

Indessen kann man nicht leugnen, daß alle diese Mittel mehrentheils fruchtlos angewendet werden; sie leeren nämlich entweder die wassersüchtigen Feuchtigkeiten im Auge nicht aus; oder wenn sie sie ausleeren, kommt die Krankheit gemeiniglich bald wieder. Im ersten Falle ist dem Wundarzt noch ein Mittel übrig, wodurch er den Endzweck, das Wasser auszuleeren gewiß erhält; eine chirurgische Operation, die Durchbohrung (paracenthesis) des Augapfels. Ist der Sitz der Wassersucht vorzüglich in den vordern zwey Augenkammern, so darf man nur die durchsichtige Hornhaut in einiger Entfernung von ihrem Rande mit einer Lanzette oder dem Staarmesser durchstoßen, um die wässerichte Feuchtigkeit aus beyden Augenkammer auszuleeren. Ist der Sitz der Krankheit vorzüglich in der gläsernen Feuchtigkeit, so muß, wie bey der Ausziehung des Staars die Hälfte der Hornhaut abgelöst, die Kapsel der Krystallinse geöffnet, und nebst der Krystallinse so viel von der gläsernen Feuchtigkeit ausgedrückt werden, als nöthig ist, um den Augapfel bis zu seiner natürlichen Größe zu vermindern. Jedoch ist bey

Nicht. Wundarzneyk. III. B. Ec diesem

diesem letzten Handgriff Behutsamkeit nöthig, denn leicht (Marchan, Journal de Medecine, Tom. 32) fließt der gläsernen Feuchtigkeit, zumal da dieselbe immer dünn und wässericht ist, zu viel aus, ja das Auge leert sich gänzlich aus, fällt zusammen, und füllt sich ganz und gar nicht wieder an. Man hat daher den Vorschlag gethan, einen kleinen Troikart, in der Entfernung von 2 bis 3 Linien vom Rande der Hornhaut im äußern Augenwinkel in den Augapfel zu stoßen, und durch die Röhre so viel abfließen zu lassen, als nöthig ist. Aber auch bey dem Gebrauche des Troikarts ist man vor diesem Zufalle nicht ganz sicher, denn wenn die gläserne Feuchtigkeit sehr dünn ist, fährt, nachdem die Röhre ausgezogen ist, der Ausfluß durch die Wunde zuweilen bis zur gänzlichen Ausleerung des Augapfels fort, andrer Unbequemlichkeiten, die mit dem Gebrauche des Troikarts verbunden sind, nicht zu gedenken.

S. 398.

Die Schwierigkeit, das Wasser auszuleeren, wird also durch diese Operation gänzlich gehoben. Aber die Schwierigkeit, zu verhüten, daß es sich nicht wieder von neuem anhäuft, ist so leicht nicht zu heben; denn auch nach dieser Operation entsteht die Krankheit gemeiniglich wieder. Es giebt in dem Falle, wo man die erste Ursach der Krankheit nicht kennt, nur drey Mittel, von welchen es sich erwarten läßt, daß sie, wo nicht immer, doch zuweilen, die Wiederkehr der Krankheit verhüten. Das erste Mittel ist, die Operation, bey Zeiten, so bald man merkt,

merkt, daß die allgemeinen und örtlichen ausleeren-
den Mittel die Geschwulst des Augapfels nicht min-
dern, und ehe noch der Augapfel zu stark anschwillt,
verrichtet. Unter der Beobachtung dieser Regel
hat die Operation zuweilen sogleich bey der ersten
Anwendung, (Bell) zuweilen nach einigen Wieder-
hohlungen (Nuck) eine gründliche Kur bewirkt.
Man darf also den Muth nicht sinken lassen, wenn
nach der ersten Operation ein Recidiv erfolgt. Aber
begreiflich ist es auch, daß es unmöglich ist, eine
Radikalkur zu bewirken, und das Auge zu seiner
vorigen Integrität wieder herzustellen, wenn es ein-
mal so stark ausgedehnt worden ist, daß seine Haupt-
verrichtung, die Sehkraft, gehemmt worden ist.

§. 399.

Gleich nach gescheneher Ausleerung müssen stär-
kende Mittel angewendet werden; denn immer ist
die Folge der Krankheit Erschlaffung, wodurch eine
neue Anhäuffung befördert wird. Auch zeigt die
Erfahrung bey andern Gattungen der Wassersucht,
daß zuweilen stärkende Mittel die Wiederkehr dersel-
ben nach gescheneher Ausleerungen verhüten. Daß
kalte Wasser, womit das Auge oft befeuchtet wird,
Dekokte von zusammenziehenden Mittel, der Eichen-
rinde, der Weidenrinde u. s. w. als Augenbad ge-
braucht, spirituose und aromatische Augengewässer,
der Janinsche Augenwein, der Salmiakspiritus sind
zu dieser Absicht vorzüglich empfehlungswürdig.

S. 400.

Gemeiniglich schließt sich die Wunde, wodurch das Wasser ausgeleeret worden ist, bald nach der Operation wieder; und sobald dieselbe geschlossen ist, häufen sich die Augenfeuchtigkeiten von neuem wieder an, und verursachen eine abermalige Ausdehnung des Augapfels, wodurch offenbar die Wirkung der eben empfohlenen stärkenden Mittel gehindert wird. Würde man nicht die Absicht, die innern Theile des Auges zu stärken, und eine neue Anhäufung zu verhüten, öfter erreichen, wenn man das Auge eine Zeitlang in einem Zustande der Ausleerung, die innern Theile desselben in einer Entspannung erhielt, und während dieser Zeit stärkende Mittel anwendete? Ein Mann wurde von einem hohen Grade der Augenwassersucht befreuet, dem man die Operation alle Wochen zwey Monate hinter einander wiederholte, und das Auge mit dem Janinschen Augenspiritus befeuchtete. Allenfalls könnte man auch ein kleines Haarseil durch die Hornhaut ziehen; oder die Wunde in der Hornhaut alle Morgen mit der Spitze des Messers wieder aufziehen.

S. 401.

Wenn die Krankheit einen so hohen Grad erreicht hat, daß das Gesicht völlig verlohren, und der Augapfel weit über seine natürliche Größe ausgedehnt ist, thut man am besten, wenn man alle Hoffnung zu einer Radikalkur aufgibt, den Augapfel gänzlich ausleert, und ein künstliches Auge einsetzt. Das Gesicht kann, wenn es durch die gewalt-

waltsame Ausdehnung des Augapfels und seiner innern Theile einmal verlohren gegangen ist, nicht wieder hergestellt werden; die Operation verursacht also keinen Verlust; sie hebt die Unförmlichkeit, und die Gefahr, die dem Kranken bey der fernern Zunahme der Krankheit drohet. — Entstehen heftige Schmerzen, die sich durch den halben Kopf erstrecken, mit Fieber und Schlaflosigkeit, dann ist die Gefahr nahe, und die Operation leidet weiter nicht den geringsten Aufschub. Man durchschneidet dabey die durchsichtige Hornhaut kreuzweis, und drückt die sämtlichen Feuchtigkeiten des Augapfels gänzlich aus. Und dennoch füllt sich der Augapfel zuweilen von neuem an. Zuweilen wächst nach der Operation aus dem innern des Augapfels ein schwammichtes Fleisch hervor; man (Perras, Journal de Medecine Tome 45) hat es in einem Falle durch den äußern Gebrauch der Belladonna glücklich gestilgt. Weicht es diesem oder andern Mitteln nicht, oder hat man die geringste Anzeige, daß der Beinfratz in der Augenhöhle ist, so muß der Augapfel samt seinen Häuten gänzlich ausgerottet werden.



Das zwölfte Kapitel.

Von dem Vorfalle des Augapfels.

S. 402.

Der Augapfel ist im Falle dieser Krankheit, die man Exophthalmia, ophthalmoptosis, ptosis bulbi oculi nennt, von natürlicher Größe und Beschaffenheit; er verändert bloß seine Stelle, und tritt zum Theil, oder ganz aus der Augenhöhle hervor. Mit Unrecht rechnet man also zu dieser Krankheit die Fälle, wo der Augapfel widernatürlich aufschwillt, und folglich stärker als gewöhnlich aus der Augenhöhle hervorragt; z. E. den Fall der Augenwassersucht, des Staphyloms, des Augenkrebsses u. s. w. Ist der Augapfel gänzlich aus der Augenhöhle herausgetreten, so liegt er gemeiniglich auf dem Schlafbeine oder der Wange, und ist der Sehkraft gänzlich beraubt. Dennoch giebt es Fälle, wo bey dem vollkommensten Vorfalle der Augapfel einen ansehnlichen Grad von Sehkraft behielt, ob gleich der Vorfall einige Jahre alt war (Hope, philos. Transact. Chir. Bibl. 4 Band, p. 343).

S. 403.

Es giebt drey Ursachen, die diesen Vorfall veranlassen können. Die erste und seltnerer ist eine heftige Erschütterung des Kopfs. Einem Mann,
der

der von einer ansehnlichen Höhe herab auf den Kopf fiel, trat der Augapfel aus der Augenhöhle. Man versichert, daß während eines heftigen Anfalls von Niesen der Augapfel aus der Augenhöhle gesprungen sey. Dies sind seltne Fälle, die immer eine große Erschlaffung derer Theile, die den Augapfel in der Augenhöhle befestigen, oder irgend eine andre prädisponirende Ursach zum voraus setzen, die den Vorfall des Augapfels erleichtert, und befördert, und worauf bey der Kur Rücksicht genommen werden muß.

S. 404.

Eine weit häufigere Ursache des Vorfalles des Augapfels ist ein Stoß aufs Auge, mit einem Instrumente, das dünne genug ist, zur Seite des Augapfels in die Augenhöhle zu dringen, und den Augapfel auszudrücken, z. E. mit einem Stocke, einer Tabakspfeife, einem Rappier u. s. w. Wiederholte Erfahrungen zeigen, daß, so gewaltsam auch der Sehnerve und die Augenmuskeln in diesem Falle ausgedehnt werden, so sehr auch gar oft selbst die innern Theile des Augapfels bey dieser Gelegenheit leiden, und obgleich die Sehkraft des aus der Augenhöhle gedruckten Augapfels meistens verlohren geht, das Auge dennoch, wenn es baldmöglichst zurück gebracht wird, in den meisten Fällen nicht nur seine natürliche Beweglichkeit, sondern auch seine vorige Sehkraft wieder erhält. Ehe man aber an die Zurückbringung des Augapfels denkt, muß man die Verletzung, die das Instrument, welches den Aug-

Cc 4

apfel

apfel aus der Augenhöhle ausgedrückt hat, in der Augenhöhle verursacht hat, untersuchen. Ist das Instrument zerbrechlich, z. E. eine Tabakspfeife, so bleibt oft ein abgebrochenes Stück davon in der Augenhöhle stecken, welches mit dem Finger oder der Sonde entdeckt, und ausgezogen werden muß. Ist der Körper spitzig und hart, so durchbohrt er zuweilen die Knochen der Augenhöhle, und dringt ins Gehirn, in die Nase, oder in die Kinnbackenhöhle. Im ersten Falle, der sogleich oft sehr schwer, nach einiger Zeit aber, durch die Zufälle, die er erregt, gemeinlich gar leicht zu entdecken ist, sind die Folgen mehrentheils tödlich. Im zweyten und dritten Falle ist die Gefahr zwar nicht groß, doch muß der Wundarzt sehr aufmerksam seyn, dem Exter, falls eine Exterung erfolgen sollte, einen freyen Ausfluß zu bahnen, und zu unterhalten.

S. 405.

Die Zurückbringung des Augapfels ist mehrentheils ohne Schwierigkeit. Oft springt er von sich selbst zurück, sobald man die kleinen Hindernisse hebt, die sein Zurücktreten erschweren; und in den übrigen Fällen läßt er sich leicht mit der Hand zurückdrücken. Immer desto leichter, je früher die Zurückbringung geschiehet. Ist der Vorfall einige Tage alt, und sind die Theile in der Augenhöhle, und um den Augapfel bereits entzündet, so thut man wohl, wenn man die Entzündung durch allgemeine entzündungswidrige, und äußerliche erweichende Mittel zu vor mindert, und dann den Augapfel allmählig

mäßig zurückzudrücken sucht. — Ist der Augenerve, und der eine oder andre Augenmuskel zerrißsen, so darf man freylich nicht hoffen, daß das Auge seine vorige Sehkraft und Bewegung wieder erhält; indessen entdeckt man diese Verletzung nicht immer sogleich, da der Nerv sowohl als die Muskeln durch die Conjunctiva bedeckt sind, und gesetzt, man entdeckte sie, so würde es dennoch rathsam seyn, den Augapfel zurückzubringen, und die Ungestalttheit, die der Verlust desselben verursachen würde, zu verdüten. Nur muß man, zumal wenn die Verwundung der Theile hinter dem Auge stark ist, Maasregeln ergreifen, dem Exter, welches sich möglicherweise erzeugen kann, einen Ausfluß zu schaffen. — Die Verletzung der Conjunctiva, der Muskeln und des Nerven kann so stark seyn, daß der Wundarzt Bedenken findet, der zu fürchtenden Exterung wegen, den Augapfel sogleich zurückzubringen, und es für rathsam hält, die Exterung erst abzuwarten, ehe er den Augapfel zurück drückt. Er kann sich dazu desto eher entschließen, da laut vielen Erfahrungen der Augapfel, auch wenn er lange außerhalb der Augenhöhle gelegen, dennoch mehrentheils leicht zurückgebracht worden ist. — Es können sogar die Theile, die den Augapfel mit der Augenhöhle verbinden, dergestalt zerreißen und verletzt seyn, daß es der Wundarzt für rathsam hält, den Augapfel ganz abzuschneiden. Doch darf er dies nicht thun, wo nur einige Wahrscheinlichkeit ist, daß der Augapfel erhalten werden kann. — Sind die Knochen in der Augenhöhle zerbrochen, so muß die Zurück-

Cc 5

brin-

Bringung des Augapfels so lange verschoben werden, bis das nöthige in Absicht dieser Verletzung besorgt ist.

S. 406.

Wenn das Werkzeug, wodurch der Augapfel aus der Augenhöhle gedrückt wird, stumpf und breit, wie z. E. ein Finger, ein Stock, ein Rappier u. s. w. ist, leidet der Augapfel selbst immer eine heftige Quetschung, die eine heftige Entzündung zur Folge hat, und die Hoffnung, daß nach Zurückbringung des Augapfels das Gesicht zurückkehren wird, mindert, oder gänzlich vernichtet. Zuweilen bemerkt man in diesem Falle eine innere Blutergießung im Augapfel; zuweilen ist die Regenbogenhaut zerrissen; zuweilen ist die Hornhaut geborsten, und ein Theil der Feuchtigkeiten des Augapfels ausgeflossen. Obgleich in allen diesen Fällen kaum zu erwarten ist, daß das Gesicht je zurückkehren wird, muß dennoch der Augapfel zurückgebracht werden, weil falls er auch in Ecyterung geräth, oder sich zum Theil ausleert, die Ungestalttheit durch ein künstliches Auge gehoben werden kann, welches nicht geschehen kann, wenn er abgeschnitten wird. Nicht zu gedenken, daß die Verletzung zuweilen größer zu seyn scheint, als sie wirklich ist, und das Gesicht zuweilen zurückkehrt, wo man es nicht erwartet.

S. 407.

Das erste Geschäfte des Wundarztes nach Zurückbringung des Augapfels besteht darinnen, daß er die Entzündung verhütet und hebt. Oft ist dieselbe

selbe unbedeutend, zuweilen aber, vorzüglich wenn der Augapfel stark gelitten hat, sehr heftig. Zu Erreichung dieser Absicht, wendet er alle die allgemeinen und örtlichen entzündungswidrigen Mittel an, die im Kapitel von der Augenentzündung empfohlen worden sind. Unter den örtlichen äußerlichen Mitteln verdienen die zusammenziehenden den Vorzug, da Quetschung und Ausdehnung die nächsten Ursachen der Entzündung sind. Eben so behandelt der Wundarzt die möglichen Folgen der Entzündung, Exterung, Verdunkelung der Hornhaut u. s. w. nach den Regeln, die in den vorhergehenden Kapiteln bereits gegeben worden sind. Gemeiniglich kommt das Gesicht wieder, so wie sich die Entzündung verliert; geschiehet dies nicht, und ist die Entzündung gänzlich verschwunden, so kann er versuchen, durch reizende Nervenmittel die Wirkungskraft des Nerven wieder zu erregen. Die vorzüglichsten Mittel dieser Art werden im Kapitel vom schwarzen Staare angezeigt werden.

S. 408.

Die dritte Ursach des Vorfalles des Augapfels ist eine widernatürliche Geschwulst in der Augenhöhle, die so wie sie größer wird, den Augapfel allmählig aus der Augenhöhle hervordrückt. Es entstehen mancherley Geschwülste in der Augenhöhle; am häufigsten aber Balggeschwülste, die zuweilen eine wässerichte Feuchtigkeit, zuweilen eine dünne breyartige, zuweilen aber auch eine dichte Materie enthalten. — Zuweilen verhärtet sich das Zellengewebe

gewebe in der Augenhöhle, und schwillt auf, und drückt den Augapfel zum Theil, oder gänzlich aus der Augenhöhle. — Ein Absceß in der Augenhöhle ward so groß, daß er den Augapfel aus der Augenhöhle drückte (Pellier). — Auch Knochengeschwülste (Exostoses) entstehen zuweilen in der Augenhöhle, die den Vorfall des Augapfels verursachen. Die Entering der Rinnsackenhöhle hebt zuweilen den Boden der Augenhöhle in die Höhe, verengert die Augenhöhle, und drückt dem Augapfel aus. In allen diesen Fällen tritt der Augapfel allmählig aus der Augenhöhle, und verliert zuletzt die Sehkraft. Und dennoch hat man Fälle, wo der Augapfel Jahre lang außerhalb der Augenhöhle lag, und dennoch die Sehkraft behielt (Chirurg. Bibliothek 4 Band, 2 Stück, pag. 243.)

§. 409.

Die Erfahrung lehrt, daß auch in diesen Fällen, wo der Augapfel allmählig aus der Augenhöhle gedrückt worden ist, lange Zeit, ja Jahre lang außerhalb derselben gelegen hat, und während der ganzen Zeit der Sehkraft völlig beraubt gewesen ist, dennoch die Bewegung und Sehkraft völlig wieder erhält, wenn er zurück gebracht wird (Acrell; Brockelsby in Medical Obs. and Enquir. Vol. IV. White Cases of Surgery). Um ihn zurückzubringen muß man die Ursach wegchaffen, die ihn aus der Augenhöhle gedrückt hat. Die Entering in der Oberkinnbackenhöhle muß nach den im vorhergehenden (siehe diese Anfangsgründe der Wundarzneyl. 2 Band §. 418) gegeben-

gegebenen Regeln behandelt werden. So bald die Heilung vollbracht ist, vermindert sich die Kinnbackenhöhle gar oft zu ihrem natürlichen Umfange, und in diesem Falle erweitert sich zuweilen die Augenhöhle wieder dergestalt, daß der Augapfel zurückgebracht werden kann. Geschiehet dies nicht, so muß er abgeschnitten werden. — Die Verhärtung und Anschwellung des Zellengewebes in der Augenhöhle zertheilt zuweilen das Quecksilber (Louis. Memoires de l'Acad. de Chir. de Paris, Tome V.); und wenn es sie nicht zertheilt, muß der Augapfel abgeschnitten werden. — Die Knochengeschwülste, welche in dem vordern Theile der Augenhöhle befindlich sind, kann man zuweilen entblößen, und durch das glühende Eisen oder durch ein Esmittel zur Exfoliation bringen. Diejenigen aber, welche tief und hinten liegen, machen, wenn sie nicht etwa dem Gebrauche des Quecksilbers, oder des decocti mezeraei weichen, die Ausrottung des Augapfels zuletzt nothwendig. — Der Absceß in der Augenhöhle muß geöffnet werden, worauf sich der Augapfel gemeiniglich von sich selbst zurückziehet (Pellier). — Die Balggeschwülste lassen sich selten auf die gewöhnliche Art ausrotten. Am besten öffnet man sie, drückt die enthaltene Materie aus, und sondert so wie im vorhergehenden (Anfangsgründe I Band S. 500) gesagt worden ist, den leeren Sack sogleich oder nach einigen Tagen ab, und zieht ihn aus. Der Sack ist immer bloß durch die Conjunctiva bedeckt. Dem Schnitte giebt man eine horizontale oder senkrechte Richtung, je nach dem der Augapfel auf dem

Schlaf-

Schlafbeine oder auf der Backe liegt, damit man nicht etwa den nahen Augenmuskel quer durchschneidet.

S. 410.

Sobald die Ursache gehoben ist, die den Augapfel aus der Augenhöhle gedrückt hat, muß derselbe zurück gebracht werden. Bey diesem Geschäfte findet der Wundarzt in diesem Falle, wo der Augapfel gemeinlich eine Zeitlang außer der Augenhöhle gelegen hat, zuweilen einige Schwierigkeit. Oft ist er genöthigt ihn mittelst einer schicklichen Binde allmählig zurückzudrücken. — Und dennoch erhält er auch in diesem Falle gar oft die Sehkraft wieder; und erhält er sie nicht von freyen Stücken, so muß der Wundarzt sie ihm durch die reizenden und stärkenden Nervenmittel, die im Kapitel vom schwarzen Staare werden angezeigt werden, wieder zu verschaffen suchen.



Das dreyzehnte Kapitel.

Von der Ausrottung des Augapfels.

S. 357.

Die Ausrottung des Augapfels findet in mancherley Fällen, z. E. bey einem Vorfalle des Augapfels, der nicht zurückgebracht werden kann; bey einem erulcerirten Staphylom, und überhaupt in allen Fällen statt, wo die Säfte und Häute des Auges dergestalt verdorben sind, daß sie nicht zu ihrer natürlichen Beschaffenheit wieder hergestellt werden können, und den Fehler, womit sie behaftet sind, leicht der Augenhöhle mittheilen. Der vorzüglichste Fall aber, der die Ausrottung des Auges erfordert, ist der Krebs am Auge.

S. 412.

Das Auge kann sich auf eine dreyfache Art in einem krebshaften Zustande befinden. Zuweilen wird der Augapfel ungleich, und knotig, und schwillt oft bis zur Größe eines Apfels auf; daß Gesicht verliert sich allmählig, die Blutgefäße im weißen des Auges schwellen auf, die ganze innere und äußere Bildung des Augapfels verliert sich dergestalt, daß das Auge innerlich und äußerlich einem Stücke Fleisch gleicht, und kein Ueberbleibsel der natürlichen Organisation mehr zu finden ist. Zuweilen bemerkt man

man äußerlich noch einen Rest von der durchsichtigen Hornhaut. Innerlich findet man zuweilen noch eine kleine Höhle, worinnen man Ueberreste von der gläsernen Feuchtigkeit und der Choroida bemerkt. Zuweilen dringt eine gauchichte Feuchtigkeit aus dem Augapfel, und innerlich ist eine exulcerirte Höhle. Zuweilen ist nicht eine Spuhr von Exulceration zu finden, und der Augapfel gleicht durch und einem etwas harten Fleische. Gemeinlich empfindet der Kranke anfangs erträgliche brennende, zuletzt heftige stechende Schmerzen im Auge, die sich allmählig durch den halben Kopf erstrecken. Die Ursach dieser Zufälle ist selten mit Gewißheit zu bestimmen. Einigemal hat man sie nach den Blattern (Vogels Wahrnehmungen) entstehen sehen. — Dies ist die vorzüglichste und häufigste Gattung des Augenkrebses.

S. 413.

Zuweilen erzeugen sich auf der vordern Ueberfläche des Augapfels, am häufigsten auf der durchsichtigen Hornhaut Auswüchse, die durch das Messer, die Unterbindung, oder das Esmittel manchmal gründlich gehoben werden. Zuweilen aber wachsen sie nach den Gebrauche dieser Mittel jedesmal von neuem wieder, werden immer breiter, bößartiger, ja krebshaft, verwandeln sich zuletzt in ein schwammichtes Gewächs, das sehr schmerzhaft ist, die ganze vordere Ueberfläche des Augapfels einnimmt, und die Außerrottung des Augapfels erfordert. — Die zweyte Gattung des Krebses am Auge. — Bey mancherley Gelegenheiten, wovon
viele

viele bereits im vorhergehenden angezeigt worden sind, erzeugen sich Geschwüre auf der vordern Ueberfläche des Augapfels, die zwar zuweilen durch innere und äußere Arzneymittel geheilt werden, zuweilen aber äußerst hartnäckig sind, das Gesicht gänzlich vernichten, und bössartig werden, daß man sie allenfalls krebshaft nennen kann. Der dritte krebshafte Zustand des Augapfels, der die Ausrottung desselben nothwendig macht.

§. 414.

Bei jedem dieser krebshaften Zufälle findet eine dreynfache Kurart statt. Man entdeckt nämlich deutlich eine bestimmte besondere Ursach, und wendet Mittel an, die dieser angemessen sind; oder man siehet auf den bössartigen Charakter des Zufalles, und wendet Mittel an, die im Allgemeinen gegen bössartige krebshafte Krankheiten empfohlen werden; oder man rottet, wenn beyderley Mittel nichts fruchten, das Auge aus. Es scheint, daß der sogenannte Krebs am Auge bey weitem nicht so bössartig ist, als der Krebs an der Brust; denn gemeiniglich verschafft die Operation eine gründliche Heilung, so lange sich der Schaden nur auf den Augapfel einschränkt, und sich noch nicht bis in die Augenlider, oder das Zellgewebe, oder die Knochen der Augenhöhle erstreckt hat. Alles kommt daher darauf an, die Operation bey Zeiten zu unternehmen; und man kann sich desto leichter dazu entschließen, da in allen diesen Fällen das Gesicht unwiderbringlich verlohren ist.

S. 415.

Bey der Operation kommt es vorzüglich auf zweyerley an; nämlich erstlich: daß man alles sorgfältig wegnimmt, und nichts zurück läßt, was schadhafft oder verdächtig ist; und zweytens, daß man sich hütet die Weinhaut und Knochen der Augenhöhle zu verletzen. Die Weinhaut stehet in so genauer Verbindung mit der harten Hirnhaut, daß Verletzungen derselben ihre Folgen leicht bis auf die harte Hirnhaut ausbreiten können; und die Knochen der Augenhöhle sind an den meisten Stellen so dünn, daß sie nicht ohne Verletzung des dahinten liegenden Gehirns durchbohret oder zerbrochen werden können. Immer ist es daher nöthig, daß die Instrumente, deren man sich zur Ausrottung des Augapfels bedient, abgerundete Spitzen haben. Bey der Operation steht der Wundarzt vor dem Kranken, der auf einem Stuhle von bequemer Höhe, mit hoher Rücklehne, damit er den Kopf nicht zurückziehen kann, sitzt. — Um die Augenlider, die gemeiniglich sehr angespannt oben und unten am Augapfel liegen, weit genug aus einander ziehen zu können, durchschneidet er zuerst ihre Vereinigung im äußern Augenwinkel einen halben oder ganzen Zoll lang. Ein Gehülfe faßt das obere Augenlid mit einer Zange, und ziehet es so hoch als möglich herauf an die Stirne. Darauf ziehet der Wundarzt mittelst einer gewöhnlichen Hefnadel einen starken Faden von dem einen Augenwinkel zu dem andern durch den Augapfel, um während der Operation denselben seinen Absichten gemäß nach der einen oder andern Seite hin ziehen und bewegen zu können.

S. 416.

Gemeiniglich bedient man sich zu dieser Operation eines auf die flache Seite gebognen Scalpels, und einer ähnlichen Scheere; und es ist nicht zu leugnen, daß man mit diesem Werkzeugen die Theile neben und hinter dem kugelförmigen Augapfel bequemer durchschneiden kann, als mit einem geraden Instrumente dieser Art. Indessen ist dennoch in manchen Fällen die Operation auch mit einem geradem Messer gar leicht zu bewerkstelligen. Gewöhnlich pflegt man zuerst mit dem Scalpel die Verbindung des Augapfels mit den Augenlidern mittelst der Conjunctiva, oben und unten, und dann mit der gebognen Scheere den Nerven und die Muskeln bald oberwärts, bald unterwärts, bald seitwärts, je nachdem man sich hier oder da mehr Raum schaffen kann, zu durchschneiden, und während dieser Handgriffe den Augapfel mittelst des Fadens nach verschiedenen Seiten, z. E. herunterwärts zu ziehen, wenn man oberwärts schneidet, um sich immer da, wo man schneidet, so viel als möglich Raum in der Augenhöhle zu schaffen. Indessen kann man der Scheere gar wohl entbehren, und die ganze Operation sehr bequem bloß mit dem Scalpel verrichten. Da auch der widernatürliche große Augapfel mehrentheils stark auf der Backe liegt, und es oft sehr schwer ist zwischen den Augapfel und den untern Augenlide mit dem Messer in die Augenhöhle zu gelangen, wird man oft die Operation auf eine leichtere Art verrichten, wenn man zuerst das obere Augenlid vom Augapfel ablöst, dann von oben herab tiefer in die Aug-

höhle dringt, die Muskeln oberwärts und seitwärts, und die Verbindung des Augapfels mit dem untern Augenlide ganz zuletzt durchschneidet. Dies geschieht desto leichter, weil man den Augapfel immer mit dem Faden leicht herunterwärts ziehen, und sich folglich oberwärts Platz schaffen kann; bey weitem aber nicht so leicht umgekehrt; d. i. den Augapfel aufwärts ziehen kann, um sich unterwärts Raum zu schaffen. So lange der Augennerve nicht durchschritten ist, darf man den Augapfel nicht zu stark hervor ziehen.

S. 417.

Sobald der Augapfel völlig abgeldst ist, muß der ganze innere Umfang der Augenhöhle mit dem Finger sorgfältig untersucht, und alles was sich hart anfühlt, behutsam abge sondert werden. Zuweilen muß das obere oder untere Augenlid weggeschnitten werden, wenn sie Antheil an der Krankheit des Augapfels genommen. Vorzüglich thut man wohl, wenn man jederzeit die Thränendrüse mit austrottet, denn diese scheint oft Gelegenheit zu den schwammichten Auswüchsen zu geben, die nach der Operation so sehr zu fürchten sind. So sorgfältig man aber auch bey der Absonderung dieser Theile verfährt, ist dennoch der Erfolg der Operation immer sehr zweifelhaft, wenn sich die Krankheit außerhalb dem Augapfel bis auf die nahen Theile erstreckt. Die Blutung ist selten von Bedeutung, und steht gemeinlich, sobald die Augenhöhle mit Charpie angefüllt ist. Auch die Zufälle der Entzündung und des Fiebers sind

sind selten so heftig, daß sie außer einer antiphlogistischen Diät und täglichen gelinden Leibesöffnung Besondere entzündungswidrige Mittel erforderten.

S. 418.

Während der Exterung füllt sich die Augenhöhle allmählig mit einem jungen gesunden Fleisch an, dessen Erzeugung und Anwuchs der Wundarzt, nach den Regeln, die bey der Heilung der einfachen Wunden überhaupt zu beobachten sind, dirigiren muß. Selten findet nach erfolgter Heilung der Gebrauch eines künstlichen Auges statt. Die Schuld liegt vorzüglich an den Augenlidern, welche während der Heilung gemeiniglich ganz zusammenschrumpfen, und am Ende gleich ein paar Falten am obern und untern Rande der Augenhöhle liegen. Man kann zwar dieses Zusammenschrumpfen zu verhindern suchen, und in der Absicht bey jedem Verbande, nachdem die Augenhöhle mit Charpie angefüllt ist, die Augenlider zusammenziehen, und mit Heftpflastern in der Ausdehnung erhalten, und an einander befestigen; dennoch aber wird man am Ende gemeiniglich finden, daß die Einlegung eines künstlichen Auges unthunlich ist.

S. 419.

Zuweilen ist das junge Fleisch, welches sich in der Augenhöhle erzeugt, bleich und schlaff, und erfordert den Gebrauch gelinde zusammenziehender Mittel, z. E. das lap. calamin. pulv. myrrh. alum. ust. u. s. w. — Zuweilen wird es schwammicht und

bösartig, und dann muß es abgeschnitten, oder geätzt werden. Zuweilen erscheint es immer von neuem wieder, und verursacht zuletzt den Tod. — Zuweilen entsteht ein halbes Jahr und länger nach völlig vollendeter Heilung ein schwammichter Auswuchs, der sich nicht tilgen läßt, und den Tod verursacht. — Manchmal entstehen einige Tage oder Wochen nach der Operatiou (Möhrenheim, Beobachtungen, 2 Band) Kopfschmerzen, Erbrechen, Uebelkeiten, Nasereyen und der Tod. Man fand in einem solchen Falle, daß sich der Krebschaden durch den Augennerven ins Gehirn erstreckt, und dieses verhärtet, und exulcerirt hatte.



Das vierzehnte Kapitel.

Vom schwarzen Staare.

S. 420.

Der schwarze Staar, (amaurosis, gutta serena) ist eine Blindheit, die wenn man nicht bloß der Versicherung des Kranken, daß er nicht sehen kann, trauen will, bey weitem nicht immer so leicht und gewiß zu erkennen ist, als man glaubt. Beynahe alle angebliche Zeichen dieser Blindheit sind trüglich und unzuverlässig. Gemeiniglich sagt man, daß die Pupille eines amaurotischen Auges widernatürlich ausgedehnt, und unbeweglich sey, und ihre natürliche Durchsichtigkeit und Schwärze habe. So ist sie wirklich in vielen Fällen; aber bey weitem nicht in allen. Nicht selten hat die Pupille bey dem vollkommensten und unheilbarsten schwarzen Staare ihre natürliche Größe, zuweilen ist sie sogar widernatürlich enge und zusammengezogen. Mehrentheils zwar, aber bey weitem nicht immer, ist sie unbeweglich; sie hat zuweilen nicht allein ihre natürliche, sondern sogar manchmal gleichsam eine widernatürlich starke Beweglichkeit, so daß sie sich bey einem mäßigen Lichte ungewöhnlich stark zusammen ziehet, und beynahe gänzlich schließt.

Dd 4

S. 421.

S. 421.

Und von diesem verschiedenen Zustande der Pupille eines amaurotischen Auges läßt sich nichts gewisses auf die jedesmalige Natur und Beschaffenheit der Krankheit schließen. Man kann nämlich die Beweglichkeit und Unbeweglichkeit der Pupille nicht als ein gutes oder böses Zeichen bey dieser Krankheit betrachten. Zuweilen ist ein schwarzer Staar mit widernatürlich erweiterter und ganz unbeweglicher Pupille heilbar; zuweilen zeigt er sich unheilbar, obgleich die Pupille beweglich, und von natürlicher Größe ist. Es giebt sogar Fälle, wo während der Kur dieser Krankheit die Pupille ihre verlorrne Beweglichkeit wieder erhält, und das Gesicht dennoch auf keine Art wieder hergestellt wird.

S. 422.

Selten hat die Pupille eines mit dem schwarzen Staare behafteten Auges die reine glänzende Schwärze eines gesunden Auges; mehrentheils hat sie eine matte, gläserne, hornfarbige Schwärze, die allein schon oft dem geübten Arzte die Krankheit verräth. Zuweilen fällt die Farbe der Pupille ins grünliche. Zuweilen ist sie neblicht, bleich, rauchrich, so daß man die Krankheit allenfalls für einen anfangenden grauen Staar halten könnte. Ein Irthum, den der ungeübte Arzt wirklich zuweilen begeht, den man aber vermöge folgender Zeichen leicht vermeiden kann. Die Trübheit ist nämlich nicht nahe hinter der Pupille in der Gegend der KrySTALLINSE, sondern oft ganz deutlich tiefer hinten im Auge;

Auges; auch steht sie nicht mit der geminderten Sehkraft in Verhältniß. Der Kranke ist stockblind, die Trübheit aber so geringe, daß sie, wenn sie von einer Verdunkelung der Krystalllinse herrührte, höchstens nur ein schwaches neblichtiges Gesicht veranlassen könnte. — Schwerer ist es diesen Irrthum zu vermeiden, wenn ein anfangender schwarzer Staar mit dieser Trübheit verbunden ist, und folglich der Grad der geminderten Sehkraft in einigen Verhältnisse mit dem Grade der Trübheit der Pupille zu stehen scheint. Indessen kann man auch in diesem Falle die wahre Beschaffenheit der Krankheit gemeiniglich daraus errathen, daß der Kranke zwar ein schwaches, aber nicht ein rauchrichtes und neblichtiges Gesicht hat; welches er haben müßte, wenn die Trübheit von einer anfangenden Verdunkelung der Krystalllinse herrührte. Nicht zu gedenken, daß man gemeiniglich allerhand andre Zufälle bemerkt, die bloß dem schwarzen Staare eigen sind.

S. 423.

Zuweilen erblickt man in einer großen Entfernung hinter der Pupille das innere des Auges ganz weiß. Man sieht eine concave weiße Fläche, auf der man sogar ganz deutlich Blutgefäße unterscheidet. Diese weiße Ueberfläche erstreckt sich zuweilen durch den ganzen hintern Theil des Auges, zuweilen aber nur durch die Hälfte, oder einen kleinern Theil desselben. Man glaubt die retina selbst zu sehen. Und in der That scheint sie es wirklich zu seyn. Es scheint, daß diese anfangs neblichte und trübe zuletzt

ganz weiße Farbe tief im Auge von der retina her: rührt, die in diesem Falle ihre natürliche Durchsichtigkeit (Haller Element. physiol. Tom. V. p. 469.) verliert, und äußerlich sichtbar wird.

S. 424.

Nur ein Symptom giebt es, das von dem schwarzen Staare unzertrennlich ist; der Kranke nämlich schießt. Er wendet nicht allein ein einzelnes Auge, nicht nach dem Gegenstande, den man ihm zeigt, dergestalt hin, daß sich dieser Gegenstand in der Schaxe dieses Auges befindet: sondern er wendet auch nie beyde Augen auf einen und eben denselben Gegenstand. Das einzige Zeichen, worauf man sich in denen Fällen verlassen kann, wo man der Versicherung des Kranken, daß er nicht sehen kann, nicht trauen darf.

S. 425.

Der schwarze Staar entsteht unter sehr verschiedenen Zufällen, und auf eine sehr mannigfaltige Art. Es ist wahrscheinlich, daß diese Verschiedenheit der Entstehungsart eine Verschiedenheit der Hauptursache der Krankheit zum Grunde hat, und eine Verschiedenheit in der Kurmethode anzeigt. Zuweilen wird der Kranke plötzlich blind, zuweilen nimmt das Gesicht so langsam ab, daß Monate, ja Jahre verstreichen, ehe die Krankheit den höchsten Grad erreicht. — Zuweilen fängt sich der Staar unter allerhand Zufällen an, die eine vermehrte Empfindlichkeit des Auges, oder einen Reiz, der aufs Auge wirkt,

wirkt, zu verrathen scheinen. Die Kranken sehen in mäßig hellen Orten gut und deutlich; an einem sehr hellen Orte schlecht, ja gar nicht. Das Auge ist zuweilen so empfindlich, daß es thränt und schmerzhaft wird, wenn ein starkes Licht in dasselbe fällt. Kranke dieser Art müssen, ob sie gleich beynahe, und manchmal wirklich stockblind sind, einen Lichtschirm tragen. — Zuweilen entsteht der schwarze Staar unter den Zufällen einer Schwäche und verminderten Empfindlichkeit. Dem Kranken ist das Gesicht neblig, er siehet besser im hellen als im dunkeln; es ist ihm zu Muthe, als wenn Schmutz und Unreinigkeit vor dem Auge wäre, weswegen er die Augen oft wischt. Er hat mehr Sehkraft, wenn er gegessen und getrunken hat, als wenn er nüchtern ist. Er sieht nach dem Gebrauche äußerlicher stärkender Mittel, z. E. des Salmiakgeistes, des kalten Wassers u. s. w. jedesmal eine kurze Zeit etwas deutlicher. Ein Mann, der beynahe stockblind war, sah jederzeit eine Stunde lang hell und deutlich, wenn er Champagnerwein trank. Eine Frau, die bereits stockblind war, verschafte sich eine Zeitlang das Gesicht immer dadurch auf eine halbe Stunde wieder, daß sie in ihrem Garten einigemal schnell auf und abging. Eine Dame, die bereits einige Jahre lang blind war, erhielt das Gesicht auf einige Augenblicke wieder, als sie sich einen Zahn ausziehen ließ.

S. 426.

Zuweilen scheinen die Zufälle eine widernatürliche Anhäufung der Feuchtigkeiten im Auge anzuzeigen.

zeigen. Die Kranken beklagen sich über eine Spannung im Augapfel, die ihnen zuweilen sehr lästig ist. So oft diese Empfindung sehr stark ist, ist das Gesicht sehr schwach; und läßt sie nach, so ist das Gesicht wieder besser. Der Augapfel fühlt sich hart an, und scheint manchmal wirklich aufgeschwollen zu seyn, so daß sich das Auge manchmal dem Zustande einer Augenwassersucht nähert. Wann mit dem schwarzen Staare der graue verbunden ist, findet man bey der Operation des letztern die gläserne Feuchtigkeit zuweilen widernatürlich dünn, so wie sie gemeiniglich in einem wassersüchtigen Zustande ist. — Zuweilen sind die Blutgefäße der Conjunctiva aufgeschwollen; der Kranke sieht schwarze Punkte, nezförmige Gestalten, Striche, schlangenförmige und allerhand andre schattige Figuren. Es scheint bey nahe, daß in diesem Falle die Blutgefäße der retina und choroidea in einem eben so varicosen Zustande sind, als die Gefäße der Conjunctiva, und die retina drücken. Die Blutung aus dem innern Auge, die zuweilen nach der Operation des grauen Staars der mit dem schwarzen verbunden ist, entsteht, macht es sehr wahrscheinlich, daß diese Gefäße sich wirklich zuweilen in einem solchen varicosen Zustande befinden.

S. 427.

Zuweilen scheint ein Reiz außs Auge zu wirken: die Kranken sehen allerhand Gestalten von verschiedenen Farben, die sich bewegen; vorzüglich glänzende, feurige Funken, Flammen, Strahlen. — Zuweilen entsteht der Staar unter heftigen, und anhaltenden

den Augenentzündungen und Kopfschmerzen. — Einige Kranke haben vor der Krankheit öftere Anfälle von Schnupfen, die sich verliehren, sobald der Staar entsteht. Die Nase wird alsdann ungewöhnlich trocken. Eine Kranke dieser Art, die bereits stockblind war, bekam einigemal das Gesicht auf eine kurze Zeit wieder, als ein starker schnupfenartiger Ausfluß aus der Nase von freyen Stücken entstand. — Eine genaue Aufmerksamkeit auf diese verschiedenen Zufälle während der Entstehung der Krankheit leitet oft den Wundarzt in der Wahl der Kurmethode, wenn alle andre Kuranzeigen ihn verlassen.

S. 428.

Gemeiniglich ergreift die Krankheit beyde Augen zu gleicher Zeit. Und wenn sie ja zuweilen nur eines des Gesichts beraubt, bleibt dennoch das andre selten lange fehlerfrey. Mehrentheils erstreckt sich die Krankheit über das ganze Auge, zuweilen nur über die Hälfte (*amaurosis dimidiata*) desselben. Im ersten Falle ist der Kranke ganz blind; im zweyten sieht er die Gegenstände nur halb. Zuweilen scheint sich die Krankheit nur auf eine einzelne kleine Stelle im Auge einzuschränken; der Kranke sieht alsdann einen einzelnen schwarzen unbeweglichen Flecken (*scotoma*). Auch diejenigen, die völlig blind sind, haben zuweilen (*Hey, Med. Obs. and Enquir. Vol. V.*) noch eine kleine Stelle im Auge, gemeiniglich zur einen oder andern Seite, die gegen das Licht noch empfindlich ist. Bey einem Manne (*Chir. Bibl. 4 Band, S. 59*) der übrigens stockblind war, war diese Stelle

Stelle schief über der Nase befindlich, und so klein, daß er jedesmal lange suchen mußte, ehe er sie fand; aber auch so empfindlich, daß er nicht allein das Licht, sondern auch andre nahe Gegenstände, ja sogar die Spitze eines ziemlich entfernten Thurms, auf derselben sehen konnte. Ueberhaupt scheint die Mitte des Auges bey dem schwarzen Staare zuerst und am meisten zu leiden: denn die meisten Kranken, die einen anfangenden, oder noch nicht vollendeten schwarzen Staar haben, sehen immer die Gegenstände zur Seite besser, als diejenigen, die gerade vor ihnen sind.

S. 429.

Zuweilen ist der schwarze Staar eine intermittirende Krankheit: er erscheint nämlich und verschwindet wechselsweise. Zuweilen erscheint er immer zu gewissen Zeiten, gewöhnlich alle Tage zu einer gewissen Zeit, zuweilen einen Tag um den andern, manchmal auch wohl alle Monate um eine gewisse Zeit; und dann ist er periodisch. Zuweilen geschehen die Anfälle der Krankheit zu ungewissen Zeiten. Zuweilen ist mit der Blindheit noch eine andre Krankheit verbunden. — Ein Mann wurde alle Tage um 12 Uhr blind; zugleich fiel jederzeit das obere Augenlid gelähmt herab. Der Anfall dauerte jedesmal 24 Stunden. Des andern Tages um Mittag bekam er das Gesicht, und das Vermögen das Augenlid aufzuheben plößlich wieder, und blieb gleichfalls 24 Stunden sehend. Als er China nahm verdoppelte sich die Krankheit, d. i. er war jedes-

jedesmal 48 Stunden blind, und 24 Stunden sehend. Bey einem andern Kranken färbte sich während dem Anfalle der Blindheit jedesmal die wässerichte Feuchtigkeit, und ward bleich und trübe; jedesmal nach dem Anfalle wurde sie wieder klar und helle. Gemeiniglich liegt bey dem periodischen Staare, ein gastrischer Reiz, oder ein Wurmreiz, oder eine Unordnung in der monatlichen Reinigung zum Grunde. Zuweilen ist diese periodische Blindheit ein verstecktes kaltes Fieber (*febris intermittens larvata*): zuweilen ist sie ein Symptom eines offenkundigen kalten Fiebers. Der Kranke hat nämlich ein gewöhnliches kaltes Fieber, und wird während dem Paroxysmus jedesmal blind, und nach demselben wieder sehend.

S. 430.

Daß das unmittelbare Organ des Gesichtes bey dieser Krankheit zunächst leidet, kann keinem Zweifel unterworfen seyn. Die Frage aber, welches das unmittelbare Organ des Gesichtes sey, die retina, oder choroidea? ist dem praktischen Wundarzt, der vorzüglich auf die entfernten Ursachen bey der Kur Rücksicht nimmt, von weniger Wichtigkeit. Indessen ist es sehr wahrscheinlich, daß der Nerv, der das unmittelbare Organ der Empfindung andrer Theile ist, auch die Hauptquelle der Sehkraft ist, und bey dem schwarzen Staare zunächst und vorzüglich leidet: und daß folglich die nächste Ursach des schwarzen Staars eine Lähmung des Sehnerven und der retina ist. Dies ist desto wahrscheinlicher, da eben die Ursachen, welche den schwarzen Staar veranlassen, auch die gewöhn-

gewöhnlichen Ursachen der Lähmungen anderer Theile sind; da dieselbe Kurart, welche man bey Lähmungen anderer Theile anwendet, auch bey dem schwarzen Staare gewöhnlich angewendet wird.

S. 431.

Selbst die mannichfaltigen, schattigen, schwarzen, gefärbten, glänzenden und feurigen Gestalten, die Kranken dieser Art, so oft vor den Augen schweben, machen es wahrscheinlich, daß die Krankheitsursache des schwarzen Staars zunächst auf den Augennerven und die retina wirkt. Und die bleiche, weiße Farbe, die man nicht selten im Hintergrunde amaurotischer Augen wahrnimmt, läßt sich bloß von der retina herleiten, und scheint eine Krankheit derselben anzuzeigen. Auch hat man den Augennerven zuweilen wirklich in einem widernatürlichen Zustande, z. E. welk; und zusammengeschrumpft gefunden. Man hat Wasserblasen, Steine, Verhärtungen anderer Art nahe am Sehnerven bey der Zergliederung solcher Kranken gefunden. — Der dünne aufgelöste Zustand, in welchem man die gläserne Feuchtigkeit bey dem schwarzen Staare zuweilen findet, ist wohl bloß eine Folge, nicht eine Ursache der Krankheit. Und wie kann man sich wundern, daß die vorzüglichste Feuchtigkeit des Auges widernatürlich beschaffen ist, da die vorzüglichsten Häute des Auges schadhast sind.

S. 432.

Man kann die entfernten Ursachen des schwarzen Staars bequem in drey Hauptklassen theilen, und
nach

nach der Verschiedenheit dieser Klassen eine dreyfache allgemeine Kurmethode des schwarzen Staars bestimmen. Die Ursachen der ersten Klasse scheinen durch eine widernatürliche Anfüllung und Ausdehnung der Gefäße im Gehirn, oder Sehnerven, oder in der retina, und einen dadurch erregten Druck auf diese Theile, die Berrichtung des Sehnerven und der retina zu hindern, und zur Kur Ausleerungen und Ableitung der Feuchtigkeiten vom Kopfe vorzüglich anzuzeigen. So erregt ein hoher Grad von Vollblütigkeit, zumal wenn sich der Kranke erhitzt, oder den Kopf stark niedersenkt, schwarze Flecken vor den Augen, ja eine völlige Blindheit. Ein Vollblütiger, der den Othem an sich hält, und eine weisse Band ansieht, erblickt ein Netzgewebe, das mit jedem Pulschlage abwechselnd erscheint, und verschwindet, und wahrscheinlich von der Anfüllung der Blutgefäße der retina herrührt. Ein Mann wurde jedesmal blind, so oft er sich berauschte (Börhaave) und wieder sehend, sobald der Rausch vorüber war.

S. 433.

Unterdruckte gewohnte Blutausleerungen, ein gestopftes Nasenbluten, ein übergangnes gewohntes Aderlaß, die Verstopfung der monatlichen Reinigung, der geheminte Hämorrhoidalfluß, häufige Ursachen des schwarzen Staars, erregen die Krankheit wahrscheinlich auf diese Art. Eben so, eine starke Anstrengung der Kräfte, wodurch augenscheinlich ein heftiger Trieb der Säfte nach dem Kopfe veranlaßt wird. Ein Mann ward plötzlich blind, indem er

Richt. Wundarzneyk. III. B. E e eine

eine schwere Last eine Treppe heraufstrug. Ein Mann verrichtete drey Tage nach einander schwere Arbeiten, mit starker Anstrengung der Kräfte, und war am Ende des dritten Tages blind. Gebärende werden auf ähnliche Art zuweilen während der Geburtsarbeit blind. Ein Mann verlor das Gesicht während einem heftigen Erbrechen. Nicht selten geschieht es, daß Soldaten auf forcirten Märschen bey heisser Witterung plötzlich blind werden (Schmucker). Am meisten lauft man Gefahr durch heftige Anstrengung der Kräfte das Gesicht zu verlieren, wenn man dabey vollblütig oder erhitzt ist, und den Körper vorwärts beugt, und den Kopf niedersenkt.

S. 434.

Wahrscheinlich gehört zu dieser Klasse auch die Blindheit, die durch äußere Kopfverletzungen, vornehmlich solche, die mit einer starken Erschütterung verbunden sind, erfolgen. Ein Mann, der einen heftigen Backenstreich empfing, ward auf der Stelle blind. Es ist glaublich, daß eine solche Erschütterung zuweilen eine atonia der Blutgefäße veranlaßt, deren Folge Ausdehnung, Anschwellung und Druck auf die nahen Nerven ist. — Der schwarze Staar, der zuweilen während einer heftigen Augenentzündung, oder auch während eines hitzigen inflammatorischen Fiebers entsteht, ist vermuthlich auch von dieser Art. — Auf ähnliche Art vermuthlich werden diejenigen zuweilen blind, die sich mit entblößtem Kopfe einer heftigen Sonnenhitze aussetzen. — Die Diagnostik dieser ersten Gattung des schwarzen Staars grün.

gründet sich auf die Kenntniß der vorhergehenden entfernten Ursachen, die mehrentheils desto deutlicher und leichter in die Augen fallen, da ihre Wirkung, die Blindheit, gewöhnlich schnell erfolgt.

§. 435.

Die Ursachen der zweyten Klasse schwächen den ganzen Körper, oder blos das Auge, und zeigen den Gebrauch allgemeiner, oder örtlicher stärkender Mittel an. Im ersten Falle ist der schwarze Staar ein Sympton einer allgemeinen großen Entkräftung des ganzen Körpers; im zweyten Falle ist er blos eine örtliche Krankheit. Eine jede große allgemeine Entkräftung des ganzen Körpers, sie entstehe von welcher Ursache sie wolle, kann eine Blindheit zur Folge haben. Sie ist zuweilen die Folge eines starken anhaltenden Durchfalls, einer heftigen Cholera, eines starken Blutverlusts, einer unmäßigen Salivation gewesen. Eine Frau ward blind, indem man ihr das Wasser der Bauchwassersucht plötzlich ausleerte. Keine allgemeine entkräftende Ursache aber wirkt so oft, und so stark auf die Augen, und erregt wirklich den gänzlichen Verlust des Gesichts so oft, als frühe und unmäßige Ausschweifungen in der Liebe.

§. 436.

Die Ursachen der örtlichen Schwäche der Augen sind verschieden. Nichts schwächt das Auge mehr, als das sehr aufmerksame, langanhaltende Anschauen eines kleinen Gegenstandes mit unverwandten Augen. So aufmerksam und lange man auch Gegenstände

Ee 2

anschauet,

anschauet, leidet dennoch das Auge bey weitem nicht so sehr, wenn man nur den Gegenstand oft verändert. Destere Veränderung des Gegenstandes, den man anschaut, stärkt und erquickt sogar das Auge. Noch mehr leidet das Auge, wenn man einen solchen Gegenstand nur mit einem Auge betrachtet, wie z. E. bey dem Gebrauche der Fern- und Vergrößerungsgläser geschiehet: denn immer erweitert sich, wenn ein Auge geschlossen wird, die Pupille des offenen Auges über ihren natürlichen Durchmesser, und läßt ungewöhnlich viel Licht ins Auge fallen. Am meisten leidet das Auge wenn man auf eben bemeldete Art stark erleuchtete, hellgefärbte, oder glänzende Gegenstände betrachtet. Diejenigen betrügen sich gar sehr, welche glauben, daß sie ihre Augen schonen, wenn sie den Gegenstand, welchen sie z. E. des Abends sehen wollen, durch mehrere Lichter, oder durch eine Lampe erleuchten, die alle Lichtstrahlen der Flamme aufhängt, sammelt, und auf den Gegenstand zurückwirft, den sie anschauen. Ein Mann verlor das Gesicht, der mitten im Winter bey hellem Sonnenschein in einer beschneiten Gegend eine Reise zu Pferde machte. Ein Mann verlor durch einen Blitzstrahl, der des Nachts das Zimmer, in welchem er sich befand, plötzlich erleuchtete, das Gesicht. Ein anderer wurde blind, indem er in tiefes Nachdenken versenkt des Nachts einige Minuten lang gerade in den Vollmond sahe. — Es ist wahrscheinlich, daß die Erschütterung des Kopfs durch eine äußere Gewalt zuweilen unmittelbar auf die Nerven wirkt, und diese schwächt, ja gänzlich lähmt.

S. 437.

Die Ursachen der dritten Klasse sind Reize, die auf eine unerklärbare Art unmittelbar oder wahrscheinlich mehrentheils mittelbar dergestalt auf den Augennerven wirken, daß sie ihn unempfindlich gegen das Licht machen. Am allerschäufigsten liegen diese Reize in den Eingeweiden des Unterleibes verborgen, von da sie consensualisch aufs Auge wirken. Es ist ohne Widerrede wahr, daß das die häufigste Gattung des schwarzen Staars ist, die von gastrischen Reizen herrührt. Mehrentheils ist derselbe atrabilarischer Art. Gar oft wird man hören, daß Kranke dieser Art anhaltenden Kummer, langwierige Betrübniß, und öfters Anlaß zum Verdruß, Zorn, und zu andern Leidenschaften gehabt haben, die die Galle verderben, und atrabilarische Schärfe und Stockungen erzeugen. Ein Mann wurde wenige Stunden nach einem heftigen Zorne blind, und den Tag drauf durch ein Brechmittel, welches viele Galle ausleerte, wieder sehend. Eine Frau (Whytt) verlor jedesmal das Gesicht, so oft sie mit Säure im Magen beschwert war. Zuweilen entsteht der schwarze Staar nach übelgeheilten kalten Fiebern, nach dem Fleckfieber, nach heftigen Koliken, nach einem gestopften Durchfalle, u. s. w. lauter Fälle, wo wahrscheinlich zurückgehaltne gastrische Schärfe die Ursach der Krankheit sind. Würmer sind eine häufige Ursache des schwarzen Staars. — Der intermittirende schwarze Staar ist gemeiniglich gastrischen Ursprungs.

S. 438.

Außer diesen gastrischen Reizen, giebt es noch sehr viel andre, die zuweilen auf die Augen wirken, und Blindheit erregen. Unter diesen ist die Sichts- materie eine der merkwürdigsten. Ein schwarzer Staar entstand nach einem zurückgetretenen Podagra, nach einem zurückgetriebnen Rheumatismus, nach einer übelbehandelten Krätze, nach einem ausgetrockneten bösen Kopfe. Eine Dame vom Tanz erhitzt, und im Schweiß ging des Nachts in den Garten, erkältete sich, und war des Morgens stockblind. Ein altes Geschwür, das man unvorsichtig trocknete, veranlaßte den schwarzen Staar. So auch ein weißer Fluß, der gestopft wurde. Das venerische Gift ist eine häufige Ursach des Staars. Der Staar, der zuweilen am Ende hitziger Fieber erfolgt, rührt wahrscheinlich von einem Absatze der kritischen Materie her. Ein heftiges Schrecken, das so oft den schwarzen Staar veranlaßt hat, scheint bloß als ein Reiz zunächst auf die Nerven zu wirken. Zuweilen ist es sogar bloß ein mechanischer Reiz, der die Blindheit erregt. Einem Mann traf eine kleine Schrotkugel das rechte Auge, welche durchs obere Augenlid drang, und im obern Theile der Augenhöhle zwischen dem obern Augenlide und dem Augapfel liegen blieb, so daß man sie äußerlich fühlen konnte. Kurze Zeit darauf ward er auf dem linken Auge blind: und als nachher die Kugel ausgeschnitten wurde, wieder sehend.

S. 439.

S. 439.

Zuweilen scheint der Reiz, der den schwarzen Staar verursacht, seinen Sitz in der Schleimhaut der Nase und der Stirnhöhle zu haben. Man hat Ursach, zu glauben, daß ein gehemmter catarrhalischer Ausfluß aus der Nase wirklich den schwarzen Staar erregen könne. Wenigstens klagen dergleichen Kranke oft über eine ungewöhnliche Trockenheit der Nase, und wirklich hat ein freywilliger oder durch Kunst erregter Ausfluß aus der Nase zuweilen eine merkliche Besserung bewirkt. Auch haben Kranke dieser Art oft allerhand unangenehme Empfindungen in der Gegend der Stirnhöhlen, ein Drucken, Ziehen, Spannen u. s. w. — Daß die Ursach des schwarzen Staars wenigstens in der Gegend der Stirnhöhlen zuweilen befindlich ist, zeigen die Augenbraunwunden (s. diese Anfangsgründe, 2 Band, S. 320 r.) an, worauf so oft ein schwarzer Staar erfolgt.

S. 440.

Der schwarze Staar ist überhaupt eine schwer zu heilende Krankheit. Indessen ist die Schwierigkeit der Kur nach der verschiedenen Entstehungsart der Krankheit, und nach der Verschiedenheit ihrer Ursachen zuweilen geringer, zuweilen grösser. Ueberhaupt ist der schwarze Staar, der plötzlich entsteht gemeiniglich leichter zu heilen, als derjenige, der langsam und allmählig entsteht. Wahrscheinlich sind die Ursachen des letztern mehrentheils alt und eingewurzelt, und folglich schwerer zu heben, die Ursachen des erstern hingegen schnell entstanden, und neu.

Immer ist es gut, wenn die Ursache dieser Blindheit deutlich erhellet, denn der sicherste Weg, zur Heilung der Krankheit zu gelangen, ist die Erkenntniß und Begräumung ihrer Ursache. — Zuweilen entdeckt man keine Spuhr der Krankheitsursache; der Kranke ist, die Blindheit ausgenommen, dem Anscheine nach vollkommen gesund, und dann ist man genöthigt empirische Hülfsmittel zu ergreifen, deren Wirkung immer sehr unsicher ist. In dem Falle, wo die Ursache der Krankheit erhellet, hängt die geringere oder grössere Schwierigkeit der Kur von der Beschaffenheit der Ursache ab, die zuweilen leicht, zuweilen schwer, zuweilen ganz und gar nicht zu heben ist. — Je älter die Krankheit ist, desto weniger darf der Wundarzt hoffen, das Gesicht wieder herzustellen.

§. 441.

Bei der Kur folgt der Wundarzt einem dreysachen Wege. Er sucht nämlich vorzüglich die Ursach der Krankheit auf, und hebt dieselbe: der sicherste und beste Weg. Nur ist wohl zu merken, daß nachdem die Ursach der Krankheit wirklich und gründlich gehoben ist, dennoch das Gesicht nicht immer wieder zurückkehrt. Der Wundarzt schreibt in diesem Falle die Fortdauer der Blindheit der Unthätigkeit des Nerven zu, der eine Zeitlang ausser Wirkung gewesen ist, und von einer Krankheitsursache gelitten hat, und wendet reizende und stärkende Mittel an, um den Nerven zu seiner vorigen Thätigkeit wieder zurück zu bringen. In einigen Fällen aber kehrt das

das Gesicht wieder zurück, sobald die Ursach der Blindheit gehoben ist. — Erhellet die Ursache der Krankheit auf keine Art und Weise, so gründet der Wundarzt die Kuranzeige auf die Zufälle und Erscheinungen, welche während der Entstehung und Fortdauer der Krankheit beobachtet werden, und woraus sich auf die innere Natur und Beschaffenheit der Krankheit etwas schließen läßt. — Findet er weder Erscheinungen dieser Art, noch auch die Ursache der Krankheit, so ist er genöthigt Mittel anzuwenden, die laut wiederhohlten Erfahrungen die Krankheit zuweilen wirklich, ob man gleich nicht immer erklären kann auf welche Art, gehoben haben, und die man deswegen empirische Mittel nennt.

S. 442.

Zuerst von der ersten und vorzüglichsten Kurmethode; von der nämlich, welche gegen die Ursachen der Krankheit gerichtet ist. Bey der Gattung des schwarzen Staars, die von den Ursachen der ersten Klasse, nämlich von denen, die durch eine wider-natürliche Anfüllung und Ausdehnung der Gefäße im Gehirn oder im Auge die Krankheit zu veranlassen scheinen, entsteht, kommt es offenbar darauf an, die Menge der Säfte zu mindern, von den obern Theilen abzuleiten; wenn gestopfte Blutgefäße Antheil an der Krankheit haben, diese wieder herzustellen, und nachdem dies alles geschehen ist, den ausgedehnten Gefäßen ihre vorige Stärke, und ihren vorigen Durchmesser wieder zu verschaffen. Das erste und vorzüglichste Mittel ist ein Aderlaß am Fuße, oder

Ge 5

wenn

wenn dies nicht hinreichend ist, an der Schlauspulsader, so reichlich, und so oft wiederholt, als es der Puls erfordert, und erlaubt. Oft ist eine einzige Blutaussäuerung zur Wiederherstellung des Gesichts hinreichend. Eine Frau, der die Kindbettreinigung gehemmt worden war, verlor das Gesicht, und erhielt es sogleich nach einem Aderlasse am Fuße wieder. Ein Nasenbluten, welches von freyen Stücken entstand, stellte einem jungen Menschen das Gesicht wieder her, welches er einige Wochen vorher verloren hatte.

S. 443.

Zuweilen sind allgemeine Aderlässe nicht hinreichend, es werden auch örtliche erfordert; Blutigel an den Schläfen, Schröpfköpfe in den Nacken, oder wenn eine Stöpfung des Monatlichen oder Hämorrhoidalflusses Gelegenheit zur Krankheit gegeben hat, auf das perinaeum, die innere Seite der Schenkel, das Heiligebein. Doch fruchten diese örtlichen Aderlässe selten etwas, wenn nicht die allgemeinen vorher in reichlichem Maaße geschehen sind. — Außer diesen Blutaussäuerenden Mitteln werden auch ableitende Mittel, lauwarme Fußbäder, erweichende Clystiere, Purgiermittel, Senfpflaster auf die Waden mit Nutzen angewendet.

S. 444.

Zuweilen helfen alle diese ausäuerenden und ableitenden Mittel, auch wenn sie so lange fortgesetzt werden, als nur immer der Puls und die Kräfte es erlauben, nichts; und dann ist der Fall doppelt.

Ent-

Entweder nämlich die Krankheit ist durch einen gehemmten Blutfluß, oder aber durch irgend eine andre Ursache der ersten Klasse entstanden. Im ersten Falle zeigt die Erfahrung, daß die Krankheit zuweilen ungeachtet aller Ausleerungen und Ableitungen nicht eher weicht, als bis derselbe Blutfluß wieder hergestellt worden ist, dessen Stopfung die Krankheit veranlaßt hat. Eine Frau, die bey Gelegenheit einer plötzlichen Verstopfung ihrer monatlichen Reinigung das Gesicht verlohren hatte, bekam dasselbe ungeachtet aller künstlichen Ausleerungen nicht eher wieder, als bis drey Monate nachher ihre monatliche Reinigung wieder erschien. Einer Frau, die bereits seit einem halben Jahre blind war, und ihre monatliche Reinigung verlohren hatte, setzte man verschiednemal Blutigel an die äußerlichen Geburtstheile. So oft die Thiere saugten zeigte sich etwas von der monatlichen Reinigung, und jedesmal sah sie, so lange sich etwas davon zeigte, welches aber selten über ein paar Stunden dauerte.

S. 445.

Im zweyten Falle, wo die Krankheit nicht von einem gehemmten natürlichen oder gewohnten Blutflusse entsteht, ist, wenn dieselbe nach hinreichenden Ausleerungen und Ableitungen nicht verschwindet, der Wundarzt berechtigt, in der Voraussetzung, daß die widernatürlich ausgedehnten Gefäße ihren tonus und Durchmesser verlohren haben, örtliche stärkende Mittel, vorzüglich das kalte Wasser anzuwenden. Daß eine solche Schwäche in den Gefäßen wirklich zuwei-

zuweilen zurück bleibt, und die Krankheit unterhält, scheint unter andern der Fall einer Frau zu beweisen, die durch die Verstopfung der monatlichen Reinigung ihr Gesicht verlohr, und dasselbe zwar nach Wiederherstellung derselben wieder erhielt, in der Folge aber eine Zeitlang jedesmal ein paar Tage vor dem Eintritt der monatlichen Reinigung dasselbe wieder verlohr, und wieder erhielt, sobald die Reinigung erschien. Das Waschen und Bähren des ganzen Kopfs und vorzüglich der Augengegend mit kaltem Wasser ist in diesem Falle nach hinreichenden Ausleerungen oft mit vortreflichem Erfolge angewendet worden. Mehrere Mittel dieser Art werden weiter unten angezeigt werden.

§. 446.

kehrt auch nach dem Gebrauche dieser Mittel das Gesicht nicht wieder zurück, so wendet der Wundarzt die reizenden Nervenmittel an, um die Unthätigkeit des Sehnervens zu heben; unter welchen die Brechmittel die vorzüglichsten sind. Soldaten (Schmucker chir. Wahrnehmungen, 1 Theil) welche auf forcirten Märschen bey heißen Tagen das Gesicht verlohren, erhielten dasselbe gemeiniglich wieder, wenn man ihnen sogleich eine Ader öffnete, und den folgenden Tag ein Brechmittel gab. Mehrere Mittel dieser Art werden weiter unten angezeigt werden. — Lähmungen, die nach äußern Kopfverletzungen zurückbleiben, sind zuweilen durch eine geschnittene Fontanelle auf der sutura mammillaris gehoben worden (Bromfield, chirurg. Obs. T. I.).

Biel-

Vielleicht nußt dies Mittel auch bey dem schwarzen Staare, der die Folge einer Kopfverletzung oder Erschütterung ist.

§. 447.

Die Kur des schwarzen Staars, der der Wirkung irgend eines widernatürlichen Reizes zuzuschreiben ist, erfordert die Erkenntniß und Begeräumung dieses Reizes. Ist es nicht möglich, den Reiz ausfindig zu machen, so sucht man durch Mittel, welche die Empfindlichkeit des Nerven mindern, die Nerven gegen den Reiz unempfindlich zu machen. Zuweilen wird der Reiz entdeckt, und wirklich weggeräumt, und die Wirkung desselben, die Blindheit dauert fort; und dann sucht der Wundarzt den Eindruck, den der Reiz auf den Nerven gemacht und hinterlassen hat, durch nervenbesänftigende (anodyna) und stärkende, oder die Unthätigkeit des Nerven durch reizende Mittel zu heben. — In den meisten Fällen liegt der Reiz, der die Krankheit erregt, in den Eingeweiden des Unterleibes. Zuweilen ist er offenbar gallicht, und dann erfordert er Brech- und Purgirmittel. Ein Mann, der nach einer heftigen Gallenkolik blind wurde, wurde durch ein einziges Brech- und Purgirmittel geheilt. Ein anderer, der nach einem heftigen Verdruß das Gesicht verlohr, erhielt dasselbe durch ein einziges Brechmittel wieder.

§. 448.

Zuweilen sind es feststehende, alte, in den Eingeweiden des Unterleibes stockende Schärfen, von mancherley, vorzüglich atrabilarischer Art: und dann sind

sind Brech- und Purgirmittel allein nicht hinreichend, sondern auflösende Mittel zugleich und vorzüglich erforderlich. — Eine Frau, die seit langer Zeit blind war, und mancherley Mittel ohne Nutzen gebraucht hatte, bekam ein Fleckfieber, und wurde während demselben von ihrer Blindheit befreyet. — Ein Mann bekam nach einem übelgeheilten kalten Fieber einen schwarzen Staar, und wurde durch den sechswöchentlichen Gebrauch einer Auflösung von 2 Gran Brechweinstein, 2 Quentchen Salmiak, und eben so viel Kamillenblumensextrakt in 6 Unzen Wasser, wovon er alle Stunden einen Eßlöffel voll nahm, geheilt. — Die vorzüglichsten auflösenden Mittel, die wieder hohlte Erfahrungen gegen den Staar empfehlen, der von Stockungen in den Eingeweiden des Unterleibes entsteht, sind: der Tartarus Solubilis täglich vier bis sechsmal zu einem halben Quentchen mit 8 bis 15 Gran castoreum: das kermes täglich vier bis achtmal zu einem Gran, allein oder mit dem Tartarus tartarificatus und bittern auflösenden Extracten: eine Mischung von 1 bis 2 Gran Brechweinstein, anderthalb Unzen Mindererschem Spiritus, 2 Quentchen Ochsegalle und drey Unzen Wasser, wovon der Kranke täglich vier bis sechsmal ein paar Eßlöffel voll nimmt: eine Pillenmischung aus 12 Gran Brechweinstein, einem Quentchen venedischer Seife, eben so viel Gumm. ammon. galban. Extract. arnic. fell. taur. rhabarb. wovon der Kranke drey mal täglich 15 Pillen 2 Gran schwer nimmt; die Belladonna täglich einmal oder zweymal zu 5 Gran: eine Auflösung vom Extracto aloes oder hellebori nigri
 aquoso

aquoso im liquore terrae foliat. Tartari, oder vino antimon. Huxhami, wovon der Kranke so oft und so viel nimmt, als erfordert wird, um täglich ein paar gelinde Stuhlgänge zu bewirken: eine dünne Lattwerge aus 1 bis 2 Quentchen Schierlingspulver und 4 Unzen Honig, welche der Kranke jedesmal innerhalb 24 Stunden allmählig verzehrt: ein Pulver aus 1 Gran Calomel, eben so viel Spießglaschwefel und 8 Gran Schierlingspulver; welches der Kranke alle Abend, oder auch alle Morgen und Abend nimmt u. s. w.

S. 449.

Ein Theil der angezeigten auflösenden Mittel hat eine erwärmende, erhitzende, der andre eine kühlende, schwächende Kraft. Die letztern sind denen Kranken zuträglich, die zu stiegender Hitze und einem gereizten geschwinden Puls geneigt sind; die erstern sind dann vorzüglich zuträglich, wenn der Kranke einen kleinen, weichen, langsamen Puls, und einen geringen Grad der natürlichen Wärme hat. Jedoch läßt sich nicht in jedem Falle mit Gewißheit zum voraus sagen, welche Gattung auflösender Mittel zuträglich ist. Ein Versuch mit der einen sowohl als der andern Art bestimmt die Wahl des Wund- arztes gemeiniglich gar bald. — Während dem Gebrauche dieser Mittel, müssen so oft als Anzeigen dazu erscheinen, Brech- und Purgirmittel gegeben werden. Am Ende sind stärkende Nervenmittel nöthig. — Ein Mensch von 22 Jahren wurde von einer dreijährigen Blindheit durch den abwechselnden Gebrauch

Gebrauch des Tartarus tartarificatus und der Brechmittel innerhalb acht Wochen ganz vollkommen geheilt. Er nahm während dieser Zeit zwölf Brechmittel. So oft er den Tartarus tartarificatus 4 bis 6 Tage hinter einander genommen hatte, bekam er Schwindel, Mangel an Appetit, eine belegte Zunge, Beängstigungen. Ein Brechmittel hob nicht allein jedesmal diese Zufälle, sondern vermehrte auch jedesmal die Sehkraft so merklich, daß dieselbe nach dem zwölften Brechmittel vollkommen wieder hergestellt war.

S. 450.

Würmer sind oft die Ursach des schwarzen Staars, vorzüglich bey Kindern. Der fortgesetzte Gebrauch des Calomel, des Wurmsamens (sem. fanton.) der Rhabarber oder Jalappe, und zuletzt der valeriana hebt diesen Staar mehrentheils vollkommen. — Unter die häufigern Ursachen des schwarzen Staars gehören vorzüglich auch zurückgetriebne Hautausschläge, ausgetrocknete Geschwüre, gehemmte wässerichte oder schleimichte Ausleerungen. Die Mittel die in diesem Falle im allgemeinen empfohlen werden, sind das flüchtige Hirschhornsalz innerlich von 6 bis 20 Gran; eine Mischung aus Spirit. Corn. Cerv. Succinat. und liquor. min. an. Hux.: Bäder, vorzüglich Schwefelbäder; die dulcamara allein oder mit dem vin. antim. Hux.: der Brechweinstein in kleinen Dosen, so daß er bloß Uebelkeit erregt, und dann und wann in voller Dose, daß Brechen erfolgt: das Extractum aconiti mit dem Symplicischen Speißglaswein; die Tinctura thebaica mit

mit dem vin. antim. Huxh. zu gleichen Theilen vermischt; der Schwefel; künstliche Geschwüre: die Electricität. — Ein Knabe, von 12 Jahren, der nach einem getrockneten bösen Kopfe stockblind worden war, wurde durch den Gebrauch folgender Salbe völlig wieder hergestellt: ℞. Flor. Sulphur. Vitriol. alb. pulv. baccar. laur. aa zij. olei oliv. q. s. ad. linimentum. Er rieb sich von dieser Salbe Abends und Morgens etwas in die Gelenke des Arms ein; nach drey Wochen erschien der böse Kopf wieder, und von dem Augenblicke an, fing das Gesicht an, zurück zu kehren.

§. 451.

Der schwarze Staar, der von venerischen Ursachen entsteht, erfordert den Gebrauch des Quecksilbers. Zuweilen ist er unheilbar; vielleicht hat das venerische Gift in diesem Falle eine Exostose in der Augenhöhle veranlaßt, die den Nerven drückt. — Der Staar, der von der gichtischen Materie verursacht wird, erfordert Mittel, die entweder die Materie aus dem Körper schaffen, oder nach ihrem ersten Sitz hinleiten. Ein Mann, der kaltes Wasser auf seinen podagrischen Fuß gelegt hatte, ward blind indem der podagrische Schmerz verschwand, und als er den Tag drauf wieder erschien, wieder sehend. — Ein schwarzer Staar, der durch eine Fiebermetastase veranlaßt worden war, wurde durch die oben (§. 448) angezeigten Pillen aus Brechweinstein, Seife u. s. w. geheilt (Schmucker vermischte Schriften, 2 Band). In einem andern ähnlichen Falle (Abhandl. der Richt. Wundarzneyk. III. B. Ff Schwed.

Schwed. Akad. der Wissensch. II B.) that ein Haarfeil im Nacken gute Dienste. — Eine Frau, die von einem heftigen Schrecken blind worden war, nahm nach einem gelinden Purgirmittel die valeriana, und erhielt ihr Gesicht wieder. In einem andern ähnlichen Falle that das Cajeputöl nach einer gelinden Abführung gute Dienste. — Ein schwarzer Staar, der während eines Frieselfiebers entstanden war, wurde durch Brech- und Purgirmittel geheilt (Deshais Gendron Maladies des Yeux). — Eine Frau wurde jedesmal in den letzten acht Tagen ihrer Schwangerschaft blind, und nach der Entbindung wieder sehend (Schmucker).

S. 452.

Von der Heilung des schwarzen Staars, der eine Folge der Augenbraunenwunden ist, ist bereits bey einer andern Gelegenheit (siehe diese Anfangsgründe, 2 B, S. 322, 323, 324) gehandelt worden. Eine Blindheit mit Thränen und großer Empfindlichkeit des Auges nach einem zurückgetriebnen Rheumatismus wurde durch spanische Fliegenpflaster über den Augenbraunen, und eine Mischung von einer Unze Huxhamschen Spießglaswein, und einem halben Quentchen Extractum aconiti, wovon der Kranke dreymal des Tages 20 bis 40 Tropfen nahm, gehoben. — Ein Mann, der offenbar aus gichtischen Ursachen einen vollkommenen schwarzen Staar hatte, wurde durch den Gebrauch des Karlsbades ganz vollkommen wieder hergestellt, bekam aber wenige Wochen nachher einen grauen Staar, der nach
einiger

einiger Zeit glücklich operirt wurde. — Eine Blindheit von zurückgetriebner Kräfte heilte die valeriana. — Der Staar nach einem gestopften Tripper erfordert nicht allein den innern Gebrauch des Quecksilbers, sondern oft auch die Wiederherstellung des Trippers.

S. 453.

Der schwarze Staar der dritten Gattung, der von schwächenden Ursachen entsteht, ist von doppelter Art: zuweilen nämlich die Folge einer allgemeinen Entkräftung des Körpers, zuweilen bloß die Folge einer örtlichen Augenschwäche, an der der Körper keinen Antheil nimmt. Im ersten Falle sind gute Nahrungsmittel und stärkende Arzneien vorzüglich die China, das Eisen und kalte Bad erforderlich; zugleich können auch örtliche stärkende Augenmittel angewendet werden. Im letztern Falle sind vorzüglich die letztern Mittel nöthig. Unter diesen ist das kalte Augenbad eines der kräftigsten. Der Kranke taucht des Tages öfters achtfache Kompressen von der Größe, daß sie das ganze Gesicht nebst der Stirn bedecken, in kaltes Wasser, und legt sie aufs Gesicht so lange bis sie die Kälte verlieren: oder er gießt sich mittelst der Hand oder einer Kompressen zu wiederholten malen kaltes Wasser auf die Augen, und ins Gesicht. Auch kann er sich den ganzen Kopf mit kaltem Wasser waschen. Der Gebrauch der kleinen Augenbadewannen ist ohne Nutzen: sie sind zu klein, das Auge erwärmt das darinnen befindliche Wasser zu schnell, oder drückt

es gar größtentheils heraus. — Spanische Fliegenpflaster, von halbmondförmiger Gestalt, einige Tage hinter einander über die Augenbraunen abwechselnd bald auf diese bald auf eine andre Stelle gelegt, stärken die Sehkraft des Auges vortreflich. Jedoch dürfen sie jedesmal nur so lange liegen, bis sie eine Röthe verursacht, nicht bis sie eine Blase gezogen haben. Allenfalls kann man auch das obere Augenlid und die Gegend der Augenbraunen des Tages einigemal mit einer Mischung aus gleichen Theilen Tinctura cantharidum und Spiritus serpilli reiben, jedoch hat man sich wohl in Acht zu nehmen, daß nichts davon ins Auge kommt. Ueberhaupt verdienen alle geistige und gewürzhafte Mittel den Namen stärkender Augenmittel; vorzüglich empfiehlt sich unter denselben ein infusum valerianae und salviae mit dem vierten Theil Kampferspiritus zum öftern Besuchen der Augenlider und Augengegend, und das oleum cajeput, dann und wann aufs obere Augenlid gestrichen u. s. w. Mehrere Mittel dieser Art werden unten unter den empirischen Mitteln, und in der Folge im Kapitel von der amblyopia angezeigt werden.

§. 454.

Wenn keine wahrscheinliche Ursache entdeckt wird, ist der Wundarzt berechtigt, empirische, d. i. solche Mittel anzuwenden, die laut wiederholten Erfahrungen die Krankheit zuweilen heben, ob man gleich nicht weiß, auf welche Art. Die vorzüglichsten Mittel dieser Art, sind: — Brechmittel, in
kleinen

kleinen Dosen, daß sie bloß Uebelkeit erregen, und dann und wann in voller Dose, um Erbrechen zu verursachen. Eine bloße Auflösung von ein paar Gran Brechweinstein in einigen Unzen Wasser Eßlöffelweise genommen, thut oft sehr gute Dienste. Vorzüglich aber empfiehlt die Erfahrung die bereits im vorhergehenden angezeigten Pillen (Schmucker) aus G. galban. sagapen. sapon. venet. von jedem eine Drachme, anderthalb Drachmen Rhabarber, und sechzehn Gran Brechweinstein. Man kann die Wirksamkeit dieser Pillen sehr vermehren, wenn man die valeriana und arnica hinzufügt. Der Kranke nimmt Morgens und Abends 16 Gran, und vermehrt die Dose allmählig. — Die Blätter und Blüten der arnica (Collin) allein in einem Aufgusse, oder in Pulver anfangs zu zehn Gran, allmählig bis zu einer halben Quente alle 2 bis 4 Stunden; vorzüglich aber (Quarin) in Verbindung mit der herba anthos. — Das Quecksilber allein bis zum Anfange des Speichelflusses, oder mit der Sarsaparille (Rowley) oder mit Schierlingspulver und Spießglaschwefel.

S. 455.

Ferner und vorzüglich die *valeriana* allein im Pulver zu einem halben Quentchen einigemal des Tages; oder (Warner on the Eye) in einem saturirten Dekokte der Chinarinde mit flüchtigem Hirschhornsalze, oder mit dem liquor min. an. Hoffm. infundirt. Auch äußerlich als Schnupftabak, oder auch als Augewasser in einem wässerichten Aufgusse

Ff 3

mit

mit dem dritten Theil Kampferspiritus. — Die *Pulsatilla* (Störk) im Extrakte von einem halben Gran bis zu 2 Gran mit Zucker oder Spießglaswein; oder das abgezogene Wasser davon. — Das *Extractum hyosciami albi*, ein vorzügliches Mittel allein von 2 bis 8 Gran des Tages zweymal, oder mit Spießglaswein. — Die *Millepedes*. Man stoßt 60 bis 100 Stück mit einer halben Unze Rheinwein, und läßt den ausgedruckten Saft alle Morgen nüchtern einige Wochen lang nehmen. — Der Schierling (Störk), das Extrakt davon täglich zu einem halben bis ganzen Quentchen; oder den frisch ausgepreßten Saft täglich zwey bis drey mal zu einem Theelöffel voll. — Die *Belladonna* in Pulver täglich zu fünf Gran. — Das flüchtige Hirschhornsalz bis zu einem Scrupel auf einmal. Auch äußerlich den *Spiritus Mindereri* mit Salben- oder Baldrianthee als Augewasser; und eine Mischung von gleichen Theilen Niebergeillessenz und *Salmiakspiritus*, innerlich zu 40 Tropfen, und zugleich äußerlich in das obere Augenlid und die Augenbraunen einzureiben. — Das *oleum animale Dippelii* und der Moschus innerlich (Warner).

S. 456.

Die Elektrizität (Hey, *Medical Obs. and Enquiries* Vol. V.) auf eine dreyfache Art angewendet. Man ziehet nämlich, wenn der Kranke mit elektrischer Materie angefüllt ist, Funken aus dem Auge und nahen Theilen, reibt ihn u. s. w. oder man giebt

giebt ihm den elektrischen Stoß. Die letztere Art ist in den neuen Zeiten beynahe außer den medicinischen Gebrauch gekommen, und es ist nicht zu leugnen, daß eine heftige Erschütterung Lähmungen verschlimmern, oder verursachen kann; daß indessen dieselbe dennoch, mit Vorsicht gebraucht, bey Lähmungen nicht ohne Nutzen ist, scheinen Fälle zu beweisen, wo Lähmungen bloß durch Erschütterungen des Körpers; z. E. durch die Berührung des Zitterfisches (Allamand, in Haarlemer Abhandlungen) durch schnelles Fahren auf ungleichen Wege (Schwenke, ebendas.) geheilt worden sind. Immer aber muß die Electricität täglich wiederholt, und verschiedene Wochen lang fortgesetzt werden, wenn sie einige Wirkung leisten soll. — Niesmittel, vorzüglich ein Schnupstabaß (Schmucker) aus lebendigem Quecksilber, Zucker und valeriana. — Reizende äußerliche Mittel; das Fenchelöl, oder das Casseputöl, wovon ein paar Tropfen ins obere Augenlid, und die Gegend der Augenbraunen eingerieben werden: der Hirschhorngeist, auf gleiche Art angewendet.

S. 457.

Die spanischen Fliegen vorzüglich. Außerlich als Pflaster hinter die Ohren vornemlich über die Augenbraunen gelegt, und täglich abwechselnd, bald an dieser bald an jener Stelle wiederholt: oder die spanische Fliegentinktur mit gleichen Theilen ungarischen Wasser vermischt, und so oft in die Gegend der Augenbraunen eingerieben, als es die

Röthe und Geschwulst verstattet. Sogar den innern Gebrauch der spanischen Fliegen hat man (Brisbane select Cases) bey Lähmungen bewährt gefunden. Also auch bey dem schwarzen Staare läßt sich etwas davon erwarten. Man giebt 10 bis 20 Tropfen von der Tinctura cantharidum ein paarmal des Tages in einer Tasse Mandelmilch. — Das Tropfbad ein Mittel, das bey Schwächen und Lähmungen anderer Theile zuweilen mit Nutzen angewendet wird, läßt sich auch bey dem schwarzen Staare versuchen. Man kann die Tropfen auf die Gegend der Augenbraunen, und die Schläfe fallen lassen. — Das Brennen mittelst eines glühenden Eisens, oder des Baumwollnen Zylinders mit Behutsamkeit in der Gegend der Augenbraunen verspricht in manchen Fällen sehr viel. — Einen Mann, der stockblind war, ließ man des Tages einigemal eine viertel Stunde lang in die klare Sonne sehen, und er erhielt dadurch sein Gesicht wieder. Als er so viel sahe, daß ihm das Sonnenlicht beschwerlich wurde, ließ man ihn weniger glänzende Gegenstände ansehen. So haben Taube durch einen starken Schall zuweilen ihr Gehör wieder erhalten.

S. 458.

Bey allen diesen bisher genannten empirischen Mitteln findet dennoch auch zuweilen eine Wahl, eine Anzeige, das eine oder andre vorzuziehen statt. Man kann diese Mittel größtentheils in zwey Klassen, nämlich in reizende (excitantia) und reizmildernde (ano-

(anodyna) eintheilen. Die erstern verdienen offenbar den Vorzug, wenn der Staar von schwächenden, oder eine widernatürliche Anfüllung der Blutgefäße erregenden Ursachen herrührt, und nachdem diese Ursachen gehoben sind, noch fortdauert. Wahrscheinlich kann man die Fortdauer der Krankheit in diesem Falle der Unthätigkeit des Nerven zuschreiben, wahrscheinlich kann man also auch von reizenden Mitteln, den spanischen Fliegen, den Brechmitteln, den Niesmitteln, der Electricität u. s. w. eine gute Wirkung erwarten. Die zweite Gattung der empirischen Mittel welche die Wirkungen und Folgen des Reizes mindert, scheint alsdann den Vorzug zu verdienen, wenn der Staar von einer reizender Ursache herrührt, und nachdem dieselbe gehoben ist, noch fortdauert. Mit Wahrscheinlichkeit kann man in diesem Falle die Fortdauer der Krankheit dem Eindrucke zuschreiben, den der Reiz im Nerven hinterlassen hat, und mit Recht also von Mitteln, die diesen Eindruck auslöschen, z. E. dem Extracto hyoscyami albi, dem Hirschhorngest, dem Schierling, der valeriana u. s. w. gute Dienste erwarten.

§. 459.

Zuweilen bemerkt der Wundarzt, wie bereits oben (S. 425, 441) angezeigt worden ist, bey der Entstehung und Fortdauer der Krankheit Zufälle und Erscheinungen, die ihn in der Wahl der Kurmittel leiten, und ihn bestimmen, diesem oder jenem unter den angezeigten empirischen Mitteln den Vorzug zu geben,

geben, oder auch andre ähnliche zu wählen. Zuweilen nämlich bemerkt er Zufälle eines widernatürlichen Reizes, oder einer widernatürlichen Empfindlichkeit des Auges; der Kranke sieht allerhand gefärbte oder glänzende Gestalten, er empfindet Schmerzen im Auge, das Auge ist, obgleich stockblind, dennoch Lichtscheu, die Pupille ist stark zusammengezogen, der Kranke hat einen anfangenden schwarzen Staar und sieht im Dunkeln besser, als im Hellen u. s. w. Findet der Wundarzt die Ursach dieser Reizbarkeit oder den widernatürlichen Reiz selbst nicht, so ist er berechtigt, allgemeine Mittel anzuwenden, die die Reizbarkeit mindern, und die Wirkung eines widernatürlichen Reizes mildern, namentlich ein Decoctum cap. pap. alb. c. femin. als lauwarmes Augenbad gebraucht, das Extractum hyocyami albi, die belladonna, cicuta, valeriana, china, das gummi ammon. galban. oleum caieput, selbst das Opium, vornemlich eine Mischung von Spießglaswein und Tinctura thebaica.

S. 460.

Zuweilen entsteht der schwarze Staar unter Zufällen, die eine Schwäche und verminderte Empfindlichkeit des Auges anzuzeigen scheinen. Dem Kranken ist, so lange er noch nicht ganz blind ist, das Gesicht neblicht, rauchricht, er siehet besser im Hellen als im Dunkeln, er hat das Gefühl einer Mattigkeit im Auge; es ist ihm zu Muthe, als wenn Schmutz und Unreinigkeiten vor den Augen wären, wodurch

wodurch er veranlaßt wird, das Auge öfters zu wischen. Er hat mehr Sehkraft, wenn er gegessen und getrunken hat, oder so oft er stärkende Mittel äußerlich anwendet (S. 425) u. s. w. Diese Erscheinungen berechtigen den Wundarzt, auch wenn er keine Ursach entdeckt, die eine Schwäche veranlaßt haben könnte, zu dem Gebrauche stärkender, reizender Mittel, namentlich der China, des Hirschhornsalzes, der valeriana, des kalten Wassers, der arnica, der spanischen Fliegen, der geistigen und gewürzhaf-ten äußern Augenmittel u. s. w.

S. 461.

Zuweilen scheinen die Zufälle eine widernatürliche Anhäufung der Feuchtigkeiten im Auge anzuzeigen. Der Kranke beklagt sich über eine Spannung des Augapfels, und über eine Empfindung als wenn der Augapfel nicht Raum genug in der Augenhöhle hätte. Der Augapfel ist ihm steif, unbeweglich, fühlt sich ungewöhnlich hart an, und scheint mehr als vorher hervorzuragen (S. 426) u. s. w. Ausleerungen allerhand Art, spanische Fliegenpflaster, über die Augenbraunen, hinter die Ohren, und in den Nacken, lange im Flusse erhalten und oft wiederhohlt; Brechmittel in vollen Dosen, wodurch so oft Anhäufungen und Stockungen in entfernten Theilen zertheilt werden, Haarseile und Fontanellen, Niesmittel, die einen starken Ausfluß aus der Nase erregen, scheinen in diesem Falle vorzüglich angezeigt zu seyn. Vielleicht ist selbst
die

die Eröffnung der Hornhaut, und Ausleerung der wässerichten Feuchtigkeit in diesem Falle von einigem Nutzen. Wenigstens kann sie auf keine Art schädlich seyn; nur müßte diese kleine Operation, so wie bey der Augenwassersucht, einige Tage nach einander täglich wiederholt werden, oder man müßte suchen, die Wunde einige Tage lang offen zu erhalten, um das Auge einige Zeitlang in einem Zustande verminderter Anfüllung zu erhalten.

S. 462.

Zuweilen scheinen die innern und äußern Gefäße des Auges in einem varicosen Zustande zu seyn. Der Kranke siehet unbewegliche schwarze Punkte, die allmältig grösser und häufiger werden, nezförmige Gestalten, und allerhand andre unveränderliche schattige Figuren; die Gefäße der Conjunctiva sind aufgeschwollen, ohne entzündet zu seyn (S. 426) u. s. w. Deßtere allgemeine und örtliche Aderlässe, die Scarification der varicosen Blutgefäße der Conjunctiva, das kalte Wasser und ähnliche Mittel scheinen der Krankheit in diesem Falle vorzüglich angemessen zu seyn. — Einige Kranke haben eine Zeitlang vor der Krankheit öftere Anfälle von einem schnupfigten Ausflusse aus der Nase (S. 427) und nachdem die Krankheit entstanden ist, eine ungewöhnliche Trockenheit der Nase, ein Drücken in der Gegend der Nasenwurzel und der Stirnhöhlen, und bey diesen sind Niesmittel von allerhand Art, namentlich der oben empfohlne Schnupftobak aus Mercur. viv. drachm. j. Sacchar.

Sacchar. alb. dr. iij. pulv. lill. alb. rad. valerian. aa dr. j. nebst Dämpfen von erweichenden Dekokten, zu welchen etwas von der valeriana beigemischt worden, offenbar hauptsächlich angezeigt.

§. 463.

In dem Falle, wo man eine bleiche oder weiße Farbe im Hintergrunde des Auges wahrnimmt, läßt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit (§. 422, 423) eine Stockung und Verdickung der Feuchtigkeiten in der retina selbst vermuthen, und diese Vermuthung berechtigt den Wundarzt zur Wahl vorzüglich auflösender Mittel, der cicuta, belladonna, des Quecksilbers, der Kellerefel, des flüchtigen Hirschhornsalzes u. s. w. — Zuweilen entsteht der Staar unter anhaltenden und oft wiederkommenden chronischen Augenentzündungen. Erscheint nicht eine besondere Ursach dieser Entzündungen, so verdienen die Spießglas-, Quecksilber-, und Wohnsaffmittel den Vorzug. — Gegen den periodischen Staar empfiehlt man zwar gewöhnlich die Chinarinde, indessen entsteht derselbe von verschiedenen Ursachen, und ehe diese nicht gehoben sind, hilft die China nichts, ja sie schadet, und verdoppelt zuweilen die Anfälle der Blindheit. Am häufigsten liegt die Ursach der periodischen Blindheit in den Eingeweiden des Unterleibes. Ein Mann wurde alle Morgen blind. Jederkzeit entstand zugleich ein Schmerz unter den kurzen Rippen der rechten Seite. Der Anfall endigte sich immer mit dem Abgange vieler Winde. — Mehrertheils

rentheils kommt es darauf an, Stockungen und Schärpen in den Eingeweiden des Unterleibes aufzulösen, und auszuleeren, und nur wenn dies geschehen ist, ist die Chinarinde zuträglich. Aber oft ist alsdann auch die ipecacuanha in kleinen Dosen, die valeriana, oder arnica hinreichend. — Zuweilen rührt die periodische Blindheit von Würmern, oder von einer Verstopfung der monatlichen Reinigung her, in welchem Falle sie ihre eigne Kurart erfordert. — Zuweilen gesellt sich der schwarze Staar zu hysterischen Zufällen, und verschwindet wieder mit denselben. Die Mittel, welche man gegen den hysterischen Paroxysmus anwendet, heben auch die Blindheit. Einmal zeigte sich das Cajaputöl vorzüglich wirksam.



Das fünfzehnte Kapitel.

Von dem Doppeltsehen.

S. 464.

Das Doppeltsehen (diplopia, visus duplicatus) ist eine der seltenen Augenkrankheiten, und von doppelter Art. Der Kranke nämlich sieht entweder einen einzelnen Gegenstand nur alsdann doppelt, dreyfach oder mehrfach, wenn er ihn mit beyden Augen betrachtet, hingegen so wie er ist, das ist einfach, so bald er ein Auge schließt; oder er sieht jeden Gegenstand doppelt, er mag ihn nur mit einem einzigen Auge, oder mit beyden betrachten. Auch bemerkt man die Krankheit in verschiednem Grade. Selten sieht der Kranke das doppelte Bild des Gegenstandes gleich deutlich, gemeiniglich das eine vollkommener, deutlicher, als das andre. Gemeiniglich ist das erstere deutliche Bild der wirkliche Gegenstand, das zweyte undeutliche, der falsche, scheinbare. Kranke dieser Art irren sich daher selten, und ergreifen immer den wahren wirklichen Gegenstand. Indessen giebt es dennoch auch Fälle, wo der Kranke beyde Bilder des Gegenstandes gleich deutlich sieht, und nicht im Stande ist, den wirklichen Gegenstand von dem falschen, scheinbaren zu unterscheiden.

S. 465.

S. 465.

Zuweilen ist die Krankheit vorübergehend, und von kurzer Dauer, und in diesem Falle kann sie auch in einem gesunden Auge von einer zufälligen Ursache veranlaßt werden. Mehrentheils ist diese ein Reiz, der außs Auge wirkt. Zuweilen aber ist sie anhaltend. Zuweilen ist sie sogar periodisch. — Zuweilen sieht der Kranke die Gegenstände nur alsdann doppelt, wenn er die Augen eine Zeitlang stark anstrengt, z. E. wenn er des Abends bey Lichte eine Zeitlang feine Schrift gelesen hat, und der Zufall verschwindet wieder, wenn er die Augen einige Augenblicke schließt. Es giebt sogar Fälle, wo der Kranke die Gegenstände nur in einer gewissen Entfernung doppelt sieht, nicht wenn sie näher sind, oder entfernter. Zuweilen sieht er sie bloß von einer gewissen Seite doppelt, z. E. wann er beyde Augen rechts wendet, nicht aber in jeder andern Richtung der Augen. Zuweilen sieht er die Gegenstände doppelt, er mag die Augen drehen und wenden, wie er will.

S. 466.

Die Ursachen des Doppeltsehen lassen sich insgesamt in vier Klassen theilen. Nämlich entweder der Gegenstand, welchen der Kranke siehet, bildet sich doppelt auf der retina ab; die Wirkung der Ursachen der erstern Klasse: — oder er bildet sich in Absicht der Grösse, Stellung, Entfernung, Deutlichkeit u. s. w. in dem einem Auge anders ab, als in dem andern; die Wirkung der Ursachen der zweyten Klasse:

Klasse: — oder er bildet sich in dem einen Auge an einer andern Stelle ab, als in dem andern Auge; die Wirkung der dritten Klasse der Ursachen; — oder endlich die Empfindung des Sehnerven ist fehlerhaft, so, daß er das Bild des Gegenstandes, ob es sich gleich einfach, in einem Auge wie in dem andern, in beyden Augen an einerley Stelle abbildet, dennoch doppelt empfindet. Rührt die Krankheit von den Ursachen der ersten und vierten Klasse her, so sieht der Kranke sowohl mit einem Auge allein, als auch mit beyden zugleich doppelt; rührt aber die Krankheit von den Ursachen der zweyten und dritten Klasse her, so sieht der Kranke nur doppelt, wenn er mit beyden Augen zugleich siehet; sobald er eins schließt, sieht er die Gegenstände natürlich wie sie sind, d. i. einfach.

S. 467.

Die vorzüglichsten Ursachen der ersten Klasse, welche veranlassen, daß sich ein einfacher Gegenstand doppelt oder mehrmal auf der retina mahlt, sind folgende: 1) Eine Unebenheit der Hornhaut, wodurch dieselbe in zwey oder mehrere concave Flächen getheilt wird. Es giebt Fälle (Haller Element. physiol. Tom. V. p. 85) welche beweisen, daß eine solche Unebenheit wirklich ein Doppeltsehen veranlassen kann; aber es giebt noch weit mehrere, wo dergleichen Unebenheiten, so merklich und ansehnlich sie auch sind, diesen Gesichtsfehler nicht veranlassen. Fälle dieser Art hat man vorzüglich Gelegenheit nach der Ausziehung des Staars zu beobachten. Es

Richt. Wunderzneyk, III. B.

Gg

kommt

kommt also wahrscheinlich wohl darauf an, daß diese Ungleichheiten eine sehr bestimmte Gestalt haben, wenn sie ein Doppeltsehen verursachen sollen. Uebrigens ist die Erkenntniß dieser Ursach ohne Schwierigkeit, aber die Heilung desselben unmöglich: denn wie kann man der Hornhaut ihre ursprüngliche Gestalt wieder verschaffen? — 2) Eine Ungleichheit auf der vordern Seite der Krystalllinse, wodurch dieselbe in mehrere abgesonderte Flächen getheilt wird, soll gleichfalls ein Doppeltsehen dieser Art verursachen. Es mag seyn, daß eine solche Ungleichheit ein Doppeltsehen verursachen kann; es ist aber sehr zweyfelhaft, ob der Fall wirklich jemals beobachtet worden ist, und kaum der Mühe werth, darüber Untersuchungen anzustellen, da die Diagnosis sowohl, als die Kur desselben unmöglich ist. Das einzige mögliche Kurmittel wäre die Ausziehung oder Niederdrückung der Krystalllinse: wie kann aber der Wundarzt bey der Ungewißheit der Diagnosis eine Operation wagen, bey welcher der Kranke nicht ganz außer Gefahr ist, das Gesicht ganz und gar zu verlieren? — 3) Eine doppelte Oeffnung in der Regenbogenhaut, oder wie man zu sagen pflegt, eine doppelte Pupille soll endlich auch ein Doppeltsehen dieser Art verursachen. Aber auch diese Ursach ist zweyfelhaft, da man (Janin) Fälle beobachtet hat, wo bey einer doppelten Pupille der Kranke dennoch nicht doppelt sahe. Uebrigens ist die Krankheit, wenn sie je aus dieser Ursache entsteht, unheilbar.

S. 468.

Die Ursache der zweyten Klasse, durch deren Wirkung der Gegenstand in Absicht seiner Größe, Stellung, Entfernung u. s. w. in dem einem Auge anders abgebildet wird, als in dem andern, sind größtentheils vielmehr bloß möglich, als wirklich beobachtet worden. Alle diejenigen Gesichtsfehler, die im folgenden unter den Namen des fehlerhaften Gesichts in einem besondern Kapitel werden abgehandelt werden, und vermöge welcher der Kranke die Gegenstände anders siehet als sie wirklich sind, d. i. z. E. in Bewegung wenn sie ruhig sind, schief, die gerade sind, gefärbt, die ungefärbt sind, u. s. w. können zuweilen nur in einem Auge entstehen; auf diesem Auge wird alsdann jeder Gegenstand ganz anders erscheinen als auf dem gesunden fehlerfreyen Auge; der Kranke wird folglich den Gegenstand auf eine doppelte Art, d. i. doppelt sehen. So kann z. E. die Brechung der Lichtstrahlen in dem einen Auge stärker als in dem andern seyn; der Kranke kann auf dem einem Auge ein Myops, auf dem andern Auge ein presbyops seyn; und wird alsdann mit dem einem Auge den Gegenstand groß, mit dem andern klein, mit dem einem Auge in der Entfernung, mit dem andern in der Nähe deutlich sehen. Ein Fall, der sich z. E. nach der Staaroperation auf einem Auge (Heuermann) wirklich zugetragen hat, und in welchem der Kranke offenbar auf eine zweyfache Art, d. i. doppelt sieht. Durch einen besondern Augenfehler sehen Kranke Gegenstände, die gerade sind, in schiefer Stellung. Wenn man an-

nimmt, daß nur ein Auge mit diesem Fehler behaftet ist, so wird der Kranke jeden Gegenstand mit diesem Auge in schiefer, mit dem andern gesunden in gerader Stellung erblicken, folglich doppelt sehen. Von allen diesen Zufällen wird in einem besondern Kapitel gehandelt werden.

S. 469.

Wenn man beyde Augen, auf einen Gegenstand dergestalt richtet, daß sich derselbe in der Sehaxe beyder Augen befindet, so bildet sich der Gegenstand in dem einem Auge sowohl als in dem andern an derselben Stelle, d. i. an der Stelle auf der retina ab, auf welche die Sehaxe fällt. Man sieht daher den Gegenstand mit dem einem Auge an derselben Stelle, wo man ihn mit dem andern Auge sieht, d. i. man sieht ihn einfach, ob man ihn gleich mit zwey Augen siehet. Wenn man aber das eine Auge in einer andern Richtung als das andre Auge auf den Gegenstand wendet, wenn man z. E. das eine Auge dergestalt auf den Gegenstand wendet, daß sich derselbe in der Sehaxe dieses Auges befindet, das andre Auge aber dergestalt, daß er sich zur Seite der Sehaxe befindet, das heißt, wenn man schielt, so bildet sich der Gegenstand in diesem Auge auf einer andern Stelle der retina ab, als in dem andern Auge, so siehet man den Gegenstand mit diesem Auge auf einer andern Stelle, mit jenem gleichfalls auf einer andern; d. i. man sieht ihn doppelt. Die dritte Gattung des Doppeltsehens: die dritte Hauptursache: das Schielen. Natürlich sehen Kranke dieser

dieser Art den Gegenstand nur doppelt, wenn sie ihn mit beyden Augen betrachten.

S. 470.

Gemeiniglich hat ein Schielender ein schwaches und ein stärkeres Auge; und die Schwäche des einen Auges ist die gewöhnliche Ursach des Schielens. Ein Schielender dieser Art sieht die Gegenstände nicht doppelt, denn er sieht sie nur mit einem Auge deutlich, mit dem andern sieht er sie so schwach und undeutlich, daß er den Eindruck derselben auf dieses Auge kaum empfindet. Nicht jedes Schielen ist folglich mit dem Doppeltsehen verbunden, ja die gewöhnlichste Art des Schielens ist nie damit verbunden. Nur dann sieht ein Schielender doppelt, wenn er mit beyden Augen gleich deutlich siehet, und das Schielen nicht von der Schwäche des einen Auges, sondern von irgend einer andern zufälligen Ursache entsteht. Die häufigsten Ursachen dieser Art sind krampfhast: ein Reiz nämlich wirkt auf den einen oder andern Augenmuskel dergestalt, daß der Kranke gehindert wird, beyde Augen nach Willkühr zu bewegen, und dergestalt auf einen Gegenstand zu richten, daß sich derselbe in der Sehaye beyder Augen befindet. In den meisten Fällen ist dieser Reiz gastrischer Art: jedoch jeder andre Reiz kann auf ähnliche Art auf die Augen wirken. Oft gesellt sich dieses Doppeltsehen zu andern krampfhastn Krankheiten als ein Symptom, vorzüglich zu der Hypochondrie. Zuweilen ist es die Folge eines heftigen Schmerzes. Ein Mensch sahe doppelt und schielte

während einem heftigen Kopfweh. Ein anderer bey heftigen Zahnschmerzen. Zuweilen ist eine Lähmung des einen oder andern Augenmuskels, zuweilen eine Geschwulst in der Augenhöhle schuld daran. Jedoch es wird von den verschiedenen Ursachen und der Kur des Schielens in einem besondern Kapitel gehandelt werden. Die Diagnostik dieser Gattung des Doppeltsehens ist ohne Schwierigkeit: der Kranke schielt, seit dem er doppelt siehet.

§. 471.

Die Ursachen der vierten Klasse sind Reize, die auf den Augennerven wirken, und seine Empfindungskraft dergestalt ändern, daß er den Gegenstand, der auf ihn wirkt, nicht so empfindet, wie er ihn empfinden sollte. So empfindet er zuweilen ungefärbte Gegenstände gefärbt, unbewegliche in Bewegung, gerade stehen schief, und in dem Falle, wovon jetzt die Rede ist, einfache doppelt oder dreyfach. Diese fehlerhafte Empfindung können Reize auch in ganz gesunden Augen verursachen, am leichtesten aber verursachen sie sie in widernatürlich empfindlichen und schwachen Augen. In diesen verursachen sie oft sehr geringe unbedeutende Reize. Gemeinlich kommt es bey der Kur darauf an, diese Reize ausfündig zu machen, und zu heben; oft aber ist dies nicht hinreichend. Bey sehr empfindlichen Augen veranlassen die Krankheit oft sehr geringe Reize, die nicht immer vermindert, oder entfernt werden können, und hier kommt es hauptsächlich darauf an, die Schwäche und hysterische Empfindlichkeit des Auges zu heben.

§. 472.

Diese vierte Klasse der Doppelsichtigkeit ist die vorzüglichste und häufigste. Die Reize, die sie erregen, sind von verschiedner Art. Gewöhnlich ist ihr Sitz in den Eingeweiden des Unterleibes. Zuweilen ist diese Doppelsichtigkeit eine Folge der Betrunktheit, eines unreinen verdorbnen mit Säure, Galle, Winden und Schleim beschwerten Magens, eines übelgeheilten kalten Fiebers, eines gestopften Durchfalls, eine Wirkung atrabilarischer Stockungen, ein Symptom der Hypochondrie, der Würmer. Jedoch auch andre Reize erregen sie zuweilen. Oft ist sie Folge eines heftigen Schreckens gewesen. Sie gesellt sich zu krampfhaften und schmerzhaften Krankheiten von allerhand Art. Heftige Kopf- und Zahnschmerzen sind zuweilen damit verbunden. Einen Knaben, der im Walde ging, schlug ein Zweig von einem Baume aufs Auge, und er ward doppelsichtig. Ein Mann, der bey hellem Sonnenscheine in einer beschneieten Gegend eine Reise zu Pferde machte, ward doppelsichtig. Einmal entstand die Krankheit nach einem getrockneten flechtenartigen Ausschlage. Oft rührt sie von unterdrückter Ausdünstung her. Zuweilen gesellt sie sich zu Kopfverletzungen. Personen, die schwache Augen haben, werden doppelsichtig, so oft sie glänzende, oder helle Gegenstände eine Zeitlang mit Aufmerksamkeit betrachten. Fieberkranke werden zuweilen doppelsichtig; mehrerer Ursachen nicht zu gedenken.

S. 473.

Der Reiz, der die Doppelsichtigkeit verursacht, kann, wenn er auf eine andre oder heftigere Art auf's Auge wirkt, auch andre und schwerere Augenkrankheiten verursachen. Daher kommt es, daß dieser Gesichtsfehler sehr oft in andre Augenkrankheiten übergeht, ja oft bloß der Vorbote schwerer Augenkrankheiten, vorzüglich des schwarzen Staars ist. — Die Schwierigkeit oder Leichtigkeit der Kur hängt theils von der Beschaffenheit der entfernten Ursache, theils von der Beschaffenheit des Auges ab. Einige der angezeigten Ursachen sind sehr leicht, andre sehr schwer zu heben. Ist das Auge sehr schwach und empfindlich, so bleibt die Krankheit gar oft zurück, nachdem der Reiz weggeschafft worden ist. Auch ist es, wenn die Krankheit gehoben ist, sehr schwer zu verhüten, daß sie nicht wieder von neuem entsteht, da auf ein so empfindliches Auge, auch geringe Reize, die sich nicht verhüten lassen, stark wirken. Alles kommt, theils um den gegenwärtigen Gesichtsfehler zu heben, theils um zu verhüten, daß derselbe oder irgend ein anderer nicht wieder entsteht, in diesem Falle darauf an, den hysterischen Zustand des Auges, d. i. die Schwäche und große Empfindlichkeit desselben gegen alle, auch geringe Reize, zu heben; und dies ist oft sehr schwer.

S. 474.

Das hauptsächlichste Geschäft des Wundarztes bey dieser Gattung der Doppelsichtigkeit besteht darinnen, daß er den Reiz, der die Krankheit verursacht,

ursacht, aussucht, und wegschaft. Die mehresten Gattungen dieses Reizes sind bereits im Kapitel vom schwarzen Staare genannt worden; denn beyde Krankheiten sind oft bloß verschiedene Wirkungen eines und eben desselben Reizes. Dasselbit ist auch die Behandlungsart angezeigt worden, die jeder derselben erfordert. Der Knabe, der durch den Schlag eines Baumzweiges im Walde doppelsichtig wurde, wurde durch den äußern Gebrauch des Infus. rad. valerian. mit dem Spirit. vin. crocatus, womit er verschiednemal des Tages die Augenlider und nahen Theile befeuchtete, von dieser Beschwerde befreuet. Eine Doppelsichtigkeit nach einen heftigen Schrecken hob die valeriana nach dem vorhergehenden dreytägigen Gebrauch des Cremor Tartari. Ein Hypochondriste wurde von der Krankheit durch das warme Bad befreuet. Eine Doppelsichtigkeit, die wahrscheinlich von atrabilaschen Stockungen im Unterleibe herrührte, wurde durch Pillen aus Gumm. galban. guajac. Rhabarber und venedischer Seife mit untermischten Brech- und Purgiermitteln geheilt.

S. 475.

Wenn der Reiz, der die Krankheit erregt, nur vorübergehend ist, und nachdem er die Krankheit erregt hat, nicht weiter fortbauert, wie z. E. das Anschauen glänzender Gegenstände; oder aber, wenn die Krankheit, nachdem der Reiz weggeschafft ist, noch fortbauert, oder endlich wenn der Reiz, der die Krankheit erregt, nicht genau entdeckt, und bestimmt werden kann, so sucht der Wundarzt durch

Gg 5

nerven-

nervenstärkende und reizmildernde Mittel den Eindruck, den der Reiz in den Nerven hinterlassen hat, auszulöschen, oder den Nerven gegen den fort dauernden Reiz unempfindlich zu machen. Alle Mittel dieser Art sind zu gleichem Endzwecke bereits gegen den schwarzen Staar empfohlen worden. Vorzüglich sind durch Erfahrungen gegen die Doppelsichtigkeit in diesem Falle empfohlen: der Salmiakgeist, in die Hand getropft, und vor die offenen Augen gehalten; der Spiritus vini crocatus äußerlich; das warme Augenbad, vorzüglich von einem Dekokt von weissen Mohnköpfen; das kalte Augenbad; innerlich die China, valeriana, ipecacuanha in kleinen Dosen, die Zinkblüten, und das Cajepudl. In einem Falle, wo die Ursache der Krankheit auf keine Art ausfindig zu machen war, that der Tartar. solub. mit Ochsen-galle und castoreum; in einem andern ähnlichen Falle, die Rhabarber, Ochsen-galle und assa foetida, und in einem dritten der Spiritus Mindereri mit Ochsen-galle vortreffliche Dienste. Ueberhaupt darf man in allen Fällen, wo die besondre Ursach der Krankheit nicht genau bestimmt werden kann, immer vermuthen, daß sie in den Eingeweiden des Unterleibes ist; und man wird in solchen Fällen mit Mitteln, die gelinde auflösen, ausleeren, Reiz mildern, oft sehr viel ausrichten.



Das sechszehnte Kapitel.

Von der Halbſichtigkeit.

S. 476.

Der Kranke, der mit diesem Augensehler (Hemiopia) behaftet ist, siehet den Gegenstand, den er anschauet, nicht ganz, sondern nur einen kleinern oder größern Theil desselben, zuweilen nur die Mitte, nicht den Umfang, zuweilen den Umfang, nicht die Mitte, zuweilen bloß die obere oder untere Hälfte. Auf eine so unvollkommene Art sieht er den Gegenstand, entweder in der Nähe sowohl als in der Entfernung, oder aber bloß in der Nähe, nicht in der Entfernung.

S. 477.

Man kann die Ursachen dieses Augensehlers in vier Hauptgattungen eintheilen. Zur ersten Klasse gehören Verdunkelungen der Hornhaut und Krystallinse, vorzüglich solche die nur einen großen Theil derselben einnehmen, die Pupille nicht ganz, sondern nur zum Theil verdunkeln. Kranke, die dergleichen Verdunkelungen haben, sehen Gegenstände nur halb, wenn sie nahe sind, nicht aber wenn sie entfernt sind. Ist z. E. die untere Hälfte der Krystallinse oder Hornhaut undurchsichtig, so kann der Kranke den untern Theil des Gegenstandes der ihm nahe ist, nicht sehen, weil von diesem Theile unmöglich Lichtstrahlen in den Hintergrund des Auges gelangen können. Er sieht folglich bloß den obern Theil des Gegen-

Gegenstandes. Jedoch gilt dies blos von grössern Gegenständen, nicht von kleinern; einem Buchstaben z. E. oder einem kleinen Stücke Geld. Ist aber der Gegenstand entfernt, so fallen sowohl vom untern als obern Theile desselben Lichtstrahlen auf die retina, und der Kranke sieht den Gegenstand ganz. Ebenfalls sieht er ihn ganz auch wenn er nahe ist, wenn er das Auge stark nach der Erde richtet. Kranke dieser Art gewöhnen sich daher leicht das Schielen an. Die Diagnostik dieses Falles ist ohne Schwierigkeit, und das was in Absicht der Kur erfordert wird, erhellet aus dem Kapitel von den Verdunkelungen der Hornhaut und dem grauen Staare.

S. 478.

Personen, die ein unvollkommenes ancyloblepharum haben, d. i. diejenigen, denen das obere Augenlid zum Theil über den Augapfel herab hängt, haben gleichfalls unter gewissen Umständen eine Halb-sichtigkeit. Sie können nämlich von einem nahen und großen Gegenstande, den sie anschauen, natürlicher Weise blos die untere Hälfte sehen, wenn sie sich nicht entweder von dem Gegenstande entfernen, oder den Kopf zurückbeugen, oder das Auge herabwärts senken. Mehr von diesem Falle ist im Kapitel von dem anchyloblepharum gesagt worden.

S. 479.

Bei verschiedenen Gelegenheiten, die bereits im Vorhergehenden, vorzüglich im Kapitel von dem grauen Staare angezeigt worden sind, wird die Pupille aus der Mitte der Regenbogenhaut an den
Rand

Rand der Hornhaut herabwärts, oder seitwärts gezogen. Mit dieser widernatürlichen Lage der Pupille ist unter gewissen Umständen gleichfalls eine Halbsichtigkeit verbunden. Der Kranke kann, wenn z. E. die Pupille herunterwärts gezogen ist, unmöglich vor einem nahen und großen Gegenstande den obern Theil sehen, wenn er nicht entweder das Auge stark aufwärts wendet, oder sich von dem Gegenstande entfernt. Ein Fall übrigens, der leicht zu erkennen, aber unheilbar ist.

§. 480.

Eben so verhält sich mit dem Falle, wo durch irgend eine Ursache, gemeiniglich durch eine äußere Gewalt, die außs Auge wirkt, die Regenbogenhaut an irgend einer Stelle vom Rande der Hornhaut abgesondert wird. Gemeiniglich schließt sich in diesem Falle die natürliche Pupille, und es entsteht eine halbmondförmige Deffnung an der Stelle, wo sich die Regenbogenhaut vom Rande der Hornhaut abgesondert hat. Durch diese Deffnung, die immer zunächst am Rande der Hornhaut ist, sieht der Kranke natürlicherweise, z. E. wenn sie am obern Rande der Hornhaut ist, den untern Theil eines nahen Gegenstandes gleichfalls nicht; entfernt er sich aber von demselben, oder wendet er das Auge stark nach der Erde, so sieht er ihn ganz. Auch dieser Fall ist leicht zu erkennen und unheilbar.

§. 481.

Die bisher genannten Gattungen der Halbsichtigkeit sind eigentlich bloß Zufälle andrer Augenkrankheiten; die vierte Gattung ist die vorzüglichste, ist mehren-

mehrentheils als eine Krankheit für sich zu betrachten. Sie ist von doppelter Art. Zuweilen verdient sie den Namen eines halben schwarzen Staars (*amaurosis dimidiata*) und in diesem Falle ist sie anhaltend: zuweilen scheint sie mehr die Wirkung eines schnell entstehenden, und bald vorübergehenden Reizes zu seyn, wodurch eine fehlerhafte Empfindung im Augennerven erregt wird. Im letzten Falle hat sie große Ähnlichkeit mit der Doppelsichtigkeit der vierten Art (S. 472); denn sie entsteht von denselben Ursachen, und erfordert dieselbe Behandlung. Mehrentheils ist die Ursache auch hier in den Eingeweiden des Unterleibes zu finden. Von dem ersten Falle gilt alles was von dem schwarzen Staare gesagt worden ist; auch geht diese Art der Halbsichtigkeit oft in den schwarzen Staar über. — Ein Mann, der auf einer Reise zu Pferde bey starkem Regenwetter durch und durch naß worden war, und nicht eher als nach einigen Stunden Gegeheit hatte, trockne Kleider anzulegen, bemerkte den Morgen drauf, daß er alle Gegenstände nur halb, und in einer schwankenden Bewegung sahe. Nach einer gelinden Abführung hob die *Tinctura thebaica* mit dem *vino antim. Hux.* nebst spanischen Fliegenpflastern, und dem *Salmiakspiritus* vor die Augen gehalten, die Krankheit in drey Tagen. Zweymal kehrte sie innerhalb drey Wochen bey Gelegenheit einer leichten Erkältung zurück, nach dem fleißigen Gebrauche des kalten Augenbades aber blieb der Kranke nachher völlig davon befreyet.

Das siebenzehnte Kapitel.

Von der Tag- und Nachtblindheit.

S. 357.

Kranke, die den erstern Augenfehler (Nyctalopia, caecitas diurna, die Tagblindheit) haben, sehen entweder es mag Tag oder Nacht seyn, an einem hellen Orte undeutlich, an einem dunklern deutlicher; oder an einem hellen Orte gar nicht, an einem dunklern ziemlich gut; oder aber sie sehen bey Tage, es sey an einem hellen oder dunkeln Orte ganz und gar nicht, bey Nachte hingegen es mag helle oder dunkel seyn, unfehlhaft. In den ersten zwey Fällen kann man allenfalls die Krankheit die unvollkommene, im letztern Falle die vollkommene Tageblindheit nennen. Die Krankheit ist sowohl in Absicht ihrer Entstehungsart, als auch in Absicht der Kurart, die sie erfordert, nach Verschiedenheit ihrer Ursachen verschieden. Und diese sind von einer doppelten Art: sie liegen nämlich entweder in einem organischen Fehler des Auges, oder sie haben einen Nervenfehler zum Grunde.

S. 483.

Die Ursachen der erstern Art erregen immer eine unvollkommene Tagblindheit. Es giebt deren zwey. Die erste ist eine Verdunkelung der Hornhaut oder Krystallinse von geringem Umfange der Mitte der Pupille

Pupille gegenüber. In beyden Fällen bedeckt, wenn sich die Pupille an einem hellen Orte verengert, die Verdunkelung, sowohl die erste vor, als die zweyte hinter der Pupille, die Pupille gänzlich, und hindert das Licht ins Auge zu fallen, sobald sich hingegen dieselbe erweitert, wird ihr Umfang größer als der Umfang der Verdunkelung, und es fallen folglich Lichtstrahlen zwischen dem Rande der Pupille und Verdunkelung ins Auge. Kranke, die dergleichen Verdunkelungen haben, sehen folglich an einem sehr hellen Orte wenig oder gar nicht, an einem dunklern hingegen besser. Verdunkelungen dieser Art hinter der Pupille rühren entweder von Ueberbleibseln des Staars nach der Staaroperation her, oder sie haben ihren Sitz in der vordern oder hintern Haut der Kapsel. Von den Verdunkelungen dieser Art ist im Kapitel vom grauen Staare, von den erstern aber im Kapitel von den Flecken der Hornhaut gehandelt worden. — Die zweyte Ursach ist eine widernatürliche Erweiterung und Unbeweglichkeit der Pupille (Mydriasis). Da sich in diesem Falle die Pupille an einem hellen Orte nicht verengert, fällt des Lichts so viel ins Auge, daß dasselbe geblendet wird; an dunklern Orten hingegen sehen dergleichen Kranken gut, ja besser als andre, weil durch ihre ungewöhnlich erweiterte Pupille mehr Licht ins Auge fällt, als in jedes andre gesunde Auge. Von der Mydriasis ist übrigens bereits gehandelt worden.

§. 484.

Die Ursachen der zweyten Gattung, die einen Nervenfehler zum Grunde haben, sind von dreyfacher Art.

Art. Zuweilen ist die Tagblindheit ein wirklicher periodischer schwarzer Staar, dessen Anfälle abwechselnd des Morgens eintreten, und des Abends wieder verschwinden. Kranke dieser Art sehen, wenn sie den Anfall haben, nicht allein gar nichts, sondern sie bleiben auch blind, sie mögen sich an einem hellen oder dunkeln Orte befinden. Alles was von dem schwarzen Staar überhaupt gesagt worden ist, gilt auch von diesem; indessen zeigt selbst seine periodische Beschaffenheit an, daß er gewöhnlich von gastrischen Ursachen herrührt. Ein Kranker dieser Art wurde nach vorgängigen Brech- und Purgiermitteln durch die China und valeriana geheilt.

S. 485.

Zuweilen liegt die Schuld in einer widernatürlichen Empfindlichkeit des Auges, vermöge welcher entweder dasselbe ein starkes Licht nicht ohne Schmerzen, Thränen, und ohne geblendet zu werden vertragen kann, oder aber die Pupille an einem hellen Orte sich so stark verengert, daß wenig oder gar kein Licht ins Auge fallen kann. Im ersten Falle scheint die zu große Empfindlichkeit vorzüglich in der retina, im letztern Falle in der Regenbogenhaut ihren Sitz zu haben. Diese widernatürliche Empfindlichkeit ist zuweilen offenbar die Folge eines inflammatorischen Zustandes, in welchem sich das Auge befindet. Am häufigsten gesellt sie sich zu catarrhalischen und rheumatischen Augenentzündungen. Jedoch auch bey Augenentzündungen andrer Art beobachtet man dieselbe zuweilen. Ein Mensch, der von einem Schläge

Richt. Wundarzneyk. III. B. Hh auß

aufs Auge eine Augenentzündung bekam, konnte bey dunkler Nacht lesen. Außer den gewöhnlichen antiphlogistischen Mitteln ist bey Entzündungen dieser Art die thebaische Tinktur äußerlich, und innerlich mit Spießglaswein gemeiniglich von vorzüglichem Nutzen.

S. 486.

Auch nicht entzündete Augen sind zuweilen widernatürlich empfindlich. Eine Frau, der die monatliche Reinigung gestopft worden war, wurde tagblind. Die Pupille zog sich an einem hellen Orte so stark zusammen, daß sie sich fast gänzlich schloß. Sobald die monatliche Reinigung wieder hergestellt war, verlohr sich die Krankheit (Pellier). Ein Mann konnte bey dunkler Nacht lesen, wenn er berauscht war (Börhaave). Zuweilen ist die widernatürliche Empfindlichkeit des Auges mit Schwäche verbunden, und das Auge befindet sich gleichsam in einem hysterischen Zustande. Ein junger Mensch, der sich von früher Jugend an, dem Laster der Onanie ergeben hatte, bekam in seinem siebenzehnten Jahre eine so große Empfindlichkeit der Augen, daß er bey Tage, auch wenn es nicht sehr helle war, immer einen schwarzen Flor vor dem Gesichte tragen mußte. Die gewöhnlichen stärkenden Mittel, vorzüglich die mineralischen Säuern und das kalte Augenbad minderten zwar die Krankheit, hoben sie aber nicht gänzlich.

S. 487.

Zuweilen ist eine Schärfe, die auf die Augen wirkt, ohne sie zu entzünden, die Ursach der widernatür-

natürlichen Empfindlichkeit und Reizbarkeit derselben. Vorzüglich wirkt die gichtische und rheumatische Materie auf diese Art oft auf die Augen. In einem Falle dieser Art that der Ellersche liquor nebst spanischen Fliegenpflastern; in einem andern die dulcamara nebst dem Spießglasweine und der thebaïschen Tinktur gute Dienste. — Auch andre Reize wirken solchergestalt auf die Augen. Ein junger Mensch von 18 Jahren hatte jederzeit eine solche Empfindlichkeit der Augen gegen das Licht, so oft er eine Unverdaulichkeit hatte. Bey einem Knaben von 9 Jahren, dem ein böser Kopf unvorsichtig behandelt worden war, waren die Pupillen immer außerordentlich klein, und an einem hellen Orte schlossen sie sich gänzlich. — Ein Auge, welches des Lichts seit einiger Zeit entwöhnt ist, ist, wenn es demselben zuerst wieder ausgesetzt wird, immer so empfindlich gegen dasselbe, daß es schmerzhaft, ja geblendet wird. Dies ist der Fall bey denen, die blind gewesen sind, und ihr Gesicht wieder erhalten, die die Augen wegen irgend einer Ursach lange verbunden haben, die sich lange an einem dunkeln Orte aufgehalten haben u. s. w. Immer gewöhnt sich das Auge in diesen Fällen allmählig wieder an das Licht.


§. 488.

Die Nachtblindheit (Hemeralopia, caecitas crepuscularis) ist von doppelter Art: der Kranke siehet nämlich bey Nacht, es mag hell oder dunkel seyn, gar nicht, oder er siehet bloß an einem stark erleuchteten Orte, wenig oder gar nicht an einem

weniger hellen Orte. — Von der erstern Art ist der periodische schwarze Staar, dessen Anfälle des Abends kommen, und des Morgens wieder vergehen, (Medical Transact. Vol. I. p. 60.) und von welchem alles das gilt, was (§. 484) von der Tageblindheit dieser Art, und von dem schwarzen Staar überhaupt gesagt worden ist. Oft scheint diese Gattung der Nachtblindheit von unterdrückter Ausdünstung zu entstehen. Sie ist in denen Gegenden häufig, wo die Tage sehr heiß, und die Nächte sehr kalt sind. Drey Soldaten (Richard de Hautefiera Observations) die in einer solchen Gegend mit offnem gegen die Sonne gerichteten Angesicht schliefen, bekamen die Krankheit. Alle Abend wurden sie blind, des Morgens wieder sehend. Immer trat zugleich mit der Blindheit Entkräftung, Kopfschmerz, und eine widernatürliche Erweiterung und Unbeweglichkeit der Pupille ein. Aderlässe, Brechmittel und schweißtreibende Mittel hoben die Krankheit.

§. 489.

Zur zweiten Gattung der Nachtblindheit gehören alle Arten der widernatürlichen Verengerung der Pupille, die mehresten Gattungen des schwachen Gesichts (amblyopia) der anfangende graue, zuweilen auch der schwarze Staar; Krankheiten, von denen zum Theil bereits besonders gehandelt worden ist, theils noch gehandelt werden wird.



Das achtzehnte Kapitel.

Von der

Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit.

§. 490.

Kranke, die den ersten Augenfehler (Myopia) haben, sehen nur sehr nahe Gegenstände deutlich, alle, auch nur wenig entfernte undeutlich, ja gar nicht. Zwar siehet auch ein gesundes Auge entfernte Gegenstände nie so deutlich als nahe, da von einem Gegenstande immer desto weniger Lichtstrahlen ins Auge fallen, je mehr derselbe entfernt ist: aber ein kurzsichtiges Auge siehet den Gegenstand bey weniger Entfernung in einem hohen Grade undeutlich. Uebrigens giebt es verschiedne Grade der Kurzsichtigkeit. Es giebt Kurzsichtige, die nicht über ein paar Zoll weit deutlich sehen. Ein im höchsten Grade Kurzsichtiger schielt zu gleicher Zeit; er muß den Gegenstand, den er genau betrachten will, so nahe an sich halten, daß er die Seharen beyder Augen auf demselben nicht vereinigen kann.

§. 491.

Am deutlichsten siehet man einen Gegenstand, wenn die Lichtstrahlen, die von demselben ins Auge fallen, sich auf der retina selbst in einen focus vereinigen: undeutlich siehet man ihn, wenn sie sich in

einen focus vereinigen, ehe sie die retina berühren, oder aber, wenn sie die retina berühren, ehe sie sich in einen focus vereinigen. In einem kurzsichtigen Auge geschiehet das erstere: die Lichtstrahlen vereinigen sich nemlich zu bald, ehe sie die retina berühren, in einen focus, und sind, wenn sie zur retina gelangen, schon wieder zerstreuet. Da die Lichtstrahlen von einem nahen Gegenstande sich immer desto weiter hinter der Krystalllinse in einem focus vereinigen, je näher der Gegenstand ist, von einem entfernten Gegenstande aber sich immer desto näher hinter der Krystalllinse vereinigen, je entfernter der Gegenstand ist, erhellet leicht, warum ein Auge, in welchem sich die Lichtstrahlen vor der retina in einen focus vereinigen, kurzsichtig ist, d. i. nahe Gegenstände deutlich, entfernte undeutlich oder gar nicht siehet. — Die Ursache dieses Fehlers, vom welchem die Kurzsichtigkeit herrührt, ist dreysach; nämlich — Die Brechung der Lichtstrahlen im Auge ist entweder zu stark, — oder der Augapfel ist ungewöhnlich lang, — oder die Kraft, vermöge welcher das Auge abwechselnd dergestalt verändert wird, daß es nahe sowohl, als entfernte Gegenstände deutlich sehen kann, ist schadhast.

S. 492.

Die erste Ursach, die allzstarke Brechung der Lichtstrahlen im Auge, wodurch die Lichtstrahlen schnell, und ehe sie die retina erreichen, in einem focus vereinigt werden, rührt zuweilen von einer zu starken Convexität der durchsichtigen Hornhaut her,
die

die bey Kurzsichtigen oft sehr bemerklich und auffallend ist. — Je mehr Feuchtigkeiten den Augapfel anfüllen, desto stärker wird die durchsichtige Hornhaut ausgedehnt und gewölbt. Man kann daraus erklären, warum vorzüglich das jugendliche Alter zur Kurzsichtigkeit geneigt ist; warum die Kurzsichtigkeit gemeiniglich mit den Jahren abnimmt; und warum selbst ein gesundes Auge je nach dem durch zufällige Ursachen die Absonderung der Feuchtigkeiten des Augapfels vermindert oder vermehrt wird, zuweilen ein wenig kurzsichtig, zuweilen vielmehr langichtig ist. — Zuweilen ist die ungewöhnliche Convexität der Hornhaut ein Fehler der ersten Bildung; zuweilen ist sie ein Symptom einer andern Augenkrankheit, eines Staphyloms, der Augenwassersucht u. s. w. Es scheint sogar, daß sie zuweilen in einem gesunden Auge durch irgend eine zufällige Ursach entstehen kann. Eine Weibsperson (Rowley; on the Diseases of the Eye) hatte eine so stark gewölbte Hornhaut, daß ihr sogar keine Brille etwas half. Sie bekam diesen Fehler bey einer schweren Geburt. — Ein Auge, welches aus dieser Ursache kurzsichtig ist, sieht wahrscheinlich die Gegenstände größer als ein gesundes Auge, weil die Lichtstrahlen indem sie im Auge stark gebrochen werden, sich unter einem größern Winkel in einen focus vereinigen. — Da die stark gewölbte Hornhaut von den Lichtstrahlen die auf sie fallen, mehrere sammelt und in die Pupille leitet, siehet ein kurzsichtiges Auge dieser Art den Gegenstand heller und deutlicher als ein gesundes Auges.

S. 493.

Die Erkenntniß dieser ersten Ursache der Kurzsichtigkeit ist ohne Schwierigkeit, aber die Heilung derselben ist unmöglich. Denn wie ist es möglich die Convexität einer sonst gesunden Hornhaut zu mindern. Der einzige Fall verdient allenfalls ausgenommen zu werden, wo die widernatürliche Convexität der Hornhaut die Folge einer Augenkrankheit, z. E. der Augenwassersucht ist; denn sobald durch die im vorhergehenden angezeigten Mittel diese Krankheit gehoben ist, verliert sich auch ihr Symptom, die widernatürliche Ausdehnung und Convexität der Hornhaut. — Indessen fragt sich dennoch, ob nicht auch in dem Falle, wo die widernatürliche Convexität der Hornhaut keine Folge irgend einer Augenkrankheit ist, und das kurzsichtige Auge übrigens vollkommen gesund ist, vornemlich in dem Falle, wo die Convexität der Hornhaut so stark ist, daß die gewöhnlichen Palliativmittel, selbst die Brille, von wenigem Nutzen sind, die Convexität der Hornhaut nicht gemindert werden könnte. Man hat die widernatürliche Ausdehnung der Hornhaut beim Staphylom zuweilen durch den äußern Gebrauch der Spießglasbutter gehoben. Ließe sich von diesem Mittel nicht auch etwas in dem Falle der Kurzsichtigkeit, wovon jetzt die Rede ist, erwarten? Freylich müßte dasselbe nicht weit vom Rande der Hornhaut applicirt werden, damit, wenn es allenfalls eine Verdunkelung verursachte, dieselbe nicht der Pupille gegenüber, und dem Gesichte hinderlich wäre. — Man hat anfangende Staphylome dadurch gehoben, daß
man

man die Hornhaut geöffnet, die wässerichte Feuchtigkeit ausgeleert, die Oeffnung eine Zeitlang offen erhalten, und durch die fortdauernde Ausleerung des Auges der Hornhaut Zeit verschafft hat, sich zusammen zu ziehen, und ihre vorige Gestalt wieder anzunehmen. Läßt sich nicht auch in dem Falle eines hohen Grades der Kurzsichtigkeit dieser Art, wo Palliativmittel wenig nützen, von dieser Behandlungsart etwas erwarten?

S. 494.

Da die Brechung der Lichtstrahlen im Auge größtentheils und vorzüglich von der Krystalllinse abhängt, läßt sich allenfalls wohl glauben, daß auch diese eine Kurzsichtigkeit veranlassen kann, wenn sie zu convey ist. Es läßt sich annehmen, daß diese Gestalt der Linse zuweilen von der ersten Bildung herrührt, oder daß sie eine Folge der jugendlichen Vollsastigkeit ist, und daß deswegen auch diese Gattung der Kurzsichtigkeit sich mit den Jahren vermindert. Indessen ist dies alles dem praktischen Arzte unbrauchbar, theils weil er kein Zeichen hat, diesen Fehler der Krystalllinse zu erkennen, und theils, weil es kein Mittel giebt, ihn zu heben. Das einzige Mittel dieser Art wäre die Ausziehung oder Niederdruckung der Linse, ein Mittel, das auch selbst in dem Falle der stärksten Kurzsichtigkeit, wo Palliativmittel wenig nützen, kaum anwendbar ist, da es leicht den gänzlichen Verlust des Gesichts veranlassen kann.

S. 495.

Der Erfahrung zu Folge brechen durchsichtige Körper die Lichtstrahlen immer desto stärker, je dichter sie sind. Es kann also wohl seyn, daß an der Kurzsichtigkeit, die von einer zu starken Brechung der Lichtstrahlen im Auge herrührt, manchmal eine allzugroße Dichtigkeit der Feuchtigkeiten und andern durchsichtigen Theile des Auges schuld ist. Aber was kann eine solche muthmaassliche Dichtigkeit veranlassen? Wie kann man sie verhüten? Durch welche Zeichen kann man sie erkennen? Durch welche Mittel heben? Man hat bey verschiedenen Gelegenheiten, vorzüglich bey der Ausziehung des grauen Staars bemerkt, daß bey denen Kranken, die kurz vor der Operation, um die Verdunkelung der Krystallinse zu zertheilen, Quecksilbermittel und alkalische Salze genommen haben, die gläserne Feuchtigkeit widernatürlich dünn und aufgelöst ist. Ist diese widernatürliche Beschaffenheit der gläsernen Feuchtigkeit wirklich dem Gebrauche dieser Mittel zuzuschreiben? Fände folglich nicht etwa ein Versuch mit diesen Mitteln statt, wo man im Falle einer Kurzsichtigkeit einige Ursach hätte, eine zu große Dichtigkeit der Feuchtigkeiten und durchsichtigen Theile des Auges zu vermuthen? Fände nicht ein solcher Versuch überhaupt bey jeder Kurzsichtigkeit statt, deren Ursach man nicht errathen kann, und die so stark ist, daß Palliativmittel wenig nutzen?

S. 496.

Die zweyte Ursache der Kurzsichtigkeit. Auch bey gehdriger Brechung der Lichtstrahlen im Auge
müssen

müssen sich dennoch die Lichtstrahlen in eine focus vereinigen, ehe sie die retina berühren, wenn die Hornhaut oder Krystallinse zu sehr von der retina entfernt, d. i. wenn der Augapfel zu lang ist. Es ist daher nicht zu zweifeln, daß die widernatürliche Länge des Augapfels eine Hauptursach der Kurzsichtigkeit seyn kann. Zuweilen ist diese widernatürliche Verlängerung und Größe des Augapfels sichtbar und deutlich, und die Folge einer andern Augenkrankheit, des Staphyloms, der Augenwassersucht, einer Geschwulst in der Augenhöhle, zur Seite des Augapfels, die den Augapfel durch ihren Druck verlängert. Wirklich entsteht zu Anfange dieser Krankheiten eine Kurzsichtigkeit, und offenbar ist dieselbe der Verlängerung des Augapfels zuzuschreiben. — Die Größe eines gesunden Auges hängt von der Menge der Feuchtigkeiten ab, die sich in demselben absondern, und ist veränderlich, je nach dem sich diese Absonderung durch zufällige Ursachen vermehrt oder vermindert. Man sieht daraus theils, daß alles was die Absonderung der Augenfeuchtigkeiten vermehrt, einen geringern oder stärkern Grad von Myopie verursachen kann, und theils daß selbst ein gesundes Auge zu einer Zeit einen geringen Grad von Kurzsichtigkeit, zu einer andern Zeit einen gewissen Grad von Weitsichtigkeit haben kann. Die Bollsaftigkeit des jugendlichen Alters, die sich mit zunehmenden Jahren mindert, macht es begreiflich, daß auch aus dieser Ursache junge Personen zur Kurzsichtigkeit geneigt sind, und daß sich dieser Fehler mit den Jahren mindert. — Es kann endlich auch der Aug-

Augapfel von seiner ersten Bildung an ungewöhnlich groß und lang seyn.

S. 497.

Die Erkenntniß und Kur dieser zweyten Hauptursache der Kurzsichtigkeit ist gleichfalls mit mancherley Schwierigkeiten verbunden. Ist sie die Folge einer andern Augenkrankheit, z. E. der Augenwassersucht, so erkennt man sie freylich gar leicht, und ihre Heilung hängt von der Heilung der Hauptkrankheit ab, deren Symptom sie ist. Ist das Auge aber übrigens gesund, so wird es mehrentheils sehr schwer seyn, zu bestimmen, ob der Augapfel zu lang ist, oder nicht; und falls er es wäre, würde es eben so schwer seyn, seine Größe auf den Grad zu mindern, daß der focus der Lichtstrahlen auf die retina fällt. Außere zusammenziehende Mittel, oft wiederhohlte Purgiermittel, oder andre Ausleerungen (s. das Kapitel von der Augenwassersucht) könnten vielleicht eine Verminderung der Größe des Augapfels bewirken, die aber immer nur sehr geringe, und von kurzer Dauer seyn würde. Und die Eröffnung der Hornhaut und Ausleerung der wässerichten Feuchtigkeit, deren bereits im vorhergehenden (S. 493) gedacht worden ist, wird theils wegen der unsichern Erkenntniß der Ursache, theils wegen ihrer ungewissen Wirkung selten anwendbar seyn.

S. 498.

Die dritte Hauptursache. Ein jedes gesundes Auge siehet den Gegenstand, den es betrachtet,
immer

immer in einer gewissen bestimmten Entfernung am allerdeutlichsten. Dieser Entfernungspunkt oder Gesichtspunkt (*punctum visionis distinctae*) ist bey jedem Auge verschieden. Ein kurzsichtiges oder lang-sichtiges Auge siehet den Gegenstand in einem hohen Grade undeutlich, so bald er aus diesem Punkte verrückt wird, das ist, so bald er sich mehr nähert, oder entfernt. Ein gesundes Auge aber sieht ihn zwar immer in diesem Punkte auch am allerdeutlichsten, aber doch auch in einer großen Entfernung von diesem Punkte, d. i. um vieles näher, oder um vieles weiter noch in einem sehr hohen Grade deutlich. Es ist kaum glaublich, daß das Auge Gegenstände in so verschiedener Entfernung in einem so hohen Grade deutlich sehen könnte, wenn nicht eine Veränderung in ihm vorginge, die es abwechselnd dazu geschickt machte; d. i. wenn es nicht anders beschaffen wäre, indem es entfernte, anders indem es nahe Gegenstände siehet. Diese Veränderung sey, welche sie wolle, (Haller *Element. Physiol. Tom. V. p. 509. Olbers Diff. de mutationibus oculi internis, Gotting. 1780: Memoires sur le Mecanisme, par lequel l'Oeil s'accomode aux differentes distances des Objets par M. Roi*) das Vermögen oder die Kraft, wodurch dieselbe im Auge hervorgebracht wird, wodurch das Auge in den Stand gesetzt wird, nahe und entfernte Gegenstände in einem hohen Grade deutlich zu sehen, kann auf eine dreyfache Art fehlerhaft werden. Sie ist nämlich entweder geschwächt; oder das Auge hat sie ganz und gar verloren; oder aber das Auge hat bloß die Kraft, sich

zu

zu nahen Gegenständen zu accommodiren, nicht zu entfernten.

S. 499.

Es giebt Personen, die wenn sie, nachdem sie eine Zeitlang einen nahen Gegenstand betrachtet haben, plötzlich einen entfernten anschauen, einige Zeitlang warten müssen, ehe sie denselben deutlich erblicken, und diese befinden sich in dem ersten Falle, der nicht selten ist. Derjenige, der sich im zweyten Falle befindet, sieht den Gegenstand in einer gewissen bestimmten Entfernung ganz vollkommen deutlich, immer aber sogleich höchst undeutlich, ja gar nicht, so bald er ihn aus diesem Gesichtspunkte verrückt, d. i. nähert, oder entfernt. Diesen seltnern Fall beobachtet man zuweilen bey Kurzsichtigen und Weitsichtigen. Der dritte Fall ist die dritte Hauptursache der Kurzsichtigkeit. Daß auf die im dritten Falle angezeigte Art die Kurzsichtigkeit zuweilen wirklich entsteht, machen viele entfernte durch öftere Erfahrungen bestätigte Ursachen derselben glaublich. — Es giebt eine Kurzsichtigkeit, die bloß von Gewohnheit herrührt. Personen nämlich, die beständig oder häufig nahe Gegenstände betrachten, oder Vergrößerungsgläser gebrauchen, die alle Gegenstände nahe vorstellen, werden zuletzt wirklich kurzsichtig, und verlieren das Vermögen, entfernte Gegenstände deutlich zu sehen. Es läßt sich daraus erklären, warum vorzüglich unter den Vornehmern, Gelehrten, Künstlern, selten unter dem Pöbel, der sich selten mit feinen und nahen Gegenständen beschäftigt,

tigt, Kurzsichtige gefunden werden. Wahrscheinlich gewöhnt sich das Auge, indem es immer nahe Gegenstände betrachtet, am den Zustand, in welchem es nahe Gegenstände deutlich siehet, und verliert dadurch das Vermögen, sich zu entfernten Gegenständen zu accommodiren. Man kann diesen Zustand des Auges einigermaßen mit einer anchylosis ex quiete vergleichen.

§. 500.

Zuweilen scheint ein Reiz das Auge auf eine krampfhafte Art in den Zustand zu setzen, in welchem es nahe Gegenstände deutlich sieht, und gehindert wird, sich zu entfernten Gegenständen zu accommodiren. Ein Mann, der in einem sehr hohen Grade hypochondrisch war, bekam zuweilen plötzlich und ohne irgend eine besondere Ursache eine so starke Kurzsichtigkeit, daß er kaum über sechs Zoll weit deutlich sehen konnte. Selten dauerte dieselbe über zwey Tage. Ein Mensch, der seit einem Jahre in einem sehr hohen Grade kurzsichtig gewesen war, empfand eine große Verminderung der Kurzsichtigkeit bey dem fortgesetzten Gebrauche eines lauwarmen Augenbades von einer Abkochung der weissen Mohrköpfe. Man hat Fälle beobachtet, wo Kranke während einer Augenentzündung kurzsichtig waren, und nachdem die Entzündung gehoben war, es wieder aufgehört zu seyn. — Zuweilen scheint die Kurzsichtigkeit vielmehr von einer Lähmung oder Schwäche der Kraft herzurühren, die das Auge zu entfernten Gegenständen accommodirt. Zwar ist die Kurzsichtig-

felt

keit öfters der Zufall eines gereizten, und die Weit-
sichtigkeit vielmehr die Folge eines geschwächten Auges.

S. 501.

Bei der Kurzsichtigkeit findet eine doppelte Kur-
methode statt; die Palliativkur, und die Radikal-
kur. Die Palliativkur bewerkstelligt man vorzüglich
durch den Gebrauch concaver Brillen, welche die
Lichtstrahlen von einander entfernen, und folglich
verursachen, daß sie von einem entfernten Gegen-
stande so ins Auge fallen, als wenn sie von einem
nahen kämen. Der Grad der Ausbuchtung der Brille
muß dem Grade der Kurzsichtigkeit angemessen seyn,
d. i. der focus der concaven Brille muß in Absicht
seiner Länge dem punctum visionis distinctae des
kurzsichtigen Auges angemessen seyn. Die Empfin-
dung des Kranken bestimmt es gemeiniglich am zu-
verlässigsten, ob er es ist oder nicht. Indessen muß
sich der Kranke wohl hüten, Brillen zu wählen,
deren focus auch nur um etwas wenig, kürzer,
als nöthig, ist; er vermehrt durch dergleichen Bril-
len den Grad seiner Kurzsichtigkeit allmählig immer
mehr und mehr. — Selbst die bloße Röhrenbrille
ohne Gläser, deren im vorhergehenden (Kapitel von
der Mydriasis) bereits gedacht worden ist, schafft
den Kurzsichtigen oft vielen Nutzen, indem sie die
Lichtstrahlen, die von den Gegenständen zur Seite
ins Auge fallen, abhält, der Pupille folglich Ge-
legenheit giebt, sich stark zu erweitern, und das Auge
in den Stand setzt, entfernte Gegenstände deutlicher
zu sehen. Gemeiniglich bemerkt man, daß Kurz-
sichtige

sichtige aus eigener Empfindung die Augenlider zusammenziehen, wenn sie entfernte Gegenstände betrachten; ohne Zweifel leisten die zusammengezognen Augenlider dasselbe, was die Röhrenbrille thut.

S. 502.

Diese Palliativmittel sind von so allgemeinem Gebrauche, daß Kranke dieser Art selten an eine Radikalkur denken: selten ist auch dieselbe nöthig, da die Palliativmittel meistentheils hinreichende Dienste thun; selten ist sie endlich auch möglich. — Indessen giebt es dennoch Fälle, wo sie wirklich möglich und nöthig ist. Nöthig: denn es giebt Fälle von einem so hohen Grade der Kurzsichtigkeit, daß der Kranke ohne Brille in der Entfernung weniger Schritte bey nahe gar nichts siehet, und fast blind ist; ja daß selbst die Brille, so stark sie auch concav ist, wenig Nutzen schafft. Möglich ist sie auch zuweilen, zumal wenn die Krankheit von einer gewissen, bestimmten heilbaren Ursache entsteht; ja sogar auch dann zuweilen, wenn die Ursache derselben ungewiß, oder ganz unbekannt ist. Es ist höchstwahrscheinlich, daß in vielen Fällen eine Kurzsichtigkeit, die durch Gewohnheit entstanden ist, durch eine gegenseitige Gewohnheit wieder gehoben werden kann, und daher in dem Falle einer solchen Kurzsichtigkeit rathsam, dem Kranken die Regel zu geben, sich der Brillen so selten als möglich zu bedienen; so selten als möglich nahe und feine Gegenstände, und hingegen so oft und lange als möglich entfernte Gegenstände anzuschauen. — Ist eine besondere Krankheitsursach,

Richt. Wundarzneyk. III. B. Zi sie

ſie ſey von welcher Art ſie wolle, kurz vor Entſtehung der Kurzsichtigkeit beobachtet worden, ſo iſt man berechtigt, dieſe für die Urſache der Kurzsichtigkeit zu halten, und ihrer Natur gemäß zu behandeln; zumal da die Erfahrung zeigt, daß Krankheitsſtoffe von allerhand Art auf die Augen wirken, und mancherley oft unerklärbare Geſichtsfehler erregen, wovon theils ſchon im Vorhergehenden gehandelt worden iſt, theils im Folgenden noch gehandelt werden wird.

S. 503.

Auch wenn gar keine wahrſcheinliche Urſache entdeckt wird, laſſen ſich dennoch in dem kurz vorher (S. 500) angezeigten äußerſten Grade der Kurzsichtigkeit, einige Mittel zur Radikalkur verſuchen, die die Krankheit wo nicht heben, doch vielleicht mindern. Warum ſollte man nicht ohne Rückſicht auf irgend eine Urſache, bloß um die Brechung der Lichtſtrahlen im Auge zu mindern, Queckſilbermittel oder flüchtige alkalische Salze verſuchen, da Erfahrungen es wahrſcheinlich machen, daß dieſe Mittel die Dichtigkeit der gläſernen Feuchtigkeit zuweilen mindern? Warum ſollte man nicht auf die bereits obenbeſchriebene Art die Hornhaut öffnen, und das Auge eine Zeit lang in einem Zuſtande der Ausleerung erhalten, um durch Verkürzung des Augapfels und Verminderung der Converitat der Hornhaut, die Kurzsichtigkeit zu mindern, auch wenn ſie nicht von einer zu ſtarken Converitat der Hornhaut, oder ungewöhnlichen Lange des Augapfels herrührt? Und ſollte man nicht in dem Falle einer äußerſten Kurzsichtigkeit

feit es versuchen dürfen, die Krystalllinse niederzudrücken, oder auszuziehen, um die Brechung der Lichtstrahlen zu mindern?

§. 504.

Die Weitsichtigkeit (presbyopia) ist ein gegenseitiger Fehler. Der Weitsichtige siehet entfernte Gegenstände deutlich, nahe undeutlich. Man findet diesen Fehler am häufigsten bey ältern Personen, und so, wie die Kurzsichtigkeit in einem verschiednen Grade. In einem weitsichtigen Auge vereinigen sich die Lichtstrahlen zu spät in einen focus, d. i. sie berühren die retina ehe sie sich in einen focus vereinigen; der focus der Lichtstrahlen würde, wenn dieselben durch die hintern Häute des Auges dringen könnten, hinter die retina fallen. Die Ursach ist dreyfach: nämlich die Brechung der Lichtstrahlen im Auge ist entweder zu schwach; oder der Augapfel ist zu kurz; oder die Kraft, die das Auge zu nahen Gegenständen accommodirt, ist schadhast.

§. 505.

Die erste Hauptursach; die verminderte Brechung der Lichtstrahlen im Auge rührt entweder von der zu flachen und nicht genug gewölbten Gestalt der durchsichtigen Hornhaut her, oder von einer ähnlichen Gestalt der Krystalllinse, oder von einer verminderten Dichtigkeit der Säfte und durchsichtigen Theile des Auges. Die Wirkungsart dieser Ursachen läßt sich aus dem, was unter der Kurzsichtigkeit von dem gegenseitigen Zustande dieser Theile gesagt worden ist, erklären. Die geminderte Con-

verität der Hornhaut ist mehrentheils die Folge der Saftlosigkeit des zunehmenden Alters, oder der verminderten Absonderung der Augenfeuchtigkeiten bey heftigen entkräftenden mit starken Ausleerungen verbundenen Krankheiten; zuweilen ist sie die Folge einer Wunde oder eines Geschwürs der Hornhaut. Selten rührt sie von der ersten Bildung her, denn selten trifft man unter Kindern und jungen Leuten Weitichtige an. Die Erkenntniß dieser fehlerhaften Beschaffenheit der Hornhaut ist leicht, die Heilung aber unmöglich. Die Weitichtigkeit, welche die Folge entkräftender und mit starken Ausleerungen verbundner Krankheiten ist, verliert, oder vermindert sich zuweilen, so wie der Kranke wieder Säfte und Kräfte erhält.

§. 506.

Die zu schwache Converität der Krystallinse kann eine Folge der Saftlosigkeit des Alters, oder der häufigen Ausleerungen, und der Austrocknung des Körpers bey fieberhaften Krankheiten seyn; oder sie kann in seltnern Fällen gleichfalls von der ersten Bildung herrühren. Es giebt kein gewisses Zeichen, diese mögliche Ursache der Weitichtigkeit zu erkennen; kein Mittel, sie zu heben. — Zu dieser Gattung der Ursachen gehört auch der gänzliche Verlust der Krystallinse bey der Staaroperation, nach welcher bekanntlich jederzeit eine Weitichtigkeit erfolgt. — Die verminderte Dichtigkeit der Feuchtigkeiten des Auges ist man freylich berechtigt, als eine Ursache der Weitichtigkeit zu betrachten, aber außer
Stande,

Stande, zu erkennen, und zu heilen. Daß sie zuweilen von dem Mißbrauche auflösender Mittel, vorzüglich der flüchtigen Laugensalze und des Quecksilbers veranlaßt wird, ist, wie bereits oben erinnert worden ist, vermöge verschiedner Erfahrungen (Marat, on a singular Disease of the Eye) wahrscheinlich. Vielleicht läßt sich in solchen Fällen die natürliche Dichtigkeit der Säfte, wo nicht gänzlich, doch zum Theil, durch stärkende zusammenziehende Mittel wieder herstellen.

§. 507.

Die zweyte Hauptursach, die widernatürliche Verkrüzung des Augapfels, kann von der ersten Bildung herrühren, kann die Folge der Safftlosigkeit des zunehmenden Alters, oder häufiger Ausleerungen, oder einer jeden Entkräftung seyn. Zuweilen befindet sich das Auge wirklich in einem atrophischen Zustande, der von innern Ursachen herrührt, oder die Folge einer starken Ausleerung der Augenfeuchtigkeiten bey Gelegenheit einer Augenwunde oder Operation ist. In allen diesen Fällen ist wenig Hülfe zu erwarten. Die Weitsichtigkeit, welche die Wirkung entkräftender Ursachen ist, vermindert sich, wie bereits im vorhergehenden gesagt worden ist, zuweilen, so wie die Kräfte wieder kommen.

§. 508.

Zur Erläuterung der dritten Hauptursache der Weitsichtigkeit gilt alles, was bey Gelegenheit der dritten Hauptursache der Kurzsichtigkeit gesagt worden ist. Auch die Weitsichtigkeit rührt zuweilen, je-

Doch seltner als die Kurzsichtigkeit, bloß von Gewohnheit her; von der Gewohnheit entfernte Gegenstände oft und lange, und nahe selten zu betrachten, und von dem Mißbrauche der Ferngläser. — Auch die Weitsichtigkeit wird zuweilen durch innere Krankheitsursachen, die indem sie aufs Auge wirken, das Vermögen desselben, sich zu nahen Gegenständen zu accommodiren, hindern oder schwächen, erregt. Selten aber sind diese Krankheitsursachen reizend, öfter schwächend. Sehr oft müssen sich Personen nach heftigen entkräftenden Fiebern der Brillen bedienen, die vorher ganz gesunde Augen hatten. Ein Mann war abwechselnd bald weitsichtig, bald nicht. Der Zustand seiner Augen schien einzig und allein von dem Zustande seines Magens abzuhängen. So oft er eine Indigestion hatte, mußte er sich der Brille bedienen, so bald diese gehoben, und sein Magen gestärkt war, sahe er ohne Brille. Ein anderer sahe des Morgens ohne Brille, des Nachts mußte er sich derselben bedienen.

§. 509.


Die Radikalkur der Weitsichtigkeit ist im Ganzen noch schwerer als die Radikalkur der Kurzsichtigkeit. Auch vermindert sich dieselbe nicht so, wie die Kurzsichtigkeit, sondern vermehrt sich vielmehr mit zunehmendem Alter. Indessen giebt es dennoch einige Fälle, wo man etwas mit einiger Hoffnung gegen dieselbe unternehmen kann. Rührt dieselbe von entkräftenden Ursachen her; oder ist sie, wie nicht selten der Fall ist, mit Zufällen einer allgemei-

nen,

nen, oder einer Augenschwäche verbunden, so hat man offenbar Hoffnung durch innere allgemeine, und äußere örtliche stärkende Mittel einigen Nutzen zu schaffen. Hat man Ursach zu glauben, daß sie von irgend einer allgemeinen innern Ursache herrührt, so ist man offenbar berechtigt, mit einiger Hoffnung gegen diese Ursache zu handeln. Die Weitsichtigkeit durch Gewohnheit läßt sich vielleicht eben sowohl durch eine gegenseitige Gewohnheit mindern, als die Kurzsichtigkeit von dieser Art.

§. 510.

In den meisten Fällen muß man sich mit der Palliativkur begnügen; und dieselbe besteht in dem Gebrauche Converer Brillen. Diese Brillen stärken und erhellen zugleich das Gesicht, indem sie die Lichtstrahlen, die außs Auge fallen, näher zusammen bringen, und folglich mehrere ins Auge leiten. Der focus dieser Brillen muß gleichfalls dem Grade der Weitsichtigkeit angemessen seyn: sind sie stärker convex, als eben nöthig ist, so vermehren sie nicht allein die Weitsichtigkeit sondern schwächen auch überhaupt das Auge. Man kann auf einem Auge weitsichtig, auf dem andern kurzsichtig seyn (Journal de Medecine Tom. XIX. Strack): am häufigsten kann sich dieser Fall nach der Staaroperation ereignen. Die Brille muß in einem solchen Falle zweyerley Gläser, auf der einen Seite ein hohles, auf der andern ein convexes haben.



Das neunzehnte Kapitel.

Von den

Flecken und Funken vor den Augen.

S. 511.

Personen, die diesen Augenfehler (Myodesopsia, Crupsia, Photopsia) haben, sehen Gegenstände, die nicht wirklich da sind. Diese Erscheinungen sind von mancherley Art: die gewöhnlichsten sind schwarze Punkte oder Flecken, halbdurchsichtige Blasen, gerade oder schlangenförmige Striche, netzförmige Gestalten, Spinnen, herabfallende Sterne, feurige Funken, Strahlen u. s. w. Alle diese Erscheinungen verhalten sich verschiedentlich: der Kranke nämlich sieht sie immer, oder nur zuweilen. Im letzten Falle erscheinen sie vorzüglich, wenn er helle Gegenstände, z. E. eine weiße Wand, den Schnee, helle lichte Wolken ansieht. Betrachtet er dunklere Gegenstände, oder befindet er sich an einem weniger erleuchteten Orte, so bemerkt er sie ganz und gar nicht. Selten siehet er sie, indem er nahe Gegenstände betrachtet, gemeiniglich nur oder vorzüglich dann, wenn er nach entfernten Gegenständen sieht. Am häufigsten und deutlichsten erscheinen sie gemeiniglich, wenn er aufwärts gen Himmel sieht. — Zuweilen erblickt der Kranke diese Erscheinungen nur oder vorzüglich, indem er die Augen bewegt; sobald er

er die Augen unbeweglich still hält, verschwinden sie. — Sie sind ferner beweglich oder unbeweglich. Die Erscheinungen erster Art schwimmen vor den Augen herum, und befinden sich bald über, bald unter, bald zur Seite der Sehaxe. Sie bewegen sich auch wenn das Auge nicht bewegt wird. Ihre gewöhnlichste Bewegung ist von oben herabwärts. Die unbeweglichen folgenden Bewegungen des Auges, und stehen still, wenn dieses still steht, bleiben aber bey den verschiedenen Bewegungen des Auges immer in derselben Stellung in Rücksicht auf die Sehaxe. — Endlich sind alle diese Erscheinungen gefärbt oder ungefärbt, schattig, schwarz: ein wichtiger Unterschied, wie im folgenden erhellen wird.

S. 512.

Es ist sehr schwer, in jedem Falle die nächste Ursache dieser Erscheinungen zu bestimmen; indessen läßt sich mit vieler Wahrscheinlichkeit behaupten, daß jederzeit eine von folgenden drey Ursachen zum Grunde liegt. Ein Reiz, der auf den Augennerven wirkt, und in demselben dieselben Empfindungen erregt, die sonst nur durch die Wirkung eines äußern Gegenstandes auf denselben erregt werden: eine Schwäche oder gänzliche Lähmung irgend einer einzelnen Stelle der retina, welche die Lichtstrahlen nicht empfindet; und eine einzelne Verdunkelung in irgend einem durchsichtigen Theile des Auges, welche die Lichtstrahlen aufhält, und einen umgränzten Schatten auf die retina wirft. Verdunkelungen dieser Art können dergleichen Erscheinungen nur als-

dann verursachen, wenn sie im hintersten Theile der gläsernen Feuchtigkeit befindlich sind. Erfahrungen und optische Gründe zeigen auf eine unwidersprechliche Art, daß Verdunkelungen in der Hornhaut, der wässerichten Feuchtigkeit, der Krystallinse und dem vordern Theile der gläsernen Feuchtigkeit keinen umgränzten Schatten auf die retina werfen, nicht einen einzelnen Theil des Gegenstandes unsichtbar machen, sondern indem sie Lichtstrahlen von allen Theilen des Gegenstandes aufhalten, das ganze Bild des Gegenstandes schwächen. Wahrscheinlich ist daher ein Irrthum in denen Fällen zu vermuthen, wo man (Pellier) beobachtet haben will, daß dergleichen Erscheinungen von einem verdunkelten Körper in der wässerichten Feuchtigkeit entstanden, und verschwunden sind, nachdem derselbe ausgenommen worden ist.

S. 513.

So schwer es auch oft ist, in jedem Falle zu bestimmen, welche von diesen drey Ursachen die Krankheit zunächst veranlaßt, läßt sich dennoch folgendes mit Wahrscheinlichkeit behaupten. Alle glänzende und gefärbte Erscheinungen rühren von einem Reize her, der auf den Augennerven wirkt; von Verdunkelungen in der gläsernen Feuchtigkeit, und einzelnen Lähmungen der retina können bloß schattige oder schwarze Gestalten entstehen. — Alle Erscheinungen, die auch im dunkeln, oder gar bey geschlossnen Augenlidern bemerkt werden, wie auch diejenigen, die bey ganz stillstehenden Augen sich hin und her

her bewegen, rühren von einem Fehler des Augennerven, nicht von Verdunkelungen in der gläsernen Feuchtigkeit her. — Auch diejenigen, die unbeständig sind, zuweilen erscheinen, zuweilen wieder verschwinden, können nicht, von Verdunkelungen her rühren. — Nezförmige Gestalten entstehen vielleicht von Stockungen und Verdickungen in den Gefäßen der retina oder der Haut der gläsernen Feuchtigkeit. — Die halbdurchsichtigen Gestalten, die Blasen und dünnen Wolken lassen sich vielleicht von einer anfangenden Verdunkelung, oder von der geschwächten Empfindung einer Stelle in der retina herleiten.

S. 514.

Zuweilen läßt sich die nähere Ursache dieses Augensehlers aus allerhand Nebenzufällen errathen, die mit demselben in Verbindung zu stehen, oder auf denselben zu wirken scheinen. Jemehr man überhaupt Veränderungen in diesen Erscheinungen, so wohl in Absicht ihrer Menge und Gestalt, als auch ihrer Bewegung und Deutlichkeit bemerkt, desto wahrscheinlicher ist die Ursach derselben ein Reiz, der auf den Augennerven wirkt. — Ist der Kranke vorzüglich bey feuchter und kalter Witterung, z. E. im Herbst und Winter, weniger im Sommer oder bey trockner Witterung mit diesen Erscheinungen vor den Augen beschwert, ein häufiger Fall, so hat man Ursach zu vermuthen, daß ein Reiz an der Krankheit schuld ist, der durch freye Ausdünstung gemindert, durch geminderte Ausdünstung vermehrt wird. —
Werden

Werden diese Erscheinungen vor den Augen vorzüglich häufig und merklich, wenn der Kranke die Augen eine Zeitlang angegriffen, z. E. feine Schrift gelesen, oder helle Gegenstände angesehen hat, so ist man berechtigt, zu glauben, daß Schwäche und widernatürliche Empfindlichkeit der Augen den vorzüglichsten Antheil an der Krankheit haben. — Siehet der Kranke alle Gegenstände, auch diejenigen, welche durch die Erscheinungen vor den Augen nicht bedeckt sind, schwach und undeutlich, so ist man berechtigt, Schwäche, Trägheit, und geminderte Empfindlichkeit des Augennerven zu vermuthen. Diese kann man nicht vermuthen, wenn der Kranke, wie oft geschieht, übrigens ein scharfes Gesicht hat.

§. 515.

Scheint ferner der Augenfehler in Verbindung mit einem fehlerhaften Zustande der Eingeweide des Unterleibes zu stehen, ein sehr häufiger Fall; nimmt der Augenfehler zu, so oft in diesen vorzüglich Unordnungen bemerkt werden, mindert er sich, wenn diese Unordnungen gehoben sind, so ist derselbe bloß einem consensuellen Reize zuzuschreiben, der sich in den Eingeweiden des Unterleibes befindet, und auf den Augennerven wirkt. — Schwäche und widernatürliche Empfindlichkeit des Auges ist oft bloß eine Folge der Schwäche und widernatürlichen Empfindlichkeit der Eingeweide des Unterleibes. — Zuweilen, vermehren und verstärken sich die Erscheinungen vor den Augen, so oft sich der Kranke durch irgend etwas, z. E. durch körperliche Bewegungen, Speisen und

und Getränke u. s. w. erhitzt, und in diesem Falle läßt sich die Krankheit mit vieler Wahrscheinlichkeit von dem Drucke der angefüllten Blutgefäße in der retina herleiten. Zuweilen findet man im Gegentheil, daß der Kranke besser siehet, so oft er etwas stärkendes genießt. — Oft freylich leitet den Wundarzt nichts auf die Spur der nächsten Ursache der Krankheit; indessen gelangt er auch dann zuweilen zum Endzwecke, wenn er auf die entfernte Ursache der Krankheit siehet; und eine Kurmethode wählt, die dieser angemessen ist.

S. 516.

Die entfernten Ursachen dieser Augenkrankheit lassen sich in drey Klassen theilen. Zu der ersten Klasse kann man alle Reize rechnen, die unmittelbar oder mittelbar aufs Auge wirken. Der allers häufigste Sitz dieser Reize ist in den Eingeweiden des Unterleibes. Schwäche, widernatürliche Empfindlichkeit und Reizbarkeit dieser Eingeweide und Stockungen und Schärpen in denselben sind die allergewöhnlichsten, und oft einzigen Ursachen dieser Augenkrankheit. Sehr oft ist dieselbe bloß ein Symptom der Hypochondrie; nicht selten die Folge venerischer Ausschweifungen, wodurch die Eingeweide des Unterleibes geschwächt werden; zuweilen gastrischer Fieber, oder anderer Krankheiten des Unterleibes, die schlecht behandelt worden sind. Gar oft sind Kranke, die mit dieser Augenkrankheit behaftet sind, zu gleicher Zeit, und aus gleichen Ursachen mit Hämorrhoidalzufällen beschweret, die man oft

oft fälschlich für die Ursach der Augenbeschwerden hält, da sie gemeiniglich bloß eine Mitwirkung derselben Ursache, die die Augenkrankheit erregt, der Schwäche und Reizbarkeit der Eingeweide des Unterleibes sind.

S. 517.

Auch Reize anderer Art verursachen diesen Augenfehler zuweilen. Oft ist er die Folge einer unterdrückten Ausdünstung; auch ist es nichts ungewöhnliches, daß er sich im Sommer mindert, im Herbst und Winter verschlimmert. Zuweilen entsteht er von Hautauschlägen, die unbehutsam abgetrocknet, oder zurück getrieben worden sind. Ein Reiz in der Nase, z. E. bey dem Catarrh, erregt ihn zuweilen, zuweilen erregen ihn Würmer. Bey Erschütterungen des Kopfs durch einen Stoß, Fall, durch heftiges Niesen oder Erbrechen entstehen bekanntlich allerhand Erscheinungen vor den Augen. Selbst der Reiz eines starken Lichts veranlaßt die Krankheit zuweilen. Diejenigen, welche einen hellen Gegenstand lange betrachten, in die Sonne sehen, bey hellem Sonnenscheine in einer beschneieten Gegend verweilen, bekommen Funken und allerhand Erscheinungen vor den Augen, die sie oft lange, ja beständig behalten. — Mit einem Worte alle Reize von welcher Art sie auch sind, und der gewöhnlichern ist bereits im Kapitel vom schwarzen Staar gedacht worden, können wenn sie aufs Auge wirken, diese Augenkrankheit veranlassen. — Es scheint sogar, daß eine lebhaftere Einbildungskraft dergleichen Er-

scheinun-

Scheinungen zuweilen beynahe willkürlich erregen kann. Es giebt wenigstens Personen, welche versichern, daß, so oft sie ihre Augen unbeweglich halten, und in einen mäßig erhellten Ort schauen, sie jederzeit allerhand Gestalten und Bilder vor den Augen vorbehey gehen sehen, die sie sonst bey keiner andern Gelegenheit sehen.

S. 518.

Die Ursachen der zweyten Klasse schwächen, und vermindern entweder die Empfindlichkeit des Auges zu gleicher Zeit, oder sie vermehren sie. Im ersten Falle nähert sich der Zustand des Auges mehr oder weniger einer Fühllosigkeit oder Lähmung; im zweyten Falle befindet sich das Auge in einem hysterischen Zustande, in welchen auch geringe Reize, die sonst nicht aufs Auge wirken, unordentliche und widernatürliche Empfindungen in demselben erregen. Der Ursprung dieser Augenschwäche ist von dreyfacher Art. Sie ist nämlich entweder bloß die consensuelle Wirkung der Schwäche irgend eines andern Theils, am häufigsten der Schwäche der ersten Wege, so daß es einzig und allein darauf ankommt, diese zu stärken, und örtliche stärkende Augenmittel ganz und gar nicht erforderlich sind; oder sie ist ein Symptom einer allgemeinen Schwäche des Körpers, und in diesem Falle vorzüglich oft die Folge venerischer Ausschweifungen, mehrentheils jedoch eine späte Folge, denn mehrentheils entsteht sie erst bey zunehmenden Jahren. Nicht selten ist sie auch die Folge heftiger entkräftender mit starken Ausleerungen verbundner Krank-

Krankheiten, vorzüglich übelbehandelter gastrischer Fieber. Sie ist die Folge und der Vorbothe der Ohnmachten, vorzüglich solcher die von starken Ausleerungen entstehen; sehr oft die Folge schwerer entkräftender Wochenbetten u. s. w. — Zuweilen ist die Krankheit bloß die Folge einer örtlichen Augenschwäche, wovon im Kapitel von der Amblyopie gehandelt werden wird. Auch in einem gesunden und starken Auge entsteht sie, und dauert oft kurze, zuweilen lange Zeit, ja manchmal bleibt sie beständig da, wenn man stark erleuchtete Gegenstände, z. E. die untergehende Sonne, eine beschneiete Gegend bey hellem Sonnenschein u. s. w. oft und lange betrachtet. Man hat Ursach, sie in einem solchen Falle einer durch die heftige Wirkung des Lichts erregten örtlichen Augenschwäche zuzuschreiben.

S. 519.

Die Ursachen der dritten Klasse scheinen durch eine widernatürliche Anfüllung der Blutgefäße, und einen dadurch erregten Druck auf den Nerven, oder die retina die Krankheit zu erzeugen. Die Erscheinungen vor den Augen sind in diesem Falle gewöhnlich schwarze Flecken, oder andre Gestalten, die entweder schnell entstehen, und bald wieder verschwinden, oder beständig und unveränderlich da bleiben. Im ersten Falle, der sich gar oft, z. E. bey einer starken Beugung des Kopfs zur Erde, bey einem heftigen Niesen, Schnauben, Husten u. s. w. ereignet, scheinen die Blutgefäße nur einen Augenblick widernatürlich angefüllt, und ausgedehnt zu werden,
und

und sich sogleich wieder zu ihrem vorigen Durchmesser zusammen zu ziehen: im letzten Falle scheint die Ausdehnung anhaltend, und das ausgedehnte Gefäß in einem varicosen Zustande zu seyn. Erfahrungen zeigen, daß diese Augenkrankheit nach hitzigen Fiebern mit Nasereyen zurückbleibt. Zuweilen ist sie ein Hämorrhoidalzufall; zuweilen der Vorbo he des Nasenblutens; zuweilen die Folge der gestopften monatlichen Reinigung, der Insolation, einer starken Anstrengung der Kräfte u. s. w. und in allen diesen Fällen scheint sie zunächst von der oben angeführten Ursache zu entstehen. Ebenfalls zeigen Erfahrungen, daß sich die Krankheit zuweilen, auch wenn sie alt ist, unvermuthet verliehrt, wenn ein Nasenbluten, oder ein güldner Aderfluß entsteht.

S. 520.

Die bisher genannten meisten Ursachen können in jedem, auch in dem gesündesten und stärksten Auge die Krankheit erregen, indessen ist dennoch nicht zu leugnen, daß sie in schwachen und weitsichtigen Augen am leichtesten entsteht. Kurzsichtige werden selten mit dieser Krankheit beschweret. Oft entsteht sie zugleich mit der Weitsichtigkeit. Daß die Weitsichtigkeit diese Krankheit ganz vorzüglich begünstigt, erhellet auch daraus, daß Kranke dieser Art, die mannichfaltigen Erscheinungen vor den Augen seltener bemerken, wenn sie sehr nahe Gegenstände betrachten, immer desto deutlicher und häufiger sehen, je mehr sie in die Ferne hinsehen, am allerdeutlichsten und häufigsten bemerken, wenn sie in die Luft gehen.

Himmel nach ganz und gar keinem Gegenstande schauen. Widernatürlich empfindliche und schwache Augen sind dieser Krankheit gleichfalls vorzüglich unterworfen. Viele Kranke dieser Art scheuen ein zu starkes Licht, und sehen auch die Gegenstände nicht ganz deutlich, die durch die Erscheinungen vor den Augen nicht bedeckt sind. Indessen ist dennoch auch nicht zu leugnen, daß man die Krankheit nicht selten auch bey starken und übrigens scharf sehenden Augen beobachtet.

§. 521.

Diese Augenkrankheit ist überhaupt schwer zu heilen. Nur selten gelingt es dem Arzte sie gänzlich zu heben. Einige gegründete Hoffnung eines glücklichen Erfolgs hat man, wenn die Ursach der Krankheit deutlich erhellet, und in sich nicht schwer zu heben, oder ganz unheilbar ist. Je mehr Ungewißheit in Absicht der Ursache obwaltet, desto zweifelhafter ist der Erfolg der Kur. — Die unbeständigen, veränderlichen, und beweglichen schwarzen Flecken vor den Augen sind insgemein gutartiger, d. i. leichter zu heben, und weniger mit der Gefahr des gänzlichen Verlusts des Gesichts verbunden, als die fixen unveränderlichen und beständigen. Diese kann man oft als einen anfangenden, oder partiellen schwarzen Star betrachten. Nehmen sie sowohl in Absicht ihrer Menge als auch ihrer Größe zu, so hat man wirklich Ursach eine völlige Blindheit zu fürchten. — Oft aber bleiben diese Flecken zeitlebens unverändert, und hindern übrigens das Gesicht wenig

wenig oder gar nicht: und in diesem Falle thut man am besten, wenn man ganz und gar keine Arzneymittel dagegen gebraucht, die überhaupt selten helfen, und oft-schaden. — Schwarze Flecken gerade in der Sehaye hindern das Gesicht am meisten, und veranlassen zuweilen ein Schielen. Die übelste Gattung der Flecken sind die feurigen, glänzenden, weil sie gemeiniglich mit der Gefahr einer gänzlichen Blindheit verbunden sind.

§. 522.

Bei der Kur verfährt der Arzt auf eine dreysfache Art. Er gründet nämlich die Kuranzeige und Methode auf die entfernte Ursach der Krankheit, wirkt gerade zu gegen diese, ohne übrigens zu untersuchen, auf welche Art und Weise sie die Krankheit erregt: die vorzüglichste, und zuverlässigste Kurmethode. Entdeckt er die entfernte Ursach der Krankheit nicht, oder bleibt die Krankheit unverändert, obgleich die Ursach gehoben ist, so gründet er die Kuranzeige und Methode auf die gegenwärtigen Zufälle und Erscheinungen bei der Krankheit, und hebt auch auf diese Art die Krankheit zuweilen, ohne ihre nächste Ursache zu kennen. Erreicht er auch auf diese Art den Endzweck nicht, oder findet er bei der Krankheit keine Erscheinungen, auf die er eine Kuranzeige gründen kann, so wirkt er zuweilen gerade zu gegen die wahrscheinlichste nächste Ursach der Krankheit.

§. 523.

Die erste und vorzüglichste Kurmethode, welche gegen die entfernten Ursachen der Krankheit gerich-

tet ist, ist von dreyfacher Art, so wie auch alle entfernte Ursachen von dreyfacher Art sind, und sich in drey Klassen eintheilen lassen. Bey den Ursachen der ersten Klasse, welche als Reize mittelbar oder unmittelbar außs Auge wirken, kommt es darauf an, die besondre Gattung des Reizes in jedem besondern Falle ausfündig zu machen, und durch Mittel, die der Natur desselben angemessen sind, zu heben. So verschieden und mannichfaltig die Reize sind, die außs Auge wirken, so verschieden ist in diesem Falle die Kurmethode. Alles was im Kapitel vom schwarzen Staare in Absicht dieser Ursachen gesagt worden ist, gilt auch hier. Auch hier, so wie bey dem schwarzen Staare ist der gewöhnlichste Sitz dieser Reize der Unterleib. — In Fällen, wo die Krankheit von einem Reize zu entstehen scheint, der besondre Reiz aber nicht ausfündig gemacht werden kann, schaffen Mittel, welche die Wirkung eines jeden Reizes auf empfindliche Theile mindern, vorzüglich der Ethersche Spiritus, die valeriana, der hyoscyamus albus, der Minderersche Spiritus, mit Ochsen-galle, das saure Elixir, das castor. galban. die assa foetid. zuweilen vielen Nutzen.

S. 524.

Die zweeny Klasse der Ursachen erfordert stärkende Mittel; bloß örtliche, oder allgemeine, oder solche, die vorzüglich auf die ersten Wege wirken, je nachdem die Krankheit bloß von einer örtlichen Schwäche des Auges, oder von einer allgemeinen Entkräftung des ganzen Körpers, oder bloß von einer

einer Schwäche der ersten Wege zu entstehen scheint. Von allen diesen Mitteln ist bereits im vorhergehenden bey Gelegenheit verschiedner Augenkrankheiten, vorzüglich im Kapitel vom schwarzen Staar gehandelt worden; auch wird im Kapitel von der Amblyopie noch weitläufig davon gehandelt werden. Hier also nur ein paar Bemerkungen in Rücksicht auf die Krankheit, wovon jetzt die Rede ist. — Die Schwäche, wodurch diese Krankheit veranlaßt wird, ist, sie sey von welcher Art sie wolle, zuweilen mit einer widernatürlich verminderten, zuweilen mit vermehrten Empfindlichkeit und Reizbarkeit des Auges oder des ganzen Körpers verbunden. Dies ist in Absicht der Wahl der stärkenden Mittel sehr wohl zu bemerken. Im ersten Falle werden solche stärkende Mittel erfordert, die die Empfindlichkeit erhöhen, wie z. E. der Wein, die Arnika, die spanischen Fliegen u. s. w. im zweyten Falle hingegen solche, die die Reizbarkeit und Empfindlichkeit mindern, wie die China, valeriana u. s. w. — Auch von den vorzüglichsten Mitteln dieser Art ist im vorhergehenden bereits gehandelt worden. — Eine Frauensperson, die nach einem schweren Wochenbette mit dieser Krankheit beschweret war, wurde durch den fortgesetzten Gebrauch der naphtha vitrioli gänzlich davon befreyet. In einem andern Falle, wo die Verdauungskräfte sehr geschwächt waren, und der Kranke zugleich hypochondrisch war, that das Schwalbacher Wasser; und in einem andern ähnlichen Falle, wo der Kranke zugleich oft mit sauren Aufstößen beschweret war, eine Mischung von Ochsgalle und assa foetida vortref-

liche Dienste. — Ein Kranker, dessen ganzes Nervensystem durch venerische Ausschweifungen äußerst geschwächt war, befand sich sowohl in Rücksicht seiner allgemeinen Gesundheit, als auch seiner Augenbeschwerde bey der Beobachtung einer kalten Diät und dem fortgesetzten innern Gebrauch der fixen Luft sehr wohl.

§. 525.

Die Ursachen der dritten Klasse erfordern Ausleerungen, und örtliche stärkende Mittel, welche den ausgedehnten und geschwächten Gefäßen ihren vorigen Durchmesser, und ihre vorige Spannkraft wieder geben. Auch von dieser Behandlungsart ist im Kapitel vom schwarzen Staare bereits gehandelt worden. Es ist gleichviel, durch welchen Weg die nöthigen Ausleerungen geschehen. Findet man indessen eine Anzeige, daß sie die Natur durch einen gewissen bestimmten Weg verlangt, und vorzüglich scheint sie sie oft durch die Hämorrhoidalgefäße zu verlangen, so ist man verbunden, diesen Weg zu wählen. Unter den örtlichen stärkenden Mitteln verdient das kalte Wasser mittelst leinener damit befeuchteter Tücher auf die Augen und das ganze Gesicht applicirt, den Vorzug. Man hat beobachtet, daß ganz allein durch den fortgesetzten Gebrauch dieses Mittels die Krankheit gänzlich gehoben worden ist.

§. 526.

Zuweilen geben die gegenwärtigen Erscheinungen bey der Krankheit dem Arzte eine Anzeige, die ihn

ihn bey der Kur leitet. — Bemerket z. E. der Kranke mancherley Veränderungen sowohl in der Menge, als auch Gestalt, Stellung und Bewegung der Erscheinungen vor den Augen, so hat die Krankheit wahrscheinlich ihren Grund in einem Nervenreize, und alle Mittel, die Nervenreiz mildern, oder die Empfindlichkeit des Nerven mindern, sind hier angezeigt. — Befindet sich der Kranke bey heiterer trockner Witterung besser, bey feuchter kälter schlimmer, so hat man Ursach zu glauben, daß gehinderte Ausdünstung Antheil an der Krankheit hat, und alle Mittel, wodurch eine freye ungehinderte Ausdünstung bewirkt wird, sind zweckmäßige. — Bemerket der Kranke eine Verschlimmerung der Krankheit, so oft er die Augen eine Zeitlang angestrengt hat, so läßt sich eine Schwäche der Augen vermuthen, und augenstärkende Mittel sind angezeigt. Eben diese Mittel sind angezeigt, wenn der Kranke überhaupt ein schwaches Gesicht hat, und alle Gegenstände, auch die, welche durch die Erscheinungen vor den Augen nicht bedeckt sind, schwach siehet. — Verschlimmert sich die Krankheit, so oft sich der Kranke durch irgend etwas erhitzt, so sind kühlende, ausleerende, ableitende Mittel wahrscheinlich von einigem Nutzen. — Scheint die Augenkrankheit in Verbindung mit dem Zustande der Eingeweide des Unterleibes zu stehen, so muß der Arzt seine Aufmerksamkeit vorzüglich auf diese wenden, und sie reinigen und stärken. — Nimmt die Augenkrankheit zu, so oft sich der Kranke durch irgend etwas schwächt, so sind stärkende Mittel angezeigt; mehrerer solcher Fälle nicht zu gedenken. Der

aufmerksame und scharfsinnige Arzt bemerkt und nutzt jeden Umstand, jede Erscheinung bey der Krankheit, die ihm zur zweckmäßigen Kurmethode Anleitung geben kann.

S. 527.

Am unsichersten geht man, wenn man eine Kurmethode wählt, die unmittelbar gegen die wahrscheinlichste nächste Ursach der Krankheit gerichtet ist, d. i. auflösende Mittel giebt, wenn man (S. 512, 513) eine Verdunkelung und Stockung in der gläsernen Feuchtigkeit vermuthet, nervenreizende und stärkende Mittel anwendet, wenn man Ursach hat, zu glauben, daß die Krankheit von einer einzelnen Lähmung oder Schwäche in der retina herrührt; reizmildernde und besänftigende Mittel, wenn sich Nervenreiz vermuthen läßt. Die Erkenntniß der nächsten Ursache ist in den meisten Fällen so zweifelhaft, daß die dagegen gerichtete Kurmethode nothwendig auch sehr ungewiß ist. Und dennoch ist der Arzt zuweilen genöthigt, diesen Weg zu gehen, wenn er auf den vorher angezeigten nicht zu seinem Endzwecke gelangt. — Genug von einer Krankheit, deren Behandlung übrigens das Geschäft eines Arztes ist.



Das zwanzigste Kapitel.

Von

verschiedenen Gattungen des fehlerhaften
Gesichts.

S. 528.

Es giebt Personen, die von Jugend auf nicht im Stande sind, Farben von einander zu unterscheiden. Ein Mann, der diesen besondern Gesichtsfehler hatte, (Philos. Transactions Vol. LXVIII. Part. II.) kannte die grüne Farbe ganz und gar nicht. Grün und roth schien ihm einerley zu seyn. Gelb und blau unterschied er sehr leicht. Im dunkelroth und dunkelblau irrte er sehr oft. Uebrigens hatte er ein gesundes und scharfes Gesicht. Der Vater des Kranken war mit demselben Fehler behaftet. Die Mutter und eine Schwester waren frey davon. Eine andre Schwester und zwey ihrer Kinder hatten ihn. Der Kranke selbst hatte ein paar Kinder, die frey davon waren. — Ein anderer, der übrigens vollkommen gesunde Augen, und ein scharfes Gesicht hatte, konnte dunkelgrün nicht von dunkelroth unterscheiden.

S. 529.

Zuweilen siehet das Auge Gegenstände anders gefärbt, als sie wirklich sind. Die Schuld liegt
zuwei-

zuweilen nicht im Auge, sondern an einem unreinen und gefärbten Lichte, welches den Gegenstand erleuchtet. So siehet man z. E. bey einem schlechten Talglichte, welches eine gelbe Flamme hat, alle Gegenstände gelb; bey brennendem Brandwein alle Gegenstände bläulich gefärbt; und überhaupt sieht man jeden Gegenstand nur bey Sonnenlichte mit seiner reinen natürlichen Farbe. — Zuweilen liegt die Schuld in den durchsichtigen Theilen, und den Feuchtigkeiten des Auges, welche durch irgend einen Zufall widernatürlich gefärbt sind. So sehen Kranke, die die Gelbsucht in einem hohen Grade haben, alle Gegenstände gelb, weil die durchsichtigen Theile ihres Auges gelb gefärbt sind. Wenn nach einer äußern Beschädigung des Auges extravasirtes Blut die wässerichte Feuchtigkeit roth färbt, sieht der Kranke alle Gegenstände roth; und weiß sieht er sie, wenn der Milchstaar bey der Niederdrückung die wässerichte Feuchtigkeit weiß färbt. — Zuweilen ist dieser Gesichtsfehler die Folge des fortdauernden Eindrucks. Wenn man einen hellgefärbten Gegenstand; z. E. eine hellrothe oder gelbe Wand worauf die Sonne schien, eine Zeitlang angeschauet hat, hat man oft dieselbe Farbe noch lange vor Augen, ob man den gefärbten Gegenstand gleich nicht mehr ansieht. Es giebt Augen, die zu dergleichen fortdauernden Eindrücken, auch von weniger hellen Gegenständen, sehr geneigt sind; immer aber verräth diese Disposition ein schwaches sehr empfindliches Auge. — Die häufigste Ursache dieses Gesichtsfehlers ist ein Reiz, der auf den Augennerven wirkt, und in demselben die Empfindung

dung erregt, die eigentlich nur ein gefärbter Gegenstand erregen sollte. Auch dieser Reiz ist am häufigsten in den Eingeweiden des Unterleibes zu finden, und erfordert, ausleerende, stärkende, und nervenbesänftigende Mittel. Indessen können doch auch Reize von andrer Art diesen Gesichtsfehler erregen. Die Wirkung hellgefärbter oder glänzender Gegenstände aufs Auge hat zuweilen auch dies zur Folge, daß eine Zeitlang nachher allerhand Farben vor den Augen schweben. In einem heftigen Affect der Furcht oder des Schreckens siehet man wirklich zuweilen Gegenstände mit andern Farben als sie wirklich haben. Eben dies geschiehet auch bey hitzigen Fiebern mit Nasereyen gar oft. Eine plötzliche Erkältung des Kopfs zu einer Zeit da er vom Schweiß ganz feucht war, veranlaßte bey einem Manne mannichfarbige Erscheinungen vor dem Augen, die sich aber nach ein paar Tagen wieder verlohren.

S. 530.

Auch ein gesundes und geübtes Auge urtheilt von der Entfernung eines Gegenstandes unsicher, unbestimmt, ja ganz falsch, wenn sich derselbe in einem Raume, oder einer Gegend befindet, deren Umfang, Länge und Weite noch unbekannt sind, wenn die Größe des Gegenstandes unbekannt ist, und wenn sich zwischen dem Gegenstande und dem Auge wenig oder gar keine andre Gegenstände in geringerer Entfernung befinden. Je mehr Gegenstände zwischen dem Auge und dem Hauptgegenstande sind, desto entfernter scheint dieser zu seyn; je weniger
Zwischen-

Zwischen: Gegenstände da sind, desto näher scheint er zu seyn. In einer stark beschneieten Gegend, auf dem Meere u. s. w. scheinen auch sehr entfernte Gegenstände nahe zu seyn. Je kleiner ein Gegenstand von bekannter Grösse dem Auge erscheint, desto entfernter scheint er zu seyn. Das Urtheil des Auges über die Entfernung der Gegenstände ist also überhaupt sehr oft trüglich. Es giebt aber auch Fälle, wo man von der Entfernung der Gegenstände bey nahe ganz und gar nicht urtheilen kann. — Der erste Fall dieser Art ist, wenn man den Gegenstand, von dessen Entfernung man urtheilen will, nur mit einem Auge betrachtet. Alle einäugige und schielende sind daher unvermögend, von der Entfernung der Gegenstände zu urtheilen. Indessen sind sie es dennoch nur anfangs, und bleiben es nur eine Zeitlang; allmählig lernen sie durch Uebung auch mit einem Auge die Entfernung eines Gegenstandes ziemlich richtig beurtheilen. — Auch bey dem Gebrauche beyder Augen wird eine gewisse Uebung dazu erfordert, von der Entfernung eines Gegenstandes zu urtheilen. Blindgeborne, die durch die Staaroperation das Gesicht auf beyden Augen wieder erhalten, können lange von der Entfernung der Gegenstände nicht urtheilen, und lernen es nur allmählig. — Zuweilen ist endlich eine fehlerhafte Empfindung des Augennerven an diesem Gesichtsfehler schuld. Reize, die auf den Augennerven wirken, ändern die Empfindungskraft desselben zuweilen derstalt, daß ein entfernter Gegenstand die Empfindung eines nahen in demselben erregt. Der Kranke siehet in diesem

diesem Falle alle Gegenstände näher als sie sind: der einzige Fall, der als eine Krankheit betrachtet werden kann, und die Aufmerksamkeit des praktischen Arztes verdient. Der Reiz, der diesen Gesichtsfehler erregt, liegt mehrentheils im Unterleibe, und erfordert Ausleerungen, und stärkende Nervenmittel. Auch der Reiz der zurückgehaltne Ausdünstungsmaterie wirkt zuweilen auf ähnliche Art auf's Auge.

S. 531.

Auch von der Grösse eines Gegenstandes urtheilt selbst ein gesundes Auge unzuverlässig, und und nicht jederzeit gleichartig. Die Ursache ist dreifach. — Um von der Grösse eines Gegenstandes richtig urtheilen zu können, muß man seine Entfernung genau kennen: denn je entfernter ein Gegenstand ist, desto kleiner erscheint er dem Auge. Das Urtheil von der Grösse eines Gegenstandes ist daher immer unrichtig, wenn man seine Entfernung nicht kennt. — Grösse ist nur immer etwas relatives. Ein einziger grosser Gegenstand mit lauter weit kleinern umgeben, scheint grösser zu seyn, als er wirklich ist; und umgekehrt. Ein Gegenstand von bekannter Grösse scheint kleiner zu seyn, als er wirklich ist, wenn man kurz vorher einen weit grössern gesehen hat. — Endlich ist auch die Brechung der Lichtstrahlen im Auge, unter welcher ein Gegenstand groß oder klein erscheint, nicht immer dieselbe, so wie auch das Auge nicht immer gleich stark mit Feuchtigkeiten angefüllt, ausgedehnt, und gewölbt ist. Derselbe Gegenstand erscheint daher demselben

Richt. Wundarzneyk. III. B. El Auge

Auge in derselben Entfernung zu gewissen Zeiten grösser, zu gewissen Zeiten kleiner. — Zuweilen indessen urtheilt das Auge so unrichtig von der Grösse eines Gegenstandes, daß man berechtigt ist, es für wirklich krank zu halten. Mehrentheils ist eine fehlerhafte Empfindung des Nerven daran schuld, die durch irgend einen Reiz veranlaßt wird, der auf's Auge wirkt, und mehrentheils gastrischer Art ist. Ein Mann (Lentin obl. Fasc.) der alles um die Hälfte kleiner und näher sahe, als es wirklich war, wurde durch ein Brechmittel, und China, Eisen und Baldrian geheilt.

S. 532.

Zuweilen sieht das Auge im kränklichen Zustande geradlinichte Gegenstände schlangenförmig; gerade stehende schiefstehend; aufrecht stehende umgekehrt, u. s. w. alles Fälle, wo eine fehlerhafte Empfindung des Nerven zum Grunde liegt, die von irgend einem Reize herrührt, der auf den Nerven wirkt. Immer kann dieser Reiz von mancherley Art seyn, die Erfahrung zeigt indessen, daß er mehrentheils gastrischer Art ist. In den meisten Fällen hebt man auch diese Gattung von Augenfehlern nach vorgängigem Gebrauche der Brech- und Purgiermittel, durch Nervenstärkende Mittel, z. E. die China, das Eisen, das oleum animale Dippelii, die valeriana u. s. w. Zuweilen jedoch seltner liegen auch andern Reize zum Grunde. Man hat beobachtet, daß auch nach einer Erkältung, einem übelgeheilten bösen Kopfe u. s. w. dergleichen Fehler entstanden sind.

S. 533.

§. 533.

Ein Zeichen eines sehr schwachen und empfindlichen Auges ist es, wenn die Gegenstände, nachdem man sie eine Zeitlang betrachtet, und gut und recht gesehen hat, anfangen sich zu bewegen, zu hüpfen, zu schwimmen, sich unter einander zu mischen, und zuletzt ganz unkenntlich zu werden. Gemeiniglich geschieht dies vorzüglich, wenn man kleine, oder stark erleuchtete Gegenstände betrachtet. Gemeiniglich sind hier die allgemeinen und örtlichen nervenstärkenden Mittel nöthig, die im Kapitel von der Amblyopie werden angezeigt werden. Indessen sind auch an diesen Augenfehler zuweilen zum Theil Reize schuld, die zuvor weggeschafft werden müssen, ehe nervenstärkende Mittel angewendet werden. Zuweilen sind so gar Reize einzig und allein schuld, das Auge ist übrigens gesund und stark, nervenstärkende Mittel sind ganz unnöthig. — Ein Mann bekam diesen Gesichtsfehler der in einer kalten Luft den Hut abnahm, indem er stark am Kopfe schwitzte, und behielt ihn einige Tage. — Vom Schwindelt der nicht als eine bloße Augenkrankheit betrachte, werden darf, kann hier nicht vollständig gehandelt werden.

§. 534.

Zuweilen sieht das Auge alle Gegenstände in einem mehr oder weniger dicken Nebel. Immer ist an diesem Gesichtsfehler eine geringe Verdunkelung irgend eines durchsichtigen Theils des Auges, oder eine große Schwäche der Augennerven schuld. Die
 erstere

erstere erkennt man leicht, wenn man das Auge betrachtet; die letztere hat man Ursach zu vermuthen, wenn man das Auge rein und klar findet. Von der erstern ist im Kapitel von der Verdunkelung der Hornhaut, dem grauen Staare u. s. w. bereits gehandelt worden, von der letztern wird im Kapitel von der Amblyopie gehandelt werden.



