

印王齊總錄

四十六

庫文閣內

漢

內閣文庫

番號 漢 12609

冊數 200 ( 50 )

函號 300 212



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale




© Kodak, 2007 TM: Kodak





大學東  
校典藉  
局之印



脾藏門

大德重校聖濟總錄 卷第四十六

脾氣虛腹脹滿

脾胃氣虛肌體羸瘦

脾胃不和不能飲食

脾胃氣虛弱不能飲食



總錄四十六



脾胃虛弱不消飲食  
脾胃虛弱不消飲食  
脾胃虛弱不消飲食  
脾胃虛弱不消飲食  
脾胃虛弱不消飲食  
脾胃虛弱不消飲食  
脾胃虛弱不消飲食  
脾胃虛弱不消飲食  
脾胃虛弱不消飲食  
脾胃虛弱不消飲食

脾氣虛腹脹滿

論曰脾為倉廩之官胃為水穀之海脾氣虛弱宿寒留滯胃受水穀不能磨化故令脹滿  
治脾氣虛弱心腹脹滿嘔吐痰逆胸膈不利腹脇刺痛不思飲食大腹木香湯方

大腹

木香

前胡

肉豆蔻

人參

白茯苓

京三稜

乾薑

青橘皮

訶梨勒

陳麴

桂

大麥蘖

厚朴

生薑



半夏湯洗柒遍去滑焙半兩

右一十五味麤擣篩每服三錢匕水一盞人生薑三

片棗二枚去核同煎至七分去滓稍熱食前服

治脾虛吞酸嘔逆腹痛泄瀉不思飲食腹脇膨脹茱萸

丸方

吳茱萸湯洗焙乾炒陸兩

附子炮裂去皮臍貳兩半

桂半麤皮肆兩

葶撥

厚朴去麤皮生薑汁炙

乾薑炮

葶澄茄

胡椒炒各貳兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸至三十九米飲下

治脾虛冷氣心腹疔痛胸膈滿悶腹脹腸鳴紫桂大丸

桂去麤皮

懷香子炒

白豆蔻人皮去

青橘皮湯浸去白焙

高良薑

附子炮裂去皮臍各壹兩

丁香

木香

甘草炙各半兩

胡椒炒壹分

右一十味擣羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服半丸

至一丸嚼破米飲下溫酒亦得

治脾氣虛弱吞酸嘔噦胸脇脹滿不思飲食增損理中

散方



乾薑炮

人參

白朮各壹兩

甘草炙

吳茱萸湯洗焙乾炒

檳榔剉各半兩

陳橘皮湯浸去白焙

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

葶藶兩半

右九味搗羅為散每服一錢匕入生薑湯點服食前

日三

治脾氣虛弱中脘痞悶脇肋脹滿心腹刺痛嘔逆痰涎

可思飲食小沉香丸方

沈香錫

丁香

木香

枳殼去麤殼炒

人參

赤茯苓去黑皮

雲藍根剉

玄參焙各壹兩

訶梨勒去核

白豆蔻皮去

肉豆蔻去殼

丁香皮剉

桂皮去麤皮

麝香研各半兩

白朮肆兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎棗湯下米飲亦得空心食前服

治脾虛止喘悶定嘔逆進飲食除腹脇脹痛白朮丸方

白朮味淡三兩

訶梨勒去核

厚朴去麤皮生薑汁炙焙乾

山芋

丁香

木香

甘草炙

白茯苓去黑皮

青橘皮湯浸去白焙各壹兩

右九味搗羅為末煮大棗肉和丸如梧桐子大每服



二十九丸至三十九丸煎粟米薑棗湯下食前早晚各一服

治脾虛藏府秘泄不常腰重頭昏舌乾眼澁食後多脹肢體疼倦和順三焦消化痰飲七氣湯方

白茯苓去黑皮 白朮

甘草炙 訶梨勒去核 連皮大腹剉

草豆蔻人各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服如寒多者更加炮裂去皮臍附子一兩

治脾氣虛弱腹脇膨脹喫食不消面色萎黃四肢劣弱

育神湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙貳兩

丁香半兩

附子炮裂去皮臍 白朮各壹兩

木香半兩

當歸焙切 人參各壹兩

訶梨勒煨去核壹兩

乾薑炮分 桂去麤皮壹兩

甘草炙半兩

白茯苓去黑皮壹兩

右一十二味麤搗篩入淨瓷器中收貯每服五錢匕水一盞半入生薑半分大棗二枚擘破同煎至八分去滓食前溫服

治脾氣虛弱飲食不美心胸膨脹脇肋痞滿噫氣不通



滿悶噎塞積滯不消結聚癖瘕異効散方

京三稜對湯浸壹宿焙乾

白朮各參兩

甘草炙對兩

麥蘖微炒

陳麴微炒各壹兩

高良薑兩半

肉豆蔻貳枚去核

青橘皮湯浸去白焙

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

草豆蔻參枚去皮

右一十味搗羅為細散每服二錢匕入鹽少許沸湯

點服空心食前

治脾虛腹脹止逆思食黑散子方

人參

丁香皮剉

澤瀉

附子

炮裂去皮臍各半兩天仙藤

白豆蔻去皮各壹兩

金墨壹分

右七味都入瓶子內以泥蓋頭候乾用稻糠旋旋燒

一日去火放冷細研為散每服三錢匕水一小盞入

薑棗少許煎至六分溫服

治脾氣虛弱腹內膨脹不思飲食豆蔻散方

草豆蔻麴畏煨熟去皮取肉

懷香子炒各壹兩

木香兩半

陳麴微炒

麥蘖炒各貳兩

厚朴去麤皮生薑汁炙乾薑炮

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

右八味搗羅為散每服二錢匕先嚼煨生薑少許沸

湯調下食前服



治脾藏虛弱冷氣不和心胸不快腹肋膨脹氣刺氣痛  
不思飲食面黃口淡及治中酒華澄茄煮散方

華澄茄炒串

丁香皮炙剉

高良薑壹兩

厚朴去麤皮生薑

京三稜炮乘

陳橘皮湯浸去甘草炙

懷香子炒

桂去麤皮

香附子炒參

桔梗炒壹

白鹽炒研拾

阿魏皂子大壹塊麩裏

右一十三味搗研為散再同和勻每服二錢匕入生薑二片水一小盞煎五七沸熱服一方更入木香半兩阿魏兩皂子大

治脾胃冷氣腹內雷鳴冷氣入腹中脫痞悶脇肋脹滿  
飲食不下桔梗丸方

桔梗炒貳

防風又去

禹餘糧醋滓

遠志去心

葶藶

鹿茸去毛

橘皮湯浸去

蕪荑

紫石英研

桂去麤皮

乾薑炮各

吳茱萸湯洗焙

甘草炙剉各

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日  
空心米飲下二十九

治脾胃久冷心腹脹滿宿食不消時作嘔逆日漸羸瘦



兼癖瘕氣塊等疾京三稜鼈甲丸方

京三稜

炮

去裙襴

黃耆

白朮

各壹兩

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙熟貳兩

乾薑

炮

訶梨勒皮

吳茱萸

枳殼

去瓤炒

橘皮

湯去白焙乾

桔梗

炒

麥蘖

炒

陳麩

乾地黄

焙

桂皮

去盤

檳榔

剉

木香

當歸

切

甘草

炙

人參

白茯苓

去黑皮各壹兩

右二十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

米飲下三十九加至四十九温酒下亦得

治久患氣脹上壅心胸食物不化腸中切痛不止人參

湯方

人參

陳橘皮

湯浸去白焙

半夏

湯洗柴漏去滑焙

枳殼

去瓤炒

草豆蔻

去皮各參分

丁香

木香

芍藥

甘草

炙剉各壹分

赤茯苓

去黑皮半兩

右一十味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生

薑一棗大切煎取八分去滓溫服

治胃冷氣脹滿悶四肢急體重白朮散方



白朮

訶梨勒

煨去核各參分甘草

丁香

厚朴

去麤皮生薑汁炙各壹分

木香

桂

去麤皮

人參

檳榔

半生半熟剉各參分

陳橘皮

去白麤炒

草豆蔻

去皮各壹兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕生薑木瓜煎湯

調下

治脾氣不足腹脹食欲嘔口舌乾澀四肢無力喜怒不

常不欲見人心煩多忘咽喉閉塞面黃補脾湯方

禹餘糧

煨醋淬剉入

大麻人

研

乾薑

炮

白朮

甘草

炙各兩

桑根白皮

剉

人參

各參兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入大棗二枚擘

破煎至七分去滓空心頓服

治脾氣虛弱宿寒留滯胃受水穀不能磨化心腹脹滿

橘紅散方

陳橘皮

去白自然汁拌勻慢火炒乾

陳麩

炒

麥蘖

炒

杏人

湯浸去皮尖雙人麤炒別

甘草

炙

人參

兩半

草豆蔻

去皮麤裏煨熟去麩

山芋

各壹兩

右八味搗研為細散每服二錢匕入薑錢二片鹽少



許沸湯點服

治脾胃氣虛風冷乘之腹內虛滿有妨飲食丁香湯方

丁香兩壹

附子炮裂去皮臍

乾薑炮

胡椒

青橘皮去白焙

陳橘皮去白焙

益智皮去

高良薑

紅豆

甘草炙各半兩

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一

棗大拍破同煎至七分去滓熱服

脾胃氣虛弱肌體羸瘦

論曰水穀精微化為血氣外榮形體內充藏府脾胃氣

和則能行其津液而充養肌肉若脾胃虛弱不能運化水穀則氣血減耗無以灌溉形體故肌肉不豐而羸瘦也

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦沉香丸方

沉香剉

附子炮裂去皮臍

厚朴去麤皮生薑汁炙

白朮

芎藭

肉豆蔻去殼

懷香子微炒

胡椒

陳麴炒

桃人去雙人皮尖炒各壹兩

棟實取皮肉炒貳兩

阿魏

阿魏無石者佳各半兩研

右一十三味除硃砂阿魏外搗研為末將硃砂阿魏



用好酒三升銀銅石鍋內熬成膏和上件藥丸如梧

桐子大早晨晚間腹空時茶酒鹽湯嚼下二十九

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦美飲食長肌肉去虛倦強心

力黃耆煮散方

黃耆兩判貳

人參

白茯苓去黑皮

葛根判

厚朴去麤皮生薑貳兩取汁塗慢火炙盡各壹兩

訶梨勒炮去核壹兩半木香

甘草炙各半兩

半夏參分水洗柒遍去滑生薑壹兩取汁浸一宿炒乾乾薑炮壹分

右一十味杵末每服二錢匕水一盞入生薑三片棗

二枚擘煎至七分不以早晚溫服

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦補不足進飲食山芋丸方

山芋判壹兩

五味子淨揀參分

黃耆細判壹兩

白朮兩

人參壹兩

右五味搗羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三

十九或三十九溫米飲下食前服

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦調中思食丸方

陳麴搗碎炒黃色

陳橘皮湯浸去白焙人參

麥蘗炒黃色

鍾乳粉

檳榔大者判

白朮

半夏麴

枳殼去瓢炒各半兩

右九味除鍾乳別入外搗羅為細末拌勻鍊蜜為丸



如梧桐子大每服二十九溫米飲下食前服

治脾胃氣虛弱四肢倦怠肌體瘦弱藏府受濕大便頻

數全不思食粟附丸方

陳粟米壹升 附子壹兩共得兩枚者

右二味同於鍋銚內入水煮令附子透取出附子切

作片焙乾又別取陳粟米半升水淘令淨控乾文火

炒令香熟同附子碾為末却取元煮附子者粟米粥

同和丸如梧桐子大每服二十九至五十九陳橘皮

湯下空心食前

治脾胃虛弱肌體羸瘦肉豆蔻丸方

肉豆蔻壹分 訶梨勒壹兩細裹火炮取皮

吳茱萸湯洗焙乾炒 防風義法 厚朴去麤皮生薑汁炙

芍藥 蒼朮米泔浸一宿切焙 藿香葉

獨活去麤頭各壹分 石硫黃壹兩別研

右一十味除硫黃外細搗羅為末同拌勻鍊蜜丸如

梧桐子大空心米湯下三十九

治脾胃虛弱肌體羸瘦及冷痢不止不能食厚朴散方

厚朴去麤皮肆兩 附子炮裂去皮臍壹兩 乾薑參兩參味同艾萍參兩都

枳實為麤末同生薑肆兩搗碎拌前參味壹處炒令紫黑色入後藥

肉豆蔻去殼壹兩半 訶梨勒煨去核壹兩半 吳茱萸湯洗柒遍去涎焙乾



壹兩 草豆蔻去皮壹兩 縮沙人兩壹

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

右一十一味都杵羅為細散每服三錢匕粟米飲調

下食前服

治脾胃氣虛弱面黃肌瘦小便頻數臍腹疼痛不能飲

食香朴丸方

沉香剉貳兩

懷香子炒貳兩

厚朴去麤皮伍兩

附子

去皮臍生用貳兩

蜀椒取紅貳兩

右五味除椒紅沉香懷香子外二味用漿水六升青

鹽三兩生薑三兩切作片子同於銀鍋中煮令水盡

暴乾入椒紅沉香懷香子搗羅為細末以水浸炊餅

和丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下

治脾胃氣虛弱多困羸瘦面黃口淡不思飲食蜀椒丸

方

蜀椒

去目及閉厚朴去麤皮用拾兩以生薑汁炙令香細剉

鹽花拾兩

附子炮裂去皮臍剉碎貳兩

右四味以水一斗於銀石器內以文武火熬候水盡

為度焙乾同杵為末鍊蜜并糯米粉同為糊和丸如

梧桐子大每服二十九至三十九溫酒下空心服如

大腸滑泄生薑米飲下



治脾胃氣虛弱肌體羸瘦人參湯方

入參大者如三半夏

湯洗去滑草豆蔻皮去

大腹皮

剉

前胡

去蘆

陳橘皮

湯浸去

白焙

桂皮

去麤

芍藥

當歸

焙切

白茯苓

去黑

右一十味各等分攪搗篩每服三錢匕水一盞半入

生薑半分切大棗二枚擘煎至八分去滓稍熱服不

計時候

治脾胃氣虛肌體羸瘦團參丸方

團參

白朮

山芋

棗焙乾

為末

陳倉米

炒黃色

甘草

炙

草豆蔻

去反

右七味搗羅為細末鍊蜜為丸如櫻桃大米飲嚼下

一九日三服

氣痛陳橘皮煎丸方

陳橘皮

壹斤用水浸去白焙乾杵為

沉香

剉

乾薑

炮裂

桂

去麤皮

附子

炮裂去皮

革薺

剉

當歸

洗切焙乾

京三稜

炮熟剉

厚朴

去麤皮生薑汁



右九味杵羅八味爲細末用陳橘皮膏和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下不嚼陳米飲下亦得空心食前服

治脾胃虛冷不思飲食或發虛腫或日漸羸瘦四肢衰倦吐利無節應脾虛候狀皆可服食椒朴丸方

蜀椒

去目并閉口者

厚朴

去麤皮生薑汁炙透

藿香子

炒

青鹽

淘去砂取淨各貳兩

右四味以水二升煮令乾焙燥擣羅爲末麪糊丸如梧桐子大每服三四十丸空心溫米飲及鹽湯下病深者日三服諸方集多載椒朴丸方有加附子者有

加乾薑之類者皆不快捷此方精要與病相當如神慎勿增他藥

脾胃不和不能飲食

論曰內經言谷氣通於脾蓋虛則能受也脾胃之爲倉廩者如此若其氣不和則腹內虛滿不能飲食治宜調其飲食適其寒溫則病可已  
治脾胃不和不能飲食心胸痞悶口淡無味及解傷寒木香煮散方

木香

人參

白茯苓

去黑皮

白朮

半夏

湯洗棗湯炒



厚朴去麤皮各壹分將厚朴入生薑壹分同搗炒乾

乾薑炮

桂去麤皮

枳實去麤皮炒

甘草炙剉各半兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

檳榔剉壹枚

草豆蔻去皮貳枚

訶梨勒煨去核伍枚

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓熱服不拘時候

治脾胃不和不能飲食建中丸方

白朮去麤皮生薑汁炙各貳兩

木香剉 訶梨勒去核 肉豆蔻去皮

芎藭各壹兩

右六味搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大空心米飲下三十丸

治脾胃冷熱不和不能飲食胸膈滿悶痰唾逆及一

切氣疾和胃丸方

甘草生剉 高良薑生各貳兩 藿香葉

桂去麤皮 丁香皮炙各壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜和杵三二百下丸如櫻桃大

每服一丸鹽湯嚼下空心服

治脾胃不和化癖氣調中藏及心下急懊厚朴湯方

厚朴去麤皮肆兩生薑貳兩同杵陰一二日暴乾 白朮肆兩



陳橘皮湯浸去白

烏藥湯浸

甘草炙到各

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片大

棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服

治脾胃不和不能飲食白豆蔻丸方

白豆蔻去皮

白朮

乾薑炮各

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸煎薑棗湯下空心食前

治脾胃不和心胸滿悶不能飲食痰逆吞酸少力頭目

昏眩均氣丸方

牡丹皮

當歸切

木香

京三稜炮

各壹分

半夏

半兩別搗末生薑自然

青橘皮

湯浸去

枳實

去瓤麩炒

檳榔剉壹

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸空心食前生薑鹽湯下

治脾胃不和痰唾嘔逆臍腹撮痛心胸痛悶調藏止瀉

紫蘇丸方

紫蘇葉

桂去麤

赤茯苓去黑

縮沙去

甘草炙到各

沉香剉大

人參

桔梗炒

青橘皮湯浸去



陳橘皮湯浸去白

焙各壹兩

胡椒兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如彈丸大每服一

丸炒生薑鹽湯嚼下

治脾胃不和腹中刺痛胃逆氣冷不能飲食七寶湯方

草豆蔻伍枚麩裏煨

熟去麩及皮

白茯苓去黑

人參各壹兩

大腹皮剉肆枚

訶梨勒炮去核

半夏壹分湯浸洗伍度生薑汁浸壹宿去薑汁炒黃

甘草炙對

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片大

棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服

治脾胃氣不和心腹疔痛不能飲食沉香湯方

沉香剉

厚朴去麤皮生薑汁炙

桂去麤皮

益智去皮

白朮

青橘皮湯浸去

桔梗炒各壹兩

五味子壹兩壹分微焙

附子炮裂去

乾薑炮

甘草炙對各半兩

右一十一味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三

片同煎至六分去滓稍熱食前服

治脾胃不和不能飲食大腹湯方

大腹剉

陳麴炒

厚朴去麤皮生薑汁炙

木香剉各壹兩

肉豆蔻去

乾薑炮

人參

白茯苓去黑皮

青橘皮湯浸去



訶梨勒炮取皮

桂去麤皮

大麥蘖微炒

半夏湯洗米漚去滑焙乾各半兩

京三稜炮剉壹兩半

右一十四味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三

片棗二枚擘破同煎至六分去滓稍熱食前服

治脾胃不和不能飲食見食吐逆半夏飲方

半夏生薑汁炒黃

乾薑炮各壹兩

棗肉焙

附子炮裂去皮臍

青橘皮湯浸去白焙各半兩

陳橘皮湯浸去白焙

紅豆蔻去皮各壹分 木香半

草豆蔻去皮貳枚

右九味麤搗篩每服一錢半匕水一盞蜜半匙煎至

七分去滓稍熱服不拘時候

溫脾胃和氣消食木瓜散方

乾木瓜焙伍兩

益智去皮

桂去麤皮

草豆蔻去皮

紅豆蔻去皮

乾薑炮

高良薑

陳橘皮湯浸去白焙

厚朴去麤皮生薑汁炙各貳兩

甘草炙

麥蘖炒

陳麩炒各參分

生薑壹斤取自然汁

丁香

沉香各壹兩

鹽壹升

右一十六味搗羅十四味為散研細入生薑自然汁并鹽拌勻瓷器盛每服二錢匕沸湯點服



治脾胃不和飲食減少腹中虛鳴高良薑散方

高良薑壹兩 陳橘皮去白焙 陳麴炒半

肉豆蔻去殼 乾薑炮 厚朴去麤皮生薑汁炙

五味子 甘草炙 白朮

吳茱萸湯洗焙乾

右一十味搗羅為散研勻每服二錢七陳米飲調下

治脾胃不和不能飲食白朮丸方

白朮剉 厚朴去麤皮生薑汁炙 蒼朮去麤皮炒

附子炮裂去皮

甘草炙 乾薑炮裂各

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如雞頭實大每服一九

空心米飲嚼下

治脾胃不和不思飲食進食湯方

青橘皮去白焙 烏頭炮裂去皮 草豆蔻參枚

訶梨勒煨去核 甘草炙 高良薑炒

陳橘皮去白焙 桂去麤皮

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片煎取

七分去滓食空時服

治脾胃氣虛不能飲食八味煮散方

厚朴去麤皮生薑汁炙 麥蘗炒各 吳茱萸湯洗焙



人參

桂皮去麤

蕪荑炒微

陳橘皮

湯洗去白焙各壹兩

葦撥兩

右八味搗羅為散每服二錢匕水一盞入生薑三片

棗一枚擘同煎至六分去滓空心溫服

治脾胃氣不和虛滿不能飲食沈香湯方

沉香剉

懷香子炒

青橘皮去白焙

胡椒

葦澄茄

棟實炒

陳橘皮

去白焙各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕蒸白三寸拍破入酒并

童子小便各半盞同煎至七分去滓溫服若氣甚虛

弱脉息沉細不過數服氣正脉生

治脾胃氣冷熱不和進食和氣草豆蔻湯方

草豆蔻去皮

人參

陳橘皮湯浸去白焙

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

甘草剉

桂去麤皮各半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同

煎至六分去滓食前溫服

脾胃氣虛弱不能飲食

論曰水穀入口而聚於胃脾則播其氣澤以埤諸藏府而已今脾藏不足胃氣內弱故不能飲食雖食亦不能



化也

治脾胃氣虛弱不能飲食食即妨悶四肢少力疼痛紅

豆蔻湯方

紅豆蔻

去皮

白朮

桂皮

去麩

訶梨勒

煨去核

黃耆

當歸

切焙各參分

厚朴

去麩皮生薑汁炙貳兩

陳橘皮

湯浸去白焙

人參

各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切

棗二枚擘破煎至六分去滓不計時候稍熱服

治脾胃氣虛弱不能飲食肌膚瘦瘁面色萎黃白朮丸

方

白朮

陳麴

微炒

陳橘皮

湯浸去白焙各貳兩

人參

草撥

各壹兩

乾薑

炮參分

右六味搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大不計時候每服以粥飲下三十九

治脾胃虛弱不能飲食心腹刺痛頻併泄利人參大丸

方

人參

貳兩

白朮

貳兩

乾薑

炮半兩

甘草

炙剉壹兩半

山芋

貳兩

附子

炮裂去皮臍壹兩

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如雞子黃大每服一丸



水一盞入棗二枚擘破同煎至六分和滓溫服或爛

嚼煎棗湯下亦得

治脾胃虛弱思進飲食山芋丸方

山芋

白朮各壹兩

人參各參分

右三味搗羅為細末煮白麩糊為丸如小豆大每服

三十九丸空心食前溫米飲下

養脾胃進飲食二橘散方

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙各壹兩

益智

去皮微炒

藿香子

炒

京三稜

煨椎碎

木香

肉豆蔻

人各參分

縮沙蜜

去皮

人參

各壹兩

薑黃

甘草

炙剉各半兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯

點服空心食前

治脾胃久弱三焦不調胸膈痞悶肢體倦怠噦逆惡心飲食進退氣道不勻思食調中丸方

陳麩

炒

麥蘖

炒

半夏麩

各壹兩

檳榔

剉參分

白朮

壹兩半

人參

參分

木香

兩半

陳橘皮

湯浸去白焙壹兩

沉香

兩半

烏藥

剉壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三



十九食前溫米飲下

治脾胃氣虛食少無力沉香陳麴丸方

沉香兩

陳麴微炒

木香

檳榔剉

半夏湯洗染

陳橘皮湯浸去

人參

白豆蔻去

麥蘗微炒各

厚朴去麤皮生

白朮各

白朮各

丁香

葶澄茄各

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每

服三十九米飲下空心食前服

補暖脾胃止吐逆利胸膈治心腹刺痛進飲食霍香

湯方

藿香葉

白茯苓去黑

青橘皮湯浸去

細辛去苗

益智去皮

縮砂蜜去

甘草炙

陳橘皮湯浸去

木香

白芷剉炒各

右一十一味麤搗篩每服三錢水一盞入生薑木瓜

各三片煎至六分去滓稍熱服不拘時候

治脾胃氣虛弱可進飲食人參飲方

人參

白茯苓去黑

山芋

白朮各

甘草生剉



右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片煎  
二枚擘同煎至七分去滓溫服小兒諸疾未痊乳食  
不進者用藥末一錢匕水一中盞入紫蘇木瓜煎至  
四分去滓放溫併喫二服

治脾胃氣虛弱進食黃耆湯方  
黃耆剉 枳殼去麩炒 人參

白茯苓去黑皮 白朮 陳橘皮湯浸去白焙

桔梗炒各壹兩 厚朴去麩皮生薑汁炙壹兩半

桂去麩皮壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片

棗二枚擘破同煎至八分去滓溫服空心  
治脾胃氣虛弱不能飲食肌體黃瘦薑蜜煎方

生薑汁壹合 蜜壹合 生地黄汁壹升

右三味相和以慢火煎如稀餈每服半匙溫酒化服  
空心晚食前各一

治脾胃虛弱及久積冷氣飲食減少腹內諸疾久服補  
脾胃壯氣進食去風烏朮丸方

草烏頭淨洗壹斤 蒼朮貳斤 陳橘皮去白半斤

甘草生推碎肆兩 黑豆參升

右五味用水一石煮乾為度去却橘皮黑豆甘草



取草烏頭蒼朮二味日暴乾麤搗篩焙乾搗羅為末酒煮麪糊為丸如梧桐子大焙乾收瓷器中每日空心晚食前鹽湯或溫酒下三十丸

治脾胃氣弱不思飲食日漸黃瘦人參茯苓湯方

人參

白茯苓

去黑皮

益智

去皮微炒

桔梗

炒各分

前胡

去蘆頭壹兩

旋復花

貳兩

木香

半兩

甘草

炙到壹分

枇杷葉

炙去毛

茈胡

去苗各參分

陳橘皮

湯浸去白焙壹分

大腹

剉伍枚

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水二盞入生薑三

片棗二枚擘破同煎至一盞去滓溫服空心夜臥各一方  
治脾胃氣虛弱四肢少力肌體羸瘦不欲飲食黃耆湯

黃耆

剉參分

甘草

炙到半兩

厚朴

去麤皮生薑汁炙貳兩

乾薑

炮參分

桂

去麤皮

白朮

熟乾地黄

焙

人參

白茯苓

去黑皮

當歸

切焙

附子

炮裂去皮臍

陳橘皮

湯浸去白各壹兩

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片棗二枚擘破同煎至八分不計時候去滓溫服



治脾胃氣虛思進飲食木香丸方

木香湯浸去懷香子炒

縮砂蜜皮去

青橘皮湯浸去蓬莪茂煨推

紅豆

高良薑湯浸去棟實炒

丁香皮剉

陳橘皮湯浸去

桔梗炒參

芍藥剉益智去皮壹

五味子

桂去麤皮

甘草炙剉

胡椒半

右一十七味擣羅為末用粟米飯為丸如棗豆大每服十五丸加至三十九丸生薑湯下如傷水多嚼服亦得

治脾胃氣虛弱不思飲食吐逆滿悶胸膈不利心腹刺痛豆蔻散方

草豆蔻去皮剉生薑和皮切作甘草剉碎

右三味同入銀器內用水過藥三指許慢火熬令水盡取出焙乾擣羅為散每服一錢匕沸湯點服夏月作熟水冷服亦佳

治脾胃氣弱不進飲食白豆蔻散方

白豆蔻入厚朴去麤皮生白朮

沉香剉陳橘皮湯浸去甘草炙

右六味等分擣羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯



點服食前

治脾胃虛弱并婦人脾血久冷桂香散方

桂去麤皮壹分

高良薑剉炒香熟

草豆蔻剉炒

甘草剉

白朮剉

縮砂肉

厚朴去麤皮剉

生薑切

棗肉

各壹兩同厚朴生薑參味

搗成團焙乾

青橘皮去白炒黃

訶梨勒肉各壹兩

右二十三味搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯

點空心服此藥兼療腹痛及冷瀉尤妙

治脾氣虛弱不思飲食必勝散方

白朮剉

甘草剉

五味子

微炒各肆兩

乾薑炮參兩半

右四味搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服

不拘時候

治脾胃虛冷澀遲化不能飲食建脾散方

人參

白茯苓去黑皮

黃耆剉

麥蘖炒黃各壹兩

甘草剉

麩麴炒令黃各半兩

右六味搗羅為散每服二錢匕入鹽沸湯點服不拘

時候

治脾胃氣虛弱不能飲食白豆蔻散方

白豆蔻人

桂去麤皮

木香



人參 各半兩

麴炒

京三稜 炮

陳橘皮 去白切焙

大麥蘗 炒各分

乾薑 炮裂

甘草 炙各分

右一十味搗羅為細散每服二錢匕入生薑三片鹽

少許沸湯點服食前

大德重校聖濟總錄卷第四十六

