



女科證治準繩卷之三

金壇王肯堂輯 門人新安閔承詔校

雜證門下

痰飲

大婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胃膈所
成也人皆有痰少者不能為妨多者成患但胃膈有
痰飲停於胸中則令眼昏亦令頭眩頭痛者藥隱
老人評曰夫痰之為害多因外感五邪五邪者寒暑
燥濕風也因五邪而得者得風為風
內傷七氣七氣者喜怒憂
思驚恐志也因七氣所傷多因婦人
痰得寒為寒痰得暑為暑痰因七氣所傷多因婦人

情性執着不能容忍而有此證豈特只因風冷而成哉所以外感五邪內傷七氣則一身之中血液淚汗涕唾身中濕者敗濁變而成痰乘間而為害也經云清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然有痰涎飲沫四種相類宜子細詳辨調治因風而生痰者宜服三生飲本中風星香飲雜病中風青州白丸子雜病中風化痰丸雜病因寒冷而得者宜服降氣湯雜病黑錫丹雜病頭養正丹頭眩因熱而得者宜服金沸草散雜病胡半夏湯本條因暑而得者消暑丸雜病因氣滯不調鬱結而成者宜服參蘇飲雜病四七湯雜病一陳

湯雜病痰在上者以瓜蒂散吐之在下者以控涎丹痰飲痛利之雖曰可吐可下亦要觀人之盛衰察脈之虛實方可投之切記不可猛吐暴下所以初虞世有金虎碧霞之戒也一醉前證若肝經悲怒用小柴胡湯傷寒肝經風熱用釣藤散頭目眩暈肝腎氣虛用川芎散少陽肝經鬱結用濟生歸脾湯雜病鬱怒傷肝脾用加味道遙散經脾虛痰逆用白朮半夏天麻湯雜病脾氣虛弱用六君子益氣湯肺氣鬱滯用一陳雜病貝母桔梗陰虧水泛用六味地黃丸雜病腎虛陰火如減八味丸雜病腎虛火不歸源八味丸雜病仍與前

證互相用之。一婦人內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下或用化痰理氣藥前證益盛肢體或麻又用祛風化痰藥肢體常麻手足或冷或熱此脾土不能生肺金也余用補中益氣湯加茯苓半夏炮薑二十餘劑漸愈又用加味道遙散三十餘劑全愈後因怒吐痰胸痞或用清氣化痰丸食少痰甚胸膈脹滿脉或浮大或微細余以六君倍用參米少加木香而康婦人咳嗽脇痛或用清肺化痰降火等劑久不愈更加內熱晡熱若兩脇或小腹內熱其咳益甚小便自遺余曰此屬肝經血虛火動用六味丸加五味子滋

腎水以生肝血用補中益氣生脾土以滋肺金而尋愈

旋覆花湯 治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶

旋覆花

枇杷葉去毛

川芎

細辛去苗

藿香

桂心

枳殼去瓢

前胡去蘆

人參去蘆

半夏薑製

甘草炙

羚羊角屑

赤茯苓各半兩

羌活去蘆

右吹咀每服五錢水一盞半生薑五片煎至一大盞去滓溫服食遠日進二服

天南星丸 治婦人風痰心膈壅滯

天南星 薑製 白附子 炮 皂角仁 炒黃

半夏麴 各壹兩 白礬 枯伍錢

右為細末酒煮麵糊丸如梧子大每服貳拾丸煎

生薑薄荷湯送下食後臨卧日進二服

大半夏湯 治痰飲脾胃不和咳嗽嘔吐飲食不入

半夏 白茯苓 生薑 各貳錢

右薑水煎服胃痞加陳皮 四七湯亦善

導痰湯 治痰涎壅盛胸膈痞塞或咳嗽惡心飲食

少思

半夏 貳錢

南星

枳實 麩炒

茯苓

橘紅 壹錢

甘草 伍分

右用薑拾片水煎服

瓜蒂散 療病痰胸膈痞塞頭不痛項不強寸脉微

浮胸中痞鞅氣衝喉咽不得息者此為胸中有痰

也當吐之宜此法 方見

柴胡半夏湯 治痰熱頭痛利膈除煩悶手足煩熱

榮衛不調肢節拘倦身體疼痛嗜卧少力飲食無

味兼治五嗽痰癖

柴胡 捌分

半夏 叁兩半

人參 去蘆

甘草

黃芩

麥門冬

各貳兩

知白朮 貳兩

右咳嗽每服伍錢水壹盞半薑伍片棗壹枚煎至
梨捌分去滓服

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

咳嗽

天婦人咳嗽者由肌體虛外受於寒熱風濕所得也
肺為四臟之華蓋內統諸臟之氣外合於皮毛若為
寒熱風濕所傷邪氣自皮毛而入於肺中外皆傷故
令咳也大抵治咳不可一槩治當以脈息辨之其脈
浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於
熱遲而澁者起於寒風者散之濕者燥之熱者涼之
寒者溫之虛者補之未有不妥者也薛丹溪云春
是木氣上升夏是火氣炎上秋是濕熱傷肺冬是風
寒外來當發散行痰開腠理用二陳湯加麻黃桔梗

痰飲

卷之三

四

杏仁痰飲隨證加藥勞嗽宜四物加竹瀝薑汁乾咳
嗽難治此證乃痰鬱火邪也用苦梗開之夏用補陰
降火不已則成勞上半日多嗽者胃火也用貝母石
膏午後嗽者陰虛也用四物加炒黑黃蘗知母黃昏
嗽者火氣浮於肺也用五味子五倍子五更嗽者飲
食之火流於肺也以貝母軟石膏肺脹而嗽或左或
右不得眠此痰挾瘀血氣滯而病宜養血疎肝清痰
用四物加桃仁訶子青皮竹瀝之類嗽而脇下痛宜
疎肝氣以青皮挾痰實者白芥子之類血礙氣作嗽
者桃仁大黃薑汁丸服治嗽多用生薑以其辛散故

四咳

女科三

五

也痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以知母止
嗽清肺滋陰降火夜嗽用清陰分之劑若嗽多用粟
殼不必疑但要夫病根此乃收後藥也竊謂前證午
前嗽屬胃火盛用竹葉石膏湯傷寒瘧胃氣虛用補
中益氣雜病傷加炒山梔午後嗽屬陰血虛用四物
黃蘗知母雜病傷腎水虛用六味地黃丸雜病黃昏
嗽用四物五味麥門并前丸五更嗽用六君子雜病
不得眠及兩脇下痛用六味地黃補中益氣若因氣
虛腠理不密六淫所浸當祛外邪而實脾土若因心
火太過當伐肝木而滋肺金若肺金氣虛當補脾土

咳

六

六

而生肺氣若因腎水虧損虛火炎上當補肺腎以滋
化源大抵風邪胃火此實熱為患易治惟肺腎虧損
此真臟為患最難調治一婦人素勤苦冬初咳嗽
發熱吐血盜汗通身作痛或寒熱往來用化痰降火
之藥口噤筋攣此血本虛而藥復損之耳余用八味
丸雜病為主佐以補中益氣麥門五味山藥年餘而
愈一婦人咳嗽發熱嘔吐痰涎日夜約五六碗喘
咳胸痞燥渴不食崩血如涌此脾土虛寒用八味丸
及附子理中湯雜病而愈一婦人不得於姑患嗽
胸膈不利飲食無味此脾肺俱傷痰鬱於中也先用

歸脾湯雜病加山梔撫芎貝母桔梗諸證漸愈後以
六君加芎歸桔梗間服全愈一婦人咳嗽早間吐
痰甚多夜間喘急不寐余謂早間多痰乃脾虛飲食
所化夜間喘急乃肺虛陰火上衝用補中益氣加麥
門五味而愈一婦人患咳嗽脇痛發熱日晡益甚
余曰此肝脾虛熱而傷肺也用加味道遙散調加熟
地黃治之而愈後因怒氣勞役前證仍作兼太陽痛
或寒熱往來或咳嗽遺尿此肺氣虛而尿脬失制也
仍用前散及地黃丸而瘥一婦人久咳嗽面色痿
黃或時晄白肢體倦怠飲食少思稍多則瀉此脾土

咳

六

七

藥用

虛而不能生肺金朝用補中益氣湯夕用六君子湯
為主間佐以八珍湯雜病三月餘漸愈後感寒邪喘
嗽胸腹作脹飲食不入四肢逆冷此中氣尚虛不能
充皮毛肥腠理司開闔之所致也遂用六君加生薑
桔梗而愈

初虞世曰經曰微寒為嗽寒甚為腸癖古人立方治
嗽未有不本於溫藥如乾薑桂心細辛之屬以寒氣
入裏非辛甘不能發散以此準之夫有不因寒而嗽
也又曰熱在上焦因欬為肺痿又實則為肺癰虛則
為肺痿此人其始或血不足或酒色滋味太過或因

服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪脉數發熱咳
嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦用溫藥如
建中之屬今人但見寒熱咳嗽率用柴胡鼈甲門冬
葶藶等藥旋踵受弊而不知非可為深戒就使不可
進以溫藥亦須妙以湯丸委曲調治無為鹵莽致傷
人命 薛丹溪云陰分嗽者多屬陰虛肺脹不得眠
者難治肺痿專主補氣養血清金肺氣有餘者宜瀉
之以桑白皮為主半夏茯苓佐之瀉其有餘補其不
足肺燥者當潤之屬熱者大力子桔梗知母雞子清
聲啞者屬寒也細辛半夏生薑肺虛者人參阿膠為

主陰不足者六味地黃為要藥或知母茯苓湯
 陰虛氣喘四物加陳皮甘草以降其氣補其陰竊謂
 前證嗽而鼻塞聲重風邪傷肺也用參蘇飲雜病發熱面
 赤喘嗽火尅肺也人參平肺散雜病喘寒熱交作肝氣
 不和也四君加知母柴胡桔梗咳喘短氣肺虛也人
 參補肺湯喘體倦少食脾虛也參朮補脾湯本口乾
 咽燥虛火上炎也六味丸大凡發熱喘嗽或咳唾膿
 血飲食不入急補脾肺滋腎水多有得生者脉浮大
 而面色赤者皆難治脉浮短濇者可療
 經曰感於寒微則為咳甚則為泄蓋肺主氣合於皮

毛邪傷皮毛則咳為肺病傳於各臟以時受邪肺為
 嫩臟邪易傷而難治其嗽有肺心脾腎肝風寒支飲
 膽之十種亦有勞嗽者華佗謂之邪嗽孫真人謂之
 注嗽此因酒色過度勞傷肺經重者咯唾膿血輕者
 時發時瘥或先嘔血而後嗽或先咳嗽而吐血此又
 挾邪傳症孫真人用通氣丸夢與鬼交用四滿丸蛤
 蚧天靈蓋桃柳枝安息香之類若肺中有蟲入喉痒
 嗽須以藥含化其蟲即死嗽即止薛仲景先生云
 咳而兩脇痛不能轉側兩胛滿屬於肝臟用小柴胡
 湯咳而嘔苦水屬膽腑黃芩半夏生薑湯咳而喉中

如梗狀甚則咽腫喉閉屬心臟桔梗湯咳而大便失
氣屬小腸腑芍藥甘草湯咳而右肱痛陰引肩背甚
則不可動動則咳劇屬脾臟升麻湯咳而嘔嘔甚則
出長蟲屬胃腑烏梅丸咳而喘息有聲甚則唾血屬
肺臟升麻湯咳而失尿屬大腸腑麻黃附子細辛湯
咳而遺溺屬膀胱茯苓半夏湯咳而不止三焦受之
其狀腹滿不食涕唾面目浮腫氣逆異功散用之對
證其効如神 一婦人患前證晡熱內熱寒熱往來
作渴盜汗小便頻數其經兩三月一行此肝脾氣血
虛損用八珍湯六味丸六十餘劑諸證漸愈其經兩

月一行仍用前一藥間以加味道遙散各三十餘劑
後恚怒適經行去血過多諸證悉至飲食少思腹脹
氣促用十全大補湯數劑漸愈仍用前藥調補漸安
復因喪子胸腹不利食少內熱盜汗便血無寐用加
味歸脾湯仍兼前藥而愈 一婦人患前證不時發
熱或時寒熱或用清熱之劑其熱益甚盜汗口乾兩
足如炙遍身皆熱昏憤如醉良久熱止方甦或晡熱
至旦方止此陰血虛而陽氣弱也余朝用六味丸料
夕用十全大補湯月餘諸證稍愈更兼以補中益氣
湯兩月餘而愈

黃芪散 治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾

黃芪 肆兩 甘草 貳兩

右為細末湯點壹貳錢服日三服 一方甘草壹兩黃芪六兩名黃芪六一湯只咬咀水煎服

蛤蚧丸 治婦人咳嗽不止漸成勞氣

蛤蚧 壹對酥炙 紫苑 欵冬花

鼈甲 炙 貝母 去心 皂角子仁 壹兩 炒各

杏仁 炒去皮尖 壹兩半

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服貳拾丸淡薑湯吞下

含化丸 昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成

肺勞服此安 寇宗奭方

枇杷葉 去毛 桑白皮 欵冬花

木通 紫苑 杏仁 各等分

大黃 減半

石為細末煉蜜丸如櫻桃大食後夜卧含化壹丸

貝母湯 治諸嗽久不瘥

貝母 生薑汁 北五味子 黃芩

乾薑 熟者減 陳皮 兩 半夏

桑白皮 桂心 北柴胡 各半兩 熟者加

咳嗽

女科三

九

半

木香

甘草各貳錢

右為粗末每服五錢水壹盞半杏仁七枚去皮尖碎之生薑貳片煎米分去滓熱服黃師文云戊申冬有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之一投而瘥以此治諸嗽悉皆愈

定喘湯 治丈夫婦人遠年近日肺氣咳嗽上氣喘急喉中涎聲胸滿氣逆坐卧不安飲食不下及治肺感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

半夏麴炒

阿膠炒

甘艸各錢半

鷲粟殼製半兩

北五味子

桑白皮

麻黃去節

人參各貳錢半

右咬咀每服參大錢薑叁片烏梅半箇水壹盞半煎至七分去滓漸漸溫服食後臨卧日二服方同和劑

分兩加減不同有效

補肺湯 治證同前滄州李官人宅又名清金湯

鷲粟殼製貳兩

人參

粉艸各半兩

陳皮

茯苓

杏仁製

白朮

明阿膠炒

北五味子

桑白皮

薏苡仁

紫蘇莖各壹兩

咳嗽

女科三

九

右咬咀為末每服叁大錢水盞半薑叁片棗貳枚
烏梅半箇煎至壹盞臨卧温服 更加百合貝母
去心半夏麴欵冬花各壹兩服之良驗

金不換散 治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促
滿悶咳嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽
唾紅痰及遠年近日一切喘嗽諸藥不効者並治
之

鷲粟殼 半兩製 杏仁 製 甘草 各叁錢
枳殼 肆錢

右咬咀每服叁錢水壹盞半薑叁片烏梅半箇煎

至八分食後臨卧漸漸熱服

許元林先生方乙卯年七月僕嘗治一婦人咳嗽
不已服諸藥無効漸成癆瘵求予診之六脉濡弱
以愚考之此是血弱又因憂感太過而成斯疾合
用當歸等藥治之必愈遂先用古今錄驗橘皮湯
空心服蘇子降氣湯徐用金釵煎熟地黄九當歸
丸調理得安 又治一婦人時行感熱咳嗽遂用
小柴胡湯去人參薑棗只加北五味子煎服愈
古今錄驗橘皮湯 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉
中作聲上氣不得下頭痛方

咳散 女科三 三

陳橘皮

杏仁製

甘草

右以咀每服五錢水盞半煎至壹盞去滓熱服

深師四浦丸 治上氣嗽飲嗽燥嗽冷嗽邪嗽謂之

五嗽

乾薑炮

桂心

躑躅花

芎藭

紫苑各貳兩

芫花根皮伍錢

蜈蚣壹條去頭足炙

細辛

甘草炙

鬼督郵

人參

半夏湯洗各壹兩

紫苑

當歸

黃芩各等分

桂心

麻黃去根

右為末煉蜜丸大豆許每服五丸米飲下日三服未應加至七八丸

團魚丸 治滑蒸勞嗽累効

貝母

前胡

知母

杏仁

柴胡各等分

生團魚貳箇

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾為末用骨更煮汁壹盞和藥丸梧子大每服貳拾丸煎黃芪六一湯空心送下病既安仍服黃芪六一湯調理

參朮調中湯

瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

四
女科三
一四

黃芪肆分 桑白皮伍分 人參

炙甘草 青皮 白茯苓各叁分

五味子杵伍分 白朮叁分 地骨皮

麥門冬 陳皮各伍分

右水煎服

噤化丸自製方 清肺止咳定喘化痰

薄荷葉肆兩 桑白皮 天門冬去心

麥門冬去心 知母去皮 百部

貝母去心 柿霜各貳兩 枇杷葉去毛

訶子肉 阿膠 橘紅

紫苑 欬冬花各壹兩半 菴藪仁去油

菴藪皮瓢 黃芩 杏仁炒去皮尖

白茯苓 玄明粉 鉛白霜

桔梗各壹兩 旋復花 馬兜鈴

五味子各柒錢半 硼砂伍錢 冰片壹錢非真者勿用

右為極細末梨膏為丸如無梨膏則以白蜜竹瀝

梨汁熬至滴水不散為度丸如龍眼大噤化壹丸

參芪補脾湯 治肺證因脾氣虛弱咳唾膿涎中滿

不食宜煎服此藥以補脾土生肺金

人參 白朮各貳錢 黃芪炙貳錢半

心下停水發熱而喘或嘔者小青龙湯去麻黃加杏
仁主之若陰證喘促者四肢逆冷脉息沉細或寸大
尺小或六脉促疾或心下脹滿結鞭若冷汗自出或
大便頻數上氣喘促或咽喉不利者此是本氣極虛
內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則愈宜返
陰丹主之見傷寒準繩大棗諸臟相乘而喘者以杏
子散本條如感寒伏熱而喘者以華蓋散雜病九寶湯
雜病若暴寒向火覆衣被過當傷熱肺實而喘促者
其狀多有熱證宜洗心散發熱冷水調服若因氣字
不調痰盛喘促者宜四七湯氣雜病兼官局桔梗湯病雜

痰薑煎服若涎多而喘者宜干縉湯雜病橘皮半夏
湯本條若不得臥即喘者此由水氣逆行上乘於肺
肺得之則浮而開使氣不得通流其脉沉大宜神秘
湯雜病肺之積名曰息賁在右脇下大如杯令人洒
浙寒熱喘咳發癰疽宜棗膏丸本條若上氣喘者神授
湯本條若上盛下弱而喘促者宜蘇子降氣湯氣雜病吞
黑錫丹頭雜病若尊年之人素來稟賦太厚不任熱藥
者不可輕投丹劑及諸熱藥但以秘傳降氣湯分心
氣飲俱雜病論之梗槩不出於此矣若素有脚氣而喘
者當作脚氣治之又有骨蒸勞喘自有專門不敢濫

及薛東垣云肺金受邪由脾胃虛弱不能生肺乃
所生受病故咳嗽氣短氣上皮毛不能禦寒精神少
而渴情慘不樂皆陽氣不足陰氣有餘也治法若肺
氣虛弱用四君子雜病加枳殼半夏脾虛不能生肺
補中益氣湯雜病七情氣結四七湯雜病脾經鬱結
歸脾湯雜病脾氣虛弱人參補肺散肺經火盛人參
平肺散腎水敗濁六味地黄丸雜病真陽虛損八味
丸虛勞或兼小便不利為害尤速非二九不能救一
婦人傷風寒作喘或用表散愈而復患仍用前藥其
證益甚飲食少思胸腹不利此因脾肺氣虛也予先

用六君子湯加桔梗漸愈又用補中益氣湯而痊
一婦人患前證屬命門火虛不能生脾土用補中益
氣湯八味地黄丸而痊後復患其喘益甚用前藥不
應遂用黑錫丹二服喘止仍用前一藥而諸證痊凡
屬邪氣有餘者其證易識治效亦速其屬元氣不足
者變證不一效非可以旦夕期也
杏子散 治諸臟相乘喘急

杏仁 去皮尖雙仁麩 麻黃根 為細末

右和勻煎橘皮湯調下貳錢無時

橘皮半夏湯和劑 治肺胃虛弱好冷酸冷寒痰停積

嘔逆惡心涎唾稠黏或積吐粥藥不下手足逆冷
目眩身重又治傷寒時氣欲吐不吐欲嘔不嘔昏
憤悶亂或飲酒過多中寒停飲喉中涎聲乾噦不
止

陳皮

去白

半夏

煮 各米兩

右剉為麤散每服參錢生薑參片水貳盞煎至壹
中盞去滓溫服不計時留兩服滓併一服再煎服
棗膏丸 治息賁在右脇下大如杯令人灑淅寒熱

喘咳

甜葶藶

炒研

陳皮

苦梗

各等

右為末煮棗肉丸桐子大每服數丸白湯下許學
士云余常停飲水積食已必嚏漸喘覺肺系急服
此良驗

神授湯

治上氣喘急不得卧

橘紅

苦梗

紫蘇

人參

各壹錢

五味子

杵炒 叁分

右薑水煎服

治婦人喘促虛腫快利小便即瘥
用生薑貳兩取汁白麵叁兩以薑汁搜作小劑太
半夏拾箇打研入麵中作餅炙熟作黃色為末溫

熟水調下壹錢以小便通利為度

天門冬楊氏家傳治婦人喘手足煩熱骨蒸寢汗口

乾引飲目浮腫

天門冬拾兩去心麥門冬去心生地黄參斤取

右二味為末入地黄膏和丸如梧桐子大每服五

拾丸逍遙散中去甘草加人參煎湯送下或服王

氏博濟方中人參荊芥散亦可如面腫不已經曰

面腫曰風故宜汗麻黃桂枝可發其汗後服柴胡

飲子去大黃故論曰治臟者治其俞治腑者治其

合浮腫治其經治俞者治其土也治合者亦治其

土也如兵家圍魏救趙之法也

人參補肺湯治肺腫腎水不足虛火上炎咳唾膿

血發熱作渴小便不調

人參 黃芪炒 白朮

茯苓 陳皮 當歸各壹錢

山茱萸去核 山藥各貳錢 五味子杵

麥門冬去心 甘草各一分 熟地黄自製壹錢伍分

牡丹皮壹錢

右薑水煎服

人參平肺散治心火尅肺金患肺痿咳嗽喘嘔痰

涎壅盛胸膈痞滿咽膈不利

人參

青皮

茯苓

天門冬

陳皮

地骨皮各壹錢

甘草炙伍分

知母柒分

五味子拾粒

桑白皮炒壹錢

右薑水煎服

嘔吐

夫婦人嘔吐者由脾胃有邪冷穀氣不理所為也胃為水穀之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於胃胃氣逆則令嘔吐也夫嘔吐之疾非特脾胃虛冷而嘔吐也亦有胃熱而嘔者亦有胃中冷胃口熱而吐者亦有痰盛而嘔者亦有血弱而嘔者經云無陰則嘔是也不可以一槩用藥如胃冷而嘔吐宜用局方人參丁香散理中丸及許仁則半夏丸人參七味丸如胃熱而嘔吐者宜用小柴胡湯蘆根湯竹茹湯槐花散如胃中冷胃口熱而嘔吐者宜用局方藿香

嘔吐

六科三

三

正氣散生薑棗子煎沉冷服即止如痰盛嘔吐者宜
局方半夏湯茯苓湯二陳湯如惡阻兼用茯苓丸自
有專門如血不歸源而嘔吐者用十全大補雜病加
陳皮半夏藿香薑棗煎服或有脚氣而嘔者自有專
門不濫及薛東垣先生云前證內有故寒與新穀
俱入於胃新故真邪相攻氣併相逆復出於胃故為
噦補手太陰瀉足少陰又云胃因氣逆為噦夫嘔吐
噦者俱屬於胃以其氣血多少為異耳如嘔者陽明
也陽明多血多氣故有聲有物血氣俱病也仲景云
嘔多雖有陽明證慎不可下孫真人云嘔家多服生

薑為嘔家之聖藥也氣逆者必散之故以生薑為主
吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲為血病也
有食入則吐以橘皮去白主之噦者少陽也多氣少
血故有聲無物乃氣病也以薑製半夏為主若脾胃
虛弱寒邪所客飲食所傷者用六君丁香藿香生薑
之類若胃中有熱高上有痰用二陳山梔黃連生薑
若久病胃虛嘔而不納穀者用生薑參朮黃芪香附
之類亦有痰膈中焦食不得下者有氣逆而嘔者有
氣鬱於胃口者有食滯於心肺之分而復出者有胃
口有火與痰而嘔者若注船大吐渴飲水者即死童

便飲之最妙前論云血不歸源而嘔用十全大補湯
誠發前人之未發愚常用屢効此論與王安道所論少異宜參看
之先太宜人飲食後聞外言忤意嘔吐酸水內熱
作渴惟飲冷水氣口脉大而無倫面色青赤此肝脾
鬱火投之以藥入口即吐第三日吐宿食第七日吐
酸黃水十一日吐苦水脉亦洪大仍喜飲冷以黃連
煎湯冷飲少許至二十日加白朮茯苓二十五日加
陳皮三十七日加當歸炙草至六十日始進米飲半
盞漸進薄粥調理得痊 府庠沈姬文母患脾虛中
滿痰嗽發熱又食濕麵冷茶吞酸嘔吐絕食誤服苓

連青皮等藥益加寒熱口乾流涎不收聞食則嘔數
日矣迎治余曰脾主涎此脾虛不能約制也欲用人
參安胃散惑於衆論以為胃經實火宿食治之病且
增劇忽思冬瓜食如指甲一塊頓發嘔吐酸水不止
仍服前藥愈劇復邀視之則神脫脉絕瀕死矣惟目
睛尚動余曰寒淫於內治以辛熱然藥不能下矣急
用鹽艾附子炒熱熨臍腹以散寒回陽又以口氣補
接母口之氣又以附子作餅熱貼臍間時許神氣少
甦以參朮附子為末仍以是藥加陳皮煎膏為丸如
粟米大入五七粒于口隨津液嚥下即不嘔二十日後

加至十粒諸病少退甘涎不止五日後漸服前劑一
二匙胃氣少復乃思粥飲後投以參朮等藥溫補脾
胃五十餘劑而愈 孫一婦人三十五歲無子恐夫
娶妾致鬱經不行者三月矣病腹痛惡心諸醫皆云
有孕其夫亦粗知醫舉家欣喜治以安胎行氣止痛
之藥服三五十貼不効痛苦益甚凡未申時發寒熱
腹中有塊如彈子大者二三十枚翻騰作痛行動則
水聲漉漉痛極則吐酸水五六碗吐盡則塊息而寒
熱除痛亦不作明日亦然又作瘡治轉劇召予診左
手弦尺濇右手濡弱重取則滑尺同左時經已五月

不行矣予曰此鬱病也豈有濇脉成孕之理若然則
前藥當効矣其夫亦悟乃為製方以一陳加香附山
梔撫芎玄胡當歸紅花之類藥進而痛止連與四貼
皆効但藥止則痛發如故調治一月不能除根予因
持脉案見先師黃古潭先生先生乃諭予曰此鬱火
病也其病起于肝膽蓋肝主謀慮膽主決斷謀不決
則鬱生鬱生則木盛木盛則凌脾脾傷則不能運化
精微而生氣血以故月水不來也肺金失於母養則
降殺之令不行木寡于畏而侮所不勝是以直衝犯
清道以作吐也吐後諸證皆減者木升而火息也為

裁一方以黃芪五錢柴胡參錢白芍藥貳錢甘草壹
錢陳皮貝母枳實各五分薑叁片一劑而寒熱除再
劑而痛減吐止水聲亦絕七日不發其夫喜曰是何
神速也乃拉予復請命于先生先生曰夫寒熱者少
陽膽也吐酸者厥陰肝也痛而腹墮翻騰者火盛激
動其水如鍋中湯滾泡浪沸騰是也吐多則肺金愈
傷故用黃芪補肺金為君使得以制肝木以柴胡瀉
肝為臣以升發其膽火經曰木鬱則達之達是通達
之義夫木性上升者也既鬱則不升故用柴胡升發
膽肝之清氣使衝開其鬱結以復其常又曰過者折

之以其畏也所謂瀉之補肺制肝正謂此也又曰泄
其肝者緩其中以甘草緩中為佐又曰木位之主其
瀉以酸以白芍藥于脾中瀉木為臣病久生鬱鬱久
則生涎以貝母陳皮枳實開鬱逐涎為禪使然後金
得其正木得其平土得其安由是病去而愈速前方
用山梔黃連之類皆降下之藥火勢正熾豈區區寒
涼所能抑哉故經曰輕者正治重則從其性而升之
但凡治病要當識得此意
益智子散 治婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐全不
下食四肢無力

益智 壹兩

附子 炮

縮砂仁

丁香

厚朴

黃芪

白朮

白茯苓

陳皮

川芎

良薑

藿香葉

當歸 各末 錢半

人參

桂心 各半 兩

右咬咀每服叁錢薑叁片棗壹枚水壹盞煎至七分去滓無時溫服

丁香散 治婦人臟腑虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水穀不消

丁香 白朮 縮砂仁

穀不消

丁香

白朮

縮砂仁

草果仁

橘皮 各末 錢半

當歸

白豆蔻

藿香葉

神麴

訶子皮

甘草 各半 兩

人參 壹兩

右為細末每服貳叁錢煎薑棗湯調下

竹茹湯 治胃熱嘔吐

乾葛 叁兩

半夏 湯洗米次薑汁半盞漿水壹升煮耗一半取米錢半

甘草 米錢半

右咬咀每服五錢水貳盞薑叁片竹茹雞彈大棗

子壹枚煎至壹盞去滓溫服 許學士云胃熱者

手足心熱政和中一宗人病傷寒得汗身涼數日

後忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆用丁香藿香滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後飲熱留胃脘孫兆竹茹湯正相當爾亟治藥與之即時愈

良方槐花散

皂莢

白礬

槐花

炒令黃
黑色

甘草各等分

右為細末白湯調下貳錢

許仁則半夏丸 療積冷在胃嘔逆不下食方

半夏

壹升真熊州者洗去滑

小麥麵

壹升

右擣半夏為散以水搜麵丸如彈子大以水煮令

麵熟則是藥成初吞四五丸日二服稍加至十四五丸旋煮旋服此覺病減欲更合服亦佳忌羊肉錫

又依前半夏丸雖覺漸損然病根不除欲多合前丸又慮藥毒不可久服欲不服又恐病滋蔓宜合人參七味丸服之

人參

白朮

厚朴

炙

細辛各肆兩

生薑

剝兩末

橘皮

叁兩

桂心貳兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大飲下拾丸漸加至
貳拾丸與半夏丸間服亦可忌桃李雀肉生葱生
菜

補遺治男子婦人一切嘔吐五苓散內除桂加半夏
末如桂分兩每服壹錢以生薑自然汁調搜和如
麵候半時久再以白沸湯一小盞調開溫服五苓散方見傷寒準繩渴門

青金丹 治一切嘔吐不已

硫黃 貳錢 水銀 壹錢
入銚內慢火熬化以木篋子揆炒成砂再入乳鉢

研黑不見星以薑汁糊丸如菜豆大每服貳叁十
丸米飲下

人參安胃散 治脾胃虛熱嘔吐泄瀉或飲食不入

- 人參 壹錢
- 黃芪 炒貳錢
- 生甘草
- 炙甘草 各伍分
- 白芍藥 柒分
- 白茯苓 肆分
- 陳皮 叁分
- 黃連 炒貳分

右水煎服

霍亂

大嘔吐而利者名霍亂也原疾之由皆因腸胃虛冷飲食過度觸冒風冷使陰陽不和清濁相干致令揮霍變亂也或先心痛而吐者或先腹痛而利者或吐利俱作者或頭痛身體壯熱而脈浮洪者或陽氣暴絕而手足逆冷而脈息微絕者治之當分陰陽察其虛實辨其冷熱觀其脈息熱者涼之冷者溫之以平為期百問云凡霍亂吐利熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中丸吐利已汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯夏月間中暑霍

霍亂

大科三

三

齊境果

亂大煩渴四肢逆冷冷汗出脚轉筋者香薷散濃煎
沉冷服即効凡霍亂之脉得浮洪者易治
先生云暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入
傷心胞絡之經其證頭疼口乾面垢自汗倦怠少氣
或背寒惡熱甚者迷悶不省或霍亂吐利嘔啞腹痛
或下血發黃生癍等證治法清心火利小便為主若
自汗熱甚用白虎湯若頭疼惡寒用十味香薷散泄
瀉煩渴飲水吐逆用五苓散熱甚煩渴用益元散清
之若表解裏熱甚者用黃連解毒湯肌微下利伴渴
喜溫或厥冷不省人事宜竹葉石膏湯加熟附半枚

冷飲次以來復丹五苓散治之故東垣云脾胃虛弱
遇夏月淫雨身重短氣甚則四肢痿軟脚軟眼黑當
滋肺氣以補水之源是以五月常服五味子人參麥
門冬之劑為熱傷元氣故爾丹溪所謂夏月伏陰在
內也蓋人之腹屬地已月六陽盡出於地之上矣是
人之陽氣亦浮于肌表散于皮毛而腹中之陽虛矣
又加以涼臺水館大扇風車寒泉水果冰涼之物自
內及外不用溫熱病所由生陳無擇云凡中暍切勿
得用冷藥惟用溫養得冷即死道途無湯即以熱土
熨臍中溺以熱尿即甦槩可見矣內經曰脉虛身熱

得之傷暑難經曰傷暑得之為正邪火自病也當惡
其病身熱而煩心痛其脉浮大而散傷寒論曰太
陽中暍者身熱頭痛而脉微弱或發熱惡寒而脉弦
細芤遲大抵寒傷形熱傷氣蓋傷氣而不傷形則氣
消而脉虛弱故先哲立法夏月宜補良有以也前證
若內有所積外有所感用二陳湯加減治之或蘿蔔
子搗碎服而吐之若飲米湯即死云云同前論若轉
筋不住男子以手挽陰女子以手牽乳近兩邊此千
金妙法也乾霍亂不得升降歿在須臾當以鹽湯吐
之後以二陳湯加川芎蒼朮防風白芷薑煎服若登

圍而不通加枳殼若食瓜果飲冷乘風霍亂用六和
湯倍加藿香大凡中暑而亡者皆因元氣虛弱暑熱
乘之以致泄瀉陽氣暴脫實為陰寒之證宜急補其
陽庶得保生緩則不救其他執為暑熱投以寒藥鮮
不誤事愚故以回陽固本之方繼之於後
加減理中丸 主霍亂臨時方亦可治男子

人參

白朮

乾薑

甘草 各壹兩

右為細末煉蜜為丸每兩作五丸取湯和壹丸服
之日參服 吐多利少者取枳實參枚炙去穢四

破水參升者取壹升和壹丸服之吐少利多者加
乾薑壹兩吐利乾嘔者取半夏半兩泡洗去滑
水貳升煮取壹升和壹丸服若體疼痛不可堪
者取棗參枚水貳升煮壹升和壹丸服吐利太
極轉筋者以韭汁洗腹腎從胸至足踝勿逆即止
若體冷微汗腹中寒取附子壹枚炮去皮四破
以水貳升煮取壹升和壹丸服吐利悉止脉不
出體猶冷者可服諸湯補之

四順湯 治霍亂吐利腹痛手足逆冷脉微欲絕

附子 壹枚破

乾薑 叁兩

人參

甘草 各壹兩

右咬咀水煎服

四逆加豬膽汁湯 治吐已下斷汗出而厥四肢拘

急不解脉微欲絕者

甘草 貳兩

乾薑 叁兩

附子 壹枚生用

豬膽汁 半合

右三味咬咀每服五錢水參蓋者至貳蓋去滓內
豬膽汁分二次温服其脉即來
香薷散 治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥鱸生
冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取涼而

風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消
化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於
腸胃之間便至吐利心腹疼痛霍亂氣逆有先心
痛而吐者或先腹痛而利者有吐利俱發者有發
熱頭痛體疼而後吐利虛煩者或但吐利心腹刺
痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或
四肢逆冷脉微欲絕者或煩悶昏塞欲死者妊婦
霍亂吐利此藥悉能主之

香薷葉

肆兩

白匾荳

厚朴

各貳兩

右取上每服半兩水壹大盞酒壹分慢火濃煎至

本方去滓井中浸令冰冷頓服無時候連併二三
服立見神效蘇沈良方中名香茸散
百問同有黃連無匾豆
訶子散 治老幼霍亂吐利一服取效又治九種心
痛及心脾冷痛不可忍

訶子皮

甘草

厚朴

乾薑

草果仁

陳皮

良薑

茯苓

神麴

麥門冬 各等分

右為細末每服貳錢候發刺痛不可忍用冰壹盞
煎七分入鹽服急則鹽點

霍亂

女科三

三三

胡椒湯 治霍亂吐利甚妙

胡椒 肆拾粒

菉豆 壹百肆拾粒

右為細末每服貳錢木瓜煎湯調下

補遺凡霍亂身熱脉浮洪而渴者此必胃有熱宜竹茹湯吐止然後以五苓散不換金正氣散六和湯等治之或若陽氣暴絕四肢逆冷脉微欲絕可用理中湯理中丸治中湯之類甚者加附子如中暑霍亂吐利嘗以香薷散入半夏少許用生薑自然泔搜藥劑入銅銚炒乾再入好紅麴酒又搜潤藥又炒乾却入水壹盞半煎七分去滓井中浸冷服効

翻胃吐食

薛病機云吐有三曰氣積寒也皆從三焦論之上焦吐者從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胸發痛其治法常降氣和中中焦吐者從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脉浮而圈其證或先痛而後吐或吐而後作痛治法當以小毒藥去其積檳榔木香行其氣下焦吐者從于寒地之道也其脉沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清大便秘而不通治法當以毒藥通其秘塞温其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不冷

反胃吐食

女科三

三三

大便秘結而自愈也王太僕曰食不得入是有火也
食入反出是無火也又發明曰噎者六腑之所主陽
也氣也塞者五臟之所主陰也血也二者皆由陰中
伏火而作也劉宗厚先生曰若三焦傳化失常所致
主於氣也若血虧胃脘乾稿所致因於血也塞猶填
塞不通之義故發明有治幽門不通噎塞不使通幽
湯例蓋陽無陰不能通化陰之失位而陽伏其中傳
化不變而反上行矣故前證或由飲食起居七情虧
損脾胃痰飲停滯中氣不運當以補中益氣湯雜病
勞倦
為主若鬱結傷脾用歸脾湯雜病
健忘加枳殼桔梗若恚

怒傷肝用小柴胡湯傷寒
少陽加梔苓參朮脾氣虛弱用
六君子雜病
虛勞加山梔枳殼氣血俱虛用八珍湯雜病
病入
湯物加山梔半夏若用行氣之藥胸膈痞悶用六君子
歸之類若過用香燥之劑而大便秘結燥用四物通參
治
朮之類若飲食不能入用六君子山梔吳茱萸治黃連
若食入而反出用六君子炮薑白芍蒼黃連製吳茱萸
若痰滯而食反出六君子枳殼桔梗若飲食少思大便
不實胸膈痞悶吞酸噯腐食反不化是為脾胃虛寒
用東垣補真丸或八味丸雜病
虛勞若發熱煩熱身惡風
寒腹畏熟食或手足俱冷胸滿腹脹是內真寒外假

反習土食
女科三
三十五

熱用神効附子丸本條或八味丸大凡嘔吐善食喜
飲冷水是為有火嘔吐少食喜飲熱湯是為無火當
審其因而治之一婦人患前證胸腹痞悶得去後
或泄氣稍寬余曰此屬脾氣鬱結而虛弱也當調補
為善不信乃別用二陳枳實黃連之類不應又用香
燥破氣前證益甚形氣愈虛余用加味歸脾湯即本方加
柴胡調治半載而痊一婦人患前證胸脇脹悶或
小腹不利或時作痛小便滯滯余曰此肝火血虛也
當清肝火生肝血養脾土生肺金以余言為迂別服
利氣化痰等劑前證益劇虛證愈起余用加味逍遙

散經調加味歸湯兼服尋愈一婦人患吐痰甚多手
足常冷飲食少思余曰此肝脾鬱怒兼命門火衰不
信另服化痰利氣之劑胸腹愈脹又服峻利疎導之
劑余曰非其治也必變脾虛發腫之證急服金匱加
減腎氣丸庶有可救不信反服沉香化氣等丸果發
腫而歿

白礬散 治婦人翻胃吐食千金翼云不特治婦人
男子亦可服一斤以上為妙

白礬土以米醋壹升煨土令赤入醋內浸令
冷再煨再浸以醋乾為度取壹兩研
乾薑炮 貳錢半

及胃吐食 女科三 三六

右為細末每服一錢米飲調下甚者貳錢

白芷散 治婦人翻胃吐食

右用白芷壹兩切作片瓦上炒令黃為細末用豬血二十文切片以沸湯泡七次將血蘸藥喫七片

如剩藥末留後次用

太倉丸 治脾胃虛弱不進飲食反胃嘔吐

白豆蔻

縮砂仁 各貳兩

丁香 壹兩

陳倉米 壹升用黃土炒米赤去土不用

右為細末薑汁法丸梧子大每服六七十丸食後

淡薑湯下

青金丹 治嘔吐反胃等證每用叁拾丸煎生薑陳

皮湯吞下 嘔吐方見前

五苓散 治反胃發渴加半夏每四錢生薑五片煎

溫服 方見傷寒渴

東垣補真丸

肉苁蓉 酒浸焙

葫蘆巴 炒

附子 炮去皮

陽起石 煨

肉豆蔻 麩裏

兔絲子 淨洗酒浸蒸

川烏 炮去皮

沉香

五味子 各伍錢

鹿茸 酒浸炒

巴戟 去心

鍾乳粉 各壹兩

右為細末用羊腰子兩對治如食法葱椒酒煮搗

食米

反胃吐食 女科三 三七

爛入酒糊丸如梧子大每服七十九空心米飲鹽湯任下

神効附子丸 治脾腎虛寒嘔吐或反胃膈噎

黑附子重壹兩肆伍錢端正底平尖圓壹枚灰火炮皮裂入生薑自然汁內浸潤晒乾仍炮再入汁浸潤仍晒再炮用盡薑汁半椀為度却去皮臍末之以人參膏和丸如黍米大每服數丸津唾嚥下胃氣稍復飲食稍進投以溫補之劑

鹽麩

血膈

薛婦人血膈若氣逆而血滯用流氣飲膈痛若素怒而

血逆用小柴胡湯傷寒少陽加山梔丹皮血虛用四物湯

通參朮柴胡山梔丹皮若鬱結而血傷用加味歸脾

能歸脾加兼加味道遙結脾虛不能生血用六君子

山梔丹皮兼加味道遙核脾虛不能生血用六君子

雜病加歸芎胃虛不能生血用補中益氣湯雜病若

肝虛而不能藏血用補肝散兩脇脹痛如不應兼以六味

丸雜病若因脾肺虛用補中益氣湯如不應用六君

子加芎歸 一婦人患前證胸膈痞悶余曰此屬脾

血膈

血膈

三十七

兩脇痞悶頭目不清月經旬餘未竭用加味道遙散
加釣藤治之復差一婦人患前證胸膈作痛面青
目劄小便頻數或時寒熱此肝氣滯而血凝先用失
笑散二服痛止又用加味道遙散而愈一婦人所
患同前泛用行氣破血之劑以致不起

牡丹煎治婦人血膈

牡丹皮

苦參

貝母去心

玄胡索

白芍藥各等分
為細末

煉蜜丸梧子大每服拾五貳拾丸米飲吞下無時

抽刀散

治婦人血風血氣血膈等候方見
血崩

鼻衄

因夫婦人鼻衄者由傷動血氣所致也凡血氣調和
則循環表裏經絡澀則不散若勞傷損動因而生熱
氣逆流溢入於鼻者則成鼻衄也只有產後見衄者
不可治凡鼻衄雖多因熱而得此疾亦有因怒氣
而得之者曾治趙恭人鼻衄不止諸治不差召予治
之先用蘇合香丸四粒次用五苓散濃煎白茅花湯
調服即止次用芎歸湯調理又有一富室男子鼻血
不止六脉洪數究竟云服丹藥太過遂用黃連黃芩
大黃為末水煎服之愈調服
亦可陸前證若熱鬱於胃

鼻衄

女科三

三

經用犀角地黃湯若伏暑於內用黃連香薷飲若大
怒血蓄于上用小柴胡湯若脾損不能攝血歸源用
歸脾湯大凡雜證見血多因陰分鬱熱或內有所傷
皆屬五志所動經曰諸見血身熱脉大者難治是火
邪勝也身凉脉靜者易治是正氣復也仍與後證同
用一婦人經素不調因怒衄血此肝火熾盛用加
味小柴胡熱入血室加紅花一劑血止又用加味道遙散
結八珍湯即八物湯雜病虛勞兼服三十餘劑經行如期一
婦人鬱結而患前證用加味歸脾湯即歸脾加其血
漸止飲食漸進用加味道遙散元氣漸復寒熱漸止

後因怒仍衄寒熱往來用小柴胡湯傷寒太陽加芩歸丹
皮而愈一婦人因勞衄血服凉血之劑更致便血
或以血下為順仍用治血余曰此因脾氣下陷而血
從之當升補脾氣庶使血歸其經不信果血益甚余
朝用補中益氣雜病勞倦夕用加味歸脾而愈此證用寒
凉止血不補脾肺而死者多矣
刺薊散 治婦人鼻衄血流不止

- 刺薊 貳兩
- 桑耳
- 亂髮灰
- 艾葉 各壹兩 炒
- 生地黃 貳兩
- 蒲黃 壹兩半

右為細末每服貳錢粥飲調下無時

伏龍肝散 治男子婦人五臟結熱吐血衄血並皆

治之

伏龍肝

生地黃

各壹斤 竹茹壹升

芍藥

黃芩

當歸

川芎

桂心

甘草各貳兩

右咬咀以水壹斗參升煮竹茹減參升內藥煮取

參升分為二服千金方無桂心

百問有茅花湯以白茅花濃煎飲之立止

一方擣生白茅根取汁壹合飲之止

又方取生葱心塞鼻中即定若因刺著并刀斧所

傷血不止者並用之立定

又方取釜底墨細研入鼻中

又方取亂髮灰細研以竹管吹入鼻中立止

又方取龍骨為末吹入鼻中立止

四物湯加側柏生地黃治虛熱吐血甚効若脾經血

虛須用四君加芎歸若脾經氣鬱須用歸脾湯若

肝腎虧損須用六味丸若氣血俱虛須用十全大

補湯

犀角地黃湯主熱鬱不解泛行經絡或流腸胃隨氣

涌泄以致衄血吐血或為便血並皆治之若實熱

熾甚加炒黃芩若去血過多或脾肺之氣虧損不能攝血歸源者急用四君子湯懷抱鬱結者用歸

脾湯

枇杷葉散治著毒攻心衄血嘔血或吐瀉作渴黃連香薷飲亦可

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

吐血

大婦人吐血者皆由臟腑傷損所致夫血者外行於經絡內榮於臟腑若傷損氣血經絡則血虛行失於常理氣逆者吐血又怒則氣逆甚則嘔血然憂思驚恐內傷氣逆上者皆吐血也

薛前證若脾經鬱熱

用犀角地黃湯脾胃伏暑用黃連香薷飲

鬱熱用生地黃湯心氣耗損用茯苓補心湯肺氣勞

傷用雞蘇散思慮傷脾用歸脾湯

加味小柴胡湯

肺虛熱用麥門冬飲肝腎虛熱用六味地黃丸氣血

俱虛用十全大補湯經云肺朝百脉之氣肝統諸經之血必用甘溫之劑補其陽氣使血各歸其經如大吐血病毋論其脉急用獨參湯救之若潮熱咳嗽而而脉數者元氣虛而假熱之脉也皆由脾胃先損須用人參之類本草云人參治脾胃不足補中溫中瀉脾肺中火東垣先生云脾胃虛者心火亢甚而乘土位肺氣受邪須用黃芪最多人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理嘗治氣血虛弱用十全大補最善若用寒涼止血胃氣反傷無不致禍一老婦每作先飲食不進或胸膈不利

或中脘作痛或大便作瀉或小便不利余以為肝脾之證用逍遙散加山梔茯神遠志木香而愈後鬱結吐血紫血每作先倦怠煩熱以前藥加炒黑黃連叁分吳茱萸貳分頓愈復因怒吐血甚多燥渴垂死此血脫也法當補氣乃用人參壹兩苓朮當歸各叁錢陳皮炮黑乾薑各貳錢炙甘草木香各壹錢一劑頓止又用加味歸脾湯調理而痊一女子懷抱素鬱胸滿食少吐血面赤用六味丸及歸脾加山梔貝母芍藥而愈一婦人為哭母吐血咳嗽發熱盜汗經水不行此悲傷肺思傷脾朝服補中益氣湯雜病加

桔梗貝母知母冬用歸脾湯吞六味丸而愈

鷄蘇散 治婦人吐血心煩昏悶

雞蘇葉 壹兩 阿膠 刺薊

生地黄 各壹兩 黃芪 麋羊角屑

茜根 甘草 各半兩 麥門冬

黃芩 當歸 伏龍肝 各半錢

右為粗末每服四錢水壹盞薑叁片竹茹半雞子
大煎至六分去滓溫服

又方 治婦人虛損氣逆吐血不止

雞蘇葉 黃芩 各壹兩 當歸

赤芍藥 各半 伏龍肝 阿膠 各貳兩

右為粗末每服四錢水壹盞煎六分去滓溫服

治婦人熱毒上攻吐血不止

生藕汁 刺薊汁 生地黄汁 各叁兩

生薑汁 半合 白蜜 壹合

右和煎三兩沸以壹小盞調炒麵壹錢服無時

千金翼治吐血百方不瘥療十瘥神驗不傳方

藥性治熱毒吐血有效

地黄汁 半升 生大黃末 壹方 寸七

右煎地黄汁三兩沸調大黃末令勻分為三服

又方 伏龍肝研極細每服貳錢新汲水調下頻服

取効

又方 白茅根壹握長陸寸以水壹大盞煎七分去滓服

又方 桂心未水調方寸匕日夜可二十服

又方 生地黄切參升阿膠貳兩炒蒲黃陸台以水五升煮

取參升分三服 予嘗治一人吐血診其脉肝部

弦氣口濡此因怒極而得之遂用蘇合香丸和雞

蘇丸服即効養生必用方云凡吐血須煎乾薑甘

草湯與服或四物理中湯亦可如此無不愈者服

生地黄竹茹藕汁去生便遠

柔脾湯 治虛勞吐血衄血下白汗出方出養生必用

甘草

白芍藥

黃耆

各壹兩

熟地黄 參兩

右為末每服四錢水酒各壹盞已上煎至七分去

滓取清汁六分温服食前 予嘗治一女人年十

九歲月經不行以藥通之遂妄行而嘔血諸藥不

効察其人肥脉不大不小投以四生丸即安 又

治一男子因飽低頭負重吐血諸藥無効亦投四

生丸及青餅子即安更不發嘗觀初虞世治吐血

不喜用竹茹生地黄藕汁然亦不可拘泥此說如

陽乘於陰血得熱則流散經水沸溢宜服涼藥以解之太黃犀角生地黄生艾藕汁等豈得無效若陰乘於陽所謂天寒地凍水凝成冰宜服溫藥以煖之乾薑肉桂豈能無功學者更宜思之
四生丸 療吐血凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉

生艾葉

生栢葉

生地黄

各等分

右爛研圓如鷄子大每服壹丸水送盞煎至壹盞去滓溫服無時候 陳日華云先公紹興初遊福

溝靈石寺主僧留飯食將竟侍者赴堂齋罷來侍立見草子不穩急罄折穩之舉首即嘔血蓋食飽拗傷肺也明年再到寺問舊年嘔血者無恙否主僧云得四生丸服之愈自得此方屢施有驗
薛
愚意前證乃內熱暴患用之有效若人病久本原不足須補脾以滋化源否則虛火上炎金反受剋獲生鮮矣

療熱甚嘔血者以犀角地黄湯局方小二黃湯以白茅根煎濃湯飲之極妙
犀角地黄湯 治內有瘀血鼻衄吐血面黃太便黑芍藥朱錢半 生地黄半斤 牡丹皮去心淨壹兩

犀角屑

壹兩如無以代

右吹咀每服伍錢水煎服有熱如狂者加黃芩貳兩

青餅子 治咯血

青黛

杏仁 各壹兩華佗方以牡蠣粉炒杏仁去皮尖牡蠣不用

右一處同研成膏熔黃蠟和作參拾餅子每服壹餅子用乾柿半箇夾定以濕紙裹煨令香同嚼粥飲下無時

乾薑甘草湯 若陰乘於陽心肺經寒而嘔血者宜服

甘草

乾薑 各半兩

右吹咀水煮頓服 局方理中湯亦妙

花藥石散 予嘗見一婦人苦此疾百藥不效以童

子小便和酒調下真花藥石散不數服而愈

烏金散 治吐血不已每服貳錢米飲下即催生如神散方見後

濟生雞蘇散 治勞傷肺經唾中有血咽喉不利

雞蘇葉

黃芪 炒

生地黄

阿膠 炒

貝母

白茅根 各壹錢

桔梗 炒

麥門冬 去心

蒲黃 炒

四血 如禾三

甘草 炙各伍分

右薑水煎服

生地黄散 治鬱熱衄血咯血吐血陰虛而不能愈者

者

枸杞子

柴胡

黃連 炒

地骨皮

天門冬 去心

白芍藥

甘草 炒

黃芩 炒

黃芪 炒

生地黄

熟地黄 自製各伍分

右水煎服 下血加地榆

三因茯苓補心湯 治面色黃悴五心煩熱咳嗽吐

血

半夏

前胡

紫蘇

茯苓

人參

枳殼 麸炒

桔梗 炒

甘草 炒

乾葛 各伍分

當歸

川芎

陳皮

白芍藥 各壹錢

熟地黄 自製壹錢半

右薑棗水煎服

麥門冬飲子 治氣虛吐血或氣虛不能攝血

五味子 筒

麥門冬 去心

黃芪 炒各壹錢

當歸身

人參

生地黄 各半錢

十一

六十三

四

右米煎服

十全大補湯 治胃氣虛弱吐血衄血便血不止以致外證惡寒發熱自汗盜汗食少體倦或寒熱作渴頭疼眩暈而似中風或氣血俱虛胸腹脇痛或骨節作痛經候不調或寒熱往來發熱晡熱或五心發熱咽乾舌燥或痰嗽喘促胸膈虛痞或嘔吐泄瀉手足冷熱等證方見雜病

