

中華民國政府內政部登記證字第一〇〇〇號
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

總發行所杭州東街路一二三號

LAXADON

八腸緩下新藥

療塞通

療塞通係化學合成之緩下新藥具左記之特色願各大醫師提倡使用

- 一、無臭無味極易服用
 - 一、用量極少奏效確實
 - 一、無習慣性及其他腹痛裏急後重等弊
 - 一、有藥粉藥片調劑投藥極爲便利
- 樣品說明書函索即寄



上海新開路一千九百五十五號新亞藥廠發行

醫學雜誌
 醫學
 衛生
 提倡
 衛生
 醫學
 衛生
 提倡
 衛生

汪建侯醫師主編

第四卷第十期

中華民國二十三年十月出版

特 四 劑 砒 香 息 安 之 微 輕 質 毒
點 大

SULFARSENOL

INTRAVENOUSLY
SUBCUTANOUSLY
INRAMUSCULALYT

靜 肌 皮 可
注 射 及
脈 肉 下 供

六〇六新良改

行 洋 興 永 商 法 漢 天 海 上 理 經 總 國 中

無 反 應 !
無 痛 苦 !
無 危 險 !

一、本劑含砒素百分之一九故其毒性輕微
二、本劑可供皮下及肌肉注射毫無痛苦亦無發炎
三、本劑分量完備自0.005g起至1g止有十九
種不同分量故老人小兒均可施用
四、本劑兼治白濁之令併症有特殊效力為他種砒
劑所不及

州

杭

房 藥 經 濟

經理雷錠
華廠出品
泰西名藥
化裝香品
注射新藥
家用良藥
醫療器具
接方送藥
日夜應配

口 巷 善 寶 路 橋 荐 州 杭
號 四 三 四 三 話 電

本誌主筆

(以姓氏筆劃多少為序)

簡章刊于
文字後面

外界惠稿
無任歡迎

江秉甫 沈康白 汪建侯 汪鶴盒 邵象伊 夏慎初 徐祖毅 郭人驥 章松筠 鄒躍如 厲綏之 盧良銘

本期目錄

- 補劑之藥理作用.....葉惠秋
- 我對於酒的感覺及片段建議.....楊仙樵
- 鹿茸之科學觀.....劍侯
- 婦科出血之原因與處置.....白忍
- 軟部外傷及其應急處置法.....馮乃勳
- 維他命之種類性狀及其功用.....林郁青
- 藝林
- 海棠香館吟草(二十一續).....汪建侯

廣告索引

CLASSIFIED LIST OF ADVERTISEMENTS

新亞藥廠.....療塞通.....	封面
新亞藥廠.....雙治拍菌.....	1
美狄根洋行.....奧頗靈.....Opclen.....	Cover
永興洋行.....改良新六〇六.....SULFARSFNOL.....	Cover
同濟藥房.....營業要目.....	Cover
謙信洋行.....奧拍泰片.....Optarson.....	Cover
興華公司.....沃度拏.....Jodipin.....	2
先靈洋行.....亞陀方.....Atcphan.....	7
禮和洋行.....梅乃落.....Milanol.....	3
安定洋行.....蘇柏喜本.....Suplahypen.....	6
福康西藥店.....撲咳他勁與法可爾.....	5


Star Brand

Transpain

樟腦
奎寧
水溶液
注射劑

本品不用油質溶化
易於吸收迅速發揮
專治腦及奎寧之功
管枝肺炎急慢性氣
症及其他氣管枝疾
甚有強心解熱消炎
殺菌等功用範圍
甚廣

說明書樣品承索即奉
各大藥房均有出售



雙
星
標
記

筋肉
注射
絕無
疼痛
製法
精良
功效
神速

上海新亞藥行

E. MERCK CHEMICAL WORKS **DARMSTADT**
 SCIENTIFIC DEPARTMENT - 1 NANKING RD. SHANGHAI

TRADE **IODIPIN** MARK


沃度拼

有機油中與脂肪酸結
 合之碘 諸藥劑中碘
 含量最富 無損胃口
 而藥劑激性 可內服

亦可注射 專用于一

般碘適應症

- ▼ 第三腺毒
 - ▼ 神經痛
 - ▼ 急性傳染病
 - ▼ 關節炎
 - ▼ 各種慢性炎
 - ▼ 肋膜炎
 - ▼ 甲状腺腫
 - ▼ 瘰癧
 - ▼ 淋病
 - ▼ 血骨硬變
 - ▼ 氣喘
 - ▼ 肺病
 - ▼ 喉痛
 - ▼ 各病時症及毒害
- 愛克司光線診斷
 上唯一現影劑



AGENTS FOR CHINA - SCHMIDT & CO.
 SHANGHAI - PEIPING - TIEN TSI - MURDEN - HARBIN - CANTON - HONGKONG

梅毒之最新療法

應採用鈹劑

效力最大

毒性最小

首推 梅乃落

“MILANOI”

梅乃落為 Bismuth Salt of

Trichlor-tertiary Butylmalonic

acidester 之油溶液專

供肌肉注射無痛無

反應一全劑之治療

注射十次已足

梅乃落每匣十二

管每管一西西五

山德士鈣

止血 強心 營養 解毒
注射劑 藥粉 藥片

用山德士鈣之功效

肺癆：使肺部壞處恢復健全

病後：調理清補勝於病前

孕婦：使母子營養佳良


產後：防止血虧體虛

小孩：發育健碩成長迅速

成人：強胃納補體力長精神

總經理德商禮和洋行

本外埠各大藥房均有分售



補劑之藥理作用

葉惠秋譯述

The Pharmacological Action of Tonics

By Professor J. H. Burn

(The Pharmaceutical Journal, No. 3666, Vol 132, Feb. 3, 1934)

補劑二字。非但在普通人中常用之。即藥師及醫師亦多用之。故補劑究爲何種意義。頗有研究之價值。物質如龍膽 (Gentian)、番木鱈素 (Strychnine)、腎上腺素 (Adrenaline)、酒精 (Alcohol)、甲狀腺粉 (Thyroid)、以及維他命乙 (Vitamin B.) 等。皆可列入補劑類中。龍膽浸劑爲苦味補劑之一種。此種苦味。補劑。在飯前服之。使舌感覺苦味而生多量之胃汁。因有此作用。故能激增食慾及消化能力。此種多量胃汁之產生。皆由於激動 (Impulses) —— 自神經至胃細胞。當咀嚼苦味物質時。激動皆由味神經傳至腦部。此類激動引起其他激動。由腦部傳至胃細胞而產生胃汁。如是苦味物質之效力可說是「反射」(Reflex)。並非由於物質與胃壁之直接接觸也。

番木鱈素 (Strychnine)

番木鱈素。當其用番木鱈酊或浸膏口服時。其作用僅似一種簡單苦味藥。其益補效力由

於胃汁之增加。因而增進消化能力及食慾。然用衣司登氏糖漿 (Eaton's Syrup) 藥片口服時。番木鱈素之作用則迥異。凡人身中之各神經間有一連絡點或名『末鞘參錯』(Synapsis)。此種末鞘參錯呈現一部份抵抗(阻止)。極輕微之刺激僅使發生稍微反應。因此種刺激不能經過二次以上之阻止。較大之刺激能經過較多阻止。所以使較多數之神經受着影響。番木鱈素之能力。即使神經組織中之末鞘參錯阻止減少。故其效力即對於輕微刺激使其反應較前增大。是以輕微刺激能經過較多數之末鞘參錯。而使較多神經纖維動作。

最後。或謂番木鱈素有一種補心作用。依照事實而論。此說實爲荒謬。因番木鱈素。無論如何。對於心臟毫無直接作用。假使將心臟取出。養於血中或適宜之鹽液中而仍能跳動不已時。試以番木鱈素則一無作用。但實際上。心臟在身內時。番木鱈素能間接增加心之跳躍。

當用皮下注射時。番木鱈素刺激腦部。因使繳動發生而至管理主動脈直徑之神經。如是番木鱈素使主動脈及其他動脈之直徑縮小。增高脈內壓力。因而使較多血液流經循環組織。如是心壁得受較多之氧氣。而其跳躍能力亦因之更强。在每跳中所發放之血量亦較多。因而使血壓仍增高。而循環血流亦得以加速。職是之故。當用以注射於猝然脫力之病之時。番木鱈素能使衰弱心臟復原。但番木鱈素對於心臟本身則毫無益補作用也。

腺上腺素 (Adrenaline)

腎上腺素爲天然之重要補劑。生於腎上腺內。爲最有強力之補劑。可稱純正之『起死回生丹』(Corpsa reviver)。例如。在施行手術時。病人之呼吸或者停止。稍遲心跳亦將停止。而病人死矣。用腎上腺素注入心臟。並助以人工呼吸。則常能使其復生。其益補效力主在心臟本身。因注射腎上腺素後。心肌肉之纖維復得其能力。而此種令人驚異之效力。對於取出之心臟及在身內之心之作用相同。

腎上腺素對於多數組織皆有作用。其能力常使全身動作。如爭鬥或奔跑情形，在此種情增之下。心跳更速而有力。以供所需之血液於多量筋肉能力之產生。其主動脈皆收縮。因是形高血壓及加增血量於腦部。瞳孔皆散大。使光線入目中更多而增進眼力。氣管皆放大。使吸多量之空氣。腸之蠕動止而血液之供給亦止。如是使肌肉得較多之供給。其主要治療之應用。全持其能將微血管閉住。故停當用皮下注射時。腎上腺素能使注射處之膚色轉白。因血流停止故也。是以與局部麻醉劑相和。其功用尤佳。因局部麻醉劑之效力。僅數分鐘而已。若與腎上腺素相和。則其作用能持長數小時之久。故腎上腺素常用如止血藥。腎上腺素又有其他二種治療之應用。(一)在氣喘時能擴大或放大喉管。(二)能阻止血清注射後之微象。此種重要作用之解說。現尙未詳。

酒精 (Alcohol)

酒精亦可用爲補劑。對於脫力症。用濃度之酒精倒入口中。則酒精有復原之能力。此種能力得之於酒精尙未吞下時。並非爲酒精之特別作用。列如燒焦羽毛之氣味。亦有同樣之作用。惟不常用。其能力爲反射作用 (Reflex)。極似苦性補藥之作用。然其作用則在呼吸部分。即使呼吸加速。並非在胃腺雖然。在補酒中酒精之應用。則全恃其對於胃液分泌之能力。在醇已入血流後。在此情形之下。胃液之總量增加。而胃液素並不因之增加。酒精之作用並非爲興奮劑。反使腦部受抑制作用 (Depressant action)。計算之機能衰弱。而判斷及自制之機能則失去。

甲狀腺粉 (Thyroid)

甲狀腺粉通常並不認爲補劑。但實際則較任何補劑爲緊要。甲狀腺粉之應用。不限用於二種甲狀腺不完全之情況。即克雷挺病 (Cretilism) 及粘液水腫病 (Myxedema)。前者見之於幼童。後者見之於年長之人。甲狀腺粉亦多用如補劑。如對於缺乏能力及消化力之病人。尤其對於少婦之患月經中止、髮之脫落、以及易覺疲乏等情形。其作用使機能速率增加。凡吾人吸收養氣及呼出碳酸氣時其養氣之吸量各人皆異。雖在睡眠時亦然。當服甲狀腺粉後。身內燃燒更烈而養氣之吸收亦增加。食物有二種用途。供給血流需要之能力。及貯藏於身中成爲

脂肪。服甲狀腺粉後。多數食物用於供給能力而少數用爲貯藏。如是消化能力增加。而病人即覺更爲健康。此即補劑之作用。

我對於「酒」的感覺及片段建議

(楊仙樵)

天晚了，一輪皎皎的月兒，早掛青霄，耀得地上呈著銀灰般的顏色，多麼好看！我在此情此景的時候，緩步階前。賞月作玩。驀然，心弦忽生悲感起來，不禁低頭歎氣。你道爲誰？原因目觀現代人們，都不知利害。整日低「醉生夢死」——有種糾正之處——呵！

「酒」之爲物，本是傷身頗烈的敗類。然自數千年來，咱們貴國底三教九流的人兒，莫不奉若高超絕倫(?)的飲品。祇消瞄準社會上的舉止，包管看清於婚，喪，祭，賀的場合，羣皆唯酒是種藉資應酬的。一般碩士才人，亦以暢飲消遣相稱快！尤有進者，即是病染汎疴，抑或精神萎頓之徒，異口同聲齊道：酒具驅瘟之功和興起的魄力、因而入身醉夢！

設把酒的危害之點和盤托出，一日被冬烘頭腦等輩聽得，「羣起而攻之，」極端反對！若再加以詳細地分析其非，那麼，它們定視人作仇，罵人胡言亂道，簡直好比挖彼祖墳似的惱恨！——還有少年學子，張輩俱各了解飲酒能防礙身心的發育，有戒除的必要。呵呀！都可糟了，彼等竟「陽奉陰違」，明知故犯的大吃特吃，直達東倒西歪難再支持的當兒才止呢

！

全國人民，雖沒有個個都是如此這般，但據咱家的觀察，身在醉鄉的百姓，也有十分之五。昏昏沈沈，過著恍惚的生活；無怪強鄰進逼，攫取東三省去，已屆幾年仍老令人照顧下兒！弄得一幅天然的海棠葉，給洋鬼子蠶食成五裂四分。難道要待刀臨頸上國至「壽終正寢」的關頭，方肯從醉夢之中驚醒轉來不成？——唉！事至其間，那有你掙扎的餘地。

同胞其聽者！凡人飲酒：則害及「神經統系」，使其思忖，記憶，和判斷……等力減迹，不久的將來，變為一個愚鈍的癡子；且又影響「子孫」，皆無半個有強健的體格；復危及心，肝，脾，肺，腎等五臟，消滅其自然的生機，遭受莫大的刺激；並害及「消化器管」；使你食量日減；消化力弱，腸胃致起閉結之患；而「血流」「肌肉」「骨節」，也即變化生出「脂肪瘤」；肌肉失其將來的堅韌，不復動作如意；至於骨骼因身體未獲充足的營養。骨力日趨枯朽，不克耐勞，頻覺渾身是痛？

鐵一般的事實，既如上述，酒之不可稍沾點水，想必毫無疑義，用志其既，希望當局諸公：取締酒商，重收酒稅，監督製酒所所用的酒的成分，提倡戒酒，於可能範圍內蒐舉事實公布俾衆周知。

——取締酒商，務須澈底的掃除，千萬不可讓彼「藏頭露尾」重收酒稅，則酒的代價過

高，售者利難厚獲。購者見昂必止，監督製酒所所用的成分，要以酒精稀少，水量居多爲合度，蒐舉的事實，力其詳且的確，總以可深印入人心，有所警惕。切切不能敷衍一番，便告罄事。

仙樵區區建議：聰明的客官已早慮及。我之所以致力於此者；無他；目的乃是挽救已蹈陷阱的人們；恢復它的本來面目，不再去作醉鄉之鬼。——心清志白，使衆能將空閑消遣的工夫，移去對付國家大事和經濟的公敵——日本——這麼；「糊塗蟲」定可相本的消逝「賣國昏蛋」也得改過自新！

鹿茸之科學觀

楊治白

鹿茸爲牡鹿初生之角，我國數千年來，皆視爲重要名貴之補品，雖在西藥發達之今日，鹿茸在補劑上，仍能保持其重要之位置。世之愛服茸者，每向新醫詢求「科學之解釋」爰草斯篇，以供參考。

鹿茸之功用甚夥，其載吾國醫書者，爲補陽生精。養血益髓，健骨暖腎，治虛熱羸瘦，惡瘡癰疽，折傷惡血，鬼交夢遺，婦女崩帶貫症。其對於發生效力之解釋則曰：「鹿爲山獸，性稟純陽，角爲陽中之陽，含生發之氣，爲峻補下元真陽之品。」此種玄妙論調，國人固

優爲之，言之成理，空若無物。知其然而不知其所以然，其不能饜足衆望也，又奚足怪。

在英美日本諸國，鹿茸亦供藥用，惟不如吾國之普遍，而於藥理之研究，轉較我國爲精，最近蘇俄醫界對於鹿茸，曾加精密之考驗，用化學方法抽出一種含有多量雄性內分泌質之鹿角素，經實驗證明此物有高强之藥力。蘇俄並對沿海省及遠東省，添設象鹿場數處，預備於下半年產生多量之角素，以備廣汎應用。茲總合各國之學說，對鹿茸下一科學之解釋於次：

性狀、鹿茸爲牡鹿初生之角，外被皮毛，內富血管，柔軟如綿，味微甘鹹，呈弱酸性反應。

成分，主要成分爲角鹿素——含有多量之雄性。內分泌質，此外更含有磷酸鈣，碳酸鈣，膠質及軟骨質等。

功用，爲興奮強壯劑。鹿角素能增加機體之活力，心臟之活動，並能消滅心肌之疲勞。復能促穫外傷之治愈，又能增加工作量及食量。其實含之磷酸鈣，碳酸鈣，爲強壯神經之特效藥，而此種有機鈣類，又能壯骨消炎。可見鹿茸之加強體力，興奮血行。補腦健骨，消炎散熱等作用，均有科學之根據。苟能以科學方法，覺煉爲精純之品，則奏效當更確速也。

(待續)

子宮出血之原因與處置 (續)

白忍

(二)子宮腔部及頸部之腫，此在肩部製成潰瘍，斷裂血管，故發生規則的子宮出血，在每二期出血之間，往往有肉汁樣之液體流出，是為特點，如用直接檢診，則診斷不難，治療之法，或行外科的搗出法，或用x光線照射，或用燒灼法破壞癌腫並以止血。

(三)卵巢囊腫及皮樣囊腫——此能添發骨盤充血及內生殖器之炎症是以發生不規則的子宮出血，其經血亦往往增強，倘兩側卵巢破壞，則月經完全停止，治療之法則剔出囊腫(惡性卵巢腫瘍所引起之徵狀，大致亦同)。

(四)因骨盤鬱血，而起之子宮出血，一切發生骨盤充血之病，均能引起子宮出血，其一部分已詳上文，為便覽計，今復綜列於下。

(一)肥厚性子宮實質炎，子宮附屬器炎，骨盤腹膜炎，骨盤纖維炎，膀胱炎——以上各種炎症，在急炎時引起動脈性充血，在慢性炎時，則起靜脈性之鬱血，因以發生不規則的子宮出血。

(二)卵巢機能之元進——此亦足以引起骨盤充血，詳見後文。

(三)子宮位置異常及子宮與卵巢之腫瘍——此亦發生骨盤充血，其說詳前。

(四)如於生殖器之種種異常刺激——此亦因反射的神經關係，發生骨盤充血，例如精神興奮的異常性交，手淫，腹痛，溫熱刺激等是也 (未完)

軟部外傷及其應急處置位

馮乃勤

第一、火傷 不論其為火、熱水、蒸氣、熱的固體，總之因一切的熱而起的外傷，謂之火傷，火傷因其輕重之差，分為三級：

第一級火傷 即皮膚祇發紅，覺灼熱及疼痛者。

第二級火傷 皮膚各處剝離，成了水泡者。

第三級火傷 皮膚一部全燒成灰白色，褐色，黃色，或黑色炭一般的痂皮，而失其知覺，或潰爛者。

火傷之部分，擴大至全身之三分之二以上時，則有生命危險。火傷死的原因，現在雖尚不十分明白，大抵因血球崩壞，血液中缺乏水分，及其他營養障礙心臟麻一等幾種原因吧！

火傷之應急處置法 火傷之治療，最好完全請醫生處置，但有時自己亦可處置，譬如：輕微的火傷，為緩解患部疼痛，即塗以油類及無刺激性軟膏，或貼冰囊或灌冷水。在第二

尚之火傷則以經已消毒之小針，破其水泡，漏其內容，至上面之表皮，無須剝去，任其留存，然後以浸亞麻仁油或橄欖油之棉紗卷之。第三級之火傷，雖可施前述方法覆以繃帶，但須待醫師之指示。

第二、凍傷 即因寒冷刺戟而起的外傷。寒冷刺戟雖不甚劇，但久受寒冷之作用時亦起凍傷。因其輕重亦如火傷分爲三級，不過第三度凍傷不如火傷之蔓延，但常達至深部，且木症多生於距心臟較遠之處，例如在指、趾、手、足、鼻尖、耳翼等，因血行不旺盛所致。

第一級凍傷 祇皮膚呈暗赤色而腫脹者，亦稱紅斑性凍傷。本症不治愈而陷於慢性時，則發所謂凍瘡。

第二級凍傷 皮膚呈暗赤色且略帶青色，生水泡，故有水泡性凍傷之名。水泡中混含有漿液或血液。

第三級凍傷 局部之血行全停，呈暗赤色。被水泡及痂皮所蔽之一部之組織，變蒼白而失其知覺；輕數日而變黑壞死者。本症又名腐痂性凍傷。凍傷劇甚而全身凍冷，早已失其救治時期時，便陷於假死以至死亡，是謂凍死。

凍傷之應急處置法 凍輕傷者，在冬季婢僕等多生之。起於指尖、足趾、耳輪、鼻尖等處。處置之法，初期用雪塊摩擦。至覺溫暖，則用十倍之樟腦軟膏，魚石脂等塗敷，或

搽樟腦丁幾亦可奏效。

因凍冷而假死之處置法 因凍冷而既陷於假死者，照例不可遽加以溫暖；應急移之於冷室，脫去求服，先以雪塊或冷溼布摩擦全身之皮膚，亦有施冷水浴。同時摩擦全身，待其強直之四肢柔軟，後行人工呼吸法，一面繼續摩擦全身。由是患者元氣漸恢復，然後才可在室內漸漸加溫。若驟移凍冷者於溫室，則祇有促其死。無補於事，是不可不注意。

第三、電擊因電火而起之火傷 電擊是因電氣的，器械的，溫熱的三作用而起。電氣作用，能令中樞神經及末梢神經起震盪。強烈時冷呼吸及血行中樞麻醉而即死，謂之電擊死。

處置法 敷以溼布繃帶(硼酸水、醋酸礬土水)，或貼硼酸軟膏。

第四、日射病 盛暑之時，因曝日中，日光直射頭上而起，侵腦及腦膜之表面，卒然呈危險症狀。

處置法 速運到樹蔭，使身體冷却，高舉頭部，以冷水灌溉，或飲以冷水，以冷溼布覆頭部，或貼以冰囊。又行人工呼吸及心臟按摩法等。

第五、熱射病，中熱病 本症是因體溫之昇騰及其放散之調節失常，致體溫暴騰而發的危險的全身症狀。夏日行遠途者，易患本症。

處置法 與日射症同，但未發病以前，應講預防法，即時時在蔭處納涼，攝取清涼飲

，料且選適當的求服。

第六、化學的外傷 由於藥物之腐蝕有起。因藥品之種類及其作用之強弱輕重不等。皮膚起水泡或發赤（如因芥子油、巴豆油、芫青等），甚而起壞死（如因硝酸硫酸等之腐蝕創）。化學的外傷因其程度亦可如火傷區別為三級。

化學的外傷之處置法 因各種藥物之腐蝕傷，其症狀雖類火傷，但處置法各異。先用多量液體洗滌負傷面所附着的藥物，使之稀薄。因酸類受傷者則用鹼類，因鹼類受傷者則用酸類以中和之。但負傷後經半小時，則多不見效。其既生潰瘍面者，可與火傷同樣處置。

維他命之種類性狀及其功用

林郁青

維他命 (Vitamin) 名稱，係一九一二年 E. M. 氏所命，有人生必需之意義；故譯為生活素，乃人畜食料中必須之要素也，蓋維他命一物。實含輕炭質，脂肪，蛋白質及無機鹽類以外之生體發育及維持健康之主要成分，一旦缺乏，則種種疾病，因之而起，腳氣病，壞血病，其最著者也，若佝僂病，骨軟化症，痙攣等，亦或莫非缺乏維他命所致者乎？考維他命為特異之化學物質，構造方式，無人知之，經多數學者之研究，僅知其不止一種，相類之物質，

實有多組，據最近研究所得，可區別者A，B，C，D四種B，與D者，學者意見不一；有認為係一種者。茲述其性狀，功用等如后：

(一)維他命A，廣存於天然產之普通食品中，而以動物性脂肪，如肝油，含量最富，植物性脂肪中，亦有相當之存在，其他若牛酪，牛乳，肝臟，心臟，腎臟，野菜，人參，甘藷及發芽之荳類中，亦含有之。

維他命A，溶解於以脫及其他脂肪溶媒中，惟以以脫，酒精溶解最良。對於熱之作用，頗安定，經酸化作用及還元作用，則易破壞。但對於酸及亞爾加里之抵抗甚強。鹼化於六%之酒精性苛性加里液中，猶不過略受影響。甚至數日間之苛性加理作用之，亦不起著明之變化。然有謂其對於酸易被破壞者，若紫外線照射，苟能避免發生之臭養氣而置之，雖互入小時之長，殊無何等影響。

依諸家之實驗，知維他命A，為促身體成長之要素，遂倡為成長維他命 *WachstumsVitamin* 之說。有治結膜乾燥症，角膜軟化症，夜盲症之效。

(未完)

林
林

海棠香館吟草

(二十二續)

汪建侯

擬謝靈運不壁精舍還西湖卽用原一
幽鏡難久駐非林澹寒暉日夕山中還倦鳥隨人歸卻望所來處蒼蒼雲樹微紅酣斂迴照翠落混
煙霏長風吹遠帆高岸絕攀依舉目一以眺幽意滿荆扉置酒讀書齋故人與我違浩然生遐思物
理難究推

春日山行

春雨洗春山春林如此閒老松三萬樹青到白雲間流水晚花瘦夕陽孤鳥還獨遊忘遠近倚杖叩
荆關

院角新植紅白碧桃二株花時妍媚可愛

素雲一朵輕鏤玉丹露三升乍染脂美女新妝才子筆入時應似此花枝

卽目

江邨紫筍又朱櫻春去芳原見落英麥隴風和鷄唱午秧畦水暖鳥催耕雙扉白板溪邊屋十里青
山郭外程如此幽棲良不俗門前疏樹綠含情

二石近自市間購得藍田叔溪山雪景畫幀索題

二石嗜古如聚珍買畫不辭解酒縉開圖示我古跡真云爲田叔老筆皴溪山一角支嶙峋旁有茅
屋宜垂綸前裕載酒搖輕輪烟嵐隱浮松筠北風颯然生白蘋雪光一道如鋪銀水墨一氣皆有
神高潔直邁荆關倫此畫記自明李辰蒼黃南渡悲君臣秦淮畫舫波鄰鄰春燈燕子歌雜陳半壁
畫出江南春叔也詩酒傷隱淪負此絕技何由伸胡不供奉邀丹宸坐今老此畫中身青樓落拓酒

人巾歌姬扇寫桃花新江山素淚太酸辛閒煞漁樵幾個人墨跡流落江之濱從此丹青付逸民煙雲過眼紛轉輪二百年來久鬱湮幾多文字飄秋燐零縑尺素誰補初卽今烽火逼江關此畫轉移如有因一朝破紙披荆榛寶劍躍出延平津奇才如遇公輪掄入手拂拭不厭頻劫灰疑有前朝塵張之君壁停且勻圖書羅列何璘彬入門莫笑詩人貧喜君氣味烟霞親邇來遙結南山鄰索詩未畚遲兼旬自憐骨相頗賦鈍感此身世同勞薪亂愁寫出吟還呻未免貽笑東家舉還君詩畫心遂巡他時雪滿南山垠清景亮與此畫均開軒掃徑賞蕭晨君當遲我山中賓一樽對雪傾芳醕

明園題壁次石翁韵

春風吹送海棠顛去蹋芳園二月天背石跼花紅受露過橋衫影綠遮烟新添稚竹堪留客重訪胎禽已得僊記取頽垣名姓在碧紗珍重護他年

擬唐人失鶴詩

翩然別我到瑤林悵望遙空何處尋霜月滿山歸有夢秋風萬里去無心青雲從此邀新侶華表何年認舊音仙子不來春草綠一聲鉄篴冷松陰

題西林蘭若圖

夢墮西林西愛此繞厓竹小艇截溪來橋轉得茅屋山深悄無人雲影伴僧獨畫理悟禪理衆峯一掌縮跌坐鎮忘言秋磬出空綠

春燕用查初白集中初聞黃鸝韻

聲聲軟語畫簾前飛絮飛花又一年巷北人歸泥滑滑江南筍熟雨綿綿烏衣夢遠春如燒紅縷情深泪亦煙獨戀詩翁茅屋破似曾相識倍相憐

題畫

個影搖青萼破紅誰將瘦筆寫春風湘妃昨夜尋寒月夢墮羅浮淺醉中(紅梅翠竹圖)
粉痕嫌淡墨嫌濃鈎出燕支幾瓣鬆日暮畫簾風過處恍疑紅雨落惺忪(桃花)

投稿簡章

- (一) 本誌各欄如蒙醫藥諸彥寵賜鴻文白撰或譯述均所歡迎
- (二) 譯文請註明原著者姓名出版日期及發行處能將原本附寄更佳
- (三) 惠稿字跡務望繕寫清晰若模糊不辨者惟有割愛
- (四) 惠稿揭載與否本社不能預先聲明而原稿亦概不寄還其欲寄還者請附郵費
- (五) 稿未請註明真姓名住址以便規訊
- (六) 惠稿本社得酌量刪改若惠稿者不願刪改須先聲明
- (七) 本誌宣傳公衆衛生介紹世界醫學爲宗旨編者皆盡義務故對惠稿者皆僅以本誌爲酬
- (八) 惠稿者請寄杭州東街路一二三號醫林新誌社編輯部收

廣告價目表 ADVERTISING RATES

位 置 Position	面積 Space	每 期 價 目 Rate for each issue
封 面 Front cover(outer)		Mex. \$ 30.00
底 面 Back cover(outer)	全 面 Full page	Mex. \$ 30.00
	半 面 Half page	Mex. \$ 17.00
封面之內面 Front cover(inner)	全 面 Full page	Mex. \$ 25.00
	半 面 Half page	Mex. \$ 14.00
底面之內面 Back cover(inner)	全 面 Full page	Mex. \$ 20.00
	半 面 Half page	Mex. \$ 11.00
普通文字 前後隨排 Ordinary pages	全 面 Full page	Mex. \$ 12.00
	半 面 Half page	Mex. \$ 7.00

廣 告 簡 章

- (一) 以上價目以杭州銀元計算當於廣告第一次登出厥收清
- (二) 如用銅鋅版或彩紙彩印價目另議
- (三) 於合同有效期間本誌每次出版均贈送一册
- (四) 如欲換登廣告須於出版前十日將稿寄下不另收費
- (五) 如訂全年合同者八折計算

定 報 價 目

每月一册零舊大洋一角全年十二期大洋一元半年五角五分(郵票在內)
 蒙古新疆及日本均照國內
 歐美各國及香港澳門照定價另價郵費五角
 郵票九折以一分四五分爲限

中華民國二十三年十月出版

編 輯 主 任 汪 建 侯 醫 師
 總 發 行 所 汪 鶴 盒 醫 師
 分 理 處 及 醫 林 新 誌 社
 代 售 處 杭州東街路一二三號
 上海北京路九十六號五定公司
 上海河南路中英大藥房
 杭州湖濱路西湖小說林
 杭州保佑坊古今圖書館店

便瀉便秘新藥

PANKONIN & TONOPHEN

『F, KOONG』

澎可寧 與 通乃芬

欲達腸腑之藥，經胃每生變化，嘗苦奏效未確。但腸消化之瀉劑『澎可寧 PANKONIN』，係與收斂之屬相結合，其抵抗胃液之作用甚強。不但至腸對於脂肪化分有異常之良效。即於蛋白質之消化力亦增強。且有消炎殺菌，制酸酵，止出血之功。新用於脂肪過泄，慢性腹瀉，小兒腹瀉，神經性腹瀉，慢性鹽酸缺乏之胃炎，年久腸炎等，均甚效。輕瀉劑『通乃芬』TONOPHEN，亦因血緩和安靜之藥，有機化合，過胃不為所動。且可藉此抑制其種種副作用。故服後不害胃，便時無腹痛，連用無習慣，減服亦仍效，實為輕瀉藥之中作者。用於常習性便秘尤宜。此二藥功皆賴於合作，遠非單純原藥可及。如須說明書，及『通乃芬』簡易試驗法，函索即呈。

以上二藥俱分 藥粉 片劑兩種

上海福康西藥店製

各大藥房均有代售

總經理處 上海肇嘉路三三號 福康藥行

新鎮痛劑

NEO VETOLIN & VETOLIN

『F, KOONG』

萬痛靈 與 凡痛靈

此係有機化合物、初名『凡痛靈 VETOLIN』止痛之功尚迅速。惟藥為淡黃色、於化學上猶覺未滿。因又再四研究。另以最新化學方法、製成一種白色『最新萬通靈 NEO-VETOLIN』功效更妥更速、吸收亦更容易、服後立刻痛止。並無種種不快、及催眠等副作用。凡各種神經痛 婦女月經痛、外科創痕痛等均甚效、而尤以三叉神經痛為最。舟車眩暈、及動脈硬化之頭頸脹痛、亦有效。定價甚廉（醫界用黃色藥片、五百片瓶裝、僅定價七元五角、白色五百片、僅定價一十元）如須說明書、及新藥價目表、函索即呈。由郵購、亦即寄。

『裝盛』 藥粉每兩一瓶

藥片分五百片 一百片 一十片

上海南福康西藥店製

各大藥房均有代售

總經理處 上海肇嘉路三三號 福康藥行



SUPRAHYM

本善柏蘇 藥聖喘氣




行藥西定安號八五七路德斐辣海上理經總華駐
行藥定五號六十九路京北所行發總

Atophan Atophan-Balsam Atophanyl

亞陀方藥片
亞陀方軟膏
亞陀方耐而

亞陀方製劑乃由杜尔姆氏及尼可拉氏在先靈藥廠最大實驗室內苦心研究而製成至一千九百一十一年始引用於藥物學為治療痛風症之第一等劑本品除具有偉大消炎作用與止痛性質外對於管林之新陳代謝影響尤巨故全世界著名醫師凡遇痛風及僵麻質斯性疾熱莫不爭先以此劑治之

總經銷處 上海福州路
先靈洋行
十九號



OPTARSON

奧拍泰純

奧拍泰純

新發明砒素士的
年化合劑專治諸
虛百損以及患瘡
後及患他種傳染
染後虛弱諸症

包裝

每盒十二管

每管一立粉



SOLARSON

所拉純

所拉純

功效準確可供皮
下注射用之砒素
強壯劑注射後病
人皆能忍受毫無
副作用專治諸虛
百損萎黃病及貧
血等症

包裝

每盒十二管

一粒分及二
立粉



TONOPHOSPHAN

託拿福賜芬

託拿福賜芬

無毒有機性燧化
合物能振足貧血
患者之新陳代謝
功能並能補益骨
組織之機能不全
毫無副作用

包裝

一或溶液每盒

二十管每管一

加料每盒十管
每管一立粉



行洋信羅路西江海士理經家獨國中造製(股斯赫耳拜)藥大德天國德

THE MODERN MEDICAL JOURNAL

123 Tung Chieh Road, Hangchow, China,

Vol. IV OCTOBER 1934 No. 10.

奧顏靈

各大藥房
均有出售

上海美狄根洋行
總經理

能溶解尿酸止痛
消炎故為痛風性
及其他急慢性關節
筋肉痠麻質斯各種
神經痛等之聖藥



OPOLLEN