


活幼心書

中國醫學大成第十集

兒科類甲
兒科叢刊之一



活
幼
心
書
上

上海大東書局印行



3 0472 7208 7

A254811

活幼心書提要

元、曾世榮編撰。世榮字德顯。號育溪。衡之丞西人。四庫未著錄。書分上中下三卷。上卷爲決證詩賦七十五則。中卷爲明天論四十三則。拾遺論八。下卷爲信效方。又分四卷。其卷一列湯散門。列湯方四十五。散方七十五。卷二列圓膏門。丸方三十二。膏方十五。卷三列丹飲門。丹方七。飲方卅七。卷四列金餅門。金方三。餅方三。附拾遺方十四。統計二百廿五方。柯逢時跋云。元本是書每半葉十一行。每行二十一。一二字不等。蓋至元甲午曾氏原刻本全佚。藝風前輩所藏士禮居本。德顯出處無徵。是書辨證詳明。處方精密。允爲仁人之言。同治衡陽縣志。及各家著錄。多作新書。黃跋偶沿其誤。千頃堂書目。光緒湖南通志。據抱經堂補元志。並作二卷。殆亦未見全書。明宣德庚戌有修補本。日本高保甲寅曾爲校刻。皆不及此本之完善。因屬翟君展成。蕭君伯丞再三讎校。改正良方。並附校勘記於後。以明實在。清宣統二年。曾由武昌醫館刻成。流行絕少。且無句讀。爰再爲重校。加以圈點印行之。

活幼心書提要

和序

醫家惟小兒科爲尤難。蓋自其能言而被病者。猶可以問而知之。而其未能言者。不可以問而知也。史言扁鵲入咸陽。爲小兒醫。然鵲之書多不傳。其言有曰。望而知之。謂之神。聞而知之。謂之聖。鵲之術固不在於書歟。信斯言也。惟鵲爲可也。夫醫不可以無書也。太倉公乃亦以醫者意耳。不肯爲書。使倉公者常有於世焉。雖無書可也。如倉公之不常有何哉。且吾聞學醫者。與學儒無異。儒者求聖賢之心法。以有聖賢之書存焉耳。醫無其書。則軒岐之心法。泯焉而不傳久矣。又何由而學之。故醫書之浩衍。與儒書相埒。殆又過之。然板行於天下。人得而有之者。往往大方脈之書爲多。彼爲小兒者。每以專科自名。或私得一方。卽祖父子孫相傳。世享其利。他人萬金不願授也。其肯與天下後世公共之哉。育溪曾君。用儒攻醫。得戴劉二家之傳。自少至老。凡活人之幼者。枚數不知幾何人。在證處方。皆超然衆醫之表。乃以得之師傅者。廣粹精覈。爲活幼心書一編。既成。不以私其家。將以公之天下後世。使爲其術者。無學醫廢人之患。凡人之幼。皆有成人之望焉。厚哉育

溪之用心也。人孰無此心哉。皆能以育溪之心爲心則善矣。雖然。書本陳言。心須活法。或徒泥其書而不善用。譬之兵家。不知合變。膠柱而調瑟焉。吾未見其可也。昔臨安李立之者。以小兒科擅名一時。有嬰兒忽病瘖。求治之。立之令人乘高撲之地下。以一衾盛之。兒不覺大驚。遂發聲能言。問之曰。此乳搖心也。非藥所能療。此活法之說也。因附著之。

嘉定丁卯閏九月朔中議大夫前同知海北海南道宣慰使司事副都元帥和尼赤序

廉序

育溪曾德顯。儒家者流。明小方脈。幼幼之心。不啻父母仁人之用心也。余家有襁褓童子。感驚風疾。其父母者咸憂焉。德顯乃不憚煩暑。隨招隨至。一眎之曰。毋慮。遂用對證之藥。療之。藥未既而效已隨之。誠可嘉尚。原其平昔用心之勤。集諸方書之經驗者。著以成帙。目之曰活幼心書。夫心者。虛靈善應。神妙不測。主宰一身。應酬萬事者也。推廣此心。以及人及物。使顛連無告者爲同胞。癢痲疾痛者爲同體。乃刻諸梓。以廣其傳。非惟傳之今。亦且傳諸後。俾後人亦能推此心。以及人及物。則活幼之心。爲無窮也。豈曰小補哉。

天歷己巳八月廿又一日朝散大夫同知衡州路總管府事廉公亮引

活幼心書 廉序

吳序

人得天地生物之心以爲心。則當視天地萬物爲一體。癢疴疾痛。舉切吾身。仁者事也。先儒謂醫家以手足痿痺爲不仁。斯言善狀仁字。蓋手足痺則氣脈不相通。痛癢無所覺。心之生道息矣。烏得仁。况醫家之於嬰孩。語言未足辨。脈理未足憑。必能以心體之。然後可以察其癢痛疴疾之所在。非有志於仁者。其能若是乎。西會君德顯。儒而爲醫。幼從鄉先生李月山。固已得儒學於心授。長從世醫劉氏。又能得醫學於心傳。精讀醫經。詳味藥性。參前輩之奧議。伸自己之獨見。有求必應。不倦於貧。集其平時論證與方。名曰活幼心書。將與同志共之。夫作書以述其心之所用。而且克廣其傳。亦庶乎仁者之心矣。嘗觀其書。則審證施劑。信有異乎人者。五苓散在諸家。止用之解傷寒溫濕暑毒霍亂。而德顯於驚風痰搐瘡疹等疾。通四時而用之。前同知衡州府事胡省齋。因其子驚風得愈。問之曰。五苓散何以愈斯疾乎。德顯曰。此劑內用茯苓。可以安此心之神。用澤瀉導小便。小腸利而心氣通。木得桂而枯。足能抑肝之氣。而風自止。所以能療驚風。施之他證。亦皆

有說。省齋深然之。此其善用五苓散也。小兒驚風搐掣。醫者視爲一病。輒以金石腦麝蜈蠶蛇蠍等劑投之。非徒無益。反激他證。德顯則謂有因驚風而搐者。有因氣鬱而搐者。驚屬心。風屬肝。而鬱於氣者。亦有搐。陳氏所謂蓄氣而成搐者是也。但未著其方。余於驚風。則隨證施治。若氣鬱而搐者。則用寬氣飲治之。只以枳殼枳實爲主。嘗因患搐者。倉卒求藥。教服鋪家枳殼散。而搐亦止。病者深感之。此又治搐之特見也。其他緊證。俱能究心。用藥之奇。成效之速。有未易縷述者。寄寓予家將十年。二孫藉其調護。每識證於微妙。制疾於萌芽。其用心之溥。非特於吾輩爲然。蓋其篤志於仁。重義輕利。亦自讀書中來。非可以庸俗例視也。讀其方論。因敘數語於篇端。識者儻察予言。必有知其用心者。

元貞乙未上巳日前太學篤信齋進士吳剛中謹書

羅序

吾鄉月山李先生。博極羣書。操行修潔。最謹於義利界限。媚學之子。翩翩從之。其誨諸生也。不止於詞藝而已。必勉以正心修身。俾之有士君子之行。德顯曾君。從游者之一也。居無何。場屋之事廢。於是。以業儒者而業醫焉。昔賢達則願爲良相。窮則願爲良醫。其心均在濟人耳。醫豈細事哉。而幼幼之醫。尤不易也。蓋氣色微。筋骨脆。癢痲疾病。不可問而知。他人止於面色指紋之間。揣摩投劑。德顯則切脈先之。儻證陽而脈陰。證陰而脈陽。必治脈不治證。精思詳究。探本索原。藥餌所施。百不失一。未嘗以病家之貴賤貧富而異用其心。或遇窘乏太甚之家。亦隨力捐貲。濟其饘粥。以故全活者衆。德顯非饒於財者。能推是心。亦賢矣哉。業醫三十年。古今醫書。讀之不輟。今取其平日閱證用藥之已效者。著爲方論。纂爲詩歌。名之曰活幼心書。是心也。恆心也。惻隱之心也。心誠求之之心也。對越天地神明而無愧矣。且欲鑄梓以爲海內共之。用心廣大可敬也。夫余嘗觀趙德麟侯鯖錄。有人得癰疽方甚奇。寶而不傳。後爲虎所食。非天譴歟。德顯心事若茲。天必福之。以誘

世人之善用其心矣。德顯衡之烝西人。號育溪。名世榮。德顯其字也。
丁未中秋邵清遺老七十翁羅宗之巨海甫謹序

自序

聞之先儒曰。天向一中分造化。人於心上起經綸。大哉心乎。其萬事之機括乎。前乎千百世而上。爲天地立心。生民立命者。此心也。後乎千百世而下。爲往聖繼絕學。來者續師傳。亦此心也。是心也。以之活幼。卽有惻隱之真。所謂乍見孺子將入於井。皆有怵惕惻隱者。無非自此心中來。宋翰林侍御世醫戴克臣者。徽宗朝名堯道活幼宗師也。取信當時。有聲朝野。心以傳心。得其妙者。惟烝西高原劉茂先。名祀自號固窮勉茂先之心。其五世孫字直甫者。名思道又深得之。推其所得。隨施輒效。亦可以見其用心矣。然昔賢之學。固以心而傳。而昔賢之心。非書又無以衍其傳。況自開慶以來。其書散漫。戴劉二公之心。傳幾不復見。予生二公之後。而無默契乎二公之心。蚤歲師事直甫。於茲有年。面命心傳。領會多矣。但念一宗醫書。方論待決。歲月寢遠。卷帙不齊。設有危難。未易檢閱。吁。得其心者。敢不究其心哉。明窗晝熏。短檠夜雨。因就其遺書。而精加編次。繁者刪之。缺者補之。書非可用。不敢錄。方非已效。弗敢收。脫亡遺漏。存十一於千百。上探三皇前哲之遺言。下探克臣茂先之用心。

實則吾心固有之理。旁求當代明醫之論。亦姑爲活幼之一助云耳。遂名其書曰活幼心書。書成。客或難予曰。醫者意也。但觀形切脈。以意逆志。是爲得之。何必一切求諸書。而且以心書名之哉。予曰。不然。予非有心於著述。而求異於人也。不過推廣劉氏數傳之貞心。以求契夫戴氏之初心耳。朱文公有言。意者心之所發也。書之所述。豈非心之流行發見者乎。客唯而退。於是乎書。

至元甲午菊節衡陽後學會世榮德顯識

活幼心書目錄

卷上 決證詩賦

觀形氣	一
及幼攻補	二
戒毀同道	三
爲醫先去貪嗔	四
辨證早決安危	四
五色主病	五
診脈明證	六
議金銀薄荷	七
胎寒	七
藏寒	七

胎熱	八
弄舌舒舌	八
臍風	八
臍突	八
夜啼	八
急驚	八
天釣	八
急驚後如瘧	九
慢驚	九
搐證	九
諸風毒	九
破血傷風	九



傷積	九
驚積	九
諸熱	〇
吐瀉	〇
傷寒	〇
傷風	〇
夾驚傷寒	〇
夾食傷寒	〇
下後傷風	〇
夾風傷寒	〇
風寒互證	一
結胸傷寒	一
痞似結胸	一
壞證傷寒	一

赤白痢	一
五色痢	一
風痢	一
腫證	一
五疳	一
走馬疳	一
脫肛	一
痢證	一
瘧證	一
癰證	一
癰證	一
癰證	一
諸疔	一
龜胸	一
驚丹	一
咳嗽	一

目疾	諸瘡	口瘡	哺露	丁奚	腹痛	五淋	瘰癧	驚癱鶴膝	陰囊腫	斑疹	豆瘡傳變	瘡疹	鉤點
.....
一五	一五	一五	一五	一五	一四	一四	一四	一四	一四	一四	一四	一三	一三

胎寒	丹毒	重舌鵝口	五軟	天柱倒	解顛	諸汗	黃證	失血	不內外因	小兒常安	小兒專科賦
.....
一	一五	一五	一六	一六	一六	一六	一六	一六	一六	一七	一七

卷中 明本論

胎熱	二
臍風撮口	三
夜啼	四
急驚	五
慢驚	八
風毒	九
傷積	一〇
熱證	一〇
傷寒	一二
咳嗽	一七
吐瀉	一九
諸吐	二一
諸瀉	二二
赤白痢	二五

腫證	二七
疳證	二九
走馬疳	三〇
脫肛	三〇
痢證	三一
瘧疾	三三
癖證	三五
疝證	三五
龜胸	三六
驚丹	三六
瘡疹	三七
陰囊腫	四二
驚癱鶴膝	四三
瘰癧	四四

五淋	四五
腹痛	四七
丁奚	四九
口瘡	五〇
諸瘡	五一
目疾	五二
丹毒	五三
重舌	五四
五軟	五五
諸汗	五六
黃證	五七
失血	五八
不內外因	六〇
小兒常安	六〇

拾遺

論小方脈數差殊	六一
辨藥病不相主對	六二
論豆瘡不應疏利	六二
評非時用附子大黃	六三
明小兒四證入候	六四
治暑風用藥次序	六四
爲醫要量大見高	六五
遇諸塗救治驚風	六六

卷下 信效方

湯散門

湯類

日生湯	一
-----	---

牛蒡湯	二
黃芩四物湯	二
耆歸湯	二
枳實湯	三
小柴胡湯	三
防己湯	四
防風湯	四
知母湯	五
白芍藥湯	五
茯苓厚朴湯	五
茯神湯	六
守中湯	六
瀉肺湯	六
五和湯	七

養藏湯	七
貝母湯	八
固真湯	八
生地黃湯	八
薑橘湯	九
理中湯	九
桂枝湯	九
麻黃湯	九
獨活湯	〇
五黃湯	〇
化毒湯	一
青木香湯	一
排風湯	一
中和湯	二

人參甘桔湯	一三
人參芎歸湯	一三
五拗湯	一三
六和湯	一四
黃耆六一湯	一四
真武湯	一五
牡蠣大黃湯	一五
坎離湯	一五
清脾湯	一六
麥門冬湯	一六
化丹湯	一六
茴香湯	一七
大柴胡湯	一七
快膈湯	一七

升麻湯	一八
小陷胸湯	一八
散類	
百解散	一九
五苓散	一九
當歸散	二〇
三解散	二〇
勻氣散	二〇
雄黃散	二一
惺惺散	二一
木通散	二二
烏梅散	二二
黃金散	二二
平胃散	二三

七寶散	二二三
三稜散	二二四
立消散	二二四
天竺黃散	二二五
連牀散	二二五
川草散	二二六
柿煎散	二二六
拂毒散	二二六
金鈴散	二二七
消黃散	二二七
疏風散	二二八
陳氏木香散	二二八
陳氏異功散	二二八
羌活散	二二九

香薰散	二二九
瀉黃散	二三〇
調元散	二三〇
醒脾散	三三一
醍醐散	三三一
二聖散	三三一
補肺散	三三一
安神散	三三一
燒鹽散	三三三
綠袍散	三三三
益黃散	三三四
解表散	三三四
參苓白朮散	三三五
守胃散	三三五

南星腹皮散	三六
導赤散	三六
錢氏白朮散	三六
和中散	三七
糖煎散	三七
六柱散	三八
九仙散	三八
草龍膽散	三九
金波散	三九
內金散	三九
霹靂散	四〇
順摺散	四〇
外消散	四一
活血散	四一

桃花散	四二
三白散	四二
麝香人齒散	四二
四黃散	四三
薄荷散	四三
榭皮散	四三
白芨散	四四
二香散	四四
萬金散	四四
神效散	四五
赤葛散	四五
四聖散	四六
天花散	四六
蟠龍散	四六

伏龍肝散	四七
益元散	四七
祛風散	四七
全蠍觀音散	四八
備急散	四八
黃土散	四九
回陽散	四九
蜜陀僧散	五〇
圓膏門	
圓類	
琥珀抱龍圓	五〇
鎮驚圓	五一
烏犀圓	五二
香芎圓	五三

香連圓	五四
化癥圓	五四
蘆薈圓	五五
使君子圓	五五
補腎地黃圓	五六
寬腸圓	五六
香陸胃苓圓	五七
二薑圓	五七
沒石子圓	五八
半夏圓	五八
六聖圓	五九
內消圓	五九
截驚圓	六〇
散氣圓	六〇

金粟圓	六八
萬應圓	六一
金菜圓	六二
二聖圓	六二
商陸圓	六三
枳殼圓	六三
濬川圓	六三
三聖圓	六四
莪朮圓	六五
豆蔻圓	六五
碧玉圓	六六
快活圓	六六
沉香檳榔圓	六七

硃砂膏	六八
如意膏	六八
地黃膏	六九
烏梅膏	六九
烏附膏	七〇
烏豉膏	七〇
辟塵膏	七〇
草麻膏	七一
鉤藤膏	七一
黃連膏	七一
益中膏	七二
玄霜膏	七二
清涼膏	七三
祛風膏	七三

千金膏……………七四

丹飲門

丹類

水晶丹……………七四

不驚丹……………七五

鶴頂丹……………七六

黑虎丹……………七六

祛暑丹……………七七

四神丹……………七七

祛瘧丹……………七八

飲類

百傷飲……………七八

速效飲……………七九

柴胡飲……………七九

四順飲……………八〇

清肺飲……………八〇

沖和飲……………八〇

明目飲……………八一

玉露飲……………八一

寬氣飲……………八二

萊豆飲……………八二

寬熱飲……………八三

赤蒼飲……………八三

化蟲飲……………八四

玄參飲……………八四

參香飲……………八五

健脾飲……………八五

五皮飲……………八六

立效飲	八六
沉香飲	八六
拔毒飲	八七
藿香飲	八七
參蘇飲	八八
紫草茸飲	八八
天麻飲	八九
黑白飲	八九
白附飲	八九
二仙飲	九〇
雙金飲	九〇
大順飲	九〇
快斑飲	九一
消暑清心飲	九一

定喘飲	九二
常山飲	九二
消毒飲	九三
縮砂飲	九三
定吐飲	九三
萬安飲	九四
金餅門	
金類	
一字金	九五
一七金	九五
一抹金	九六
餅類	
香橋餅	九六
通聖餅	九七

薑豉餅……………九七

拾遺

香艾圓……………九八

烏白圓……………九八

既濟解毒丹……………九九

輕粉散……………九九

獨聖散……………〇〇

馨香托裏散……………〇〇

拔毒散……………〇一

神應散……………〇一

涼肺散……………〇二

玄明粉……………〇二

必勝散……………〇三

遠徹膏……………〇三

至聖散……………一〇四

八仙飲……………一〇四

活幼心書

元

衡陽

曾世榮德顯編次

鄞縣

曹赤電炳章圈校



卷上 決證詩賦

觀形氣

觀形觀氣要精通。稟受元來自不同。細察盈虧明部分。隨機用藥見奇功。
形者面色也。氣者神氣也。張吉夫云。小兒證候。不可取之一端。在表裏相應。隨機消息。豈膠柱調瑟者。所能觀其形而知其證哉。信斯言也。況小兒虛實。有非係乎肥瘦。而係乎氣色者。何以言之。蓋有肥而氣怯。瘦而氣壯。氣怯則色必嫩。其爲虛可知矣。氣壯則色必盛。其爲實可知矣。由是論之。五臟之氣。皆形於面部。肝青。心赤。肺白。腎黑。脾黃。是其本體。肝旺於春。心旺於夏。肺旺於秋。腎旺於冬。各七十二日。脾寄旺於四季後一十八日。是其本位。然有時乎不春不冬。而

面變青黑者。非肝之與腎也。不秋不夏而面變赤白者。亦非心之與肺也。蓋五臟之氣。層見疊出。隨證流形。初無一定。忽然青黑主乎痛。忽然赤者主乎熱。忽然白者主乎冷。忽然黃者主乎積。此其氣之開闔。非係乎時。非拘乎位。又如心主頰。肝主眼。并左臉。脾主脣之上下。肺主右臉。腎主耳前頰音外。其形或見於位。或露於他部。所謂不可取之一端。明其義也。且脾主脣之上下。爲吐瀉。或患痢日久。然其色黑。則腎之乘脾。水反剋土。名爲強勝。其藏或敗耳。肝主眼。並左臉。其色青。本色也。主驚駭風痰發動。是爲順證。若見白色。乃肺之剋肝。卽爲逆證。以此推考。變而通之。存乎其人。學者留心於此。誠有用焉。

及幼攻補

察病必須明表裏。更詳虛實在初分。惡攻喜補人皆信。誰識攻中有補存。張子和曰。人身不過表裏。血氣不過虛實。此言其大略耳。惟庸工之治病。純補其虛。不敢治其實。舉世皆曰平穩。誤人不見其迹。渠亦不自省其過。雖終老而不悔。且曰。吾用補藥也。何罪焉。病人亦曰。彼以補藥補我。彼何罪焉。雖死亦不知覺。此庸工誤人最深。如蘇湮洪水。不知五行之道。夫補者人所喜。攻者人所

惡。醫者以其逆病人之心。而不見用。不若順病人之心。而獲利也。豈復計病者之死生乎。蓋醫有賢愚。人多謬誤。以賢爲非。以愚爲是。不明標本。妄投藥餌。自取危困。徒切感慨。所謂攻者。萬病先須發散外邪。表之義也。外邪既去。而元氣自復。即攻中有補存焉。裏之義也。然察其表裏虛實。尤在臨機權變。毋執一定之規也。

戒毀同道

大抵行醫。片言處。深思淺發。要安詳。更兼忠厚。斯爲美。切戒逢人恃己長。鄭端友曰。醫門一業。慈愛爲先。嘗存救治之心。方集古賢之行。近世醫者。診察諸疾。未言理療。訾毀前醫。不量病有淺深。效有遲速。亦有陰虛陽實。翕音合轉移。初無定論。惟務妒賢嫉能。利己害人。驚謔病家。意圖厚賂。尤見不仁之心甚矣。昔神宗時。錢仲陽爲醫有聲。皇子儀國公病癒音瘕音。繼國醫莫能治。長公主朝。因言錢乙起草野。有異能。立召入。進黃土湯而瘳音。神宗褒諭。問黃土何以瘳斯疾狀。乙對曰。以土勝水。木得其平。則風自止。且諸醫所治垂瘳。小臣適當其瘳。上悅其對。擢太醫丞。賜紫衣金魚。一旦超然衆醫之表。豈不貴哉。學者能

以仲陽之心爲心。則善矣。

爲醫先去貪嗔

爲醫先去貪嗔。用藥但憑真實心。富不過求。貧不倦。神明所在儼如臨。人有恆心。踐履端謹。始可與言醫道矣。凡有請召。不以晝夜寒暑。遠近親疏。富貴貧賤。聞命卽赴。視彼之疾。舉切吾身。藥必用真。財無過望。推誠拯救。勿憚其勞。冥冥之中。自有神佑。如臨汝張彥明爲醫。未嘗以錢爲較。應有求醫。期於必效。一日城中火災。周回蒸盡。煙焰中獨存其居。後且子孫榮貴。以此見天道有陰扶顯助之靈。誠爲可敬。

辨證早決安危

色脈參詳。貴造微。早憑疾證。決安危。時醫怕觸病家諱。病稍差池。便怨咨。爲醫固難。及幼尤難。故醫者診視小兒之證。儻色脈精明。則死生可判。若以恐觸病家之諱。猶豫其說。不吐真情。稍有差池。必招其怨。與其受怨於後。孰若告之於先。縱有危難。夫復何怨。昔扁鵲見桓侯曰。疾在腠理。不治將深。桓侯不信。復見曰。疾在骨髓。雖司命無如之何。後果弗起。學者於此。觸類究心。斯有得於

扁鵲之妙旨。

五色主病

積黃青則是驚風。熱赤傷寒。紫淺紅。黑痛白爲虛冷嗽。更須隨部用神工。望聞問切。醫者先之。凡看病形指文。聽聲察色。其病圖載方冊。皮有薄厚。但周時外嬰孩。多在懷抱。手無垢膩。則指白皮嫩。其紋顯而易見。至三五歲者。常貪戲耍。手弄泥水。則指蠱皮厚。其紋隱而難辨。參諸面部。是爲捷要。有紫黑而紋蠱。或叫怒而容變。則倉卒難定。必須聽聲。有中風而迷悶。或久患而昏沉。語遲失音。口瘡咽痛。尤非聞而知之所能盡。問證一節。最爲的當。然幼幼方脈。謂之啞科。縱稍長。成語不足信。有飽曰飢。癢曰痛。如是類者。屢嘗試之。每究心及此。初在父母。審其得患之由。而告醫者參詳。則易於調治。多有病家不肯自言。其致疾之始末。而一聽醫者之揣摩。由是觀之。問亦難矣。必須診脈。以決諸證。然南北稟賦不同。施始之法。亦當隨其虛實冷熱。用藥可也。若夫造妙工夫。初無其他。大學所謂若保赤子。心誠求之。專是業者。儻不盡此心之誠。何以察不言之疾乎。

診脈明證

小兒脈應二周前。一指分關寸尺全。六至號爲無病子。不和氣主按如絃。浮洪風熱數驚候。虛冷沉遲實積堅。指滯脾經時緩應。過猶不及亂難痊。

叔和脈經曰。孩兒三歲至五歲。呼吸須將入至看。乃以入至爲平。及觀張氏脈訣云。小兒常脈。只多大人二至爲平。予嘗指下審之。果一息六至爲平。若七至入至。乃是數脈。主發熱作驚。由此而論。則脈之微妙。不可不察。學者當審而切之。庶無錯誤。凡把幼穉之脈。僅二三歲者。但以一指揣按關部。側指於關前取寸口。側指於關後取尺澤。至四五歲餘。却密下三指。按三部明標本。察病證。然後可以剋進退。決安危。蓋周歲以前。氣血未完。脈難依據。周歲以後。氣血和平。始可診脈。二歲以前。只依一指按關部取法。爲率。若絃緊主氣不和。先與順之。然後調中快氣。浮洪主風熱。先與解之。然後疏風除熱。急數主受驚。先與發散。然後鎮心退驚。沉遲主虛冷。先與溫之。然後理虛去寒。實滑主傷積。先與表之。然後疏滌積聚。沉緩主宿冷滯脾。錢氏脈訣云。沉緩爲積。此又因宿冷積滯於脾。則脾氣弱而不能磨化穀食。遂成積也。先與和解。然後去積溫脾。已上脈病。

皆宜對證調治。有傳作乖異。尤在臨機應變。不可執一。所謂醫者意也。其有旨哉。若一息十餘。至爲危急。謂之太過。一息僅二。至爲虛極。謂之不及。大小不同。爲惡候。謂之亂。皆難治也。若年至十二三以上。又當參諸大方脈。以明得病之由。因其所製之方。以爲治。斯不誤矣。

議金銀薄荷

薄荷湯內用金銀。多爲訛傳。誤後人。細讀明醫何氏論。於中載述得其真。古方所載金銀薄荷爲湯。使後人之醫者。遂薄荷之外。加以金銀。銀銀同煎。殊欠講明。夫鑲者。乃婦人常帶之物。垢膩浸漬。用以煎煮。其味雜乎藥內。大非所宜。切須戒此。昔明醫何澄論金銀薄荷。乃金錢薄荷。卽今之家園薄荷。葉小者。是其葉似金錢花葉。名曰金錢薄荷。此理甚明。非所謂再加金銀同煎。大概錢字與銀字相近。故訛以傳訛。是亦魯魚亥豕之類也。

胎寒

先後數詩雖曰繁紊
誠爲學者識證提綱

孩兒百日胎寒候。足曲難伸兩手捲。音口冷腹膨身戰慄。晝啼不已夜噉噉。

藏寒

手兼足冷面微青。腹痛腸鳴泄瀉頻。蓋爲生時感寒溼。夜多啼切日常輕。

胎熱

三朝旬外月間兒。目閉胞浮證可推。常作呻吟煩躁起。此爲胎熱定無疑。

弄舌舒舌

弄舌微微露卽收。得於病後最難療。出長收緩名舒舌。熱在心脾不用憂。

臍風

風邪早受入臍中。七日之間驗吉凶。若見腹疼臍凸音起。惡聲口撮是爲風。

臍突

嬰孩生下旬餘日。臍突光浮非大疾。穢水停中明所因。徐徐用藥令消釋。

夜啼

夜啼四證驚爲一。無淚見燈心熱煩。面瑩夾青臍下痛。睡中頓哭是神干。

急驚

面紅卒中暈身熱。唇黑牙關氣如絕。目翻搐搦喉有痰。此是急驚容易決。

天鈞

天鈞元因積熱深。涎潮心絡又多驚。雙眸翻上脣焦燥。呵欠頻頻疾便生。
急驚後如瘧

急驚之後傳如瘧。外感風邪爲氣虛。略表次和脾與胃。自然寒熱得消除。
慢驚

陰盛陽虛病已深。吐餘瀉後睡揚睛。神昏搐緩涎流甚。此證分明是慢驚。
搐證

搐證雖分急慢驚。亦因氣鬱致昏沉。良醫欲治宜寬氣。氣順之時搐自停。
諸風毒

諸風夾熱隱皮膚。凝結難爲陡。猝頓除。項頰腫須護喉舌。內疏風熱外宜塗。
破血傷風

跌撲皮膚因破損。外風侵襲在傷痕。隨時發腫微加痛。活血疏風是要言。
傷積

頭疼身熱腹微脹。足冷神昏只愛眠。因食所傷脾氣弱。下宜遲緩表宜先。
驚積

大府無時泄下青。見人啾啾似生噴。解驚去積宜施劑。立致精神起臥寧。

諸熱

諸熱元初各有因。對時發者是潮名。乍來乍止爲虛證。晚作無寒屬骨蒸。

吐瀉

脾虛胃弱病根源。水穀如何運化行。清濁相干成吐瀉。久傳虛渴便風生。

傷寒

傷寒之候有多般。一概推詳便究難。面目俱紅時噴嚏。氣麤身熱是傷寒。

傷風

惡風發熱頭應痛。兩頰微紅鼻涕多。汗出徧身兼咳嗽。此傷風證易調和。

夾驚傷寒

身微有熱生煩躁。睡不安兮神不清。此是夾驚感寒證。亦須先表次寧心。

夾食傷寒

鼻涕頭疼時吐逆。面黃紅白變不一。此因夾食又傷寒。發表有功方下積。

下後傷風

表而未盡遽宣通。通後從而喘氣攻。此是陽微陰弱證。肺經再受有邪風。
夾風傷寒

孩子傷寒又夾風。目多眵淚臉腮紅。太陽冷汗微生喘。口水如涎滴滿胸。
風寒互證

風寒雙中汗難通。重下雄黃散是功。得汗來時猶可治。莫教不汗變張弓。
結胸傷寒

大結胸兮小結胸。水兼寒熱不雷同。陽經下早留爲毒。用藥無非直達攻。
痞似結胸

證同前證應無痛。病在陰經下早虛。邪毒結留心下滿。此名痞氣膈中居。
壞證傷寒

此病初傳不識機。致令汗下失其宜。邪乘虛入傷榮衛。知犯何經急療之。
赤白痢

小兒下痢細尋推。不獨成於積所爲。冷熱數般雖各異。寬腸調胃在明醫。
五色痢

痢成五色豈堪聞。日久傳來神氣昏。乾痛煩啼爲最苦。更防兒小命難存。

風痢

風毒乘脾黃褐色。看來其痢與驚同。但聞不臭斯爲異。獨瀉脾經自有功。

腫證

古今議腫是脾虛。大抵多從溼熱爲。十種根因各調治。詳分補瀉在臨機。

五疳

五疳五藏五般看。治法詳推事不難。若見面黃肌肉瘦。齒焦髮豎卽爲疳。

走馬疳

傷寒熱毒上熏蒸。面色光浮氣喘生。口臭齒焦腮有穴。馬疳如此是真形。

脫肛

肛門出露久難收。再感風傷事可憂。況自先傳脾胃弱。更詳冷熱易爲瘰。

痢證

驚傳三捨後成痢。嚼沫牙關目上翻。明辨陰陽參色脈。不拘輕重總風痰。

瘧證

夏傷於暑秋成瘧。聞日連朝不少差。解表去邪須次第。再宜養胃固脾家。
瘧證

本因積久成頑結。男左女右居腹脇。俗云龜癆不須聽。化癥調脾自安帖。
諸疝

諸疝元來各有名。蓋因寒溼氣侵成。治分芍藥烏梅散。勻氣金鈴與五苓。
龜胸

無端脣口忽然紅。心肺因痰飲聚中。風熱乘之加喘急。形如覆掌號龜胸。
驚丹

兒在胎時母受驚。驚傳邪熱子傷神。忽然赤片微微起。涼解肌膚始見寧。
咳嗽

咳嗽雖然分冷熱。連聲因肺感風寒。眼浮痰盛喉中響。戲水多因汗未乾。
齁齕

孩兒齁齕爲啼時。食以酸鹹又乳之。或自肺經傷水溼。風痰結聚早爲醫。
瘡疹

毒停在胃布諸經。運氣變遷瘡疹生。面口脣紅兼噉渴。腹疼中指冷分明。

豆瘡傳變

黑陷瘡枯噉失音。瀉兼渴甚吐無停。身涼食減多沉困。更有痰多命必傾。

斑疹

斑證總言因胃熱。赤生黑死分明別。忽如錦片出肌膚。溫毒發時從兩脇。

陰囊腫

厥陰少陰寒激搏。致令腫縮宜溫藥。光浮不痛作虛醫。赤腫須憑涼劑卻。

驚癱鶴膝

風溼流傳骨節間。痛兼心悸是驚癱。若於腕脛多疼重。凝結成團鶴膝看。

癰瘡

初發原於耳項旁。證輕多謂是無妨。因循作腫成膿後。穿破名爲癰瘡瘡。

五淋

淋病雖然分五種。要明各類在詳看。曰膏曰冷同其證。血石均爲熱一般。

腹痛

大凡腹痛初非一。不特癥瘕與疝癰。分條析類證多端。看取論中最詳悉。

丁奚

久積成疝因失治。肚高頸細變丁奚。更兼手足如筒樣。面白身黃汗不時。

哺露

積傳疳後曰丁奚。哺露因而又得之。腹大青筋蟲滿肚。吐頻瀉數急調脾。

口瘡

心脾胃熱蒸於上。舌白牙根肉腐傷。口角承漿分兩處。有瘡雖異治同方。

諸瘡

滿頭及額生如癩。但用連牀得安瘥。徧身糜潰更多煩。一抹金塗無不快。

目疾

生下經旬目見紅。蓋因胎受熱兼風。涼肝心藥斯為妙。疝氣豆瘡宜別攻。

丹毒

小兒氣弱肌膚薄。熱毒乘虛來發作。急須化毒與消風。毒散風消始安樂。

重舌鵝口

活幼心書 卷上 決證詩賦

孩兒胎受諸邪熱。熱壅三焦作重舌。或成鵝口證堪憂。用藥更須針刺裂。

五軟

稟賦元虛髓不充。六淫之氣易來攻。頭兼手足身羸弱。此證名爲五軟同。

天柱倒

忽然天柱倒何如。此病皆因肝腎虛。外有風邪容易襲。故傳項軟不相隨。

解顛

頭顛初見如開解。腎弱元虛大可憂。補腎調元是良藥。投之不應定難瘳。

諸汗

小兒自汗證多端。切莫將爲一例看。要識陰陽虛實病。勤勤調理自然安。

黃證

身黃暑溼蒸脾得。內外因分治最良。更有胎傳生便見。母宜多服地黃湯。

失血

九道何爲血妄行。蓋因抑鬱熱邪生。隨經施治明虛實。氣順如常血自勻。

不內外因

人身一或才傷損。重則宜其血亦多。不內外因然有自。各分證治在專科。

小兒常安

四時欲得小兒安。常要一分飢與寒。但願人皆依此法。自然諸疾不相干。

右前詩訣。言雖鄙俚。所貴平易能記者。得之於心。應之於手。何施不可。參諸後論。尤見詳備。此特爲初學之勉。非敢立異於人也。

小兒專科賦

以小兒專科要識形證爲韻
前場屋中應舉八韻賦式

細辨諸證。難明小兒。惟造理以達此。於專科而見之。傷風清涕交流。初傳在肺。夾食黃紋必見。是屬居脾。原夫七日之內。臍痛乃多。百晬之外。骨蒸者少。惟驚疳積。熱半在攻裏。故暑溼風寒。先宜發表。總謂十三科目。各貴精專。不拘長幼。兒童均稱是小。觀其得病。嬰孺要參脈形。雖痛癢難通於一問。然重輕明察於諸經。暴感邪氣。頰頰微紫。久因客忤。山根太清。勿問兒小。但憑藥靈。腎有證攻。黑色多浮於地閣。即承心爲邪克。赤紋獨露於天庭。即額茲蓋脈病證治。審察要詳。襁褓嬰孩。變更莫測。凡有疾苦。全憑見識。非業擅一門。何以取效。苟醫不三世。徒然用力。難同初學之妄議。貴在專科之定式。心肝恬淡。自然毋染於時災。脾胃和平。戒以勿

餐於夜食。請言夫醫通仙道。溥以生意。家傳祕方。及諸幼年。參天地之化育。無息少閒。免父母之憂懷。有驚即痊。雖用藥聖。亦由業專。然而見魚口兮氣弱。殊甚。聞雅聲兮命傾。必然。既危吐露。以真實。安有怨咨。而妄傳。表用疏通。細述戴君之語。藏明補瀉。載稽錢氏之篇。專者何。精義無二。全活孩提。博學有諸。在明機要。是知小脈科兮。嘗喜一藥多效。大方科兮。固有十形三療。蓋進以乳食。務要搏節。而遠之鼓樂。免生驚叫。調和自小。以無恙。長大何憂於不肖。春融一念。普推活幼之誠。日究千方。庶盡及人之妙。然嘗論形質始具。夙有靈性。語言未通。是爲啞科。非圓機之士。焉察彼證。必精製之劑。能除宿痼。有信巫不用醫。適以謬甚。有是方不重藥。尤其誤矣。此病家自取過耳。於醫者殊無奈何。術顯咸陽扁鵲。全嬰而有驗。脈明晉代叔和。及幼以無訛。抑又聞皓白虛盛。神氣常昏。紫黑實多。聲音益勝。陽證似陰。脈按細緊。陰證似陽。脈來緩應。然大學所謂若保赤子。心誠求之。此又在究心而觀證。

嘗謂爲醫不易。而幼幼之科。尤不易也。

黃帝曰。若吾不能察其幼小。雖聖人猶難之。况後學乎。余雖不才。謾成前賦。以

便學者觀形切脈之要。臨病之際。非特少資談柄。亦可以發揮神聖工巧之妙。豈不躋歟。其或未然。後之明者。改而證諸。幸莫大焉。

活幼心書 卷上 決證詩賦



3.081
.5
10(2)1

活
幼
心
書

二

中國醫學大成第十集

兒科類甲
兒科叢刊之一

活
幼
心
書
中

上海大東書局印行



3 0472 7204 6

A254812



活幼心書

元

衡陽

曾世榮德顯編次

鄞縣

曹赤電炳章圈校



卷中 明本論

胎寒

孩兒初生百日內。覺口冷腹痛。身起寒粟。時發戰慄。曲足握拳。晝夜啼哭不已。或口禁不開。名曰胎寒。其證在胎時。母因腹痛而致。產經云。胎寒多腹痛。亦有產婦喜啖甘肥。生冷時果。皆致胎寒。或胎前外感風寒暑溼。治以涼藥。內傷胎氣。則孩兒生後。昏昏多睡。間或嘔乳瀉白。若不早治。必成慢驚慢脾。凡有此候。宜以沖和飲。當歸散。合和水煨薑煎服。使之微泄。泄行進勻。氣散調補。泄止氣勻。神安痛定。手足舒伸。次用參苓白朮散。以養胃氣。白芍湯去其寒溼。乳母宜節生冷飲食。庶漸瘥也。又有手足稍冷。脣面微青。額上汗出。不願乳飲。至夜多啼。頗似前證。但

無口冷寒戰。名曰藏寒。其疾夜重日輕。腹痛腸鳴。泄瀉青水。間有不瀉者。此證亦在百日內有之。皆因臨產在地。稍及冷氣侵逼。或以涼水參湯洗兒。或斷臍帶短。而又結縛不緊。爲寒氣所傷。如此宜以白芍藥湯及冲和飲。加鹽炒茴香。茱萸水。薑煎投。並乳母同服。

胎熱

嬰兒生下。三朝旬月之間。目閉而赤。眼胞浮腫。常作呻吟。或啼叫不已。時復驚煩。偏體壯熱。小便黃色。此因在胎。母受時氣邪毒。或外感風熱。誤服湯劑。或食五辛。薑麵過多。致令熱蘊於內。熏蒸胎氣。生下故有此證。名曰胎熱。所謂胎熱。卽多驚。若經久不治。則鵝口。重舌。木舌。赤紫丹瘤。自此而生。先以木通散煎與母服。使入於乳。兒飲之。通心氣。解煩熱。然後以四聖散溫洗兩目。目開進地黃膏。天竺黃散。及牛蒡湯。當歸散。亦令母服。使從乳過。是一助也。乳母宜忌雞酒羊麵。庶得易安。不致反復。又有一證。如前證元無大病。而遽然弄舌者。但身熱而四肢冷。脣青色。此脾胃不和所致。宜服守胃散自癒。音愈有弄舌出於大病後。舌略出不長。一動卽收。此是惡候。以錢氏白朮散治之。不癒。音愈將傳危急。舒舌者。此脫著衣服。

不常。外感風熱入於心脾。蓋脾之脈絡繫於舌。故時復舒卷。音出長收緩。或渴或不渴。謂之舒舌。宜瀉心脾經之熱。用瀉黃散加黃芩水煎服。但不可以大寒之劑攻之。熱退則寒起。傳作他證。切宜謹之。

臍風撮口

嬰孩始生。一七之內。腹肚脹硬。臍畔四圍浮腫。口撮牙關不開。攢眉而叫。名臍風證。乃因剪臍帶短。或結縛不緊。致外風侵入臍中。或用鐵器斷臍。爲冷所侵。或牽動臍帶。水入生瘡。客風乘虛而入。傳之於心。蘊蓄其邪。復傳脾絡。致舌強脣青。手足微搐。口噤不能進乳。啼聲似啞。喉中痰涎潮響。是其候也。此證多致不救。若一七之外。先投劫風膏。次以五苓散。加寬氣飲。入薑汁。葱白。燈心。煎湯調服。與解風痰。及用一字金煎荊芥湯。或薄荷湯。調抹口內。證輕卽快。如稟賦充實。發熱有痰驚搐。投黑白飲。溫蜜湯。空心調下。微泄似茶褐色二三行。進白芍藥湯。水薑棗煎服。常用此法亦效。若臍凸音迭肚緊。微有青色。口撮不開。肝風盛而脾土受制。不可施治。凡有此候。百無一活。縱使得安。亦非長壽。一法用之間有驗者。孩兒牙根肉上有小泡。如粟米狀。用溫湯蘸舊絹裹手指。輕輕擦破。卽口開舌軟。不藥

自瘡。音。有臍突一證。又非臍風。此亦因初生洗浴。繫臍不緊。穢水侵入於內。產後旬日外。臍忽光浮如吹。捻動微響。間或驚悸作啼。治用白芍藥湯加薏苡仁。水煎空心溫服。次以外消散塗貼。自然平復。

夜啼

夜啼者。有驚熱夜啼。有心熱夜啼。有寒疝夜啼。有誤觸神祇夜啼。此四者。詳具於後。驚熱者。爲衣衾之厚。或抱於極煖處久坐。致生煩悶。邪熱攻心。心主神。神亂則驚。心與小腸爲表裏。故啼泣而遺溺者是也。治法。遏熱鎮心。則自安矣。用百解散。牛蒡湯。三解散主之。心熱者。見燈愈啼。面紅多淚。無燈則稍息。蓋火者陽物也。心熱遇火。兩陽相搏。才有燈而啼甚。故經曰。火疾風生。乃能雨。此其義也。宜涼心安神。用百解散。或五苓散。加黃芩。甘草。水煎服。次牛蒡湯。三解散。及琥珀抱龍圓爲治。有遇黃昏後至更盡時。哭多睡少。有啼聲不已。直到天明。乃胎中受寒。遇夜則陰勝而陽微。故腰曲額汗。眼中無淚。面瑩白而夾青。伏臥而啼。入盤腸內。弔之證。名爲寒疝。治法。去宿冷。溫下焦。白芍藥湯。烏梅散。及沖和飲。加鹽炒茱萸。茴香。水薑煎服。及鉤藤膏亦佳。誤觸神祇者。面色紫黑。氣鬱如怒。叫時若有恐

之。驚風既除之後。輕者投半夏圓。重者下水晶丹。與之去痰。免成癡疾。但不可用大寒涼藥治之。熱去則寒起。亢則害。承乃制。若倉卒之間。驚與風證俱作。只用五苓散加辰砂末。薄荷湯調服。少解其證。蓋五苓散內有澤瀉導小便。心與小腸爲表裏。小腸流利。心氣得通。其驚自減。內有桂。木得桂則枯。是以有抑肝之氣。其風自停。況佐以辰砂。能安神魂。兩得其宜。大略要解熱涼心肝。後用平和湯散調理。稍熱之劑。則難用。醫者宜審之。愚嘗感慨諸人。每見驚風搐作。不明標本。混爲一證。遽然全用金石。腦麝。蜈蚣。蛇。蠍。大寒搜風等劑。投之。耗傷真氣。其證愈甚。多致弗救。殊不知驚生於心。風生於肝。搐始於氣。是爲三證。其驚與風。首已詳及。然所謂畜氣而成搐。陳氏之論。最爲明理。但未著其方。余於此證。則用寬氣飲治之。只以枳殼。枳實爲主。蓋其氣也。四時平和則身安。一息壅滯則疾作。况小兒啼哭不常。其氣蘊蓄。內則不能升降。外則無由發泄。展轉經時。亦能作搐。善醫者審察病源。從而療之。萬無一失。更辨陰陽虛實。不可輕忽。若陽實證。煎平和湯調三解散主之。此急驚有搐之類。若陰虛證。煎固真湯調寬氣飲治之。此慢驚有搐之類。若暴感此證。未別陰陽虛實。先用五苓散和寬氣飲。及少加寬熱飲。三藥合用。蓋

汗沸湯調灌即解。大抵治搐之法。貴以寬氣爲妙。氣順則搐停。此自然之理。男左女右。手足搐者。卽爲順證。男右女左。手足搐者。卽爲逆證。故難治也。有男右女左。證輕者。投順搐散。使分左右。庶好療之。天鈞者。初得時頓頻呵欠。眼忽下淚。身熱脈浮洪實。是風痰壅聚。上貫心包。致經絡閉而不通。目睛翻視。頸項強仰。兩手掣轉向後。大哭如怒。脚曲腰直。發熱痰鳴。爪甲皆青。狀如鬼祟。名曰天鈞。治法同前。急驚內藥與服。先解風熱。次理痰氣。斯爲當矣。暑風一證。因夏月感冒風寒太甚。致面垢脣紅。脈沉細數。忽發驚搐。不省人事。治用消暑清心飲。辰砂五苓散及琥珀抱龍圓。自安。切勿以溫劑調補。熱氣得補則復盛。尤宜戒之。又有急驚天鈞之後。變作潮熱。手足逆冷。有似瘧疾。蓋因病愈之時。不善將護。外感風邪。乘虛而入於經絡。再未解散。以致如此。經曰。重陽必陰。重陰必陽。又曰。亢則害。承乃制。此其義也。宜服柴胡加桂湯及當桂散。氣實者。則以烏犀圓。水晶丹。略與通利。勻氣散止補。後以參苓白朮散調理。自然平愈。此證所用藥品。間使苦寒之味。務在消陽盛之火。肺金得勝。肝木自平。而風邪亦散。斯爲良法。大凡幼穉欲令常時驚悸不作。在乎腎藏和平。故戴氏曰。治驚不若補腎。謂心屬火。火性燥。得肝風。

則煙焰起。致生驚悸。補腎則水升火降。邪熱無侵。雖有肝風。不生驚駭。其法當於申時。進補腎地黃圓一服。或琥珀抱龍圓。用申時者。蓋水生於申。佐之以藥。則腎水得平。心火不炎。自無驚矣。

慢驚

治慢驚者。考之古書。亦無所據。惟載陰痢而已。蓋慢驚屬陰。陰主靜而搖緩。故曰慢。其候皆因外感風寒。內作吐瀉。或得於大病之餘。或傳誤轉之後。目慢神昏。手足偏動。口角流涎。身微溫。眼上視。或斜轉。及兩手握拳而搖。或兼兩足動掣。各辨男左女右。搖者爲順。反此爲逆。口氣冷緩。或顛門陷。此虛極也。脈沉無力。睡則揚睛。謂兩目半開半合。此真陽衰耗。而陰邪獨盛。陰盛生寒。寒爲水化。水生肝木。木爲風化。木剋脾土。胃爲脾之府。故胃中有風。癩_音癩_音漸生。其癩癩證狀。兩肩微聳。兩手垂下。時復動搖不已。名爲慢驚。宜以青州白圓子。蘇合香圓。入薑汁杵勻。米飲調下。虛極者加金液丹。次用沖和飲。同七寶散。水煨薑煎服。使氣順風散。少解吐瀉。間以胃苓湯救其表裏。若吐不止。可投定吐飲。瀉不減。宜服六柱散。或日生湯。去胃風。定癩癩。清神氣。五苓散導其逆。調榮衛。和陰陽。若痰多脣白。四肢如

冰不省人事。此虛慢之極。用固真湯速灌之。以生胃氣。胃氣既回。投醒脾散。沉香飲調理。有慢脾風者。自慢驚傳變。始因吐瀉。經久不治。故胃弱脾虛。脾虛生風。風入經絡。則手足無時搖動。昏沉不省。面帶痿色。風勢太甚。乃虛之極。急用青金丹。天麻飲灌服。或六柱散。固真湯。不問有熱有痰。皆風入脾經。亦是危證。若痰如牽鋸之聲。面無風氣。猶甚縮。氣羸頑軟。搐甚。不可治也。

風毒

風毒者。因驚風之後。風從氣行。血從氣使。毒氣蓄於皮膚。流結而爲腫毒。遂成頑核赤色。多在顛頰之間。或耳根骨節之處。重則成癰成瘡。謂之遁毒風。宜以百解散。牛蒡湯。及當歸散倍加枳殼。大黃水煎服。或用皂角子。薄荷同煎。續投雄黃散。消毒飲。結在顛頰者。治用烏豉膏。以護咽喉。外則敷以拂毒散。及外消散。若因跌撲破損皮膚。風邪侵襲。傷寒而發毒腫。謂之破血傷風。可投疏風散。活血散。及黃芩四物湯調治。若發於喉下。如帶橫纏者。乃纏喉風也。三因方爲喉風。此證宜投化毒湯。及烏豉膏。鎔化護喉。却不可於喉外用藥塗貼。但依前遁毒風內治法。如服藥後散止不定。或上頭項。或遊於面目。而又復來喉下。如赤紫微浮。中有白

突者。陽證變陰。亢則必害。謂之赤遊風毒。亦難治矣。

傷積

凡嬰孩所患積證。皆因乳哺不節。過餐生冷堅硬之物。脾胃不能剋化。積停中脘。外爲風寒所襲。或因吃臥失蓋。致頭疼面黃。身熱眼胞微腫。腹痛膨脹。足冷肚熱。不安。昏神飲食不思。或嘔或噦。口噫酸氣。大便酸臭。此爲陳積所傷。如覺一二日。先以百傷飲發表。次當歸散入薑煎服。溫動積滯。方下爲犀圓。六聖圓。重與寬利。後用勻氣散調補。有食飽傷脾。脾氣稍虛。物難消化。留而成積。積敗爲痢。腹肚微痛。先調胃氣。次理積。却止痢。則病根自除。和中散理虛養胃。三稜散。烏犀圓。助脾化積。沉香檳榔圓。守中湯。進食止痢。仍忌生冷黏膩之物。不致復作。有時時泄青水。如生菜汁。是受驚而後有積。煩悶啾啾。常似生嗔。名爲驚積。先解驚。後理積。解驚五苓散。或百解散。理積三稜散。或烏犀圓。及三解散。炒神麴。生薑煎湯調服。醒脾散。沉香檳榔圓。寧驚化積。壯氣和胃。仍節冷乳。自然平治。

熱證

仲景論曰。有翕翕發熱。有蒸蒸熱。此分汗下之不同。翕者若翕之所覆。明其熱

在表也。屬上太陽第一證。以桂枝湯主之。蒸者如熏蒸之甚。主其熱在胃也。屬陽明三十二證。以調胃承氣湯下之。此仲景法也。緣小兒之熱。似是而非。若同而異。有傷寒熱。變蒸熱。積熱。麻豆熱。驚風熱。潮熱。骨蒸熱。有表裏俱虛而熱。有熱雖同名則異。可不明辨標本。以施治乎。須令驗證。對證用藥。斯爲的論。傷寒熱。十指稍冷。鼻流清涕。發熱無汗。面慘凌振。右頤有紫紋。治法載於傷寒條內。變蒸熱。溫溫微熱。氣羸驚少。喎乳瀉黃。上脣尖有小泡。如水珠子。卽變蒸也。不須用藥攻治。如兼他證者。當依其所感之候。略與和解。不必重劑可也。蓋變者變其形容。蒸者蒸長肌肉。三十二日爲一變。六十四日爲一蒸。又三大蒸。積五百一十二日。變蒸畢而形氣血脈筋骨全矣。夫變蒸之說。再考明醫陳氏書。載十變之內。五蒸存焉。又有三大蒸。計其數恰五百一十二日。最爲明矣。積熱。眼胞浮腫。面黃足冷。發熱從頭至肚愈甚。或聞飲食之氣惡心。及腹疼嘔吐。治法詳載傷積論中。麻豆熱。面赤足冷。身發壯熱。呵欠頓悶。咳嗽腰疼。時或作驚。腹痛自痢。及中指獨自冷者是也。治法詳見瘡疹證內。驚風熱。徧身發熱而光。自汗心悸不寧。脈數煩躁。治法與急驚證同。所用藥餌。必先解表。潮熱。有午後發熱。或日晡發熱。對時

如潮水之應。不差是也。先用百解散發表。次以當歸散及三解散治之。脈實者下之。宜大柴胡湯。虛浮散者微汗之。用百解散。若發熱而嘔者。小柴胡湯主之。虛熱。因病後發熱無時。一日三五次者。此客熱乘虛而作。先以胃苓湯加黃耆末。溫米清湯調服。次投錢氏白朮散。或固真湯帶涼服。及用溫鹽湯。參入涼水送下。黑錫丹。固守元氣。骨蒸熱。身體虛羸。遇晚二發。有熱無寒。醒後渴汗方止。此乃疳病之餘毒。傳作骨蒸。或腹內有癥塊。有時微痛。用參苓白朮散。薑棗三稜煎湯調服。或投化癥圓。先療脾虛宿滯。次以柴胡飲爲治。仍忌鷄酒羊麵毒物。有小兒熱證。用表裏藥後。其熱俱退。既退復熱者何也。療病至此。難以概舉。或再解表攻裏。或施涼劑。熱見愈甚。以陰陽辨之。何者爲是。推其原乃表裏俱虛。而陽浮於外。陰伏於內。所以又發熱。宜用溫平之藥和其裏。則體熱自除。投錢氏白朮散。去木香加扁豆水煎。及黃耆六一湯安神散。自然平復。若日久汗多。煩渴食減。脈微緩。喜飲熱。可服真武湯。雖附子性溫。取其收斂陽氣。內有芍藥性寒。一寒一溫。亭分得宜。用之無不驗矣。

傷寒 仲景一書前輩發明甚詳。愚不敢贅姑舉其略。

按仲景傷寒論云。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冷烈。此四時正氣之序也。惟冬時嚴寒。去寒就溫。不致於傷。偶然觸冒。名爲傷耳。小兒在襁褓中。或長成而稟賦虛怯。苟失其養。百病蠱起。故傷寒多得於秋冬。或薄暮清朝。蓋秋冬多冷。夜起便送。或遽出風寒之地。爲邪氣所侵。旋即噴嚏。五指稍冷。關紋不見。面目俱紅。慘而不舒。氣麤體熱。無汗惡寒。是傷寒也。或面色光而不慘。汗出惡風。是傷風也。其候與大脈科若同而異。治療之法。亦相去不遠矣。餘外不然。蓋以小兒是純陽之體。用藥不可太熱。此醫門入法。所謂治小兒無熱一也。然仲景一十六條。三百九十七法。前賢名曰金匱。豈不貴哉。兼五運有太過不及之異。六氣有逆從勝伏之差。變生災眚。皆應在人身。或遇客邪臨御。藏氣虛弱。因受其病。謂之時氣。又與傷寒不同。乃四時乖戾之氣。如春應暖而反寒。夏應熱而反冷。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。非其時而有其氣。人感冒中傷而有病者。不擇地之遠近。所患一同。當以何經何藏所受病證。知犯何逆。以法治之。此仲景之妙旨。然治小兒傷寒傷風。與大方相同者。若發熱身無汗。麻黃湯主之。以表實無汗。榮血受邪而設也。得汗則寒邪發泄。而無壅遏之患。若身熱自汗。桂枝湯主之。以表虛自汗。衛受

邪而設也。解肌則風邪疏散。而無壅滯之患。凡治病之要。尤在臨機審察。庶無誤矣。夾驚傷寒。其候謂感寒時。忽受驚觸。情性昏沉。身微有熱。心躁或渴。睡中多驚。手足動掣。面紅痰嗽。齧牙呵欠。山根準頭。皆淡青色。兩眉下有紫紅見。論其得病之由。或被驚發熱。後感寒邪。或先感寒邪。後因被驚。遂致兩熱相乘。所有此候。宜百解散發表。次牛蒡湯治驚熱。散邪氣。若看證大。菴蓉當歸散。三解散。間以無驚圓。琥珀抱龍圓。與服。夾食傷寒。其證鼻流清涕。頭疼發熱。晝輕夜重。時復吐逆。噫氣酸醜。面黃紅白。變之不一。目胞微浮。乍涼乍熱。心煩發渴。腹痛脹滿。皆因飲食過傷。又感風寒。激搏而熱。其熱氣與食熏蒸於胃。胃爲水穀之海。脾實則能剋化。今脾胃因飲食所傷。致有斯疾。先煎小柴胡湯。加生薑自然汁同服。或五苓散入薑汁沸湯調下。與解寒邪。溫胃止吐。次用百解散。及當歸散。水薑煎服。疏解外邪。溫正胃氣。烏犀圓去積。勻氣散止補。參苓白朮散調脾胃。則瘡愈矣。下後傷風。其候兩臉微紅。眼胞浮腫。發熱痰喘。飲食少進。此則亦因外感風寒。未經發散。下之失宜。邪氣未除。而正氣有損。調理又遲。致榮衛不和。正氣失守。脾胃尙弱。過傷飲食。名爲食復。用小柴胡湯和解。次三稜散調治。或因下後體氣虛弱。腠理

不密。遽出風寒之地。易爲感冒。此爲再經外邪。侵襲於皮毛。皮毛者肺之合也。風寒外侵於皮毛。內合於肺經。致有痰熱喘急。肺主氣故也。亦宜發散。表邪既退。然後調脾。使中州之土固守。則何患乎外邪得以侵襲哉。用五苓散。加麻黃去節。存根。沸湯泡過。功全表裏。水薑煎服。其解表散。惺惺散。枳實湯。或當歸散。加陳皮。水薑煎服。以和中散調理。夾風傷寒。與前證相似。但臉紅身熱。氣羸微喘。目淚口渴。手足皆溫。太陽冷汗。口水流滴胸前。時或惡風。此因先傷寒發熱。日久未經解散。將傳入裏。而又感風。風熱相搏於內。致心脾蘊熱。熱氣上逼。口舌發瘡。名爲夾風傷寒。諸熱引肝風。目多眵淚。口燥發渴。手足溫者。邪將傳裏。口水不止。而加生瘡者。熱上蒸也。太陽冷汗者。表之虛也。邪實表虛。證在半表半裏之間。宜以小柴胡湯。加桂爲用。疏滌肝風。羌活散和解。四順飲去上焦熱。則口舌之證乃除。而重感之邪。亦得消釋。風寒互證。活人書云。脈似桂枝反無汗。病似麻黃反煩躁。風喜傷衛。寒傷榮。榮衛俱病。仲景以大青龍湯治之。然榮行脈中。衛行脈外。榮衛皆虛。疾由生矣。蓋兒小者。因抱養失宜。風寒不避。致有斯疾。兒大者。或因水浸雨侵。或因向火脫著。遽然出外。外邪乘虛而襲。汗閉不通。其後或冷或熱。昏醒不定。名

爲風寒互證。但小方用藥品味。分兩不與大人同。若此證一汗。風寒既除。惟當順氣化痰。慎勿投峻補之劑。熱氣得補則復盛。變生他證。初用雄黃散。水薑葱薄荷同煎。併三服。稍熱投得汗卽瘳。免爲角弓反張之證。次以當歸散。惺惺散間服。若痰不退。牛蒡湯如意膏。半夏圓。結胸傷寒。其候兩眉尖紅。脣紫鼻青。咳嗽口痛。痰結氣促。咳嗽不活。身熱汗出。目露白睛。項頸如柔痙之狀。不可俛仰。結胸之證。居身之高分。故經云。高者因而越之。下者引而竭之。所謂結胸。如繫結而不能解者。諸陽受氣於胸中。邪氣與陽氣相結。固而不解。非虛煩結實之比。胸膈高起。不按自痛。名大結胸。按之方痛。名小結胸。有水寒熱結胸。凡此諸證。低者舉之。高者陷之。仲景結胸之高邪。當行降下之法。以下結固之邪。內經曰。結雖大猶可解也。蓋傷寒之結。非直達之劑。孰能解之。仲景治小結胸證。以小陷胸湯主之。平常小兒。多有小結胸證。然陷胸湯內有黃連極苦。難以施之。嬰孩如發表後。但用鶴頂丹爲治。有兒最小者。於此丹內加寬氣飲。寬熱飲少許。薑汁茶清調下自瘳。若僅六七歲兒。投小陷胸湯入蜜同煎服取效。壞證傷寒。其候外察印堂多紫紋。脣白如灰色。四肢黃瘦。吐瀉間作。或寒或熱。飲食減少。大概外感風寒暑溼。內因飢

飽失節。不能調護。以傳受日深。醫不辨其表裏虛實。汗下失宜。使陰陽反錯。邪氣得勝。正氣將衰。胃納五味。以養五藏。脾受五味。以分清濁。而榮養百骸。今汗下不依其法。致傷榮衛。榮衛者。自中焦而生。得其氣之清者爲榮。濁者爲衛。其重濁者爲糟粕而下行。偶六淫所侵。治不如法。則外邪日盛。正氣乖常。胃氣衰微。變證多出。或作瀉痢。青黃吐逆寒熱。或爲腫滿偏枯。五疳八痢。或成丁奚。哺露。傳變不一。各有條論。隨證治之。並宜先投加味白芍藥湯和解。

咳嗽

咳嗽者。固有數類。但分冷熱虛實。隨證疏解。初中時未有不因感冒而傷於肺。內經曰。肺之令人咳何也。岐伯曰。皮毛者。肺之合也。皮毛先受邪氣。邪氣得從其合。故難經云。形寒飲冷則傷肺。使氣上而不下。逆而不收。衝壅咽膈。淫淫如癢。習習如梗。是令咳也。乍暖脫著。暴熱遇風。邪氣侵於皮膚。肺先受之。而爲咳嗽。若初得時。面赤脣紅。氣粗發熱。嗽來痰鳴。此是傷風痰壅作嗽。用清肺飲。五拗湯。及小柴胡湯。羌活散。皆可解表。次青木香湯。有小兒汗出未乾。遽爾戲水。亦致傷風咳嗽。外證眼胞微浮。額汗痰鳴。亦宜清肺飲。瀉肺湯。與之疏風化痰。解利邪熱。小柴

胡湯亦可。若嗽日久。津液枯耗。肺經虛矣。肺爲諸藏華蓋。臥開而坐合。所以臥則氣促。坐則稍寬。乃因攻肺下痰之過。名爲虛嗽。聲連不斷。喉中痰鳴。氣息欲絕。嗽罷則吐白沫。或乾嘔。此肺虛而氣不順也。面脣皆白而慘。嗽過額上多汗。哽氣長出。乳食減少。致脾虛而胃亦虛。宜其有吐。投茯苓厚朴湯及藿香飲。次溫脾潤肺。理中湯加杏仁。北五味。水煎服。蓋此藥補脾而益肺。藉土氣以生金。則自瘳矣。或咳而夾紅。有紫黯色。於理中湯內再加乾薑爲用。亦良法也。有脾虛亦能作嗽。當投補劑。用醒脾散。茯苓厚朴湯。令脾氣實。然後間以清肺飲煎服。疏解肺經風寒。及藿香飲助脾養胃。亦救子益母之法也。有一證。咳嗽至極時。頓嘔吐乳食與痰俱出。盡方少定。此名風痰壅。成肝木剋脾土。宜以白附飲投之。卽效。百日內嬰孩。偶咳痰壅。睡中不寧。亦因產後感風而得。但不可過用發散之劑。先以解表散一二服。次投貝母湯及惺惺散爲治。小兒喘疾。重於咳嗽。然有虛實冷熱之分。不可概舉。實熱者投清肺飲加五和湯。水薑葱煎。及瀉肺湯。碧玉圓爲治。經云。喘急多因氣有餘。蓋肺主氣故也。虛冷者投枳實湯。水薑煎。並如意膏。補肺散。坎離湯。自效。此肺虛感風。氣不升降。致有是證。及用定喘飲常驗。不拘冷熱。

皆可服。如壅失音。二聖散主之。 齶驗一證。郭氏曰。小兒此疾。本因暑溼所侵。未經發散。邪傳心肺。壅而爲熱。有熱生風。有風生痰。痰實不化。因循日久。結爲頑塊。圓如豆粒。遂成痰母。細推其原。或啼哭未休。遽與乳食。或飼以酸鹹。氣鬱不利。致令生痰。或節令變遷。風寒暑溼侵襲。或墮水中。水入口鼻。傳之於肺。故痰母發動。而風隨之。風痰潮緊。氣促而喘。乃成痼疾。急宜去風化痰。先以五苓散同寬氣飲。寬熱飲。用少薑汁和百沸湯調服。次進知母湯。雄黃散。如意膏。半夏圓。

吐瀉

吐瀉者。乃揮霍擾亂之證。霍者吐。亂者瀉。有心痛而先吐者。有腹痛而先瀉者。莫不由中焦而作。上焦主納。而不出。中焦主腐化水穀。而生榮衛。灌漑百骸。下焦分別水穀。主出而不納。此三才成式。日用常行。故脾居中州。胃爲水穀之海。乳哺入胃。脾能剋化。然後水穀分在臍上一寸。名分水穴。分其清濁。傳受得宜。則無吐瀉之患。凡嬰孩上吐不止。下瀉不停。皆因六氣六氣者。飭骨血也。未完。六淫六淫者。風燥是易侵。兼以調護失常。乳食不節。遂使脾胃虛弱。清濁相干。蘊作而然。有先瀉而後吐者。乃脾胃虛冷。其候先瀉白水或白凍。吐亦不多。口氣緩而神色慢。額前

有汗。六脈沉濡。此爲冷也。先吐而後瀉者。乃脾胃有熱。氣促脣紅。吐來面赤。脈洪而數。渴飲水漿。此爲熱也。冷熱之分。要須詳審。有數歲者。亦患此證。始自夏秋。晝近極熱之地。解衣乘涼。夜臥當風之所。失蓋感冷。陰陽相搏。氣射中焦。名爲霍亂。活人書用香薷散調治。以其能分別水穀。升降陰陽。又曰。熱多欲飲水者。五苓散。寒多不飲水者。理中圓。詳究治法。得非欲平中焦乎。又有脾經積滯未除。再爲飲食所傷。不吐則瀉。不瀉則吐。宜以三稜散化積。守胃散和中。必自安矣。錢仲陽議曰。吐乳瀉黃。是傷熱乳。吐乳瀉青。是傷冷乳。皆當下之。詳夫此理。乃迎奪之法也。不若傷熱者用五苓散以導其逆。傷冷者用理中湯以溫其中。自然平復。有小兒盛夏初秋。遇夜乘風。渴而飲水。過餐生冷果物。攻激腸胃。遂乃暴吐暴瀉。傳作手足俱痺。筋攣而痛。痛則神志不寧。以驚證治之。誤矣。所謂筋遇寒則引縮。又以陽明養宗筋。屬胃與大腸。因內傷生冷飲食。外感風邪。吐瀉交作。胃氣固虛。不能養其宗筋。亦致攣急。此證口氣溫。面色慘。脈沉緩。再用手按兩膝腕下。見筋縮而引於皮間。是其候也。治以理中湯。加附子半生半炮。水薑熟煎。空心溫服。更詳虛實冷熱爲治可也。

諸吐

論吐之原。難以概舉。有冷吐、熱吐、積吐、傷風嗽吐、傷乳吐。其吐則同。其證有異。各述於後。冷吐乳片不消。多吐而少出。脈息沉微。面白眼慢。氣緩神昏。額上汗出。此因風寒入胃。或食生冷。或傷宿乳。胃虛不納而出。宜溫胃去風除宿冷。用當歸散、水煨薑、陳皮煎服。或間投沖和飲。理中湯。及薑橘湯。定吐飲。如諸藥不效。以參香飲治之。熱吐面赤脣紅。吐次少而出多。乳片消而色黃。偏體熱甚。或因暑氣在胃。或食熱物。精神不慢。而多煩躁。此熱吐也。宜解熱毒。用大順飲。溫熟水空心調下。並五苓散、小柴胡湯。並加薑汁緩服。及香薷散主之。誤服熱藥。先投菘豆飲解之。次服止吐之劑。積吐眼胞浮面微黃。足冷肚熱。晝輕夜重。兒大者脈沉緩。此宿冷滯脾。故吐黃酸水。或有清痰。脈實而滑。為食積所傷。吐酸醜氣。或宿食併出。兒小者喎乳不化是也。先用五苓散、來汁。溫湯調下和解。次以烏犀圓主之。最小者投三稜散、化癥圓。傷風嗽吐。有熱生風。有風生痰。痰結胸中。肺氣不順。連嗽不止。和痰吐出。此為嗽吐。痰壅而作。乃為實證。宜去風化痰。先投清肺飲。次小柴胡湯為治。若嗽久而肺虛。土不生金。故面白脣燥。乾嗽乾嘔而無痰。可溫補為

上用茯苓厚朴湯。惺惺散。如意膏爲治。傷乳吐。纔乳哺後卽吐。或少停而吐。此因乳飲無度。脾氣弱。不能運化。故有此證。譬如小器盛物。滿則溢。治法宜節乳。投三稜散。諸吐不止。大要節乳。徐徐用藥調治。必安。節者。撙節之義。一日但三次。或五次。每以乳時。不可過飽。其吐自減。及間稀粥投之。亦能和胃解吐。屢見不明此理。惟欲進藥以求速效。動輒斷乳二三日。致餒甚而胃虛。啼聲不已。反激他證。蓋人以食爲命。孩非乳不活。豈容全斷其乳。然乳卽血也。血屬陰。其性冷。吐多胃弱。故節之。醫者切須知此。乳母亦宜服和氣血調脾胃等藥。

諸瀉

論瀉之原。有冷瀉。熱瀉。傷食瀉。水瀉。積瀉。驚瀉。風瀉。藏寒瀉。疳積瀉。種種不同。各分於後。冷瀉多是白水。瀉密而少。腹痛而鳴。眉皺目慢。面帶白色。額有汗多。此爲冷瀉。沖和飲。當歸散。合和水煨薑煎服。並守中湯。參苓白朮散。益中膏。沉香檳榔圓治之。熱瀉大便黃色。如筒弔水。瀉過卽止。半日復然。心煩口渴。小便黃少。食乳必羸。此爲熱瀉。先用五苓散。或大順飲。次以錢氏白朮散。主之。香薷散亦佳。傷食瀉。乃脾胃素弱。復爲生冷果食所傷。故大便不聚而瀉。或因乳母養生

冷肥膩之物。自乳而過。亦能作瀉。面脣俱白。瀉稀而少。或如壞雞子。腥臭異常。身形黃瘦。名傷食瀉。宜先溫正胃氣。次理積而後固脾。沖和飲。當歸散。合和水。煨薑棗子煎服。理積。兒大者烏犀圓。小者化癖圓。三稜散。固脾和中散。醒脾散。水瀉謂之洞泄。乃陰陽不順。水穀不分。瀉黃水而小便少。番次密而無度。是夏秋之際。晝則解衣取涼。夜則失蓋感冷。冷熱相激。清濁渾亂。或因母自熱中來。乳有熱氣。遽以哺之。令兒脾胃不和。水穀交雜而下。以咬咀五苓散。加薏苡仁。車前子。半夏。水薑煎服。分正陰陽。或先用大順飲。溫白湯調下。香薷散。調中止補。錢氏白朮散。六和湯亦好。積瀉。脾氣虛弱。乳食入胃。不能運化。積滯日久。再爲冷食所傷。傳之大腸。遂成泄瀉。留連不止。諸藥不效。蓋以積在脾胃。積既未除。何由得瘳。宜先去積。後止瀉。瀉止實脾。則病除矣。三稜散。烏犀圓。續用沉香檳榔圓。參苓白朮散。和中散。香橘餅調理。驚瀉。糞青如苔稠。若膠黏。不可便止。但鎮心抑肝。和脾胃。消乳食。斯爲治法。先投五苓散。次用三稜散。水薑粳米煎服。或三解散。煨神麴。生薑煎湯調服。及沉香檳榔圓。不驚丹調治。風瀉。慢驚大病後有之。其糞稀黃褐色。或夾不消乳食同下。此因脾虛所致。或夾褐黑色者屬腎。蓋脾虛爲腎水所乘。

故也。若久不進飲食。再有驚搐。宜疏腎水。去脾風。次補脾則自瘳。庶無復作之患。疏腎水。以咀五苓散。加黑牽牛半生半炒。並薏苡仁水。薑煎服。去脾風。瀉黃散。調脾氣。參苓白朮散。藏寒瀉糞。如青竹色。不稀不稠。或下青水。未瀉時腹痛而鳴。叫哭方瀉。多是生來三五月內有此。周歲則無。始因斷臍帶短。風冷自外。逼內而成。此疾先用沖和飲。水葱白煎投。溫中解表。次以當歸散。水煨薑煎服。及投勻氣散。理中湯。疳積釀瀉。其候面色痿黃。肚脹脚弱。頭大項小。髮稀且豎。肌肉消瘦。不思飲食。晝涼夜熱。或腹內有癥瘕氣塊。瀉則顏色不等。其臭異常。其瀉有時或一月半月旬日一番。自瀉自止。名爲疳積釀瀉。先以當歸散。加三稜。陳皮水。薑煎服。次投烏犀圓。沉香檳榔圓。及化癖圓。蘆薈圓。沒石子圓。兒最小者。難下圓子。止投三稜散。快膈湯。自然痊瘳。若瀉或痢。色青甚而淡黃夾白。寒多熱少。此陰邪勝陽。宜用守中湯。胃苓湯與服。扶表救裏。方進當歸散。加陳皮。紫蘇水。薑糯米煎服。亦宜和解。理中湯。清米飲。空心調服。溫脾去溼。益氣清神。寒甚者。理中湯內加熟附子。水薑棗煎服。次投南星。腹皮飲。水薑煎服。和脾胃。去陰邪。若瀉或泄。色青淡而有沫糞稠。熱多寒少。亦致面黃肌瘦。煩躁不寧。宜以咀咀五苓散。加薏苡

仁車前子。水薑煎服。解散餘邪。仍用茵陳蒿、梔子仁煎湯。調細末五苓散溫服。退黃色。消陽毒。及當歸散。水薑棗煎投。或服萬安飲、四神散。

赤白痢

赤白之痢。世人莫不曰赤爲陽爲熱。白爲陰爲冷。或曰無積不成痢。至於調治。若以冷熱之劑互進。或投去積之藥。必難取效。不究其原。何由可療。且四時八風之中人。五運六氣之相勝。夏秋人多痢疾。內經曰。春傷於風。夏生飧泄。至真要大論曰。少陽在泉。火淫所勝。民病注泄。赤白。其可拘於無積不成痢之說。若專以積爲論。豈一歲之中。獨於夏秋人皆有積。春冬不然。蓋風邪入胃。木能勝土。不爲暴下。則成痢疾。赤白交雜。此爲陰陽不分。法當分正陰陽。五苓散以導其逆。理中湯以溫其胃。使色歸一。然後施治。若一分之後。仍赤白同下。則當究其所患之因。若先白後赤。乃內傷生冷。外失於蓋。由元氣感於暑熱。治法先救其裏。次解暑毒。若先赤後白。乃先傷熱而後失蓋感冷。先宜解熱。後治其痢。有夾熱而痢者。則下純鮮血。此風能動血。宜冷服黃連香薷散。川草散。以當歸散加醋炒蒸柏葉水。薑煎服。或羌活散加三和湯水。薑倉米煎。有人冷而痢者。則下純白凍。或白上有粉。

紅色。或似猪肝瘀血。皆爲陰證。蓋血得寒則凝。泣音故也。先用呶咀五苓散。加守中湯煎投。次以附子理中湯帶涼服。或固真湯。儻不辨其虛實冷熱。妄行施治。必致脾胃愈虛。不能乳食。成噤口痢者。則難療矣。又有裏急後重。蓋裏急爲陽。後重爲陰。未圍音前腹痛爲裏急。已圍後腹痛爲後重。故裏急者。大腸澀也。先以大順飲加寬氣飲和解。及羌活散。水薑倉米煎服。次下寬腸圓。後重者。爲氣虛。用呶咀五苓散加入人參。水薑煎服。併投香連圓。若二證俱作。前二圓子並進。或雙金飲。金粟圓亦效。然瀉痢二字。自是兩證。糞夾水來。多而順者。曰瀉。帶血凍白凍。來三五點而痛者。曰痢。輕重陰陽。於此而分。斯爲治法。有膿血交雜。經久不止。晝輕夜重。或晝夜頻數。食減痛多。並用萬金散。神效散主之。有五色痢者。乃因五藏蘊熱。日久不散。故有是證。蓋五藏受熱。榮衛不調。五穀不化。熏腐藏府。神氣昏沉。此候已危。最苦是腹中刺痛。兒小者無治法。蓋五色者。乃五藏之色。皆見於外。兒大者。可用局方三神圓。或小來復丹。以五苓散送下。或者可療。若投藥如故。不可爲也。又有風痢。多是黃褐色。與疳瀉頗同。但不臭爲異耳。此風毒停滯於脾。宜去脾經風毒。瀉黃散主之。若見赤白同下。久而不禁。小便澀少。痛熱並作。脣裂眼赤。

氣促心煩。坐臥不安。狂渴飲水。穀道傾陷。時復面容如妝。飲食不進者。難治。

腫證

此疾更多投五皮飲為好

原腫病之由。標本之疾。腎主元氣。天一之水生焉。肺主沖化。地四之金屬焉。腎為本而肺為標。皆至陰以積水。其為病也。腎者胃之關鍵。關鍵不利。樞機不轉。水乃不行。滲於脈絡皮膚。而為浮腫。當推究內外所因。而為施治。兒大者。憑脈以明虛實。古方有十種論證。短氣不得臥為心水。兩脇緊痛為肝水。大便鴨溏為肺水。四肢苦重為脾水。腰痛足冷為腎水。口苦咽乾為膽水。乍虛乍實為大腸水。腹急肢瘦為膀胱水。小便閉澀為胃水。小腹急滿為小腸水。然脈浮為風為虛。沉伏為水病。沉則脈絡虛。伏則小便難。即為正水。脾脈虛大。多作脾腫。因循不給。乃成水腫。蓋脾屬土。喜燥而惡溼。常感溼氣。溼喜傷脾。血化為水。土敗不能制水。則停蓄不行。留滯皮膚。故作浮腫。初得病時。見眼胞早晨浮突。至午後稍消。以羌活散疏解。次醒脾散主之。及間投南星腹皮散。其脾冷困。則燥以草果。縮砂之類。然此證夏與秋冬治之頗易。惟春不然。蓋四時之水。無如春水泛溢。兼肝木旺而脾土受剋。不能受水。所以難療。進退不常。須徐徐調理取效。若脾熱而困。又以藥燥之。雖

火能生土。亦可勝水。奈何燥之太過。土不敵火。則熱愈甚。而不食發熱煩渴。醫者又進之以燥劑。由此而面目轉浮。致脾敗而手足背皆腫。蓋手足背與臍凸。音即脾之外候。有未經發表。遽用下藥。以瀉之。則一瀉而腫消。乃云得瀉之力。殊不知脾愈瀉而愈虛。不逾旬月。其腫如初。此世人只知瀉腫爲最。而不求其十補勿一瀉之論。法當隨四時用藥。解表通利小便。春以七寶散。加麻黃、桂枝、赤茯苓、水、薑、蔥煎服。夏以五苓散。加麻黃、車前子、薏苡仁。秋以清肺飲。加羌活、細辛、商陸。冬以沖和飲。加白朮、生川烏、赤小豆。已上三藥。並用水、薑、蔥煎投。滋潤救脾。導水湯劑。滲泄之。乃爲良法。更以香陸、胃苓、圓、赤蒼飲。頻服。自然獲安。蓋內經云。開鬼門。發也。潔淨府。利小。平治權衡。以平爲期。此之謂也。有初腫便覺疲嗽氣喘。小水不通。正屬肺腎所主。先服解表散。次以三白散爲治。餘證輕者。投商陸圓。故經曰。其高者因而越之。卽湧吐之義也。下者引而竭之。卽滲泄之義也。凡得此病。非一朝一夕之故。不可以孟浪之藥求其速效。以致虛脫。如癒後再感外風。滿面虛浮。用排風湯和解。仍服前救脾湯劑。免致反復。飲食之忌。惟鹽醬蠶鮓溼麵。皆味鹹能溢水者。併其他生冷毒物。亦宜戒之。重則半載。輕者三月。須脾胃平復。腫消氣實。

然後於飲食中。旋以燒鹽少投。則其疾自不再作。故劉氏曰。治腫非易。補養尤難。所忌者切須詳審。有經久不消者。下濬川圓卽效。

疳證

小兒疳證。其各有五。心、肝、脾、肺、腎是也。詳析於後。齧_五牙舒舌。舌上生瘡。愛飲冷水。脣紅面赤。喜伏眠於地。名曰心疳。目生眵糞。髮際左臉多青。或白睛微黃。瀉痢夾水。或如苔色。名曰肝疳。愛喫泥土冷物。飲無度。身面俱黃。髮稀作穗。頭大項小。腹脹脚弱。間或瀉瀉。肌瘦目慢。晝涼夜熱。不思乳食。名曰脾疳。鼻下赤爛。手足枯細。口有腥氣。或作喘嗽。右頤_白。名曰肺疳。兩耳內外生瘡。脚如鶴膝。頭縫不合。或未能行。牙齒生遲。其縫臭爛。傳作走馬疳之類。名曰腎疳。大抵疳之爲病。皆因過餐飲食。於脾家一藏有積不治。傳之餘藏而成。五疳之疾。若脾家病去。則餘藏皆安。苟失其治。日久必有傳變。然脾家病宜蘆薈圓。沉香檳榔圓。或水晶丹。烏犀圓。更察虛實療之。有蟲者投使君子圓。化蟲飲。如心腹痛。吐清水。蟲自下。多投二聖圓。諸疳證皆宜用局方五疳保童圓。或萬應圓。常服化積治疳。仍各投本臟調理之劑。寧心用茯神湯。調肝用耆歸湯。調脾用參苓白朮散。補

肺用補肺散。補腎用調元散。庶各得其宜。則前證不致再作。

走馬疳

凡得此候。多因氣虛受寒。及有宿滯。留而不去。積溫成熱。虛熱之氣上蒸。或食甜酸鹹膩之物。而脾雖喜甘。積滯日久。蘊熱上熏於口。致齒焦黑爛。間出清血。血聚成膿。膿臭成蟲。侵蝕齦口齒。甚致頰頰穿破。乳食不便。面色光浮。氣喘熱作。名走馬疳。治之之法。先去積熱。用當歸散合三稜散。水薑棗煎服。次投蘆薈圓。玉露散。及以溫鹽水灌嗽。或軟鷄翎蘸鹽水拂洗。略拭乾。仍以燒鹽散。內金散。密陀僧散。傅之。若經久不瘡者。傅於脣之上下。乃成崩砂證。或穴發滿頰。齒落骨露。飲食減少。氣促痰鳴。必致危矣。

脫肛

脈訣曰。大腸共肺爲傳送。蓋肺與大腸爲表裏。肛者大腸之門。肺實熱則閉結不通。肺虛寒則腸頭出露。有因痢久。裏急後重。努力肛開。爲外風所吹。或伏暑作瀉。腸滑不禁。或稟賦怯弱。易於感冷。亦致大腸虛脫。凡小兒所患瀉痢。皆因暑溼風熱乘脾胃虛而得。蓋風屬木。木勝則制土。土主脾胃。虛而受制。又溼喜傷脾。因虛

受溼。不能分別清濁。水穀交雜。則爲洞泄。洞泄既久。大腸亦虛。大腸乃手陽明燥金。而土虛不能生金。金氣既虛。則傳送之道亦虛。又爲風冷所襲。故肛門脫而不收。法宜補脾溫胃。使金得受母之益。而氣實。宜藿香飲。勻氣散。平胃散。主之。次則內投固腸之劑。用健脾飲。養藏湯。服餌。外以敷貼之法。用伏龍肝散。傳之。及草麻膏貼顛門。使引氣上。令其自收。如收盡。仍以水洗去其膏。又有邪熱積滯於大腸。未經疏滌。亦成此疾。其肛門色紅而軟。肺脈浮數。右手指紋紫見。身微有熱。時或煩躁。先投清肺飲。疏解。次用薄荷散。蟠龍散爲治。間服萬安飲。亦佳。

痢證

古人議痢最多。大概在乎觀形切脈。明辨陰陽。對證用藥。不致妄投湯劑爲上。陰痢者。因慢驚後去痰不盡。痰入心包而得。四肢逆冷。吐舌搖頭。口嚼白沫。牙關緊閉。但不甚驚搐作啼。面色或白或青。脈息沉微。故嬰孩寶書云。睡中吐舌更搖頭。正此之謂。治以固真湯。加日生湯同煎。調寬氣飲和解。陽痢者。因感驚風三次發搐。不與去風下痰。則再發。然三次者。非一日三次也。或一月。或一季。一發驚搐。必經三度。故曰三次。所謂驚風三發便爲痢。卽此義也。其病主身熱自汗。兩目

上視。嚼沫齧牙。手足掣搦。面色紅紫。六脈浮數。以百解散加五和湯。水煎疏解。次下痰。用水晶丹或半夏圓。胎癇者。因未產前。腹中被驚。或母食酸鹹過多。或爲七情所汨。致傷胎氣。兒生百日內有者是也。發時心不寧。面微黃。氣逆痰作。目上視。身反張。啼聲不出。先用參蘇飲和解。次以不驚丹。或琥珀抱龍圓間投。輕者可瘡。重則亦危。六畜癇者。發時作牛馬猪羊雞犬聲。便致僵仆。口吐涎沫。不省人事。張氏論此。蓋初發作羊犬聲者。咽喉爲風痰所梗。聲自如此。其理甚明。若言六畜者。特強名耳。凡得此證。宜多投疏風順氣化痰等劑。早爲治療。則免終身之患。食癇者。因中焦不和。飲食時偶被驚搖。則驚氣停滯中脘。食不剋化。淹留日久。氣鬱痰結。痰結則風熱生。由此致疾。陳氏有曰。結氣而成癇。此其義也。宜寬中順氣。去風痰。療驚積。和脾胃。則安矣。狂癇者。亦屬陽。難經云。重陽則狂。至長成小兒才發。時妄言不食而歌。甚則踰牆上屋。棄衣而走。或一日二日方醒。始因冒熱感風。風熱內蓄。久則風痰鬱結。上迷心包。蓋心乃神之舍。偶爲邪熱攻逼。則神失所守而昏亂。名曰狂癇。然心火肝木皆爲物。火不自炎。因風吹起煙焰。木不自動。因風撼而自動。搖風火合德。兩陽相搏。其熱可知。心藏神。肝主驚。因風生痰。以致

於此。醫者爲治療。既能清心平肝。疏風退熱。得病暫安。不與鎮心下痰。則痰涎結實。停滯心絡。病至再三。加以發搐頻數。難爲治療。必成廢人。有曰驚癇。卽與此證相類。若乍感真疾。日月稍近。法當解表散驚。及涼心肝。次下風痰。解表散驚百解散。涼心肝三解散。防風湯。下風痰水晶丹。碧玉圓。更須臨證參詳。乃無失也。

瘧疾

內經瘧論云。瘧瘧皆生於風。而發作有時何也。岐伯曰。夏傷於暑。秋必病瘧。謂腠理開而汗出。遇風。或得於澡浴。水氣舍於皮膚。因衛氣不守。邪氣並居。其疾始作。伸欠寒慄。腰背俱痛。骨節煩疼。寒去則內外皆熱。頭疼而渴。乃陰陽二氣交爭。虛實更作而然。陰氣獨勝則陽虛。故先寒戰慄。腰背頭項骨節皆痛。陽氣獨勝則陰虛。故先熱發。時不嗜食。善嘔頭疼腰痛。小便利。陰盛陽虛。則內外皆寒。陽盛陰虛。則內外俱熱。此外感六淫。或內傷七情。蘊積痰飲。病氣與衛氣並居。故病日作。衛氣晝行於陽。夜行於陰。得陽而外出。得陰而內薄。內薄五藏。六氣深入。不能與衛氣俱出。則間日而作。當衛氣所至。病氣所在。則發。在陽則熱。在陰則寒。經曰。亢則害。極乃反。俟陰陽各衰。衛氣與病氣相離。則病休。陰陽相搏。衛氣與病氣再集。

則病復。各隨其衛氣之所在。與所中邪氣相合而然也。先寒後熱者。先傷寒而後傷風。名曰寒瘧。先熱後寒者。先傷風而後傷寒。名曰溫瘧。但熱不寒者。名曰瘧。瘧身重寒熱。骨節痛。腹脹滿。自汗善嘔。名曰溼瘧。但寒不熱者。名曰牝瘧。蓋瘧之爲病。而證狀非一。故處方之制。隨其陰陽虛實。脈病證治。汗吐下溫。對證施劑。以平爲期。然百病中人。必因其正氣之虛。感受邪氣。留而不去。其病爲實。自表傳裏。先汗後下。古今不易。蓋治瘧之法。必須先表。用百解散。水薑葱煎投。次小柴胡湯。加桂。水薑棗煎服。以和解表裏之邪。自然作效。若表裏實。用當歸散。五和湯。或烏犀圓。六聖圓下之。勻氣散止補。後以藿香飲。加草果。良薑。水薑棗煎投。正胃氣。去寒邪。則自平復。如解表後。寒熱往來。以二仙飲。或三聖圓截之。寒熱既除。用平胃散。加苗香湯和勻。鹽湯空心調服。溫胃燥脾。進飲食。使中州之土既實。則外邪不戰而自屈。此爲明論。有寒多熱少。經久不愈。致脾胃弱。飲食減。神色慢。二薑圓主之。及清脾湯爲治。每見治瘧不明理者。多取草藥。擲水冷服。或露而投之。水傷脾胃。耗損真元。變證百出。或傳成浮腫。或轉作疳瀉。或變爲冷痢。致脾胃虛弱。飲食減少。因而不救者有之。且嬰孩嬌脆。何堪用以草藥服餌。爲醫爲父母。

者。切宜戒之。

癍證

嬰兒始生。稟賦未完。失於襁褓之不謹。乳哺之不節。外爲六淫侵襲。內因五藏氣虛。冷積久停於脾。不能剋化。結成癍塊。突於脇下。或左或右。俗曰龜癍。其疾皆因積滯蘊作。致有寒熱。或腹肚疼痛。或晝涼夜熱。治療之法。氣實者。亦須溫正胃氣。後用烏犀圓。或水晶丹下之。如過二三次。卽以稀粥略止。候所作形證消盡。方投補益之劑。氣虛者。先與調脾胃。固真元。神色稍正。飲食進多。如前法下之。若太虛甚。用三稜散。化癍圓漸消之。順適陰陽。以平爲期。然先補後瀉。行迎奪之法。則取去陳寒冷積。若面黃脣白。髮豎肌瘦。乃爲虛極。不可輕下。但徐徐用藥消化。調理爲上。若兒小者。更令乳母常服藿香飲。使藥從乳過。亦少助也。

疝證

按內經大奇論曰。腎脈大急沉。肝脈大急沉。皆爲疝證。心脈搏滑急爲心疝。肺脈沉搏爲肺疝。蓋疝者。寒氣結聚之所爲。故令臍腹絞痛者是也。又巢元方曰。諸疝者。陰氣積於內。復爲寒氣所傷。榮衛不調。二氣虛弱。風冷入腹而成。故肺經云。

肺用補肺散。補腎用調元散。庶各得其宜。則前證不致再作。

走馬疳

凡得此候。多因氣虛受寒。及有宿滯。留而不去。積溫成熱。虛熱之氣上蒸。或食甜酸鹹膩之物。而脾雖喜甘。積滯日久。蘊熱上熏於口。致齒焦黑爛。間出清血。血聚成膿。膿臭成蟲。侵蝕_音口齒。甚致頤頰穿破。乳食不便。面色光浮。氣喘熱作。名走馬疳。治之之法。先去積熱。用當歸散。合三稜散。水薑棗煎服。次投蘆薈圓。玉露飲。及以溫鹽水灌嗽。或軟鷄翎蘸鹽水拂洗。略拭乾。仍以燒鹽散。內金散。密陀僧散。傅之。若經久不瘡者。傅於脣之上下。乃成崩砂證。或穴發滿頤。齒落骨露。飲食減少。氣促痰鳴。必致危矣。

脫肛

脈訣曰。大腸共肺爲傳送。蓋肺與大腸爲表裏。肛者大腸之門。肺實熱則閉結不通。肺虛寒則腸頭出露。有因痢久。裏急後重。努力肛開。爲外風所吹。或伏暑作瀉。腸滑不禁。或稟賦怯弱。易於感冷。亦致大腸虛脫。凡小兒所患瀉痢。皆因暑溼風熱乘脾胃虛而得。蓋風屬木。木勝則制土。土主脾胃。虛而受制。又溼喜傷脾。因虛

受溼。不能分別清濁。水穀交雜。則爲洞泄。洞泄既久。大腸亦虛。大腸乃手陽明燥金。而土虛不能生金。金氣既虛。則傳送之道亦虛。又爲風冷所襲。故肛門脫而不收。法宜補脾溫胃。使金得受母之益。而氣實。宜藿香飲。勻氣散。平胃散。主之。次則內投固腸之劑。用健脾飲。養藏湯。服餌。外以敷貼之法。用伏龍肝散。傳之。及草麻膏貼顛門。使引氣上。令其自收。如收盡。仍以水洗去其膏。又有邪熱積滯於大腸。未經疏滌。亦成此疾。其肛門色紅而軟。肺脈浮數。右手指紋紫見。身微有熱。時或煩躁。先投清肺飲。疏解。次用薄荷散。蟠龍散爲治。間服萬安飲。亦佳。

痢證

古人議痢最多。大概在乎觀形切脈。明辨陰陽。對證用藥。不致妄投湯劑爲上。陰痢者。因慢驚後去痰不盡。痰入心包而得。四肢逆冷。吐舌搖頭。口嚼白沫。牙關緊閉。但不甚驚搐作啼。面色或白或赤。脈息沉微。故嬰孩寶書云。睡中吐舌更搖頭。正此之謂。治以固真湯。加日生湯同煎。調寬氣飲和解。陽痢者。因感驚風三次發搐。不與去風下痰。則再發。然三次者。非一日三次也。或一月。或一季。一發驚搐。必經三度。故曰三次。所謂驚風三發便爲痢。卽此義也。其病主身熱自汗。兩目

上視。嚼沫齧牙。手足掣搦。面色紅紫。六脈浮數。以百解散加五和湯。水煎疏解。次下痰。用水晶丹或半夏圓。胎癇者。因未產前。腹中被驚。或母食酸鹹過多。或爲七情所汨。致傷胎氣。兒生百日內有者是也。發時心不寧。面微黃。氣逆痰作。目上視。身反張。啼聲不出。先用參蘇飲和解。次以不驚丹。或琥珀抱龍圓間投。輕者可瘳。重則亦危。六畜癇者。發時作牛馬猪羊雞犬聲。便致僵仆。口吐涎沫。不省人事。張氏論此。蓋初發作羊犬聲者。咽喉爲風痰所梗。聲自如此。其理甚明。若言六畜者。特強名耳。凡得此證。宜多投疏風順氣化痰等劑。早爲治療。則免終身之患。食癇者。因中焦不和。飲食時偶被驚搖。則驚氣停滯中脘。食不剋化。淹留日久。氣鬱痰結。痰結則風熱生。由此致疾。陳氏有曰。結氣而成癇。此其義也。宜寬中順氣。去風痰。療驚積。和脾胃。則安矣。狂癇者。亦屬陽難經云。重陽則狂。至長成小兒才發。時妄言不食而歌。甚則踰牆上屋。棄衣而走。或一日二日方醒。始因冒熱感風。風熱內蓄。久則風痰鬱結。上迷心包。蓋心乃神之舍。偶爲邪熱攻逼。則神失所守而昏亂。名曰狂癇。然心火肝木皆爲物。火不自炎。因風吹起煙焰。木不自動。因風撼而自動。搖風火合德。兩陽相搏。其熱可知。心藏神。肝主驚。因風生痰。以致

於此。醫者爲治療。既能清心平肝。疏風退熱。得病暫安。不與鎮心下痰。則痰涎結實。停滯心絡。病至再三。加以發搐頻數。難爲治療。必成廢人。有曰驚癇。卽與此證相類。若乍感真疾。日月稍近。法當解表散驚。及涼心肝。次下風痰。解表散驚百解散。涼心肝三解散。防風湯。下風痰水晶丹。碧玉圓。更須臨證參詳。乃無失也。

瘧疾

內經瘧論云。瘧瘧皆生於風。而發作有時何也。岐伯曰。夏傷於暑。秋必病瘧。謂腠理開而汗出。遇風。或得於燥浴。水氣舍於皮膚。因衛氣不守。邪氣並居。其疾始作。伸欠寒慄。腰背俱痛。骨節煩疼。寒去則內外皆熱。頭疼而渴。乃陰陽二氣交爭。虛實更作而然。陰氣獨勝則陽虛。故先寒戰慄。腰背頭項骨節皆痛。陽氣獨勝則陰虛。故先熱發。時不嗜食。善嘔。頭疼腰痛。小便不利。陰盛陽虛。則內外皆寒。陽盛陰虛。則內外俱熱。此外感六淫。或內傷七情。蘊積痰飲。病氣與衛氣並居。故病日作。衛氣晝行於陽。夜行於陰。得陽而外出。得陰而內薄。內薄五藏。六氣深入。不能與衛氣俱出。則間日而作。當衛氣所至。病氣所在。則發。在陽則熱。在陰則寒。經曰。亢則害。極乃反。俟陰陽各衰。衛氣與病氣相離。則病休。陰陽相搏。衛氣與病氣再集。

則病復。各隨其衛氣之所在。與所中邪氣相合而然也。先寒後熱者。先傷寒而後傷風。名曰寒瘧。先熱後寒者。先傷風而後傷寒。名曰溫瘧。但熱不寒者。名曰瘧。身重寒熱。骨節痛。腹脹滿。自汗善嘔。名曰溼瘧。但寒不熱者。名曰牝瘧。蓋瘧之爲病。而證狀非一。故處方之制。隨其陰陽虛實。脈病證治。汗吐下溫。對證施劑。以平爲期。然百病中人。必因其正氣之虛。感受邪氣。留而不去。其病爲實。自表傳裏。先汗後下。古今不易。蓋治瘧之法。必須先表。用百解散。水薑。葱煎投。次小柴胡湯。加桂。水薑。棗煎服。以和解表裏之邪。自然作效。若表裏實。用當歸散。五和湯。或烏犀圓。六聖圓下之。勻氣散止補。後以藿香飲。加草果。良薑。水薑。棗煎投。正胃氣。去寒邪。則自平復。如解表後。寒熱往來。以二仙飲。或三聖圓截之。寒熱既除。用平胃散。加茴香湯和勻。鹽湯空心調服。溫胃燥脾。進飲食。使中州之土既實。則外邪不戰而自屈。此爲明論。有寒多熱少。經久不愈。致脾胃弱。飲食減。神色慢。二薑圓主之。及清脾湯爲治。每見治瘧不明理者。多取草藥。擲水冷服。或露而投之。水傷脾胃。耗損真元。變證百出。或傳成浮腫。或轉作疳瀉。或變爲冷痢。致脾胃虛弱。飲食減少。因而不救者有之。且嬰孩嬌脆。何堪用以草藥服餌。爲醫爲父母。

者。切宜戒之。

癖證

嬰兒始生。稟賦未完。失於襁褓之不謹。乳哺之不節。外爲六淫侵襲。內因五藏氣虛。冷積久停於脾。不能剋化。結成癖塊。突於脇下。或左或右。俗曰龜癆。其疾皆因積滯蘊作。致有寒熱。或腹肚疼痛。或晝涼夜熱。治療之法。氣實者。亦須溫正胃氣。後用烏犀圓。或水晶丹下之。如過二三次。卽以稀粥略止。候所作形證消盡。方投補益之劑。氣虛者。先與調脾胃。固真元。神色稍正。飲食進多。如前法下之。若太虛甚。用三稜散。化癖圓。漸消之。順適陰陽。以平爲期。然先補後瀉。行迎奪之法。則取去陳寒冷積。若面黃脣白。髮豎肌瘦。乃爲虛極。不可輕下。但徐徐用藥消化。調理爲上。若兒小者。更令乳母常服麝香飲。使藥從乳過。亦少助也。

疝證

按內經大奇論曰。腎脈大急沉。肝脈大急沉。皆爲疝證。心脈搏滑急。爲心疝。肺脈沉搏。爲肺疝。蓋疝者。寒氣結聚之所爲。故令臍腹絞痛者是也。又巢元方曰。諸疝者。陰氣積於內。復爲寒氣所傷。榮衛不調。二氣虛弱。風冷入腹而成。故肺經云。

急者緊也。緊則爲寒。爲實。爲痛。血爲寒泣。音則爲癢。氣爲寒聚則爲疝。皆因本藏氣虛。外感於寒溼。內傷於生冷。遂使臍腹絞刺。激搏而痛。無有定處。倉卒之際。不堪忍者。謂之疝也。並宜先用五苓散。沸湯調服。和解。輕則但以白芍藥湯。烏梅散。鉤藤膏爲治。重者。金茱圓。散氣圓。未有不瘳。音愈也。

龜胸

嘗論此候。因風痰停飲。聚積心胸。再感風熱。肺爲諸藏華蓋。居於膈上。水氣泛溢。則肺爲之浮。日久凝而爲痰。停滯心胸。兼以風熱內發。其外證。唇紅面赤。咳嗽喘促。致胸骨高如覆掌。名曰龜胸。治法。寬肺化痰利膈。以除肺經痰飲。先用五苓散和寬氣飲。入薑汁。葱湯調服。次清肺飲。雄黃散。碧玉圓。如意膏爲治。若投前藥。愈而復作。傳變。目睛直視。痰涎上壅。兼以發搐。則難治矣。龜背者。蓋初生嬰孩。未滿半周。強令坐早。客風吹著背脊。傳入於髓。故令背高如龜之狀。名曰龜背。終成痼疾。何以爲治。

驚丹

嬰孩生後。百日之內。半歲以上。忽兩眼胞紅暈微起。面帶青黯色。向夜煩啼。或臉

如臙脂。此伏熱在內。亦有臉不紅者。始因居胎之時。母受重驚。驚邪傷胎。遞相傳襲。降生之後。復受熱毒。或再有驚。有驚則有熱。熱氣內蘊。形發於外。初發時散生滿面。狀如水豆。脚微紅而不壯。出沒休息無定。次到頸項。赤如硃砂。名爲驚丹。用四聖散先洗其目。次百解散加五和湯同煎。與解驚熱丹毒牛蒡湯當歸散三解散。黃芩四物湯皆可爲治。如驚丹發至胸乳間。微有痰喘作搐。急宜宣熱拔毒。免致內流。爲害不淺。五和湯加升麻。生乾地黃水。薑燈心煎服。則自消除。仍用前數藥調治。不生他證。或投萬安飲。

瘡疹斑後

瘡疹之作。始自嬰孩生時。啼聲一出。則嚙下口中穢濁。蓄之在胃。因氣運變遷。主客勝復。邪氣鬱發。與元受穢濁激搏。而形於肌肉皮膚之外。初發有類傷寒。不拘四時。皆有此候。經云。春夏爲順。秋冬爲逆。蓋春夏則陽氣布。玄府開。人之氣血流暢。邪毒易出。秋冬則寒氣勝。而水冰地凍。人之氣血凝泣。故難出也。小兒所患此證。輕重不等。命名亦異。輕者如麻。俗言麻子。重者如豆。謂之豆瘡。重而又重。密如浮蠖。俗曰赤蠖。既傳及此。已是危急。醫與病家。切宜詳審。故出各有其名。心爲

紅點。肝爲水疱。肺爲膿疱。脾主結痂。惟腎居下。不受穢濁。所以獨無其證。若見瘡色黑陷。乃毒氣入腎。急投麝香人齒散救之。及一七金尤妙。此言五藏各有所主。及其發也。始焉壯熱腰痛咳嗽。面目皆赤。或乍涼乍熱。兩足微冷。有驚搐譫語者。有腹痛欲吐者。有頭痛煩渴者。六脈緊數。耳尻音俱冷。呵欠頓悶。至五六日。身出紅點。紅點成水疱。水疱成膿疱。膿疱之後。結痂。痂則瘡音愈矣。此證才見。似是非。若同而異。疑貳之間。但以升麻湯加麻黃與之。發表及清肺飲。蓋肺主氣。王氏曰。豆瘡氣均則出快。故用之。仍不可過投。兼此疾首尾無下法。若下之必損脾胃。然萬物得土氣溫暖而生。下之則脾土虛冷。氣血無自而盛。故豆瘡因脾胃虛冷。而氣血亦衰。遂有伏陷之變。又內經云。諸痛癢瘡瘍。皆屬於心。雖各藏形證不同。而心實爲之主。心主血。因其血熱在裏。再遇六淫侵襲。兩相攻擊。自內而形於外。則發之爲豆瘡。未有不先見其血點。而後結膿疱。故其原出於心。或痛或癢。以分虛實。經曰。諸痛爲實。諸癢爲虛。切宜知此。不可妄投藥餌。若一出便齊者爲重。不齊者爲輕。以中和湯通順表裏。及耆歸湯催脹而已。既出不多。發之亦少。此爲本疏。不宜再發。有大熱者。以導赤葛散利小府。微熱者用咬咀五苓散。加人參甘草水。

煎欲出不見者快斑飲久而不結痂死者是表有熱。或蒸於皮膚。可用升麻湯加黃芩以解之。若豆瘡見形。有渴瀉吐痢。用陳氏木香散。異功散。豆蔻圓治之。有虛癢者。多服耆歸湯及中和湯。已上豆瘡。大約施治。不過如此。其餘雜證。預防之法。胡大卿陳文秀二公之書。該載詳備。或問升麻湯治豆瘡已發未發。皆可服。何如。愚曰。予每致思及此。屢見病家不循次序。不問可否。以爲常服。自取危困。良可嘆也。殊不知古人立方。深有意焉。但後學不能究心造微。以爲一定之方。誤人多矣。蓋未發之先可服。使其解利肌膚。自然出快。已發之際。便不可服。爲其藥性差涼。凝滯氣血。毒不能出。反以爲害。結痂之後。可服。使其解散餘毒。氣順血和。免有豆癰之患。或問豆瘡倒靨。有用麝香。人齒散作效。亦有不效者。何。予曰。其說有二。若見黑陷。毒氣入腎。腎色主黑。蓋齒者腎之餘。用麝香之法。引導歸腎。而發出其毒。故效耳。及用一匕金救之。其效尤速。若見癢塌。灰白色。脾虛所致。多投陳氏異功散。取效。已上二證。各有主治。不可執一切。須詳審。或問豆瘡投紫草。飲固好。亦有不服者。曾子曰。處方之妙。在乎君臣佐使。後之醫者。不諳古法。令病家自取紫草。修合品味。或爲湯使入諸藥內。彼欲速效。而倍用恣飲。按本草云。紫草性

寒。小兒脾氣實者。或爾偶中。脾氣虛者。反以爲害。如戴氏方名紫草茸飲。後人訛傳此方。缺其茸字。蓋茸者。春月纔生之芽。色澤而紅嫩。得陽氣之使然。以類觸類。所以用發豆瘡故效。但罕得嫩茸。後以紫草頭僅半寸者代之。卽與茸初萌處同類。今人不達其理。遽全用之。有脾虛者服之作瀉。瘡陷不救者多。予嘗目擊其事。深爲可傷。凡治豆瘡。不可不明此理。蓋戴氏紫草茸飲。內有人參、黃耆、當歸、白芍藥佐之。故用驗矣。或問。病豆瘡者。忌食粥然歟。予曰。此俗忌也。病家恐患者。瘡爛如粥。故忌之。其實不然。毒氣自裏達表。滿口糜潰。乳食不能進。非以粥飲飼之。則脾土虛而豆瘡陷。必致不救。深可痛惜。予嘗調治此證。始終與粥全活多矣。蓋粥者以米爲之。何毒之有。爲父母者。切宜知此。或問。禁食葷腥者何。予曰。此亦世俗拘執之論。天以五氣生萬物。人以五味養五藏。豆瘡之萌。始因藏受邪毒。感時氣而鬱發。自內達外。榮衛俱虛。裏氣亦弱。必藉五味葷腥。以爲滋補。使氣順血和。自然出快。但不可食動風發熱之物。以助毒氣。亢則必害。或問。豆瘡後與產後相類何如。予曰。蓋產後之婦。血脈傷損。榮衛大虛。敗血未盡。偶六淫侵襲。便致急證。亦有不救者。故郭氏著產後二十一論。正爲此設。且小兒豆瘡。一身精血皆

形於外。熱作脹痛。叫聲不已。耗損真炁。結痂後表裏俱虛。榮衛亦弱。餘毒未解。失於調護。暴感邪氣。多致夭傷。與產後傳變何異。在父母者。儻不究心。及此。悔將噬臍。爲之晚矣。然有瘡少氣實。飲食如故。又不拘以此論。醫者宜審之。切勿例指爲虛也。凡豆瘡欲瘡音未瘡之間。傳變黑陷乾枯。咳嗽失音。吐瀉煩渴。渾身手足俱冷。睡則昏迷。飲食減少。及痰多氣促燥癢。皆爲不治。醫者宜察之。世言麻子者。亦疹毒也。經曰。疹屬於脾。胃爲脾之府。有疾則同矣。疹毒乃天行氣運變遷之使然。亦隨天地乖戾之氣而受病。故曰時氣。不拘長幼。身發大熱。咳嗽連聲。腰痛口乾。足冷。有寒熱腹痛者。有頭疼自痢者。有煩熱驚搐者。此熱使然也。但外證形於身體頭面。如蚊蚤所螫。五結發紅點而起頭。其瘡脚有紫黯色爲異耳。蓋因四時有非節之氣。著人肌膚。留而不去。再經外邪鬱蒸。與元受蘊熱相觸。毒氣遂發於外。形而爲疹。若熱太甚。則爲癰爲疽。爲赤紫丹瘤。傳入藏府。治之稍緩。亦致害人。有胎受穢液。熱毒蘊蓄於肺胃。因感時氣而發者。並以清肺飲疏表。及百解散去桂加黃連水煎。或餘毒之氣上蒸。口齒糜爛作臭。飲食不便。以當歸散加七寶散。入鹽水薑煎服。併牛蒡湯疏風化毒。若疹出盛時。頭痛肚熱。神思煩悶。麥門冬

湯主之。如夏月得此證者。煩躁發渴。小便少。神不安。投卻暑丹即效。有毒氣甚者。滿口成瘡。目赤腫痛。失音惡心。此餘毒在肺胃之間未解。致肺胃俱虛。肺虛則語聲不全。胃虛則飲食不納。急宜早治。若氣促心煩驚悸者。病必致危矣。世言此證有溫毒發斑。有胃爛發斑。若溫毒發斑。其癰疹如錦紋片。出於兩腋之下。蓋兩腋者。氣之道路。故蘊毒隨氣之道路而先出。其疾咳嗽煩悶。或嘔清水。此因冬時感冒寒毒。停於肌肉之間。至春陽氣發動。而形於外。名爲溫毒發斑。以百解散。牛蒡湯。及當歸散加陳皮。黃連爲治。胃爛發斑。初因傷寒下早。熱毒乘虛入裏。及當下而不下。亦致熱毒內蒸於胃。胃受熱毒。則發出於皮膚。斑之赤者可療。黑者十死一生。治法亦同前議。活人書以玄參升麻湯。大青四物湯。化斑湯爲治。大人小兒。病同一體。用藥施治。無逾古法。但小方分劑。則輕少不等耳。此證更宜投拔毒飲。升脈湯。前豆瘡餘毒發見。皮膚潰爛。治用黃土散。

陰囊腫

巢元方論曰。諸筋會於陰器。邪客於厥陰少陰之經。與冷氣相搏。則陰囊腫痛而引縮。經中雖分四證。曰腸癰。氣癰。水癰。卵癰。然小兒患此。若治之不早。則成癩疾。

如腰曲腹痛。冷汗自出。而陰囊二子。弔縮入腹。痛止方出。名爲內弔。用烏梅散。勻氣散。金菜圓。金鈴散爲治。有陰莖全縮不見。有陰囊光腫不痛。此因肝腎氣虛。宜以橘子仁煎湯。調下金鈴散。勻氣散。皆可投之。內經曰。癩瘡。皮膚脹者。陰亦盛。而脈脹不通。故曰癩瘡。由是觀之。乃陰氣盛。而致有此弔縮者。筋急也。筋遇寒。則引縮。遇熱則縱弛。故三因所用方法。以寬小腸氣。疏風爲治。然小兒此證。多因坐陰潤之地。感風溼而得。用當歸散加檳榔。蒼朮。水薑煎服。並青木香湯。鉤藤膏。外以立消散傅之。有外腎無故而膚囊腫大。不燥不痛。光亮如吹。此名氣虛所致。以勻氣散調治。三因方家韭子圓主之。一證外腎膚囊赤腫通明。及女兒陰戶腫脹。乃心熱之所傳。皆以木通散。導赤散爲治。或用薏苡仁煎湯。調五苓散。及以外消散傅之。併投天花散。用無灰酒煎下。不能飲者。水煎少入酒。同服亦好。

驚癱鶴膝

肝者。東方青龍木也。其動則應於風。病則主驚駭。諸熱引肝風。有風則生痰。有痰亦作搐。小兒驚風之際。手足動掣。當聽其自定。然後療之。免生異證。或父母見其病勢可畏。從而按伏之。豈知筋者肝之令也。臨病發時。若按束其手足。則筋不舒。

伸。遂至經絡爲風所閉。終爲廢人。內經曰。頑弱名緩風。疼重名溼痺。又有四肢痿痺不仁。致手足稍脹痛不堪忍者。此風毒之氣使然。故傳曰。風溼未疾是也。凡小兒心悸不常。及偏身腫痛。或手足不隨。此爲驚癱候也。若治之稍遲。至臂腕膝脛骨節之間。流結頑核。或膝大而腫。肉消骨露。如鶴膝之狀。或爲癱爲癰。此名鶴膝候也。已上形證。並宜發汗爲先。使腠理開通。則風熱可除。有溼亦去。用百解散和咬咀五苓散。倍加麻黃水。薑蔥煎服。微得汗爲度。或以麻黃湯發散尤佳。次防己湯。祛風散。及獨活湯。加桑寄生投服。並防風湯。或黑虎丹。作小圓子間服。使風不生。而痰不作。則其疾易瘳。音愈。若爲癱爲癰。疼重者。用黑牽牛半生半炒。略碾碎。煎無灰酒調下五苓散。以除流注之寒溼。則腫毒可消。如大府閉而不通。此是風熱內蘊。其右頤紅紫。及右手三部脈浮而實滑。宜五和湯。或當歸散。枳殼圓治之。其加減之法。尤在臨機審處。若泥一方。非良醫也。前證更宜間服排風湯。

癩癰

癩癰一證。先賢名曰九漏。究其所因似熱。稽考形狀非一。不過隨象命名。大概初發於頸項肌肉之間。未成膿者。從本引末。可使衰去。針之灸之。傳之。從其所因而

施療。然小兒幼弱。豈堪針灸。但以服餌塗貼之劑爲治。此疾多生於耳後及頸項兩旁。初發止是一枚。次必連生。大小十數。纏繞項下。累累如貫珠。逐箇先腫。作膿穿破。輕者可瘡。愈音重者難除。先穴漏膿。長歲不乾。謂之漏項。原其得病之初。自足三陽感受風熱。與血氣相搏而成。治以百解散加當歸散。水薑葱燈心煎服。次用玄參飲及牛蒡湯。木通散。內消圓。與之宣熱化毒。洗以櫛皮散。塗用白芨散。二香散。使氣順血行。膿乾汁盡。則自瘡矣。仍忌燥毒野味。其證不致再作。

五淋

巢氏病源曰。諸淋皆腎虛所致。腎與膀胱爲表裏。至水下入小腸。通於胞。行於陰而爲澀。腎氣通於陰。下流之道也。淋有五名。曰膏。曰冷。曰熱。曰血。曰石。各具於後。膏淋。見小便有油脂似膏。而浮於小便之上。此腎虛不能制其肥液而下行也。冷淋。先戰慄而後小便。此亦腎虛而下焦受冷。冷氣入胞。與正氣交爭。故小便澀而戰慄。熱淋。下焦有熱。熱氣傳於腎。流入於胞。其溺黃多而澀。間有鮮血同來者。血淋。熱之極也。心者血之主。外行經絡。內行藏府。熱盛則失其常道。心與小腸爲表裏。故下流而入於胞。則爲血淋。石淋。腎主水。水結則化爲石。腎爲熱

所乘。遇小便則莖中痛。不得流利。痛引小腹。則沙石從小便出。甚至塞痛。令人昏悶。偏身有汗。而後醒。此痛之使然。蓋五淋者。雖曰腎虛所致。然小腸爲受盛之府。氣通於膀胱。膀胱爲津液之府。氣通於腎。餘化下流而不通。皆曰腎氣不足。熱入膀胱。水道澀而不利。出入起數。臍腹急痛。蘊作有時。或如豆汁膏血。並以局方五淋散。下龍腦雞蘇圓。自然平瘡。音愈及香芎圓。補腎地黃圓。與之疏導補益爲上。有癰閉遺溺二證。與淋不同。內經宣明五氣篇曰。膀胱不利爲癰。不約爲遺溺。蓋癰者。乃內藏氣虛受熱。壅滯宣化不行。非澀非痛。但閉不通。腹肚緊滿。宜用咬咀五苓散。加木通。車前子煎服。遺溺者。乃心腎傳送失度。小腸膀胱關鍵不能約束。有睡夢而遺者。有不知而遺者。皆是下元虛冷所致。亦因稟受陽氣不足。用三因方家韭子圓治之。及參苓白朮散。補腎地黃圓。然此證法當實土以存水。乃免滲泄之患。所謂補腎不如補脾是也。平胃散倍加益智仁。剉碎水薑棗燒鹽煎。空心溫服。又有陰陽二閉證。陰閉者。爲冷溼乘虛入裏。因而不通。名曰陰閉。以白芍藥湯加南木香水煎服。及用炒鹽以絹帕兜令帶溫熨臍四圍。併投五苓散。入靈砂末。溫鹽湯空心調下。其效尤速。陽閉者。因暴熱所逼。澀而不通。名爲陽閉。以咬

咀五苓散。加車前子。燈心水煎服。及木通散。玉露飲。益元散。皆可用之。或貼薑豉餅於臍上取效。不拘陰陽二證。悉能療之。併投萬安飲。

腹痛

內經舉痛論。五藏卒然而痛者。何氣使然。岐伯曰。經脈流行不止。環周不休。寒氣入經則稽遲。泣音而不行。故卒然而痛。蓋小兒腹痛。有藏寒痛。鎖肚痛。盤腸內疝痛。積痛。癥瘕痛。疝痛。癰痛。疝腎痛。偏墜氣。寒疝痛。虻音蟲動痛。諸痛不同。其名亦異。故不可一概論之。藏寒痛議。附胎寒論後。鎖肚痛。一月內嬰孩。忽乳不下。咽。肚硬如石。赤如朱。撮口而哭。面青唇黑。手足口氣俱冷。是也。始因斷臍帶不緊。爲風冷所乘。證亦危急。以白芍藥湯。烏梅散。一字金投之。日久則難瘉。音更參考臍風證內議論。盤腸內疝痛。議在夜啼論中。積痛。腹中陰陰而痛。面黃不食。兒大者。口吐酸醜氣。先治積滯。後調脾胃。其痛自止。仍辨虛實和解治法。見前傷積論中。癥瘕痛。乃久積所致。亦能成疝。此皆榮衛俱虛。外則感受風寒。內則過傷乳食。停滯既久。不能剋化。故邪併於陰爲癥。陰則專靜凝而不移。邪併於陽爲瘕。假物象形動而不息。蓋此二證。若久而不治。亦成脾疝積。或兩脇間有塊如石。

接之則痛。不按則輕。或面黃肌瘦。肚硬而脹。及有青筋。晝涼夜熱。蒸潮無時。乳食減少。愛喫泥土。或大便釀瀉。痛則身冷如冰。法當調脾養胃。用醒脾散。參苓白朮散。磨積理疳。用化癖圓。三稜散。木香莪朮圓。治釀瀉。沒石子圓。沉香檳榔圓。然此積滯之疾。非匕劑可療。必須次第調理。則日久自然平復。疔痛者。始則腹內一小長塊。其硬如臂。從腰纏轉。或左或右。良久痛甚。則見於皮下。不妨乳食。其證先因有疾。表解未盡。遽爾下之太過。氣虛寒搏鬱結而成。法宜益氣理虛。用參苓白朮散。沉香檳榔圓。木香莪朮圓為治。或間投白芍藥湯。加入參。茯苓。水薑煎服。癖痛者。癥痕疔癖四證。大同小異。各有治法。惟癖證詳論在前。疔腎偏墜痛。論在陰囊腫證內。當理腎和氣。寒疝痛。即在疝證論中詳備。虯蟲動痛。口吐清水涎沫。或吐出蟲。痛不堪忍。其疾因食甘肥葷腥太早而得。故胃寒蟲動作痛。其蟲吐來。或生或死。兒小者此痛苦甚。亦致危難。先以理中湯加烏梅。水煎服。使胃暖不逆。次蘆薈圓。使君子圓。化蟲飲主之。有兒大者。面皁白而間黃色。肉食倍進。肌體消瘦。腹中時復作痛。此有血鼈虯蟲雜乎其間。以二聖圓下之。又有胃受極寒極熱。亦令蟲動。或微痛。或不痛。遽然吐出。法當安蟲為上。若以治蟲。反傷胃。

氣固不可也。因寒而動者。用理中湯加烏梅。水煎服。因熱而動者。用咬咀五苓散。亦加烏梅。水薑煎投。

丁奚

丁奚者。亦久積成疳之證。皆因飲食過傷於脾胃。脾胃虛。不能磨化飲食。飲食漸減。無以生其氣血。面白色慘。潮熱往來。腹大而多青筋。手足如筒。顛顛開解。頸項小而身黃瘦。先投萬應圓。次參苓白朮散。早晨一服。與養胃氣及醍醐散。進食。食後下烏犀圓三粒。至五粒。助脾化食。此卽用迎奪之法。間投醋脾散。沉香檳榔圓。木香莪朮圓。次第調理。有渴瀉腹痛。千金膏自好。若脾氣稍和。飲食漸進。再以化癖圓。快活圓常服。或用烏犀圓略下二三行。勻氣散止補。有寒熱往來。柴胡。飲主之。腹脹投南星腹皮飲。有餘熱。麥芽柳枝煎湯。調三解散。有蟲下。使君子圓。故斯疾得之。非一朝一夕。然施治之法。亦須漸漸令其平復。欲求速效。則爲難矣。凡雞酒羊麵魚鮓甘甜生冷毒物。宜忌之。哺露者。亦由乳哺不節。損於脾胃。脾胃損而飲食減。形容羸瘦。則藏府之氣不能宣通。時間有熱。謂之哺露。此候與丁奚相去不遠。但食多吐逆。藏氣虛冷。而泄瀉無度。糞中有蟲。治法同前。丁奚證藥。惟加

養藏湯服之。

口瘡

口瘡一證。形與名不同。故治法亦異。有發於未病之前。有生於已病之後。大抵此疾不拘肥瘦。有血氣盛者。又加將養過溫。或心脾二經有熱。或客熱在胃。熏逼上焦。而成其瘡。此爲實證。宜宣熱拔毒。使無炎熾。自然作效。可用當歸散。加升麻。乾葛。黃芩。水薑。葱。燈心煎服。及投牛蒡湯。拔毒飲。木通散。點以消黃散。若口內白爛。於舌上口外糜潰。於脣弦瘡少而大。不甚爲痛。常流清水。此因脾胃虛熱。上蒸內已先發。而後形於外。宜百解散。疏表。當歸散。水薑。棗煎服。和胃氣。理虛熱。次投牛蒡湯。三解散。塗以綠袍散。立效。飲黃金散。或投天竺黃散。地黃膏。若瘡生於口角。是脾有積熱。才開口則燥痛。飲食多難。甚至再有外風吹著。便覺折裂。微有清血。謂之燕吻瘡。治法同前藥餌。輕者用甌蓋上。炊流汁塗之。亦驗。有口脣下成小片赤爛。此因飲食膩汁。淋漓不潔。蓋以嬰兒皮肉脆嫩。浸漬成瘡。及有風熱乘之。名曰承漿瘡。又謂之疳蝕瘡。其所因者一也。治法同前證內藥劑。有無故口鼻糜潰。而不成瘡。或服涼劑。或塗末藥。不能療者。此各元焦。故叔和脈訣云。陰

數脾熱。並口臭。是脾家有虛熱。上攻於口。宜服同陽散。兒大者用黑錫丹。早食前新汲井水入鹽少許調勻送下。與正元氣及參苓白朮散調元散服之。以立效。飲黃金散。乾點潰爛處。或用蒸蜜同熟水調點舌上。令其自化。嚥下無妨。誠良法也。仍忌毒物。

諸瘡

內經曰。諸痛癢瘡瘍。皆屬心火。火鬱內發。致有斯疾。蓋心主乎血。血熱生風。熱鬱內甚。遞相傳襲。故火能生土。血注陽明。主肌肉。風熱與血熱相搏。發見皮膚。其名不一。有黃膿而白者。土生金。母歸子也。始生微癢而熱輕。腫痛潰爛為熱極。血凝化水。氣滯成膿。甚至寒熱作而飲食減。尤為可慮。宜宣泄風毒。涼心經。解胃熱。用當歸散。加黃連。升麻。乾葛。水薑。葱。燈心煎服。及三解散。牛蒡湯。木通散。間服。塗以四黃散。一抹金。若頭上散生成片。常常燥癢。毛髮稀少。有類白屑。此因積熱上攻。名曰禿瘡。瘡雖生於頭。世人只知以藥外傳得瘡。愈不逾旬月。其瘡又發。何為而然。蓋頭者諸陽所會之處。洪範五行。火曰炎上。熱毒上攻。兩陽相灼。故瘡生於頭。法當解陳莖音之積熱。導心經之煩燎。音了斯可矣。宜百解散。倍加五和湯。水薑

慈燈心煎服。次連牀散塗之。及四黃散亦好。有偏身糜潰成片。甚至煩躁。衣不可著。蓋因風火內鬱於陽明。流毒於外。名曰風熱瘡。用百解散。加五和湯。入何首烏、荆芥、白芷。水煎服。及牛蒡湯。當歸散。木通散。五黃湯。疏滌腸胃。解散風熱。其瘡自瘡。愈不致再生。外則塗以四黃散。或連牀散亦佳。若見滿頭連額有痂如癩。或成黃膿。即是驚風積熱。久滯在裏。致上熏於頭皮。名胎風瘡。俗曰甜瘡。亦以百解散先和表。次水晶丹去積疏風。或用烏犀圓與之寬利。勻氣散止補。然後塗以連牀散。四黃散。或投消毒飲。自然獲安。更隨稟賦虛實療之。應湯火瘡。先用羌活散發表。次以玄霜膏塗之。即效。

目疾

純陽之子。始生旬月。忽兩目俱紅。弦爛澀癢成翳。此因在胎。爲母感受風熱。傳於心肝而得。先以百解散。加當歸散。水薑燈心煎服。次導赤散。及牛蒡湯。加黃連。木賊。蟬殼。水煎服。自效。有熱極夾風。則目赤腫痛。晝夜不開。驚啼不已。先用九仙散。水薑葱煎投。次三解散。溫米泔水調下。及點以黃連膏。若豆瘡之後。眼生翳障。昏澀流淚。或浮腫不開。此豆瘡餘毒攻肝。投百解散。少加五和湯。水薑燈心煎

服。次用牛蒡湯解之。洗以黃金散。及多投柿煎散。有豆瘡後眼中成翳。或大或小。無非餘毒使然。亦用牛蒡湯及甘桔湯加蟬殼白蜜水煎服。次以金波散黃金散。無時頻洗。更詳虛實爲治。並羌活散。加薄荷。穀精草。白菊花。水。燈心。薑皮煎投。間以糖煎散服。若天行時證。暴赤腫痛。晝夜苦甚。久則昏矇。治法先以九仙散解表。次小柴胡湯去半夏。加大黃。薄荷。竹葉。生地黃。水煎服。併投草龍膽散。及點用黃連膏。貼以清涼膏。有孩兒胃氣表虛。脾氣實盛。眼胞赤腫。羞澀不開。遽投苦寒之劑。以退赤腫。反傷脾胃。不吐則瀉。或四肢微冷。復以溫藥調治。則目疾轉加。宜先用咬咀五苓散。水薑。燈心煎服。次投瀉黃散。自瘡愈。有心脾蘊熱。經久及肝受邪熱。致兩目羞明。眼胞浮腫。微有紫色。大府閉或流利。小便澀或通順。先以百解散發表。次投明目飲。自然平復。仍忌酒葷三五日。有小兒薄劣。多致塵埃入目。揩摩成腫。發熱作痛。啼哭不已。宜用辟塵膏治之立效。

丹毒

經云。赤紫丹瘤。皆心火內鬱而發。赤如丹砂。故名丹毒。心主血而火性熱。血熱相搏。陰滯於陽。即發丹毒。心虛寒則癢。心實熱則痛。自腹生出四肢者易治。自四肢

生入腹者難療。先用百解散表之。次以當歸散。加連翹。荆芥。水煎服。及牛蒡湯。加炒麻仁。研碎同煎。與宣熱拔毒。其次赤葛散。或初用化丹湯亦好。有身上發時。亦如前證。不甚燥癢。但見出浮於徧體。神昏不悅。名陰溼毒證。先以冲和飲加南木香水。薑煎服。次用當歸散。雄黃散。然此二證。不問赤白。若入腹入腎。多致爲害。不可輕視如常。自取困爾。

重舌

凡患此證。是脾與心肝屢受極熱。有所謂重舌。木舌。又謂之舌黃。鵝口。名雖異。皆熱也。大抵重舌生於舌下。挺露如舌。故曰重舌。然脾之絡脈係舌旁。肝之絡脈係舌本。心之絡脈係舌根。凡此三經。或爲溼熱風寒所中。則舌卷音捲縮。或舒長。或腫滿。宜消黃散。綠袍散主之。及當歸散。羌活散與服。木舌者。舌腫硬而妨乳食。此爲風熱盛也。以當歸瀉黃散。玉露飲。皆可服之。次消黃散。點擦舌上。蓋舌者心之官。心熱則生瘡破裂。肝壅則血出如湧。脾閉則白胎如雪。熱則腫滿。風則強木。口合不開。四肢壯熱。氣喘語澀。卽其候也。治法涼解上焦。及心肝脾三經邪熱。疏風化痰。初用百解散。加五和湯。水薑燈心煎投。次以牛蒡湯。同當歸散。入生地黃水。

薑煎服。鵝口者。始生嬰兒。自一月之外。至半歲已上。忽口內白屑滿舌。則上腭戴礙。狀如鵝口。開而不合。語聲不出。飲食多艱。亦因感受熱毒。停積於脾。故上蒸於舌。至極時。藥不能頓治。急以絹線扎針嘴。約以粟穀長。刺破舌上下小泡。如芥子大。見黃水清血微出。卽減。方投前證內藥同服。及以硃砂膏。地黃膏。調化塗點舌上。嚥下無妨。或消黃散亦好。

五軟

戴氏論五軟證。名曰胎怯。良由父精不足。母血素衰而得。誠哉是言。以愚推之。有因母血海久冷。用藥強補而孕者。有受胎而母多疾者。或其父好色貪酒。氣體虛弱。或年事已邁。而後見子。有日月不足而生者。或服墮胎之劑不去。而竟成孕者。徒爾耗傷真氣。苟或有生。譬諸陰地淺土之草。雖有發生。而暢茂者少。又如培植樹木。動搖其根。而成者鮮矣。由是論之。嬰孩怯弱。不耐寒暑。縱使成人。亦多有疾。爰自降生之後。精髓不充。筋骨痿弱。肌肉虛瘦。神色昏慢。才爲六淫所侵。便致頭項手足身軟。是名五軟。治法用調元散補腎。地黃圓漸次調養。日久乃安。若投藥不效。亦爲廢人。有小兒體肥容壯。不爲瘦瘁。忽然項軟傾倒。此名下竄。皆因肝

養藏湯服之。

口瘡

口瘡一證。形與名不同。故治法亦異。有發於未病之前。有生於已病之後。大抵此疾不拘肥瘦。有血氣盛者。又加將養過溫。或心脾二經有熱。或客熱在胃。熏逼上焦。而成其瘡。此爲實證。宜宣熱拔毒。使無炎熾。自然作效。可用當歸散。加升麻。乾葛。黃芩。水。薑。葱。燈心煎服。及投牛蒡湯。拔毒飲。木通散。點以消黃散。若口內白爛。於舌上口外糜潰。於脣弦瘡少而大。不甚爲痛。常流清水。此因脾胃虛熱。上蒸內已先發。而後形於外。宜百解散。疏表。當歸散。水。薑。棗煎服。和胃氣。理虛熱。次投牛蒡湯。三解散。塗以綠袍散。立效。飲黃金散。或投天竺黃散。地黃膏。若瘡生於口角。是脾有積熱。才開口則燥痛。飲食多難。甚至再有外風吹著。便覺折裂。微有清血。謂之燕吻瘡。治法同前藥餌。輕者用甌。蓋上炊流汁塗之。亦驗。有口脣下成小片赤爛。此因飲食膩汁。淋漓不潔。蓋以嬰兒皮肉脆嫩。浸漬成瘡。及有風熱乘之。名曰承漿瘡。又謂之疳蝕瘡。其所因者一也。治法同前證內藥劑。有無故口臭糜潰。而不成瘡。或服涼劑。或塗末藥。不能療者。此名元焦。故叔和脈訣云。陰

數脾熱。並口臭。是脾家有虛熱。上攻於口。宜服回陽散。兒犬者用黑錫丹。早食前新汲井水入鹽少許調勻送下。與正元氣。及參苓白朮散。調元散。服之以立效。飲黃金散。乾點潰爛處。或用蒸蜜同熟水調點舌上。令其自化。嚥下無妨。誠良法也。仍忌毒物。

諸瘡

內經曰。諸痛癢瘡瘍。皆屬心火。火鬱內發。致有斯疾。蓋心主乎血。血熱生風。熱鬱內甚。遞相傳襲。故火能生土。血注陽明。主肌肉。風熱與血熱相搏。發見皮膚。其各不一。有黃膿而白者。土生金。母歸子也。始生微癢而熱輕。腫痛潰爛為熱極。血凝化水。氣滯成膿。甚至寒熱作而飲食減。尤為可慮。宜宣泄風毒。涼心經。解胃熱。用當歸散。加黃連。升麻。乾葛。水薑。葱。燈心煎服。及三解散。牛蒡湯。木通散。間服。塗以四黃散。一抹金。若頭上散生成片。常常燥癢。毛髮稀少。有類白屑。此因積熱上攻。名曰禿瘡。瘡雖生於頭。世人只知以藥外傅得瘡。愈不逾旬月。其瘡又發。何為而然。蓋頭者諸陽所會之處。洪範五行。火曰炎上。熱毒上攻。兩陽相灼。故瘡生於頭。法當解陳莖。鱉之積熱。導心經之煩燥。了斯可矣。宜百解散。倍加五和湯水。薑

慈燈心煎服。次連牀散塗之。及四黃散亦好。有徧身糜潰成片。甚至煩躁。衣不可著。蓋因風火內鬱於陽明。流毒於外。名曰風熱瘡。用百解散。加五和湯。入何首烏。荆芥。白芷。水煎服。及牛蒡湯。當歸散。木通散。五黃湯。疏滌腸胃。解散風熱。其瘡自瘡。愈音不致再生。外則塗以四黃散。或連牀散亦佳。若見滿頭連額。有痂如癩。或成黃膿。即是驚風積熱。久滯在裏。致上熏於頭皮。名胎風瘡。俗曰甜瘡。亦以百解散先和表。次水晶丹去積疏風。或用烏犀圓與之。寬利。勻氣散止補。然後塗以連牀散。四黃散。或投消毒飲。自然獲安。更隨稟賦虛實療之。應湯火瘡。先用羌活散發表。次以玄霜膏塗之。即效。

目疾

純陽之子。始生旬月。忽兩目俱紅。弦爛澀癢成翳。此因在胎。爲母感受風熱。傳於心肝而得。先以百解散。加當歸散。水薑燈心煎服。次導赤散。及牛蒡湯。加黃連。木賊。蟬殼。水煎服。自效。有熱極夾風。則目赤腫痛。晝夜不開。驚啼不已。先用九仙散。水薑葱煎投。次三解散。溫米泔水調下。及點以黃連膏。若豆瘡之後。眼生翳障。昏澀流淚。或浮腫不開。此豆瘡餘毒攻肝。投百解散。少加五和湯。水薑燈心煎

服。次用牛蒡湯解之。洗以黃金散。及多投柿煎散。有豆瘡後眼中成翳。或大或小。無非餘毒使然。亦用牛蒡湯及甘桔湯。加蟬殼。白蜜。水煎服。次以金波散。黃金散。無時頻洗。更詳虛實爲治。並羌活散。加薄荷。穀精草。白菊花。水。燈心。薑皮煎投。間以糖煎散服。若天行時證。暴赤腫痛。晝夜甚久。則昏矇。治法先以九仙散解表。次小柴胡湯去半夏。加大黃。薄荷。竹葉。生地黃。水煎服。併投草龍膽散。及點用黃連膏。貼以清涼膏。有孩兒胃氣表虛。脾氣實盛。眼胞赤腫。羞澀不開。遽投苦寒之劑。以退赤腫。反傷脾胃。不吐則瀉。或四肢微冷。復以溫藥調治。則目疾轉加。宜先用咬咀五苓散。水。薑。燈心煎服。次投瀉黃散。自瘡。有音。有心脾蘊熱。經久。及肝受邪熱。致兩目羞明。眼胞浮腫。微有紫色。大府閉。或流利。小便澀。或通順。先以百解散發表。次投明目飲。自然平復。仍忌酒葷三五日。有小兒薄劣。多致塵埃入目。揩摩成腫。發熱作痛。啼哭不已。宜用辟塵膏治之。立效。

丹毒

經云。赤紫丹瘤。皆心火內鬱而發。赤如丹砂。故名丹毒。心主血而火性熱。血熱相搏。陰滯於陽。卽發丹毒。心虛寒則癢。心實熱則痛。自腹生出四肢者易治。自四肢

生入腹者難療。先用百解散表之。次以當歸散。加連翹、荆芥、水煎服。及牛蒡湯加炒麻仁。研碎同煎。與宣熱拔毒。其次赤葛散。或初用化丹湯亦好。有身上發時。亦如前證。不甚燥癢。但見出浮於徧體。神昏不悅。名陰溼毒證。先以沖和飲加南木香水。薑煎服。次用當歸散、雄黃散。然此二證。不問赤白。若入腹入腎。多致為害。不可輕視如常。自取困爾。

重舌

凡患此證。是脾與心肝屢受極熱。有所謂重舌、木舌。又謂之舌黃、鵝口。名雖異。皆熱也。大抵重舌生於舌下。挺露如舌。故曰重舌。然脾之絡脈係舌旁。肝之絡脈係舌本。心之絡脈係舌根。凡此三經。或為溼熱風寒所中。則舌卷_音縮。或舒長。或腫滿。宜消黃散、綠袍散主之。及當歸散、羌活散與服。木舌者。舌腫硬而妨乳食。此為風熱盛也。以當歸瀉黃散、玉露飲。皆可服之。次消黃散。點擦舌上。蓋舌者心之官。心熱則生瘡破裂。肝壅則血出如湧。脾閉則白胎如雪。熱則腫滿。風則強木。口合不開。四肢壯熱。氣喘語澀。即其候也。治法涼解上焦。及心肝脾三經邪熱。疏風化痰。初用百解散。加五和湯、水薑燈心煎投。次以牛蒡湯。同當歸散。入生地黃水。

薑煎服。鵝口者。始生嬰兒。自一月之外。至半歲已上。忽口內白屑滿舌。則上腭戴礙。狀如鵝口。開而不合。語聲不出。飲食多艱。亦因感受熱毒。停積於脾。故上蒸於舌。至極時藥不能頓治。急以絹線扎針嘴。約以粟穀長。刺破舌上下小泡。如芥子大。見黃水清血微出。卽減。方投前證內藥同服。及以硃砂膏。地黃膏。調化塗點舌上。嚥下無妨。或消黃散亦好。

五軟

戴氏論五軟證。名曰胎怯。良由父精不足。母血素衰而得。誠哉是言。以愚推之。有因母血海久冷。用藥強補而孕者。有受胎而母多疾者。或其父好色貪酒。氣體虛弱。或年事已邁。而後見子。有日月不足而生者。或服墮胎之劑不去。而竟成孕者。徒爾耗傷真氣。苟或有生。譬諸陰地淺土之草。雖有發生。而暢茂者少。又如培植樹木。動搖其根。而成者鮮矣。由是論之。嬰孩怯弱。不耐寒暑。縱使成人。亦多有疾。爰自降生之後。精髓不充。筋骨痿弱。肌肉虛瘦。神色昏慢。才爲六淫所侵。便致頭項手足身軟。是名五軟。治法用調元散補腎。地黃圓漸次調養。日久乃安。若投藥不效。亦爲廢人。有小兒體肥容壯。不爲瘦瘁。忽然項軟傾倒。此名下竄。皆因肝

腎氣虛。客邪侵襲風府。傳於筋骨。故成斯疾。蓋肝主乎筋。腎主乎骨。筋骨俱弱。則項軟垂下無力。又名天柱倒。與五軟相類不遠。治同前藥。有解顛一證。其顛縫不合。此腎氣不足。腎主骨而腦爲髓海。腎氣不足。則腦髓不滿。故不合也。名曰解顛。凡得此候。不及千日之內。間有數歲者。偶因他疾攻激。遂成廢人。若氣色精明。能飲食者。多服調元散。補腎地黃圓。旬月內頗見效者。次第調理。或有可治。若投藥後如故。亦難療矣。世言顛腫皆以爲熱。殊不知有陰陽二證。切宜詳辨。堅硬爲陰。紅軟爲陽。故嬰孩寶書云。寒氣上衝則牢鞦。鞦音鞦。熱氣上衝則柔軟。正此之謂。若陰證。以勻氣散。理中湯主之。陽證。用玉露飲。當歸散。防風湯爲治。有顛陷者。虛之極也。胃氣虛寒。則顛陷。慢驚中有之。胃寒脾困吐瀉者。爲虛極。急以金液丹。固真湯。及諸救元等藥治之。外則貼以烏附膏。有後枕陷者。其證尤重。治法以顛陷藥同。不效亦爲難療。此大虛極。百無一活耳。

諸汗

汗者。心之液。故叔和心臟歌曰。液汗通皮潤。聲言爽氣清。蓋人之氣血。猶水火也。平則寧。偏則病。陰虛陽必痿。則發熱自汗。陽虛陰必乘。則發厥自汗。小兒脾虛自

汗多出額上。沾黏人手。速救胃氣。全蠟觀音散。用薑棗煎湯調服。及沉香飲爲治。脾虛瀉自汗。徧身冷而出。有時遇瀉則無。瀉過卽有此候。大虛急當補脾。投益黃散。參苓白朮散。附子理中湯。肺虛自汗。其候右臉色多眊白。肺脈按之無力。蓋久因咳嗽。連聲不已。痰少不活。乃肺經虛氣上壅。致令汗出。宜用補肺散爲治。及以藿香飲調脾。此又益母救子之義也。慢驚自汗。徧體俱有。其冷如冰。此證已危。金液丹。固真湯主之。有實證自汗。外因感冒風邪發熱。無問昏醒。浸浸汗出。當救表解肌。用百解散。水煎服。或間投五苓散。溫白湯調下。有小兒無疾。睡中徧身汗出如水。覺而經久不乾。此名積證盜汗。脾冷所致。用三稜散。水煨薑煎服。次投益黃散。參苓白朮散。有時時冷汗微出。髮根如貫珠。面額上澣澣然。此爲驚汗證。宜鎮驚圓。或琥珀抱龍圓。及茯神湯。加麻黃根。水煎服取效。有夜睡中而汗自出者。名曰盜汗。巢元方論云。病因睡寐中而身體汗流。此因陽虛所致。久不已者。令人羸瘠枯瘦。心氣不足。津液妄出故也。用茯神湯。加黃耆。水薑棗燒鹽煎服。

黃證

凡黃病者。不可一概而論。標本不同。證治亦異。故嬰孩寶書云。黃病皆因胃熱所爲。由是觀之。乃脾胃氣虛。感受溼熱。鬱於腠理。溼於皮膚。蘊積成黃。熏發於外。故有此證。或脾胃虛弱。內因癥癖攻之而成。然疳瀉亦主皮黃髮豎。肚大青筋。肌肉消瘦。外無色澤。身必發黃。此又本於疳病而作。致有是證。治法若感溼熱而得。身黃如烟熏之色。以吶咀五苓散。加麻黃水薑煎投。汗之即瘳。或用茵陳蒿湯調下五苓散亦好。若得於疳癖者。其形如黃土相類。以醒脾散化癖圓。醒脾快胃。磨積理疳。胃氣既和。飲食倍進。運化精微。榮養百骸。灌漑藏府。五色各見於本部。精華乃形於面貌。其黃自除。有嬰孩生下。便見徧體俱黃。惟兩目弦厚如金色。身發壯熱。名爲胎黃。皆因未產之前。母受極熱而傳於胎。故有其證。乳母宜服生地黃湯。使藥入於乳。令兒飲之。必獲安矣。

失血

小兒九道出血。何爲而然。蓋人之所有者。血與氣也。心者血之主。肺者氣之主。氣主吮之。血主濡之。榮養百骸。灌漑孫脈。升降上下。榮衛諧和。自然順適。一或不調。疾由生矣。或外爲六淫所侵。內因七情所汨。氣乃留而不行。血乃壅而不濡。內外

抑鬱不能流注。以榮於身。必有妄動之患。叔和以芤脈爲失血之義。在七表屬陽。故也。陽明主乎多氣多血。未有不因熱而得。蓋氣血俱熱。毒鬱內逼。失其常度。是以妄行。有在襁褓患此證者。因非七情所傷。皆因乳母執著。不自寬釋。及啖辛辣之味。流於乳絡。兒飲之後。停滯不散。鬱蒸於內。亦能動血。又或居重幃暖閣。火氣熏逼。不令常見風日。積溫成熱。或極則湧泄。或吐或衄。或大小府亦多血來者。有氣出而邪熱乘之。則血不得循流。故道滲於諸經。亦生走失之證。其面晄白。脈沉微。血淡紫。口氣緩是也。又况嬰孩脆弱。易虛易實。因熱內攻。血隨氣行。或壅而上逆。或下而忘返。遂有吐血。衄血。瀉血。溺血之證。然而血不自動。因氣使之。風不自生。因熱而起。由是而論。可以類推。治法先明虛實。審得病源。隨經施治。藥餌無差。則不失其機要。實則小柴胡湯。加生地黃。絲茅根。或苦參亦好。並用水煎服。或咬咀五苓散。合五和湯。亦加絲茅根。苦參水煎。及投消毒飲。次用局方鷄蘇圓。三黃圓。間服。虛則理中湯。及人參芎歸湯。皆可服。間有醫者。見其血盛。以爲熱極。過投涼劑。遂使血寒。不能歸源而妄流。其色紫黯而凝滯。或成小片。當服薑附之劑。以溫之。自然流暢。毋致妄行爲佳。

不內外因

愚嘗論十歲以上小兒。飲酒啖熱。因熱動血。醉飽掬搦。胃腕吐血。甚至鼻口俱出。此非內因。外因之使然。乃自取過耳。治法先用百解散去桂。加黃連、水、葱、燈心煎服。疏利熱毒。次以小柴胡湯。加生地黃。或藕節水。薑煎下。定吐止血。其證自除。有長成小兒。偶因他物自傷。或戲走失足。觸損兩目。血脹腫痛。晝輕夜重。投速效。飲卽快。仍忌鷄酒、羊、麵三五日。庶易瘥也。有因飲食中誤吞骨鯁。吐不出。嚥不下。氣鬱生痰。痰裹其骨。內則作痛。外則浮腫。啼聲似啞。亦爲可慮。投備急散取效。有孩兒貪劣。因弄刀錐。或乘高墮地。致傷皮破血出。輕者先用桃花散傅之。仍服活血散以勻其血。毋使作膿。潰爛肌肉。有僅十五歲者。恃其血氣方剛。惟務馳騁。多致落馬墮車。或鬪很跌折肢體。一切損證。及毒蟲惡獸所傷。此又世醫各有專科。茲不繁引。

小兒常安

康節曰。與其病後求良藥。不若病前能自防。然致疾之始。必有所因。大凡幼穉。要其常安。在乎謹寒暄。節飲食。夫復何慮。每見嬰孩目有所覩。心有所欲。但不能

言惟啼泣而已。父母不察其詳。便謂飢渴。遽哺之以乳食。強之以雜味。不亦多乎。有數歲者。嬌惜太過。不問生冷。甘肥時果。聽其貪食。豈能知足。愛之實以害之。遂傷脾胃。不吐則瀉。或成疳積。浮腫。傳作異證。此則得於太飽之故。有遇清朝薄暮。偶見陰晦。便加以厚衣重衾。或近於紅爐烈焰。又且拘之懷抱。惟恐受冷。及長成者。所愛亦復如是。遂致積溫成熱。熱極生風。面赤脣紅。驚掣煩躁。變證多出。此乃失於太暖之故。殊不知忍一分飢。勝服調脾之劑。耐一分寒。不須發表之功。余故曰。孩提之童。食不可過傷。衣不可太厚。此安樂法也。爲父母者。切宜深省。

拾遺

論小方脈數差殊

宣和御醫戴克臣侍翰林曰。得叔和小兒脈訣印本二集。一本云。呼吸須將六至看。一本云。呼吸須將八至看。遂與內臺高識參詳字義。審察至數。就診五歲兒常脈。一息六至者是。八至者非。蓋因鏤板之際。誤去六字。上一點一畫。下與八字相類。致此訛傳。迨與卒以學易。作五十以學易之誤是也。嘗考默庵張氏脈訣亦云。

小兒常脈一息只多大人二至爲平。卽六至也。然一呼一吸之間。六至明矣。不然。姑俟來者考之。

辨藥病不相主對

鄭氏議古人醫書。不能無失。如錢氏治慢驚用括樓湯。與病不相主對。是謂之失。以愚觀之。所傳藥性。醫者之通曉。縱有前證。未必肯用。但不容不講明耳。殊不知錢氏旣沒之後。其書成於仕路。故人閻孝忠編集刊行。屢經異代。況錢氏儒醫。名聞朝野。施治之法。如珠在貫。未嘗少差。鄭氏所指慢驚誤用括樓湯。然本方下明載治肺熱涎盛。非爲慢驚之設。閻孝忠豈不知此。其或居官錄梓之日。失於參考。訛傳此劑。致有前議。今歷年已遠。卒難校正。若論五藏補瀉之妙。卻無瑕可指。及諸雜方。有功於世。不爲不多。直訣一書。信不誣矣。

治豆瘡不應疏利

張氏治小兒豆瘡法。若才覺是其證。便當疏利。又云。若才見出時。皆不可轉利。自立兩說。遂使後人多生疑惑。以何爲當。此張氏之論別矣。劉茂先曰。嬰孺豆瘡一證屬裏。首尾無下法。若下之則裏虛。毒氣何由而發泄。必至傳變。大要愛護。庶獲

全安。此茂先之言是也。然後學不可執一而取。當擇其善者而從之。亦有孩兒稟賦素實。豆瘡出見。徧體紅壯光澤。飲食快順無外證。自然效速。如俗用符水神藥。皆非良法。慎勿輕信耳。

評非時用附子大黃

前賢議曰。小兒證候。最易虛易實。要施治得宜。如隆暑戒用附子。隆寒戒用大黃。若用之。是實實虛虛。損不足而益有餘。此亦理到之論。以愚評之。拘一法者。不足以善兵。泥一說者。不足以善學。在乎通變而已。記嘗城居。侯自牧次子五歲。盛夏泄瀉。面垢煩渴。耳尻冷。驚悸多。診其心肝脈浮而洪大。脾肺脈虛而細數。予曰。面垢渴瀉。脈虛細數者。此中暑也。驚悸發熱。耳尻俱冷。心肝脈洪大者。此豆瘡欲作也。先服黃連香薷散。解利暑氣。續投陳氏異功散。再加附子。與之實脾。二日瀉止。三日瘡見。不旬餘而收全功。此隆暑用附子之效也。又本路總管楊侯幼子四歲。臘月得患驚風。搐掣。諸醫調治。前證俱解。但神昏不食。四肢微冷。已五日矣。前醫用醒脾助陽之藥。不一而足。余診六脈。獨脾脈沉滑。餘脈微緩。脾脈沉而滑者。此積蘊在脾。乃為脾約。當主大便秘不利。非陰厥也。彼曰。然。遂用瀉黃散。加大黃水煎。

併三服。大府一通。神氣清而飲食進。隨獲安可。此隆寒用大黃之功也。用藥如用兵。當用豈容自己。如五月渡瀘。雪夜平蔡。何待秋高馬肥而後爲之。若拘以四時取用。則兵藥無成功矣。愚不敏。歷醫五十餘載。凡調理旬月外嬰孩有病。所用寒涼溫燥之劑。必先明標本。辨虛實。然後處之以藥。屢試輒效。此特又在察色聽聲。心誠求之而得。非假脈取。三歲之上小兒。以色合脈。尤其爲妙。嘗用已驗活法。拯療諸疾。危而復安者多矣。姑以楊侯二家疑難之證。詳述於前。非矜能也。

明小兒四證八候

四證者。驚風痰熱是也。八候者。搐搦掣顫。反引竄視是也。搐者兩手伸縮。搦者十指開合。掣者勢如相撲。顫者頭偏不正。反者身仰向後。引者臂若開弓。竄者目直似怒。視者睛露不活。四證已備。八候生焉。四證旣無。八候安有。專是業者。可不究心及此。脈病證治。明有條類。大抵嬰孩得疾。如火燎原。撲之在微。不致有延蔓之盛。療病亦然。若初覺是受驚傷風發熱。便與疏解。何患有傳變之誤。所謂閭門之盜。不可以固留。逆流之水。不可以順決。此有疾在謹初之意也。

治暑風用藥次序

衡州萬戶張侯寓屯田日。長子三歲。六月得患。不語。手足痿縮。已經二旬。命余至彼。諸醫議論不一。觀外形面垢有熱。氣促流涎。口眼喎斜。不省人事。次則手足俱冷。而痿縮。身臂反張。診六脈沉。按而取。獨心肝脈虛而細數。餘脈緩弱。余曰。面垢色脈細數。此因中暑感風。前賢所謂暑風者是也。手足冷縮而不伸。或服涼劑太過。寒之使然。若手足溫。其效自速。愚以治法分陰陽。順乎氣。五苓散加寬氣。飲薑汁。沸湯調下三服。其證稍慢。次疏風和榮衛。百解散加荊芥。人參。當歸。水。薑煎投。隨以溫灰湯澆洗手足。藥一服。洗一次。至八九次。手足溫則血活。血活則筋舒。筋舒則手足運動如常。餘熱未除。消暑清心。飲主之。聲音不全。二聖散取效。調理惟用萬安飲。恰九日前證俱減。張侯曰。此子更生。端藉藥力。不敢忘也。因筆漫紀。後有是證。倣此活人。亦方便心矣。


為醫要量大見高

元貞乙未春。有王千戶來自廣西。安船河下。一子僅二周。患頭痛。服藥針灸不效。召以診視。色脈俱好。惟額上微紅。以手法驗之。大哭淚下。其母怒而見給。愚亦置之勿論。但究心以病為事。再問當間得證之因。千戶云。初在靜江。大風吹篷。撲著

便不快。予曰。此疾若令細揣頭上。便知其證。彼諾之。遂遣家人出外探親。其父自抱手揣之。果有小篾籤刺在顙上皮下。卽篋籤也。以酥油潤透。用摘鑷取出。痛定卽安。若初以匹婦饒舌而退。則及幼之心不溥矣。後之醫流。儻見嬰孩色脈好而病者。用藥不應。必有他故。宜究心推原。切勿拘泥可也。

遇諸塗救治驚風

大德戊戌夏。因幹出郭。至五里外。見有夫婦二人。抱子而哭於道旁。問之。答曰。入城探親。三歲孩兒。忽得驚風。不省人事。觀其面青黯色。目閉神昏。診之六脈全無。接太衝脈。沉而微。有。余顧曰。毋慮。此子可救。且左右竟無人家。遂於路側拾得破盃半邊。有薑小塊。細嚼捻汁。盃中。用五苓散。蘇合香丸。寬氣飲。澆水調和。灌下。十數次。方覺氣回。聲出。目開。自此蘇矣。漫附卷末。同志鑒之。



3.081
5
10(2)2

活幼心書


三

中國醫學大成第十集

兒科類甲
兒科叢刊之一

活
幼
心
書
下

上海大東書局印行



3 0472 7200 4

A254813

活幼心書

元 衡陽 曾世榮 德顯 編次

鄞縣 曹赤電 炳章 圈校



卷下 信效方

湯散門

湯類

日生湯

治吐瀉痢後。將傳慢驚慢脾。神昏脈弱。飲食不進。睡露揚睛。晝輕夜重。急宜投解。
北南星一兩剉破瓦器或東壁土 人參去蘆 冬瓜子仁
右件同醋煮少時 吹咀。每服二錢。水一盞半。薑三片。慢火煎七分。候溫無時少與緩服。投之
急必吐。

此後應諸湯散圓劑。所述服藥次序。不過言其大略。然煎煮調化。分數湯使下

引。法。尤在臨時量兒大小。以意加減。或多或少。隨病輕重用之。餘皆倣此。再不繁

牛蒡湯

主傷風發熱煩躁鼻塞氣喘。痰嗽驚啼。及諸瘡赤紫丹毒。咽喉腫痛。

牛蒡子三兩略少研碎

大黃半兩

防風去蘆

薄荷去老梗二兩

荆芥去根老根四兩

甘草錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

黃芩四物湯

理諸瘡丹毒。赤癩燥癢。

黃芩一兩

當歸酒洗

生乾地黄

赤芍藥

川芎四兩各半兩

何首烏皮去粗

草烏炮去

玄參三錢各

甘草六錢

薄荷葉二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

膏歸湯

治小兒稟賦素弱。豆瘡出不快者。及肝虛目視不明。

黃耆水一兩蜜

當歸酒洗焙乾

白芍藥

川芎三味各

甘草三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

枳實湯

主傷風傷寒。胸滿氣促。咳嗽不活。食多夾痰吐出。

枳實去粗剉片麥

赤茯苓去皮二味

甘草六錢

半夏七錢湯洗乾

桔梗七錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

小柴胡湯

治傷寒溫病。身熱惡風。胸滿脇痛。煩渴嘔噦。小便不利。大便秘硬。能解表裏邪毒。

痰嗽氣喘。

柴胡去蘆

半夏如前

黃芩

人參去蘆

甘草四味各

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。無時溫服。或去棗。加薄荷同煎。

防己湯

治感冒風溼之氣。失於解表。流注兩足疼痛。至兩膝浮腫。不能屈伸。傳成癱瘓。

防己去黑皮

麻黃去節存根。功全表裏。碎傷泡。德過焙乾。

薄荷桂去粗皮。三

赤芍藥一兩

赤茯苓去皮一兩

蒼朮米泔水浸一宿。去粗皮。德乾。用炒。至微黃色。一兩。

甘草炙半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。空心熱服。或入薤白同煎。

防風湯

治急驚後。餘熱未退。時復手足搐掣。心悸不寧。及風邪中入肺經。兩目視人。開眵不帶。

防風去蘆

川芎

大黃

白芷

黃芩

甘草六味各

細辛去葉

薄荷葉二錢

右件剉焙為末。每服一錢。用溫湯無時調服。

知母湯

治胸膈氣喘。痰鳴發熱。咳嗽惡風。

知母

甘草二味各

貝母

羌活

滑石別研

大黃

小麥子五味各

麻黃製如前

苦葶藶

訶子肉三味各

薄荷去梗

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

白芍藥湯

治冷痢腹痛。及誤汗誤下。即壞證傷寒是也。並宜先服。次投對證之劑。

白芍藥半兩

澤瀉去粗皮

甘草三錢

薄荷桂去粗皮

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。誤汗誤下。加人參。南木香各二

錢。臍下痛。入生薑及鹽同煎。加鉤藤亦好。

茯苓厚朴湯

主傷寒傷風。夾痰嘔逆。並吐瀉後。喉涎牽響。飲食減少。脾胃氣虛。

白茯苓去皮

半夏如前製二味

甘草三錢

厚

朴五錢去粗皮剉碎每一斤用生薑一斤
薄片切爛杵拌勻釀一宿慢火炒乾用

右件咬咀每服二錢水一盞半薑三片煎七分無時溫服或加棗一枚去核同煎。

扶神湯

治心氣不足虛而驚悸日常煩哭及嬰孩生下羸瘦多驚宜子母同服自然有效。

茯

神去根一兩

人

參去半兩

甘

草錢二

當

歸去薑尾酒

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服有微熱煩躁入麥門冬去心同煎。

守中湯

思。理春夏相交陰溼氣重中傷脾胃致腹痛泄痢經久不止漸傳手足浮腫飲食少

桔

梗去炒薑

蒼

朮如前製二

白

薑四錢

甘

草六錢

右件剉焙為末每服一錢空心沸湯調服咬咀水煎亦可或用薑棗

瀉肺湯 即瀉白散

主傷風後。五心煩熱。咳嗽喘促。唇紅頰赤。發渴引飲。

桑白皮 剉炒

地骨地淨洗焙乾二味各二兩

甘草炙三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。粳大米百粒。煎七分。食後臨臥溫服。或不拘時。

五和湯

主宣利藏府積熱。調和榮衛。

當歸 酒洗

赤茯苓去皮半兩

甘草炙

大黃

枳殼水浸潤去殼剉片麥殼炒微黃三味各七錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

養藏湯

主生津益氣。溫腸止痢。

人參 去蘆

甘草炙二味各二錢半

白芍藥

白朮二味各半兩

南木香

肉桂

去粗皮二錢 罌粟殼去蒂剉碎

肉豆蔻

訶子肉三味各一錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或入倉米同煎。

貝母湯

主百日內嬰孩咳嗽有痰。

貝母一兩 甘草半錢

右件剉焙為末。每服一字或半錢。用陳大米煎湯。空心調服。痰盛。淡薑湯調下。

固真湯

主吐瀉痢後。胃虛脾慢。四肢口鼻寒冷。沈困不省人事。

人參去蘆 附子湯浸炮 白茯苓去皮 白朮四錢半

山藥去黑皮 黃耆塗炙 肉桂去粗皮 甘草四錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑三片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或無時。

生地黃湯

治胎黃。乳母服。嬰兒亦可少與含嚙。

生乾地黃 赤芍藥 川芎 當歸酒洗

天花粉五兩各

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

薑橘湯

治脾慢胃冷嘔吐不止。

白

薑二錢

陳橘皮去白

粉 草錢三

右件劉煔為末。每服半錢或一錢。用溫棗湯調化。空心少與緩服。

理中湯

主溫脾煖胃。冷吐冷瀉。及治氣虛中寒腹痛。

人

參去蘆

白 朮二味各

乾 薑炮

粉 草二錢半

右件劉煔為末。每服半錢或一錢。用溫白湯空心調服。

桂枝湯

治太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。嗇嗇惡寒。翕翕發熱。鼻

鳴乾嘔者。

桂

枝去粗

芍 藥二味各

甘 草一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。不拘時溫服。

麻黃湯

治傷寒頭疼發熱。身痛無汗喘滿。又治太陽病脈浮緊無汗。發熱身痛。八九日。表證不解者。

麻黃去根節一兩半

桂枝去粗皮一兩

甘草半兩

杏仁湯三十五粒去殼

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

獨活湯

治驚癱鶴膝。及中風溼。日久致腰背手足疼痛。晝輕夜重。及四肢痿痺不仁。

川獨活黃色如兔眼者佳半兩

當歸酒洗

白朮

黃耆塗炙

薄荷桂皮粗

川牛膝酒洗各二錢 甘草半兩 草薺三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。薤白一根。煎七分。空心熱服。或無時。

五黃湯

主解利偏身癱癲。惡核發熱。及丁黃腫毒丹瘤。

黃耆生用

黃連

黃芩

黃蘗

大黃四味各二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。蜜一大匙。煎七分。無時溫服。

化毒湯

解風熱上攻。咽喉腫痛。飲食不便。

桔梗剉炒

薄荷葉

荊芥穗

甘草三錢各

山豆根取淨皮

牙硝

礪砂

朴硝

雄黃

硃砂五味各

青木香湯

右前五味焙為末。後五味入乳鉢細杵。同前藥末一處再杵勻。每用一字至半錢。乾點舌上化下。或以溫湯濃調少與含嚥亦可。

治小兒陰莖無故而腫。或痛縮。初因陽明經有風熱。溫氣相傳。所以如是。法當寬此一經。其證自瘳。蓋陽明受病。不能養其宗筋故也。宜服之。及咳嗽痰喘氣促。

青木香去蘆

枳殼如前製 甘草二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

排風湯

治中風狂言。失音不語。精神昏困。驚癱鶴膝等證。及腫疾才瘳後。偶感外風。滿面

偏體虛浮。並宜可服。

白蔞皮

白朮

白芍藥

薄

桂皮去粗

防風去蘆

川芎

當歸酒洗

杏

仁皮尖去

甘草炙九味

川獨活

麻黃去根

白茯苓去皮尖
各七錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

中和湯

此藥大能通和表裏。溫養脾胃。勻調氣血。順正陰陽。發散風寒。辟除腥穢。善使豆瘡易出易收。不致倒靨黑陷。傳變危急。兼治偏身癱瘓。已潰未潰。排膿止痛。自然消釋。常服清神駐顏。明目健脾。真元益固。邪氣無干。

人參去蘆

厚朴如前

當歸酒洗

防風去蘆

白芷

肉桂去粗

桔梗

川芎

白芍藥

沉香

檀香

乳香

藿香葉

紫蘇葉

黃耆蜜炙

甘草各十六味
各半兩

右件咬咀。用無灰酒四兩。重拌勻曬乾。天陰略焙。每服一錢。水一盞。煎七分。無

時溫服。

人參甘桔湯

感冒風熱。火氣熏逼。豆瘡蘊毒上攻。咽喉腫痛。痰氣不順。咳嗽失音。飲食減少。並宜治之。

人

參半兩

桔

梗剉用蜜水

甘草半生半炙三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。風熱加荊芥。杏仁煎。豆瘡後目生翳膜。用蟬殼淨洗去嘴足同煎。咽痛入礪砂末煎。去渣無時含嚥。

人參芎歸湯

治九道血妄行。

人

參去蘆

川芎

當

歸酒洗三味各半兩

荆

芥二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

五拗湯

治感風溼。及形寒飲冷。痰嗽咳逆。連聲不已。

麻

黃根節不去

杏

仁皮不去

荆

芥梗不去

桔

梗四味各五錢用

甘草

半二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

六和湯

治心脾不和。氣不升降。霍亂吐瀉。咳嗽胸滿。頭目疼痛。嗜臥倦怠。并陰陽不分。冒暑伏熱煩悶。成痢中酒作渴。心逆畏食。

人參

去蘆

縮砂仁

甘草

炙

杏仁

湯泡去皮尖

半夏

如前製五兩

薑

厚

朴如前製二兩

白扁豆

炒熟剉去殼一斤用生薑一斤碎切爛煮拌勻釀經一宿焙乾

藿香

香

赤茯苓去皮

木

瓜各一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。無時溫服。或入鹽半字同煎。

黃耆六一湯

治諸虛不足。煩躁驚悸。目揚。身體軟弱。不思飲食。

黃耆

六兩蜜炙

甘草

草一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。棗二枚。煎七分。無時溫服。

真武湯

治傷寒諸疾後。表裏俱虛。煩渴有熱。偏身汗出。

白茯苓去皮

白芍藥七錢各半

白朮

附

子如前製二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

牡蠣大黃湯

治三五歲小兒。感受溫溼之氣。侵襲膀胱。致陰莖膚囊浮腫作痛。

牡蠣

用熟黃泥包裏夾水燒透出地上候冷用

大黃

紙裹水浸透炮過候冷二味各一兩

右件剉研為末。每服一錢。用無灰溫酒空心調服。不能飲者。溫湯調。少入酒同服。

坎離湯

治虛喘晝輕夜重。食減神昏。

萆澄茄

石菖蒲二錢各

白朮

白茯苓去皮

南木香三錢各

甘草炙

半夏如前製

紫蘇子略炒碎三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

清脾湯

治諸瘧久不瘥者。脾胃虛弱。形容憔悴。

厚朴

如前製

烏梅

打破

半夏

如前製

夏

劉用東薑壁土炒

青皮

去白

甘草

炙三

草

果炮去殼取仁二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。未發前併三服。仍忌生冷油膩時果毒物。

麥門冬湯

解斑疹熱毒。頭痛煩悶。狂渴妄語。

麥門冬

去心

乾葛

二錢各

人參

去蘆

赤芍藥

升麻

赤茯苓

去皮

甘草

二錢各

石膏末

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

化丹湯

解利丹毒。徧身燥癢。發熱煩啼。

川獨活

射夜干

麻

黃製如前

青木香

甘草

黃芩

薄

桂去粗皮

石膏末五錢
八味各

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

茵香湯

和脾胃。進飲食。理腹痛。散邪氣。

茵香炒

良薑劉用東壁土炒

蒼朮如前製

甘草一兩

右件劉焙為末。每服一錢。燒鹽湯空心調服。

大柴胡湯

疏利風熱。痰嗽腹脹。及裏證未解。

柴胡去蘆

黃芩

芍藥

二味各

大黃

半夏如前製

枳實

如前製

甘草一兩小方

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑三片。煎七分。無時溫服。

快膈湯

理胸膈不快。飲食少進。亦能順氣和中。消導宿滯。

人參去蘆

青皮去白

縮砂仁

烏藥

良薑如前

香附子

甘草炙七味

右件剉碎爲末。每服一錢。溫鹽湯空心調服。

升麻湯

治時行瘟疫。頭痛發熱。肢體煩疼。及瘡疹未見形先。疑貳之間。並宜可服。大能和順血脈。解諸餘毒斑證等疾。

升麻

乾葛

芍藥二味各

甘草半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

小陷胸湯

治六七歲已上之兒。小結胸證。

半夏如前製

淨黃連

栝樓實各半

右件咬咀。每服二錢。水一盞半。白蜜一大匙。煎至八分。無時溫服。未效再投。得

微下黃涎爲好也。

散類

百解散

主和解百病。虛慢陰證不宜。

乾葛二兩

升麻

赤芍藥二兩各

黃芩一兩

麻黃如前製

薄荷桂去粗皮

甘草一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑三片。葱一根。煎七分。無時溫服。有風熱感。加薄荷同煎。

荷同煎。

五苓散

解傷寒溫溼。暑毒霍亂。分陰陽。理煩渴。

澤瀉去粗皮

白茯苓去皮

猪苓去皮

白朮三兩各

肉桂去粗皮

右前四味剉焙。入桂同研為末。每服二錢。溫湯調下。不拘時。若作咬咀。用赤茯苓分兩同前。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。其餘活法明本論中。隨證詳述。

當歸散

調順氣血。和解表裏。爽利心腹。疏理百病。及治溫熱停積。白痢。煩躁不寧。

當歸法洗

赤芍藥二兩各

大黃半生半炮 川芎

麻

黃如前製二兩 甘草半生半炙

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

三解散 一名甯心湯

主上焦蘊熱傷風。面紅目赤。狂躁氣急。渴水驚啼煩悶。丹毒口瘡。痰嗽搐掣。

人參去蘆

防風去蘆

天麻

茯苓神木根

鬱金無仁代

白附子

大黃七錢半

赤芍藥

黃芩

僵蠶五錢各

全蠍去尖毒

枳殼二錢如前製

粉草六錢

右件剉焙爲末。每服半錢至一錢。用溫薄荷湯。無時調下。或燈心湯。

勻氣散

主調補通利後。及冷疝腹痛。氣滯不和。

桔 梗二兩 陳皮去白 縮砂仁 茵香二兩

白 薑二錢 粉 草四錢

右件劉焙為末。每服半錢或一錢。空心沸湯調服。冷疝腹痛。燒鹽湯調下。

雄黃散

主暴中急慢驚風。駒駝痰涎滿口。及雨侵閉汗不通。或涼或熱。坐臥生煩。

雄黃紅鏡半 白藥去黑 川烏頭炮裂去 草烏炮裂去

天麻明亮 川芎五兩

右除雄黃外。餘五味劉焙。同雄黃為末。驚風痰壅。每服半錢或一錢。用薑汁茶

清調下。發汗。水薑葱薄荷同煎。並投三服取效。

惺惺散

主傷風傷寒。痰嗽咳逆。理虛和氣。寧心清肌。止啼去煩。利咽膈。解失音。

人參去蘆 桔梗劉破 白茯苓去皮 白朮

天花粉四兩 細辛去葉 防風去蘆 川芎

南星生用 甘草炙 草生

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。薄荷三葉。慢火煎七分。無時溫服。

木通散

主上膈熱。小府閉。煩躁生嗔。及淋證諸瘡丹毒。

木通去皮

地篇蓄去老梗 大黃

甘草

赤茯苓去皮 瞿麥去乾

滑石末

山梔仁

車前子

黃芩五錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。燈心三莖。煎七分。無時溫服。或入薄荷同煎。

烏梅散

治腹疼。及初生嬰孩臍下冷痛疝氣等疾。

烏梅和核

玄胡索

粉草半生 三

乳香

沒藥

鈎藤和鈎 三

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。

黃金散

解口內舌上瘡毒。及治豆瘡後目生翳膜。

黃

藥乾去粗皮用生蜜潤透烈日下曬再塗上蜜凡經十數次為度

粉 草二味各

右件劉焙研為細末。治口瘡用藥末乾點患處。或用麥門冬熟水調點舌上。令其自化。治豆瘡後目生翳膜。湯泡澄清。無時頻洗。仍投糖煎散。柿煎散二藥。

平胃散

主脾胃不和。嘔逆噦酸。霍亂腹痛。

厚

朴如前製

陳

皮去白二味

朮如前製

甘草一兩

右件劉焙為末。每服半錢至一錢。薑棗煎湯。空心溫服。燒鹽湯亦好。

七寶散

治時氣傷風傷寒。頭昏體熱咳嗽。及脾胃肺藏不和。口中腥氣異常。或牙縫微有鮮血。兼調理諸病後小證得中。以其品味不慳不燥為佳。

紫

蘇去老梗

淨香附二味各

陳皮去白

甘草二味各

桔

梗二兩半

川芎

白芷二味各

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。咳嗽加製半夏。口腥氣入鹽煎。調理諸疾加棗子煎。

三稜散

主諸般停滯。疳積發熱。瀉痢酸酸。水穀不化。常服和脾胃。進飲食。長肌肉。益神氣。

人

參去蘆七
錢半

三

稜炮剉

淨香附二兩各

青

皮去白

益智仁

陳

皮去白

半

夏製如前

枳

殼製如前

神麴炒

穀

芽洗焙

莪

朮醋煮透燻

大

黃半生

紫蘇味去老梗十

甘草一兩二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。倉米百粒。煎七分。無時溫服。氣虛勞加白

茯苓一兩。

立消散

治膀胱久受熱毒。致陰器囊赤腫脹痛。

赤小豆

赤芍藥

枳

殼生用

風化朴硝藥拌勻

商陸半兩各

右件不過火。剉曬為末。柏枝煎湯。候冷調二錢。或三錢塗腫處。仍服咬咀五苓

散。加車前子。薏苡仁。水煎。

天竺黃散

主上焦風熱。口鼻生瘡。兩目赤腫。咽膈不利。痰涎壅滯。氣不通暢。驚搐煩悶。神思昏迷。

天竺黃

鬱

金櫃無以代

茯

神去皮

甘

草四味各半兩

硼砂

牙消

白芷

川芎

僵蠶去絲

枳殼

如前製六味各二錢半

硃砂

水飛二錢

麝香一字

蟬殼

十五洗去泥土

右除硼砂、牙消、硃砂、麝香四味。乳鉢細杵。餘九味焙乾末。同入乳鉢內再杵勻。每服半錢或一錢。溫薄荷湯。無時調服。或麥門冬湯。

連牀散

治滿頭如癩瘡毒。及手足身上。陰器膚囊。癢則抓爛。黃汁淋漓燥痛。

淨黃連一兩

蛇牀子去埃土半兩

五倍子去內蟲屑二錢半

輕粉十五貼

右前三味曬乾為末。再入乳鉢內。同輕粉杵勻。用清油稀調二錢或三錢。塗搽患處。必先以荆芥和葱煮水。候涼淨洗拭乾。後傅藥。

川草散

治腹痛下痢赤白不拘遠近。

川芎

白芷

甘草半生半炙三味各七錢

赤芍藥

當歸酒洗

淨黃連三味各五錢

右件剉焙爲末。每服半錢至一錢。白痢白薑湯調。赤痢甘草湯調。赤白痢溫米清湯調。並空心服。

柿煎散

治豆瘡後目生翳膜。

白菊花

菘豆殼

穀精草三味各一兩

右爲咬咀。每服二錢。乾柿一枚。粟米泔汁大盞。慢火煎乾去渣。食後臨睡。止喫柿肉。一日三枚。倍加尤好。如嬰孩小乳母可服。或用煮過柿子去核。薄切焙爲細末。抄半錢。溫米泔水調化。無時與兒服亦可。

拂毒散

治諸風熱陰毒腫核已結成未穿潰。或正發者。

半 夏生 廬 貝 母

大 黃二味各 朴 消

五倍子去內蟲屑二味各二錢半

右件剉焙為末。用醇醋調一錢或二錢塗患處。如乾再塗。仍服疏風化毒之劑。餘藥成末。除朴消。臨入杵勻用。

金鈴散

治疝氣腹痛。投諸藥後。痛而復作宜服。

金鈴子肉 六錢 三 稜 炮 剉

莪 朮醋煮 青 皮 去 白

陳 皮去白二錢半 赤 茯苓 去 皮

苗 香二味各 南 木 香 二 錢

甘 草炙四錢 檳 榔

枳 殼製如前 鈎 藤和鈎三味

右除檳榔。木香不過火。餘十味剉焙。仍同木香。榔檳為末。每服半錢至一錢。仍用炒茴香煎無灰酒空心調服。不飲酒者。煎炒茴香湯調下。

消黃散

治風熱溫氣上攻。舌硬腫大不消。

風化朴消 真蒲黃二味各

活効心書 卷下 信效方

右蒲黃曬乾為末。同朴消乳鉢內細杵勻。每用一字至半錢。點揩舌上下。

疏風散

主小兒薄劣。跌觸頭腦。或弄刀錐。因而破血感風。致面目傷痕浮腫。

荆芥穗一兩

防風去蘆半

甘草半生半炙二錢

右剉焙為末。每服一錢。用無灰溫酒調服。或葱湯亦好。

陳氏木香散

能和表裏。通行津液。清上實下。扶陰助陽。及治腹脹瀉渴。溫壯豆瘡。

南木香

厚桂去粗皮

陳皮去白

訶子肉

丁香

人參去蘆

赤茯苓去皮

半夏如前製

甘草半炙

大腹皮淨洗

前胡去蘆半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

陳氏異功散

能除風寒溼痺。調和陰陽。滋養血氣。使豆瘡易出易斂。不致癢塌瀉痢。

南木香

當歸酒洗

人參去蘆

肉豆蔻

陳皮去白

丁香

白茯苓去皮

厚桂去粗皮

白朮

厚朴如前製

半夏如前製

附子如前製二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或不拘時。

羌活散

治傷風時氣。頭痛發熱。身體煩疼。痰壅咳嗽。失音鼻塞聲重。及解時行下痢赤白。

人參去蘆

羌活

赤茯苓去皮

柴胡去蘆

前胡去蘆

川芎

獨活

桔梗剉炒

枳殼如前製

蒼朮如前製

甘草十一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。薄荷三葉。煎七分。無時溫服。發散風邪入

葱白同煎。痢證薑倉米煎。

香薷散

主夏秋藏府冷熱不調。或飲食起居不節。致吐痢心腹疼痛。發熱煩悶。身體拘急。或脚轉筋。四肢厥冷。有似陰證。但口氣溫。脈按沈緊為驗。

陳香薷去老梗

白扁豆如前製

厚朴如前製二兩

右三味。六兩。咬咀了。用無灰酒三兩拌勻。仍曬乾。或焙。臨入咬咀。生甘草一兩。和勻。每服二錢。水一盞。煎七分。去渣。以瓦器盛在水中。沈溫。不拘時服。如熱極。或瀉痢中有鮮血者。加淨黃連一兩。細剉拌勻。名黃連香薷散。下法如前。

瀉黃散

治胃虛脾實。生熱煩渴。頭痛惡心。

藿香葉 半錢

梔子仁

防風 各一兩

甘草 半錢

石膏末 八錢

右前四味。剉。同石膏末。用酒蜜微炒香。為咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。

調元散

主稟受元氣不足。顛顛間解。肌肉消瘦。腹大如腫。致語遲行遲。手足如癩。神色昏慢。齒生遲者。服之有效。

乾山藥 去黑皮 五錢

人參 去蘆

白茯苓 去皮

茯神 去木根

白朮

白芍藥

熟乾地黄 酒洗

當歸 酒洗

黃 耆蜜水塗炙八
石菖蒲各二錢半

川 芎
甘 草炙二味

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。無時溫服。如嬰孩幼嫩。與乳母同服。

醒脾散

主醒脾養胃。止吐痢。進飲食。及調理病後神昏目慢。貪睡多困。脈弱氣短。微有痰涎。並宜投服。

人 參去蘆 白茯苓去皮 藿香葉 白朮

甘 草炙五錢 丁 香四錢 大南星入錢剉作小塊。紙裹水透。壓胞過用。

縮砂仁四十粒

右爲咬咀。每服二錢。水大盞。薑三片。冬瓜子仁五十粒。杵碎。慢火煎七分。空心緩投服之。急必吐。

醍醐散

治吐瀉後。調和脾胃。消進飲食。及丁奚哺露。虛熱煩渴。氣逆心惡。

陳皮去白

縮砂仁

厚朴如前

麥芽洗淨

烏梅和核五味

良薑如前

乾葛

烏藥三錢各

草果仁炮二

甘草炙三

右為咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。鹽少許。煎七分。空心溫服。

二聖散

治風痰壅閉。語音不出。氣促喘悶。手足動搖。似搐非搐。

訶子十個大者半

大腹皮洗淨

右為咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

補肺散

治久患咳嗽。肺虛氣促。有痰惡心。

阿膠對炒

白茯苓

馬兜苓去老

糯米三味各

杏仁二十一粒

甘草炙四錢

右為咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

安神散

證。治吐瀉諸病後。心虛煩悶。觸物易驚。氣鬱生涎。涎與氣搏。睡不得寧。預防變生他

人

參去蘆

白茯苓去皮

半

夏如前

甘

草炙

陳

皮去白

枳

實如前製六錢

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。竹茹小團。煎七分。無時溫服。有微熱微渴。入麥門冬去心同煎。

燒鹽散

治走馬疳。牙根肉潰爛黑臭。

橡

斗不拘

右件每用大者兩個。入鹽滿殼。蓋作一合。或五六個。或十數個。安在火內。和鹽燒透。取出地上。以瓦盤蓋定。存性候冷。入麝香少許。乳鉢內極細杵勻。每以半錢塗搽患處。常收用小瓦合盛貯。勿使紙裹。蓋鹽能作潤。

綠袍散

治重舌。及滿口內外瘡毒。咽膈不利。

薄荷去老

荊芥穗五錢各

青黛

玄明粉

礬砂三味各半

百藥煎

甘草二味各二錢

右件剉焙爲末。除玄明粉。礬砂二味。在乳鉢內細杵。同前藥末再杵勻。用一字至半錢。乾點舌上。令其自化。或以新汲水入蜜調點舌上亦好。

益黃散

治脾虛受冷。水穀不化。泄瀉注下。盜汗出多。

陳皮去白

肉豆蔻炮二錢

丁香二錢

訶子肉炮去核二錢

甘草錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。

解表散

主傷風感冷。咳嗽痰喘。嘔吐瀉痢驚悸。有熱證在表裏發。當用氣解藥可投。

麻黃如前製

杏仁湯炮去皮尖

赤茯苓去皮三兩

川芎

防風去蘆

枳殼如前製三兩

甘草半生半炙

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。無時溫服。有熱入薄荷同

煎。

參苓白朮散

主脾胃虛弱。飲食不進。多困少氣。中滿痞噎。嘔吐咳逆。此藥不寒不熱。性味溫平。常服調脾悅色。順正去邪。

人參去蘆

白茯苓去皮

粉草

白朮

白扁豆製如前

山藥去黑皮

縮砂仁

薏苡仁

桔梗劉炒丸味蓮子肉去心

右件劉焙為末。每服半錢至一錢。用棗湯空心調服。或溫米湯亦可。

守胃散

治陰陽不和。吐瀉不止。預防風證。常服調脾胃。進飲食。

人參去蘆

白朮

白茯苓去皮

山藥去黑皮

乾葛

扁豆製如前

南星製如前

甘草

藿香去老梗

防風去蘆

天麻十一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。冬瓜子仁五十粒。搗碎煎七分。空心溫服。

如瀉不止。入沉香、白豆蔻同煎。

南星腹皮散

主腫疾欲瘡未瘡之間。脾胃虛慢。氣促痰喘。腹脹胸滿。飲食減。精神困。小便不利。面色痿黃。

南星同前製 大腹皮淨洗

生薑皮

陳皮去白

青皮去白 桑白皮剉炒

甘草炙

扁豆同前製七

右為咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

導赤散

治心經壅熱。煩躁睡語。或時復上竄齧五巧牙。小便黃澀。久則成驚。觸物易動。

生乾地黃淨洗 木通去皮節二 黃芩

赤茯苓去皮二錢半

甘草三錢

右為咀。每服二錢。水一盞。竹葉三片。煎七分。無時溫服。或加麥門冬去心同煎。

錢氏白朮散

治脾胃不和。嘔吐瀉痢。惡心發渴。大能補虛損。調榮衛。

南木香

白朮

二味各半兩

人參 去蘆

白茯苓 去皮

藿香葉

甘草 四味各一兩

乾葛 二兩

右為呶咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

和中散

主久病方瘡。面黃清瘦。神昏氣弱。脾胃未實。食物過傷。停飲生痰。留滯中脘。耗虛真氣。或成吐瀉。此藥性味甘平。大能調治。常服和胃氣。進飲食。悅顏色。理風痰。

人參 去蘆

白扁豆 同前

白茯苓 去皮

川芎

縮砂仁

香附子

半夏 同前

甘草 八味各一兩

肉豆蔻

訶子 去核二味各七錢

右為呶咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或不拘時。

糖煎散

治豆瘡餘毒。攻目成翳。澀痛有熱。多淚羞明。

赤芍藥

當歸尾

大黃

川芎

荆芥

防風去蘆

漢防己祛黑

龍膽草

黃耆生用

黃芩針雨

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。沙糖小塊。煎七分。食後臨睡溫服。或無時。

六柱散

治吐痢泄瀉。胃虛脾慢。手足俱冷。六脈沉微。

人參去蘆

白茯苓去皮

熟附子

南木香

肉豆蔻

白朮六味各半雨

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。不拘時溫服。

九仙散

解諸目疾。不拘歲月遠近。並宜先服。

柴胡去蘆

蒼朮同前製二雨赤芍藥

荆芥

甘草三味各六錢半

麻黃同前

川芎

薄荷和梗三味各半雨

旋覆花去老梗三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。不拘時溫服。

草龍膽散

治暴赤火眼。晝夜澀痛。作腫淚多。

草龍膽

木賊去節

荆芥

菊花

防風去蘆

草決明半炒

甘草半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。痛甚加羌活。乳香同煎。

金波散

治時行赤眼。腫痛成翳。有熱多淚。

淨黃連一兩

硼砂

寒水石

大黃三錢

海螵蛸

銅青二錢

玄明粉半錢

麝香一字

全蠍七鼠去

右除玄明粉。麝香。餘七味剉曬為末。仍入玄明粉。麝香。乳鉢內同前藥末杵勻。每用一字至半錢。溫淨湯或涼水調化。澄清去渣。無時頻洗。有風夾蟲作癢。入輕粉取效。仍忌酒葷三五日。

內金散

浴牙根肉臭爛黑色。有蟲作痛。

雞內金即雞肚內麤皮陰乾一兩

白芷

銅青三味各半兩

麝香一字

右前三味。剉曬或焙為末。仍以麝香乳鉢內同杵勻。每用一字或半錢。乾擦患處。先用溫鹽水灌漱。後傳藥。

霹靂散

解急慢驚風。不省人事。

猪牙阜角三錢

細辛

川芎

白芷三味各

躑躅半錢

右件剉曬為末。每以少許。用大燈心三寸長。蘸點鼻內。得噴嚏為驗。前藥不可焙。焙則不應。

順搐散

解男右女左搐不順者。

枳殼如前製

鈎藤去鉤

荆芥

羌活

防風去蘆

甘草六味各

右件咬咀。每服二錢。水一盞。順切薑三片。煎七分。無時溫服。或入薄荷同煎。

外消散

治嬰孩初生。旬日外臍突。或痛或不痛。痛則啼聲不已。及療小兒因感溫熱相搏。致陰器膚囊浮腫。

大黃

牡

蠣如前製二味各半兩朴消二錢

右前二味。剉焙爲末。仍入朴消。乳鉢內同杵勻。抄一錢或二錢。取田螺三枚。淨洗。再以水半盃。活過一宿。去螺用水。調塗腫處。卽消。其螺仍放水中。勿害之。昔賢有曰。殺生救生。去生遠矣。物命雖微。亦可戒也。治陰器膚囊腫。車前子煎湯候冷。調傅患處。

活血散

解破血傷風

當歸酒洗

生乾地黃酒洗

川芎

紅花

赤芍藥

蘇木六味各

甘草三錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

桃花散

治一切破損肢體。血出作痛。

好石灰用抄淨

清油小盞

大黃五錢剉碎水浸取汁大半盞

右石灰先用鐵鑊炒令帶熱。次入大黃汁。清油和勻。仍以慢火炒如桃花色。烏盆盛之。傾出在內。浮而不沉。鵝翎拂聚紙上。別著瓦器收藏。凡是破損傷痕。用塗立效。仍服疏風散。活血散。

三白散

解初中腫疾。四肢膚囊浮脹。大小便不利。皆因膀胱蘊熱。風溼相乘。

白牽牛炒性碎

桑白皮剉炒

白朮

木通去皮

陳皮去白

甘草六味各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

麝香人齒散

治豆瘡黑陷。因毒氣入腎。而形於外。

麝 香少許

活人牙齒不拘多少火煨過

右二味同研為末。每用半錢至一錢。無灰溫酒調下。止以一服。然此藥固好。但人齒難得。嘗用一匕金取效。

四黃散

治小兒身上一切熱毒瘡疾燥癢。抓破有汗不乾。

淨黃連

黃 礬

黃 芩

大 黃

滑 石五味各半兩

五倍子去內蟲屑二錢半

右件劉曬為末。用清油入桐油和調二錢至三錢。塗搽患處。仍服四順飲。消毒飲。

薄荷散

治陽證脫肛。

薄 荷和梗

骨碎補去毛二味各半兩

甘 草半二錢

金罌刺根七錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。入無灰酒大匙。煎七分。空心溫服。或無時。

槲皮散

解癰癰作腫疼痛。

櫛皮仍去粗皮此櫛在處有包鹽櫛葉木也。

右件不拘多少。剉碎煮水候溫。頻洗患處。

白芨散

治癰癰膿汁不乾。

白芨

貝母

淨黃連三味各半兩 輕粉三十

右前三味。剉焙為末。仍以輕粉乳鉢內同杵勻。抄一錢至二錢。清油調擦患處。必先用櫛皮散煮水候溫。淨洗拭乾方塗藥。

二香散

治同前證。

白膠香

降真香用心無土氣者

海螵蛸

五倍子去內蟲屑四味各半錢

右件為末。如前先用櫛皮散煮水淨洗患處。後以此藥一錢或二錢乾塗上。外將水紙封掩。三五次即效。

萬金散

治水瀉下痢。久不瘥者。

罌粟殼去糖二兩一兩生用

甘草雨炙一雨生用

陳皮去二兩
烏梅和核一雨

右件咬咀。每服二錢。熱湯一盞。略煎二沸。和渣傾出盤內。上以盞蓋定。候澄清去渣。空心溫服。

神效散

治赤白痢晝夜頻數。食減腹痛。小便不利。

罌粟殼去梗帶剉碎白芷

烏梅和核三味乳香

撫芎半雨

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。

赤葛散

治因血熱與風熱相搏。徧身丹毒燥癢。日久不消。

赤葛二兩甘草三錢

右件咬咀。每服二錢。無灰酒一盞。煎七分。無時溫服。不飲酒者。止用水一盞。入

酒大匙同煎。

四聖散

主嬰孩胎受熱毒。生下兩目不開。

燈

心

黃連

秦皮

木賊

棗

子和核五味
各半兩

右爲咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。澄清去渣。無時頻洗。兩目自開。

天花散

治外腎膚囊腫痛。

天花粉二兩

甘草三錢

右件咬咀。每服二錢。無灰酒一盞。煎七分。空心溫投。不能飲者。止用水煎。少入

酒同服。

蟠龍散

治陽證脫肛。

乾地龍蟠如錢樣者佳
略去土一兩

風化朴硝二錢

右剉焙研爲細末。仍和勻朴消。每以二錢至三錢。肛門溼潤乾塗。或乾燥用清油調塗。先以見毒消。荆芥。生葱。煮水候溫浴洗。輕與拭乾。然後傅藥。

伏龍肝散

治陰證脫肛。

伏龍肝一兩

鼈頭骨半兩

百藥煎半錢

右三味焙研爲末。每用二錢至三錢。濃煎紫蘇湯候溫。和清油調塗患處。並如前法浴洗。拭乾方上藥。

益元散

解暑毒。利小便。理煩渴。除驚悸。

滑

石六兩

粉

草細剉一兩

右二味。或曬或焙。研爲細末。每服一錢至二錢。溫熟水無時調服。涼水亦可。

祛風散

治卒暴中風。全不能言。口眼喎斜。驚癱搐掣。痰實煩躁。神昏有熱。睡臥不穩。

防風去蘆半

南

星生用

甘

草生用

半

夏如前製

黃芩四味各一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞半。薑三片。慢火煎七分。不拘時溫服。

全蠍觀音散

治外感風寒。內傷生冷。吐瀉交作。脾胃俱虛。盜汗出多。神昏色慢。常服溫中益氣。進飲食寧心。

蓮子肉去心

人參去蘆

扁豆如上製三味各一兩 天麻

防風去蘆

全蠍去鬚

羌活 白芷

南木香

甘草炙

黃耆鹽薑水塗炙八味各半兩

神麴炒

白茯苓去皮二錢半

右除木香不過火。餘十二味剉焙。仍同木香碾為末。每服半錢至一錢。用棗湯無時調服。

備急散

治小兒諸般骨硬。致咽喉腫痛。

五倍子末一兩 先春茶末半兩

右二味和勻。抄一錢。溫湯半盞。調化無時。少與嚥下。依此法服。餌不過三五次。即效。如骨出或刺破處。血來多者。研砂末六錢。水煎消。毒飲調服。血止痛住。腫消食進。

黃土散

治豆瘡餘毒太甚。偏身潰爛。濃汁不乾。

黃

土不拘多少。取曠野背陰處。深掘為妙。

右件安地上。炭火煨透。候冷。研為乾末。用絹或紗兜撲患處。仍服解餘毒之藥。併忌動風發熱等物。

回陽散

理脾虛。感受風寒。溼氣。傳作吐瀉。手足逆冷。腹痛有痰。及陰證脫肛。疝疾盜汗。

附

子如前

甘

草半生半炙二

人

參去蘆七

細

辛去葉一

桔

梗剉炒

厚

桂去粗

白茯苓去皮

川獨活三錢各

半

夏同前製

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。或入棗子同煎。

蜜陀僧散

治走馬疳。齒焦黑爛。

蜜陀僧一兩

輕粉五十

麝香一字

右件為末。同輕粉。麝香。乳鉢內杵勻。每用半錢。擦患處。

圓膏門

圓類

琥珀抱龍圓

抱龍之義。抱者保也。龍者肝也。肝應東方青龍木。木生火。所謂生我者父母也。肝為母。心為子。母安則子安。況心臟神。肝藏魂。神魂既定。驚從何生。故曰抱龍圓。理小兒諸驚。四時感冒。風寒溫疫。邪熱致煩躁不寧。痰嗽氣急。及瘡疹欲出發搐。並宜可投。其藥性溫平。不慳不燥。常服祛風化痰。鎮心解熱。和脾胃。益精神。

真琥珀

天竺黃

檀香細剉

人參去蘆

白茯苓去皮五兩

粉草去節

枳殼如前

枳實如前製二兩

水飛珠砂五兩先以碎石引去鐵屑次用水乳鉢內細杵取淨者飛過

山藥去黑皮一斤剉作小塊南星兩剉碎用臘黃

金箔百片去護紙取見成藥一兩同用

右前十二味除珠砂金箔不入研內餘十味檀香不過火外九味或晒或焙同研為末和勻珠砂金箔每一兩重取新汲井水一兩重入乳鉢內略杵勻隨手圓此樣○大一粒陰乾晴霽略晒日色燥甚則捩折宜頓放當風處取其自乾治法並用葱湯無時化服或薄荷湯痰壅嗽甚淡薑湯下豆瘡見形有驚溫淨湯下心悸不安燈心湯下暑天迷悶麥門冬熟水下百日內嬰孩每圓分三次投二歲以上者止一圓或二圓其品劑修合之日但缺一味不依製度必無效矣常用瓦瓶入麝香同貯毋使散泄氣味入珍珠末一兩合和名金珠散蓋珍珠能鎮心寧肝墜痰尤效治法湯使同前此藥乃家傳祕方嘗自精製出賣人多信用取者甚衆今推誠利行願與天下共之非敢自矜特以全嬰為念耳

鎮驚圓

主急慢二驚風痰上壅手足抽掣口眼喎斜躁煩生噴精神昏悶常服寧心鎮驚

疏風順氣。

人參去蘆三錢

粉草半生

茯苓去木根

僵蠶去絲

枳殼如前製四錢 白附子

南星如前製

白茯苓去皮

礪砂 牙消

硃砂水飛六錢半全 蠍拾尾去毒

麝香一字

右除牙消、礪砂、麝香、硃砂、四味。用乳鉢細研。餘九味焙為末。入乳鉢內和勻。前四味用糯米粉水煮清糊為圓。梧桐子大。就帶潤以銀硃為衣。每服三圓至五圓。或七圓。急驚用溫茶清磨化投服。慢驚以生薑熟附子煎湯研化溫服。薄荷湯化下。或麥門冬湯。

烏犀圓

主諸積滯夾風。溫胃調脾。消進飲食。吐逆有酸醜氣。面黃肌瘦。不拘孩兒生後歲月遠近。並宜可服。

烏犀 硫黃

皂莢取出地上瓦盤蓋定存性冷用七錢 白薑二錢半

陳皮去白

川烏炮去皮臍二

巴

豆七粒法
膜心

右硫黃一味。先入研內研細。除巴豆外。餘四味同焙為末。仍以巴豆薄切。在乳鉢極細杵。再同前五味藥末杵勻。用粳大米飯包作糗子一大箇。小瓦瓶盛水。熟煮。候冷取出。在沙鉢中爛杵。細布兜緊。捻出如稠糊。安在別器內。以藥末亭分同杵細軟。圓粟穀大。取諸積。每服十五圓。或二十一圓。至三十三圓。並用淡薑湯泡冷飯。取汁小盞。五更初空心送下。通利三五行。以勻氣散止補。治積吐有酸醜氣。每服三圓至五圓。用淡薑湯入米醋少許。候溫空心投下。

香芎圓

治諸淋證。若患風閉尤效。

淨香附鹽水炒

川芎

赤茯苓去皮半兩

海金沙

滑石二兩各

枳殼如前

澤瀉去粗

石葦去毛蘗

檳榔不過火四味

右件剉晒為末。糯米粉煮為清糊。圓麻仁大。每服三十三圓。至五十五圓。或七十七圓。並用麥門冬熟水空心送下。若小便澀痛。滴三五點者。取長江順流水。

用火微溫。入鹽少許調勻。空心嚥服。

香連圓

治赤白下痢。煩渴作痛。

南木香

半兩不

淨黃連

一兩剉用葉黃

烏梅肉

二錢半薄切用

右件為末。用阿膠半兩。剉碎炒脹。水化如糊。候冷入乳鉢內。同前藥末。亭分杵勻。圓作麻仁大。赤痢每服三十三圓。至五十五圓。或七十七圓。甘草湯空心下。白痢圓數同。前白薑湯空心下。赤白交作。溫米清湯空心嚥服。

化癖圓

主癖結氣塊。在兩脇之間。日久不化。乍寒乍熱。藏府不調。米穀不消。噎氣喘促。胸腹滿悶。及理丁奚哺露。

南木香

陳

皮去白

莖

朮去毛

三

稜剉

青

皮巴豆九粒去

枳

殼製如前

檳

榔七味各

白朮

丁香二味各

細

墨燒存性

用

四錢

右除木香、檳榔、丁香不過火。餘七味焙。同前三味爲末。麵糊圓。作麻仁大。每服十五圓。至二十一圓。清米湯空心下。有寒熱往來。以柴胡飲間服。忌油膩生冷飲食。

蘆薈圓

主五疳八痢。蛇蟲藏府虛弱。身體瘦悴。頭髮焦疏。腹脹青筋。小便白濁。渴水無度。洞泄不時。穀食難化。偏身瘡疥。神色乾燥。此藥大能養胃壯氣。止痢除蟲。長肌健力。

南木香

丁

香二錢各
鐵半各

訶

子取核

肉豆蔻二味各

使君子肉

蘆

薈四錢各

棗

肉一兩
或慢火焙乾

右除使君子肉薄切。於乳鉢內極細杵。仍將前南木香等四味。溼麵裹煨。至香熟取出。地上候冷。去麵剉焙。同棗肉。蘆薈爲細末。再入乳鉢。同使君子肉杵勻。煉蜜圓。作麻仁大。每服三十圓。至五十圓。溫米湯空心送下。兒小米湯化服。

使君子圓

治腹內諸蟲作痛。口吐清水。

使君子肉薄切屋 檳榔

酸石榴根皮東向者佳

大黃味生半炮四

右除檳榔剉晒不過火。餘三味再焙。同檳榔為末。沙糖水煮麵糊。圓麻仁大。每服三十圓至五十圓。淡猪肉汁空心下。或雞肉汁亦好。

補腎地黃圓

治稟賦不足。腎氣虛弱。骨髓枯竭。顛大頭縫不合。體瘦語遲。行步多艱。齒生緩者。

乾山藥去黑 山茱萸酒浸潤蒸去核取皮為脰

熟乾地黃酒洗焙乾三 鹿茸蜜塗好 川牛膝酒洗焙二

牡丹根皮淨洗 白茯苓去皮二味 澤瀉去粗皮

右件剉焙為末。煉蜜圓。作麻仁大。每服十五圓或二十五圓至三十五圓。空心

溫鹽湯下。溫酒亦佳。

寬腸圓

治痢後裏急。大府閉澀不通。

枳殼同上製仍用清油浸 麻仁去殼 木通去皮

大黃半甞

檳榔

大腹皮淨洗焙乾

右除麻仁用乳鉢極細杵。外五味檳榔不過火。餘焙同研成末。入乳鉢中。與麻仁再杵勻。煉蜜圓。菜豆大。每服三十圓至五十圓。仍以枳殼、甘草煎湯。空心送下。一二月嬰孩。溫蜜湯化服。

香陸胃苓圓

治腫疾日久不瘳。此藥大能實脾導水。多服取效。

丁香香去梗

商陸

赤小豆

陳皮去白

甘草炙五兩

蒼朮如前製

澤瀉去粗皮

赤茯苓去皮

猪苓去皮

白朮三兩

肉桂去粗皮

厚朴同上製

右除丁香、肉桂不過火。餘藥剉焙。同前二味為末。用麵微炒。水浸透。煮糊圓。菜豆大。每服二十圓。至五十圓。或七十圓。空心溫湯下。兒小者圓作粟穀大吞服。粒數引子。並如前法。

二薑圓

治瘧疾往來寒熱。經久不瘳者。

良 薑東一兩剉片 薑一兩剉片 巴豆九粒去

右爲細末。用獾猪膽汁和水煮麵糊圓麻仁大。就帶潤以硃砂末爲衣。熱多用溫湯。早晨面北空心送下。寒多亦於清旦用溫酒面南空心嚥服。若寒熱相亭。用陰陽湯以一半冷水一半熱湯參和是也。不拘向南北投服。

沒石子圓

治久患疳痢及釀瀉。

沒石子二枚

南木香一兩紙包

肉豆蔻一枚

淨黃連剉碎薑汁炒過

訶子四枚炮

右剉焙成末。如烏犀圓內製飯糊爲圓。粟穀大。每服十五圓至三十圓或五十圓。溫白湯空心下。或米清湯。

半夏圓

治痰證神妙。若驚搐後。風涎潮作。服之尤驗。

半夏生用

赤茯苓去皮

枳殼剉上製一兩 風化朴消半錢

右前三味。剉焙爲末。入乳鉢同朴消杵勻。用生薑自然汁煮糯米粉爲糊。圓菜

豆大。每服三十圓至五十圓。仍以淡薑湯食後臨睡送下。兒小者圓如粟穀大。

六聖圓

治諸積和胃。大能主氣厚腸。消痞快膈。屢用取效。

莖 朮 炮 剉

淨黃連

陳皮去白

白

薑炮四味
各五錢

南木香半錢

右除南木香不見火。餘四味剉焙。同木香爲末。每一錢重。巴豆三粒。去殼膜心。存油碎切。入乳鉢極細杵。同前藥末再拌勻。煮醋麵糊圓。麻仁大。每服十五圓。至二十五圓。或三十五圓。淡薑湯五更初空心送下。利三五行。勻氣散止。補常服助脾化積。進食消痞。臨睡以淨湯或溫酒下三粒。及五粒而已。每一次止圓藥末三錢重。淨巴豆九粒爲則。不可多合。久則味過。用之效遲。

內消圓

治癰癤作膿穿破。久不瘡者。或初得此證。投之亦效。

斑 貓一兩除翅足粟米大盞炒
令粟米微焦色似去粟米

右件入薄荷葉三兩。同研爲末。雞子清爲圓。菘豆大。初用半飢半飽間。以溫茶

清下一圓。逐日加一圓。加至五圓之外。又逐日減一圓。減至一圓之後。每一日只服五圓。得瘥即止。不可過投。

截驚圓

治驚風搐掣。煩躁有熱。兩目上視。口噤牙關。

龍膽草 去蘆

防風 去蘆

青黛

鉤藤 和鉤

淨黃連

牛黃

甘草

硃砂末 味各五錢

薄荷葉 半錢

麝香 半錢

右除牛黃麝香外。餘八味剉晒。或焙為末。仍同前二味乳鉢內杵勻。煉蜜圓。芡實大。每用一圓至二圓。溫湯化服。或茶清。

散氣圓

理諸疝氣。小便利或不通。臍下作痛。不堪忍者。

海藻 湯浸洗七

澤瀉 去粗

茴香 炒

車前子 焙

蘿蔔子 用屋瓦慢

川練子 取肉斑貓丸救去翅冷用

大腹皮 淨洗焙乾七

右件剉焙為末。酒煮麵糊圓。菘豆大。每服三十圓至五十圓。南木香煎酒。空心

下。或防風、牡丹皮煎酒下。不能飲者。於木香湯中防風、牡丹皮湯內各少入酒。並空心投亦可。再用鹽炒苗香煎湯尤妙。

金粟圓

治下痢赤白。水穀不化。

淨黃連一兩

神麴一兩別研川芎

枳殼如前

穀芽淨洗

赤茯苓去皮白芷

南木香六兩各

右除木香別剉不過火。餘六味焙。入木香同為末。用神麴末煮糊圓粟穀大。每服七十圓至百圓。空心溫米清湯下。不拘時。

萬應圓

治諸般疴證。胃口有熱。飲食不進。頭髮作穗。面色痿黃。

五倍子去屑

胡黃連 青皮去白

陳皮去白

黃礬

神麴 麥芽淨洗

三稜炮剉

莪朮炮剉

蕪荑 檳榔

龍膽草

川練子肉 使君子肉各十四味

右除檳榔不過火。麥芽二味外。餘十二味剉碎。炒令微焦色。候冷同前麥芽檳榔研爲細末。水煮麵糊圓麻仁大。每服三十圓。至五十圓。或七十圓。溫米清湯無時送下。或空心。兒小者圓作粟穀大。粒數下法同前。

金菜圓

治冷痧氣痛及膚囊浮腫。

金鈴子肉一兩 家菜黃半兩

右二味焙研爲末。酒煮麵糊圓麻仁大。每服三十圓至五十圓。空心溫鹽湯下。溫酒亦好。兒小者圓作粟穀大。粒數下法如前。

二聖圓

治腹內諸蟲。及消穀逐水下氣去風。

檳榔一兩 巴豆十五粒去殼
膜內存油

右檳榔剉晒爲末。巴豆碎切。在乳鉢內極細杵。仍入檳榔末同再杵勻。麵糊圓菜豆大。每服七十七圓至九十九圓。用溫茶清五更初空心止投一服。見蟲下盡。進以稀粥自安。

商陸圓

治水腫小便不通。勿拘遠近。

商陸一兩 淨黃連半兩

右二味焙為末。薑汁煮麵糊圓。菘豆大。每服三十圓至五十圓。用溫紫蘇熟水空心下。或溫葱湯。

枳殼圓

治大府虛閉氣連日不通。痢後裏急。用之亦效。利小便熱閉。

枳殼不拘多少剉片麥麩炒過

右焙為末。煉蜜圓。作芡實大。兒小者用甘草糯米煎湯化下一圓至二圓。兒大者圓菘豆大。每服三十圓或五十圓。食前溫米清湯送下。小府熱閉。用車前子煎湯候溫空心投之。

濬川圓

治水腫及單腹滿脹。氣促食減。徧身面浮。

大戟 羌花醋炒 沉香 檀香

南木香

檳榔

莪朮

大腹皮淨焙乾

桑白皮劉半兩九味

黑白牽牛糖研取生

巴豆去殼膜心存

右除牽牛末。巴豆外。前九味。內有沉香。檀香。木香。檳榔。不過火。餘五味焙乾。同沉香等為末。就加牽牛末和勻。巴豆碎切。在乳鉢內極細杵。入前藥末。同再杵勻。水煮麵糊。圓麻仁大。每服十七圓。濃煎葱湯。候溫五更初空心下。去水未盡。停一日減用十三圓。次減作九圓。再減至七圓。湯使下法如前。證退即止。仍投南星腹皮散。如單腹腫甚。能飲食氣壯者。加甘遂末同圓取效。仍忌有甘草草藥餌。不致相反。

三聖圓

治諸瘧不拘遠近。

穿山甲一兩半湯浸透取甲剉碎同

雞心檳榔二味各一兩 雞骨常山

右件再晒為末。水煮糯米粉為糊。圓菜豆大。就帶潤以紅丹為衣。陰乾。每服三十圓至五十圓。未發前隔晚用酒空心投一服。重則二服。經久不瘥。下祛瘧丹。

莪朮圓

和脾益胃。消進飲食。寬膈快氣。悅色清神。

莪朮圓

三稜炮剉

淨香附三味各四兩 薑七慢火煮乾再洗

檳榔一兩

生牽牛末一兩

青木香去蘆

穀芽淨洗

青皮去白三味

葶澄茄

丁香

南木香四錢

右除檳榔、丁香、木香不過火。及牽牛末、餘七味剉焙。仍同檳榔、丁香、木香為末。臨入牽牛末和勻。水煮麵糊圓。菘豆大。每服三十圓。至五十圓。無時用淡薑湯下。溫茶溫酒皆好。兒小者圓粟米大。粒數下法如前。

豆蔻圓

治患豆瘡。脾虛作瀉。

肉豆蔻

南木香

縮砂仁三味各

白龍骨

訶子肉五錢

赤石脂

枯白礬七錢

右除木香不過火。餘六味剉焙。仍同木香為末。稠煮麵糊圓。麻仁大。每服三十圓。至五十圓。溫米清湯空心送下。或不拘時。兒小者圓粟穀大。下法同前。

爲定。下常如前法製半斤。作一料。後人切勿以見方不重藥爲誤。余嘗屢試屢驗。其餅如南饅頭樣者

沉香檳榔圓

和脾助胃。進食清神。寬胸快膈。順氣調中。悅顏色。壯筋骨。理面帶痿黃。肌膚瘦弱。過食生果。停寒在裏。乳癖腹脹作痛。及吐痢瘰腫。瘥後諸疴蟲積。並皆可投。

沉香

檳榔

檀香

南木香

丁香

三稜炮製

莪朮炮製

神麴炒

穀芽洗焙

厚朴同上

蒼朮同上

使君子肉剉以屋瓦焙乾

青皮去白

陳皮去白

縮砂仁

益智仁

淨香附

枳殼同上

良薑同上製十九味各半兩

粉草煎半

右除沉香、檳榔、檀香、木香、丁香不過火。餘十五味剉焙。仍同沉香等爲末。水煮麵糊圓。麻仁大。每服三十圓至五十圓。溫米清湯無時送下。兒小者不能吞嚥。煉蜜圓如芡實大。每以一圓或二圓。溫湯化服。

膏類

硃砂膏

五心煩熱。喉痰壅盛。驚風搐搦。渴飲無時。睡中不寧。見人煩躁。口瘡糜爛。

硃砂水飛五錢

牙消

硼砂

玄明粉三味各二錢半

麝香一字

金箔

銀箔各十貼

白附子

枳殼如前製二錢川芎

粉草二味各四錢

人參去蘆

黃芩薄荷葉二錢各

右前七味。入乳鉢杵勻。後七味剉焙為末。仍入鉢中同前藥和。煉蜜圓芡實大。每服一圓至二圓。用麥門冬熟水無時化服。

如意膏

治痰喘氣促咳嗽。連聲不已。冷熱二證皆可投。

半夏夏炮裂

南星炮裂二味各一兩半

右二味為末。以生薑汁和勻。捻作小餅如錢樣。用慢火炙乾。再為末。復取薑汁如前。經兩次炙乾。仍焙為末。煉蜜圓芡實大。每服一圓至二圓。仍用薑蜜湯無

時化服。有熱以薄荷湯。

地黃膏

治口內舌上生瘡作痛。飲食艱進。晝夜煩啼。

山梔仁

萊豆粉二味各

粉 草六錢

右件或晒或焙為末。用生地黃爛杵取汁一兩半。好蜜一兩半。以薄瓦器盛。在銅鐵鉢中水煑成膏。如稀糊相似。候冷亭分。入前藥末。同在乳鉢再杵勻。圓芡實大。每以一圓至二圓。麥門冬熟水無時化服。兒大者每用一圓納口內含化。或以新汲水調點舌上。

烏梅膏

治諸渴不止。吐瀉後口乾無味。及病中昏悶。咽痛不利。心悸似驚。此藥品味不寒不燥。用得其宜。暑月出路含化。則津液生而煩渴少。神效異常。

人參

去蘆

檀香剉曬

薄荷葉三味各

烏梅肉薄切用屋瓦

乾葛

縮砂仁

百藥煎

粉 草五味各

右除檀香不過火。烏梅肉別焙。餘六味或晒或焙。仍同前二味研為細末。煉蜜

圓芡實大。每服一圓或二圓。無時含嚙。兒小者麥門冬熟水化服。

烏附膏

理顛門陷。

綿川烏生用

綿附子

生用二味各五錢

雄

黃二錢

右件為末。用生葱和根葉細切爛杵。入前藥末同煎。空心作成膏。貼陷處。

烏豉膏

治六七歲以上小兒。疳顛腫毒。牙關緊硬。飲食不便。

綿川烏水浸爛炮裂去皮膚半兩

玄明粉二錢

淡豆豉三錢重水浸

右以川烏為末。同蒸豆豉玄明粉在乳鉢爛杵為膏。圓芡實大。每用一圓。兒大者安在牙關內。令其自化。和痰吐出。又再如前法含化。腫毒自消。兒小者用薄荷蜜湯化開。以指頭抹入牙關內。嚙下亦不妨。

辟塵膏

治小兒塵埃入目。措成腫熱作痛。啼哭不已。

油煙細墨

右以煙墨新汲井水濃磨。入玄明粉半錢。和勻爲膏。用筆多點目內。三五次卽效。仍忌飲酒一晝宵。

草麻膏

治暴患脫肛。

草麻子一兩

右件爛杵爲膏。捻作餅子。兩指寬大。貼顛上。如陰證脫肛。加生附子末。蔥蒜同研作膏。依前法貼之。

鉤藤膏

治百日內嬰孩。脣面青冷。腹痛夜啼。及周歲以上者。盤腸內疝。諸疝氣疾。

鉤藤和鉤

玄胡索

當歸酒洗

粉草炙

乳香五味各

肉桂去粗皮

麝香一字

右前四味焙乾。桂不過火。同爲末。乳香藟葉裹。熨斗盛火。熨透候冷。入乳鉢同磨細杵。後入前藥末再杵勻。煉蜜圓芡實大。每用一圓至二圓。白湯空心化服。

黃連膏

治時行火眼。赤腫澀痛。晝夜煩啼。

淨黃連二錢半

右件細剉。雞子一枚。筋嘴札開。一頭大處。取清瓦盞盛入黃連和勻釀一時。見黃色。以絹濾過成膏。患者仰面臥。外令人挑一字許。頻點目內。覺口中有苦味滿舌。上藥之驗也。豆瘡餘毒攻眼。眇多有熱。用之亦驗。

益中膏 一名助胃膏

治脾胃虛弱。吐瀉腹脹。肚疼困倦。有因感冷而瀉。夜起頻數。大便過時。食不剋化。

肉豆蔻

丁香

縮砂仁

訶子肉各二錢四分

粉草炙

青

皮去白 仁去味 陳皮去白

馬芹淨洗三錢

右除丁香不過火。餘七味焙。仍同丁香為末。煉蜜圓。艾實大。每用一圓至二圓。

白湯空心化服。

玄霜膏

治一切湯火瘡。但傅上痛止。更無癢痕。

好糯米五升或不少不拘

右用堅硬鐵器盛貯。見天處以雪水浸一二月。不問腐爛。仍用竹器撈出。於大箕內。別取淨水淋過。晒乾。焦炒研爲細末。新汲井水調塗患處。如乾燥。又以軟雞翎蘸水。添拂瘡上。使之滋潤。痛減。藥少再添用。自然效速。未久成團。再研細。一名玄霜散。炒透黑色。煙清爲度。

清涼膏

治暴赤火眼腫痛。及血癬作疼發熱。

大黃

淨黃連

黃檗

赤葛

細辛和葉

薄荷葉

風化朴消七味各

右前六味。或晒或焙爲末。臨入朴消。乳鉢內同杵勻。每用一錢至二錢。冷水加薑汁調塗太陽。或新汲井水調妙。熱癬以涼米湯水調。搽患處。

祛風膏

治急慢驚搐。臍風撮口。牙關緊閉。痰涎壅盛。咽喉腫痛。

歲靈仙

去蘆一兩半細
剉焙研爲末

右用皂莢三兩。去皮弦。搥損。挪溫水一盃。絹濾過。慢火熬若稀糊。入醇醋半兩。

再熬三五沸。去火候冷。用前藥末亭分。乳鉢內杵勻。圓芡實大。先用鹽梅肉擦牙根。次以此膏一圓或二圓。溫白湯濃調。抹入左右牙關內。卽開。續進別藥。熬時得瓦器爲上。銀器尤佳。及解風痰壅盛。淡薑湯調化。無時少與含嚥。咽喉腫痛。溫茶清調下。或薄荷湯。

千金膏

治水瀉疳瀉。下痢赤白。腹痛煩渴。

橡斗子一兩

細茶

白薑

甘草三錢各半

白芷五錢

右件剉焙爲末。煉蜜圓芡實大。每服二圓至三圓。溫米清湯空心化下。入醋。與蜜相亭。爲膏尤妙。湯溫化服。

丹飲門

丹類

水晶丹

治驚積。食積。蟲積。腹脹。煩啼。惡心。食減。面黃。並宜通利。此藥有頑積。驚重。風緊。涎多。熱極。乃可服。非常用之劑。及急驚後。風痰未盡。免生癡疾。宜再投。

南星劉作小塊半 夏味各三錢 滑石四錢 輕粉五十

淨蕪荑仁二百 巴豆五十粒去殼全者湯泡七次又去心膜作二邊水煮少時曬乾碎切

右前三味焙為末。拌和輕粉外。蕪荑仁。巴豆二味同碎切。在乳鉢內細杵。入前藥末再杵勻。如烏犀圓內。製麵糊。圓麻仁大。每服十五圓。至二十五圓。或三五圓。糯米湯泡葱白取汁。小盞五更初空心下。過三五行。進勻氣散調補。下風痰用淡薑湯空心服。

不驚丹

治因驚氣而吐逆作搐。痰涎壅塞。手足掣縮。目睛斜視。常服疏風順氣。自不作驚。和脾胃。進飲食。

枳殼同上製一兩 淡豆豉焙乾 茯苓去皮 南星同上製三

嫩梢五十尾 淨蕪荑仁二錢半先入乳鉢

右除蕪荑外。餘五味焙為末。再同蕪荑乳鉢內杵勻。醋煮糯米粉糊為圓。周歲

內嬰孩粟穀大。每服三十圓至五十圓。乳汁下。三歲以上者。麻仁大。每服五十圓及六十圓。溫米清湯下。候一時得喫乳食。

鶴頂丹

治陰陽二證結胸神妙。勝陷胸。承氣。瀉心三藥。

明白礬一兩 真銀硃半兩

右二味同研爲末。用熨斗盛。少炭火坐小瓦盞在上。平抄礬硃末一錢入盞中。鎔化。急刮出。就搓成圓。如有前證。每用一圓。研細茶清調勻。溫服。或入薑汁少許同炒下。聽心上有隱隱微聲。結者自散。不動藏府。不傷真氣。無問虛實證。皆可投。白礬能化痰解毒。銀硃是水銀或硫黃煉成汁。專破積聚。故治結胸。

黑虎丹

治諸般風證。

草烏去黑皮用川烏去黑皮用甘草七味各半麻黃根節去

甘松 熟乾地黃淨洗 藿香葉 白芷

油煙墨燒存性 猪牙皂莢 川芎 當歸

何首烏

南星生用

僵蠶去絲

赤小豆

羌活

白膠香

木鼈子去油半斤

右件剉碎。或焙或晒。研爲細末。糯米粉煮糊。圓麻仁大。每服三十圓至五十圓。或七十圓。稍空心用淡薑湯下。兒小者。圓作粟穀大。治法如前。

祛暑丹

治小兒暑月五心煩熱。睡臥不穩。無時咳嗽。及小便少。乳食減。渴飲水漿。

硃砂末水飛三錢

黃芩末

甘草末半兩

五苓散末二兩

右件和勻。煉蜜圓芡實大。每服一圓至二圓。麥門冬熟水無時化服。臨睡時投亦佳。

四神丹

治水瀉赤白痢。

淨黃連三錢

黃蘗去粗皮七錢

白薑

當歸酒洗焙乾半斤

右四味薄剉。或曬或焙爲末。用烏犀圓內製飯糊。圓麻仁大。每服三十圓至五十圓。烏梅煎湯空心下。其他病證。多好甘甜鹹美。惟瀉痢惡之。專喜酸苦澀淡。

為上。故以烏梅作湯。使兒小者圓粟穀大。下法同前。

祛瘧丹

治瘧疾經久不瘥。

常山二兩 烏梅和枝一兩 紅丹半兩

右除烏梅屋瓦別焙。常山或曬或焙。仍同烏梅。紅丹研為細末。糯米粉煮糊圓。麻仁大。每服三十圓至五十圓。未發前涼酒空心送下。或隔晚酒下。重則二服。輕則一服。忌雞麵羊生冷飲食毒物。

飲類

百傷飲

主百物所傷。感冒風寒邪氣。不拘冷熱二證。並宜可服。惟慢驚慢脾不用。

乾葛三兩 淨香附二兩 升麻淨洗 青皮去白

陳皮去白 穀芽淨洗 麥芽淨洗 桔槓剉炒

紫蘇和根 縮砂仁 甘草 神麴炒

赤芍藥各一兩 麻黃同上 枳殼同上 錢半

赤芍藥各一兩 麻黃同上

枳殼同上 錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。或入薑、葱同煎。有積加水、酒、麴。熱多添燈心、竹葉煎投。

速效飲

治長成小兒。因他物或跌著觸損兩目。血脹腫痛。

荊芥穗

薄荷葉二味各半兩

草決明微炒一兩

甘草三錢生用

右爲粗末和。半生半炒。芝麻等分。炒二錢。在掌中盛。以乾喫咀嚼。味盡。吐去渣。如此法投三五次即效。

柴胡飲

治骨蒸疴氣。五心煩熱。日晡轉盛。口乾無味。渴多身瘦。胸滿痰緊。小便黃色。食減神昏。

北柴胡去蘆洗

人參去蘆

當歸酒洗

黃芩

赤芍藥

甘草炙六味各一兩

大黃生用

桔梗去蘆炒

北五味去梗

半夏同上製四味各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。爲梅小角。薑二片。煎七分。無時溫服。

四順飲

治血脈壅實。藏府生熱。頰赤煩躁。四肢驚掣。及因乳哺過傷。寒暄失理。令兒腸胃不調。蘊蓄積滯。並風熱結核。頭面多生瘡癩。目赤咽痛。

當

歸二兩酒洗

大

黃半兩

赤芍藥三兩

甘草一兩

右件劉焙為末。每服一錢。湯調溫服。不拘時。

清肺飲

治肺受風邪客熱。嗽聲不斷。氣促喘悶。痰壅鼻塞。流涕失音。及解時行疹毒豆瘡。涎多咳嗽。咽痛煩渴。

人

參去蘆半兩

柴

胡淨洗二兩

杏

仁湯泡去

桔

梗劉炒

赤芍藥

荆

芥

枳

殼同前

桑白皮劉炒

北五味

麻

黃同前

半

夏同前製九旋覆花五錢

甘草半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。無時溫服。或入薄荷同煎。

沖和飲

治感冒風寒。頭疼發熱。肩背拘急。惡心嘔吐。腹痛膨脹。兼寒溼相搏。四肢拘急。冷氣侵襲。腰足疼痛。

蒼朮同上製一人 參去蘆 前胡去蘆 桔梗剉炒三味

枳殼同上 麻黃同上 陳皮去白三味 川芎

白芷半 夏同上 當歸酒洗 薄桂去粗皮

白芍藥 赤茯苓去皮七味 薑 厚朴同上製二錢

甘草炙半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。無時溫服。傷冷惡心嘔吐。煨薑同煎。開胃進食。加棗子煎。空心溫投。寒疝痛。入鹽炒茱萸。茴香同煎。

明目飲

治心脾蘊熱。肝受風邪。致兩目羞明。經久不瘳。

山梔仁 淨香附二味各 夏枯草去根

右件咬咀。每服二錢。水一盞。蜜大匙。煎七分。無時溫服。

玉露飲

浴頰赤咽乾。心煩躁。睡不穩。身熱頭痛。兼中暑發渴昏悶。小便不通。驚氣入腎。夢中齧牙。加金珠散。薄荷湯。空心溫服。

寒水石 中有細微以碎者是

石膏 潔白堅硬而有渣壁者是二味各一兩重

甘草 二錢曬乾天陰火焙

右除前二味外。甘草剉曬或焙。同為細末。每服半錢至一錢。溫湯無時調服。或麥門冬熟水。

寬氣飲

主通利關節。除胸膈痞結。消痰逐水。進美飲食。及治蓄氣而成搐。傳變急慢驚風。氣逆不和。精神昏倦。

枳殼 同上

枳實 同上製二兩入

甘草 炙二味

右件剉焙為末。每服半錢至一錢。淨湯無時調服。驚風痰搐加薑汁。葱湯同調。熱極者入寬熱飲。薄荷蜜湯調下。或麥門冬湯。

菘豆飲

解誤服熱劑。煩躁悶亂。或作吐或狂渴。宜先投之。次服對證藥劑。

菘豆粉一升

淨黃連

乾葛

甘草三兩各

右除菘豆粉外。餘三味或曬或焙為末。入乳鉢同菘豆粉杵勻。每服半錢至一錢。溫酒調服。

寬熱飲

主伏熱在裏。風痰壅滿。氣促昏悶。或脾胃停滯。日久飲食減少。面黃脈實。發熱無時。並宜可服。

枳

殼去麩一兩剉片巴豆十五粒作二邊去

大黃一兩

粉

草七錢

玄明粉二錢

右前三味。剉焙為末。臨入玄明粉。乳鉢內同前藥末杵勻。每服半錢至一錢。兒小者抄一字。並用薑蜜湯無時調服。或薄荷湯。

赤蒼飲

主脾胃因虛受溼。面浮而黃。或徧身作腫。飲食減少。氣不升降。小便赤色。腹肚膨脹。咳嗽有痰。及腫後當服神妙。加草果仁炮過。水薑棗煎投。

赤茯苓去皮

蒼朮同上製二味

枳

殼同上製

薑 香和根

半 夏同上

淨香附

紫 蘇和梗

厚 朴同上

陳 皮去白 薑六錢 甘草二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

化蟲飲

治化蟲毒在腹作痛。

檳 榔

酸石榴根皮淨洗焙乾二

紅 丹服過

雷 丸

貫 衆如雞頭 使君子肉薄切焙四味

甘 草炙

枳 殼同上 大 黃三錢

右為細末。用清油煎雞子一枚。如春餅樣。候冷抄藥末一錢於上攤勻。空心捲

而食之。兒小者用糯米粉水煮糊團。粟穀大。每服十五圓至三十圓。以淡猪肉

汁空心下。雞肉汁亦好。

玄參飲

治瘰癧證。及頸上生惡核腫痛。

玄 參

升 麻二錢

川 烏炮裂去

草 烏炮裂

當歸酒洗

川芎

赤葛

生乾地黄

赤芍藥七味各二錢半

甘草三錢

大黃半生四錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

參香飲

治胃虛作吐。投諸藥不止。

人參去蘆一兩

沉香

丁香

藿香和梗

南木香四味各二錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。去渣。臨入薑汁少許。作三次空心溫服。

健脾飲

健脾養胃。理嘔吐。治瀉痢。及諸病後氣色虛弱。有痰惡心。腹中微痛。飲食減。精神

慢。並宜投服。

厚朴同上製再熟炒入醇醋

人參去蘆二味各一兩

白茯苓去皮

肉豆蔻

半夏同上

益智仁

淨香附五味各

良薑剉片炒

訶子肉二錢各

甘草炙五錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或無時。

五皮飲

主頭面四肢浮腫。時有微喘。飲食不進。

犬腹皮

淨洗焙乾

桑白皮

去粗皮剉炒

茯苓皮

淨洗

生薑皮

略洗焙乾

陳皮

去白

五味

右件咬咀。每服三錢。水一盞。煎七分。無時溫服。此劑但多投自然作效。勿以見

方不重藥為誤。

立效飲

主口內牙根舌上發瘡作痛。致語言飲食不便。咽痛。茶清調下。

淨黃連一兩

北細辛

去葉半

玄明粉二錢

右件細剉。或曬或焙為末。仍同玄明粉乳鉢內杵勻。每用一字。乾點患處。或以

一錢。新汲井水調塗瘡上。兒小者畏苦不肯點。用蜜水調抹爛處及舌上。令

其自化。

沉香飲

治吐痢後。神昏倦怠。飲食減少。脾胃氣虛。水穀不化。或隨時直下。五心煩熱。盜汗常出。或聞食心惡。

沉香

丁香

南木香

藿香葉四味各二錢半

陳皮去白

白朮

半夏同上

白茯苓去皮

肉豆蔻五味各五錢

粉草三錢

右除沉香、丁香、木香不過火。餘七味或曬或焙。仍同前三味研爲細末。每服半錢至一錢。用紫蘇、木瓜煎湯空心調服。棗湯亦好。

拔毒飲

解風熱毒氣上攻頭項。浮腫作痛發驚。及治發斑。

天花粉去粗皮一兩

生乾地黃淨洗

白芷

當歸尾酒洗

桔梗剉片蜜水炒過

甘草五味各半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

藿香飲

理虛化痰。及治脾胃不和。飲食少進。正氣除邪。

人參去蘆 半夏製同上

赤茯苓去皮

甘草炙四兩

蒼朮同上製 陳皮去白

藿香去皮二兩 厚朴同上製

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。空心溫服。或入燒鹽同煎。

參蘇飲

解驚風煩悶。痰熱作搐。咳嗽氣逆。脾胃不和。

人參去蘆 紫蘇和梗 前胡去蘆 乾葛

半夏同上 赤茯苓去皮六兩 枳殼同上 陳皮去白

桔梗剉炒 甘草四兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑三片。煎七分。無時溫服。

紫草茸飲

和益脾胃。催張豆瘡。麻使易收。不致傳變。

紫草茸無炭茸取近 人參去蘆 黃耆生用

當歸酒洗 白芍藥 甘草半兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。糯米五十粒。煎七分。無時溫服。或入棗一枚。去核。

同煎。

天麻飲

治諸般風搐。不省人事。

天麻 糊亮

川

烏炮製法皮二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑三片。慢火煎若稀糊。無時勤與溫服。

黑白飲

治臍風氣實者。及急驚壯熱發搐。

黑牽牛 半炒

白牽牛 半炒

大黃 生用

陳皮 去白

檳榔 五味各

甘草 三錢

玄明粉 二錢

右除檳榔不過火。餘五味或曬或焙。仍合檳榔為末。同玄明粉入乳鉢再杵勻。每服半錢至一錢。溫蜜湯調化。空心投服。或無時。此藥新合最妙。久則效遲。

白附飲

治肝風剋脾土。痰涎壅盛。和飲食吐出。蓋風能生痰。痰壅甚食故吐出。

白附子

南星 生用

半夏 夏生用

川烏 生用仍去皮

天麻明亮

陳皮去白

南木香

全蠍去尾

僵蠶去絲

丁香香

右件咬咀。每服二錢。水一盞半。薑三片。慢火煎七分。作五次空心溫服。

二仙飲

治瘧疾。不拘歲月遠近。

青蒿法槩二兩五月五日采暴乾用

桂枝去粗皮

右二味。剉曬為末。每服一錢。寒熱未發前。用涼酒調服。或先隔晚。亦以酒調下。加香薷華二兩。好茶芽半兩。合研成末。又名斬邪飲。治證下法同前。療暑瘧尤勝。

雙金飲

治下痢赤白。晝夜頻密。及泄瀉經久。

大罌粟殼法去蒂剉碎蜜水透晒乾一兩

大川芎剉碎釀醋炒透候乾半兩

右二味。再曬或焙為末。每服一錢至二錢。用粳米清湯空心調服。或溫蜜湯。

大順飲

多。解冒暑毒。煩渴吐瀉。腹痛發熱神昏。或衄血咯血。及大府下血。小便黃少。口乾汗

細 麵二十

生 薑兩六

赤茯苓去皮

粉 草二各五兩

右先以生薑方切如菜豆樣。石鉢內略杵爛。入麵再杵勻。攤作薄片。烈日中暴乾。赤茯苓粉草二味。細剉。同前薑麵片。或曬或焙。合研爲末。每服一錢至二錢。新汲井水無時調服。或溫熱湯。

快斑飲

治痘瘡出不快。

麻 黃去節存根一宿焙乾

紅色麴半兩

薄 桂去粗皮

甘 草二各三錢

右剉焙爲末。每服一錢。用溫白湯無時調服。

消暑清心飲

解伏熱中暑。煩躁作渴。神氣不清。及有驚搐。名暑風證。投之卽效。

香 薷去老根

澤 瀉去粗皮一兩 扁 豆同上

淨黃連

羌活

猪苓去皮

厚朴同上

白朮

乾葛

赤茯苓去皮

升麻

川芎針味各

甘草二錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時帶涼服。治暑風證。先投此劑得效。次服卻暑丹。其搐不致再發。

定喘飲

治夾風痰喘氣促。不拘冷熱二證。

人參去蘆

麻黃根節不去

防己去黑皮

訶子去核

半夏同上

甘草六錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。

常山飲

治瘧後單熱不退。

常山

檳榔二兩

烏梅一兩和核

右前二味各剉片。各用醇醋釀一宿。常山炒乾。檳榔曬乾。仍同烏梅咬咀。每服

二錢。水一盞。煎七分。熱未發。先空心帶涼服。仍忌雞酒羊麵生果毒物。有寒熱經久不除者。加此劑於小柴胡湯。或藿香飲內。同煎亦效。

消毒飲

解急驚風毒。赤紫丹瘡。壯熱狂躁。睡臥不安。胸膈滿悶。咽喉腫痛。九道有血妄行。及徧身瘡疥。

牛蒡子 六兩

荊芥穗 二兩

甘草 一兩

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

縮砂飲

和胃氣。消宿食。及理腹痛。快膈調脾。

沉香 一兩

縮砂仁

烏藥 二兩味各

淨香附 四兩

甘草 二錢炙一兩

右除沉香不過火。餘四味剉焙。仍同沉香研為細末。每服一錢。用溫鹽湯無時調服。或空心燒鹽湯調下亦好。及紫蘇棗湯尤妙。

定吐飲

治吐逆投諸藥不止用此神效。

半

夏同前製咬咀如菘豆大篩去細末二兩

生

薑淨洗拭乾和皮二兩薄

桂去粗皮咬咀三錢

右生薑切作小方塊如菘豆大。同前半夏和勻。入小鐺內。慢火順手炒令香熟。帶乾。方下桂再炒勻。微有香氣。以皮紙攤盛。地上出火毒候冷。略簸去黑焦末。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。稍空心少舉緩服。

萬安飲

此劑能推陳致新。除邪輔正。和益脾胃。宣通氣血。調順飲食。疏解風寒。寧心化痰。去煩理熱。不拘證在表裏。並宜可投。常服百病不生。貞元益固。補養諸虛。亦有驗矣。此方與宣明論當歸飲相類不遠。治法最多。其藥品之外。惟加枳殼。半夏。

人

參去蘆

當

歸酒洗

大

黃生用

防

風去蘆

柴

胡去蘆

枳

殼同前製

半

夏同上製

芍

藥淨洗

黃 芩

甘

草十味各一兩

滑

石末六兩

右件咬咀。除滑石末。臨入和勻。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時溫服。或加棗一枚同煎。

金餅門

金類

一字金

治初生嬰孩一七之外。欲成臍風撮口。及卒中急驚慢風。牙關緊閉。痰涎上壅。

疆

蠶去絲

威靈仙

去蘆二味 各四錢

明白礬

二錢 生用

細

辛去葉 一錢

甘

草

生用 二錢半

右件劉焠為末。每服一字至半錢。薑汁沸湯調和。以指抹入牙關內。治卒中急慢驚證。口噤不開。用鹽梅湯調擦上下牙根二處。

一七金

治痘瘡黑陷。或變紫黯色。證在急危。但投此藥。亦能頓蘇而復紅壯。則此劑又勝人齒散。若精神昏慢。口鼻氣冷。不復救矣。

穿山甲

同上 五錢 製

紅色麴炒

川烏

一枚 灰火中帶焦炮 二味各二錢半

右研為末。入麝香半字。同在乳鉢杵勻。每用一匕。用葱白濃煎湯調下。止投一

服或二服。

一抹金

治偏身生瘡。潰爛如糜。梨燥痛膿汁不乾。

黎 蘆淨洗

蛇牀子去埃土

紅 丹火飛過三錢 硫 黃

赤石脂

明白礬火飛

五倍子去內蟲屑 黃 礬去粗皮五錢

輕 粉五十

右前入味。或曬或焙為末。仍同輕粉在乳鉢再杵勻。用生肥猪膏碎切。以瓦鉢和藥末爛杵。塗抹患處。或清油調搽亦可。

餅類

香橘餅

治嬰孩過傷乳食。或吐或瀉。及病後虛中感積成痢。氣弱神昏。面黃目慢。

南木香

陳橘皮去白

青 皮去白三錢 厚 朴同上製

縮砂仁

神 麴溼紙

麥 芽淨洗焙三錢 稜炮剉三錢

右除木香不過火。餘七味剉焙。仍同木香研為細末。煉蜜捻作餅子。如芡實大。

每服一餅至三餅。用棗湯化開。空心溫服。米清湯亦可。

通聖餅

治大府閉澀。連日不通。滿腹膨脹。氣壅悶亂。服藥罔效。

淨黃連二錢

巴豆

生蒜一箇

生鹽半錢

右以黃連剉碎為末。同後三味石鉢內爛杵。捻作餅子。寸半闊。貼臍。緊搓乾艾。切作菜豆大五枚。作五次安臍間餅子上。以火灸之即通。

薑豉餅

治久因溼氣中於膀胱。復為風邪客熱攻激。小便不利。臍凸腹脹。食減作痛。先投解表散。後用此藥貼之。

生薑碎一兩

生葱五根

豆豉七錢

生鹽一錢

生蒜碎七個

醎糟一盞。酒代穿山甲。同上製。

右件入石鉢內同杵爛。捻作餅子。二寸闊。用微火炒熱。帶溫貼臍上。外以絹帕兜住。如冷。依前法換帶溫者貼之。或再以火烘煖亦好。

拾遺

香艾圓

此劑小兒常進。驚積自除。色澤殊異。手足肥健。脾胃調和。兼理男子婦人諸虛不足。生氣血。暖中焦。固養精神。消進飲食。男子服之。身體強壯。寒暑耐安。婦人投之。百病不生。經脈通順。

淨香附一斤

乾艾葉四兩

右二味。瓦器盛。用醇醋浸經七日。於淨鍋內用火煮令醋盡。就炒乾研爲細末。仍用醋煮粳米粉爲糊。入乳鉢亭分杵勻。小兒圓如蘿蔔子。大人圓如梧桐子。每服三十圓至五十圓。或七十圓。湯酒米飲隨意送下。並不拘時。婦人血氣素虛無生育者。加琥珀二兩。同作圓服。極效。粒數湯使下法。亦依前。或用棗湯。

烏白圓

治五六歲以上小兒。頭風苦痛。或一邊作痛。及療耳聾耳。

綿川烏炮煬浸略

去皮

烏略炮

川白芷

蒼

朮如上製

右件剉焙爲末。用生葱汁合麵糊圓。菘豆大。慢火焙乾。晴曬亦好。每服三十圓至五十圓。或七十圓。食後臨臥用溫清茶送下。其葱汁法。用生葱不去根葉。入

水同搗爛取汁

既濟解毒丹

治小兒中熱。睡中咬牙。夢語驚悸不寧。或吐血瀉血。強渴引飲。手足動搖。狀似鬼祟。並宜投服。

淨黃連 五分

黃蘗 去粗皮

黃芩 淨者

大黃 三錢 各半

肉桂 去粗皮

枳殼 同上

白茯苓 去粗皮 各二錢

甘草 七錢 生用

右除桂不過火。餘七味剉焙。仍同桂為末。滴水乳鉢內熟杵。圓菴豆大帶潤。以水飛。硃砂末為衣。陰乾。每服三十圓至五十圓。用麥門冬熟水無時送下。吐血瀉血。梔子仁煎湯下。兒小者。薄荷湯磨化投服。

輕粉散

治長成小兒。蟲蛀牙疼。飲食不便。

輕粉

白礬 生用

雄黃

紅丹 四味 各一錢

麝香 半字

右件入乳鉢細杵為末。先用五倍子、鶴虱、生葱。煮水大半盃。候溫灌漱令淨。次

以前未藥一字或半錢擦患處。六七次即效。

獨聖散

治嬰孩滿口白屑。或如粟穀。糜爛作痛。不能乳食。晝夜煩啼。此名鵝口證。

大北南星剉開白者為佳不拘多少

右件為末。炒一錢或二錢。醋蜜調塗顴門上。於中間留一小指大不塗。及傅男左女右足心。仍以立效。飲溫蜜水調點舌上。令其自化尤佳。

藿香托裏散

治諸腫毒癰疽。已潰未潰者。及疔瘡流注偏身。並內外一切黃證。惡心嘔逆。憎寒壯熱。晝夜疼痛。不拘老少。悉宜服之。此藥非特解毒。大能正氣理虛。祛風去煩。排膿活血。定痛消腫。

藿香

連翹

山梔仁

川當歸酒洗

木通去節

芍藥

僵蠶去絲

甘草入味各二錢半

大黃生用

茵陳

黃耆生用

貝母四味各五錢

右件咬咀。每服二錢。酒水各大半盞。煎八分。病在上食後溫服。病在下食前溫

服。

拔毒散

治癩犬惡犬所傷不拘老幼並宜可投。

斑

七枚去翅足用屋瓦或入糯米同煮不用米

黑牽牛末二錢半取半

右二味和勻用無灰溫酒調作一服空心投其毒自小便中出或從大府過似葡萄酒或如犬形見毒出盡尙覺腹中有痛取用青黛入乳鉢杵勻仍羅爲末每服三錢并花水調下二服不拘時

神應散

治小兒大人虛嗽神效。

罌粟殼

去梗帶剉碎蜜水炒

杏仁湯泡去皮

白膠香淨者水煮

參去蘆

阿膠

剉碎

麻

黃存根

烏梅和核五味

桑白皮去粗皮剉碎

款冬花

淨者四味各一兩

甘草炙一

右件咬咀每服二錢水大盞薑三片棗一枚煎八分空心溫服或不拘時

涼肺散

治小兒大人一切實嗽。

桑白皮去粗皮剉碎蜜

桔梗剉炒

天花粉淨者

乾葛

麻黃根節

薄荷和梗

黃芩

杏仁不去

知母

貝母

木通去節十味

款冬花淨者

麥門冬去心二味 甘草生用一

右件咬咀。每服二錢。水大盞。薑三片。葱一根。煎八分。無時溫服。如有熱氣促。加

大黃製。枳殼各一兩。

玄明粉

治腎水衰虛。肝經邪熱。視物不明。或生障翳。胫肉攀睛。迎風淚出。或如蠅飛油星。或睛澀腫。痛癢不可忍。並皆治之。及療風熱上壅。咽痛口瘡。痰實咳嗽不活。悉宜加諸藥內。自然作效。

明淨朴硝

右於臘月霜雪凝寒之際。用皂莢三兩重。略炮搥碎。溫熱湯六盞。挪去渣浸化。薄皮紙二重濾過澄清。入鐵鍋煮至一半。候溫。傾出瓦盆內。於見天處露一宿。

次早結塊。再用淨熱水六盃化開。入大蘿蔔八兩重。切作二分厚一片同煮。見蘿蔔熟爲度。仍便在瓦盆去蘿蔔片。放在見天處露一宿。次日結塊去水。取去濾乾。入好皮紙袋盛。懸掛當風處。自然成粉。用以點眼。只如常法。治風熱等疾。隨意加減用之。

必勝散

治小兒大人。病中聞飲食藥氣。卽惡心乾嘔。不能療者。

川白芷不拘多少

右件剉曬或焙研爲細末。抄一字及半錢於舌上。令其自化。或用掌心盛之。以舌舐嚥。兒小者。溫淨湯濃調。少與含化。並不拘時。至六七次卽效。

遠徹膏

治大小府秘澀。投諸藥無驗。不拘老幼。並皆療之。

穿山甲尾足上者佳

五靈脂淨者二錢重

右二味研爲細末。次以巴豆二錢重。去殼研碎。和前藥末。仍用大蒜四錢重。去上粗皮三五層。於砂鉢內爛杵如泥。圓作一餅。納臍中。以絹帕繫之。外以掌心

火上烘熱。熨至八九次。聞腹中微響即通。

至聖散

治老幼暴吐。服藥不止者。神驗。

枇杷葉淨刷去葉後毛 半

夏四兩淨者

右件用生薑四兩重。切作菘豆大。拌勻。釀一宿。慢火炒令微焦色。以皮紙盛於地上候冷。每服二錢。水一盞。煎七分。去渣。空心少與緩投。或入諸藥內同煎服。亦效。

八仙飲

治小兒男子婦人血風目疾。經久不瘥。晝夜澀痛。視物不明。甚至生翳散漫。投諸藥未驗者。

生乾地黄淨洗

赤芍藥

大川芎

羌活

川當歸尾酒洗

龍膽草

漢防己

甘草五錢

右件咬咀。每服二錢。水一盞。白蜜半匙。煎八分。去渣。食後臨臥二時溫服。

活幼心書終

跋一

曾世榮活幼新書上中下三卷。上卷爲決證詩賦。中卷爲明本論並拾遺。下卷爲信效方並拾遺。余向曾見此刻多闕失。故未收。後又收得一本。非此刻矣。適從五硯樓以醫書一櫛歸海寧友人。余爲之介。遂檢得是書。中多缺葉。影鈔別本補全。卽所收之又一本。而非原刻也。重付裝池。而識其緣起如此。

嘉慶辛未中秋前二日復翁丕烈識

澄幼心書跋一

跋一

元本活幼心書三卷。每半葉十一行。每行二十一二字不等。蓋至元甲午曾氏原刻全裘。藝風前輩所藏士禮居本也。德顯出處無徵。是書辨證詳明。處方精審。允爲仁人之言。自序備述淵源。極有心得。爰爲重刻。以廣流傳。同治衡陽縣志。及各家著錄。多作新書。黃跋偶沿其誤。千頃堂書目。光緒湖南通志。據抱經堂補元志。並作二卷。殆亦未見全書。明宣德庚戌。有修補本。日本高保甲寅。曾爲校刻。皆不及此本之善。因屬翟君展成鳳翔。蕭君伯丞延平。再三讎校。改正良多。並附校記於後。其昭晰無疑者。不復贅列。庶後之君子。有所考焉。

宣統二年庚戌二月武昌柯逢時

養幼心書 跋二

活幼心書校記

決證詩賦卷上

吳序

善狀

狀原

反激他證

反原

及成效之速

成原

下有者或

或字

皮嫩

嫩原

不言之疾乎

厚

決證詩六論

因有薄荷

原文或係

誤下文有皮嫩

皮厚之訛

皮嫩

嫩原

不言之疾乎

厚

耳作

詩七論

蓋周歲

蓋原

以前作

盡疏

滌積聚

滌原

作條

詩十九

揚睛

揚原

作睛

詩五十一

風痰結聚

風痰原

作本論咳嗽十一改

作冷熱

據明

詩五十六

風溼

溼原

作溼

詩七十一

暑溼

溼原

作溼

賦七十五

腎有證攻

腎原

輕怨咨

咨原

晉代叔和

代原

作伏

明本論卷中

胎寒一

庶漸瘥也

漸原

作壘

夜啼四

遏熱鎮心

遏原

急驚五

目睛

原作

如怒

怒原

勻氣散

止補

勻原

慢驚六

惟戴陰痢

戴原

不可治也

治原

風毒七

營化

營疑

但依前

依原

傷積八

風寒所襲

襲原

熱證九

面慘

慘原

恰五百一十二日

恰原

作目

腹疼

嘔吐

腹原

作腹

中指

獨自

冷作

中指毒

遇晚二發

二疑

傷寒十

皆音省

省原

以無驚

圓

圓原

本書丸

多作

圓

沿宋

藥

疑名

遽然

出外

據原

正氣將衰

正氣二

百骸

骸原

咳嗽十一

癖塊

頑塊

吐瀉十二

詳究治法

究原

養宗筋

宗原

諸吐十三

其吐自減

減原

諸瀉十四

素弱

素原

化癖

圓

癖原

粳米

粳原

作占

案

粳應

作

糞稠

糞原

赤白痢十五

亦效

效原

腫證十六 施洽施原於兩脇脇原作協鴨塘塘原作塘手足背皆腫背原作皆其腫如初其原作甚

脫肛十九 風屬木木原未

癩證二十 七情所汨汨原作汨

瘧疾二十一 閒日而作閒原作閒勻氣散止補勻原作白加草果果原作棊為醫為父母者者原

在醫字下

瘡疹二十六 發之亦少作字原而導赤葛散導字當衍為其藥性藥原作樂異功散功原作攻攻原噬

臍劑原作劑蚊蚤做原做病必致危病原作瘡

陰囊腫二十七 縱弛弛原作張感風溼溼原作溫

驚癱鶴膝二十八 閒服排風湯閒原作閒

五淋三十 而為洩洩原作瘦名曰陰閉閉原作閒薑豉餅豉原作鼓

口瘡三十三 脣弦弦原作弦

諸瘡三十四 及三解散及原作乃木通散閒服閒原作雖

目疾三十五 紅弦弦原作弦

重舌三十七 卷音捲音原作捲札針札原作札

五軟三十八

聊音報

原音昂作勤

諸汗三十九

驚汗

作肝

黃證四十一

兩目眩

作眩

辨藥病不相主對二

所傳藥性傳原

評非時用附子大黃四

侯自牧揚侯原作候下同准

信效方卷下

目錄

使君子圓同原改丸以下

拾遺目錄

凡針四原無今補

白芍藥湯十

臍下痛

臍原

六和湯三十三

水一盞

作盞原

黃耆六一湯三十四

口揚揚原甘草一兩缺一原

坎離湯三十七

甘草

無分數或下二味當是三味

化丹湯四十

石膏末

無分數薄桂下往入味各五錢當移此

雄黃散六

川烏頭

此葉鈔補作川芎按下重

瀉黃散二十七 微炒香 鈔原直 氏作妙 據改

調元散二十八 手足如癩 作簡原

霹靂散五十 白芷三味各二錢 原作 三味據準繩改

麝香人齒散五十六 入腎作胃原

補腎地黃圓九 取皮為用 作用則原

香陸胃苓圓十一 此藥作菘原

二薑圓十二 就帶潤作帶原

沒石子圓十三 肉豆蔻一枚 模糊原刻

二聖圓二十二 逐水作遂原

地黃膏三 納口內作納紙原

烏肢膏六 疥癩詐原 作

劫風膏十四 劫據原 錄改

寬熱飲十一 見微黃色去巴豆片 原作見微去貴 色法巴豆片

白附子飲二十六 白附飲共十味 幼原科準繩去五味 二錢 茲據

拾遺

輕粉散四

五倍子

倍原
作部

麝香托裏散

六

托原
作托
當作

拔毒散七

犬形

形原
作刑

玄明粉十

蠅飛

飛原
作腎
類方
準繩
改

曹炳章主編
中國醫學大成
幼心書

全三冊 實價國幣陸角

中華民國二十六年二月初版

編撰者 元·曾世榮

發行人 沈駿聲
上海北碚建路三三一號

印刷者 大東書局
上海北碚建路三三一號

總發行所 大東書局
上海福州路三一〇號

分發行所
開封 安慶 常州 無錫 信陽
南京 北平 天津 濟南 西安
長沙 漢口 廣州 杭州 重慶
徐州 蕪湖 哈爾濱
大東書局

(本 書 校 對 者 章 瑜)



3.081

5

10(2)3

6