

聖濟總錄



大德重校聖濟總錄總目

運氣

叙例

補遺

治法

諸風門

諸痺門

傷寒門

中暈門

瘧病門

寒熱瘴氣附

霍亂門

肝藏門

膽門

心藏門

小腸門

脾藏門

胃門

肺藏門

大腸門

腎藏門

膀胱門

三焦門

心痛門

心腹門

脅肋附

消渴門

黃病門

胸痹門

膈氣門

嘔吐門

疾飲門

欬嗽門

諸氣門

吐血門

鼻衄門

積聚門 疰癘附

泄痢門 蟲附

水病門

脚氣門

腰痛門

虛勞門

骨蒸傳尸門

諸疰門

陰疰門

大小便門

諸淋門

九蟲門

諸尸門

諸注門 中惡客忤等附

面體門

髭髮門

眼門

耳門

鼻門

口齒門 唇舌附

咽喉門

癭瘤門

癰癩門 諸瘰附

癰疽門 發背附

瘡腫門 疥癬附

金瘡門

傷折門

婦人門

乳石發動門

食治門

符禁門

壽慶門

雜療門

小兒門

補益門

鍼灸門

神仙服餌門



大德重校聖濟總錄目錄卷第一

運氣

甲子

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

以上屬

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

以上屬

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

以上屬

卷第二

運氣

甲午

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

以上屬

甲辰

乙巳

目錄

二

丙午

丁未

戊申

乙酉

庚戌

辛亥

壬子

癸丑

以上屬卷中

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

以上屬卷下

卷第三

叙例

補遺

治法

等差

藥品

湯散

煎煮

服餌

服藥多少

禁忌

治擇

修製

秤兩

升合

婦人

小兒

食治

鍼灸

符禁

補遺

煎厥

薄厥

飧泄

臍脹

風消

心掣

風厥

結陽

結陰

厥疝

心疝

解休

胃疸

蠱病

癰病

勞風

痺氣

骨痺

肉苛

肺消

涌水

鬲消

口糜

處瘕

食亦

鼻淵

衄蟻

鼓脹

血枯

伏梁

瘖俳

厥逆

風成寒熱

風成寒中

風成熱中

腦風

首風

目風眼寒

漏風

胃風

行痺

痛痺

着痺

周痺

胞痺

腸痺

熱痺

白淫

胃脘癰

陽厥

息積

疹筋

厥逆頭痛

脾痺

膽痺

濡寫

鶩溇

三焦約

胃寒腸熱

胃熱腸寒

控晷

陰疝

卷第四



治法

治神

治宜

平治

本標

通類

逆從

奇偶

輕重

補益

湯醴

汗

吐

下

漬浴

祝由

熨引

按摩

導引

灸

刺

砭石

卷第五

諸風門

統論附

中風

肝中風

心中風

脾中風

肺中風

腎中風

卷第六

急風

卒中風

風癘

風口噤

風口喎

破傷風

卷第七

中風失音

中風舌強不語 柔風

攤緩

風痺曳

賊風

卷第八

中風身體不隨

中風四肢拘攣不得屈伸

風脚軟

風腰脚不隨

風痙

風角弓反張

卷第九

偏風

風偏枯

中風半身不隨

風痲

肉苛

卷第十

歷節風

中風百節疼痛

風身體疼痛

風走注疼痛

白虎風

風腰脚疼痛

卷第十一

風脹腿

風不仁

風瘙痒

風痞癩

風瘙癢疹

卷第十二

蠱風

刺風

風氣

肌肉瞤動

風冷

風熱

中風發熱

卷第十三

漏風

風消

熱毒風

勞風

風成寒中

風成熱中

風成寒熱

卷第十四

風恍惚

風驚

風驚邪

風驚恐

風驚悸

風邪

風狂

卷第十五

風癲

風癩

風厥

首風

腦風

卷第十六

風頭眩

風頭痛

偏頭痛

卷第十七

風頭旋

頭面風

風痰

胃風



風秘

風入腹拘急切痛

卷第十八

癰瘍風

白駁

白癩風

紫癩風

惡風

大風眉須墮落

大風出蟲

大風癩病

烏癩

白癩

卷第十九

諸痺門 統論附

肝痺

心痺

脾痺

肺痺

腎痺

痛痺

著痺

行痺

皮痺

肌痺

血痺

脉痺

卷第二十

筋痺

骨痺

腸痺

周痺

風冷痺

風濕痺

風濕痺身體手足不隨

痺氣

熱痺

卷第二十一

傷寒門 統論附

傷寒可汗

傷寒可下

傷寒可吐

傷寒可溫

傷寒過經不解

卷第二十二

中風傷寒

傷寒濕溫

傷寒時氣

傷寒疫癘

傷寒結胸

卷第二十三

傷寒謔語

傷寒潮熱

傷寒煩渴

傷寒煩躁

傷寒厥

卷第二十四

傷寒頭痛

傷寒喘

傷寒上氣

傷寒效嗽

卷第二十五

傷寒乾嘔

傷寒嘔噦

傷寒心悸

傷寒痞滿

傷寒心腹脹滿

卷第二十六

傷寒霍亂

傷寒小便不通

傷寒大便不通

傷寒下痢

卷第二十七

傷寒陰毒

傷寒陽毒

傷寒兼食毒

傷寒發斑

卷第二十八

傷寒發黃

傷寒發豌豆瘡

傷寒發狂

傷寒剛瘧

傷寒柔瘧

卷第二十九

傷寒壞病

傷寒狐惑

傷寒百合

傷寒陰陽易

傷寒鼻衄

卷第三十

傷寒吐血

傷寒瘀血

傷寒口舌生瘡

傷寒舌腫脹

傷寒咽喉痛

傷寒毒攻手足

卷第三十一

傷寒後夾勞

傷寒後勞復

傷寒後骨節煩疼

傷寒後餘熱

傷寒後虛羸

傷寒後虛煩

傷寒後盜汗

傷寒後驚悸



卷第三十二

傷寒後身體虛腫 傷寒後不思食 傷寒後宿食不消

傷寒後不得眠 傷寒後失音不語 傷寒後餘毒攻眼

傷寒後咽喉閉塞不通

卷第三十三

傷寒後變成瘧 傷寒後脚氣 傷寒後腰脚疼痛

傷寒後下痢膿血 傷寒後蠱瘡

辟溫疫合不相傳染

卷第三十四

中暍門 統論附

中熱暍 中暍悶絕

瘧病門 統論附

寒瘧 溫瘧 寒熱往來瘧 痺瘧

卷第三十五

間日瘧 痰瘧 勞瘧

久瘧

鬼瘧

瘧母

卷第三十六

足厥陰肝瘧

手少陰心瘧

足太陰脾瘧

手太陰肺瘧

足少陰腎瘧

足少陽膽瘧

足陽明胃瘧

足太陽膀胱瘧

瘧病發渴

卷第三十七

瘧病發熱身黃小便不利

瘧痢 瘴氣

瘴瘧 寒熱往來

卷第三十八

霍亂門 統論附

霍亂吐利

霍亂嘔吐不止

霍亂四逆

霍亂欲死

霍亂心腹痛

霍亂心腹築悸

霍亂心腹脹

卷第三十九

霍亂昏塞下利

乾霍亂

中惡霍亂

霍亂煩渴

霍亂心煩

霍亂逆滿

霍亂乾嘔

卷第四十

霍亂嘔噦

霍亂下利

霍亂轉筋

霍亂心下痞逆

霍亂後煩躁卧不安

卷第四十一

肝藏門

統論附

肝虛

肝實

肝脹

肝著

肝風筋脉抽掣疼痛

前厥

肝氣逆面青多怒

薄厥

卷第四十二

肝病筋急

疹筋

膽門

膽虛

膽實

膽虛不得眠

膽熱多睡

膽痺

卷第四十三

心藏門

統論附

心虛

心實

心熱多汗

心中寒

心煩熱

心健忘

善笑

癆病

小腸門

小腸虛

小腸實

小腸有寒

卷第四十四

脾藏門 統論附

脾虛

脾實

脾藏虛冷泄痢

宿食不消

卷第四十五

脾痺

穀勞

脾胃冷熱不和

脾胃氣虛冷水穀不化

脾胃氣虛弱嘔吐不下食

脾藏冷氣攻心腹疼痛

脾藏冷氣腹內虛鳴

卷第四十六

脾氣虛腹脹滿

脾胃氣虛肌體羸瘦

脾胃不和不能飲食

脾胃氣虛弱不能飲食

卷第四十七

胃病門

胃虛冷

胃實熱

食亦

胃反

噦

噫醋

胃寒腸熱

胃熱腸寒

卷第四十八

肺藏門

統論附

肺虛

肺實

肺脹

肺消

肺中寒

肺氣喘急

卷第四十九

高消

肺藏傷風冷多涕

肺痿

肺痿咽燥

肺痿小便數

肺藏壅熱

卷第五十

肺癰

肺癰喘急胛滿

肺氣面目四肢浮腫

肺藏痰毒壅滯

肺藏風毒生瘡

大腸門

大腸虛

大腸實

腸垢

虛痲

卷第五十一

腎藏門 統論附

腎虛

腎實

腎寒

腎脹

腎著

解你

瘖俳

厥逆頭痛

腎藏風冷氣

卷第五十二

腎藏風毒流注腰脚

腎藏積冷氣攻心腹疼痛

腎藏虛冷氣攻腹脇疼痛脹滿

腎藏虛損陽氣痿弱

腎藏虛損骨痿羸瘦

卷第五十三

腎虛多唾

骨虛實

髓虛實

膀胱門

膀胱虛冷

膀胱實熱

胞痺

胞轉

卷第五十四

三焦門 統論附

三焦病

三焦約

三焦效

三焦脹

三焦有水氣

三焦俱虛

上焦虛寒

上焦熱結

中焦虛寒

中焦熱結

下焦虛寒

下焦熱結

卷第五十五

心痛門 統論附

心痛

卒心痛

久心痛

肝心痛

脾心痛

胃心痛

腎心痛

厥心痛

卷第五十六

九種心痛

停飲心痛

蟲心痛

冷氣心痛

中惡心痛

惡注心痛

心痛懊懷

心痛不能飲食

心掣

厥逆

卷第五十七

心腹門

心腹痛

心腹卒脹痛

腹痛

腹虛脹

久腹脹

腹脹腸鳴切痛

腹內結強

膜脹

鼓脹

脇肋痛

脇痛煩滿

息積



卷第五十八

消渴門 統論附

消渴

消渴煩躁

消渴口舌乾燥

消渴腹脹

消渴後虛乏

消渴小便白濁

卷第五十九

虛熱渴

暴渴

胃熱渴

久渴

渴利

消渴後成水

消渴後成癰疽

消中

消腎

卷第六十

黃病門 統論附

黃疸

急黃

陰黃

酒疸

穀疸

胃疸

黑疸

女勞疸

卷第六十一

黃汗

三十六黃

胸痺門 統論附

胸痹

胸痹噎塞

胸痹心下堅痞結

胸痹短氣

胸痛

卷第六十二

膈氣門

統論附

五種膈氣

膈氣咽喉噎塞

膈氣嘔逆不下食

膈氣痰結

膈氣宿食不消

卷第六十三

嘔吐門

統論附

嘔吐

乾嘔

痰飲門

統論附

痰癖

支飲

留飲

卷第六十四

冷痰

熱痰

留飲宿食

膈痰結實

膈痰風厥頭痛

卷第六十五

咳嗽門 統論附

效嗽

暴嗽

久嗽

冷嗽

熱嗽

呷嗽

五藏諸效

卷第六十六

效嗽上氣

效嗽嘔吐

效嗽唾膿血

效嗽短氣

效嗽面目浮腫

效嗽失聲

風冷聲嘶

卷第六十七

諸氣門 統論附

諸氣

上氣

上氣胸脇支滿

上氣嘔吐

上氣腹脹

上氣喉中如水雞聲

短氣

冷氣

厥逆氣

陽厥

卷第六十八

吐血門 統論附

吐血

吐血不止

卷第六十九

嘔血

唾血

吐血後虛熱胸中痞口燥

舌上出血

汗血

卷第七十

鼻衄門 統論附

鼻衄

衄不止

大衄

久衄

衄蟻

卷第七十一

積聚門 統論附

積聚

肥氣

伏梁

痞氣

息賁

賁豚

卷第七十二

積聚心腹脹滿

積聚宿食不消

久積癥癖

食癥

諸癥

卷第七十三

結瘕

疝氣

癖氣

寒癖

酒癖

疰癖不能食

卷第七十四

泄痢門 統論附

水瀉

濡瀉

飧泄

洞泄寒中

驚澹

卷第七十五

白滯痢

冷痢

熱痢

赤痢

卷第七十六

血痢

膿血痢

赤白痢

卷第七十七

氣痢

休息痢

蠱痢

久痢

卷第七十八

下痢裏急後重

痢兼渴

痢兼腫

痢後脫肛

疝蠱

濕蠱

卷第七十九

水病門 統論附

水腫

十水

涌水

風水

石水

大腹水腫

卷第八十

水腫效逆上氣

水氣徧身腫滿

水腫胸滿氣急

水蠱

膜外氣

卷第八十一

脚氣門 統論附

風毒脚氣

脚氣緩弱

脚氣痺弱

脚氣痺瘳

脚氣疼痛不仁

卷第八十二

脚氣上氣

脚氣腫滿

脚氣心腹脹滿

脚氣衝心煩滿

卷第八十三

脚氣語言蹇澀

脚氣風經五藏驚悸

脚氣嘔逆

脚氣痰壅頭痛

乾濕脚氣

脚氣變成水腫

卷第八十四

脚氣大小便不通

江東嶺南瘴毒脚氣

服乳石脚氣發動

脚氣雜治膏藥淋瀝等

卷第八十五

腰痛門 統論附

腰痛

卒腰痛

風濕腰痛

腰痛強直不得俛仰

腰脚疼痛

腰脚冷痺

卷第八十六

虛勞門 統論附

肝勞

心勞

脾勞

肺勞

腎勞

卷第八十七

冷勞

熱勞

氣勞

急勞

風勞

卷第八十八



虛勞少氣

虛勞上氣

虛勞欬嗽

虛勞痰飲

虛勞嘔逆

虛勞不思食

虛勞食不消

虛勞寒熱

虛勞潮熱

卷第八十九

虛勞盜汗

虛勞體痛

虛勞羸瘦

虛勞腰痛

卷第九十

虛勞心腹痞滿

虛勞心腹痛

虛勞效唾膿血

虛勞嘔吐血

虛勞四肢逆冷

虛勞驚悸

虛勞不得眠

卷第九十一

虛勞失精

虛勞脫營

虛勞口乾燥

虛勞積聚

虛勞兼痢

虛勞裏急

虛勞浮腫

卷第九十二

虛勞小便白濁

虛勞小便餘瀝

虛勞小便利

虛勞小便難

虛勞大便難

筋極

氣極

脉極

肉極

骨極

精極

白淫

卷第九十三

骨蒸傳尸門

虛勞五蒸

骨蒸羸瘦

骨蒸肺痿

骨蒸痲痺

骨蒸煩渴

傳尸骨蒸

傳尸勞

卷第九十四

諸疝門 統論附

寒疝

心疝

厥疝

寒疝心腹痛

寒疝積聚

七疝

蠱病

陰疝門 統論附

陰疝

卒疝

陰疝腫縮

陰疝腫痛

控晷

卷第九十五

大小便門 統論附

大小便關格不通

小便不通

小便不禁

卷第九十六

小便利多

小便赤澀

小便出血

大便不禁

卷第九十七

大便秘澀

大便不通

結陰

卷第九十八

諸淋門 統論附

卒淋

冷淋

熱淋

氣淋

血淋

膏淋

石淋

勞淋

卷第九十九

九蟲門 統論附

九蟲

虻蟲

寸白蟲

蟯蟲

五藏蟲

三蟲

卷第一百

諸尸門 統論附

諸尸

遁尸

飛尸

尸注

諸注門 統論附

諸注

風注

走注

鬼注

氣注

卒魔不寤

中惡

卒死

尸厥

鬼魅

鬼擊

卷第一百一

面體門

頭風白屑

面黥黥

面肝炮

面皴炮

面皴

面體疣目

孤癩

滅癩痕

髭髮門

統論附

烏髭髮

鬚髮黃白

榮養髭髮

白禿

赤禿

卷第一百二

眼目門

統論附

肝虛眼

肝實眼

肝腎虛眼黑暗

目胎赤

卷第一百三

目赤痛

目赤腫痛

目熱疼痛赤腫

卷第一百四

風毒衝目虛熱赤痛

目風赤

暴赤眼

卷第一百五

目赤爛

目積年赤

目飛血赤脉

目血灌瞳人

赤脉衝灌黑睛

卷第一百六

隆睛

蟹目

目珠子突出

白睛腫脹

目暴腫

目風腫

目睛疼痛

目溢痛

卷第一百七

目痒急及赤痛

五藏風熱眼

目偏視風牽

目風眼寒

目風淚出

卷第一百八

丹石毒上攻目

時氣後患目

目暈

目昏暗

目眵眩

眼眉骨及頭痛

卷第一百九

目見黑花飛蠅 息肉淫膚 目生努肉

卷第一百一十

目内生瘡 目膿漏 目生珠管 斑豆瘡入目

雀目 目瞼生風粟 目瞼垂緩 目瞼腫鞭

倒睫拳攣

卷第一百一十一

目生膚醫 目生丁醫 目生花醫 醫膜遮障

速年障醫

卷第一百一十二

目青盲 將變內障眼 內障眼鍼後用藥

外物傷目

卷第一百一十三

目眇瞤 眯目 鍼眼 鉤割鍼鎌法

熨烙法

卷第一百一十四

耳病門

統論附

耳聾

風聾

勞聾

久聾

五聾

耳聾有膿

耳虛鳴

卷第一百十五

耳疼痛

耳腫

耳内生瘡

耳疔瘰

聾耳

百蟲入耳

耳諸疾

卷第一百十六

鼻病門

統論附

鼻塞氣息不通

鼻塞不聞香臭

艷鼻

鼻中生息肉

鼻痛

鼻淵

鼻流清涕

鼻中生瘡

疳蟲蝕鼻生瘡

卷第一百十七

口齒門

統論附

口瘡

口糜

口吻瘡

口舌乾焦

卷第一百十八



口舌生瘡

口瘻

唇瘡

唇生核

緊唇

卷第一百二十九

重舌

舌腫強

牙齒歷蠱

牙齒疼痛

齒蠱

卷第一百二十

蟲蝕牙齒

腎虛齒風痛

齒風腫痛

齒斷腫

風疔

卷第一百二十一

齒間出血

齒斷宣露

齒齩

齒動搖

牙齒黃黑

牙齒不生

牙齒挺出

措齒

卷第一百二十二

咽喉門

統論附

咽喉閉塞不通

喉痹

馬喉痹

咽喉腫痛

卷第一百二十三

喉中生穀賊  
咽喉生瘡  
咽喉腫痛語聲不出  
咽喉卒腫痛  
咽喉生癰

懸癰腫  
尸咽喉  
狗咽

卷第一百二十四

咽喉中如有物妨悶  
咽乾  
咽喉諸疾

骨鯁  
誤吞諸物

卷第一百二十五

癭瘤門 統論附

氣癭  
癭病咽喉噎塞  
五癭  
瘤

卷第一百二十六

療癭門 統論附

癭癭結核  
風毒氣毒熱毒癭癭  
癭癭寒熱

癭癭有膿  
癭癭久不差

卷第一百二十七

諸癭癭  
諸癭

卷第一百二十八

癰疽門 統論附

石癰

附骨癰

癰內虛

久癰

乳癰

卷第一百二十九

腸癰

胃腕癰

緩疽

石疽

附骨疽

風疽

甲疽

療疽

卷第一百三十

癰疽潰後蝕惡肉

癰疽大小便不通

癰疽托裏法

癰疽等瘡內消法

一切癰疽諸瘡膏藥

卷第一百三十一

發腦

發背

癰疽發背發渴

癰疽發背作寒熱

發背潰後

卷第一百三十二

瘡腫門

諸瘡

諸惡瘡

反花瘡

卷第一百三十三

浸淫瘡

下注瘡

諸瘡水毒焮腫

冷瘡

熱瘡

月蝕瘡

卷第一百三十四

凍爛腫瘡

癩瘡

漆瘡

湯火瘡

卷第一百三十五

灸瘡

諸瘡生肌肉

癩瘡

熱腫

毒腫

結陽

卷第一百三十六

氣腫

風腫

丁腫

諸疥

卷第一百三十七

諸癬

伐指

卷第一百三十八

諸丹毒

癩瘡

肉刺

惡脉

追蝕一切瘡腫

卷第一百三十九

金瘡門 統論附

金瘡血不止

金刃傷中筋骨

金瘡煩悶及發渴

金瘡中風水及瘰

金刃腸出

卷第一百四十

毒箭所傷

箭鏃金刃入肉

狐尿刺

惡刺

竹木刺傷肌肉不出

卷第一百四十一

痔瘻門 統論附

諸痔

牡痔

牝痔

卷第一百四十二

脉痔

血痔

腸痔

氣痔

卷第一百四十三

久痔

痔瘻

痔瘻疼痛不可忍

腸風下血

卷第一百四十四

傷折門 統論附

從高墜下傷損腫痛

傷折惡血不散 筋骨傷折疼痛

傷折腹中瘀血 傷折風腫

卷第一百四十五

打撲損傷 腕折

倒仆蹴傷 被傷絕筋

傷墮致損吐唾出血

傷損止痛生肌 頭傷腦髓出

傷折淋熨貼燭並膏藥

諸骨蹉跌

卷第一百四十六

雜療門 統論附

中藥毒 食毒

食諸菜葷菌中毒

飲酒中毒及大醉不解

服藥過劑

卷第一百四十七

食牛馬猪犬魚蟹中毒

解金銀銅鐵石毒

蠱毒

馬咬并踏傷

卷第一百四十八

馬汗入瘡

獬犬齧

諸蟲齧

蛇螫

蟹螫

卷第一百四十九

蜂螫

蜘蛛蜈蚣傷

蠅蝮尿瘡

中水毒

射工中人

溺水死

自縊欲死

卷第一百五十

婦人門 統論附

血風勞氣

血風走注

血風身體骨節疼痛

風虛勞冷

中風

中風角弓反張

中風偏枯

風邪驚悸

卷第一百五十一

月水不利

月水不調

月水不通

月水不斷

月水來腹痛

室女月水不通

室女月水不調

室女月水來腹痛



卷第一百五十二

帶下

漏下

經血暴下

卷第一百五十三

經血暴下兼帶下

血積氣痛

瘀血

血分

水分

血枯

無子

卷第一百五十四

妊娠門 統論附

妊娠惡阻

妊娠漏胎

妊娠驚胎

妊娠胎動

妊娠胎動下血

卷第一百五十五

妊娠卒下血

妊娠胎萎燥

妊娠胎不長養

妊娠心痛

妊娠腹滿

妊娠腹痛

妊娠心腹痛

卷第一百五十六

妊娠嘔逆不下食

妊娠痰飲

妊娠虛煩懊熱

妊娠效嗽

妊娠傷寒

妊娠下痢

妊娠子淋

卷第一百五十七

妊娠胎間水氣肌膚浮腫

妊娠小便不通

妊娠小便利

妊娠大便不通

妊娠大小便不通

妊娠半產

妊娠數日不產

妊娠數墮胎

卷第一百五十八

妊娠墮胎後衣不出

妊娠墮胎後血不出

妊娠墮胎後血出不止

妊娠諸瘡

產婦推行年等法並安產圖

卷第一百五十九

逆產門

逆產

產難

子死腹中

息胞

卷第一百六十

產後門 統論附

產後血運

產後語言妄亂

產後惡露不下

卷第一百六十一

產後惡露不斷 產後血氣攻腹疼痛

產後血塊攻腹疼痛

產後中風

產後中風口喎

卷第一百六十二

產後中風偏枯 產後中風角弓反張

產後傷寒

產後霍亂

產後寒熱瘧

產後頭痛

卷第一百六十三

產後腰痛

產後嘔逆

產後煩悶

產後虛熱

產後虛渴

產後短氣

產後上氣

產後驚悸

卷第一百六十四

產後咳嗽

產後虛羸

產後汗出不止

產後蓐勞

產後泄瀉

卷第一百六十五

產後下痢

產後腫滿

產後小便不通

產後大便不通

卷第一百六十六

產後大小便不通

產後乳汁不下

產後妬乳

產後乳結核

產後乳結癰

卷第一百六十七

小兒門 統論附

小兒受氣初生將護等法

小兒口噤

小兒撮口

小兒鵝口

小兒重脬

小兒臍風

小兒臍瘡

小兒解顛

小兒顛陷

小兒變蒸

卷第一百六十八

小兒溫壯

小兒壯熱

小兒潮熱

小兒風熱

小兒熱渴

卷第一百六十九

小兒瘡疹

小兒驚熱

小兒急驚風

卷第一百七十

小兒慢驚風

小兒驚悸

小兒驚啼

小兒夜啼

卷第一百七十一

小兒軀啼

小兒驚癇

小兒風癇

小兒食癇

小兒諸癩

卷第一百七十二

小兒天癩

小兒胎風

小兒驚疳

小兒乾疳

小兒漏疳

小兒腦疳

小兒急疳

小兒口齒疳

小兒無辜疳

小兒疳渴不止

卷第一百七十三

小兒疳痢

小兒疳痢久不差

小兒疳蠱

小兒五疳出蟲

小兒諸疳

卷第一百七十四

小兒傷寒

小兒中風

小兒發黃

小兒瘧

小兒木氣腫滿

小兒心痛

卷第一百七十五

小兒宿食不消

小兒腹脹

小兒哺露

小兒丁奚腹大

小兒脾胃氣不和不能飲食

小兒效嗽

卷第一百七十六

小兒效逆上氣

小兒嘔吐

小兒噉

小兒吐喎

小兒乳癖

小兒癥瘕癖結

卷第一百七十七

小兒骨蒸

小兒痰實

小兒容忤

小兒中惡

小兒中蠱

小兒尸注

小兒胎寒

卷第一百七十八

小兒冷痢

小兒熱痢

小兒赤白痢

小兒血痢

小兒膿血痢

小兒蠱毒痢

卷第一百七十九

小兒下痢煩渴

小兒胃風腹脹泄痢

小兒洞泄注下

小兒下痢後脫肛

小兒諸淋

小兒小便不通

小兒大便不通

小兒諸蟲

小兒盜汗

小兒吐血

小兒鼻衄

卷第一百八十

小兒鼻艱塞

小兒鼻多濁涕

小兒腦熱鼻乾無涕



小兒多涕

小兒喉痹

小兒重舌

小兒木舌

小兒燕口瘡

小兒口瘡

卷第一百八十一

小兒語遲

小兒齒不生

小兒咽喉諸病

小兒誤吞物

小兒緊脣

小兒涎液不收

小兒胎赤眼

小兒斑瘡入眼

小兒眼生翳膜

小兒目赤痛

小兒睜耳百歲入耳附

卷第一百八十二

小兒諸丹

小兒遊腫赤痛

小兒癰瘡

小兒疽瘡

小兒瘰癧結核

小兒惡瘡

小兒凍爛瘡

小兒疥

小兒癬

小兒風瘙癢疹

小兒癩疔

卷第一百八十三

乳石發動門統論附

乳石將適失度

乳石發動寒熱

乳石發渴

乳石發動上衝頭面及身體壯熱

乳石發動吐血衄血

乳石發目昏赤痛

乳石發癰疽發背瘡腫



乳石發身體生瘡

乳石發口舌瘡爛

卷第一百八十四

乳石發身體腫 乳石發上氣喘嗽

乳石發嘔逆

乳石發霍亂轉筋

乳石發痞結羸瘦

乳石發心腹脹滿

乳石發下利 乳石發淋瀝

乳石發大小便不通

服乳石備飲食常法

乳石發諸藥不治者

卷第一百八十五

補益門 統論附

平補

峻補

補虛益氣

補虛益精髓

補虛固精

補虛壯元陽

卷第一百八十六

補虛益血

補虛壯筋骨

補虛強力益志

補虛治風

補虛治痢冷

補虛理腰膝

卷第一百八十七

補虛進飲食

補虛調腹藏

補虛消痰

補虛明目

補虛益髭髮

補虛駐顏色

補虛治小腸

補益諸疾

卷第一百八十八

食治門 統論附

食治諸風

食治傷寒後諸病

食治虛勞

食治吐血

食治消渴

食治水病

食治脚氣

卷第一百八十九

食治腰痛

食治心腹病

食治脾胃

食治反胃嘔吐

食治久新咳嗽

食治泄痢

食治赤白痢

食治休息痢

卷第一百九十

食治婦人血氣

食治妊娠諸病

食治產後諸病

食治小兒諸病

食治發背癰疽

食治瘰癧

食治五痔

食治乳石發動

食治耳病

食治目病

食治大腸諸疾

食治五淋

食治小便數

食治蛇蟲

卷第一百九十一

鍼灸門 統論附

骨空穴法 經脈統論

手太陽肺經 手陽明大腸經

足陽明胃經 足太陰脾經

手少陰心經 手太陽小腸經

足太陽膀胱經 足少陰腎經

手厥陰心主經 手少陽三焦經

足少陽膽經 足厥陰肝經

卷第一百九十二

奇經八脈

治五藏中風并一切風疾灸刺法 治風狂灸刺法 治風癩灸刺法

治痺灸刺法 治熱病灸刺法 治寒熱灸法 治瘧病灸刺法

治霍亂灸法 治轉筋灸法 治心腹痛灸刺法

治胸痺灸刺法 治脹滿灸刺法 治消渴灸法 治黃疸灸刺法

卷第一百九十三

治欬嗽灸刺法 治諸氣灸法 治唾血嘔血灸刺法

治吐血灸法 治癥瘕灸法 治腳氣灸法 治水腫灸刺法

治嘔吐灸法 治噦灸法 治水飲不消灸刺法

治骨蒸灸法 治目疾灸刺法 治耳疾灸刺法 治鼻疾灸法

治口齒灸刺法 治失欠灸法

卷第一百九十四

治泄痢灸刺法 治脫肛灸法 治癩疔灸法 治腰痛灸刺法

治虛勞失精灸刺法 治虛勞小便白濁灸法 治諸淋灸法

治遺溺灸法 治小便數灸法 治小便黃赤不利灸刺法白濁附

治胞轉灸法 治中惡灸刺法卒死客忤尸厥等附

治鬼魅諸邪病灸刺法 治卒魘寐不寤灸法

治卒中五尸灸法 治癭氣灸法

治瘰癧痔瘻灸刺法 治痔疾灸刺法

治癰疽瘡腫灸刺法 治癬灸法 治雜病灸法

治婦人諸疾灸刺法 治小兒諸疾灸刺法

灸刺禁忌論 誤傷禁穴救鍼法

卷第一百九十五

符禁門 統論附

持禁總法

行符總訣

咒禁掌訣

護身法叙論

咒童子令說鬼法

禁鬼邪法

禁溫疫法

禁瘧法

禁尸注法

卷第一百九十六

禁客忤法

禁蠱毒法

禁狂疾法

辟怪法

禁夢魘法

禁白虎法

卷第一百九十七

禁瘡腫法

禁百病法

禁諸痛法

禁諸鯁法

禁產乳諸疾法

禁小兒夜啼法

禁惡獸諸蟲法

卷第一百九十八

神仙服餌門

統論附

神仙草木藥上

神仙草木藥下

神仙辟穀

卷第一百九十九

神仙去尸蟲上

神仙去尸蟲下

神仙導引上

神仙導引下

卷第二百

神仙服氣上

神仙服氣中

神仙服氣下

神仙鍊丹

大德重校聖濟總錄目錄終



大德重校聖濟總錄卷第六十八

吐血門

吐血統論

論曰古人論吐血有三一曰內衄二曰肺疽三曰傷胃內衄者近從心肺間津液出還流入胃色如豆汁凝留胃中滿悶即吐如衄血狀是也肺疽者飲酒滿悶即吐血從吐出少或一合多至一升是也傷胃者食飲過度胃冷不化煩悶強嘔食物與氣俱上衝蹙胃腕因致傷損吐血鮮赤是也三者證雖不同要之皆由大虛損及飲酒勞傷所致巢元方曰肺者五藏上蓋也心肝又俱主血上焦有邪則傷諸藏藏傷血下入於胃胃得血則悶滿氣逆氣逆故吐血也孫思邈又曰吐血之後體中但自恹恹然心中不悶者輒自愈凡是之類學者宜審

吐血

論曰吐血病者有三種一則緣心肺蘊熱血得熱則妄行下流入胃胃受之則滿悶氣道賁衝故令吐血二則虛勞之人心肺內傷恚怒氣逆肝不能藏血投虛而出因怒氣逆甚則嘔血三者緣酒食飽甚胃間不安或強吐之氣脉奔亂損傷心胃血隨食出此名傷胃各隨證以治之



治吐血羚羊角湯方

羚羊角

銖三兩

伏龍肝

兩伍

熟艾

炒壹兩

地榆

去土

牛膝

去苗酒浸

牡丹

去心各兩貳

芍藥

炒四兩

阿膠

炒令燥壹兩

柏葉

炙

大薊根

各三兩

雞蘇葉

壹握

蟻曹

慢火炙伍枚

右一十二味粗擣篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎同煎至七分去

滓溫服

治吐血乾地黄湯方

生乾地黄

焙捌兩

伏龍肝

陸兩

芎藭

壹兩

當歸

酒浸切焙三兩

桂皮

去粗

赤芍藥

白芷

乾薑

炮裂各兩

細辛

去苗葉半兩

甘草

炙剉壹兩

吳茱萸

湯浸去涎大豆同炒去豆用二兩

右一十一味粗擣篩每服三錢匕水酒各半盞同煎至七分去滓溫服空心食前服

治肺損吐血嗽血通聖散方

金星石

銀星石

太陰玄精石

雲母

陽起石

不灰木

右六味等分以甘鍋子一枚先入羅過紫冬灰

水牛糞是也

可厚一二寸鋪藥一

重以灰一二寸築令實又鋪藥一重准前以灰蓋後鋪藥盡為度上下以灰封蓋以泥固濟不限藥多少皆用炭一秤於靜室中周密不通風處火煨一日一夜候冷取於淨地掘一坑子深一尺許埋鍋子一宿取出先揀出藥塊子餘以粗羅羅去灰取藥碾為末更入乳鉢研令極細即入罐子內收之每藥末一兩入龍腦麝香各半錢阿膠一分炒同研入前件藥末一兩內合和令勻每服一錢或半錢匕以糯米少許研細入薄荷汁蜜各少許同煎為飲候溫調下空心日午臨卧各一服

治吐血五通散方

巴豆

伍拾枚  
去皮

白麩

壹兩

郁李人

三伯伍  
拾枚

鹽豉

三伯伍  
拾粒

伏龍肝

貳兩

右五味鍋子內炒熟不住手攪以煙青為度傾出放濕地出火毒擣羅為散每服半錢匕溫蜜水調下如患咯血用前件藥末一兩鄆州蛤粉二兩同研羅細每服一錢匕薤汁半盞生油兩點食後調服

治吐血及一切血病諸藥不効者烏金散方

鯪鯉甲

犀角

黃明膠

赤鯪魚皮

各壹兩

胎髮 壹兩

獨角仙 壹枚 翅頭足

右六味用瓦藏瓶一枚底下開竅內藥以紙筋塗固濟暴乾用炭五斤簇燒纔候煙絕撥去火放冷取出細研為散每服一錢匕旋入膩粉少許吐血鼻衄不止新汲水調下產後血運昏迷悶亂不知人冷醋湯下血氣溫酒調下咯血及血積藏毒下血赤白痢血痢盡毒痢腸風及五痔下血並米飲調下臨卧空腹服更相度虛實可加至二匕服藥後取下積聚物為効

治男子婦人咯血吐血阿膠散方

阿膠 炒令燥

白及

白芷

白斂

黃蘗 去粗皮色各壹兩

右五味搗羅為散每服三錢匕糯米粥飲調下空心食前日三小兒量減

治飲食傷肺吐血并嗽血五勝湯方

木香

蜜陀僧

蟬殼 去足

甘草 炙剉各半兩 黃明牛膠 兩片將壹片酥炙壹

片生

右五味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓食後良久溫服

治吐血黃耆散方

黃耆 剉

白及

白斂

黃明膠 炒令燥各貳兩

右四味搗羅為散每服二錢匕糯米飲調下

治吐血綠雲散方

柏葉 百合 人參 阿膠各二兩

右四味搗羅為散每服二錢匕用糯米粥飲調下

治吐血神效金珠丸方

丹砂兩半 金薄四片 蚯蚓三條

右三味先將丹砂金薄研細後將蚯蚓同研和前二味為丸如小皂子大每

服一九冷酒下不嚼

治吐血咯血神効散方

鹿角膠炙令燥 黃蘗去粗皮 杏仁四枚 麩九枚 湯去

右三味搗羅為散每服一錢匕用白麵一錢溫水同調下食後再服

治吐血金粉湯方

熟乾地黄焙 蒲黃各壹兩 芎藭半兩

右三味粗搗篩每服三錢匕水一盞半入糯米十四粒同煎至七分去滓溫

服

治吐血咯血綿灰散方

新綿壹兩 燒灰

黃明膠炙令燥

黃蘗去粗皮蜜炙 為末各壹兩

右三味細研每服一錢匕地黃汁糯米飲相和調下食後臨卧服

治吐血咯血金沙湯方

紫金沙野蜂窠帶 是半兩

貝母去心或 錢生用 盧會壹錢

右三味粗擣篩每服二錢匕水半盞入蜜少許煎一兩沸去滓細呷空心食

後臨卧服

治吐血熱極紫參散方

紫參

阿膠炒燥各 二兩

甘草炙剉 壹兩

右三味擣羅為散每服二錢匕溫糯米飲調下不計時候

治吐血杏蜜膏方

猪脬

壹具用瓷器煮 爛冷水浸去膜

杏人

去皮炙 雙入炒蜜 熱熱各 貳兩

右三味同研飯上蒸入木香附子末各二錢和勻成膏每服半匙酒一盞調

下日三

治吐血藕汁散方

白茯苓

去黑皮

生乾地黄

焙

蒲黃

右三味等分搗羅為細散每服二錢匕生藕汁半盞調勻頓服立止

治吐血獨聖散方

晚桑葉

微焙不計多少

右一味搗羅為細散每服三錢匕冷臘茶調如膏入麝香少許夜卧含化

津只一服止後用補肺藥

治吐血補肺煮肺散方

杏仁

壹伯貳拾粒去皮尖新瓦上焙研

百合

四兩

糯米

壹合

葱白

三莖並同杏人法

右四味和勻猪肺一具入藥在內麻線繫沙鍋內煮水去一半翻轉令熟竹

片切葱藥細嚼蜜湯下服至五具為度

治暴吐血嗽血貫眾散方

貫眾

壹兩

黃連

去須年老者半兩少年者三分

右二味搗羅為細散每服二錢匕濃煎糯米飲調下立止

治吐血雲雪散方

雲雪

寒食麩是

蒲黃

各壹兩



右二味並生用研勻每服二錢匕冷水調下

治吐血香草湯方

莎草根

去毛伍兩

甘草

壹兩剉炙

右二味粗搗篩每服二錢匕水一盞煎取七分去滓溫服

治吐血鹿角膠丸方

鹿角膠

炙令燥

黃蘗

去粗皮各壹兩

右二味搗羅為末入杏仁四十九枚湯浸去皮尖雙入炒黃研細拌勻鍊蜜和丸如櫻桃大每服一九含化嚥津

治諸般吐血朱粉散方

丹砂

研飛

蛤粉

右二味等分研細合和令勻每服二錢匕溫酒調下

治吐血黃藥散方

黃藥子

防己

右二味等分搗羅為散每服一錢匕煎小麥湯調下吐甚者一服減二服定

治吐血異功散方



人參壹兩

右一味擣羅為散以密絹再羅令極細五更雞鳴時打雞子清調如稀糊匙抄服若服一兩人參盡甚好不盡半兩亦可服訖却卧

治吐血槲葉散方

槲葉不拘多少

右一味擣羅為散每服二錢匕水一盞煎五七沸和滓温服不拘時候

治肺損吐血糯米飲方

薜荔

右一味每一二十葉用紙貼放著肉處至乾切不可燥收貼起如有患旋碾羅作細末每服先研糯米濃飲煎若煎餅麩稀稠可八分一盞抄藥末一匙頭同攪調勻臨卧温服

治吐血咯血青金散方

荷葉不拘多少

右一味焙乾擣羅為散米飲調下二錢匕

治吐血黑神散方

栝樓 取端正者紙筋和泥通裹於頂間留壺眼子煨存性地坑內合壺宿

右一味去泥搗羅為散每服三錢匕糯米飲調下再服止

治吐血艾灰散方

艾 不拘多少

右一味燒灰細研每服二錢匕新汲水調下

治忽吐血一兩口地黄飲方

生乾地黄 焙伍兩

王不留行 牡丹皮 各二兩

赤芍藥

萆薢 各四兩

麥門冬 焙去心續斷

牛膝 焙切

阿膠 炙燥各三兩

蟻螬 研伍枚

右一十味除蟻螬外粗搗篩以生地黃汁三升赤馬通汁三升并蟻螬同煎

至三升半去滓分温六服空心食前

治吐血衄血大小便出血竹葉芍藥湯方

竹葉 陸合

赤芍藥

甘草 炙剉各壹兩

阿膠 炙燥三兩

當歸 切焙壹兩半

右五味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓温服食後日二服

治心肺熱極喘滿吐血地黄飲方

地黃汁

生藕汁

小蘗根汁

牛蒡汁

各壹合

生蜜

生薑汁

各壹合

右六味和勻徐徐呷之以差為度

治吐血唾血赤芍藥散方

赤芍藥

當歸

切焙

附子

炮裂去皮臍

黃芩

去黑心

白朮

甘草

炙剉各壹兩

阿膠

炙燥二兩

生乾地黃

焙乾四兩

右八味搗羅為散每服三錢匕空腹溫酒調下日三服

治肺損吐血綿膠散方

新綿

燒灰研

黃明膠

炙燥槁本

右二味等分研勻每服一錢匕臨卧糯米飲調下

治吐血溺血衄血竹茹湯方

青竹茹

剉壹升

芍藥

貳兩

芎藭

當歸

切焙

桂

去粗皮

甘草

炙剉各三兩

黃芩

去黑心三分

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓溫服不拘時

治吐血及大小便血三物湯方

生地黃半兩 阿膠三兩 白斂兩

右三味以咀如麻豆每服七錢匕水二盞煎至八分去滓空腹温服

治吐血方

蛇蛻燒灰

右一味研細每服一錢匕冷熟水調下不拘時候

治吐血天南星散方

天南星壹兩 剉如散子大

右以炭灰汁浸一宿漉出湯洗焙乾擣羅為散每服一錢匕酒磨自然銅調

下

治肺損吐血不止地黄飲方

生地黃兩 研取汁

鹿角膠壹兩 炙燥碾為末

右二味先以童子小便五合於銅器中煎次下地黄汁及膠末打令勻煎令

鎔十沸後分作三服當止

又方

地黄汁陸合 牛皮膠壹兩 生薑壹塊 搗碎細切

右三味先以二味於銅器中煎十數沸次下牛皮膠煎令消濾去生薑分作兩服喫便止或微轉一行不妨

又方

訶梨勒生為末白麵炒

右二味等分每服二錢匕糯米粥調下

又方

白藥四兩燒存性以盞蓋地上出火毒為末每服三錢匕糯米飲調下

吐血不止

論曰藏真高於肺而主氣藏真通於心而主血藏真散於肝而藏血是三者或因愁憂思慮與夫恚怒氣逆傷之則氣亂而血妄行下入於胃胃受之則滿脹其氣衝賁於上故吐血不止也  
治吐血不止極者大効聖散方

金星石 銀星石 禹餘糧

寒水石以上並碎 不灰木 半夏湯洗去滑

蛤粉 大黃剉

右八味等分搗羅為散每服一錢匕新汲水調更入龍腦少許佳兼解五毒

治吐血不止阿膠散方

阿膠炒令燥

生乾地黄焙壹兩

人參壹分

黃蘗去粗皮

蟬殼去土

甘草生剉

黃耆剉各半兩

右七味搗羅為散每服一錢匕糯米飲調下不拘時候服

治吐血不止苧根散方

苧根

人參

白堊

蛤粉各壹分

右四味搗羅為散每服一錢匕糯米飲調下不拘時候

治吐血不止金花散方

黃蘗去粗皮塗蜜

炙令赤二兩

寒食麩微炒

黃明膠炙令燥壹兩

右三味搗羅為散每服三錢匕冷熟水調下食後臨卧服

治吐血不止鼈甲散方

鼈甲壹兩剉

蛤粉壹兩

銚內炒香黃色和於

熟乾地黄壹兩半

右三味搗為細散每服二錢匕食後臘茶清調下服藥訖可睡少時

治吐血不止鬱金散方



鬱金 兩壹

蓮實 去皮

黃耆 對各壹分

右三味搗羅為散每服一錢匕冷水調下不計時候服

治吐血不止二黃湯方

生乾地黄 焙 蒲黃 各壹兩

右二味粗搗篩每服二錢匕水一盞入竹葉七片煎七分去滓放冷細呷食

後

治吐血不止調胃散方

紫背荷葉 焙半兩

黃耆 對壹分

右二味搗羅為細散每服一錢匕生薑蜜水調下不拘時候

治吐血咯血不止白飲湯方

白飲 三兩 阿膠 二兩炙令燥

右二味粗搗篩每服二錢匕酒水共一盞入生地黃汁二合同煎至七分去

滓食後溫服如無地黃汁入生乾地黄一分同煎亦得

治吐血肺損不止白金散方

白麩 九節菖蒲末 各壹兩



右二味再研勻每服二錢匕新汲水調下未止再服如中暑毒氣生薑蜜水調下

治吐血似鵝鴨肝晝夜不止生犀散方

犀角 二兩 鎔屑生用 桔梗 二兩 生用

右二味搗羅為散煖酒調下二錢匕

治吐血成塊不止若葉散方

若葉 半兩 燒灰 楓香脂 壹兩

右二味研為散每服一錢匕煎黃牛皮湯調下不計時候服

治吐血不止人參散方

人參 壹分 天茄子苗 半兩

右二味搗羅為散每服二錢匕新水調下不拘時

治血妄行入胃吐血不止黃耆散方

黃耆 半兩 細剉 五靈脂 壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕新汲水調下不拘時

治吐血不止黃藥湯方

黃藥子

萬州者  
壹兩

右一味搗碎用水二盞煎至一盞去滓溫熱服

治吐血不止槐香散方

槐花

不拘  
多少

右一味火燒存性研細入麝香少許每服三錢匕溫糯米飲調下立効

治吐血不止方

黃櫨木

不拘多  
少剉碎

右一味粗擣篩每服三錢匕以水一盞煎至六分去滓溫服

治吐血不止如聖散方

右用上色白瓷椀樑椎碎搗羅為細末打皂莢子人煎湯調下二錢匕連三

服立愈

治暴吐血不止人參散方

人參

右一味為散每服三錢匕用雞子清投新汲水半盞調下

治吐血不定蒿草飲方

茵草 壹兩 生用

右一味粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓放冷服食後

治吐血不止如聖散方

楓香脂 不拘 多少

右一味細研為散每服二錢匕新汲水調下不計時候

治吐血不止蛛絲散方

大蜘蛛網 壹大塊

右一味於銚中炒令黃色研為散以温酒調下立止

治吐血不止欬嗽補肺百花煎方

生地黃汁 壹升 生薑汁 半升

黃牛乳 壹升 藕汁 壹升

胡桃瓢 拾枚 研

乾柿 伍枚 細剉 研如糊

太棗 二拾壹枚 煮去 皮核 研如糊

清酒 壹升 以上 壹處 入銀鍋 中煎 候

沸方下 後藥

黃明膠 炙燥 為末

秦朮末 各半 兩

杏仁 湯浸 去 皮尖 雙入 炒

右一十一味相次下煎減一半却入上色蜜四兩徐徐著火養成煎後入瓷

合中盛每日三度服每服一匙頭糯米飲調下酒下亦得

治吐血不止紅藍花飲方

紅藍花兩 伏龍肝三兩 犀角鎊壹 甜竹筴三分

白茅根剉 麥門冬去心剉

右六味將伏龍肝汁煎諸藥取六合去滓食後分三服每服更入亂髮灰一

錢匕和勻服

治卒吐血不止阿膠散方

阿膠炙燥 艾葉焙各三兩 地榆 芍藥各四兩 薊根伍兩

右五味粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治心肺蘊熱或恚怒氣逆使血妄行日夕不止土馬駿湯方

土馬駿焙乾 枳實去穢炒 白茯苓去黑皮 秦朮去苗土 甘草炙剉

苈胡去苗 人參 生乾地黄焙各壹兩

右八味粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後溫服

治吐血不止方

生地黄汁

右一味和生蜜每服半盞不拘時候

大德重校聖濟總錄卷第六十八

大德重校聖濟總錄卷第六十九

吐血門

嘔血

論曰愁憂思慮則傷心恚怒氣逆上而不下則傷肝蓋心主血肝藏血二藏俱傷則血不循經隨氣上逆故因嘔而血出也內經曰怒則氣上甚則嘔血

治嘔血唾血效逆氣喘短氣欵冬花丸方

欵冬花

紫苑

去苗土各參兩

杏仁

湯浸去皮共雙入炒

豉

炒各二兩半

桂 去麤皮各半兩

天門冬

去心焙

蜀椒

去目并合口炒出汗

甘草

炙

生乾地黄

焙各參分

柏葉

去梗焙三分

人參

兩半

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸冷熱水嚼下日三夜二

治傷中胸內急痛效嗽嘔血時寒時熱小便黃赤澤蘭湯方

澤葉蘭

六兩

大黃

剉炒

遠志

去心各一兩

人參

兩

麻人

桑根白皮

剉各四兩

右六味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓冷服不拘時

治嘔血鬱金散方



鬱金剉 甘草炙剉各一兩

右二味搗羅為散每服二錢匕井華水調下不拘時

治吐血嘔血五靈脂餅子方

五靈脂一兩 盧會二錢

右二味搗研為末滴水和丸如雞頭大捏作餅子每服二餅龍腦漿水化下不拘時

治嘔血吐血及鼻衄血麥門冬汁方

生麥門冬汁 生地黃汁 生藕汁 冷熱水各一盞 白芍一兩為末

右五味合和勻每服二盞略煎沸溫服不拘時

治卒嘔血羚羊角飲方

羚羊角一兩半 桂去麤皮二兩 大黃剉炒一兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓冷服不拘時

治嘔血不止荊芥飲方

荊芥穗 梔子人 黃芩去黑心 蒲黃各一兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓冷服不拘時

治嘔血煩滿少氣胸中痛阿膠湯方



阿膠炙令燥

甘草炙各一兩半

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生地黄汁三合同煎至七分去滓溫服不拘時

治嘔血荊芥湯方

荊芥穗一兩

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓冷服不拘時

治嘔血比金散方

黃蘗去麤皮蜜炙二兩

右一味搗羅為散每服二錢匕麥門冬熟水調下

治憂恚嘔血煩滿少氣胸中痛生地黄湯方

生地黄斤半

阿膠炙令燥甘草炙各一兩半

右三味以咀如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入大棗二枚擘破煎至七分去滓溫服日二夜一

分去滓溫服日二夜一

治虛勞內傷寒熱嘔逆出血堅中湯方

芍藥

半夏湯洗七遍

甘草炙各一兩半

桂去麤皮一兩

右四味以咀如麻豆大每服四錢匕以水一盞半入生姜一棗大切棗二枚  
擘破同煎至八分去滓入飴糖一分再煎令沸放溫服日二夜一

治嘔血伏龍肝湯方

伏龍肝一兩

生竹筴剉升

芍藥

當歸焙切

黃芩去黑心

芎藭

甘草炙各二兩

生地黄一斤

右八味以咀如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓溫服日三

唾血

論曰邪熱熏於肺則損肺恚氣逆傷於肝則損肝肺肝傷動令人唾血如唾  
中有若紅縷者屬肺如先苦脇下痛而唾鮮血者屬肝可析而治之

治肺氣內傷邪熱熏積效唾有血紫苑散方

紫苑去苗土

欬冬花

當歸焙切

桂皮去麤皮

芎藭

五味子炒

附子炮裂去皮臍

細辛去苗葉

貝母去心

柏葉炒

白朮

甘草炙剉

生乾地黄焙

杏人湯浸去皮共雙人炒各一兩

右一十四味搗羅為散每服三錢匕蜜湯調下日三服不拘時

治肺傷唾血羊肺湯方

鍾乳粉

參雨

半夏

生薑同搗作餅暴乾半兩

桂皮

去麝

陳橘皮

去白焙

白石英

碎

桃人

湯浸去雙皮共炒

貝母

去心

五味子

炒

百部

切

射干

款冬花

甘草

炙

厚朴

去麝皮生薑汁炙各一兩

右一十三味麤搗篩每服三錢七先用水二盞煮羊肺一兩至一盞去肺入

藥末煎取七分去滓溫服日三夜一

治心肺有熱唾血不止石膏湯方

石膏

二兩碎

厚朴

去麝皮塗生薑汁炙

五味子

炒一兩

半夏

生薑汁製暴乾半兩

麻黃

去根節

杏仁

湯浸去皮共雙炒各一兩

小麥

洗二合

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞生薑三片同煎至七分去滓空心日午

夜卧溫服

治肺傷唾血前胡湯方

前胡

去芦頭二兩

小麥

茅根

剉

麻黃

去根節

麥門冬

焙去心

甘草

炙剉各一兩

石膏

碎一兩

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑汁生地黄汁各半合同煎至七

分去滓溫服

治憂恚氣逆肝氣不足唾血不止礬石丸方

礬石熬令汁枯

生乾地黄焙

乾姜炮裂

桂去皮去麤

皂莢炙剖去皮并子

桔梗剉炒

附子炮裂去皮臍各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫水下日三

治恚怒傷肝唾血煩滿脇下痛阿膠散方

阿膠炙令燥二兩

甘草炙剉一兩

右二味搗羅為散每服三錢七以水一盞入生地黄汁二合煎至七分和滓

溫服不拘時候

治肺熱唾血白前湯方

白前

桑根白皮剉

桔梗剉炒二兩

甘草炙剉一兩

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

治肺肝內傷卒唾血生地黄飲方

生地黄二十兩搗絞取汁

阿膠二兩每片如兩指大

右二味每以膠一片入地黄汁一盞內飯甑蒸之取出放溫旋服

治憂恚絕傷唾血胸脇疼痛地黄煎方

生地黃汁五升

右一味於銀石器內慢火煎至三升入白蜜一盞酒一盞再煎至三升每食

後溫服半盞

治唾血不止蒲黃散方

蒲黃一兩

右一味研細每服三錢匕冷水調下不拘時候

吐血後虛熱胸中痞口燥

論曰上焦有邪則傷於藏藏氣傷則吐血人病吐血之後榮衛俱虛陰陽否隔

陽氣不降故身體虛熱胸中煩痞而口舌乾也

治吐血後胸中痞痛口燥不喜食補肺湯方

黃耆細剉

桂去麤皮

生乾地黃焙

赤茯苓去黑皮

厚朴去麤皮生薑汁炙

紫苑去苗土

陳橘皮湯浸去白焙

當歸焙切

五味子各二兩

遠志去心

麥門冬焙去心

甘草炙

鍾乳研成粉

白石英研成粉

桑根白皮剉炒各一兩

右一十六味除別研外麤搗篩再入研藥同和勻每服五錢匕以水一盞半

大棗二枚擘破同煎至一盞去滓温服日二夜一

治心肺壅熱上焦不利吐血胸中痞口乾地黄湯方

生乾地黄焙 地骨皮 玄參 當歸焙切 黃芩去黑心

大黃濕紙裏 煨剉 甘草炙 升麻 藿香葉取 紫苑去苗土

赤茯苓去黑皮 麥門冬去心 焙 桑根白皮剉各一兩

右二十三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓温服不拘時

治吐血後身體虛熱胸中痞隔口舌乾燥茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 黃連去須 生乾地黄焙 梔子人 桂去麤皮

栝樓根各參分 大黃剉炒 一兩 黃芩去黑心 杏人湯浸去皮 麤炒各一兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時温服

治吐血後胸中痞口乾柏葉散方

柏葉焙 蒲黃各一兩 木香 烏魚骨去甲炙 椶皮

當歸洗切 焙 婦人油髮與椶皮二味 燒灰各半兩 阿膠炙燥 一兩

右八味搗羅為細散每服一錢匕用糯米粥飲入地黄汁少許煖令温調下

不計時候服



治吐血後虛熱胸中痞口燥鹿角膠散方

鹿角膠炙燥

阿膠炙燥

秦艽去苗土

糯米炒黃

烏梅去核炒各等分

右五味搗羅為細散每服二錢匕糯米飲溫調下早晚食後臨卧服

治男子婦人吐血後膈上虛熱抵聖湯方

陰地蕨

紫河車剉

貫眾去毛土

甘草炙剉各半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後溫服

治吐血後上脘痞隔虛熱口燥阿膠散方

阿膠炙燥

生乾地黄焙

黃蘗去麤皮蜜炙各半兩

甘草炙剉一分

右四味搗羅為細散每服二錢匕用綿灰蜜湯調下日三服

治吐血後虛熱胸中痞口乾人參散方

人參二兩

阿膠炙燥一兩

甘草炙剉半兩

黃耆細剉一兩半

右四味搗羅為細散每服二錢匕溫糯米飲調下不拘時候

治吐血後虛熱躁渴及解毒茜草丸方

茜草剉

雄黑豆去皮

甘草炙剉各等分

右三味搗羅為細末并華水和丸如彈子大每服一丸溫熱水化下不拘時服

治吐血後虛熱胸中痞口燥鹿角膠散方

鹿角膠炙 黃蘗去麤皮蜜炙各十兩 杏仁四十九枚湯去皮共雙入麩炒

右三味搗羅為細散每服一錢匕用溫水調下不拘時服

治肺藏壅熱吐血心膈煩悶天竺黃散方

天竺黃 人參 側柏葉焙 大黃劉炒 犀角鎊

黃耆劉焙 赤茯苓去黑皮 馬兜鈴半焙各兩 鹿角膠炒燥

右九味搗羅為散每服一錢匕煖生地黄汁調下不拘時

舌上出血

論曰心主血在竅為舌若心藏蘊熱則血得熱而妄行或溢於心之竅故有舌

上出血之證甚者出如涌泉

治心藏有熱舌上血出如涌泉升麻湯方

升麻劉 茜根劉 小薊根劉各一兩半 艾葉去梗 凝水石碎參

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞同煎至七分入生地黄汁一合更煎一

二沸去滓溫服

治心藏熱盛舌上出血香參丸方

人參 生蒲黃 麥門冬焙去心 當歸切焙各半兩 甘草炙劉一分 生乾地黃焙一兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸如小彈子大每服一丸溫水化下日三四服

治心經煩熱血妄行舌上血出不止寸金散方

新蒲黃參錢七 新白麵二錢七 牛黃研 生龍腦各半錢七

右四味同研極細生藕汁調下一錢七食後臨卧服日二

治舌上血出不止阿膠散方

阿膠炒燥 蒲黃 黃耆細劉各一分

右三味搗羅為細散每服一錢七生地黃汁調下併二服

治心經蘊熱舌上血出及諸失血熟艾湯方

熟艾用糯米半合炒 松黃 栢葉炙各半兩

右三味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治舌上出血竅如簪孔紫霜丸方

紫金沙即露蜂房頂上實處是研一兩 盧會研二錢 貝母去心四錢

右三味搗研為末鍊蜜和丸如櫻桃大每服一丸水七分一盞化開煎至五

分溫服吐血衄血每服一丸酒半盞化開服

治舌上忽然血出不止聖金散方

黃藥子兩一 青黛分一

右二味搗研為細散每服一錢七食後新汲水調下日二服

治心藏積熱血脉壅盛舌上血出鬱金散方

鬱金兩一 當歸兩半

右二味搗羅為散每服一錢七煎生姜烏梅湯調下

治舌上血出地黃散方

生乾地黃焙乾 鹿角膠炒令燥

右二味搗羅為散每服二錢七食後糯米飲調下

治舌上出血不止阿膠湯方

阿膠炒令燥 蒲黃兩半

右二味合和勻每服二錢七水一盞煎至六分入生地黄汁一合更煎一二

沸溫服不拘時候

治舌上出血清心散方

刺薊握一

右一味研絞取汁以酒半盞調服如無生汁只搗乾者為末冷水調下三錢  
七兼治大衄

治心藏熱極舌上出血黃蘗散方

黃蘗二兩塗蜜  
慢火炙焦

右一味搗羅為散每服二錢匕溫糯米飲調下

汗血

論曰內經言藏真通於心血脉之氣行焉又曰肝藏血人卧血歸於肝蓋血雖藏於肝而心則行之也若肝心二藏俱傷於邪故血隨心液為汗而出

治肝心傷邪血汗人參湯方

人參

桂去麤  
皮

甘草炙  
剉

白朮

赤芍藥各一  
兩

黃芩去黑  
心

芍藥

當歸切  
焙

淡竹筴各二  
兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治血汗從膚腠出神白散方

人中白

右一味不以多少刮在新瓦上用火逼乾研令極細每服二錢匕入麝香少

許溫酒調下

治血汗如聖散方

郁李人去皮

右一味研細每服一錢七研鵝梨汁調下

治血汗鼻衄不斷吹鼻散方

人中白

右一味瓦上焙乾研為細末每以少許吹入鼻中立差

治吐血或汗血尿血竹茹湯方

淡竹茹

人參

芍藥

桔梗剉

生乾地黄

焙

當歸

焙切

甘草

剉炙

桂皮

去麤

芍藥

各一兩

右九味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓不拘時溫服

大德重校聖濟總錄卷第六十九



大德重校聖濟總錄卷第七十

鼻衄門

鼻衄統論

論曰內經謂脾移熱於肝則為驚衄蓋脾土也肝木也土本畏木今脾移熱於肝則是土氣反盛熱往乘木肝所藏者血其神為魂虛熱勝之故驚而衄也從春至夏者為太陽衄從秋至冬者為陽明衄巢元方曰寸口微芤者衄寸脉微苦寒為衄寸脉微弱尺脉澀發熱而弱為無血必厥其人微嘔夫厥當眩不眩而反頭痛痛為實下虛上實必衄凡是之類皆其脉也孫思邈曰鼻頭白者亡血設令微赤非時者死病人色白昏亡血也凡時行衄不宜斷之如一二升以上恐多者即以龍骨末吹之凡是之類皆其候也以至九竅血俱出者謂之大衄膽移熱於腦熱盛則陽絡溢陽絡溢則衄出血汗者謂之衄鱗治之各有方論

鼻衄

論曰脾移熱於肝則為驚衄蓋木克土者也脾土熱氣移於肝木則神魂驚而血行不由其道肺主氣開竅於鼻血隨氣上今既妄行故出於鼻竅而為衄也治鼻衄伏龍肝湯方

伏龍肝

細辛

去苗葉 各半兩

芍藥

芎藭

桂皮

白芷

乾姜

芍藥

甘草

吳茱萸

白芷

右九味麤搗篩每服三錢七酒一盞煎至七分入生地黃汁一合更煎一二

沸去滓溫服日三

治鼻衄蒲黃散方

蒲黃

柏子人

當歸

阿膠

櫻櫚

亂髮灰

右六味搗研為散每服三錢七生藕節自然汁調下如肺損吐血用地黃

自然汁調下腸風下血用檣根皮煎湯調下婦人帶下艾湯調下

治邪熱上攻鼻衄煩悶比金丸方

鬱金

紫石英

白石英

水銀

甘草

黑鉛

白茯苓

龍腦

右八味除沙子外搗研為末用黃牛膽汁和丸如彈子大每服一丸煎甘草

湯放冷磨下

治鼻衄睡黃散方

惡實一兩半

雄黃研

馬牙消研

甘草生剉各半兩

牛黃研一錢

右五味搗研為散每服二錢七用豬膽汁與新汲水調下相次便睡微有汗出為効如時氣黃發舌脹咽喉腫及熱極者如前法斟酌多少服

治鼻衄搐鼻方

駝糞

右一味不以多少用新藏餅一箇打開底入糞在內燒成灰取出研細用麝

香少許研勻隨衄血鼻搐之

治鼻衄防已散方

防已生用參兩

右一味搗羅為細散每服二錢七新汲水調下老兒酒調一錢七服更用熱

湯調少許鼻中嗅氣佳

治鼻衄烏沙散方

細烟香墨二兩

右一味為細散每服一錢七臘茶清調下

治鼻衄地金湯方

生乾地黄

焙

生乾藕節

各二兩

右二味細剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後臨卧温服  
治肺壅鼻衄玉麈散方

白麩

若葉灰

各三錢

右二味研令勻分為二服食後并華水調下

治鼻衄吹鼻方

百葉石榴花

右一味搗羅為細末每用少許吹鼻中

治鼻衄劄耳方

延胡索

右一味搗羅為末用綿裹劄耳內左衄劄右右衄劄左左右俱衄則兩耳俱

劄

治鼻衄貼鼻方

鹿角膠

不以多少

右一味以沸湯浸軟貼鼻坳上更以麩麩調令稀稠得處若左竅出血則塗

右邊右竅出血則塗左邊

治鼻衄貼背膏方

京三稜大者一枚

右一味以濕紙裹於慢火中煨熟乘熱椎碎搗為細末醋煮麩糊調貼背第

五椎上

治鼻衄剋効湯方

甘草炙

桑耳焙各參分

麥門冬去心焙一兩半

白芷

雞蘇葉

黃耆剉

枳殼去麩炒

槐實炒剉一兩半

百合

連翹各一兩

姜黃二兩

大黃剉炒兩兩

檳榔剉各一兩

白前一兩

右一十四味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生姜三片同煎至八分去滓

溫服

治鼻衄方

燒亂髮灰錢一

人中白半錢

麝香字

右三味合研勻吹少許入鼻中立効

又方

羊脛炭皮拍碎炒令通赤一兩 伏龍肝半兩 麝香一錢

右三味細研如粉每服二錢匕冷水調下或研小蘗汁調下亦得

治肺積熱極衄血吐血方

黃明膠末錢一 桑葉末錢二 伏龍肝半錢

右三味研勻為散糯米飲調下二錢匕

治鼻衄刺蘗湯方

大蘗根兩 相思子半兩

右二味麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓放冷服

治鼻衄血葱白汁方

右以葱白一握搗絞取汁投酒少許點三兩滴入鼻差

衄不止

論曰榮氣之行常與衛氣相隨則氣與血未嘗相離肝藏血肺主氣榮衛和平則氣血順治若人府藏有熱熱乘血氣血性得熱流溢妄行而肺開竅於鼻故其發為鼻衄鼻衄不止者藏虛血盛故也內經又云脾移熱於肝則為驚衄蓋脾土也肝木也今脾移熱於肝則木不能制土肝藏血其神魂故為驚衄之病



治鼻衄不止紫參湯方

紫參

蒲黃

生地黄

各二兩

黃芩

去黑心

赤茯苓

去黑皮

赤芍藥

當歸

切焙各一兩

甘草

炙一兩半

右八味判如麻豆大每服三錢七水一盞入阿膠二片炙令燥同煎至七分

去滓溫服不拘時候

治鼻衄不止刺薊湯方

刺薊

黃芩

去黑心

大黃

剉炒

赤芍藥

各參兩

蒲黃

二兩

側柏葉

四兩

生乾地黄

焙

甘草

炙劉各五兩

右八味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服逐急以新汲水調

下

治鼻衄不止麝香散方

麝香

二錢

滑石

末

人中白

各半兩

右三味同研為散每服二錢七熱酒調下

治鼻衄不止厚朴丸方

厚朴

去麤皮

瓦礫

并沙姜

糞堆土瓜苗心

等分

聖濟金 卷之六  
右三味搗羅為末蜜丸如雞頭大每服三丸葱一握細切麩一匙鹽半錢同炒黃沸湯點下

治鼻衄不止蒲槐散方

蒲黃

槐花

各半兩

防己

人參

各一分

右四味搗研為散每服一錢七新水調下食後服

治鼻衄不止天竺黃散方

天竺黃

芎藭

各一分

防己

半兩

右三味搗研為散每服一錢七新汲水調下肺損吐血用葯二錢七生麩一

錢七水調下並食後服

治鼻衄不止干鐵散方

刺薊

木賊

各一分

白麩

一錢

右三味搗羅為散每服一錢七研青蒿心七枚新水調下併二服

治鼻衄日夜不止頭痛心煩玉粉散方

石膏

研

牡蠣

燒研如粉

各一兩

右二味研勻為散每服二錢七新汲水調下候血滴間斷時再水調為如

稀糊滴鼻內

治鼻衄不止雞蘇散方

雞蘇

參兩

防風

去又兩

右二味搗羅為散每服二錢七溫水調下更以雞蘇葉於新水內揉軟內鼻竅即止

治鼻衄不止二花散方

酸石榴花

一分

黃蜀葵花

一分

右二味搗羅為散每服一錢七水一盞煎至六分不拘時候溫服

治鼻衄不止欲死車前散方

車前子

末

牛耳中垢

等分

右二味和成挺子塞鼻中立止

治鼻衄不止柳枝散方

寒食楊柳枝

門傍插者一兩

人參

一分

右二味搗羅為散每服一錢七新水調下併二服

治鼻衄不止參蓮散方

人參錢一

蓮子心分一

右二味搗羅為散每服一錢匕新水調下

治衄血不止心神悶亂頭旋欲倒通神散方

亂髮燒灰

伏龍肝等分

右二味研為散每服三錢匕新汲水調下

治鼻衄不止栗灰散方

生栗

宣州大者七枚

右逐一微利破皮連皮燒存性椀蓋候冷入麝香少許同研每服二錢匕温

水調下

治鼻衄不止黃藥散方

黃藥子

兩一

右一味搗羅為散每服二錢匕煎阿膠湯調下良久以新汲水調生麩一匙

投之

治鼻衄血不止法紙散方

右病人衄血時以紙接血候滴滿紙於紙燈上燒作灰每一張作一服新汲

水調下不得令病人知

治鼻衄不止燈心散方

燈心焙一兩

右一味搗羅為散入丹砂一錢研每服二錢七米飲調下

治鼻衄不止當歸散方

當歸焙切

右一味搗羅為散每服一錢七米飲調下

治血熱衝肺鼻衄不止蝸牛散方

蝸牛焙乾一分 烏賊魚骨錢半

右二味搗研為散含水一口搗一字入鼻內

治鼻衄血不止吹鼻散方

茆花十莖 亂髮一小團

右二味燒為末研勻每以少許吹鼻內

治鼻衄不止諸藥不驗大蒜貼足方

蒜一枚 蒜皮細去

右一味攤作餅子如錢大厚一豆許若左竅出血貼於左脚心下帛繫定右竅即貼右脚心兩竅俱出即俱貼之血止急以溫水洗脚心令去蒜氣

治衄血不止雞蘇飲方

雞蘇

白茯苓

皮去黑

射干

各一兩半

當歸

切焙一兩

桂

去麤皮半兩

白芷

天門冬

焙去心

甘草

炙各一兩

桔梗

大黃

剉炒各一兩

右一十味吹咀每服二錢七以水一盞生姜三片煎取六分空腹去滓溫服

治鼻衄不止方

五月收刺薊暴乾為散每服三錢七溫酒調下

治鼻衄不止方

右以玄明粉臨卧冷熟水調下二錢七差

又方

右取楮葉搗絞取汁一二升旋飲之即止

治鼻衄不止方

糯米二合

右一味搗羅為散冷水調下三錢七



治鼻衄不止欲絕者

右取芩花無即以根代每服一大把細剉水兩椀煎濃至一椀分二服

大衄

論曰大衄者口耳皆血出是也蓋血為榮而藏於肝氣為衛而主於肺肺開竅於鼻三者相為流通若熱氣乘血而甚則氣血妄行與氣衝錯溢於上竅故鼻衄不已而口耳皆出血也

治大衄不止遠志湯方

遠志去心

天門冬焙去心

當歸焙切

藕節洗淨各半兩

此胡去苗一兩

阿膠炙燥

麥門冬焙去心

大黃剉炒

芎藭各半兩

桂去麤皮一分

甘草炙

牡丹皮參分

沒藥研

麻黃節去

桃核人湯浸去皮共炒令黃色各一分

右一十五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓空心溫服

治血妄行九竅皆出服藥不住者南天竺飲方

南天竺草生瞿麥是搏指大一把剉

大棗去核五枚

生姜一塊指大

燈草如小指一把

山梔子參拾枚去皮

甘草炙半兩

右六味剉入瓷器中水一大椀煮至半椀去滓通口服

治大衄口耳皆血出不止苦參湯方

苦參剉

黃連去須各一兩

大黃炒一兩

梔子去皮七枚

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生地黄汁一合煎至七分去滓溫服

治大衄口耳皆出血不止阿膠湯方

阿膠炙燥一兩

蒲黃半兩

右二味麤搗篩每服二錢匕水一中盞入生地黄汁一合煎至六分溫服急

以帛繫乳隨衄左右繫之兩鼻竅俱出則盡繫兩乳不計時候

治鼻衄至一斗并大衄聖効方

線五兩

人中白一團如雞子黃大

右二物燒為灰研細每服二錢匕溫水調下

治大衄口耳鼻俱出血牡蠣散方

左顧牡蠣燒赤一分

石膏碎一分

右二味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下早晨日午晡時各一服亦可蜜丸

如梧桐子大每服三十九酒下

治大衄不止萊菔酒方

萊菔

不拘多少用

右一味每細剉一合用酒一盞先煎酒令百沸次下萊菔再煎一兩沸放溫

濾去滓頓服

治大衄玉漿散方

白麩

不拘多少

右一味每服三錢七用冷水調下

治九竅出血刺薊飲方

刺薊

右一味每用一握絞取自然汁以酒半盞相和頓服之如無青汁只搗乾者

為末冷水調下三錢七

治鼻中及耳昏出血不止黑神散方

白刺蝟皮

燒灰存性半兩

人中白

半錢

右二味細研為散每用少許搐在鼻中

治大衄口鼻出血血上胸心氣急勞熱生地黃飲方

生地黃

四兩

黃芩

去黑心

赤芍藥

竹茹

各參兩

蒲黃

參大台

地骨皮

五兩

右六味除蒲黃外咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服食後日二

治大衄不止方

右以龍骨末用蘆管吹入鼻中立止

久衄

論曰肝藏血肺主氣今氣與血俱熱故氣溢則血妄行而為鼻衄衄久不差則面色不榮目昏眩冒

治鼻久衄不止桑根白皮丸方

桑根白皮炙剉

黃芩去黑心

甘草剉

當歸切焙各一分

茈胡去芦頭各半兩

胡黃連各一分

羌活去芦頭

防風去叉各一分

人參

地骨皮各半兩

山梔子去皮

訶梨勒煨去核各一分

白茯苓去皮半兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心食前溫酒

下

治鼻衄久不止諸藥不効榴花散方

石榴花暴乾

故綿灰各半兩

人中白一分

右三味同細研更入麝香一錢研勻少吹入鼻中立止

治鼻衄久不止血餘散方

亂髮灰錢一

人中白兩半

麝香錢半

右三味同細研勻每服吹一小豆許入鼻中

治鼻衄不止阿膠湯方

阿膠

炙燥二兩

蒲黃兩一

右二味麤搗篩每服三錢七水一盞入生地黄汁二合同煎至七分去滓温服

服

治鼻久衄鉛丹散方

鉛丹

不拘多少

右一味細研如粉每服二錢七發時新汲水調下

治鼻久衄積年或夜卧血流常數升衆藥不差穀楮葉汁方

穀楮葉

五七把

右一味搗揆取汁日飲一二盞不過四五劑愈

治鼻衄久不止銀粉散方

定州白瓷器

右一味搗研為細散每搐一剋耳許入鼻中

治鼻久衄吹鼻白礬散方

白礬

燒令汁盡半兩

右一味細研羅為散以少許吹鼻中

衄鱗

論曰內經謂膽移熱於腦則辛頰鼻淵傳為衄鱗瞑目夫血得熱則涌溢得寒則凝泣膽受胃熱循脉而上乃移於腦蓋陽絡溢則血妄行在鼻為衄在汗空為鱗二者不同皆熱厥血溢之過也今之治衄鱗者專於治血不知血之行留氣為之本猶海水朝夕陰陽之氣使然也明夫經絡逆順則血與氣俱流通而無妄行之患矣

治衄血汗血熱盛所致竹茹湯方

生竹茹

生地黃切

黃芩

去黑心各二兩

蒲黃

芍藥

麥門冬

去心皮各一兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服日三



治鼻衄汗血黃藥飲方

黃藥去麤皮

葛根剉

黃芩去黑心各一兩半

雞蘇一兩

凝水石二兩

生竹筴兩半

右六味麤搗篩每服三錢七水一盞入生地黄半分切煎至七分去滓食後

臨卧温服

治衄血汗血白藥散方

白藥二兩半

生地黄汁合

生藕汁合

生姜汁許少

右四味搗白藥為末先煎三物汁令沸每以半盞入熟水一合白藥末二錢

七攪勻食後温飲之

治衄血汗血久不止紫參散方

紫參

黃芩去黑心各一分鬱金

甘草各炙半分

右四味搗羅為散每服三錢七以生地黄汁一合白蜜一匙水一盞同煎沸

微温調下日三

治血汗鼻衄不止定命散方

丹砂

水銀

麝香各一分

右三味細研分為二服用新汲水調下

治衄血汗血地黃散方

生乾地黃焙 阿膠炙令燥 各參兩 蒲黃二兩

右三味搗羅為散每服二錢七溫糯米飲調下不拘時

治衄血汗血鬱金散方

鬱金 甘草炙 青黛各半兩

右三味搗羅為散每服二錢七用雞子白調下

治衄血汗血消熱結地黃竹茹湯方

生地黃切焙 一斤 黃芩去黑心 當歸焙各三兩 甘草炙三兩 桂去麤皮 一兩

青竹茹五兩 芎藭三兩 芍藥三兩 釜月下焦黃土一塊如雞子大

右九味呖咀如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

治血妄行或衄或蟻獨聖湯方

黃芩去黑心 五兩

右一味細判如麻豆大每服七錢七水二盞煎至一盞去滓溫服

治熱氣上行衄血汗血刺薊湯方

刺薊

雞蘇葉各二兩

黃連去須

犀角鎊

生乾地黃各一兩

右五味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

大德重校聖濟總錄卷第七十

聖濟總錄

卷七十

鼻衄門

十一



大德重校聖濟總錄卷第七十一

積聚門

積聚統論

論曰積者五藏所生氣之所積名曰積其始發有根本其痛不離其部由陰氣所生也聚者六府所成氣之所聚名曰聚其始發無根本其痛無常處由陽氣所生也然又癥癰癥結者積聚之異名也證狀不一原其病本大略相類但從其所得或診其證狀以立名爾且癥者為隱見腹內按之形證可驗也癥者為癥聚推之流移不定也癰者僻側在於脇肋結者沉伏結強於內然有得之於食有得之於水有得之於憂思有得之於風寒凡使血氣沉滯留結而為病者治須漸磨潰削使氣血流通則病可愈矣

積聚

論曰經曰病有積有聚何以別之積者陰氣也聚者陽氣也陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五藏所生聚者六府所生積之為病其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚之為病其始發無根本上下無所留止其病無常處此積聚之別也

治腹內積聚心肋急滿時吐清水不能食時惡寒鼈甲丸方

鼈甲

去裙襴醋炙一兩半

甘草

炙剉一分

枳殼

去麩炒

防葵

剉

當歸

切焙各一兩

厚朴

去麩皮生薑汁炙三兩

大黃

剉炒二兩

前胡

去芦頭

桔梗

炒

乾姜

炮各一兩

食茱萸

參兩

附子

炮裂去皮臍

白朮

各一兩

檳榔

剉二兩

人參

一兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸温酒下早晚各一服漸加至三十丸

治積聚結實腹滿刺痛泄利不止檳榔湯方

半夏

陳者湯洗七遍焙乾五兩

芫胡

去苗參兩

檳榔

一兩

甘草

炙剉二兩

紫苑

去苗土三兩

陳橘皮

湯浸去白焙各二兩

細辛

去苗葉一兩

紫蘇

二兩

大黃

剉二兩炒

生姜

切焙三兩

附子

一枚炮裂去皮臍

赤茯苓

去黑皮四兩

右一十二味剉如麻豆每服三錢七水一盞煎至七分去滓温服若有癥瘕

癖結加鼈甲去裙襴醋炙並防葵各二兩上氣加桑根白皮剉三兩枳殼去

瓢麩炒厚朴去麩皮生薑汁炙各二兩

治五藏積聚癖氣或有墜損腹滿大黃丸方

大黃

剉炒

桃人

去皮去雙人研如膏各參兩

鼈甲

去裙襴醋炙

乾姜

炮二兩

桂皮

去麩



吳茱萸陳者湯洗炒

檳榔煨剉

京三稜剉

烏頭炮裂去皮

右九味搗羅八味為末與桃人膏研勻鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空

腹日午夜卧煎橘皮湯下

治五藏寒熱積聚臏脹腸鳴而噫食不作肌膚甚者嘔逆若傷寒瘡狀已愈令

不復發三台丸方

大黃剉炒

消石研

杏人去皮共二人

葶藶子隔紙炒

前胡去芦頭

半夏湯洗七

附子炮裂去皮

赤茯苓去黑皮

細辛去苗葉

右九味除研外搗羅為末與消石杏人研勻鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸

食後米飲下常服令人大便調和長肌肉

治積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足通神丸方

蜀椒去目并閉

厚朴去麤皮生

茫消研五

杏人湯浸去皮共雙

半夏湯洗七遍

葶藶子紙上炒

大黃剉炒

附子炮裂去

右八味除研外搗羅為末與杏人芒消研勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十

丸米飲下

治積聚暖血海女人諸疾補益桑黃丸方

桑黃半斤 牛膝酒浸切一斤 桃人去皮共雙入 麥蘖炒 白朮

陳麴炒 當歸切 大黃劉炒各半斤 生地黃十斤絞自然汁 生姜十斤絞自然汁

右二十味搗羅七味為末與桃人膏同入二汁內拌勻瓷器盛甑內蒸一日取出焙乾搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸空腹溫酒下漸加至三十丸

治心腹積聚脹滿繞臍疼痛按之有形寒中有水上氣女人產後餘病大人風

癩小兒驚癇百病烏頭丸方

烏頭炮裂去皮臍 菖蒲米泔浸一宿切焙 芫胡去苗 人參 桔梗炒 黃連須去

厚朴去麤皮生薑汁炙 赤茯苓去黑皮各參分 蜀椒去目并閉口炒出汗 乾姜炮

桂皮去麤 吳茱萸陳者湯洗焙炒 皂莢去皮子酥炙各一兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸空心日午晡時米飲下漸加至十五丸

治積聚瘕氣不能飲食心肋下滿四肢骨節痠疼盜汗不絕白朮丸方

烏頭炮裂去皮臍 白朮 黃耆劉 當歸切 檳榔判

赤茯苓皮去黑 人參 乾姜炮 甘草炙劉各一兩半 牡蠣熬

麥門冬去心

前胡去頭

鼈甲去裙襴醋炙各一兩

防葵剉

桂去麤皮各參分

細辛去苗葉兩

紫苑去苗土

桔梗炒各三分

芍藥一兩

右一十九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心日晚温酒

下漸加至三十丸

治積聚不消累有傷滯食已腹痛飲食不化嘔噦惡心胸脇脹悶大便秘利不

定磨滯丸方

木香 青橘皮湯浸去白焙

桂去麤皮各一兩

吳茱萸湯洗焙乾炒參兩

巴豆霜半錢

硃砂醋熬成霜研末一錢七

右六味搗羅四味為細末入硃砂巴豆霜拌勻醋煮麩糊丸如棗豆大每服

三丸至五丸早晚食後臨寢服大便溏利即減丸數

治積聚不消心腹脹滿化氣消積硃砂丸方

硃砂一分研 大黃剉炒兩

京三稜剉

巴豆去皮心膜出油盡各一分

沒藥剉研兩

乾漆炒煙出

青橘皮焙去白

蓬莪茂剉

鼈甲去裙襴醋炙各一分

當歸剉

烏頭去皮臍

芫花剉搗末一分

桂去麤皮半兩

芎藭分

右一十四味搗羅十味為末用醞醋半升於銅石器內下芫花硃砂巴豆三

味慢火熬漸添醋一升即入十味并沒葯末同熬成膏放冷別入陳麩末一兩半拌和丸如菜豆大每服三丸至五丸茶酒生姜湯任下

治五積氣心腹脹悶噫氣吞酸不思飲食五積丸方

杏人去皮六兩 醋石榴兩 京三稜兩 大戟兩 甘遂兩 烏梅和核一兩

甜葶蘆兩 巴豆和皮雜研 五靈脂 大黃 豉各一兩 芫花各半兩

右一十二味細剉用水一升煮令水盡炒過勿太焦搗為細末醋煮麩糊丸

如菜豆大每服五丸食後溫水下

治一切積滯痰逆惡心霍亂吐瀉膈氣痞滿脇肋積塊胸膈膨悶嘔噦心疼泄

痢不止積氣丸方

代赭石煨醋碎研 礞石研各兩 桂皮去麤 硃砂研 赤茯苓去黑皮

青橘皮去白焙各半兩 胡椒九粒 巴豆研去皮心膜

右八味搗羅四味為末與四味研者和勻酒煮麩糊丸如梧桐子大每服一

丸至三丸食後木香湯下

治積聚留結心腹脹滿胸膈痞悶丁香丸方

丁香 木香 沉香剉 安息香 乳香淨帛裹用沸湯急流過研 硃砂

肉豆蔻

去殼

當歸

焙切

檳榔

剉

陳橘皮

去白焙各一分

巴豆

十粒去皮心膜炒研如膏

京三稜

剉

桂

去麤皮

丹砂

萆澄茄

各一分

附子

炮裂去皮臍一分半

右一十六味先將安息香硃砂乳香三味細研用少許酒浸良久別研巴豆

丹砂并十一味搗羅為末合研令勻用前三味酒煮麩糊丸如麻子大常服

五丸至七丸熟水下若氣痛甚即加至十九生姜湯下亦得

### 取積聚透膜丸方

消石

礞石

各一分二味同研細作汁用皂子參枚旋旋入烟絕為度放冷研每料用末參錢

硃砂

乳香

粉霜

硫黃

膩粉

白丁香

蜜陀僧

京三稜

各一錢

巴豆

二十一粒去皮心膜醋煮紫色研

右一十一味為末研令勻用棗肉丸如棗豆大每服七丸至十九煎生姜橘

皮湯下小兒皂子湯下

治積聚留滯胸膈痞悶嘔噦吐逆心腹刺痛脇肋脹滿噫氣吞酸宿食不消痞

癖結塊四肢倦怠不思飲食妙香丸方

檳榔

一分

桂

丹砂

桃人

去皮共雙兩

麝香

半錢

巴豆

二十五粒去皮

附子

炮裂去皮臍一兩



右七味搗研為末湯浸炊餅和丸如梧桐子大每服一丸食後溫木香湯下  
生薑湯亦得更量虛實加減

治積聚滯氣胸膈痞悶心腹刺痛萬靈丸方

雄黃研 陳橘皮去白焙 京三稜煨 巴豆去皮心膜出

大黃剉炒 肉苁蓉酒浸切焙 乾漆炒烟出 白牽牛末炒

胡椒半 天南星炮 藿香葉分 訶梨勒炮去核

白朮分 杏仁去皮尖雙 木香分 青橘皮湯浸去白

右一十六味搗研為末用薄荷汁煮麩糊丸如棗豆大傷飲食生薑湯下三  
丸至五丸傷酒嚼燒生薑下十九丸婦人血氣心痛酒煎當歸調沒藥末一錢  
七下十九丸

治五積氣胸膈痞悶腹脇脹滿宿飲不消積氣成塊心腹疔痛不能飲食大五

積丸方

砲砂 芫花 乾漆炒出烟 巴豆半兩去皮心 豬牙兒去皮

烏頭炮裂去皮 各參分 以上六味搗羅 四味為末 入陶

大黃蒸熟 龍甲去裙襖 京三稜煨 陳麴炒 桂去麩 木香分



青橘皮 湯浸去白焙

當歸 切焙各一兩

右一十四味搗羅八味為末前膏和丸如菜豆大每服二丸至三丸茶酒任下如要取積量虛實加減服

治五積氣結面色萎黃心腹疼痛口吐酸水發歇有時積年不已沉香丸方

沉香 剉

丁香

木香 各半

硃砂 研一分

巴豆霜 半錢

蓬莪茂 煨剉

桂 去麤皮

乾漆 炒烟出

乾姜 炮

青橘皮 去白焙

京三稜 煨剉

白豆蔻 去皮各一兩

大黃 一兩生為末用醋一升慢火熬成膏

右一十三味搗研十二味為末入大黃膏和丸如梧桐子大每服五丸食後

臨卧生姜湯下

治五積氣嘔吐酸水心腹脹悶不思飲食十味五積丸方

沉香 剉

青橘皮 去白焙

京三稜 煨剉

甘松 各半兩

姜黃

木香

甘遂 炒

芫花 醋炒焦

大戟 炒各一分

牽牛子 炒一兩

右一十味搗羅為末湯浸炒餅和丸如梧桐子大每服七丸至十丸食後臨

卧橘皮湯下

治積滯寬利膈腕思飲食消積丸方

牽牛子末一兩取

丁香

沉香剉各兩

檳榔剉二枚

青橘皮去白焙一兩

木香一兩

桂皮去麤

乾姜炮各半兩

巴豆十粒去皮心膜出油研

硃砂研一兩

右一十味搗研為末鍊蜜和丸如豌豆大每服一九至二丸食後臨卧橘皮湯下

湯下

治五積六聚血瘕氣塊聚散不定及一切氣疾京三稜煎丸方

京三稜煨剉

芫花醋炒

青橘皮去白焙

豬牙皂莢去皮子

蓬莪茂煨剉

硃砂研去石

五靈脂醋炒各半兩

半夏湯洗一兩

延胡索醋炒

乾漆炒烟

附子炮裂去皮臍

桂皮去麤

大戟臑粉調酒

右一十三味搗研為末用好醋三升入葯二停熬成膏再入一停和丸如菜

豆大每服五丸食後生姜湯下

治冷積滯氣心胸痞悶冷氣上攻藏府疼痛木香丸方

木香

桂皮去麤

京三稜煨剉

訶梨勒炮去

白牽牛炒一兩取

檳榔剉半兩

胡椒炒

蓬莪茂煨剉

大黃剉炒各半兩

青橘皮去白焙

右一十味搗羅為末醋煮麩糊丸如菜豆大每服七丸至十九丸食後生姜湯

下

治一切積滯痰逆惡心吐瀉霍亂膈氣痞滿脇肋積塊胸膈膨悶嘔噦心疼泄瀉下痢積氣丸方

大戟

龍膽

木香

杏仁

代赭

赤石脂

水飛研各一兩

巴豆

去皮心膜研出油一錢一字

右七味搗研為末合研極細以麩糊丸如梧桐子大陰乾經十日方可服每

服三丸至五丸木香湯下溫湯熱水亦得

治食積隱見時作攻心脇疔刺疔痛乙丑丸方

礞砂

細研湯內飛過去沙石熬取霜

烏頭

生去皮臍為末各一兩

沉香末

五靈脂末

乾姜末

桂去麤皮為末

胡椒末

巴豆

去皮心膜研各半兩

乾漆末

參分

右九味除巴豆外同研勻次入巴豆再研極細取熟棗肉和作一塊用濕紙裹三五重用紙筋黃土泥固濟約厚半指許燻乾用熟炭火十斤於乙丑日早漸進火燒令香為度以新盆器合候冷取出去泥及焦紙灰不用搗爛看鞭軟再入熟棗肉和納千餘杵得所丸如梧桐子大每服三丸溫木瓜酒下木瓜湯下亦得不計時候服如大段癖積塊及諸冷氣疔刺疔痛或泄痢膿

血食前服五丸至七丸看虛實加減

治府藏積聚癥癖氣塊腹多疝痛按或有形肢節煩熱腰脚痠疼及婦人血癖  
經候不調赤白帶下等疾温白丸方

芫胡去苗

巴豆去皮心膜

研出油盡

紫苑去苗土

各一兩

當歸切二

焙兩

吳茱萸湯浸焙

乾炒

乾姜炮

蜀椒去目并合口

者炒出汗

京三稜煨

剉

菖蒲

赤茯苓去黑

皮

桔梗剉

鼈甲去裙襴醋

炙各一兩

黃連去須

炒

人參

烏頭炮裂去

皮臍

桂去麤皮

厚朴去麤皮生

姜汁炙

黃耆剉各

二兩

皂莢去皮炙

黃一兩

右一十九味搗研為末鍊蜜和搗一千下丸如梧桐子大每服一二九加至

三四丸温酒下利下惡物為度

治五種積聚成塊木香丸方

木香

訶梨勒炮用

皮

大黃剉

炒

檳榔剉

剉

郁李人生研入

各參兩

紫蘇子微炒

枳殼去麤

炒

芍藥

赤茯苓去黑

皮

消石碎

乾姜炮各

二兩

人參三

兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心温酒下三十九至

四十九通利則減丸數

治癥癖積聚牛膝丸方

牛膝

酒浸切焙

芍藥

桔梗炒

大黃炒

芫胡去苗各三兩

枳殼去瓢麩炒一兩一分

檳榔剉一兩

厚朴去麤皮塗生薑汁炙香熟

赤茯苓去黑皮

訶梨勒皮各兩

陳橘皮去白焙一兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心棗湯下加

至三十九通利為度

治一切積聚心腹疼痛年月深久者皆治百歲至一歲并可服百當膏方

丹砂研

膩粉研各半兩

水銀

鉛各一分錫各二分

牛黃

龍腦研

鉛霜研各二錢

粉霜研

陽起石研各一分

黃蠟半兩

巴豆

肥者一百二十粒去皮心膜研出油取霜用

蠟梢炒一分

半夏一錢湯洗去滑二味許羅為末

右一十三味合研極勻鎔蠟并熟蜜少許同和成膏旋丸如梧桐子大每服

三丸至五丸量大小虛實加減服吐逆藿香湯下取熱積生姜蜜水下取冷

積乳香湯下風涎薄荷湯下便秘米飲下

肥氣

論曰凡積氣在左脇下如覆杯有頭足名曰肥氣肝之積也肝藏血故陰多而

陽少病為氣積此由肺病傳肝肝傳脾脾以季夏適王而不受邪氣留於肝故



結為積久不愈令人發欬逆痰瘧連歲不已此陰盛陽虛故也

治久積結癖氣不散左脇下如覆杯咽酸吐水面目萎黃此名肥氣并女子血

瘦蓬蘽根湯方

蓬蘽根 到二兩

檳榔 到一兩半

枳殼 去蘘殼炒參分

生姜 去皮切焙半兩

牡丹皮 到

赤芍藥 各一兩

當歸 焙切

生地乾黃 焙各一兩半

桂 去蘘皮三分

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服空心日晚各一服

治久積肥氣寒熱痰瘧青蒿湯方

青蒿 自然汁一合

生姜 自然汁半合

童子小便 半兩

常山 到參分

此胡 去苗參分

鼈甲 去裙襴醋炙黃

烏梅肉 焙各半兩

甘草 炙到一分

右八味除汁外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分入前三味汁各少

許同煎至一大盞去滓食後臨卧溫服

治肝積肥氣久不已變瘧令人熱多寒少小便赤澀酸棗人丸方

酸棗人 生用

薏苡人

紫蘇子 研炒

木通 到

枳殼 去蘘殼炒

坐拿草

木香

大黃 炒到

黃耆 到

麥門冬 焙去心

升麻

赤茯苓 去黑皮各一兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九漸加至三十九



煎麥門冬湯下

治肝積氣石韋丸方

石韋

拭去毛焙

京三稜

剉

附子

炮裂去皮臍

蜀椒

去閉口及目炒出汗各一兩

吳茱萸

水洗七遍焙乾炒

陳橘皮

湯浸去白焙各一兩

右六味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大空腹煎荊芥湯下二十九

治肝積肥氣結鞭不散木香丸方

木香

大黃

剉各一兩

鼈甲

去裙襴剉二兩米醋三升與大黃同煎醋盡為度焙乾

右三味搗羅為末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九空心食前生姜

湯下

伏梁

論曰內經謂病有少腹盛上下左右皆有根名曰伏梁裏大膿血居腸胃之外不可治治之每切按之至死又曰人有身體脾股胛皆腫環臍而痛病名伏梁此風根也夫氣之所聚名曰聚氣之所積名曰積聚陽氣也故無所留止積陰氣也故有形伏梁心之積也起於臍上故少腹盛上下左右皆有根裏大膿血居腸胃之外故環臍而痛此為風水之病故身體脾胛皆腫名曰伏梁以其若

梁之隱伏也其證有淺深居臍上為逆以邪氣之逆上行也居臍下為從以邪氣之順下行也治法不可動動之為水溺瀆之病故曰論在刺法中

治伏梁積氣鼈甲湯方

鼈甲去裙襖 醋炙黃 京三稜剉 大腹剉 芍藥各一兩 當歸切

芫胡去苗 生乾地黄各一兩半 桂皮去麤 生姜切片炒 各參分

右九味麤搗篩每服三錢七水一盞入木香末半錢同煎至七分去滓空心

溫服日再

治心積伏梁人參丸方

人參一兩 陳橘皮湯浸去白焙二兩 搗末醋一升煎膏 射干 自然銅研如粉 金牙研如粉

枳殼去麤 炒 知母剉 當歸切 焙 細辛去苗 葉 檳榔剉

石菖蒲泔浸一宿切焙 赤茯苓去黑皮 遠志去心 麥門冬去心焙 各一兩

右一十四味除煎研者外搗羅為末入煎研者藥和勻鍊蜜和丸如梧桐子

大每服二十九空心炒生姜黑豆湯下日再稍加至三十丸

治伏梁氣胸下痞痛小便赤澀及驚悸不安夜多夢寐丹砂丸方

丹砂 金牙 馬牙消以上三味 同研細 人參 赤茯苓去黑皮

麥門冬

去心焙

升麻

遠志

去心 豉

各一兩 生乾地黄

焙二兩

右一十味除研者外搗羅為末入研者為拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九臨卧煎桑根白皮葱湯下

治憂積伏梁氣訶梨勒丸方

訶梨勒

煨去核二兩

檳榔

剉參兩半

赤茯苓

去黑皮

芫胡

去苗

枳殼

去穢炒

羚羊角

鎊

黃連

去須

防葵

剉

生姜

切焙各一兩半

黃芩

去黑心一兩

大黃

剉炒參兩半

木通

剉一分兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九空腹米飲下日再漸加至三十九以利為度

治伏梁氣桃奴散方

桃奴

一兩

右一味搗羅為散每服三錢匕空腹温酒調下

痞氣

論曰凡積氣在胃脘覆大如盤者脾積也痞結不通故名痞氣此本肝病傳脾脾當傳腎以冬適王而不受邪氣留於脾故結為積久不愈令人四肢不收

發為黃疸飲食不為肌膚所以然者脾藏肌肉之氣能與胃行其津液以榮養四肢若為積氣所留不能榮養故有四肢不收飲食不為肌膚之證

治脾積痞氣胸脇脹滿氣逆昏悶四肢少力烏頭丸方

烏頭炮裂去皮臍

半夏湯洗去滑焙

防風去

乾姜炮

枳實去麩炒

皂莢去皮炙

木香各一分

右七味搗羅為末生姜自然汁為丸如小豆大早晚用炒生姜湯下七丸至至十丸不可多服

治脾積氣累有傷滯食已腹痛飲食不化嘔噦惡心胸脇脹悶大便秘利不定磨滯丸方

木香

青橘皮湯浸去白焙

桂去麩皮各一兩

吳茱萸湯洗焙乾炒參兩

巴豆霜抄半錢七

礞砂醋熬成霜研末一錢七

右六味搗羅四味為末與礞砂巴豆霜同拌勻醋煮麩糊為丸如菉豆大每服三丸加至五丸早晚食後臨寢服大便澹利時減丸數服

治脾積痞氣攻注腰背痛豆蔻湯方

肉豆蔻去殼

赤茯苓去黑皮

高良姜

附子炮裂去皮臍

草豆蔻去皮

藿香 陳橘皮湯浸去白 人參一兩 桂去麤皮 檳榔一兩

右一味挫如麻豆每服二錢七水一盞半入棗五枚擘生姜一分切碎煎至

八分去滓熱服

治脾積冷氣痞結胸滿痰逆四肢怠墮半夏湯方

半夏陳者湯洗去滑焙乾 葶藶紙上一兩 麥門冬去心焙 蘆根剉碎

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞入小麥淨淘半合生姜半棗大切同煎

至八分去滓空心日午夜卧各一如病人瘦弱即加桂心柏子人各一兩

治脾積痞氣泄瀉日夜下痢白膿礬石丸方

礬石燒令汁枯 訶梨勒煨去核 黃連去須 木香一兩

右四味搗羅為末水浸蒸餅濾如糊為丸如梧桐子大空心食前陳米飲下

三十丸以泄止為度

治脾積痞氣微有滑泄不思飲食蕪美丸方

蕪美四兩 陳橘皮湯浸去白焙乾 附子炮裂去皮 木香一兩

莎草根去毛 白朮一兩

右六味除橘皮外搗羅為末入橘皮煎揆和更入鍊蜜為丸如梧桐子大空



心日午陳米飲下三十九

治脾積痞氣大便不通身重少力肢節疼痛牽牛子丸方

牽牛子一兩半 微炒

甘遂半兩 微炒

京三稜炮

陳橘皮湯浸去白焙乾

訶梨勒煨取皮 各參分

木香一兩

右六味搗羅為末生姜汁二兩蜜四兩同煎至四兩按和前藥末為丸如梧

桐子大臨卧米飲下二十九如不轉加至三十九

治脾積痞氣煩渴口乾葛根丸方

葛根剉

附子炮裂去皮臍去

薏苡根剉

蘆根剉各一分

糯米合二

右五味搗羅為末入桃膠湯浸煮為糊和丸如小豆大食後臨卧燈心杳杷

葉煎湯下十九至二十九

治脾積痞氣身黃口乾胸膈滿悶肌瘦減食或時壯熱脾積丸方

陳倉米一合 醋浸淘過

青橘皮五片 醋浸去白

巴豆五十枚 去皮麻絲繫定參味同炒乾去巴豆不用入後藥

石三稜分

雞爪三稜分

蓬莪茂參枚 炮剉

京三稜一分 炮剉

檳榔二枚 剉

右八味搗羅為末取一半麩糊為丸如棗豆大一半作散每服一錢七粥飲

調下三丸



治脾積痞氣腹膨脹心痛悶不思飲食平氣丸方

檳榔一枚

烏梅核一兩一半去核

京三稜炮半兩

青橘皮去白焙一兩

縮沙去皮半兩

巴豆去皮心別研二錢

胡椒半兩

右七味將六味搗羅為末入巴豆研勻白麩糊和丸如菜豆大每服三丸温

生姜湯下食後服

治脾積痞氣痰逆惡心腹脇滿悶胸膈噎塞可思飲食金液丸方

京三稜炮

蓬莪菹炮

白朮

丁香皮剝去麩皮

牽牛子麩炒

青橘皮

陳橘皮並湯浸去白焙

肉豆蔻大者去殼

檳榔炮各一兩

乾姜炮

丁香

硃砂研各半兩

巴豆半兩和皮秤去皮研如膏紙壓出油盡以不汚紙為度

右一十三味為末攪拌勻用頭醋煮稠麩糊和丸如菜豆大每服五丸米飲

下食後

治脾積痞氣心腹脹滿嘔逆噫酸快氣丸方

檳榔參枚剝

木香一兩

肉豆蔻去殼半兩

甘遂半兩麩炒黃

大戟一分炮

白牽牛一兩炒

墨燒赤醋淬一分

沉香半兩

京三稜炮一兩

陳橘皮湯浸去白焙

青橘皮湯浸去白焙各一兩

右一十一味搗羅為末白麩糊為丸如梧桐子大每服三丸食後生姜湯下  
治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食勺氣湯方

大腹連皮剉 牽牛子生半熟 高良姜炮半 白朮 陳麩炒

桂皮去麩 麥蘖炒各 甘草炮二 郁李人半生

厚朴去麩皮姜汁

右一十味麩搗篩每服三錢七水一盞入生姜二片棗一枚擘同煎至七分

去滓稍熱服日三

治痞氣脇肋滿悶白朮湯方

白朮 苕胡去苗 生姜去皮薄切焙乾 厚朴去麩皮塗生薑汁炙香熟 桂去麩皮各參兩

甘草炙剉 檳榔剉十枚

右七味麩搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服微利為度

息責

論曰凡積氣在右脇下覆大如杯者肺積也氣上責衝息有所妨名曰息責此  
本心病傳肺肺當傳肝肝以春適王而不受邪復責於肺故結為積久不已令  
人洒淅寒熱喘效發肺壅所以然者肺主氣外合於皮毛今肺氣留積故有寒

熱喘效肺壅之病

治肺積息賁氣脹滿效嗽涕唾膿血桑根白皮湯方

桑根白皮

剉

麥門冬

去心焙各一兩半

桂皮

去麤

甘草

炙剉各半兩

陳橘皮

湯浸去白焙

豬牙皂莢

酥炙去皮各一兩

右六味麤搗篩每服三錢七水一盞入生姜半分拍碎煎至七分去滓溫服

空心晚食前一

治肺積息賁上氣胸滿效逆枳實湯方

枳實

去殼炒

木香

檳榔

甘草

炙

吳茱萸

湯浸焙乾炒

葶藶

紙上炒令紫色各半兩

杏仁

湯浸去皮尖雙炒參分

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞生姜一分拍碎同煎至七分去滓溫服

空心食前日二

治肺積息賁下氣防已湯方

防已

大腹

和皮子用各一兩半

郁李人

湯去皮

大麻人

炒

檳榔

剉

陳橘皮

湯浸去白焙

桑根白皮

炙

甘草

炙

訶梨勒

微煨去核各一兩

右九味除郁李大麻人外麤搗篩再同搗勻每服三錢七入生姜半分拍碎

以水一盞煎至八分去滓溫服空心午時各一以利為度

治肺積息賁效嗽半夏湯方

半夏湯洗去滑七偏焙乾

桑根白皮炙剉

細辛去苗葉

前胡去芦頭各兩半

桔梗炒

貝母心去

人參

甘草炙剉

苕胡去苗

訶梨勒微煨去核

白朮各一兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞入棗三枚擘破生姜半分拍碎煎至七分去滓溫服食後夜卧各一

治肺積息賁上氣皂莢丸方

皂莢二挺不蛀者酥炙去皮子剉

桂皮去麤皮

乾姜炮

貝母心去

右四味等分搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心日午生姜湯下十五丸加至二十九丸

治肺積息賁氣上枳實木香丸

枳實去瓢麩炒二兩

木香

陳橘皮湯浸去白焙

人參

海藻水洗去鹹焙

葶藶紙上炒令紫色各一兩

芍藥剉

丁香各參分

右八味搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十九丸漸加至三十九丸用炒豆煎湯下空心日午夜卧各一服

賁豚

論曰凡積氣發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時者腎積也腎水乘心其狀賁衝如豚名曰賁豚此本脾病傳腎腎當傳心心以夏適王而不受邪氣留於腎故結為積久不已令人喘逆骨痠少氣所以然者腎藏骨髓之氣若其氣留積不能榮養骨髓故變為骨痠之病

治賁豚氣逆衝心滿悶檳榔散方

檳榔

剉

訶梨勒

煨去核各二兩

吳茱萸

陳者湯洗焙乾炒一兩半

牽牛子

微炒參兩

右四味搗羅為散每服一錢七童子小便半盞空心調下不過三服効如患

陰陽二毒傷寒及脚氣亦可服

治積氣不散久伏於臍腹間發似豚狀賁上衝心木香湯方

木香

桂去麤皮各參分

赤茯苓

去黑皮

檳榔

剉

桑根白皮

剉各一兩半

甘草

炙半兩

陳橘皮

湯浸去白焙

紫蘇莖葉

各一兩

右八味麤搗篩每服三錢七水一盞入生姜半棗大拍破煎至七分去滓温

服空心日午近晚各一

治腎藏久積成賁豚氣注小腹急疼發即不識人吳茱萸飲方



吳茱萸湯洗 焙乾

桃人湯浸去皮六分 雙入各一分

黑豆兩半

右三味同炒以黑豆熟為度用童子小便一升浸少頃煎至六合去滓分三服空心日午夜卧各一

治久積賁豚氣時攻膀胱切痛四味丸方

蜀椒去目及閉 口炒出汗

藜香子炒

附子炮裂去皮臍

肉蓯蓉酒浸切焙 各一兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸空心温酒下

治腎積頻發小腹急脹疼痛唇口青黑木香硫黃丸方

木香

硫黃研

青橘皮湯浸去白焙

乾姜炮

桂去麤皮

沉香錯

肉豆蔻去殼

藜香子炒

附子炮裂去皮臍

銅青研

檳榔剉各一兩

右十一味將九味搗羅為末與別研二味和勻搗研糯米飯為丸如梧桐

子大每服十九丸藜香酒下加至二十九

治腎虛積氣桃人丸方

桃人湯浸去皮六分 兩研以酒二升煎成膏

木香

桂去麤皮

青橘皮湯浸去白焙

藜香子炒各半兩

乾姜炮一分

檳榔剉參分

右七味搗羅六味為末入桃人煎丸如梧桐子大每服十五丸至二十九空



心温酒下

治腎藏久積氣在膀胱虚脹上攻膨滿疔痛懷香子丸方

懷香子

參兩微炒為末以米醋二升煎如錫

附子

炮裂去皮

青橘皮

湯浸去白焙

木香

狼毒

炒

當歸

切焙各參分

阿魏

一兩研以酒一升煎取半

自然銅

煨醋淬研一兩半

礞砂

一兩半研沸湯化澄煎取霜入阿魏煎中同煎如錫入懷香煎攪勻

右九味除煎研外搗羅為末同入煎內和搗丸如梧桐子大如鞞入鍊蜜少

許每服十五丸至二十丸空心温酒下

治腎積化氣沉香湯方

沉香

黃耆

人參

各參分

懷香子

炒

甘草

炙

木香

桂皮

烏藥

附子

炮裂去皮臍去

石斛

去根

牛膝

酒浸切焙

五味子

炒

巴戟天

去心

陳橘皮

湯浸去白焙

高良姜

各半兩

右一十五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生姜一分拍碎煎至七分去滓

温服空心日午食前各一

治賁豚氣成塊上衝腹脇滿痛懷香檳榔散方

懷香子

炒

檳榔

剉

京三稜

剉

青橘皮

湯浸去白切鹽炒各半兩

木香

一分

右五味搗羅為散每服二錢七熱湯調服不拘時

治賁豚氣上衝心腹三神煎方

桃人去皮共雙人四兩湯浸研細取汁參升

京三稜煨剉二兩

鼈甲去裙襴醋炙參兩

右三味搗二味為末先煎桃人汁至二升次下葯末不住手攪良久更入好

醋一升同煎如錫以瓷合收每服半匙空心溫酒調下

治賁豚氣衝心吸吸短氣發作有時李根皮湯方

李根白皮剉焙八兩

半夏湯洗七兩焙

乾姜炮

桂去麤皮各四兩

人參二兩

赤茯苓去黑皮參兩

附子炮裂去皮臍一兩

甘草炙二兩

右八味咬咀如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

治賁豚氣上衝胸心迫滿吳茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙炒一兩

半夏湯洗七兩

桂去麤皮參兩

人參

甘草炙各二兩

右五味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生姜一棗大拍碎煎至八分去滓

溫服不拘時

治一切風及腎藏賁豚氣上衝心胸悶亂木香散方

木香一兩

青橘皮湯浸去白焙

白芷炒

沉香剉

懷香子炒

桂皮去麤

蓬莪茂剉

杉木節各半

枳殼去麤 麩炒

木瓜焙各分

右一十味搗羅為散每服二錢七炒生姜鹽湯調下

治賁豚冷氣上衝昏亂四肢軟弱不收磁石散方

磁石燒醋 碎研

肉豆蔻去殼

木香

檳榔剉各 一兩

右四味搗研為散每服三錢七以生葱一莖細切熱酒投調下

治賁豚氣從少腹奔衝上心昏亂嘔吐痛甚木香郁李人丸方

木香一兩

郁李人去皮生 用參兩

沉香剉

檳榔剉

桂皮去麤

青橘皮去白 焙

附子炮裂去 皮臍

藁香子炒各 一兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大藁香子或薄荷酒下二十九一日

三服臍下有塊服一月永除

治腎積氣賁豚從少腹上衝心昏亂嘔吐疼痛檳榔丸方

檳榔一兩 煨 一兩 半生

木香微炒 半兩

安息香研一 分

桂皮去麤

青橘皮去白麩炒 各半兩

吳茱萸湯洗焙 一分

右六味搗羅為末以豬膽二十枝水煮如錫和前六味末搗二千下丸如小

豆大每服空心嚼破七丸煖酒下

治賁豚氣上下攻走疼痛天雄丸方

天雄生去皮 臍一兩 桃人去皮共雙 人炒黃

桂去麤皮 藁香子炒 乾蠍炒各半兩

蜀椒去目并合口 炒出汗半兩

右六味搗羅為末用狗裏外腎并胆細切就銀石器中以無灰酒一升煎成膏入葯末杵丸如梧桐子大每服二十九丸空心生姜鹽湯下

治賁豚氣臍腹左右堅鞭橫連如臂若弓弦急痛木香丸方

木香 鼈甲去裙襴 醋炙 訶梨勒皮 桂去麤皮 各二兩 吳茱萸湯浸焙炒 一兩半

牽牛子炒二兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下加至四十丸

治賁豚氣自少腹上至心下若豚狀腰腹疼痛或衝心滿悶七氣湯方

桂去麤皮 赤茯苓去黑皮 高良姜炒 訶梨勒皮各一兩半

大腹連皮剉一兩 吳茱萸湯洗焙 炒參分 牽牛子炒半兩

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服微利兩三行為度

治賁豚氣上衝胸膈壓氣木香丸方

木香 丁香 白豆蔻去皮 肉豆蔻去殼 吳茱萸醋浸一宿炒令 黃色各半兩

沉香

參分

青橘皮

湯去白焙一分

麝香

別研二錢

右八味除麝香外搗羅為末入麝香研勻用硃砂煎豬胆汁和丸如梧桐子大每服溫酒下二十九

治賁豚氣上衝脇肋疔痛七寶丸方

丁香

沉香

剉

硃砂

湯浸綿濾澄入陳麴同煎成膏丸諸藥各半兩

蒺藜子

炒去角

木香

各參分

附子

炮裂去皮臍一兩

麝香

研一分

右七味除煎外搗研為末用前煎按和丸如梧桐子大每服十丸炒生姜酒或炒生薑黑豆小便下

治腎藏積冷賁豚氣攻少腹疼痛上衝胸脇沉香石斛湯方

沉香

剉

石斛

去根

陳麴

炒各一兩

人參

赤茯苓

去黑皮

五味子

微炒

桂皮

去麤皮

巴天戟

去心炒

白朮

芎藭

各參分

木香

肉豆蔻人

各半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢七水一盞姜錢三片棗三枚摩煎至六分去滓食前熱服

治腎藏氣發動築人心腹面黑悶欲絕及諸氣賁豚喘甚婦人傷冷血氣發攻



心等應急撞氣丸方

鉛二兩

石亭脂為末二兩

丁香為末一兩

木香為末一兩

麝香研一分

右五味先將鉛於銚子內慢火炒令乾入石亭脂末急手炒轉莫令焰起以水微噴之慢火再炒令乾傾於淨地坑子內以盞子覆之候冷取出細研如麩次入諸藥相和研之以粟米飯丸如雞豆大每用時研破二丸熱酒浸之頓服或汗或下氣或通轉即愈如秘不通每一丸入玄明粉半兩如氣滿胸膈服藥皆吐即以炒豆炒鹽等熨令氣下便服此藥無不驗

治積氣不散結伏賁豚發即上衝心胸令人喘逆骨痠少氣木香檳榔散方

木香

檳榔剉

沉香剉

磁石煨醋

訶梨勒去核藁香子炒

芎藭

白芷炒

牡蠣煨各半兩

桂去粗皮

陳橘皮湯浸去白焙各三分

右一十一味搗羅為散每服二錢七炒生姜鹽湯調下



大德重校聖濟總錄卷第七十二

積聚門

積聚心腹脹滿

論曰府藏不和則氣血留滯而成積聚其積聚蘊結氣不宣通與藏氣相搏故令人心腹脹滿煩悶短氣若為寒邪所并則搏於府藏陰陽相擊而致心腹疼痛甚則泄利也

治積聚心腹脹滿食已腹痛飲食不化嘔噦惡心胸脇脹悶大便秘利不定磨滯丸方

木香

青橘皮湯浸去白焙

桂去麤皮各一兩

吳茱萸湯浸焙乾炒參兩

硃砂

醋熬成霜研末一錢匕

巴豆霜半錢匕

右六味搗羅四味為末與硃砂巴豆霜同拌勻醋煮麩糊為丸如菘豆大每服三丸加至五丸早晚食後臨寢服大便溇利時減丸數

治積聚不散心腹脹滿嘔吐酸水惡聞食氣藏府不調或秘或泄硃砂丸方

硃砂

一兩化入麩一匙醋一盞半同煮成糊

烏梅去核炒參兩

巴豆霜七錢

沒藥研

蓬義茂

剉

丁香

木香

京三稜

剉

乾漆

炒令煙出各半兩

右九味搗研八味為末令勻以硃砂糊丸如菘豆大每服二丸至三丸煎丁

香烏梅湯下食後服更量虛實加減

治積聚心腹脹滿宿食不消疝刺疼痛惡心嘔吐可思飲食積氣丸方

桂去麤皮附子炮裂去皮丹砂研四桃人湯浸去皮共雙

巴豆去皮心膜壁京三稜剉煨乾漆炒煙鼈甲去裙襴醋

硃砂研二大黃生用麝香研一木香一

右一十二味搗研為末先以好醋一升熬成膏和前件藥丸如菜豆大每服

三丸五丸量虛實加減煎木香湯下食後

治積聚心腹脹滿不思飲食沉香煎丸方

沉香 木香 胡椒 青橘皮去白阿魏醋化麩和

沒藥研檳榔剉丹砂研硫黃研硃砂研高良姜各一

巴豆霜二錢丁香兩半

右一十三味除研外搗羅為末一處研勻用重湯煮蜜丸如梧桐子大每服

三丸煎橘皮湯下

治積聚不消心腹滿疝刺疼痛嘔逆醋心可思飲食代赭丸方

代赭研木香 桂去麤皮丹砂研各京三稜煨剉

杏人去皮共雙人炒研一分

檳榔剉參分

巴豆去皮心膜研出盡油三十粒

右八味搗研為末以醋煮麩糊丸如梧桐子大每服三丸食後温橘皮湯或生姜湯下

治積聚不消心腹脹滿醋心嘔逆不思飲食木香三稜丸方

木香

京三稜煨剉

檳榔剉各半兩

烏梅肉炒二兩

縮沙人一兩

青橘皮

去白焙一兩半

巴豆

去皮心膜研出油一分

右七味搗研為末用醋煮麩糊丸如麻子大陰乾丹砂為衣每服三丸至五

丸温橘皮湯下食後服

治積聚心腹脹滿氣攻刺痛嘔逆惡心可思飲食小分氣丸方

青橘皮

湯浸去白焙一兩

胡蘆巴

參分

沉香

剉一兩

補骨脂

炒半兩

蓬莪茂

煨剉一兩

白豆蔻人

半兩

懷香子

船上者炒一兩

右七味搗羅為末酒煮麩糊丸如梧桐子大丹砂為衣每服二十九丸食前生

姜米飲下

治積聚心腹脹滿利胸膈散滯氣消宿食木香乾漆丸方

木香

半兩

乾漆

炒煙出參分

肉豆蔻

去殼

京三稜

煨各一兩

檳榔

剉半兩

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙

桂皮

去麩

牽牛子

炒各一兩

補骨脂

炒半兩

右一十味搗羅為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服十丸生姜湯下早晚食後服

治積聚心腹脹滿腸鳴醋心嘔吐冷痰可思飲食京三稜散方

京三稜

煨

蓬莪茂

煨

益智

去皮

縮沙人

炒

檳榔

剉

青橘皮

湯浸去白焙

姜黃

各半兩

丁香

一分

甘草

炙剉

右九味搗羅為散每服二錢七沸湯點服不拘時候

治積聚氣塊心腹膨脹胸膈痞悶氣逆噎塞三稜湯方

京三稜

參兩椎破以好醋盡為度再剉焙

枳殼

去麩

青橘皮

湯浸去白焙

木香

檳榔

剉各一兩

乾姜

炮半兩

桂

去麩皮一兩

甘草

炙剉

右八味麩搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治積聚不消心腹脹滿金翼丸方

沉香

木香

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙

京三稜

煨

五靈脂

各半兩

芫花

醋炒焦色

乾漆

炒煙出各一分

寒食麩

炒參分

墨

燒研一分

右一十味搗研為末每秤藥末一兩用去皮心膜巴豆人秤一錢入淨白內

搗令極細方入葯末再搗勻用硃砂末半錢新汲水浸化旋入臼內再搗千  
百下候鞣軟得所丸如麻子大每服三丸食後臨卧溫熱水下心胸痞悶不  
快溫甘草湯下

治老幼久積冷毒嘔吐酸水心腹膨脹疔痛不美飲食兼治小腸疝氣大便不  
通紫金丸方

硃砂

別研  
一兩

乾漆

炒煙  
出

烏頭

生去  
皮臍

乾姜

生用各  
一兩

右四味除硃砂外搗羅為細末入硃砂研勻別以巴豆去皮心膜秤三分細  
研厚紙塵出油與前葯同研勻以水煮棗肉和搗令得所作一團用好濕紙  
裹三五重別取好淨泥去砂石多入紙筋鹽水拌和如膠將前葯一團固濟  
可厚一豆許暴令泥乾或於文武火灰中煨乾亦得次燒熟炭火十斤煨通亦  
赤取出候冷打去泥刮取裏面葯再搗更入少棗肉杵勻可丸即丸如梧桐  
子大每服三丸五丸量虛實加減元氣及諸般冷氣撮痛及泄瀉膿煎艾湯  
癖積脇下刺痛妨悶酒食過度膨脹木瓜湯婦人血刺醋湯下  
治久寒積聚心腹脹痛食飲不下烏頭丸方

烏頭

炮裂去  
皮臍

吳茱萸

湯洗焙乾  
炒各參兩

細辛

去苗  
葉

附子

炮裂去  
皮臍



藁本 去苗土 各二兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸至十九空心温酒下

治積聚心腹脹滿宿食不化氣刺疔痛泄瀉善噫吞酸食欲嘔吐手足逆冷白

豆蔻散方

白豆蔻 去皮 參分 桂皮 去麩 麩 丁香 附子 炮裂去皮 臍各半兩 高良姜 木香

肉豆蔻 去殼各一分 人參 枳殼 去麩 麩炒 甘草 炙 剉 陳橘皮 去白焙炒 各半兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕煎木瓜生姜湯調下

治胃中諸食結滯不消心腹脹滿吐瀉不止白豆蔻散方

白豆蔻 去皮 乾木瓜 各一兩 生糯米 參合 乾姜 炮參分 甘草 炙剉 半兩

縮沙人 半一兩

右六味搗羅為散每服二錢匕新汲水調下

治積聚脹悶減食黃瘦參苓丸方

人參 赤茯苓 去黑皮 細辛 去苗土 枳殼 去麩 麩炒 熟乾地黄 焙

當歸 焙切 麥門冬 去心 焙 附子 炮裂去皮臍 乾姜 炮 大黃 剉炒

厚朴 去麩皮塗 生薑汁炙 桂皮 去麩 甘草 炙剉各一分 桔梗 炒



烏頭炮裂去皮

紫苑去苗土

蜀椒去目并開口炒出汗各一兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服七丸空心温酒下日再漸加至十九丸以知為度

治榮衛壅滯流傳藏府心腹脹滿飲食不消腹痛不止化氣丸方

紫蘇子炒研

乾姜炮

檳榔剉

萊菔子炒研

蕪荑炒各半兩

青木香

訶梨勒煨去核

甘草炙剉

青橘皮湯浸去白焙

草豆蔻去皮各參分

右一十味搗羅為末以麴末作糊和丸如梧桐子大每服二十九生薑鹽酒

下

治府藏不和氣血留滯積聚脹滿心腹妨悶食物減少煩悶短氣京三稜湯方

京三稜煨剉

大腹皮連皮剉

延胡索

天雄炮裂去皮臍

芎藭

白朮各一兩半

桃人湯浸去皮去核

桂皮去麤皮

當歸切焙

消石各一兩

郁李人湯浸去皮一分

右一十一味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半入生姜二片煎至七分

去滓温服

治積聚心腹脹滿甚則泄利及氣不升降為葯湯方

赤芍葯

赤石脂

大腹皮

京三稜剉煨

桑根白皮剉焙各一兩半

肉豆蔻 去殼一枚 桃人 去皮共雙八 桂 去麤皮半兩 附子 炮裂去皮臍 白朮

木香 枳殼 去麤炒 當歸 焙切 麻黃 去節根 黃連 去須各一兩

右一十五味剉如麻豆每服五錢七水一盞半入生姜三片同煎至八分去

滓溫服

治冷積不去氣澀腹痛飲食不下旋復花湯方

旋復花 微炒參分 當歸 焙切 黃連 須去 陳麴 炒 桑根白皮 牛膝 焙切

芎藭 射干 白朮 龍骨 各一兩半 枳殼 去麤炒 桂皮 去麤

地榆 各一兩 杏仁 湯浸去皮共雙 附子 炮裂去皮臍 赤石脂

厚朴 去麤皮生薑汁炙各二兩 黃芩 去黑心半兩 黑豆 合 草豆蔻 去皮二枚

桃人 去皮共雙八枚

右二十一味細剉每服五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

治虛積潮熱心腹脹滿疼痛妙香丸方

丹砂 研一兩 牛黃 研 龍腦 研 麝香 研各一分 金薄片 十四

粉霜 膩粉 各一錢 巴豆 去皮心一百二十粒肥者研 蠟 二兩

右九味研細丸如彈丸量虛實加減夜半後龍腦漿水下藏虛即旋丸如小

豆大每服三丸龍腦米飲下疾堅者加至十丸皆以鍼刺作數孔以行葯力  
小兒取積丸如菉豆每服三丸又治小兒吐逆並米飲下

治氣脹心腹滿悶胸脇痛氣壅不通沉香散方

沉香

剉

青木香

剉

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

郁李仁

湯浸去皮別研

大黃

煨剉各一兩

桂

去麤皮半兩

枳殼

去麤殼炒

檳榔

半生半熟

訶梨勒皮

各參分

右九味搗羅為散每服二錢匕炒生姜酒調下

治積聚心腹脹滿痞塞不通大腸結燥腰腹疔痛面赤口乾香桂湯方

桂皮

去麤皮

陳橘皮

去白焙炒

檳榔

生剉

當歸

切焙

甘草

炙

木香

芍葯

枳殼

去麤殼炒

大黃

剉炒各半兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治久積氣不散心膈滿悶四肢不收痞膈不通枳實丸方

枳實

去麤殼炒一兩

白朮

檳榔

剉

陳橘皮

湯浸去白焙各參分

甘草

炙

生姜

一切炒各一分

赤茯苓

去黑皮

青木香

桂皮

去麤皮

昆布

洗去鹹焙

訶梨勒皮

大黃

煨剉各半兩

草豆蔻

去皮一兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九生薑木瓜湯下

積聚宿食不消

論曰飲食入胃脾藏化之若腹內素有積聚攝養乖度飲食不時則脾胃愈弱飲食遲化故為宿食不消之病其狀噫氣食臭胃脹煩滿是也

治積聚宿食不消中脘痞滯煩滿氣促腹內刺痛噫氣不思飲食木香丸方

木香兩半

檳榔兩

陳橘皮湯浸去白

丁香分一

京三稜兩

乾姜分一

蓬莪茂兩

巴豆去皮心膜

硃砂水飛研

右九味除研外搗羅為末入巴豆硃砂研令勻湯浸蒸餅丸如菜豆大每服

二丸至三丸溫生姜橘皮湯下食後服

治積聚宿食不消胸膈症悶腹肚脹滿疴痛不食丁香丸方

丁香兩一

青橘皮湯浸去白

桂皮去麤

乾姜炮

附子炮裂去皮

蓬莪茂兩

京三稜兩

乾漆炒烟出

豬牙皂莢酥炙去

木香兩一

牽牛子細末

墨搗羅為細末

硃砂研

大黃生為末

巴豆於新瓦內攤去油取霜

右一十五味先將後三味於石鍋內煎硃砂醋令熱先下巴豆霜煎三兩沸

次下大黃末熬成膏和前一十二味藥末熟杵丸如菜豆大常服一九二丸

茶湯任下如要取積生姜湯下七丸更量力加減

治積聚宿食不化留滯成塊心腹疼痛脾倦多困日漸黃瘦木香丸方

木香參分 蓬莪茂 京三稜二味 巴豆去皮心膜 丹砂研參

右五味將前三味搗羅為末入巴豆丹砂同研令勻醋煮麩糊丸如菘豆大

每服三丸至五丸生姜橘皮湯下食後臨卧服

治久積氣塊宿食不消胸膈痞悶痰逆惡心不思飲食臍腹刺痛醋心噎塞小

分氣丸方

木香兩 檳榔剉 陳橘皮湯浸去白 棟實剉 乾姜炮各 雄黃研一

青橘皮湯浸去白 蓬莪茂醋浸一宿 巴豆研去皮心膜

半夏湯洗七遍 大黃煨炒各

右一十一味搗研為末醋煮麩糊丸如菘豆大每服五丸七丸温生姜湯下

食後臨卧服

逐積滯化宿食利胸膈寬中丸方

烏頭炮裂去 吳茱萸湯浸 高良姜 甘遂麩 大黃

梔子各半 巴豆去皮心膜



右七味搗研為末用棗肉丸如小棗豆大每服一丸生姜橘皮湯下  
消積化氣溫胃思食治食後心膈妨悶如意丸方

威靈仙去苗土

附子生去皮臍二味各半兩同為末用好醋半盞浸一宿

礞砂細研

巴豆

二十一粒去皮心膜出油二味同研用酒半升醋半升同煎與前二味同熬成膏

蓬莪茂煨

木香各半兩

青橘皮湯浸去白炒一兩

大黃剉炒

陳麴炒半兩

丁香一分

右一十味將後六味為末以前四味膏和更別熬醋少許研墨汁同丸如棗豆大每服五丸至七丸生姜湯下

消積滯化宿食痰飲治胸膈痞痞悶桂香勻氣丸方

桂皮去麤

丁香皮

縮砂人

益智去皮炒

陳橘皮湯浸去白焙

青橘皮湯浸去白焙

檳榔剉

木香

蓬莪茂煨各一兩

烏梅

和核一兩半

巴豆去皮心膜研出油陸十四粒

右一十一味除巴豆外搗羅為末和勻煮麩糊丸如麻子大每服七丸至十丸茶酒任下食後服

治一切積滯宿食不消痰逆惡心吐瀉霍亂膈氣痞滿脇肋膨悶嘔噦心痛泄痢宜服積氣丸方

痢宜服積氣丸方



代赭 研

赤石脂 研各一兩

大戟

木香

龍胆 各半兩

杏仁 湯浸去皮共九粒

巴豆 去皮心膜研出油為霜參十粒

右七味除別研外搗羅為末入杏仁巴豆霜同研勻用麩糊丸如梧桐子大每服三丸至五丸食後臨卧木香湯下

治久積伏滯胸膈膨脹心腹刺痛不化飲食及婦人血氣疼痛紫沉消積丸方

沉香 剉

阿魏 醋化

巴豆霜 各一兩

硃砂 研四兩四味同研勻用蜜一斤酒二盞共

熬成膏以瓷合盛

丹砂 研二兩

硫黃 研四兩

青橘皮 湯浸去白焙

高良姜

檳榔 剉

木香

人參

桂皮 去麤

胡椒 各四兩

丁香

乾姜 炮各二兩

右一十五味將前四味蜜酒熬成膏餘並搗羅為末用膏和搗千百杵丸如

菉豆大每服五丸七丸温橘皮湯下如心痛温酒下婦人血氣當歸湯下

消積化氣進食黑神丸方

木香

硃砂 研

蓬莪茂 煨

京三稜 煨剉各半兩

桂皮 去麤

附子 炮裂去皮臍

乾姜 炮

乾漆 搗碎炒

太黃 煨別為末

青橘皮 湯浸去白焙

墨 燒過

巴豆 去皮心膜細研

右一十二味以好醋一大椀先熬硃砂令沸入巴豆又熬數沸次又入大黃末熬成膏餘藥並搗羅為末以膏杵和丸如菜菔子大每服三丸五丸茶酒任下如消食化氣生姜橘皮湯下小腸疝氣懷香酒婦人血氣當歸酒下

治積聚宿食留飲不消丁香丸方

丁香

木香

沉香剉

安息香

乳香

硃砂剉

肉豆蔻

去殼

桂皮去麤皮

京三稜煨

當歸切焙

檳榔剉

陳橘皮

湯浸去白焙

華澄茄各一兩

附子炮裂去皮臍半兩

巴豆十枚於糖灰內炮去皮細研

右一十五味先將安息香乳香硃砂三味用少許酒浸良久別研如膏更與巴豆研勻餘藥並搗羅為末同用酒煮麩糊丸如麻子大每服五丸至七丸熟水下若大段氣痛加至十丸用生姜湯下

治積聚氣滯胸膈滿悶心腹疼痛不化飲食乳香丸方

乳香研

丁香

木香各一兩

附子炮裂去皮臍

五靈脂為末

乾姜

炮各半兩

桂皮去麤皮

芫花醋拌炒焦黃

青橘皮湯浸去白炒各參分

豬牙皂莢

去皮酥炙一兩

巴豆

去皮心膜別研如膏新風內搗去油取霜一錢

右一十一味除乳香五靈脂末巴豆霜外八味搗羅為末入上三味拌勻煮

陳麴糊丸如菜豆大每服二丸三丸温生姜湯下量虛實加減食後臨卧服  
治積聚癖塊一切所傷喫食減少日漸黃瘦如聖丸方

巴豆去皮心膜研  
出油一兩

丁香參錢

烏梅去核一兩半

乾漆搗碎炒煙  
出一兩

滑石錢一

右五味先搗羅四味為末然後入巴豆同研勻用粳米飯同爛搗丸如粟米  
大每服二丸至三丸隨所傷物下更量虛實加減

消食化氣利胸膈及積聚凝滯藏府刺痛飲食減少木香丸方

木香末為末

丁香末為末

巴豆去皮心膜研  
出油各半兩

硃砂研半兩

大棗去皮核

烏梅去核為末  
各參十枚

右六味先將水拌白麴作一薄餅以棗肉鋪餅上次以前四味藥末和勻復  
鋪棗肉上作饅頭裏就用炭火四圍炙燻候麴焦黑約藥透取出地面上出  
火毒候冷打破去焦麴不用將藥與烏梅末同搗稀麴糊丸如黃米大每服  
二丸三丸食後生姜湯下或隨所傷物湯下

消食化氣破積聚治心腹脹滿噫醋惡心八仙丸方

京三稜煨

蓬莪茂煨

五靈脂各一兩

烏梅六十枚  
和核用

乾漆半兩炒  
煙出

巴豆四十粒  
不出油研

木香一分

縮砂一百粒  
去皮

右八味搗羅為末用酸粟米飯三兩匙再入白杵五七百下丸如菘豆大每服五丸至七丸生姜湯下小兒一丸如要宣轉十五丸更量虛實加減

取積聚消宿食檳榔丸方

檳榔 生剉兩枚

巴豆 去皮心膜麩炒二十一粒

青橘皮 湯浸去白焙半兩

牽牛子 炒

大黃 濕紙裹煨

乾漆 炒煙出各一分

硃砂 研一錢

右七味搗研羅為末湯浸蒸餅丸如菘豆大以丹砂為衣每服一丸二丸溫水下如要宣轉取食積三五丸或七丸十九丸量虛實空心煎葱白湯下宣後服和氣人參湯

和氣人參湯方

人參

白茯苓 去黑皮

厚朴 去麩皮生薑汁炙

甘草 炙

肉豆蔻 去殼

陳橘皮 去白麩炒

藜香子 炒

木香

白朮

桂 去麩皮各半兩

右一十味搗為麩末每服二錢七水一盞生姜三片棗一枚擘同煎至七分

去滓溫服

治脾胃虛冷積聚沉結宿食不消益智散方

益智 炒去皮

蓬莪茂 剉煨

京三稜 剉煨

青橘皮

陳橘皮 二味並湯浸去白炒

白茯苓去黑皮 各一兩 人參 甘草炙剉各 半兩 木香分厚朴 去蘊皮生薑汁

右一十味搗羅為散每服一錢匕入鹽少許沸湯點服不拘時候

治久積聚宿滯不消或翻胃吐逆惡心乾噦及脾寒疾等藿香煮散方

藿香葉 木香 陳橘皮湯浸去白焙 肉豆蔻去殼 訶梨勒皮 人參

白茯苓去蘊皮 甘草炙 草豆蔻去皮 麥蘖炒 陳麴炒各 一兩

乾姜炮 高良姜剉炒各 半兩 厚朴去蘊皮生薑汁炙一兩半

右一十四味搗羅為散每服二錢匕水一盞生姜一塊拍破同煎至七分入

鹽一捻熱服水瀉及腸風藏毒熱陳米飲調下

治諸積宿食不消黑虎丸方

芫花炒 甘遂炒 烏頭炮裂去皮臍 大戟炒 京三稜剉

牽牛子炒 乾姜炮 陳橘皮去白焙 各半兩 乾漆二兩炒 烟出盡

右九味搗羅為末以醋煮麩糊丸如菜豆大每服二丸消食化氣溫水下取

積滯米湯下溫病傷寒姜醋湯下氣痛艾湯下本藏氣虛炒懷香子酒下瘡

疾桃枝湯下婦人血氣勞氣醋湯下寸白蟲煎牛肉湯下

治一切積滯化氣消食補益真氣產後逐敗血補虛損確砂煎丸方



硃砂棟通明無石者別研如粉

當歸酒浸一宿去

肉蓯蓉酒浸一宿薄切作片焙乾

巴戟天去酒浸一宿焙

檳榔生各一兩

煉實洗過切破四兩酒浸一宿候軟以刀刮下麩去皮核不用二兩

藜香子微炒

沉香剉

附子炮裂去皮臍

天雄用酒煮五七百沸候剉去皮臍各一兩

阿魏半兩米醋磨成膏入諸藥

右一十二味搗研為細末以無灰酒煮白麩糊丸如梧桐子大每服三十丸

空心日午温酒下嘗有婦人病蓐中下痢日久甚困篤百方不差醫曰蓐中

痢與他痢不同常痢可用苦澀藥止之蓐中痢生於血不足投澀藥則血愈

不行痢當愈甚產後痢者宜投硃砂丸日三服痢頓減半次日遂愈此藥產

後雖無病亦宜服之能養血去積滯

治積聚宿食不消脇肋堅鞭心腹刺痛及諸病礞石丸方

礞石研半兩

硃砂一兩米醋參升化

巴豆霜一兩半

木香

檳榔剉各一兩

大黃煨剉一兩半

京三稜醋浸一宿

肉豆蔻去核

桂皮去麩

豬牙皂莢去皮炒

乾姜炮

丁香

芫花醋浸一宿炒微有煙

蓬莪茂炮各一兩

青橘皮去白焙

白豆蔻去皮

墨燒八分過各半兩

胡椒一分

粉霜研一分

白麩二兩酒半升化



右二十味搗研各為末先以硃砂醋合巴豆煮兩食久投礞石三稜又投酒麩又投大黃相去皆半食久乃入眾藥燉成稠膏丸如菜豆大每服三丸酒飲下凡堅積飲食所傷皆能愈

治肋下結塊連心腹痛食冷物即劇鼈甲散方

鼈甲

醋去裙襴炙

疾蕪子

炒去角各二兩

黃芩

去黑心半兩

桂

去麤皮一兩

苳胡

去苗

桔梗

炒

當歸

切焙

牛膝

酒浸切焙

芍藥

赤茯苓

去黑皮

大黃

剉醋拌炒

人參

陳橘皮

湯浸去白焙

檳榔

剉

訶梨勒

煨去核各二分

右一十五味搗羅為散每服二錢匕煮棗湯調下

久積癥癖

論曰癥之為病雖有形證推之不動癖之為病僻在脇肋按之水鳴此皆飲食留滯所致也不即治日漸增長盤結牢固邪氣日盛令人正氣衰微累歲不已甚則身瘦腹大名曰久積癥癖

治久積癥癖冷熱不調痰逆痞悶心腹刺痛喘滿膨脹泄利羸困不思飲食消積丸方

代赭

煨醋淬參七編研

礞石

研各一兩

桂皮

去麤皮

白茯苓

去黑皮

青橘皮

湯浸去白焙

巴豆去皮心膜壓出油各半兩

京三稜剉

棟實肉各一分

硃砂研參分

右九味搗研為末拌勻酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二丸至三丸木香湯下看虛實加減

治久積伏滯成塊婦人血癖血塊及產後敗血不行兒枕刺痛小兒妳癖常服利胸膈除傷滯比金丸方

沒藥研一錢

五靈脂研半兩

皂莢去皮子酥炙搗末參錢不艸者

白丁香雄者研

硃砂研

乳香研各一錢半

巴豆膜一百粒去皮心不出油爛研

右七味同研為細末用大棗十枚去核刮巴豆膏入在棗內線纏了慢火炙熟去線搗爛與前項藥末合勻和搗成劑丸如棗豆大大人藏府實者五丸虛者三丸小兒芥子大一歲三丸五七歲以上七丸十歲以上十九丸取積用燒皂子濃煎湯放冷下利胸膈用棗一枚爛嚼裏藥乾嚥不得嚼藥並臨卧服急患不拘時

治久積癖氣心胸不和嘔吐痰逆脇肋脹滿疼痛如神丸方

烏頭去皮臍

乾漆

乾姜

桂去麤皮各一兩以參味同為末

硃砂別研半兩

巴豆半兩去皮心膜研為霜

右六味合研令勻取炊棗肉和成塊用濕紙厚裹鹽泥固濟厚一指許陰三日暴乾地坑子內以火三斤簇燒候火銷半取出看鞞鞞搗細為丸如小豆大每服三丸至五丸木瓜湯下不拘時

治久積冷氣攻心腹疼痛痲痺嘔逆腹脹不思飲食肌膚瘦瘁腰膝倦痛下痢洩瀉瘧疾腸風并婦人血海久冷無子陳橘皮煎丸方

陳橘皮湯浸去白焙十五

巴戟天心去

石斛根去

牛膝酒浸切焙

肉蓯蓉酒浸切焙

鹿茸去毛炙

菟絲子酒浸三日

杜仲去麩皮炙切

陽起石酒浸研如粉

厚朴去麩皮炙

附子炮裂去皮臍去

當歸切焙

吳茱萸湯洗焙乾炒

乾姜炮

京三稜煨

草薢各參兩

甘草炙切兩

右一十七味搗羅為末先以好酒五椀於銀石器內煎橘皮末令如錫入諸藥攪勻再搗三五百杵稍乾更入酒少許和丸如小豆大每服二十九至三十丸溫酒空心下鹽湯亦得

治藏府久積氣塊冷痞不思飲食沉香三稜煎丸方

沉香剉

人參各一兩

青橘皮湯浸去白焙一兩半

京三稜參兩搗末用陳粟米醋五升同入在醋內攪化以銀器內慢火熬成膏

右四味搗羅三味為末入三稜硃砂煎內和勻成劑如有餘煎更於火上慢熬同搗納千杵丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下婦人醋湯下日再治久積癥塊心腹脹滿胸膈不利痰實胃脹硃砂丸方

硃砂好者二錢研 狼毒劉醋乾 芫花醋浸一宿炒乾 乾漆炒煙出 鼈甲去裙襴醋炙各一兩

硫黃好者一分研如粉 巴豆好二粒去皮心膜以醋一升煮令紫色

右七味搗研為末和勻煮麩糊丸如豌豆大每服三丸食後臨卧温生姜湯下

治多年積氣癥癖三稜丸方

京三稜煨剉 雞爪三稜煨剉 陳橘皮湯浸去白焙 青橘皮湯浸去白焙

巴豆去皮心膜出油 石三稜剉各五兩 檳榔十枚半生用半炮剉 丁香一兩

肉豆蔻十枚去殼醋浸二宿 益智去皮各一兩 木香二兩 硃砂一兩半研過

右一十二味搗研為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服三丸如當心氣塊

茱萸湯下左右氣塊木香湯下本藏氣塊懷香湯下

治久積食癖心腹時發疼痛胸膈不快痰逆惡心藏府不調不思飲食或下痢

膿血裏急後重散惡氣逐滯結丁香丸方

丁香

木香

桂皮去麤

阿魏去麤

麝香研

硫黃研

水銀二味於盞內結成沙子

硃砂研飛過

粉霜研

胡粉研各一分

巴豆去皮心膜研取霜四錢

右一十一味搗羅三味為末與八味合研勻細用安息香半兩酒化濾過入蜜少許重湯同熬和劑旋丸如梧桐子大每服三九至五九臨卧煎生姜棗湯下更看虛實加減取下積聚惡物為効

治男子婦人遠年積氣消磨癥塊取虛中積礞石丸方

礞石半兩青者生用搗羅為細末

硃砂醋浸澄

丁香桂皮去麤

乾姜炮各二兩

木香京三稜剉

蓬莪茂剉

芫花醋浸一宿炒焦

檳榔剉末

豬牙皂莢去皮炙黑

肉豆蔻各一兩

白豆蔻人兩半

胡椒分

巴豆心膜出油盡

青橘皮湯浸去白焙

墨燒八分熟各半兩

粉霜細研一分

大黃兩煨熟半兩炒焦

右一十九味各搗研為末用醋三升飛硃砂於銀石器中文武火熬二十沸次入巴豆又熬五七沸次入礞石京三稜末又熬三五沸次取白麩二兩以無灰酒半升調入藥中又熬一兩沸次入大黃末又熬三兩沸次下諸藥末不住用柳木杖子攪勻候稠搗千杵丸如菉豆大每服三九不問男女長幼



心痛醋湯下左脇下疼煎姜棗湯下右脇下疼煎木香湯下婦人血癖血氣炒生姜醋湯下久患冷痢煎黃連湯下小兒常服冷水下有妊者不得服小兒以意減丸數

治久虛積癥癖水銀丸方

水銀

豉研

礞石末

滴酒和勻瓷合內慢火逼乾各半兩

京三稜末

石三稜末

雞爪三稜末

膩粉

粉霜

白丁香末

硃砂

研各參錢

肉豆蔻

去殼

檳榔

各二枚一末

丹參

研參錢

右一十三味合研勻細用棗肉和丸如菴豆大每服五丸溫水下又一方治丈夫病入懷香補骨脂各一分治婦人病入血竭沒藥各一分

治遠年癥氣積聚木香丸方

木香

硃砂

研

當歸

切炒各兩

礞石

研參分

大黃

剉煨

麥蘖

炒

墨

研

陳麴

不炒

白麴

各半兩

大戟

炒

乾漆

炒煙出

膩粉

各一分

豉

少許

巴豆

人不出油研

右一十四味搗研為末以臘月雪水同搗三二百杵丸如菴豆大每服一丸

空心用乾柿爛嚼裹藥隨所傷物煎湯下不得吐津



治男子婦人久氣塊癥癖兩脇下積冷胸腹氣刺痛紫金丹方

鐵滓一斤淘淨控乾

硃砂二兩

硫黃半斤水飛過

右三味先取鐵滓硫黃二味於瓷器內用米醋一斗慢火煎候煎硫黃火上無焰即燂乾刮此二味入瓷合內固濟了用大火煨三度畢取合內藥再用水飛不用鐵滓控硫黃令乾入細瓷合內坐在平地別用火一秤煨至火盡取出入硃砂二兩同研令細再入合內用火一斤就灰池中養三日放冷取二兩再入下項藥

硃砂兩半

木香末

丁香末

膩粉研

肉豆蔻去殼末

丹砂研

乾漆炒煙盡研

胡椒末

阿魏用醋化麩和作餅子燒熟為末各一錢

砒霜末一字半

右一十味研細再同硫黃研勻用酒醋中半煎五靈脂薄麩糊和丸如梧桐子大每服從五丸漸加至二十九丸以意加減服若取積滯癥癖及酒食積急氣冷氣一切滯氣等疾更入後藥

巴豆人兩研一

大戟末兩半

芫花末兩半

草烏頭末一分

五靈脂末兩一

膩粉二錢

硃砂研半兩

右七味以米釀醋二升已來銚子內熬成膏便與前藥末按為劑丸如梧桐子大量虛實加減服逐一丸加用醋湯或茶清下

治久積癥癖氣攻左脇如覆杯及婦人血痕蓬莪茂丸方

- 蓬莪茂炒一兩
- 桂去麤皮參分
- 芍藥
- 枳殼去麤炒
- 沉香剉

- 檳榔剉
- 木香
- 當歸切焙
- 昆布洗去鹹汁
- 白芷炒兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九煨姜木瓜湯下

治五毒五積五勞并一切氣疾癥癖塊及遠年積丁香丸方

- 丁香兩半
- 附子炮裂去皮臍
- 烏頭炮裂去皮臍
- 檳榔剉
- 膩粉研一分半

- 大戟炒
- 甘遂炒
- 芫花醋炒
- 紫苑去土各一分
- 硃砂醋飛過焙乾研一兩

右一十味先將八味搗羅為細末入研藥和勻麩糊丸梧桐子大每服七丸

至十九醋湯下

治久積癥癖不散心下結痛狀如伏梁三稜湯方

- 京三稜炒
- 鼈甲醋炙去裙爛
- 大腹剉炒各兩
- 桂去麤皮
- 芍藥
- 當歸切焙

- 枳殼去麤炒
- 陳橘皮去白焙
- 高良姜各參分
- 木香
- 訶梨勒煨去核各半兩

右一十一味細剉每服五錢七水一盞半煎取八分去滓溫服

治久癖塊聚心腹脹滿人參丸方

人參 玄參

沙參

丹參

苦參

防風

去文各一兩

麝蟲

參十枚熟

附子

炮裂去皮臍一兩

巴豆

去皮心煮研出油參十枚

蜀椒

炒去目并開口出汗一合

乾姜

炮半兩

葶藶

微炒研一合

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每食後米飲下一丸未利再服

服

治久癖結鞭兩脇臍下堅如石按之痛刺食飲不下鼈甲丸方

鼈甲

去裙爛醋炙二兩

牛膝

酒浸切焙

芎藭

防葵

當歸

切焙

乾姜

炮

附子

炮裂去皮臍

桂皮

去麤皮

甘草

炙各一兩

巴豆

二枚去皮膜研

大黃

剉炒一兩半

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服空心温酒下三丸加至五

丸日二服以利為度

治久積癖瘕鼈甲丸方

鼈甲

大者一枚淨洗去筋膜縫裏外面二分厚上面用紙固濟泥一風炉子安鼈甲在上面剔入桃人半斤去共皮雙人研以米醋四升無灰酒

參升

礞砂參兩同攪拌旋入向鼈甲中煎為膏取出用合盛却將鼈甲去紙泥炙令黃色

青橘皮

去白

麥蘖

炒

沉香

剉

肉豆蔻

去殼各參兩

丁香

木香

檳榔

一半生

陳麴

炒

京三稜煨剉 大黃剉生 厚朴去麤皮生 薑汁炒令紫各二兩 芩胡去苗半斤 桂去麤皮二兩

右一十四味搗羅為末再研令勻用桃人煎並熟蜜和丸如梧桐子大空心米飲下二十九

食癥

論曰脾胃虛弱飲食累傷積久不去結在腹內與正氣交爭則心腹鞭痛妨害飲食肢體消瘦以手按之積塊有形謂之食癥

治食癥氣檳榔丸方

檳榔煨剉參兩 木香 郁李人研去皮細 芩胡去苗 大黃剉各一兩半

枳殼麩炒去麤 桂去麤皮 訶梨勒煨去核各一兩 乾姜炮半兩 草豆蔻去皮五枚

右一十味搗羅九味為末入郁李人同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空心温酒下日晚再服

治食癥噉酸吐津胸膈疼痛氣噎食飲進退麥蘗湯方

麥蘗炒 陳麴炒 厚朴去麤皮生 檳榔剉 紫苑去苗土

鼈甲去裙襖醋炙 當歸切焙 大黃剉炒各半兩

右八味麴搗篩每服五錢七水一盞半煎至七分去滓温服空心午時臨卧

各一

治食癥冷氣及傷寒後一切氣疾食物不消木香散方

木香 檳榔剉 青橘皮湯浸去白焙 肉豆蔻殼去 食茱萸

紅豆蔻皮去 白朮 乾姜炮 葛根剉 草豆蔻皮去 虎杖

麻黃節去根 厚朴去麤皮生薑汁炙 桔梗炒 桂皮去麤 人參

羌活頭去芦 芎藭

右一十八味等分搗羅為細散每服三錢七空心炒姜鹽湯調下

治食癥氣五通丸方

乾姜炮兩 巴豆半分去皮心膜醋一盞煮醋盡研如膏 陳橘皮湯浸去白焙 黃連須去

白朮各一分

右五味搗羅四味為末與巴豆同研令勻煮麩糊和丸如梧桐子大每服一

丸空心鹽湯下加至兩丸茶清下亦得如有滯積生姜橘皮湯下要轉冷茶

下五丸熱茶投之

治食癥氣聚不消萬金丸方

檳榔剉 肉豆蔻殼去 青橘皮湯浸去白焙 乾姜炮 木香各一兩



巴豆 去皮心膜五十粒 炒黑色研如膏

右六味搗羅五味為末入巴豆同研令勻浸研鹽豉和丸如梧桐子大每服一二丸煎生姜橘皮湯下良久以粥飲投之以利為度

治食癥瘕癖聚血結刺痛一切疾黑金丸方

沉香 剉 附子 炮裂去皮 木香 青橘皮 湯浸去白焙 乾姜 炮

細墨 燒紅醋研 京三稜 剉 蓬莪茂 剉 桂 去麤皮各一分 大黃 剉

乾漆 炒烟出 麝香 研各半分 硃砂 研水飛

右一十三味各搗研為末將京三稜蓬莪茂大黃硃砂四味用米醋煮爛研作糊入眾藥末和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸姜湯下不拘時

治食癥積氣成塊胸膈痞悶腹脇脹滿宿食不消心腹疼痛不能飲食化積丸方

硃砂 無石者研 芫花 炒 巴豆 去皮心膜研如膏 乾漆 炒烟出 木香 參

豬牙皂莢 去共炙參分 以上除硃砂巴豆外搗羅為末拌 當歸 一切焙

烏頭 炮裂去皮 大黃 熟兩蒸 鼈甲 醋去裙襴 青橘皮 湯浸去

京三稜 剉 陳麴 炒各兩 桂 去麤皮



右一十四味搗羅八味用前膏和丸如棗豆大每服二丸至三丸茶酒任下如取積量虛實加減

治食癥結塊疼痛發歇化氣消酒食硃砂丸方

硃砂

研細

乾漆

炒烟出各一分

木香

丁香

蓬莪茂

煨

京三稜

煨

青橘皮

湯浸去白焙

羌花

炒各半兩

肉豆蔻

五枚大者去殼

巴豆

心一分半去皮膜壓出油

右一十味將米醋一椀浸蓬莪茂羌花三稜一宿後焙乾與五味同搗羅為末入硃砂巴豆拌勻醋煮麩糊和丸如大麻子大每服三二丸如要取轉着虛實加減生姜湯下婦人血氣醋湯下小兒疳氣甘草湯下男子膈氣龍腦湯下瀉痢乾姜湯下

治食癥氣塊痞癖等疾八靈丸方

京三稜

煨

石三稜

煨

雞爪三稜

煨

木香

檳榔

剉各一兩

肉豆蔻

去殼半兩

巴豆

去皮心膜煎黃出油盡

硃砂

研各一分

右八味搗羅六味為末入巴豆霜硃砂末拌勻醋煮麩糊和丸如小豆大每服五七丸丈夫生姜湯下婦人醋湯下痞癖氣煎木香湯下

治食癥勞氣五積五膈脾胃久冷喫食無味飲食不化四肢少力痰毒氣脹胸膈不利三稜丸方

京三稜 石三稜 雞爪三稜 黑三稜 蓬莪茂各煨

巴豆連皮 乾姜炮各

附子炮裂去皮臍一兩以上八味用醃醋一斗於銀石器中煮令盡除巴豆不用外並切焙乾 青橘皮去白炒

肉豆蔻去殼各半兩 丁香 木香 桂去麤皮 檳榔剉各半兩

右一十四味搗羅為末每秤一兩末別用巴豆七枚去皮心膜出油細研拌勻更用硃砂一分醋化煮麩糊和丸如大麻子大丹砂末為衣每服三九至五丸生姜湯下

治遠年食癥積氣并酒食所傷胸膈脹滿及婦人血塊木香三稜丸方

木香 京三稜剉煨 補骨脂炒 牽牛子炒 丁香皮剉

乾漆炒煙出各一兩 陳橘皮湯浸去白焙 烏梅肉炒 五靈脂末各二

巴豆霜一分同五靈脂末用醋一升調勻慢火熬成膏 沉香半兩

右一十一味搗羅丸味為末入二味膏子和丸如棗豆大每服五丸至七丸食後臨卧生姜湯下

治食癥氣堅腹中疼痛丁香丸方

丁香 乳香研

木香

肉豆蔻去殼

當歸焙切 青橘皮焙去白

京三稜煨剉各半兩

紫苑去苗土

乾姜炮

附子炮裂去皮臍

巴豆去皮心膜出油研各一兩

鼈甲去裙襴醋炙二兩

丹砂研一分

右一十三味搗羅十味為末與丹砂巴豆乳香拌勻又入蕎麥麩一匙旋滴

新汲水和搗五千杵取手丸如菘豆大每服三丸至五丸先煎散水令沸入

藥煮少頃漉出暴乾茶酒任下要轉利以冷茶下熱茶投之

治食癥氣塊心腹脹滿吐逆酸水小三稜煎丸方

京三稜

蓬莪茂各四兩

芫花一兩

右三味同入瓷瓶內用米醋五升浸封瓶口以澆火煨微乾取出三稜並蓬

莪茂杵碎芫花以餘醋炒微焦同焙乾為末米醋煮麩糊和丸如梧桐子大

每服三丸至五丸生姜鹽湯下婦人醋湯下

諸癥

論曰積氣在腹中久不差牢固推之不移者癥也此由寒溫失宜飲食不節致府藏氣虛弱食飲不消按之其狀如杯盤牢結久不已令人身瘦而腹大至死

不消診其脉弦而伏其堅不轉動者死之候也

治諸癥結痛起於脇下按之而堅妨痛不能飲食漸加羸瘦當歸煮散方

當歸焙切 鼈甲用醋頻煎炙令黃色 桂皮去麤 木香 桔梗炒

桃人湯浸去皮共雙人炒 吳茱萸陳者水淘七

右七味除桃人外搗羅為末入桃人同研令勻每服三錢匕水一盞煎至六

分去滓溫服逐日空腹日午夜卧各一

治積年癥塊京三稜湯方

京三稜炮 青橘皮去白焙 桂去麤皮

木香分 檳榔剉半 大黃剉碎炒

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服空腹日午夜卧

各一

治癥塊衝心氣滿食不下手足煩悶鼈甲丸方

鼈甲去裙襴醋炙黃色 訶梨勒微煨去核 防葵 甘草剉 人參

大黃剉炒各 白朮 桂皮去麤 郁李人去皮 杏人去皮

右一十味除研外搗羅為末入郁李人杏人同研勻鍊蜜丸如梧桐子大空

腹温酒下二十九丸漸加至三十丸以微利為度

治積年癥塊血氣凝滯木香丸方

木香

吳茱萸

陳者淘七  
徧炒乾

青橘皮

去白焙  
各半兩

巴豆

去皮九十粒研如膏  
用紙裏壓去油研

硃砂

用沸湯化於瓷椀中用慢  
火熬水盡收霜再研一分

右五味除研外搗羅為末入巴豆硃砂研令勻於塘火中煨粟米飯丸菜豆

大每服温酒下三丸至五丸食後服澹利勿怪老小減服

治癥癖腹滿如鼓坐卧不安食即欲吐氣悶喘急檳榔湯方

檳榔

二兩微  
煨剉

赤茯苓

去黑  
皮

芍藥

京三稜

微煨  
剉

陳橘皮

湯浸去白焙  
各一兩半

郁李人

湯浸退去  
皮一兩

食茱萸

去葉  
參分

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓温服空腹午後各一

治癥癖氣脹腹痛脇肋脹滿不思食飲此胡湯方

此胡

去  
苗

赤茯苓

去黑皮  
各參分

桔梗

炒

木通

剉各  
一兩

芍藥

鼈甲

去裙襴醋薰慢  
火炙令黃色

郁李人

湯浸去皮  
各半兩

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓温服空腹午後各一

治癥癖氣塊脇肋妨滿腹脹不能飲食腹痛防葵丸方



防葵剉

芫胡苗

赤茯苓

去黑皮 各參分

桂皮去麩

木香各半

鼈甲

去裙襴醋燻慢 火炙令黃色

檳榔

剉各一兩半

桔梗

剉一兩

當歸

切焙 羊兩

郁李人

湯浸去皮共別 研如膏一兩

大黃

剉碎微炒 一兩一分

京三稜

剉

五味子

各半 兩

右一十三味除研外搗羅為末入郁李人同研勻鍊蜜丸梧桐子大空腹温

酒下二十九

治癥癖食氣食勞五膈痰逆夾食丸方

乳香

別研 如粉

木香

丁香

肉豆蔻

去殼

當歸

切焙

青橘皮

去白 焙

京三稜

各半兩 炮剉

紫苑

去苗 土

乾姜

剉

附子

剉裂去 皮臍

巴豆

去心皮別研紙裏 壓出油各一兩

鼈甲

去裙襴用醋燻慢 火炙令黃色二兩

丹砂

一分別 研如粉

右一十三味除乳香丹砂巴豆外搗羅為末然後入乳香等三味同研令勻

都入臼中用蕎麥麩與藥末臨時以意看多少入麩搗徐徐入新汲水搗候

可丸即止丸如菴豆大煎淡漿水令沸旋旋入藥煮三五沸漉出於日中暴

乾每服五丸食後用茶酒温水下

治癥癖氣塊鼈甲丸方

鼈甲

去裙襴醋 燻炙黃色

木香

烏頭

剉裂去 皮臍

芫胡

各 一兩半



京三稜炮剉

當歸切焙

桂皮去麤皮

厚朴去麤皮

生薑汁

陳橘皮湯浸去白

焙各二兩

甘草炙剉

檳榔剉各半兩

大黃剉碎

朴消研如粉各參兩

右一十三味除朴消外搗羅為末同研令勻鍊蜜丸梧桐子大空腹用溫酒下十九飲下亦得

治癥塊粉砂餅方

粉霜

胡粉各一兩

硃砂

丹砂

白丁香

膩粉各半兩

右六味研為末入麩一兩水和捏作餅如碁子大慢火燒熟每服一餅麝香米飲嚼破服

治積年血氣癥塊往來疼痛吐逆不納飲食保命丸方

當歸切炒

烏頭炮裂去皮臍

芍藥

桂皮去麤皮

乾姜炮各半兩

大黃剉炒

斑貓二十一枚用糯米炒令黃色為度去翅足

右七味搗羅為末醋煮麩糊丸梧桐子大空心食前溫酒下一丸

治虛積食氣蠱脹水氣年深癥癖五食丸方

大戟刮去皮

甘遂各半兩生

豬牙皂莢生去皮一兩

胡椒一分

芫花半兩醋浸一宿炒乾

巴豆半兩去皮心膜醋煮參十沸瀝出研

右六味搗研為末合研勻水煮麩糊和丸如菜豆大每服五丸用米麩菜豆肉煎湯放温下量病人大小加至七丸

治癥塊氣積下結胸一切積滯半夏礞石丸方

半夏四十枚湯浸七編 巴豆四十粒去膜 杏人去皮六雙 豬牙皂莢去皮四

味用好醋浸七日取出以布絞取汁熬成膏入眾藥 礞石研細炒 丁香 木香

沉香各二錢 檳榔兩半 膩粉 硃砂各一錢 粉霜各一分

右一十二味將後八味搗研為末入在前膏子內一處再搗納令勻丸小豆大看虛實煎棗湯下二丸爛嚼乾柿乾嚥下亦得

治癥塊消食積止心腹疼木香編丸方

木香 硃砂通明者各一錢 半夏中等者一十枚生 桂去麩皮參錢

草撥四十九枚中等者 杏人皮二十一粒去 巴豆二十一粒去皮心

右七味先將杏人巴豆同研如泥以好米醋八分一盞熬至二分以下成稠膏入前藥末和勻再入棗肉丸菜豆大捏編丸常服食後良久一丸生姜湯

下要轉三丸男子婦人心痛炒萊菔醋湯下

治癥癖化氣取食積及本藏氣水疾蠱脹大戟丸方

大戟

兩半

芫花

醋炒一兩

巴豆

一百粒

去皮

以水

五升

煮水

甘遂

陳橘皮

去白焙

硃砂

姜黃

乾姜

炮

桂

去麤皮

右九味搗研為末於銀石器內炒令極熱勿令焦鍊蜜丸梧桐子大常服生

姜湯下一丸如取轉量藏府虛實加減

治癥積五積食氣諸藥無効者沒藥丸方

沒藥

研

硫黃

研

白丁香

生

當歸

切焙

芫花

醋浸半日炒

硃砂

通明者研

乳香

研

丹砂

研各一分

巴豆

四十九粒

去皮

不出油研

右九味搗研為末合研勻用水浸炊餅和劑搗一千杵丸梧桐子菜豆麻子

三等大每服一丸婦人血氣童子小便和酒下心頭高鞭當歸酒下遠年癥

積五積食氣生姜湯下小兒脾積癖氣臘茶清下大人與大丸十五以下與

中等十歲以下與第三等者服

治積聚癥塊及涎積等續隨子丸方

續隨子

參十枚去皮

膩粉

二錢

青黛

炒

研一錢

右三味先研續隨子令爛次下二味合研勻細以燒糯米軟飯和丸如雞頭

大每服先燒大棗一枚剝去皮核爛嚼取藥一丸椎破并棗同用冷臘茶清

下服後便卧並不按攪至中夜後取下積聚惡物為効

破癥塊消積氣乾漆丸方

乾漆四兩搗為末炒令煙盡

五靈脂用瓶子盛地坑子內以火煨煙盡取灰二兩

懷香子炒令香

皂莢

長五寸許剉以麻纏定用泥固濟火煨煙盡取灰二兩

木香雞骨者

檳榔結實者剉

桂皮去麤

附子炮裂去皮臍

青橘皮去白

陳橘皮去白

蓬莪茂炮

白牽牛

炒令香熟

大黃劈開錦文者炒

京三稜用醋紙裏煨剉

芫花

米醋浸一宿炒乾用各二兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大生姜湯下二十九至三十九

忌豬魚熱麪等物

大德重校聖濟總錄卷第七十三

積聚門

結瘕

論曰結瘕者積聚之類也結伏聚積久不散謂之結浮流腹內按抑有形謂之瘕結之證形體瘦瘁食不作肌膚遇陰寒冷濕之氣則發而腹脇塊鞭隱隱然痛者是也瘕之證腹中氣痛動轉橫連脇下有如癖氣遇脾胃有冷陽氣不足而發動者是也

治結瘕癖實腹滿如鼓食即欲吐喘息急其脉弦而緊防已散方

防已煮

訶梨勒煨去核

郁李人湯退皮研如膏

白朮

檳榔劉各一兩半

吳茱萸陳者淘七偏炒參分

右六味除郁李人外搗羅為散入郁李人同研令勻每服三錢匕水一盞煎

至六分和滓空心溫服

治結瘕脉弦腹滿坐卧不安食即欲吐喘急檳榔湯方

檳榔白者劉一兩半

赤茯苓去黑皮

芍藥

陳橘皮湯浸去白焙

吳茱萸陳者淘七偏炒

郁李人湯退去皮別研如膏

訶梨勒煨去核各參分

京三稜煨剉

桑根白皮焙剉各一兩



右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服食前後各一服  
若服後頻利即減檳榔郁李人

治結瘕氣積腹滿如石氣急少卧小便不利防己湯方

防己

百合

乾者

郁李人

去皮別研如膏各一兩

木通

判一兩半

吳茱萸

陳者淘七

陳橘皮

湯浸去白焙

當歸

切焙

赤茯苓

去黑皮各參分

右八味搗篩為散每服三錢匕水一盞生姜半分煎至六分去滓空心溫服

治結瘕喘嗽腹中疝痛飲食減少四肢乏力防葵丸方

防葵

參分

桂心

兩半

木香

兩半

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

五味子

兩半

鼈甲

一兩半塗醋炙令黃去裙襴

桔梗

參分去頭

川大黃

碎一兩微炒

當歸

半兩剉微炒

京三稜

參分微煨剉

赤芍藥

參分

檳榔

一兩半

郁李人

一兩湯浸去皮微炒

右一十三味搗羅為細末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下

治結瘕久不差令人不思飲食羸瘦少力芍藥散方

芍藥

一兩

桂心

一兩

川大黃

二兩剉碎微炒

鼈甲

二兩塗醋炙令黃去裙襴

京三稜

一兩剉微

檳榔

一兩

右六味搗篩為散每服三錢匕水一盞生姜半棗大拍破同煎至七分去滓



温服空心日午夜卧各一服

治結瘕氣塊飲食不消肺積氣發心胸痰逆氣喘卒中風毒脚氣大腸秘澁奔豚氣痛羗活丸方

羗活去芦頭

桂去麤皮

芎藭

木香

檳榔剉各一兩

郁李人

湯浸去皮研如膏五兩

大黃剉炒二兩

右七味除郁李人外搗羅為末與郁李人研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空腹煎生姜湯或姜棗湯下氣痛温酒下

治結瘕腹脹堅鞮如石肚上青筋浮起紫葛丸方

紫葛一兩

芍藥赤者

桔梗炒

紫苑去苗土

木香

訶梨勒皮各參分

大黃剉熬一兩半

牽牛子生半兩半熟

郁李人湯浸去皮研一兩

右九味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空腹煎木通及棗湯下老幼量減丸數

治結瘕腹脹堅鞮不消木通湯方

木通剉

赤茯苓去黑皮各一兩

赤茯苓

吳茱萸湯洗焙炒各參分

檳榔白者煨一枚剉

紫苑去苗土

郁李人去皮共炒各半兩

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞半煎取七分空腹服日再

治積聚氣塊癖瘕乾柿丸方

硃砂研 砒霜 粉霜 乾漆燒烟 鼈甲去裙襴

黃連去須各一分 旋復花炒 京三稜炮各半兩 杏仁去皮共雙

乾姜炮各兩 皂莢四挺不蛀者去皮酥炙 巴豆四十九粒去皮心膜出油

右一十二味各研搗為細末先將乾漆鼈甲京三稜三味末用粟米半盞不

淘洗以釀醋五升同熬成粥入眾藥拌和丸如豌豆大每服三丸爛嚼乾柿

裹藥臨卧温水下

治遠年虛實積聚瘕塊木香湯方

木香一兩 海馬子一對雄者雌者黃色雄者青色 大黃剉炒 青橘皮湯浸去白焙

白牽牛炒各二兩 巴豆四十九粒

右六味以童子小便浸青橘皮輕裹巴豆以線繫定入小便內再浸七日取

出麩炒黃去巴豆只使青橘皮并餘藥麤搗篩每服二錢七水一盞煎三五

沸去滓臨卧温服

治結瘕積聚血結刺痛木香煎丸方

木香

巴豆 去皮心膜不  
出油細研

大黃

炒 京三稜 生

蓬莪茂 炮

筒子乾漆

烟炒

青橘皮

湯浸去  
白焙

附子

皮 炮裂去  
皮臍

桂 去 蠹

乾姜

炮裂各  
一分

墨

一指  
大研

硃砂

半兩好醋一盞  
化一宿去砂石

右一十二味各研搗為細末先將大黃京三稜巴豆等三味同於銀石器內用醋一升煎一二沸次入硃砂同熬成膏次入諸藥末和勻再入臼杵千下丸如棗豆大每服五丸傷冷食冷酒冷水不消結聚成氣塊痛者乾姜湯或橘皮湯下冷麩黏食不消者煮麩湯下牛羊鼈肉等不消各以本肉煎淡汁下宿酒不消溫酒下婦人諸血氣當歸酒下妊娠不可服欲宣轉者茶下七丸小兒三丸

疰氣

論曰疰氣謂臍腹左右緊鞭而痛橫連如臂取象如弓弦之急故謂之疰氣蓋因寒溫失宜房室過度真陽虛憊陰冷內生所以水飲入於胃而不能銷鑠流於脇下經久不去遂成痼疾若遇陰寒或食冷物則作痛久則不能飲食肌膚消瘦

治疰氣急痛日漸黃瘦大黃湯方

大黃劉

芍藥各二兩

桂皮去麤

鼈甲醋炙去裙襴各一兩半

甘草炙

訶梨勒微煨核

防葵各一兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓下朴消一字攪勻溫服

空心日晚各一以利下爛肉血為驗

治瘥氣口吐酸水醋心常似有物在胸膈間牽牛子丸方

牽牛子生搗羅為末以生薑汁一升慢火熬如錫二兩

硃砂湯中慢火熬取霜一兩

檳榔煨劉木香各三分

桃人湯退去皮共雙入炒黃別研一兩半

附子炮裂去臍

乾姜炮

人參各丁香各分

右九味除煎研外搗羅為末入硃砂桃人研令勻同入牽牛子煎中和搜丸

如梧桐子大每日空心食後煎生薑湯下一十九丸漸加至二十九丸以利下積

滯物為度

治瘥氣胸臆多滿大腸常澀訶梨勒丸方

訶梨勒煨去核

大黃劉

芍藥

防葵

桂皮去麤

甘草炙

烏梅各一兩

鼈甲去裙襴炙二兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹煎生薑湯下二十九日午臨

卧再服

治瘧氣急痛嘔吐酸水食物多噎枳殼丸方

枳殼去蘇麩炒搗末米醋二升別煎如膏

木香 薏苡人

黃連去須

大黃剉

人參 白茯苓皮去黑

附子炮裂去臍皮

蟲寶微炒

郁李人湯去皮共別研各一兩

右一十味除煎研外搗羅為末入郁李人同研勻入枳殼煎中和搗如鞣入

少鍊熟蜜丸如梧桐子大空腹煎黃耆湯下二十九日晚再服

治積冷瘧氣口吐清水面色萎黃附子丸方

附子炮裂去臍皮

草豆蔻去皮各二兩

桂皮去麩

吳茱萸湯浸焙乾炒各一兩

丁香參分

木香半兩

桃人湯去皮共雙人炒黃別研參兩

右七味除桃人外搗羅為末入桃人同研勻別搗羅麩末煮糊和丸如梧桐

子大每服二十九空腹煎生姜橘皮湯下日晚再服

治瘧氣搐痛吐酸水大便不通大黃丸方

大黃二兩搗羅為末以酒二升慢火熬如錫

檳榔煨剉

丁香各參分

訶梨勒煨去核

桂皮去麩 木香各一兩

右六味除煎外搗羅為末入大黃煎中和搗丸如梧桐子大每服食後臨卧

温酒下二十九漸加至三十九



治瘥氣急痛多吐苦水日夜發歇無常木香丸方

木香 乾姜一兩各 烏頭炮裂去皮 桂去麤皮

右四味搗羅為末用米醋三升慢火煎如稀糊和藥末杵丸如梧桐子大每

服一十五丸空腹煎生姜湯下日晚再服

治瘥氣上攻心脾注痛嘔吐酸水醋心烏頭丸方

烏頭皮生用去臍 附子生用去臍 乾姜生用各一兩三 阿魏研末入前

研勻別取生地黃汁四升 肉豆蔻去殼 木香 龍胆去土

乾椿葉各參 當歸切焙一兩半 桂去麤皮

右一十味將木香等六味搗羅為末入前煎中和為劑再入白搗勻熟鞭即

入少蜜丸如梧桐子大每服空腹用溫水下二十九日三若心脾有痛溫水

調蛤粉湯下

治瘥氣心痛巴豆丸方

巴豆參枚去皮心 杏仁炒黃研 大黃一兩剉

右三味同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心溫酒下兩丸

治瘥氣甘遂丸方



甘遂微炒 黃色 芫花醋炒 黃色 桃人湯去皮 黃別研 芎藭 當歸焙切 此胡去苗

蜀椒去閉口及 目炒出汗 吳茱萸湯淘七 焙乾炒 偏 厚朴去麤皮 姜汁炙 桂去麤皮 各一兩

右一十味除桃人外搗羅為末入桃人搗令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每日

空腹煎生姜湯下十九日二

治瘰氣成塊在臍兩邊疼痛甘草丸方

甘草炙 桂去麤皮 盧會研 蜀椒去目及閉 口炒出汗 豉微炒

木香 柏子人 蕪荑各一兩

右八味除盧會外搗羅為末入盧會研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每食後

臨卧用温酒下二十九漸加至三十九

治瘰瘰氣塊鼈甲丸方

鼈甲醋炙去裙 鱗秤二兩 乾姜炮 大黃剉炒 硃砂去砂石 各一兩半 附子炮裂去 皮臍

檳榔剉 桂去麤皮 乾漆炒出 烟 京三稜煨 木香

訶梨勒皮 水銀與諸藥末同 研各一兩 墨燒半 兩

右一十三味搗研為末用麴末三兩濃醋二升同煎成膏和上件藥丸如梧

桐子大每服七丸加至十丸不拘時候日三丈夫温酒下婦人醋湯下不嚼

破取下血塊如雞肝色是效

治瘰癧氣及兩脇積聚并婦人血刺疼痛檳榔煎丸方

檳榔 參兩到搗為末 吳茱萸 為末醋半 京三稜 為末醋半 硫黃

巴豆 硫黃一兩去皮及一升將硫黃與巴豆同研 木香 白豆蔻 皮去

肉豆蔻 殼去 桂 皮去麤 陳橘皮 湯浸去 青橘皮 湯浸去 高良姜

萼撥 訶梨勒皮 白朮 各一 胡椒 分 當歸 切

乾漆 炒烟出 草豆蔻 去皮

右一十九味搗羅為末與前三味膏同按丸如菜豆大每服生姜湯下三五

丸食後服

治瘰癧氣塊冷物所傷消積丸方

代赭 參大燒醋碎 青礞石 研末各 桂 皮去麤 白茯苓 去黑皮各 硃砂 參分

青橘皮 湯浸去 巴豆 去皮出油 京三稜 炮 棟實 各一

右九味研杵為末拌令勻酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服一丸至二丸木

香湯下量虛實加減

治五積瘰癧氣塊三稜丸方

雞爪三稜

石三稜

京三稜

煨

木香

青橘皮

湯浸去白焙各半兩

檳榔

剉

肉豆蔻

去殼各二枚

硃砂

研參分

右八味搗羅為末用生姜汁麩糊和丸如棗豆大每服十五丸空心臨卧生

姜湯下

治丈夫婦人痰癖氣一切積滯京三稜丸方

京三稜

推碎

芫花

各參兩二味醋浸五七日炒黃

蓬莪茂

剉炒

桂

去麤皮各一兩

乳香

研

硃砂

細研各一分

巴豆

參十箇用硫黃一皂子大研細醋兩盞煎令醋盡為度只用巴豆

附子

炮裂去皮臍一兩半

右八味搗研令勻每用葯末二兩鎔黃蠟一兩蜜少許同和丸如梧桐子大

丹砂為衣生薑木瓜湯下二丸至三丸甘草生薑湯下亦得看虛實臨時用

治痰癖結塊面黃肌瘦心腹引痛不欲飲食宿滯冷痰二香三稜丸方

丁香

木香

各一兩

京三稜

煨

雞爪三稜

石三稜

各參分

硃砂

研

牽牛子

炒

大黃

炮

蓬莪茂

炮各半兩

檳榔

剉一兩

巴豆

五十箇去皮心出油七分細研

烏梅肉

焙乾二兩

右一十二味搗研為末再研勻酒煮麩糊和丸如棗豆大每五丸至七丸陳

橘皮湯下食後服

治瘕氣急痛腹脹胃管不下食緩中湯方

乾姜炮

檳榔

甘草炙各一分

鼈甲去裙襖醋炙

附子炮裂去皮臍

芍藥炒

陳橘皮湯浸去白焙

厚朴去麤皮生薑汁炙

人參

枳殼去麤殼炒

桂皮去麤皮

半夏湯洗去滑七編焙各半兩

右一十二味剉如麻豆每服五錢七水一盞半生姜五片煎取八分去滓溫服

治瘕氣胃中寒癖不思食肉豆蔻散方

肉豆蔻人

枳殼去麤殼炒各參分

蕪荑炒二兩

吳茱萸湯洗焙

木香各半兩

高良姜一兩

生姜并皮用一斤

右七味剉如麻豆拌勻麩裏煨令香熟去麩取藥搗羅為散每服二錢七冷

生姜茶清調下

治積冷瘕氣口吐清水面色萎黃白朮丸方

白朮

蓬莪茂剉炮

木瓜切焙

桂皮去麤皮

陳麴炒別為末

木香

蕪荑炒

姜屑各半兩

北亭湯研末同煎成膏

益智各參分

右一十味搗羅九味為末用北亭膏攪和丸如梧桐子大每服二十九炒生姜鹽湯下

治疔癖積聚腹脹氣逆煩滿嘔逆大通散方

沉香

判

木香

白朮

陳橘皮

湯浸去白焙

桑根白皮

判

木通

判各一分

胡椒

一字

黑牽牛

參兩半生半炒搗取粉一兩半餘者不用

右八味除牽牛外別搗羅為細散每服一錢匕入牽牛末一錢匕五更初以沸湯點臘茶調熱服却卧不住以熱茶及熱粥投取利為効少壯多用牽牛少用藥末老弱多用藥末少用牽牛

癖氣

論曰癖氣者聚於兩脇間有時而痛是也以其僻在肋下故名癖氣又云飲水過多或卧覺飲水復卧久皆成癖此由氣脉不宣水飲停積寒氣加之故為是病

治癖氣脇肋妨滿腹脹痛不思食防葵丸方

防葵

此胡去苗

赤芍藥

桂皮

木香

當歸

五味子

各半兩

鼈甲

去裙襴醋炙一兩半

桔梗

炒

大黃

蒸參編判炒一兩一分



京三稜 煨剉 參分

郁李人 去皮 一兩

檳榔 煨剉 一兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心温酒下

治癖氣腹痛兩脇脹滿不思飲食此胡飲方

此胡 去苗

赤茯苓 去黑皮 各參分

赤芍藥

鼈甲 去裙襴 醋炙

郁李人 去皮 各半兩

桔梗 炒

木通 剉炒 各一兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後温服日再

治癖氣在脇下痛久不去京三稜散方

京三稜 煨剉 半斤

枳殼 去瓢 炒一兩

甘草 炙剉 參兩

右三味搗羅為散每服三錢匕入鹽半字沸湯點服空心食前

治癖氣疼痛腹脇脹滿發歇不定可思飲食硃砂丸方

硃砂 醋一盞化 盡熬成膏

芫花 醋拌 炒乾

乾姜 炮

京三稜 剉碎 醋浸三宿 焙乾 各半兩

右四味除硃砂外搗羅為末入硃砂醋膏內和丸如菉豆大每服十九生姜

橘皮湯下不計時候

治食氣癖塊胸膈噎塞冷氣攻刺吐酸水不美飲食腹脇脹痛氣不升降三稜

丸方



京三稜炮

芍藥

桔梗炒

乾姜炮

檳榔生

吳茱萸湯浸焙

烏頭炮裂去皮

鼈甲去裙襖醋

桃人湯浸去皮共雙

大黃煨

訶梨勒煨去核

右一十一味搗羅為末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服十五丸炒橘皮鹽

湯下如酒食所傷胸膈不快腹脹醋心熟水下

治積年癖氣及氣塊上攻心腹鼈甲丸方

鼈甲去裙襖醋

乾姜炮半

京三稜炮

青橘皮湯浸去白

巴豆去皮心膜研用醋

右五味除巴豆外搗羅為末入巴豆膏和丸如菜豆大每服三丸至五丸生

姜湯下空心食前

治癖氣塊聚心胸痛食不消婦人帶下淋瀝羸瘦困怠無力温白丸方

烏頭炮裂去皮

紫苑去苗

吳茱萸湯洗焙

菖蒲

芫胡去

厚朴去麤皮生

桔梗炒

皂莢炙去

赤茯苓去黑

乾姜炮

人參

黃連去

蜀椒去目并閉

巴豆去油盡

右一十四味等分除巴豆外搗羅為末入巴豆研勻白蜜和再杵千下丸如

梧桐子大每服三丸不利漸加至七丸十五日後下惡膿血如雞肝

治癖氣積氣血結刺痛木香硃砂煎丸方

木香

分

硃砂

醋一盞化盡濾去砂石半兩

巴豆

去皮膜不出油研

大黃

炮

京三稜

剉生

乾漆

炒烟出

青橘皮

湯浸去白焙

附子

炮裂去臍皮

蓬莪茂

炮

桂皮

去麤皮

乾姜

炮

墨

一措節大研

右一十二味將大黃京三稜巴豆三味各搗研為末同於銀石器內以醋一升煎一兩沸次入硃砂同熬成膏次將諸藥搗羅為末用膏和成劑杵千下為丸如菉豆大每服五丸炒生姜湯下結聚腹內氣塊痛乾姜湯或橘皮湯下食冷麩黏食不消成塊聚煮麩湯下食牛羊鼈肉成氣塊不散各用本肉淡汁下宿酒不消溫酒下婦人諸般血氣當歸酒下妊娠不得服如要宣轉茶清下加至七丸小兒三丸

治虛積導滯氣消癖塊如意丸方

硃砂

半皂子大十二塊

巴豆

參十六枚去皮

大棗

十二枚去核取六枚每枚各入巴豆肉參枚硃砂一塊各用濕紙裹

兩重

煨火內煨焦候有烟取出紙於地上生用

白丁香

八十四箇堅實者

膩粉

錢一

右五味將已去核棗六枚水煮熟同搗納餘藥成膏丸如棗豆大每服五丸煎生姜湯下小兒二丸至三丸煎皂子湯下臨卧服

治癖氣結鞭不消胸脇脹悶消癖丸方

巴豆去皮心研壓去油別研一分

硃砂酒一盞化盡慢火熬成膏半兩

豬牙皂莢去皮酥炙四兩

右三味先將皂莢搗羅為末入巴豆研勻用硃砂膏和丸如棗豆大每服一丸食後臨卧粥飲下

治丈夫婦人腹內癖氣郁李人丸方

郁李人皮去

京三稜剉

芫花

蓬莪茂剉

木香各一兩

右五味用醋一升同煮醋盡焙乾搗羅為末麩糊丸如棗豆大每服三五丸生姜湯下日三

治男子婦人小兒虛中癖氣藏府不調食飲不消久致瘦弱不可取轉者服之自然好安又治虛氣膨脹心胸悶滯并婦人產後血積蓐勞瘦瘁甚者鼈甲三稜丸方

鼈甲

九肋重四兩以上者水浸洗去脊骨裙襴醋浸一宿炙為末

京三稜

水浸兩宿醋剉浸一宿焙乾為末

乾漆

炒烟出各參兩

木香

乾姜炮

補骨脂

炒

檳榔剉為末

沒藥研 硃砂研 墨研各

右一十味搗研為末再同研勻醋煮麩糊為丸如菜豆大每服二十九生姜鹽湯下婦人血病醋湯下

治癖氣發歇衝心疼痛不知人蓬莪散方

蓬莪煨剉 胡椒分 附子炮裂去皮

右三味搗羅為散每服半錢七醋湯調下不計時候

治癖氣發歇疼痛不可忍者宜急服應痛丸方

桂皮去麤 乾漆炒烟 京三稜煨者 當歸切

右四味等分搗羅為末醋煮麩糊為丸如梧桐子大燒紙灰酒下十五丸至

二十九

治癖積建脾胃消宿滯鼈甲大黃丸方

鼈甲去裙襖醋炙黃二兩 大黃煨剉 檳榔 附子炮裂去皮 麥蘖炒各

烏藥剉 訶梨勒煨去核 木香 白朮 桂皮去麤

蓬莪剉 京三稜剉各 枳殼去麤 吳茱萸炒各

右一十四味並搗羅為末後將硃砂三兩細研醋三升濾去滓將前藥末平

分一半入硃砂內攪和於銚子內煎成膏按餘藥和丸如梧桐子大空心炒  
生薑鹽湯下二十九

治冷癖醋心嘔逆宿食不消中酒後腹藏雷鳴時發腹痛一切虛冷等溫胃丸  
方

吳茱萸湯洗醋炒

陳麴炒黃

陳橘皮湯浸去白焙

白朮

人參

桂去麤皮

熟乾地黄焙

甘草炙各兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹飯飲下十九

寒癖

論曰寒癖者有癖積在脇下遇寒即痛是也此由飲冷過度停積不散能使氣  
道升降胃府和調則飲食消化陳寒癖積亦自去矣

治寒癖積聚巴豆丸方

巴豆參七枚去皮心研紙裏壓去油

杏仁五十枚湯浸去皮六雙人炒令熟研如膏

桔梗剉炒

皂莢去黑皮子塗酥炙黃色

藜蘆去苗微炒各二兩

右五味除研者外搗羅為末入研藥拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服食前

米飲下一丸日三服欲利者服二丸



治久寒癖積胸脇痞滿心腹堅鞭短氣嘔逆手足厥冷腰背引痛吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗七遍焙乾炒一兩

附子炮裂去皮臍半兩

厚朴去麩皮生薑汁炙透

桂皮去麩

白礬燒令汁盡研如粉

人參

半夏湯洗去滑七遍焙乾

枳實炒麩

乾姜炮各分

右九味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心温酒下

治久寒宿癖心腹刺痛痰逆嘔吐飲食不消下利羸瘦白朮丸方

白朮

吳茱萸湯洗七遍焙乾炒各二兩

桔梗炒一兩

當歸切焙

赤茯苓去黑皮各一兩

乾姜炮二兩

桂皮去麩

附子炮裂去皮臍

生乾地黄焙

細辛去苗葉

椒去目并閉口者炒出汗

甘草炙剉各一兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心温酒下二十九

治寒癖宿滯飲食不消千金丸方

丹參去芦頭半兩

乾姜炮二兩

附子炮裂去皮臍

人參

戎鹽研如粉各半兩

半夏湯浸去皮焙乾一兩半

大黃剉炒二兩

苦參剉

桂去麩皮各半兩

石膏二兩研

巴豆參十枚去皮心紙裏壓去油別研

右一十一味搗研為末再同研勻鍊蜜和丸如小豆大每日食後温酒下三



丸

治寒癖飲食不化心下虛滿如水狀枳實湯方

枳實疑炒

白朮各一兩

半夏湯洗去滑暴乾

前胡去芦頭各二兩

桂皮去麤

甘草炙剉各一兩

赤茯苓去黑皮二兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生姜一小塊拍碎同煎至八分去滓

溫服空心日午臨卧各一

治寒冷癖積虛中積滯及下痢心腹疼痛木香丸方

木香

硃砂研分各半

附子去皮臍生用

高良姜

胡椒各一分

硫黃研分半

巴豆二十八粒去皮心膜出油研

右七味搗研為末再同研勻用粟米飯和丸如菘豆大每服五丸煎乾柿湯

下臨卧服

治寒癖留滯不消葫蘆巴丸方

葫蘆巴

補骨脂各一錢

木香

懷香子炒各一分

棟實炒半兩

硃砂研一錢

銅綠研一錢

五靈脂研

膩粉研各一分

巴豆參錢去皮心膜不出油研

草烏頭半兩用麩和巴豆同炒黑色

積聚門

右一十一味搗研為末用樓葱汁和丸如豌豆大看虛實炒鹽酒下三五丸  
空心服

治寒癖積氣病痛下利大沉香煨姜丸方

沉香一兩半 砲砂研 木香各半兩 附子一枚炮裂去皮臍 黑三稜炮

雞瓜三稜炮 京三稜炮各半兩 青橘皮湯浸去白焙 當歸切焙各一兩

右九味搗研為末酒煮麩糊和丸如小櫻桃大每服用生薑一塊剉作甕子  
入藥一丸以濕紙裏煨令香熟安地上出去火毒少時細嚼鹽湯下

治寒癖虛冷久積成塊進食化痰解風秘皂莢丸方

皂莢不蚰者去黑皮并子塗酥炙 肉蓯蓉酒浸一宿薄切焙乾 白芷 附子炮裂去皮臍各一兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸温酒熟水任下空心  
食前服如闕隔服暖藥不得者服此便通快

治寒癖積塊丁香丸方

丁香 沉香 附子炮裂去皮臍 砲砂研各半兩 陳麴末參兩

右五味除砲砂陳麴外搗羅為末用木瓜一枚大者破開去瓢入砲砂於木  
瓜內甑上蒸爛次入諸藥末都研着軟鞭次入陳麴末看得所為丸如梧桐

子大每服五丸茶湯或温酒嚼下如腰疎轉可服十丸小兒一丸  
治冷癖氣困服熱葯發熱心驚虛悸下冷上熱頭痛嘔逆白朮丸方

白朮

陳橘皮去白焙各一兩半

白芷參分

防風去義

芎藭

山芋

吳茱萸湯洗七遍焙乾

厚朴去麩皮塗生薑汁炙熱

桂皮去麩

大麥蘖炒

乾姜炮

防葵剉各一兩

甘草炙剉

茯神去木

人參各一分兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心温酒下二十九

酒癖

論曰胃弱之人因飲酒過多酒性熱使渴而引飲遇氣道否澁酒與飲俱不化  
停在脇肋結聚成癖其狀按之有形或按之有聲脇下弦急脹滿或致痛悶肌  
瘦不能食但因酒得之故謂之酒癖

治酒癖痰多脇脹氣喘大黃桃人丸方

大黃剉炒

桃人去皮共雙人炒研

芎藭

陳橘皮湯浸去麩焙

蜀椒去目并閉口炒出汗各一兩

乾姜炮

高良姜

小草各三分

右八味為細末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服三十九粥飲下日三

治酒癖食塊痰積及血氣血刺血塊陰陽二毒水銀煎方

水銀 鉛各半兩  
結砂子兩

膩粉 兩半

硃砂 通明各一  
者兩

礞石 分 巴豆 二粒去皮心  
膜出油研

右七味除膩粉外合研勻用大棗八枚去核以水調膩粉分填於棗內以濕紙五重逐枚裏之灰火內煨熟去紙并棗皮將棗肉與前葯同研勻每服皂子大一丸安舌上勿嚼用姜棗湯吞下取下積滯効

治酒毒發四肢黃腫積聚成塊行風順氣四神散方

甜葶蘆 一兩湯浸  
炒令紫色

海藻 一兩洗  
去鹹味

吳茱萸 一兩湯浸七  
遍焙乾微炒

陳橘皮 一兩湯浸  
去白瓢焙

右四味搗羅為末每服一錢匕水一盞生姜半棗大擘破同煎至六分和滓温服

治酒瘡癖水不消兩脇脹滿時復嘔吐腹中如水聲乾姜丸方

乾姜 一兩炮  
裂剉

葛根 一兩

白朮 二兩

枳殼 一兩燒沙  
微黃去瓢

陳橘皮 參分湯浸  
去白瓢焙

甘草 半兩炙  
微赤剉

右六味搗羅為細末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服三十九粥飲

下日二

又方

川芎

一兩

京三稜

一兩 裂

右二味搗羅為末每服二錢葱白酒調下

治瘕氣在兩胸結聚不散礪砂丸方

礪砂

參錢 細研

巴豆

十二枚 去心皮

川烏頭

半兩 炮裂 去皮臍

芫花

半兩 醋拌 炒令乾

皂莢

半兩 去黑皮塗 炙令焦去子

五靈脂

乾姜

炮

京三稜

半兩 煨各

右八味搗羅後六味為末入煎二味拌勻再羅每秤此藥末一兩入去皮心膜油煎黑色巴豆十二枚研和勻以醋煮麩糊丸如大麻子大每服五丸加

至七丸茶酒熱水任下

治酒癖至妙通神丸方

乾姜

炮

知母

焙

烏頭

炮裂去皮臍各一兩

巴豆

去皮心膜出 油研半兩

右四味搗羅前三味為末入巴豆同研勻以酒煮麩糊丸如菴豆大每服七丸加至十丸臨卧生姜湯下

治酒癖食積逐痛氣紫金丸方



代赭石末

礞砂末

巴豆霜

各一分

木香末

丹砂末

各抄二錢匕

膩粉

礞石末

各抄參錢匕

右七味合研勻細以燒粟米飴為丸如小豆大每服二丸至三丸冷橘皮湯下

治酒癖脇下脹滿不能飲食枳樓散方

枳樓實

去殼焙乾一兩

陳麴末

微炒半兩

右二味為細散每服二錢匕葱白湯調下

治宿食酒癖鼈甲大黃丸方

鼈甲

生末

大黃

生末

吳茱萸

末各二兩

礞砂

火枯半兩與上參味用米醋二升慢火煎成膏

藥後

京三稜

炮

木香

陳橘皮

白湯浸去焙

白朮

肉豆蔻

去殼

枳殼

去瓢熨炒各一兩

右一十味搗羅後六味為末將前鼈甲煎按和丸如梧桐子大每服二十九

酒飲任下空心服加至三十九

痲癖不能食

論曰痲癖不能食者由脾胃虛弱為寒氣所乘蓋脾胃者倉廩之官其氣宣通



則能傳化糖粕受納水穀痠痺之人本於寒氣久積腹內不能榮養府藏脾胃既弱邪氣停滯故但虛滿而不能食也

治痠氣腹脹兩肋急滿不能飲食頭痛壯熱身體疼痛枳殼湯方

枳殼去瓢麩炒

桔梗去頭炒

人參

前胡去頭

桂去麩皮

檳榔微煨剉

鼈甲去裙襴醋炙

右七味麩搗篩每服三錢匕水一盞半入生姜半棗大拍破同煎至七分去滓溫服日三

滓溫服日三

治痠氣兩肋脹滿不能飲食白朮湯方

白朮

赤茯苓去黑皮

枳殼去瓢麩炒

人參

桔梗去頭炒

桂去麩皮

右六味麩搗篩每服三錢匕水一盞半入生姜半棗大拍破同煎至七分去滓溫服日三

滓溫服日三

治痠氣撮痛不能飲食人參湯方

人參

陳橘皮湯浸去白焙

白朮各一兩

桂去麩皮

赤茯苓去黑皮

右五味麩搗篩每服三錢匕水一盞半入生姜半棗大拍破同煎至七分去

滓温服日三

治瘧氣胃中寒痺不思飲食肉豆蔻散方

肉豆蔻

去殼

枳殼

去瓢麩炒各參分

蕪荑人

吳茱萸

陳者淘焙各二兩

高良姜

一兩剉

木香

半兩

生姜

一斤并皮薄切炒乾

右七味搗羅為散和小麥麩裹之以塘灰火煨令麩黃熟去麩取散每服三

錢七空服用冷生姜水調下午後再服

治瘧氣胃冷不入飲食木香丸方

木香

蜀椒去開口及目炒令汗出

乾姜炮裂各一兩

右三味搗羅為末鎔蠟和丸梧桐子大空心温酒下七丸

治瘧氣積滯不消胸膈痞悶可思飲食京三稜湯方

京三稜

炮剉

木香

甘草炙剉

蓬莪茂

炮剉各一兩

藿香葉

一兩半

烏藥

剉

懷香子

炒各半兩

赤茯苓

去黑皮三分

右八味麤搗篩每服三錢七以水一盞煎至七分去滓食前温服

治瘧瘵氣每發疼痛不能飲食白朮湯方

白朮

木香

益智去皮各一兩

京三稜

微煨熟剉三兩

檳榔

剉半兩

右五味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓不計時稍熱服

治瘰癧積氣不能飲食及五膈氣婦人血氣木香散方

木香一分 蓬莪茂炮剉六兩 京三稜剉炮 益智去皮各二兩

陳橘皮去白焙四兩 甘草炙剉三兩

右六味搗羅為散每服二錢七入鹽點不計時候

治瘰癧急痛不能飲食京三稜丸方

京三稜五兩搗木以好醋一椀同熬成稠膏 蓬莪茂炮剉 益智去皮

青橘皮去白焙各三兩 冬用檳榔 夏用木香各一兩半

右五味內四味搗羅為末以京三稜膏和丸如菜豆大每服二十九至三十

十九生薑湯下食後

治腹內瘰癧積聚心胸刺痛面無顏色鼈甲散方

鼈甲去裙襴炙 附子炮裂去皮臍 木香 白朮 京三稜剉

檳榔半生半熟剉各參分 大黃微炒 桂皮去麤 高良姜炒 芎藭各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢七炒生姜湯或炒生姜酒調下

治瘰癧不能食心脇刺痛發作有時并膀胱小腸冷滯黑神丸方

漆六兩半生用重湯煮半日令香

陳麴

懷香子各四兩

木香細剉

椒紅

丁香各二兩

檳榔四枚剉除椒紅外五物皆半生半炒

右七味內六味搗羅為末用漆和丸如彈子大取懷香子末十二兩鋪蓋陰乾并懷香收器中養為極乾乃去懷香瓷合盛若腎餘氣小腸膀胱疔瘕癖七疝下墜五膈血傷產後諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一丸皆綿灰酒化下難產炒葵子四十枚搗碎酒煎濃汁化下一丸諸疾不過三服

大德重校聖濟總錄卷第七十四

泄痢門

泄痢統論

論曰脾與胃合俱象土外榮肌肉腐熟水穀風寒暑濕襲於外則留連肌腠傳於脾胃飲食不節害於內則腸胃乃傷不化糟粕皆能為病所得之源不一故立名多端且久風入中則為飧泄濕勝則為濡瀉寒中則為洞泄暑勝則為毒痢而又或冷或熱或赤或白或色雜或腸垢或滯下或休息或澁或蠱之類種種不同悉由將攝失宜飲食不慎致腸胃不調邪氣交攻施治之方則有宜調補宜攻化宜收斂宜滲泄各隨所宜以用之

水瀉

論曰內經謂諸厥固泄皆屬於下暴注下迫皆屬於熱蓋為冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱水穀不分濕飲留滯水走腸間禁固不能故令人腹脹下利有如注水之狀謂之注泄世名水瀉  
治水瀉不止木香散方

青木香

黃連

去須炒 各一兩厚朴 去麤皮生薑汁炙令紫剉三分

訶黎勒皮

微炒 三分



龍骨 半兩

右五味搗羅為散每服三錢七空心以粥飲調下日午再服以差為度小兒  
以意加減服之

治一切水瀉及冷痢厚朴散方

厚朴 去麤皮生薑汁  
炙令紫到一兩

白朮 一兩

甘草 半生半炙半兩 陳橘皮 湯浸去白  
焙三分

乾薑 半生半炮  
裂一兩

右五味搗羅為散每服三錢七空心米飲調下如霍亂吐瀉新汲水調下日  
晚再服

治水瀉腸鳴臍腹撮痛代赭丸方

代赭 煨赤 乾薑 炮

龍骨 各一兩

附子 炮裂去皮  
臍三分

右四味搗羅為末研軟飯和丸如梧桐子大每服三十九丸空心米飲下日午  
再服

治水瀉無度腸鳴腹痛肉豆蔻散方

肉豆蔻 去殼為末一兩

生薑 汁二合

白麩 二兩

右三味將薑汁和麩作餅子裹肉豆蔻末煨令黃熟研為細散每服二錢七



空心米飲調下日午再服

治水瀉不止硃砂丸方

硃砂研

石硫黃

研各一分鉛丹

巴豆

去皮心出油盡一十四枚

右四味先將巴豆霜研細入諸藥同研細用糯米飯為丸如小豆大水瀉新汲水下丸赤白痢煎乾薑甘草湯放冷下一丸吐瀉煎生薑木瓜湯放冷下一丸白痢煎乾薑湯放冷下一丸不拘時候

治暴注水瀉日夜無度蚪門散方

椽蚪子

刺去核訶梨勒

煨去須黃連

右三味等分搗羅為散每服一錢七米飲調下食前

治水瀉不止木香丸方

木香

草烏頭

生去皮臍半兩

胡粉

半兩

肉豆蔻

一枚大者去殼

巴豆

大者七枚去皮膜出油盡研

右五味搗羅為細末合研勻糯米飯和丸如黍米大每服三丸小兒一丸

并用冷菜菔湯下

治水瀉不止黑神丸方

巴豆 一枚去皮心膜不出油

鑄墨 錢一

杏人 七枚去皮去雙尖炒

右三味同研極細以糯米粥和丸如秣米大每服一丸冷水下立止甚者再服一丸

治水瀉不止立效丸方

鉛丹 炒半錢

草烏頭 一枚炮裂去臍皮

巴豆 三枚去皮心膜出油盡研

右三味先搗烏頭為末與二味同研極勻以麩糊和丸如菜豆大每服一丸煎陳粟米甘草烏梅湯放溫冷下

治水瀉杏人丸方

杏人 湯浸去雙眼皮尖七粒

砒霜末

鑄墨

巴豆霜 各一錢

右四味同研棗肉和丸如粟米大臨卧新汲水下丸

治水瀉白痢小腹痛玉霜丸方

砒霜 研細粉二兩黃蠟一兩

右二味以瓷碗盛重湯煮鎔開以東南柳枝二七莖各長七寸麤細如筋每用兩莖攪藥又轉一頭攪候兩頭并黑黃色乃已又取兩莖依前攪七次了將出藥趁軟作條子收遇病旋於火上烘軟丸如梧桐子大小兒菜豆大空心

新汲水下一丸

治水瀉腸鳴鉞頭丸方

巴豆

一枚去皮膜

杏仁

一枚去皮尖二味皆針割火上煨令存性

右二味同細研約三百轉入大豆末一字再研一百轉麪糊和丸如針頭大每服一丸新汲水下

治水瀉并赤白痢如聖丸方

烏頭

端正大者炮裂去皮臍

菜豆

右二味等分搗羅為末新水和丸如菜豆大以丹砂為衣每服五丸白痢煎乾薑湯下赤痢煎甘草湯下赤白痢煎乾薑甘草湯下水瀉用新汲水下小兒一兩丸不計時候

治水瀉方

右用青州乾棗十枚去核入葶苈子填满以麻纏却用炭火燒令煙盡研令細每服一錢半七煎陳粟米稀粥飲調下

治水瀉滑腸氣虛久冷如聖丸方

乾薑

炮

高良薑

胡椒

蜀椒

去目并閉口炒出汗

右四味等分搗羅為末醋煮米糊和丸如梧桐子大每服三十九丸早晨空心食前粥飲下

治水瀉不止傷冷虛極黃蠟丸方

硫黃

兩一

右一味研細先鎔黃蠟入硫黃末打勻丸如梧桐子大每服五丸新汲水下  
治水瀉訶黎勒丸方

右取訶黎勒不拘多少以麩裹灰火內炮令赤黃剝去麩取訶黎勒皮搗羅為末軟飯和丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下空腹食前

治暴水瀉不止厚朴散方

訶黎勒皮

厚朴

去麩皮生薑汁炙剉各一兩

甘草

炙剉

黃連

去須微炒

乾薑

炮

肉豆蔻

去殼

白朮

剉炒

赤茯苓

去黑皮各三分

右八味搗羅為散每服二錢七溫米飲調下

治脾胃虛冷腸滑水瀉如休息痢不止木香丸方

木香

白朮

煨火

肉豆蔻

丁香

各半兩

訶黎勒皮

煨取

乾薑

炮

龍骨

各一兩

黃連

去須三兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心米飲下三十九丸日晚再服

治水瀉蕪荑丸方

蕪荑炒

黃連去須炒

吳茱萸

湯洗焙乾炒各三兩

枳殼

去瓢麩炒半兩

乾薑

炮一兩

縮沙蜜

二兩

右六味搗羅為末煮漿水飯和丸如梧桐子大每服二十九丸溫米飲下

治水瀉腸滑不禁訶梨勒丸方

訶梨勒

二兩以麩裹煨去核取皮并麩為末

乾薑

炮

龍骨

赤石脂

各一兩

右四味搗羅為末以稀麩糊丸如梧桐子大每服空心以米飲下二十九

治水瀉吐噦偏身疼痛訶梨勒丸方

訶梨勒

煨去核

鹿茸

酥炙去毛

桑根白皮

剉

赤石脂

天雄

炮裂去皮臍

地榆

龍骨

各一兩半

白芷

黃連

去須

桂皮

去粗

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙

白茅根

當歸

切焙各一兩

黃芩

去黑心

乾薑

炮裂各半兩

肉豆蔻

去殼四枚

右一十六味搗羅為末爛飯為丸如梧桐子大每服三十九丸溫米飲下

治水瀉腹痛日夜不止正氣散方

縮沙蜜去皮炒 附子炮裂去皮臍 赤石脂 肉豆蔻去殼 石榴皮焙 龍骨

甘草對炙 人參 地榆 吳茱萸湯浸焙乾炒 白朮

乾薑炮各一兩

右一十二味搗羅為散每服三錢匕煮粳米飲調下不拘時以止為度

治水瀉米穀不化晝夜不止白堊丸方

白堊煨過一兩 乾薑炮一兩 楮葉研細二兩生

右三味搗研為末麩糊和丸如菉豆大空心米飲調下二十九

又方

取黃荊葉不限多少陰乾搗羅為散每服以米飲調下三錢匕

又方

取羊蹄根曬乾刮去皮搗羅為散每服以米飲調下三錢匕

又方

取熟艾半斤慢火炒令熟布裹坐之冷再炒坐

濡瀉

論曰內經曰濕勝則濡瀉甲乙經曰寒客下焦傳為濡瀉夫脾為五藏之至陰



其性惡寒濕今寒濕之氣內客於脾則不能裨助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡瀉

治腸胃受濕濡瀉不止肉豆蔻散方

肉豆蔻炮去殼 黃連炒去須 訶梨勒炮去核 甘草炙 白朮

乾薑炮 赤茯苓去黑皮 厚朴去粗皮生薑

右八味搗羅為散每服二錢七空心食前米飲調下日三

治脾胃傷濕濡瀉不止豆蔻散方

肉豆蔻去殼炮 甘草炙剉 厚朴去麤皮生薑

右三味搗羅為散每服二錢七米飲或湯調下食前溫服

治腸胃寒濕濡瀉腹內疝刺疼痛當歸散方

當歸切焙 木香 肉豆蔻去殼炮 乾薑炮 訶梨勒炮去核

黃連去須炒

右六味搗羅為散先用水四盞入甘草生薑各一分黑豆一合并半生半炒

同煎至二盞去滓分作二服每服用調散三錢七空心日午服

治濡瀉水痢久不止桂附丸方

桂皮去麤

附子炮裂去皮臍

乾薑炮

赤石脂各一兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸空心食前米飲下日三

治腸胃寒食濡瀉無度嗜卧不食猪苓丸方

猪苓去黑皮半兩

肉豆蔻去殼炮二枚

黃蘗去麤皮炙一分

右三味搗羅為末米飲和丸如菜豆大每服十丸食前熟水下

治寒濕傷脾濡瀉訶梨勒散方

訶梨勒炮去核

吳茱萸湯浸焙炒

木香

蕪荑炒各半兩

黃連去須炒一兩

右五味搗羅為細散每服二錢七空腹陳米飲調服日再

治腸胃受濕濡瀉無度腹痛飲食不化白豆蔻湯方

白豆蔻去皮

訶梨勒炮去核

陳橘皮湯浸去白焙炒

乾薑炮各半兩

厚朴去麤皮生薑汁炙三分

右五味麤搗篩每服五錢七切薤白三寸水一盞半煎至七分去滓空心温

服日再

治濡瀉暴下不止枳殼湯方

枳殼去瓢麤炒三分

黃連去須炒

厚朴去麤皮生薑汁炙各一兩

甘草炙剉

阿膠炙燥各半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓空心溫服日再

治腸胃寒濕濡瀉不止及冷痢色白食不消化附子湯方

附子炮裂去皮臍甘草炙阿膠炙燥各半兩黃連去須炒一兩

右四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓空心溫服日再

治脾胃受濕濡瀉不止建脾白朮丸方

白朮 乾薑炮各三分厚朴去粗皮生薑汁炙一兩人參三分

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心米飲下日再

治寒濕濡瀉久不差附子丸方

附子炮裂去皮臍一兩甘草炙剉二兩

右二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸空心生薑湯下日再

治傷濕濡瀉不定厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙一兩半黃連去須炒一兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半大棗二枚擘破煎至一盞去滓空心

溫服日再如腹痛加當歸三分

治濡瀉不止或冷痢無度附子丸方

附子炮裂去皮臍 高良薑各一兩一分 甘草炙

右三味搗羅為末陳米煮糊丸如梧桐子大每服二十丸米飲下不拘時服

治濡瀉裏急後重數走圓檮根散方

檮根皮剉一兩 枳殼炒去瓢 甘草炙

右三味搗羅為散每服二錢七粥飲調下食前一服止

治胃虛泄瀉老人冷瀉建脾湯方

烏頭炮裂去皮臍三分 甘草炙 乾薑炮 厚朴去麤皮生薑汁炙各一分

右四味剉如麻豆每服三錢七水一盞生薑二片煎至七分去滓熱服併二服止

服止

治久患脾泄瀉薑連散方

生薑四兩 黃連去須一兩

右二味以咀加麻豆一處慢火炒令薑赤色去薑取黃連為細散每服二錢

七空腹臘茶清調下不過二服差

飧泄

論曰內經曰清氣在下則生飧泄又曰久風為飧泄夫脾胃土也其氣沖和以化為事今清濁交錯風邪之氣得以干胃故沖氣不能化而食物完出夕食謂之飧以食之難化者尤在於夕故食不化而泄出則謂之飧泄此俗所謂水穀痢也

治風冷入中飧泄不止脉虛而細日夜數行口乾腹痛白朮湯方

白朮

當歸切焙

龍骨各一兩

熟艾炒半兩

厚朴去麤皮生薑汁炙一兩

右五味麤搗篩每服四錢匕水一盞入生薑兩片同煎至七分去滓空心日晚溫服

治腸胃受風飧泄無度或下黃水腹脇痛悶地榆湯方

地榆

厚朴去麤皮生薑汁炙

當歸切焙各三分 吳茱萸湯浸焙乾炒

艾葉炒

高良薑各半兩

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去滓空心日午溫服

治腸胃風冷飧泄注下腹痛不止乾薑丸方

乾薑炮

厚朴去麤皮薑汁炙 當歸切焙各三分 阿膠炙燥

龍骨各一兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心棗湯下日午再服



治殮泄米穀完出茯苓湯方

赤茯苓去黑皮厚朴去麤皮黃連去須炒乾薑炮半  
各一兩

右四味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半煎至八分去滓空心日午溫服

治殮泄水穀不化及諸色痢茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙乾炒黃連去須炒

右二味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半煎至八分去滓空心溫服未止再

服

治殮泄色白食不消化乾薑丸方

乾薑炮黃連去須炒各一兩半

右二味搗羅為末先以酒一斗微火煎候可丸即丸如梧桐子大空心米飲

下三十丸日午再服

治殮泄氣痢腹脹滿不下食華撥散方

華撥半兩肉豆蔻去殼半生半煨一兩乾薑炮半訶梨勒半生半炮去核一兩

白朮三分甘草半生半炙剉半兩木香半生半炒一兩

右七味搗羅為散每服二錢匕空心米飲調下日晚再服



治脾胃氣虛殮泄不止飲食不消雷鳴腹內疴痛桂心丸方

桂去麤皮

赤茯苓去黑皮

赤石脂各三分

黃連去須炒

麥蘖炒

陳麩炒

石斛去根

乾薑炮

當歸焙切

人參

蜀椒去目並閉口炒出汗

附子炮裂去皮臍

龍骨各半兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心煖酒下日午再服米飲亦得

治泄痢無問老少地榆湯方

地榆剉

酸石榴皮

甘草炙剉各三分

阿膠炙炒半兩

厚朴去粗皮生薑汁炙三分

白石脂研半兩

赤芍藥三分

龍骨半兩

右八味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓空心日午溫服

治腸胃受風久為殮泄下痢嘔逆腹內疴痛高良薑湯方

高良薑

木香

赤茯苓去黑皮

檳榔剉

肉豆蔻去殼

吳茱萸湯浸焙炒

陳橘皮湯浸去白炒

縮沙蜜半兩

乾薑炮一分

右一十味麤搗篩每服四錢七水一盞半煎至八分去滓不拘時日三服

治殮泄水穀不分溫脾止腹痛進食豆蔻散方

草豆蔻皮去 乾薑 甘草 高良薑 陳橘皮湯浸去白

右五味等分剉碎都作一處用胡餅劑裹煨灰內炮令黃熟取出藥去麩搗

羅為散每服二錢匕陳米飲調下食前服

治泄痢無度訶黎勒散方

訶黎勒 母丁香各五枚 甘草炙剉一錢 肉豆蔻麩裹一枚

右四味搗羅為散米飲調半錢匕食前服

治腸胃冷氣殮泄不止木香散方

木香 阿膠炙炒 訶黎勒炮去核 黃連去須炒各半兩 吳茱萸湯浸焙炒 乾薑炮

龍骨各一分

右七味搗羅為散每服三錢匕空心米飲調下日晚再服

治脾胃氣虛腹脹殮泄困劣服煖藥即嘔逆食飲不下薑米散方

陳米一升用生薑二斤取汁浸米煨搗篩為末炒令黃 肉豆蔻三枚去殼 草豆蔻十枚煨去皮

陳橘皮去白炒 甘草炙剉 燒鹽各一兩研

右六味搗研為散每服二錢匕沸湯點服不拘時候

洞泄寒中

論曰內經謂長夏善病洞泄寒中洞泄謂食已即泄乃殮泄之甚者此因春傷於風邪氣留連至夏發為殮泄至於長夏發為洞泄蓋當春之時陽氣在表為風邪所中入客于經未至府藏風者陽氣也東方木也未能勝土脾胃受之仲夏則陽盛之時以陽邪之氣違陽盛之時重陽必陰病在脾胃故為殮泄陰生於午至未而盛是為長夏之時脾上當王脾為陰中之至陰則陰氣盛陰盛生內寒故令人府藏內洞而泄是為洞泄寒中之病

治洞泄寒中注下水穀或痢赤白食入即出食物不消附子丸方

附子炮裂去皮臍烏梅肉炒乾各一兩

乾薑炮一兩半黃連去須炒二兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空心米飲下日晚再服

治洞泄冷痢熟艾湯方

熟艾炒附子炮裂去皮臍甘草炙乾薑炮赤石脂各半

黃連去須一兩阿膠炙令燥三分

右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心食前溫服

治洞泄不拘冷熱注下不止如神散方

附子炮裂去皮臍 白木椎碎用漿水煮半日焙乾各一兩 乾薑炮 甘草炙剉各半兩

右四味搗羅為散每服一錢七空心溫米飲調下如熱瀉新水調下

治寒中洞泄不止及年高久瀉建脾湯方

烏頭炮裂去皮臍三分 厚朴去麤皮薑汁炙 甘草炙 乾薑炮各一分

右四味剉如麻豆每服三錢七水一盞生薑三片煎至七分去滓連併熱服

治大腸積冷洞泄不止天仙子丸方

天仙子 乾薑炮 陳橘皮湯浸去白焙 訶梨勒皮各一兩

右四味先為麤末用醋拌勻一宿炒令黃色再為細末醋煮麪糊和丸如梧

桐子大每服二十九丸食前米飲下

治洞泄不止兼治霍亂附子湯方

附子一枚重七錢者炮裂去皮臍

右一味細剉分二服每服以水一盞鹽半錢七煎至六分去滓溫服

治洞泄寒中注下不禁不思飲食紅豆散方

紅豆揀 附子大者炮裂去皮臍 乾薑炮 硫黃細研各一兩

右四味搗研為散和勻每服一錢七空心溫粥飲調下再服當愈

治洞泄不止豆蔻湯方

肉豆蔻七枚  
去殼烏頭

白木各一  
兩

右三味用油四兩先煎後二味候白木黃色烏頭外裂裏黃取出烏頭去皮臍入肉豆蔻三味剉如麻豆每服三錢七水一盞煎至七分去滓空心食前

稍熱服

治脾胃虛寒洞泄不止四肢逆冷心腹疔痛溫中丸方

肉豆蔻人 硫黃研

乾薑土用

附子炮裂去  
皮臍龍骨各二  
兩

右五味為細末用麩糊和丸如梧桐子大每服三十九丸食前艾湯下

治脾胃虛寒洞泄注下腹脹腸鳴肉豆蔻丸方

肉豆蔻五枚  
去殼

木香一分

蠍梢炒一  
錢

陳橘皮焙去  
白附子炮裂去  
皮臍

乾薑炮胡椒各半  
兩

右七味搗羅為末麩粥和丸如豌豆大每服十五丸食前未飲下

治脾胃虛冷洞泄不止厚朴乾薑丸方

乾薑炮二  
兩

附子炮裂去  
皮臍白木各一  
兩

訶梨勒皮三  
分厚朴去  
汁炙三分



五... 卷之十四  
右五味為細末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服二十九至三十九空心食前熟米飲下日三

治脾胃久寒大腸虛滑洞泄豆蔻附子散方

肉豆蔻人麩裹炮熟

附子去皮臍對鹽炒縮沙去皮各半兩

木香半

右四味搗羅為細散每服一錢匕食前米飲調下

治脾冷洞泄丁香散方

丁香二錢

厚朴去麩皮生薑汁炙半兩

檳榔一枚

肉豆蔻去殼二枚麩裹炮熟

右四味為細散每服二錢匕熱粥飲調下

治脾胃氣寒大腸虛滑日夜不止火輪散方

附子臍一枚裂去皮

乾薑炮一分

肉豆蔻去殼半兩麩裹炮熟

右三味為細散每服二錢匕陳粟米飲調下

治脾胃虛寒洞泄不止橘皮散方

陳橘皮去白焙

白朮炒各二兩

訶梨勒皮炮乾薑炮

枳殼去瓢麩炒

桂去麩皮

木香炮

人參

甘草炙對各一兩

檳榔炮剉七枚

半夏湯洗七遍生薑汁製三分

草豆蔻煨去皮五枚

厚朴去麩皮生薑汁炙一兩半



右一十三味為細散每服二錢匕煎生薑棗湯調下

治脾寒洞泄黃連飲方

黃連炒去須 訶梨勒核煨去 地榆 芍藥炒各一兩 甘草炙二分 木香

當歸切焙各三分

右七味細剉每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日三

治洞泄寒中二黃丸方

黃連炒去須 黃蘗去麤皮炙剉 附子炮裂去皮臍 烏梅肉炒 乾薑炮各半兩

甘草炙剉一分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心米飲下

治藏府冷極或久冷傷憊洞泄下痢穀米不化飲食無味肌肉瘦瘁心多嗔恚

及婦人產後虛冷下痢一切水瀉冷痢木香散方

木香 補骨脂各一兩 高良薑 縮砂人 厚朴去麤皮生薑汁炙各三分

陳橘皮去白焙 桂皮去麤皮 白朮各半兩 胡椒 吳茱萸湯洗各一分

赤芍藥兩半 肉豆蔻四枚去殼 檳榔剉一枚

右一十三味搗羅為散每服三錢匕用不經水猪肝四兩去筋膜批為薄片

身... 重重糝藥置一鼎中入漿水一椀醋半合蓋覆煮肝熟入鹽一錢葱白三莖細切生薑彈子許拍破同煮水欲盡空心為一服冷食之初服微瀉不妨此是逐下冷氣少時自止渴即飲粥湯

治洞泄大腸切痛腸鳴食不化木香訶黎勒丸方

木香 半生半炒 共一兩

訶黎勒 煨去核 三分

白朮 一兩

桂 去麤皮

蕪荑 炒各一兩 兩半

附子 炮裂去皮臍

厚朴 去麤皮生薑汁炙焦各二兩

高良薑 炒

肉豆蔻 去殼各一兩

甘草 炙剉 兩

乾薑 炮一分

右一十一味搗羅為末用陳麩末煮糊為丸如梧桐子大每服三十九丸煨生

薑鹽湯下

治因傷水飲後變成暴泄白芷黃連湯方

白芷 一兩 半

黃連 去須 一兩

地榆 半兩

當歸 剉焙 一兩

附子 炮裂去皮臍 一兩半

木香 一兩

赤石脂 半兩

黃芩 去黑心 半兩

芍藥 半兩

訶黎勒皮 煨一兩

肉豆蔻 一枚 煨

白朮 一兩

桂 去麤皮 一兩

右一十三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓

空心溫服日三

治大腸洞泄水穀入即注下烏梅丸方

烏梅肉炒四兩 乾薑炮二兩 黃連去須炒五兩 肉豆蔻去殼五枚 附子炮裂去皮臍一兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下

治洞泄水穀注下黃連阿膠湯方

黃連須去 阿膠炙燥 烏梅肉炒各二兩 黃蘗去蘗皮對一兩 山梔子人枚三十

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空心食前日二

治五泄痢訶黎勒丸方

乾薑炮 甘草炙剉各半兩 木香 肉豆蔻去殼 訶黎勒半生半煨並去核各三分

右五味搗羅為末煮醋糊和丸如梧桐子大每服二十九至三十九丸米飲下

治洞泄寒中水穀不化黃連當歸湯方

黃連須去 當歸焙切 甘草炙剉各二兩 酸石榴皮剉炒四兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空心食前

驚澹

論曰脾氣衰則驚澹蓋陰中之至陰脾也為倉廩之官若脾胃氣虛弱為風冷所乘則陰氣盛陰氣盛則藏寒糟粕不化故大便秘色黑狀如驚澹也又大腸有

寒亦曰驚澹

治脾氣不足驚澹青黑茱萸丸方

吳茱萸湯浸焙炒乾薑炮

赤石脂

陳麩炒

當歸切焙各三分

厚朴去麁皮生薑汁炙剉一兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心食前米飲下日三

治大便青黑狀如驚澹龍骨散方

龍骨去須炒黃連各一兩白礬熬令枯

阿膠炙燥

白石脂研

乾薑炮

當歸切焙胡粉炒

赤石脂研

牡蠣煨各三分研

甘草炙剉

附子炮裂去皮臍各半兩

右一十二味搗研為散每服三錢匕食前米飲調下日再

治大便滑泄色如驚澹龍骨黃連湯方

龍骨碎一兩黃連去須炒當歸切焙乾薑炮

甘草炙剉各半兩

右五味麁搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食前溫服日再

治驚澹所下瘀黑木香丸方

木香生去皮臍烏頭生去皮臍當歸切焙各三分烏梅肉炒乾半兩

右四味搗羅為末用粟米一合醋一升半慢火煎調和丸如梧桐子大每服  
十九至十五丸食前米飲下日三

治大便驚澹滑利不止附子散方

附子炮裂去皮  
臍三分

乾薑炮

龍骨各一兩

右三味搗羅為散每服三錢匕食前煎烏梅湯調下日再

治腸胃久寒大便驚澹華撥丸方

華撥

附子炮裂去皮臍

乾薑炮

厚朴

去麤皮生薑汁炙

肉豆蔻人

各一兩

龍骨

訶藟勒皮

縮沙人

各半兩

右八味搗羅為末麪糊和丸如梧桐子大每服二十九丸食前米飲下日再

大德重校聖濟總錄卷第七十四

內夏人



大德重校聖濟總錄卷第七十五

泄痢門

白滯痢

論曰白滯痢者冷痢之類蓋腸虛受冷留而不去與津液相搏結滯如膿或如凝脂腹痛而下故為白滯痢

治白滯痢及小便白人參湯方

人參

龍骨

當歸切

乾薑炮

白茯苓

去黑皮各半兩

甘草

炙剉半兩

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙熟一兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓空心服日晚再服如

小兒患量大小以意加減

治白滯痢及食不消化黃蘗丸方

黃蘗

去麤皮炙三分

烏梅肉

炒乾熟艾一兩

微炒

甘草

炙剉半兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十五丸空心米飲下日午再服

治白膿痢赤石脂散方

赤石脂

碎

乾薑

炮三分

右二味搗羅為末每服兩錢七空心米飲調下日晚再服

治白膿及諸痢當歸丸方

當歸切

黃連去須炒

烏梅肉乾炒

阿膠炙燥各

右四味搗羅為末鎔蠟和丸梧桐子大每服空心温粥飲下二十九日午服

治白滯痢及腹痛不止陳麩湯方

陳麩炒黃

黃連去須炒

厚朴去粗皮塗薑汁

附子炮裂去

乾薑炮各

右五味剉如麻豆每服五錢七水一盞半煎至八分去滓空心服日晚再服

治白滯痢心腹脹滿不下食豆蔻湯方

肉豆蔻殼去

甘草炙剉各

厚朴去粗皮塗薑汁

乾薑炮半

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓空心温服日午再服

治白滯痢及水痢日夜一二十行心下痛白朮湯方

白朮分三

甘草炙剉

黃蘗去粗皮炙

龍骨各

厚朴去粗皮塗薑汁

右五味麤搗篩每服五錢七水一盞半生薑三片同煎至八分去滓空心温

服日晚再服

治冷白滯痢及腹痛附子湯方

附子炮裂去皮 乾薑炮 赤石脂 芍藥 甘草炙剉各

當歸焙切 龍骨各一兩半 白朮二兩 人參三分 牡蠣熟一兩半

右一十味剉如麻豆每服五錢七水一盞半煎至八分去滓空心溫服日晚

再服有膿加厚朴一兩去麤皮薑汁塗炙紫色若嘔加陳橘皮一兩湯浸去

白焙

治白滯痢龍骨丸方

龍骨一兩半 乾薑兩半 附子炮裂去皮

右三味搗羅為末醋煮麩糊丸如梧桐子大食前未飲下十五丸

治脾胃氣虛滑泄下痢白膿厚朴湯方

厚朴四兩去皮塗薑汁炙令紫 乾薑炮二兩

右二味麤搗篩每服三錢七漿水一盞煎至六分去滓溫服食前

治丈夫婦人久患白滯痢如魚腦阿魏丸方

阿魏別研一分 桂去麤皮為末半兩 木香為末半兩 獨頭蒜二顆煨熟去皮研爛

安息香酒浸一分別研

右五味再同研極細溫酒和丸如梧桐子大每服三十丸空心陳米飲下日  
午再服

治白滯痢腹藏撮痛豆蔻丸方

肉豆蔻 麩裏煨 熟為末

草豆蔻 麩裏煨 熟為末

縮沙人

母丁香 各一兩

木香

沉香 剉

墨 燒紅為末 各半兩

地榆 二兩

枇杷葉 去毛炙 一兩

右九味搗羅為末燒粟米飴和丸如櫻桃大每服二丸米飲化下食前服

治白痢多膿腹中疔痛黃芩丸方

黃芩 去黑心

黃連 去須

黃蘗 去麩皮 各一兩半

吳茱萸 湯洗焙乾 炒一兩

訶梨勒皮 炒二兩半

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服四十九丸食前橘皮湯下日再

治藏寒下痢白濃心腹疔痛薑附散方

乾薑 炮

附子 炮裂去皮臍

訶梨勒皮 煨取皮

龍骨 各一兩

右四味搗羅為散每服三錢匕煎烏梅湯空心調下

治白滯痢久不差黃連湯方

黃連 去須 炒

厚朴 去粗皮生薑汁炙各二兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食前服

冷痢

論曰下痢其色或青或白或黑者皆冷痢也此因腸胃虛弱寒氣乘之故令人大便痢下青黑若其痢色白而食不消者寒中也當診其脈沉則生浮則死其人素有積寒即成久冷痢有膿也

治冷痢肉豆蔻湯方

肉豆蔻去殼 甘草炙剉各一兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心日午溫服

治久冷痢枳殼湯方

枳殼去瓢麤炒一兩 甘草炙剉半兩 赤茯苓去黑皮 乾薑炮各一兩 厚朴去麤皮薑汁炙一兩半

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空心日午二服

治冷白滯痢腹痛牡蠣湯方

乾薑炮 當歸切焙 龍骨 白朮各三分 附子炮裂去皮臍 甘草炙剉

人參 芍藥各半兩 牡蠣煨三分 赤石脂一兩

右一十味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心食前溫服

日三服或下膿加厚朴去麤皮以薑汁炙一兩或嘔逆加陳橘皮湯浸去白  
焙一兩

治冷痢不調水痢不止黃連散方

黃連

去鬚炒

無食子

燒令烟盡存性

黃藥

去麤皮炙

酸石榴皮

炒

乾薑

炮各一兩

右五味搗羅為散每服三錢七空心日午米飲調服

治冷痢及赤白滯下附子湯方

附子

炮裂去皮臍半兩

黃連

去須炒一兩

阿膠

炙令燥三分

甘草

炙

乾薑

炮各半兩

赤石脂

厚朴

去麤皮薑汁炙各一兩

右七味剉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服空心食前

日三

治冷痢疴痛腸滑不差黃連湯方

黃連

去須炒半兩

阿膠

炙令燥

當歸

焙

乾薑

炮各三分

鼠尾草

洗淨慢火焙乾三分

右五味麤搗篩每服四錢七若冷甚白多以酒一盞半煎至八分去滓空心

溫服日午再服若熱及不痛即去乾薑當歸用水煎依前服



治冷痢熟艾湯方

甘草

炙

乾薑

炮

赤石脂

各半

熟艾

炒

附子

炮裂去皮

臍各半兩

黃連

去須炒

阿膠

炙令燥

右七味劉如麻豆每服三錢七水一盞煎至七分去滓空心食前溫服日三

治冷痢厚朴飲方

厚朴

去粗皮薑汁炙一兩

肉豆蔻

去殼龍骨

白朮

各三分

右四味劉如麻豆每服四錢七水一大盞入生薑三片同煎至七分去滓空

心食前溫服日三

治冷痢下色白食不消甘草湯方

甘草

炙

黃連

去須炒

附子

炮裂去皮臍各三分

阿膠

炙令燥

右四味劉如麻豆每服五錢七水一盞半煎至八分去滓空心日午溫服日二

治冷痢訶黎勒湯方

高良薑

白芍藥

枳殼

去瓤

白茯苓

去黑皮

訶黎勒

炮去核

厚朴

去麤皮薑汁炙三分

右六味以咀如麻豆每服五錢七水一盞半入生薑三片煎至八分去滓空

心食前温服日三如腹脹加人參半兩甘草半兩炙

治冷白帶痢腹痛龍骨湯方

龍骨一兩半

當歸切

厚朴

去粗皮姜汁炙各一兩

赤石脂

一兩半

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心食前温服日三或熱加白頭翁三分水洗曬乾牡蠣一兩燒令赤

治一切冷痢附子丸方

附子

炮裂入水少時去皮臍

乾薑

炮

熟艾

微炒為末各一兩

右三味搗羅為末以新汲水調麩拌和為丸如彈子大每服二丸用麩一錢匕以水一盞半化開煎三五沸空心服之服後覺熱以飯壓之或患冷病丸如梧桐子大空心米飲下三十丸至五十丸

治大腸積冷下痢不止裏急後重疼痛五神散方

乾薑

炮

訶梨勒

炮去核

延胡索

各一兩

烏梅

去核半兩

附子

炮裂去皮臍半兩

右五味為麤散和白麩裏慢火內燒令麩熟為度去麩焙乾搗羅為細散每服一錢匕空心食前米飲調下

治冷極泄瀉久作腸滑不禁不欲飲食玉粉散方

硫黃研如粉附子炮裂去皮臍紅豆

乾薑炮各一兩三味同搗羅為末

右四味再同研令極細每服一錢匕稀粟米粥調候溫冷得所服之

治大腸虛滑冷痢日夜不止火輪散方

附子炮裂去皮臍一兩

肉豆蔻去殼半兩乾薑炮一分

右三味搗羅為散每服一錢匕陳粟米飲調下空心食前服

治脾胃虛冷下痢滑泄不思飲食和一切冷氣訶梨勒湯方

訶梨勒炮去核厚朴去蘘皮薑汁炙甘草炙

白朮

草豆蔻皮去

陳橘皮湯浸去白焙各一兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分

去滓食前溫服

治脾藏冷滑不止腹痛疝刺和陰氣進食烏頭湯方

烏頭生去皮臍四兩切作片子

益智去皮三兩

乾薑生

青橘皮湯浸去白焙各二兩

懷香子炒一兩

右五味剉如麻豆每服二錢匕水一盞入鹽少許煎至六分去滓溫服如小

腸氣攻刺急煎一兩服熱服

治冷痢久不差乾薑丸方

乾薑 炮

附子 生去皮臍

赤石脂

黃連 去須各一兩

右四味搗羅為末麩糊和丸如梧桐子大米飲下二十九丸加至卅丸日三服

治冷痢不消化食已腹中脹痛氣滿地榆丸方

地榆 六兩

赤石脂

龍骨 各一兩三分

烏梅肉 炒

厚朴 去麩皮生薑汁炙

乾薑 炮各一兩半

黃連 去須二兩半

白朮

當歸 切焙

艾葉 炒各一兩一分

甘草 炙剉一兩

右十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下空心食

前日二服

治冷痢久不差臍腹痛時下白膿食物不消茱萸人參丸方

乾薑 炮

陳麩 炒各四兩

附子 炮裂去皮臍二兩

食茱萸 炒

人參

芍藥

桔梗 炒

枳實 炒

甘草 炙剉各一兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下空心食前

治冷痢下膿血臍腹痛脹滿食不消化吳茱萸丸方

吳茱萸 湯洗焙乾炒

乾薑 炮各一兩半

赤石脂

陳麩 炒各二兩

厚朴去麤皮當歸切焙各四兩

右六味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九丸米飲下空心食前日服

治冷膿痢腹痛不止黃連散方

黃連去須炒厚朴去麤皮生薑汁炙各一兩乾薑炮木香一半生一半炒

甘草炙阿膠炙燥陳麴炒各三分訶梨勒皮一半生一半煨一兩

右八味麤搗羅為散每服二錢匕米飲調下

治遠年冷痢食物不化或青或黃四肢沉重起即目眩兩足逆冷時苦轉筋赤

石脂丸方

赤石脂 艾葉炒各一兩乾薑炮三兩烏梅肉炒五兩蜀椒去目并閉口者炒出汗三百粒

右五味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服廿丸米飲下空心食前日三服

治冷痢四白散方

龍骨 白石脂 胡粉蒸令黃白礬煨成灰各半兩

右四味搗研為散每服二錢匕米飲調下

熱痢

論曰凡痢色黃色赤并熱也甚則下血汁此由腸胃虛弱邪熱之氣乘虛入客



於腸間故其證下痢黃赤或血雜下腹間熱痛小便赤澀身熱煩渴故謂之熱痢

治熱痢不止生地黄湯方

生地黄兩半 甘草分一 地榆分三

右三味咬咀如麻豆大水二盞煎至一盞去滓分溫二服空心日晚再服

治熱毒痢注下赤黃苦參丸方

苦參 陳橘皮湯浸去白焙 獨活去蘆頭 阿膠生用 藍青

黃連去須 鬼白 黃蘗去麩皮 甘草炙

右九味等分除阿膠外為末以水煮阿膠和併手丸如梧桐子大每服十丸

米飲下日三服治卒下痢大良

治諸熱痢不差烏梅丸方

烏梅肉炒 黃連去須各四兩

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下日二夜一服

治熱痢無度黃連散方

黃連去須一兩 雞子二枚



右二味搗羅黃連為散取雞子白和藥為餅子燒令黑再搗羅為細散每服三錢七空心粥飲調下日晚再服

治一切熱痢黃連丸方

黃連

去須二兩半

羚羊角

鎊

黃蘗

去麤皮各一兩半

赤茯苓

去黑皮半兩

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九薑蜜湯下暑月下痢用之尤驗

治挾熱痢多下赤膿黃連散方

黃連

須去

竈突中黑塵

各一兩

右二味搗羅為細末每服二錢七溫酒調空心服日再

治夏月暴下熱痢甘草湯方

甘草

炙剉半兩

生薑

切一分

生蜜

合

右三味用漿水五合同煎至四合去滓空心溫分二服

治熱痢腹內疴痛日夜百行氣欲絕黃連湯方

黃連

去須一分

附子

泡裂去皮臍一兩

龍骨

白朮

各二兩

阿膠

炙燥

乾薑

炮

當歸

焙

赤石脂

各三兩

右八味以咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治熱痢蒲根湯方

蒲根割二 粟米淘二

右二味以水三盞煎取一盞半去滓分溫二服空心日午再服

赤痢

論曰熱痢之甚者為赤痢本由腸虛為風邪所傷又挾邪熱血得熱而妄行乘虛必湊滲入腸中與痢相雜其色純赤名為赤痢若腸虛不復則為久赤痢變成嘔噦疳蠱之候矣

治痢下黃赤水或黃赤膿四肢煩皮膚冷者黃蘗丸方

黃蘗去粗皮 黃連去須炒 熟艾半兩 黃芩去黑心

右四味搗羅為末用白蜜三兩鍊熟入蠟一兩鎔化入前藥末和搗丸如梧

桐子大每服三十丸空心米飲下日晚再服

治諸熱毒痢下黃汁及如赤爛豆如赤帶狀又如魚腦壯熱牡蠣湯方

牡蠣煨過 白頭翁焙 當歸切 犀角鎔 艾葉炒 甘草炙

桑寄生剉各半兩 黃蘗去粗皮 黃連去須 黃芩去黑心 升麻

酸石榴皮

各三分

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓空心溫服日午再服

治赤痢腹痛四肢羸困伏龍肝丸方

伏龍肝

艾葉炒

木香

地榆

阿膠炙令燥

當歸切炒

黃連

去須炒

赤芍藥

黃芩

去黑心各一兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫粥飲下不拘時

治暴赤痢如鷲鴨肝其痛不可忍黃連湯方

黃連

去須炒

黃芩

去黑心各二兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓熱服不拘時

治赤痢腹內疼痛無食子丸方

無食子

地榆

各半兩

黃連

去須炒一兩半

酸石榴皮

一兩

黃蘗去粗皮蜜炙二兩

右五味搗羅為末醋煮麪糊丸如梧桐子大每服十五丸食前溫米飲下

治赤痢及赤白等痢茯苓丸方

赤茯苓

去麤皮

當歸

黃連

去須炒

黃蘗

去麤皮各一兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸空心米飲下赤白痢加阿膠末一兩

治熱痢香連丸方

木香 黃連去須炒 甘草剉炙 肉豆蔻去殼

右四味等分搗羅為末沙糖和丸如梧桐子大每服十五丸空心米飲下更以意加減

治諸痢久不差黃連丸方

黃連去須炒 烏梅肉炒乾一兩半 亂髮灰汁洗淨燒灰三兩

右三味搗羅為末用蜜二兩半鍊熟入蠟一兩醋二合羊脂一兩煎令蠟化入前藥末於銅器中重湯熬令可丸即丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下日再

治一切痢二黃丸方

黃蘗去麤皮 黃連去須炒 羚羊角鎊 赤茯苓去黑皮

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下日再薑湯亦得

治赤痢兼大腸下血黃連散方

黃連

去須炒

黃蘗

去麤皮蜜炙

厚朴

去麤皮生薑汁炙

木香

各一兩

右四味搗羅為散每服三錢匕空心粥飲調下日午再服

治一切痢疾地榆湯方

地榆

樗皮

去麤皮炙

黃連

去須炒各一兩

當歸

切炒

陳橘皮

湯浸去白炒

枳殼

去瓢麤炒

桂皮

去麤皮

桔梗

炒各三分

大腹皮

一兩半

甘草

炙剉半兩

右一十味麤篩每服五錢匕水一盞半生薑五片煎至一盞去滓空心溫服

治赤痢不止枳殼散方

枳殼

胡桃

各七枚

皂莢

不蚰者一挺

右三味就新瓦上以草灰燒令烟盡取研極細分為八服每臨卧及二更五

更時各一服荆芥茶調下

治赤痢腹痛紫參散方

紫參

三分

肉豆蔻

去殼一兩

烏賊魚骨

去甲二兩

右三味為細散每服一錢匕食前溫米飲調下

治因冷飲食變成赤痢黃連湯方

黃連去須

桂去麤皮

白芷一兩

赤石脂一兩

肉豆蔻一枚

地榆一兩

訶梨勒皮煨一兩

黃芩去黑心

附子炮裂去皮

當歸焙一兩

黃耆一兩

吳茱萸洗炒

右一十二味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至一盞去滓

空腹溫服日三

治赤痢腹痛或下純血六神湯方

黃連去須

車前子各二兩

地榆

山梔子

甘草炙剉各

陳橘皮湯浸去白

右六味麤搗篩每服五錢匕以漿水一盞半煎至八分去滓空心服



大德重校聖濟總錄卷第七十六

泄痢門

血痢

論曰邪熱客於血脈之中腸胃虛弱血隨熱行流滲腸間因便血下故名血痢其脈見虛小者生身熱疾數者難治

治痢下鮮血茜根湯方

茜根

黃連去煩

地榆各一兩

犀角屑一分

山梔子人枚十四

右五味麤搗篩每服五錢匕入薤白香豉各少許以水一盞半煎至六分去滓不拘時溫服日再

治血痢腹痛芍藥湯方

赤芍藥

黃蘗去麤皮炙

地榆各一兩

右三味麤搗篩每服五錢匕以漿水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

治血痢不止地榆湯方

地榆二兩

甘草炙剉半兩

右二味麤搗篩每服五錢匕以水一盞煎取七分去滓溫服日二夜一

身... 治血痢晝夜不止黃蘗湯方

黃蘗 去麤皮炙 黃連 去須各二兩 木香 一兩

右三味麤搗篩每服五錢匕以水一盞煎至七分去滓食前溫服日三

治血痢茜根散方

茜根 貫眾 槐花 陳者 椿根 剉 甘草 剉

右五味等分搗羅為散每服一錢匕米飲調下食前日再服

治一切血痢腹痛人參散方

人參 三分 肉豆蔻 去殼炮 烏賊魚骨 去甲各二兩

右三味搗羅為散每服一錢匕溫米飲調下食前

治熱血痢不定日夜頻滑地榆散方

地榆 半兩 酸石榴皮 三分 黃芩 去黑心半兩 枳殼 去瓢炒三分 赤石脂 半兩 甘草 一兩剉

右六味搗羅為散每服二錢匕以米飲調下食前

治血痢不止枳殼散方

枳殼 七枚 胡桃 七枚 皂莢 半挺不

右三味都盛一新瓦上炭火燒令烟盡研每服一錢匕臨卧時用荊芥茶下

二更三更各一服

治血痢腹中疔刺日夜無度通聖散方

大棗

烏梅各七枝

乾薑

三塊如棗大

甘草

一尺各細對

右四味搗羅為散每服一錢七水一盞生薑半棗大拍破同煎至六分去滓

温服

治血痢久患醋石榴皮散方

醋石榴皮

一兩一積殼

一兩麩炒微黃去瓢

當歸

二分對微炒

右三味搗羅為細末每服二錢粥飲調下

治血痢不止黃連丸方

黃連

去須微炒

黃蘗

炙微赤對

黃芩

各一兩

右三味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食前粥飲下十五丸

治血痢裏急後重腸中疼痛當歸散方

當歸

三分對微炒

黃連

一兩去須微炒

龍骨

二兩

右三味搗羅為細散每服二錢七粥飲調下不拘時候日二

治血痢久不差臍腹刺痛肉豆蔻丸方

肉豆蔻一兩 陳米半兩 樛子一兩

右三味先二味搗篩為麤散同米拌令勻同炒黃色去米一分單炒一分生用同焙搗為末研粟米粥和搗為丸如梧桐子大每服五十丸空心溫陳米飲下一二服效

治血痢及婦人產後血痢葵子散方

冬葵子不以多少

右一味搗羅為散每服二錢匕入蠟茶末一錢以沸湯七分一盞調服併三兩服差

治瀉血血痢烏金丸方

烏藥不以多少炭火燒存性

右一味搗羅為末陳粟米飯如梧桐子大每服三十丸米飲下

治丈夫婦人便血下痢地榆散方

地榆一兩焙乾 礬石燒汁盡細研半兩

右二味搗羅為散用生猪肉二兩批開摻藥一錢匕在肉上用炭火炙熟細

嚼米飲下併兩服立效

治血痢不止方

木耳

半兩燒作灰研細

右一味以井華水一盞調空腹頓服之

治腸胃虛熱血痢地榆散方

地榆

酸石榴皮焙剉

木賊各一兩

右三味搗羅為散每服一錢匕煎訶梨勒湯調下食前服

治久虛撮痛後重下血不止烏頭丸方

烏頭

生用去皮臍去蛤粉各半兩

右二味搗為細末用麩糊為丸梧桐子大用鹽豉湯下十五丸食前

治血痢腹中疝痛犀角丸方

犀角鎔

地榆

黃芩去黑心

黃蘗去皮

甘草炙剉各半兩茜根二兩

栝葉

炙三兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下食前服

治藏毒下血藏府疝痛日夜五七行及血痢甚者黃連飲方

黃連

去須

阿膠炙燥

當歸切焙

赤石脂

各四兩

附子

炮裂去皮臍一兩

龍骨

白朮 各二兩

右七味以咀如麻豆每服五錢七水二盞煎至一盞去滓溫服空心食前

治血痢黃連丸方

黃連 須去須

龍骨

禹餘糧

煨醋

伏龍肝

各二兩

代赭

煨醋

乾薑

炮各一兩半

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下空心食前日二

治血痢不止少腹疴痛艾葉飲方

艾葉 焙

當歸 焙切

黃連 須去

龍骨

訶梨勒皮

各一兩半

右五味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服

治久患血痢訶梨勒散方

訶梨勒 一枚不去核炮

乾薑 塊一

甘草 炙一

高良薑

一指節大炮

白礬 一塊燒灰如良薑壹半大

右五味搗羅為散先吃好茶一盞後用烏梅一枚椎破以水一盞煎至六分

調藥二錢七微利即差

治血痢不止及積毒瀉血地榆湯方



地榆剉

樗根剉 焙 各一兩

醋石榴皮乾者 半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕漿水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治痢血方

右取鹽水梅除核研一枚合臘茶加醋湯沃服之一服差

治痢血三物散方

胡黃連

烏梅肉焙

竈下土各等分

右三味搗羅為散每服二錢匕臘茶清調下空腹服

治血痢日夜數十行葛粉飲方

葛粉

白蜜各一兩

右二味相和新汲水四合調空腹服之

治痢下血膿裏急後重腸中疼痛磨化虛積丹砂礞石丸方

丹砂

研末 四錢匕 青礞石研末 一錢匕

砒霜

研末 二錢匕 黃連搗羅末 三錢匕

肉豆蔻

搗羅末 二錢匕

烏頭

炮裂去皮臍 搗羅為末 一錢匕

巴豆霜一錢匕

右七味同研勻煮糯米粥和丸如麻子大每服十九丸溫熱水下臨寢服妊婦

不宜服

治血痢不止蛇含散方

蛇含二枚

右一味煨醋淬十數度研如麩每服三錢匕陳米飲調下兼止腸風瀉血婦人血傷等

膿血痢

論曰春傷於風邪氣留連夏為洞泄若遇熱氣乘之則血隨熱行滲入腸中又與腸中津液相搏積熱蘊結血化為膿膿血相雜故成膿血痢秋冬診脾脈微瀋者是也其脈滑大或微小沉細虛遲者皆生若懸絕或實急或數大身熱者皆死

治下痢膿血羸瘦黃連丸方

黃連去須

龍骨

苦參

厚朴去粗皮生薑汁炙各一兩

白礬熱令汁枯

甘草炙

陳麩炒

赤石脂

熟艾葉炒

乾薑炮各一兩

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

治血膿諸痢及痢後腹痛阿膠散方

阿膠炙令燥

龍骨

無食子各三兩

桃葉炒

柏葉去梗焙各一兩

甘草

炙 肉豆蔻 去殼各半兩

右七味搗羅為細散每服三錢匕米飲調下不拘時

治下痢膿血腸胃虛滑米穀完出黃連湯方

黃連

去須 乾薑 炮

熟艾 炒

阿膠 炙令燥

附子 炮裂去皮臍

蜀椒

去目并閉口炒 出汗各半兩

右六味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服

治久痢膿血木香散方

木香

炮半兩

阿膠 炙令燥 一兩半

訶梨勒 炮去核

黃連 去須各一兩

右四味搗羅為散每服二錢匕空心用冷粥飲調服

治伏熱下痢膿血貫眾丸方

貫眾

剉一兩

黃連 去須

板藍根

木香 各半兩

胡黃連 一分

訶梨勒皮

肉豆蔻 去殼各三分

右七味搗羅為末煮麩糊丸如梧桐子大每服十五丸煎甘草湯下不拘時

治藏氣止便血下痢膿血臍腹痛虛氣痞滿腸鳴裏急香連丸方

黃連

去須 三兩

地榆 剉

赤石脂 各二兩

龍骨

阿膠 炙令燥

木香

赤芍藥

艾葉炒

黃芩

去黑心 各一兩無食子分三

肉豆蔻

去殼 兩半

右一十一味搗羅為末煮麩糊丸如梧桐子大每服三十丸米飲下不拘時

柏葉去梗

黃連須去

阿膠炙令燥

地榆剉

當歸焙各半兩

治膿血痢萊莢湯方

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫米飲下不拘時

訶梨勒皮

當歸切

黃連

去須各二兩乾薑炮半兩

吳茱萸湯浸焙炒一兩

右五味麩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食前溫服

治膿血痢食入即注下不安烏梅丸方

烏梅肉炒

黃連

去須各一兩附子炮裂去皮臍半兩

乾薑炮三分

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下

治膿血痢下腹痛龍骨丸方

龍骨

赤石脂

黃連須去

附子炮裂去皮臍

羚羊角銹

犀角銹

當歸切

白礬熬令汁枯

甘草炙

熟艾炒

乾薑炮

龍膽各半兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫米飲下空心食

前

治膿血痢日久不差乾薑丸方

乾薑炮

黃連須去

黃蘗去麤皮

熟艾炒

附子炮裂去皮臍

烏梅肉炒各三分

甘草炙半兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下

治膿血下痢不禁女萎丸方

女萎

半夏湯洗七遍

焙各一兩

藜蘆去蘆頭

附子炮裂去皮臍三分

右四味搗羅為末陳醋煮沸和藥末為丸如梧桐子大每服三九陳米飲下

日午再服未止加至五丸

治久痢膿血日夜不止白礬丸方

白礬研

鉛丹研

硃砂研

硫黃研各一分

右四味先入礬於瓷合子內次入硫黃硃砂鉛丹覆之用瓦片蓋面文武火

煨赤傾地上候火氣絕再為末蒸餅丸如梧桐子大每服十丸米飲下

治下痢膿血不止茱萸丸方

吳茱萸湯浸焙

乾炒

乾薑炮各半兩

胡粉一分

訶梨勒皮半兩

白礬灰 分一

右五味搗羅為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服十丸食前米飲下

治新久膿血痢橡實散方

橡實 二枚滿殼入礬陀僧末炭大煨赤為末

訶梨勒皮 為末與前等分

右二味共研細分作五服每服用溫米飲調下空心食前服

治痢下膿血黃連湯方

黃連 去須一兩 厚朴 去麤皮生薑汁炙一兩半

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半薑二片煎至八分去滓溫服不拘時

治膿血痢二宜散方

黃連 去須 吳茱萸 湯浸焙炒各一兩

右二味各搗羅為末每赤膿多用茱萸末一錢匕黃連末倍之白膿多即黃

連末一錢匕茱萸末倍之空心食前米飲調下

治膿血痢借氣散方

黃連 去須 生薑 並細剉各一兩

右二味同用銀石器炒焦赤色去薑取黃連為細散每服二錢匕空心食前陳



米飲下

治膿血痢困極木香散方

木香

一塊方一寸

黃連

去須細到一兩

右二味先將木香一塊置銀石器中次下黃連蓋之以水二盞同熬水盡取木香切焙為散分三服第一服甘草湯下第二服陳米飲下第三服臘茶清下並食前服大妙其黃連別搗末專治赤痢每服二錢七陳米飲下

治膿血痢通神丸方

沒藥

研

五靈脂

研

乳香

研各一錢

巴豆

去皮心膜研出油五粒

右四味合研令勻滴水丸如粟米大每服一丸生木瓜湯下不拘時

治膿血痢腹痛滑泄胡粉丸方

胡粉

阿膠

炙令燥

烏賊魚骨

去甲各半兩

蜜陀僧分一

龍骨

白礬

熬各一兩令汁枯

右六味搗研為細末粟米粥丸如梧桐子大每服二十九丸空心食前粟米下飲

治膿血痢後重裏急日夜頻併赤石脂丸方

赤石脂

白芷

天雄

炮裂去皮臍

龍骨

當歸

切焙各一兩半

肉豆蔻去殼

黃連須去

厚朴去麩皮生薑汁炙剉

地榆

白朮

桂皮去麩

訶梨勒煨去核

木香各一兩

黃芩去黑心

吳茱萸湯洗焙乾炒各半兩

右一十五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服空心食前

赤白痢

論曰赤白痢者由腸胃虛弱冷熱相乘客於腸間變而為痢也蓋熱乘於血流滲腸內則赤冷氣入搏津液凝滯則白其候裏急後重數至圍而不能使膿血相雜故謂之赤白痢重者狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脈薄血狀如魚脂腦世謂之魚腦痢也

治赤白痢腹中痛口乾或作寒熱黃連散方

黃連三分去須微炒

白朮兩半

黃芩兩半

當歸三分剉微炒 烏梅肉兩半微炒

乾薑半兩炮裂剉 阿膠一兩搗碎炒令黃燥

甘草半兩炙微赤剉

右八味搗篩為散每服三錢匕水一中盞煎至五分去滓不計時候稍熱服

治赤白痢日夜不絕赤石脂散方

赤石脂一兩

龍骨一兩

阿膠一兩搗碎炒令黃燥

厚朴一兩半去粗皮塗薑汁令香熟

地榆一兩 訶梨勒一兩 煨

當歸一兩 乾薑一兩 炮

黃連一兩 去須微炒

右九味搗羅為細末每服二錢匕以粥飲調下不計時日二

治赤白痢及水穀冷熱氣痢白朮丸方

白朮三分 赤石脂三分 犀角屑三分 乾薑半兩 炮 厚朴一兩 去粗皮塗生薑炙令香熟

龍骨三分 烏梅肉三分 當歸三分 甘草半兩 炙 黃連一兩 去須微炒

右一十味搗羅為細末鍊蜜和搗五百杵丸如梧桐子大每於食前粥飲下

三十九

治痢白多赤少沒石子散方

沒石子半兩 黃連一兩 去須微炒 乾薑一兩 炮 白茯苓半兩 厚朴一兩 去麤皮塗生薑炙令香熟

當歸一兩 剉微炒

右六味搗羅為細散每服二錢匕粥飲調下不計時

治赤白痢日夜不止橡實散方

橡實一兩 醋石榴皮一兩 微炒 黃牛角一兩 炙

右三味搗羅為細散粥飲調下二錢日三

治赤白痢冷熱相攻腹中疴刺疼痛龍骨阿膠散方

龍骨

赤石脂

楮皮

炙

地榆

炙

厚朴

去麤皮  
薑汁炙

阿膠

炙令燥  
等分

右六味搗羅為散每服二錢七陳米飲調下日三服

治氣虛冷熱不調臍腹疼痛下痢膿血日夜頻滑四肢少力裏急後重不進飲食赤石脂丸方

赤石脂

龍骨

白礬灰

各二兩

胡粉

研一兩

蜜陀僧

研半兩

阿膠

炙令燥

烏賊魚骨

各一兩

右七味搗研為末再同研勻以粟米飯和丸如梧桐子大每服二十九至三十丸溫米飲下食前服

治赤白痢久不止腹中疴痛及下血脫肛烏梅散方

烏梅肉

焙

檮根皮

炙

赤石脂

當歸

切

地榆

各半兩

黃連

去須炒

乾薑

炮各三分

甘草

炙一分

右八味搗羅為散每服二錢七溫米飲調下空心食前服

治一切赤白冷熱下痢腹內疼痛赤地利丸方

赤地利 阿膠煨 赤石脂各二 當歸切 乾薑炮各一

地榆剉 茜根各一 木香兩 黃連去須炒

右九味搗羅為末以米醋二升入藥末一兩同熬成膏和丸如梧桐子大每服二十九丸食前温米飲下

治赤白痢訶梨勒丸方

訶梨勒煨去核 附子切作片用生薑汁煮令汁盡 蕪荑人瓦上炒熟 陳橘皮湯浸去白米醋浸一宿焙

黃連吳茱萸少許同炒令焦去茱萸不用

右五味等分搗羅為末用漿水煮粟米飯和為丸如梧桐子大每服三十丸

空心生薑湯下日二

治赤白痢諸藥無效麝香丸方

麝香一分 菴荳粉一分 朱砂半 巴豆研爛去皮心

右四味搗羅為細末粟米餅和丸如菴荳大食前冷粥飲下二丸當日忌熱

食物

治赤白痢內補散方

黃連一兩去須微炒 甘草半兩炙 乾薑半兩炮 紫筍茶微炒

右四味搗羅為細末每服二錢匕粥飲調下不計時候日三

治赤白痢日夜無度攻臍腹痛桃花丸方

赤石脂一兩 乾薑一兩

右二味搗羅為細末白麩糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前日二服若

血痢甘草湯下白痢乾薑湯下

治冷熱赤白痢瀉血加減薑黃丸方

乾薑炮 黃連去須炒

右二味等分各搗羅為末各用水煮麩糊和丸如梧桐子大陰乾兩處收貯

白痢冷瀉每服乾薑二十九黃連十五丸同用溫米飲下赤痢瀉血黃連三

十丸乾薑十五丸亦用米飲下赤白相雜者黃連乾薑各二十九丸共服同用

米飲下空心食前服未愈加丸數取差為度

治大人小兒赤白痢滑腸不止綠白散方

綠礬 白礬 石灰 鉛丹四味同入罐子內 龍骨

赤石脂 縮沙人各半

右七味搗研為散更合研勻每服一錢匕小兒半錢匕或一字匕並米飲調



下治腸滑極有效作丸服亦得

治赤白痢久不差臍腹痛丹硫丸方

丹砂研 硫黃研各二錢 烏頭末炒半錢 砒霜研半錢 巴豆一錢半去皮心膜出油

麝香研少許 蛤粉二錢

右七味合研為細末用棗肉為丸如黍米大米飲下一丸

治赤白痢腸胃虛滑龍骨散方

龍骨兩半 黃連須去 牡蠣煨各一兩 烏梅肉焙乾三分

右四味搗羅為散每服二錢匕溫米飲調下食前服

治赤白痢腹痛不止鉛丹丸方

鉛丹錢半 丹砂研二錢 巴豆七枚去皮心出油盡 杏仁七枚湯退去皮尖雙人研

乳香研一錢 砒霜研半錢如秋後不用入研黃末半錢

右六味合研令勻細鎔黃蠟和丸如黃米大每服三九至五九煎乾薑甘草

湯下食前臨卧

治赤白痢臍腹疼痛腸滑後重妙功散方

大黃瀉紙裹根半兩 莨菪子炒令黑一物許

右二味搗羅為散每服一錢七米飲調下

治赤白痢臍腹痛裏急後重并治疝氣萬靈湯方

嬰子粟

妙赤半斤

甘草

炙剉一兩

右二味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓臨卧空腹溫服

治赤白痢橡實湯方

橡實殼

炒

甘草

炙

荔枝殼

石榴皮

右四味等分細剉每服半兩水一盞半煎至八分去滓溫服

治赤白痢止瀉烏金丸方

巴豆

二十一枚去皮

大棗

青州者二十一枚去核

右二味每一枚棗入巴豆一枚燒令煙出絕以器覆之後搗研為細末更入

輕粉二錢黃連末三錢燒陳粟米飯丸如棗豆大丸每服五丸煎獨掃湯下

治赤白痢礬石丸方

白礬

四兩

消石

一兩半

右二味搗為末米醋拌和入罐子內罇頭閣起罐底將瓦片蓋口慢火燒熟

置冷地上出火毒一夜研細用米醋浸炊餅心丸如梧桐子大每服十九空

心米飲下夜起頻鹽酒下

治赤白痢赤石脂丸方

赤石脂

桑根白皮剉桔梗炒

訶黎勒皮煨天雄地裂去皮臍

龍骨各一兩半

白芷

黃連須去

地榆

厚朴去麤皮塗生薑汁炙

桂皮去麤皮

木香各一兩

黃芩去黑心

乾薑炮裂各半兩

肉苳蔻去殼

當歸切焙一兩

右一十六味搗羅為末麩糊和丸如梧桐子大

治赤白痢膠阿膠丸方

阿膠炙燥

枳殼去瓢炒各半兩

訶黎勒核去

甘草剉

乾薑地

芍藥地

黃連去須炒

木香一半生一半炒各一兩

當歸切焙

地榆剉各一兩半

右一十味搗羅為末用陳苦酒和丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下食前

治赤白痢疼痛不止當歸湯方

當歸切焙

厚朴去粗皮生薑汁炙

阿膠炙燥

芍藥炒各一兩

甘草炙剉半兩

黑豆炒合

乾薑炮

赤茯苓去黑皮各三分

烏梅去核炒

右九味細剉每服三錢七水一盞煎取七分去滓溫服

治赤白膿血崩黃連散方

黃連去須 龍骨各二兩

赤石脂一兩 厚朴去麤皮生薑汁炙剉一兩

人參三

乾薑炮 地榆

黃芩去黑心各一兩

右八味搗羅為散空心粥飲下二錢七日再服

治赤白痢久不差取虛積輒紅丸方

丹砂研半兩

砒霜研半錢

硫黃研

硝砂飛研

消石研各一錢

粉霜錢一

輕粉錢二

龍腦研半錢

右八味再同研勻細入去皮心膜巴豆半兩研勻用黃蠟半兩鎔作汁同和

旋丸如菜豆大每服三丸至五丸溫漿水下

治赤白痢裏急後重黃連丸方

黃連去須炒 龍骨

地榆剉焙

訶梨勒煨去核

赤石脂各半兩

草豆蔻去皮一分

右六味搗羅為末水浸炊餅為丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下空心食

前日三服

治赤白痢臍腹痛及久水瀉白濁如米泔馬蘭子飲方

馬蘭子 合三

地榆

艾葉 炒各二兩

赤石脂

當歸 切焙各四兩

龍骨

白茯苓 去黑皮各二兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空腹溫服

治赤白痢血多痛不可忍艾葉丸方

艾葉 炒

黃連 去須

木香 一半生

肉豆蔻 去殼各三分

地榆 剉一兩

阿膠 炙

當歸 切焙各半兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下

治赤白痢疼痛不止甘草湯方

甘草 炙

地榆

當歸 切焙

黃連 去須

芍藥 炒各半兩

右五味細剉每服三錢匕漿水一盞煎取六分去滓溫服

治赤白痢龍骨黃連丸方

龍骨

黃連 去須

白石脂 各一兩半

胡粉 炒黃

白礬 熬令汁枯各一兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下日三

治赤白痢香連散方

黃連 去須炒

木香 一兩

丁香

乾薑 炮

訶梨勒皮 炒各半兩

右五味搗羅為散每服三錢七陳米飲調下日再

治赤白痢腹痛不止阿膠丸方

阿膠 炒三兩 黃連 去須二兩 當歸 切焙 胡粉 研各一兩

右四味搗研為末稀糊丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下

治赤白痢無問遠近黃連丸方

黃連 去須 黃蘗 去粗皮 當歸 切焙 赤茯苓 去黑皮等分

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服四十九丸空腹飯飲下以差為度

治赤白痢萬全茯苓散方

赤茯苓 去黑皮 黃連 去須 阿膠 炙燥 黃蘗 去粗皮等分

右四味搗羅為散每服二錢七空腹甘草湯下日再以差為度如三歲以下

小兒每服半錢七五歲至十歲每服一錢七

治赤白痢肉豆蔻散方

肉豆蔻 去殼 鹿角屑 炙 胡粉 研 蜜陀僧 各三分 燒過於冷地止出火毒

右四味搗羅為散每服二錢七米飲調下

治赤白痢後重腸痛四神散方



乾薑炮

黃連去須炒

當歸切焙

黃蘗去麤皮切炒各等分

右四味為散每服二錢匕以烏梅三箇煎湯調下水瀉等分赤痢加黃蘗白痢加乾薑後重腸痛加黃連腹中痛加當歸各一倍並空心食前服大凡泄痢宜食酸苦蓋酸收苦堅故也

治下痢赤白木香散方

木香

肉豆蔻去殼

檳榔一半生一半炮各一兩

乾薑炮半兩

右四味搗羅為散每服二錢半匕米飲調下

治赤白痢腹痛駐車丸方

黃連

去須炒乾薑炮

當歸切炒

阿膠

剉炒碾末再炒再碾各一兩

右四味各為細末以好醋調阿膠和丸如梧桐子大每服四十丸空心陳米飲下日再

治冷熱赤白痢疾吳茱萸湯方

吳茱萸

湯洗焙炒半兩

黃連去須炒

赤芍藥

各一兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓溫服食前

治冷熱痢腹痛裏急和中散方

附子 炮七度水淬  
去皮臍為末

黃連 去須各一  
兩為末

乳香 研一  
分

右三味如患冷熱痢取黃連附子各半錢乳香一字以陳米飲調下未止再服以青橘皮湯調下如患赤痢附子末半錢黃連末一錢乳香一字如患白痢黃連末半錢附子末一錢乳香一字米飲調下未止以黑豆七粒煎湯止

治冷熱痢甘草飲方

甘草 大者二寸許一  
半生一半炙

烏梅 五枚  
拍碎 訶黎勒皮 五  
枚

右三味細剉用水一盞煎取五分去滓一半冷服一半熱服

治赤白痢并血痢梔子人湯方

山梔子 四七  
枚剉

右一味以漿水一升半煎至五合去滓空心食前分溫二服

治赤白痢橘皮散方

陳橘皮 湯浸去白焙  
炒為末一兩

冬瓜汁 一  
合 生薑汁 一  
合

右三味合調令勻每服一匙如赤多增瓜汁白多增薑汁和白湯調下

治赤白痢不止豆蔻散方

肉豆蔻 去殼  
一分 訶黎勒 炮取皮  
二分

右二味搗羅為散每服二錢七米飲調下

治赤白痢久不止白礬丸方

白礬

鉛丹

各二兩二味拌勻用瓷瓶子固濟封却頭以火燒令通赤候一兩炊久方可取出放冷杵碎於地上出火毒一

研宿

右二味研令極細用粟飯和丸如梧桐子大每服三丸空心米飲下

治赤白等痢巴豆丹砂丸方

巴豆

五粒去皮心麩炒

杏仁

七粒去皮雙人炒黃

右二味入丹砂一錢同研極細以蒸餅為丸如菜豆大每服一丸至二丸空

心陳米飲下

治赤白痢服諸藥不差者黑豆湯方

黑豆

半升炒去皮揀淨者四合為末

甘草

一兩半炙半生為末

右二味綿裹以漿水三升煎至一升去滓空心分溫二服

治赤白痢香連丸方

黃連

去須炒

木香

各二兩

右二味搗羅為末以麩糊和丸如梧桐子大每服五十九丸空心陳米飲下日再

大德重校聖濟總錄卷第七十六

大德重校聖濟總錄卷七十七

泄痢門

氣痢

論曰氣痢者由冷氣停於腸胃間致冷熱不調脾胃不和腹虛滿腸鳴腹痛便  
痢赤白名為氣痢治法宜厚腸胃調冷熱補氣則痢當自愈

治氣痢久不止氣力困弱赤石脂散方

赤石脂

三分

乾薑

炮三分

龍骨

三分

黃連

去須一兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩

無食子

二枚炒令煙出

白茯苓

去黑皮三分

當歸

切焙三分

右八味搗羅為散每服三錢七空心米飲調下日晚再服

治氣痢胃大腸虛不能制晝夜無度漸令人黃瘦食不為肌肉困重無力眼目

多澀十年不愈縮沙蜜丸方

縮沙蜜

去皮一兩

肉豆蔻

去殼半兩

黃連

去須二兩

當歸

切焙

赤石脂

陳橘皮

去白酒浸一宿暴乾各一兩

右六味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心溫漿水下日晚

再服老人及妊娠人並可服

治久氣痢不止或差或劇黃連丸方

黃連去須微炒

當歸焙

烏梅肉微炒

訶梨勒炮去核各一兩

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心用薑製過厚朴煎湯下日晚再服

煎湯下日晚再服

治氣痢久不止木香丸方

木香一兩

訶梨勒炮去核二兩

右二味搗羅為末用粥飲和丸如梧桐子大每服二十九丸空心溫漿水下日午再服

治氣痢久不差桃人丸方

桃人去皮去雙入炒令香一分別研入

安息香兩別研入

訶梨勒炮去核一兩

木香半兩

右四味將木香訶梨勒搗羅為末與二味研了藥相和重細研入少許米飲

為丸如梧桐子大每服三十丸空心用煖漿水下日晚再服

治積年冷痢日三五行脹悶腸鳴食不消化面黃漸瘦厚朴丸方

厚朴去麤皮生薑汁炙令紫

陳橘皮湯浸去白

訶梨勒炮去核

乾薑炮

白茯苓去皮

蕪荑微炒香

阿膠炙令燥

熟艾微炒別搗

烏梅去核炒乾

胡粉炒黃

黃石脂赤石脂亦可

當歸焙切

蜀椒去目并開口炒出汗各一兩



右一十三味除膠艾二味外搗羅為末先以米醋一升半於無風處煮艾水減約八分絞去艾次下阿膠候消盡乘熱入藥末和勻杵千百下併手丸如梧桐子大暴乾每服空心用溫漿水下五十九日午再服

治氣刺年深不差陳橘皮丸方

陳橘皮

酒浸去白焙一兩

陟釐

微炒半兩

麥蘖

炒熟三分

白茯苓

去黑皮三分

白石脂

兩

赤石脂

三分

無食子

三枚煨令煙出

酸石榴皮

炙黃一兩

龍骨

兩

右九味搗羅為末用麩糊和丸梧桐子大每服二十五丸空心以溫漿水下日午再服

治冷勞氣刺久不差豬肝丸方

豬猪肝

一具去筋膜切作柳葉片以醋一升煎醋令盡

烏梅肉

炒乾一兩

大蒜

煮令熟去殼研二兩

桂

去麤皮一兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙令紫二兩

乾薑

炮一兩

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

訶梨勒

煨去核一兩

黃連

去須二兩

當歸

切焙一兩

右一十味除豬肝蒜外搗羅為末將豬肝與蒜細研如麩糊入藥末和勻搗數百下丸如梧桐子大每服二十九丸空心用熱麩湯下日午再服

治氣止瀉痢霍亂厚朴散方

厚朴去麤皮生薑汁炙令紫三兩 陳橘皮去白焙乾一兩 吳茱萸湯洗焙乾炒三分

甘草炮 白芷 乾薑炮 藿香子畧炒各半兩

右七味搗羅為散每服二錢七丸氣不和鹽湯調下霍亂吐瀉煎木瓜紫蘇湯調下泄瀉米飲調下赤白痢甘豆湯調下並食前

治氣痢泄瀉心腹疴痛木香散方

木香 沉香剉 桂皮去麤皮 沒藥 胡椒各一分 龍骨半兩

當歸切焙一分 肉豆蔻人一枚 赤石脂半兩 乾薑炮一分 附子炮裂去皮臍一分

甘草炙剉一分 蜜陀僧一分

右一十三味搗羅為散每服一錢七米飲調下食前服

治諸積瀉痢及暴氣瀉紅蠟丸方

丹砂研令極細 粉霜 硫黃各一分 巴豆去皮取半兩不破者微用油炒熱湯洗去油拭乾

右四味同研如膏鎔黃蠟一兩半劑勻旋丸黍米大飲下二三丸暴瀉水

下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白甘草乾薑湯下婦人血氣紅花酒下

治氣瀉不止木香丸方

木香

丁香

縮沙人

肉豆蔻

去殼各一兩

訶梨勒皮

藿香葉

赤石脂 各半兩

右七味搗羅為末用麩糊和丸如梧桐子大空心食前米飲下十五丸

治冷勞氣痢腹脇疼痛水穀不消神驗丸方

陳麩 炒

吳茱萸 湯浸焙乾炒各一兩

黃連 去須炒

蕪荑 炒各三分

右四味搗羅為末薑汁和丸梧桐子大每服十五丸温米飲下食前

治諸氣痢不止木香丸方

木香

肉豆蔻人

縮沙人

赤石脂 各半兩

右四味搗羅為末以棗肉和丸梧桐子大每服二十九丸温米飲下食前服

治氣痢腹痛睡卧不安香艾丸方

艾葉 炒

陳橘皮 湯浸去白焙等分

右二味搗羅為末酒煮爛飯和丸如梧桐子大每服二十九丸空心鹽湯下

治氣痢腹内虚鳴日久不差龍骨散方

龍骨

黃連

黃蘗 去麩皮

乾薑 炮

阿膠 炙燥

人參

厚朴

去麩皮生薑汁炙各二兩

右七味搗羅為散每服二錢匕空腹粥飲下日再

治脾毒氣痢下血如鴛鴨肝腹痛不止地榆湯方

訶梨勒皮 地榆各一 甘草 炙 當歸 切焙各半兩 柏葉

茜根

芍藥 赤茯苓 去黑皮各三分

右八味細剉每服三錢匕水一盞煎取六分去滓溫服食前

又方

胡黃連末 用雞子白調作餅子炙令黃研為末入樗皮汁和再作餅用蜜塗炙令黃

右一味不拘多少搗羅為散米飲調下二錢匕

治氣痢瘦弱諸瘵不損者蒼朮丸方

蒼朮 黃連 去須 當歸 焙 訶梨勒皮 炒 厚朴 去麤皮生薑汁炙

乾薑 炮各一兩半 吳茱萸 湯洗炒乾秤一兩 艾葉 炒三分 附子 炮裂去皮臍

龍骨 各二兩

右一十味搗羅為末米飲和衆手丸如梧桐子大每服三十丸食前生薑湯

下日再

治氣痢不差疲劣變成冷勞痢烏梅丸方

烏梅肉炒一兩

豬肝

一大葉以醋煮令爛研如糊

草豆蔻皮去

厚朴去粗皮生薑汁炙各一兩

甘草

炙剉一分

當歸

焙切

乾薑

炮

華撥

肉豆蔻殼去

訶梨勒皮

炒各三分

桂去麤皮半兩

右一十一味搗羅十味為末用豬肝煎和丸如梧桐子大每服二十九米飲

下陳麴湯亦得

治氣痢腹脇虛滿腸鳴腹痛便下赤白地榆飲方

地榆

檮皮

當歸

黃連

去須炒

甘草

炙剉各一兩

枳殼

去瓢麤炒

桔梗

桂

去麤皮

大腹

剉去皮

陳橘皮

湯浸去白炒各一兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至八分去滓

空心服

治氣痢腹脹腹中虛鳴木香縮沙散方

木香

二兩半

縮沙

人半

枳殼

去瓢麤炒

訶梨勒皮

各三兩

右四味搗羅為細散每服一錢匕空心以陳米飲調下良久以食壓之

治脾胃虛冷兼腸間泄瀉變成氣痢華撥丸方

華撥

檳榔

剉一分

乾薑

炮

附子

炮裂去皮臍各一兩半

白朮



黃連

去須各三兩

訶梨勒皮

蕪荑人

各二兩

阿魏

三兩以水四合煎五六沸同蜜和藥

枳殼

去瓤麩炒一兩三分

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空腹生薑湯下日再

漸加至四十九

治氣痢並休息痢人參散方

人參

陳橘皮

湯浸去白炒

黃連

去須炒

赤茯苓

去黑皮

樗皮

地榆

當歸

切炒

五味子

黃芩

去黑心

枳殼

去麩炒

白朮

炒

甘草

炙剉

桂

去麩皮

大腹

剉各一兩

右一十四味麩搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍碎煎至八分

去滓空心頓服

治氣痢腹脹不下食肉豆蔻散方

肉豆蔻

一半炮一半生

訶梨勒皮

一半生一半煨

木香

一半生一半炮各一兩

白朮

剉炒三分

甘草

剉一半生一半炙

華撥

乾薑

炮各半兩

右七味搗羅為散每服二錢匕米飲調下

治氣痢赤白不止下冷上熱橘皮丸方



陳橘皮湯浸去白 焙三兩

乾薑

木香

枳殼去瓢 麩炒

芍藥各三兩 桂去麩

大黃各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空腹煎生薑湯下日再

治氣痢久不差及諸痢困弱者華撥煎方

華撥為末三錢 牛乳半升

右二味同於銀石器中慢火煎令減半空腹頓服神效

休息痢

論曰腸中宿挾痼滯每遇飲食不節停飲不消即乍差乍發故取名為休息痢

治瘵當加之以治飲消削陳寒痼積之劑則愈

治休息痢阿膠湯方

阿膠炙令燥

黃連去須炒

龍骨各一兩

艾葉微炒半兩

倉米二合炒

右五味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓空心溫服日午再

服

治休息氣痢久不差肉豆蔻丸方

黃連去須炒

白礬熬令枯半兩

肉豆蔻去殼

訶黎勒煨去核

烏梅肉炒乾各一兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心用粥飲下或煎白梅生薑湯下亦得更加丸數服

治休息痢不能食及羸瘦藥丸方

大麥蘖炒 附子炮裂去皮臍 陳麴炒 桂 烏梅肉炒 人參

白茯苓已上一各

右七味搗羅細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十九煮棗粥飲下不計時候

治休息痢諸藥無效黃丹散方

黃丹三兩炒 棗肉三十枚搗為一塊用紙緊裹大火燒令赤後冷取出 枳殼半兩麩炒

黃連半兩去頭微炒

右四味搗羅為末每服一錢空心粥飲調下忌油膩冷物

治休息痢立效枯樓散方

枯樓一枚出却半瓢 白礬一兩 白石英一兩

右二味入枯樓中濕紙裹燒赤為度後冷搗細杵為散每服一錢七食前粥

飲調下

治休息痢日夜頻併白茯苓丸方

白茯苓

兩半

黃連

兩

黃蘗

羚羊角

各一兩半

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心以米飲下三十丸日午再服

治休息痢縮沙丸方

縮沙蜜

去皮一兩為末

肉豆蔻

去殼半兩為末

羊肝

去筋膜半具細切

右三味拌和令勻用麩和作餅子裹又以濕紙三重裹於煆灰火內煨令香熟去焦麩紙研細為丸如梧桐子大每服三十丸空心用米飲下日再服

治休息痢及赤白痢附子丸方

附子

炮裂去皮臍半兩

雞子

二枚去黃取白

右二味先將附子搗羅為末以雞子白和為丸如梧桐子大一時傾入沸湯內煮數沸濾出分作兩服米飲下空心日午各一服

治休息痢黃連湯方

黃連

去須炒

龍骨

各半兩

艾葉

一握微炒

阿膠

炙令燥半兩

右四味細剉三味以水三盞先煎黃連等三味至一盞半去滓次下阿膠再煎至一盞分為二服空心一服如人行十里再一服每服藥後濃煎乾艾葉

湯飲之亦佳

治休息痢玉液丹方

白礬 二兩 熬 令汁枯 硫黃

消石 各半

右三味於乳鉢內相和研作末却入砂瓶子內以炭火鎔成汁取出候冷更

研令細用麩糊和丸如菜菔大每服十丸空心米飲下兼治腸風痔漏諸疾

治休息痢紫金散方

定粉 研

鉛丹 各一兩

大棗 二兩 去核

葶苈子 一兩

訶梨勒 炮去核 一兩

右五味相和搗成一團以麩重裹於火中燒令煙盡取出去灰土令淨搗羅

為散每服三錢七空心米飲調下日晚再服

治休息痢脾胃氣虛冷大腸轉泄或發或止飲食減少四肢無力沒石子散方

沒石子 半兩

肉豆蔻 半兩

訶梨勒 一兩 煨 用皮

厚朴 一兩 半 去麩皮 塗生薑汁炙令香熟

龍骨 一兩

桂心 半兩

麝香 細研

右七味搗羅為末每服一錢七粥飲半盞調下食前服之

治休息痢發歇不定經久不差硫黃丸方

硫黃 一兩

砒黃 一兩

何首烏 一兩

白礬 一兩

右四味相和研令勻入瓷瓶子中五月五日取不食井水和六一泥固濟封頭候乾安瓶子向火中燒令通赤俟冷取藥細研以麩糊和丸如菜豆大患近者黃連湯下久老橘皮湯下一丸

治休息痢久不差四霜丸方

巴豆霜

半錢

百草

二錢

粉霜

一錢

砒霜

半錢

乳香末

二錢

右五味再研細令勻用黃蠟半兩鎔汁和為丸如菜豆大每服一丸新汲水下食前服

治一切休息痢日夜不止四體倦怠黃芩丸方

黃芩

去黑心半兩

砒霜

煨研三分

烏梅肉

乾炒

黃蘗

剉各一分

右四味搗研為末鍊蜜和丸如菜豆大每服五丸冷水下

治冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫暖脾胃及治冷滑下痢不禁虛羸

縮沙丸方

縮沙蜜

去皮

附子

炮裂去皮臍

乾薑

炮

厚朴

去麩皮薑汁炙

陳橘皮

湯浸去白焙

肉豆蔻

去殼各半兩

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下食前服

治下痢乍差乍發病名休息丹粉丸方

丹砂

研半兩

粉霜

錢三

膩粉

鉛丹

各四錢

白礬灰

錢三

消石

研

砒霜

研各二錢  
伏火者

右七味再同研勻用水浸炊餅心為丸如豌豆大每服三丸冷麩湯下看虛

實加減

治年多休息痢疾四神丸方

當歸

切焙半兩

烏梅

七枚  
去核

黃連

去須微炒一兩  
龍骨半兩

右四味搗羅為細末以薤白細研和丸如梧桐子大每日空心以溫漿水下

十五丸至二十丸

治休息痢當歸丸方

當歸

炒剉

黃連

須去

烏梅

去核焙各一兩

右三味搗羅為細末以生蒜汁和眾手丸如梧桐子大焙乾每服三十九空

心煎厚朴湯下加至五十九丸

治休息痢金石散方

石灰

鉛丹

各一分

糯米

一合  
炒黑



右三味將前二味慢火炒一炊久入糯米同研令細每服二錢七空心陳米飲調下

蠱痢

論曰凡下痢膿血間雜瘀黑有片如雞鴨肝與血皆下者蠱痢也此由歲時寒暑不調濕毒之氣襲人經脈漸至藏府毒氣挾熱與血相搏客於腸間如病蠱注之狀故名蠱痢也

治蠱痢下血如雞鴨肝片腹痛煩悶地榆湯方

地榆剉

犀角鎊

黃連去須微炒

柏葉微炒

黃蘗去麤皮炙剉

當歸剉微炒

黃芩去黑心

生乾地黃焙

赤地利各半兩

右九味麤擣篩每服三錢七以水一盞煎取七分去滓溫服不拘時候

治蠱痢下血如雞肝疼痛桔梗散方

桔梗去蘆頭剉炒

犀角鎊等分

右二味搗羅為散酒服一錢七日三不能自服者即灌之藥下心中當煩須

史自靜七日乃止可食豬脾以補養之

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不差方

牛膝一兩

右一味切推碎以醇酒一升漬一宿平旦空心服之再服愈

治時歲蠱毒下痢黃連散方

黃連去須一兩

白礬燒令汁盡

乾薑炮

附子炮裂去皮臍各三分

右四味搗羅為細散每服一錢半七溫酒調下空心日午服

治蠱痢下血如雞肝腹中疔痛難忍茜根飲方

茜根

升麻

犀角鎊

桔梗去蘆頭 黃芩去黑心

黃蘗去麤皮 地榆各三分

白蘘荷各一兩

右八味搗為麤散每服五錢七水一盞半煎至七分去滓空心日午服

治藏府傷動腸胃弱虛血滲腸間風冷相乘大便下血瘀黑有片或五痔腫痛

久下膿血者蛭皮丸方

蛭皮一具切 當歸剉

續斷

黃耆

連翹

槐實炒

乾薑炮

附子炮裂去皮臍

白礬飛各二兩

生乾地黄五兩

右一十味同搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心食前米下飲

治歲時蠱痢黃蘗丸方

黃蘗去麤皮

黃連去須各一兩

右二味搗羅為末飯飲為丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下日午服再

治蠱毒痢如鶩鴨肝腹痛不可忍黃芩湯方

黃芩去黑心

黃連去須炒各半兩

右二味細剉以水二盞煎取一盞去滓空心日晚乘熱服冷即凝

治蠱毒痢下血片臍下疔刺痛升麻湯方

升麻

地榆

黃芩去黑心

茜根各一兩半

犀角鎊一兩

山梔子

去殼二七枚

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生地黃一分切薤白三莖切豉三

七粒同煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治中蠱下痢日數十行方

巴豆

十四枚去皮心膜出油

藜蘆去蘆頭

芫青去翅足炒

附子炮裂去皮臍

白礬

熟令枯各半兩

右五味搗羅為末和勻以綿裹藥一大豆許內下部中日三

久痢

論曰久痢不差則穀氣日耗腸胃損傷濕氣散溢肌肉浮腫以胃土至虛故也  
蟲因虛動上蝕於膈則嘔逆煩悶下蝕腸中則肛門瘡爛久而不差變成疳蟲  
下赤汁水血相半腥不可近是謂五藏俱損五液雜下此為難治

治久痢經年不差雲母散方

雲母粉

白茯苓

去黑皮

附子

炮裂去皮  
臍各三分

赤石脂

半兩

龍骨

半兩

右五味搗羅為細散每服一錢匕溫酒或米飲調服日三夜一

治痢積年不差厚朴湯方

厚朴

去麤皮生  
薑汁炙

乾薑

炮

阿膠

炒

酸石榴皮

炒

黃連

去須

艾葉

炒各  
一兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治久痢不止地榆丸方

地榆

一兩

龍骨

赤石脂

無食子

炮

熟艾

微炒各  
半兩

黃蘗

去麤皮  
三分

橡實殼

炒半  
兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九米飲下不拘時

治積年痢困篤腸極滑醫所難療乾薑湯方

乾薑 炮

黃蘗

去麤皮炒

阿膠 炒令燥

酸石榴皮

炒各一兩

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治下痢數年不止桂附丸方

桂皮 去麤皮

附子

炮裂去皮臍

黃連 去須

黃蘗

去麤皮

陳麴

炒黃

乾薑 炮

麥蘗

炒各一兩

吳茱萸

湯洗焙乾

蜀椒

去目及開口者炒出汗

烏梅肉

炒各一兩半

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲下

治久痢不止脾胃虛弱食飲不消化腹鳴疔痛茯苓丸方

白茯苓

去皮三分

陳麴

炒一兩

赤石脂

三分

黃連

去須一兩

附子

炮裂去皮臍半兩

黃蘗

去麤皮

乾薑 炮

當歸

切焙

龍骨

各三分

甘草

炙半兩

人參

半兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲下不拘時

治久痢蜜陀僧丸方

蜜陀僧

白礬

陽起石

伏火砒

伏龍肝

赤石脂

各半兩

右六味搗令細入瓶子中鹽泥固濟以文火養三日後煨令通赤候冷重研

極細水浸蒸餅和丸如梧桐子大每服三丸煨生薑湯下空心日午夜卧服



治久下痢赤白不止吳茱萸丸方

乾薑炮

黃連去煩

訶梨勒皮 白礬灰

吳茱萸湯洗焙乾炒各半兩

右五味搗羅為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服十丸粟米飲下食前服

治久痢金星鱔散方

金星鱔醋炙

白礬

鉛丹各半兩

右三味搗羅為散每服二錢七米飲調下食前

治腸虛久痢天仙散方

天仙子

鉛丹各二兩

大棗三十枚去核三味同搗作餅子炭火燒通赤入地坑出火毒為末

訶梨勒皮一兩末

赤石脂半兩燒過細研

右五味為細散和令勻每服二錢七米飲調下食前服

治腸滑久痢神效無比黑神散方

醋石榴

一枚擘破炭火簇燒令烟盡急取出  
不令作灰用瓷碗蓋一宿出火毒

右一味搗為散每服用醋石榴一瓣以水一盞煎湯調下二錢七久瀉亦治

治一切赤白痢久不差乾薑散方

乾薑

榭石皮薑汁炙五度一兩



右二味搗羅為散每服二錢七空心食前溫米飲調下

治久患滑泄下痢龍骨丸方

龍骨一兩燒醋  
淬三五度

白礬灰半兩 鉛丹炒黑一分

右三味搗羅為末麩糊為丸梧桐子大每服十九丸臘茶清下不拘時服

治諸般多年不差日夜百十行不止抵聖丸方

丹砂錢一 硃砂錢半

右二味以巴豆二七粒和殼用黃蠟半兩煎候黑煙起良久取出巴豆就內  
揀取一七粒好者去殼先將丹砂硃砂於乳鉢內同研令細後方入剝了巴  
豆同研令勻用煎者蠟一小塊更同熬令勻作一劑如有患者旋丸如黍米  
大先用艾湯下三九取出積聚澹轉一兩行並不搜攪疼痛後以冷水空心  
下三九即差

治泄痢久不止方

生薑切 沙糖各一兩

右二以味三重濕紙裹煨五更初都作一服以臘茶嚼下

治久痢不止沉困怠墜訶梨勒散方

訶梨勒皮取木香

黃連須去

地榆各半兩

吳茱萸浸浸焙炒一分

右五味搗羅為散每服三錢七沸湯調下食前服

治久痢不差將變疳蟲虛積丸方

硫黃

水銀

二味同巴豆去皮心不去油與沙同研各一兩

礞石搗碎

硝砂研各半兩

右五味再同研勻以好醋和令得所先作一地坑如茶盞大深四指淨火煨

通赤去灰火用醋紙襯攤藥在內碗蓋土焙一宿取出候乾麩糊為丸如小

豆大每服二丸或三丸生薑棗湯下

治久痢不止或赤或白煨薑莧方

馬齒莧

細切一握生薑二兩

右二味和勻用濕紙裹煨熟不拘多少細嚼米飲嚥下

治新久瀉痢龍骨散方

龍骨

桑根白皮

赤石脂

天雄

炮裂去皮臍去麩皮生薑汁炙

厚朴

去麩皮生薑汁炙

麻黃

去節根各一兩半

白芷

黃連

須去

地榆

桂去麩皮

當歸切

木香

訶梨勒皮

白木

煨各一兩

黃芩去黑心半兩

肉豆蔻

去殼  
二枚

右一十六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一棗大切煎至六分去滓溫服

大德重校聖濟總錄卷第七十七

聖濟總錄

卷第七十七

泄痢門

上



大德重校聖濟總錄卷第七十八

泄痢門

下痢裏急後重

論曰下痢裏急後重者有瘕聚也經所謂大瘕泄者裏急後重數至圜而不能便莖中痛是矣法當和冷而祛蘊滯則脾胃和平飲食腐化其膿血自消大腸自固也治裏急後重下赤白痢及下部疝痛當歸散方

當歸焙切

黃連去須炒

乾薑炮

黃蘗去麤皮蜜炙各一兩

右四味搗羅為散每服三錢匕濃煎烏梅汁調下空心食前日二服若腹中

疝痛加當歸下赤加黃連下白加乾薑

治後重下痢赤白滯下腹內結痛當歸黃連湯方

當歸

焙切三分

黃連

去須炒一兩半地榆一兩

犀角屑三分

赤茯苓

去黑皮三分

甘草

炙剉半兩

厚朴

去麤皮生薑汁炙一兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎至八分去

滓空心溫服日再

治大病後重下赤白痢腹中疝痛石鍾乳湯方

石鍾乳別研黃連去須炒防風去附子炮裂去黃蘗去粗皮

當歸焙切乾薑炮各蜀椒去目并閉口者

右八味除鍾乳外剉如麻豆再同和勻每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服空心食前日二服

治冷熱不和下痢赤白臍腹作痛裏急後重聖功散方

乾薑炮五倍子各一訶黎勒煨去甘草炙剉各

右四味搗羅為細散每服二錢匕食前米飲調下

治腸虛冷熱不和赤白下痢裏急後重訶黎勒湯方

訶黎勒煨去草豆蔻去皮延胡索各半乾薑炮一

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前溫服

治後重下膿血如聖散方

臭橘各一草薢各一

右二味同搗碎炒令烟出放冷搗羅為細末每服二錢至三錢匕茶清調下

治藏氣不調裏急後重勻氣湯方

甘草生剉乾薑生剉蒼朮米泔浸一宿厚朴去麤皮生薑



右四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至六分去滓食前溫服夏末秋初最宜服

治熱痢下重者白頭翁湯方

白頭翁

二兩

黃蘗

去麤皮剉

黃連

去須

秦皮

剉各三兩

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至六分去滓食前溫服日二

治冷痢裏急後重當歸丸方

當歸

切焙半兩

胡椒

炒一兩

黃連

去須

厚朴

去麤皮生薑汁炙各二兩

阿膠

炙燥一兩別為末

乾薑

炮一兩半

右六味除阿膠搗羅為末用好醋調阿膠為膏和劑丸如梧桐子大每服十

五丸食前橘皮湯下加至二十丸

治腹痛虛滑裏急後重心胸痞悶逆滿或傷冷暴瀉手足厥冷脉息沉伏訶黎

勒丸方

木香

半兩

龍骨

二兩

烏頭

炮裂去皮臍

縮沙人

各一兩

訶黎勒

炮去核一兩

肉豆蔻

去殼半兩

白礬

熬令汁枯一兩

右七味搗羅為末粟米粥和為丸如梧桐子大每服二十九丸食前粟米飲下

治藏寒下痢臍腹撮痛腸鳴脹滿裏急後重不思飲食日漸羸瘦勝金丸方

黃連去須 龍骨四兩 草豆蔻去皮 赤芍藥 當歸焙切 乾薑炮

地榆 橡實各三兩 赤石脂 代赭煨赤研 乾桑葉 木香各二兩

右一十二味搗羅為細末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九至三十

丸煎艾醋湯下空心食前服

治洞泄殮泄裏急後重薑桂散方

乾薑炮三兩 甘草一兩剉二味用沙糖二兩水微化開同炒乾 桂去麤皮一分

右三味搗羅為散每服二錢匕白湯調下兼治腹痛止虛渴

治膿血雜痢後重疼痛日久不差通神丸方

沒藥 五靈脂 乳香各一錢 巴豆霜半錢

右四味各研細再同研勻滴水丸如黃米大每服七丸煎生木瓜湯下小兒

三九隨歲數加減空心食前服

治下痢赤白日久不差裏急後重取冷積玉粉丸方

白丁香直者研一兩 粉霜研三分 硫黃研 膩粉研各半兩

乳香鎔過研一分 硃砂研半兩

右六味再同研勻用生薑自然汁煮棗肉研和作劑每服旋丸如豌豆大臨  
卧煎生薑棗湯下七丸未動次夜服十丸老少以意加減

治下痢赤白裏急後重大腸虛滑丹砂丸方

丹砂研

草烏頭末

乳香

研各一錢七

巴豆

大者去皮心研七枚

右四味再同研令勻細用醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服一丸冷乳香湯

下不拘時候

治下痢腹脹裏急後重木瓜飲方

乾木瓜焙

白芷

厚朴

去麩皮薑汁炙

白朮

炒

木香

各一兩

桂去麩皮

黃連

須去

當歸

炙

縮沙蜜

去皮

龍骨

訶梨勒皮

煨各一兩半

陳橘皮

去白焙三分

杏仁

去皮尖雙入炒十五枚

赤石脂

三兩

右一十四味麩搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓溫服

痢兼渴

論曰痢不差則腸胃虛弱津液減耗不能上潤於咽嗝故口舌焦乾而內煩使人引飲飲多則濕氣滯溢肌肉虛浮而痢亦不差也

治下痢冷熱相衝藏府氣不和順本來下虛津液耗少口乾咽燥常思飲水人

初不許飲水毒氣更增煩躁轉甚宜急與湯飲救之不得令至過度止渴枯樓根湯方

枯樓根剉

甘草炙

白茯苓去黑皮各半兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半麥門冬一分去心棗二枚擘破同煎至七分去滓不拘時溫服

治久痢食即嘔吐煩渴不可忍烏梅湯方

烏梅肉炒半兩

黃連去須炒三分

白茯苓去黑皮

黃芩去黑心

龍骨各半兩

訶梨勒炮去核三分

厚朴去麤皮生薑汁炙剉一兩

阿膠炙令燥半兩

右八味麤搗篩每服五錢匕漿水一盞生薑三片同煎至七分去滓空心溫服日午再服

治痢後渴不止石膏丸方

石膏別研

麥門冬去心焙

枯樓根

茯神去木

知母焙

黃連去須

枸杞根皮

白茯苓去黑皮各一兩

胡粉炒黃色半兩

右九味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心米飲下晚食前再服或作散冷熱水調二錢匕服亦得

治泄痢藏府虛燥煩渴不止黃芩湯方

黃芩三分去黑心秤石膏碎

甘草剉

枳殼去瓢炒

黃蘗去麩皮剉

女萎

栝樓根剉

白茯苓去黑皮各半兩

各半兩

檉皮去麩皮剉

淡竹葉各三分切

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服空心未止再服小兒量大小服之

治泄痢上膈虛熱煩渴引飲口瘡不下食困劣人參湯方

人參

白茯苓去黑皮

木香

麥門冬去心焙

葛根剉

前胡去頭

梔子人

黃耆剉

陳橘皮湯浸去白焙

訶梨勒炮去核各一兩

半夏

湯洗七遍焙二兩

甘草炙剉半兩

右一十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞半生薑三片陳米一合同煎至七分去滓空心溫服日晚再服

治下痢煩渴黃連丸方

黃連

去須炒二兩

當歸切焙一兩

烏梅肉

炒半兩

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心米飲下日晚再服

痢甚者鎔蠟為丸服



治熱痢黃膿發渴四肢煩悶黃連丸方

黃連去須一兩半 黃芩去黑心 黃蘗去麤皮各二兩 熟艾葉炒西

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸空心飯飲下日晚服

治痢兼渴麥門冬湯方

麥門冬去心一兩半 烏梅碎七枚

右二味用水二盞煎取一盞去滓分溫二服空心晚食前服

治吐痢後大渴飲水不止陳米湯方

陳廩米水淘淨二合

右一味用水二盞煎至一盞去滓空心溫服晚食前再煎服

治痢後渴糯米汁方

糯米二合

右一味以水一盞半同研絞取汁空心頓服之

痢兼腫

論曰下痢身體浮腫者久痢所致也痢久則胃氣弱而腸虛胃者土也所以化水穀而充肌肉若胃土氣衰不能勝濕則水氣妄行流溢皮膚故痢而兼腫也



得小便利者乃愈

治夏月暴冷忽壯熱泄痢引飲變通身浮腫脉沉細小數澤漆湯方

澤漆炒一两半 吳茱萸湯洗焙

赤茯苓去黑皮 桔梗剉 白朮

當歸切焙 犀角鎊

青木香 海藻洗去鹹焙

大黃炒 芍藥各二兩

右一十一味剉如麻豆每服以水二盞煎藥五錢匕取八分去滓温服下後

消息五六日可與女麴散

治利後虛腫水腫者服此藥小便利得止腫亦消女麴散方

女麴二兩 乾薑炮

細辛去苗葉 椒目微炒 附子炮裂去皮臍

桂去麤皮各一两

右六味搗羅為散酒服一錢匕不知加至三錢七日三若婦人產後虛滿服

此大良

治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血澤漆湯方

桑根白皮炙令黃色剉

郁李人湯浸去皮炙

澤漆葉微炒

杏仁湯浸去皮尖及雙人者炒香

人參各一两半 白朮剉

陳橘皮湯浸去白焙

右七味麴搗篩每服五錢匕水二盞入生薑三片煎取八分去滓温服後半

時辰再服取下黃水數升或小便利為度

治下痢後脾胃虛弱不能制輸水氣致身腫脹滿桑白皮湯方

桑根白皮炙令黃色剉

郁李人湯浸去皮尖麩炒研

赤茯苓去黑皮各二兩

陳橘皮湯浸去白焙一兩

海藻洗去鹹炙一兩半

赤小豆炒半升

右六味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎取八分去滓溫服日三

治痢後偏身浮腫茯苓湯方

防己去黑心 射干各三兩

赤茯苓去黑皮 白朮剉微炒各一兩

澤瀉三兩 桑根白皮炙黃色剉三兩

澤漆葉切微炒一兩

右八味麤搗篩每用五錢匕先以水三盞煮大豆一合取二盞去滓內藥煎

取一盞分為二服末差頻服兩料

治下痢體腫香菽散方

大豆炒熟揅去黑皮用一合

右一味搗羅為散用粥清調一錢匕服日二

治虛勞下痢心胸壅悶喘促四肢腫滿細辛飲方

細辛去苗葉 防己

桂皮去麩

當歸切炒各半兩 枳殼去麩炒

白朮

赤茯苓

皮去黑

赤芍藥

各三分

黃耆

剉一分

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑三片煎至七分去滓溫服不

拘時

治痢後四肢浮腫喘息促急坐卧不安小便不利防已湯方

防已

猪苓

皮去黑

桑根白皮

剉

赤茯苓

去黑皮各三分

海蛤

陳橘皮

湯浸去白焙

檳榔

剉

紫蘇

用莖葉

木通

剉各一兩

木香

白朮

各半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑三片煎至七分去滓溫

服不拘時

治下痢後虛損臍下痛四肢浮腫木香湯方

木香

五加皮

剉

桑根白皮

剉

檳榔

剉

桃人

湯浸去皮尖及雙人微炒

郁李人

湯去皮尖微炒各一兩

松節

剉二兩

薏苡人

陳橘皮

湯浸去白焙各三分

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至六分去滓不拘時候稍熱服

治痢後四肢浮腫麻人湯方

大麻人

商陸

防風

去

附子

炮裂去皮臍去

陳橘皮

湯浸去白焙

防已 各一兩

右六味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半入赤小豆一百粒同煎至八分

去滓食前服

痢後脫肛

論曰下痢脫肛者因大腸虛弱冷氣壅滯至固不能便極力於下肛門脫出故謂之脫肛溫其藏則愈古方有坐湯溫熨之療皆良法也

治肛門不收裏急後重磁石散方

磁石

火煨醋桂去蠱皮

蛭皮

一枚炙令黃熟

右三味搗羅為末每服二錢匕米飲調下慎舉重及急衣帶斷房室周年 佳乃

治痢後脫肛蝸牛散方

蝸牛

三七枚燒灰細研

磁石

火煨醋碎一兩細研

右二味重合研如粉每服二錢匕空心米飲調下日午再服

治痢後脫肛菘菈散方

菘菈子

炒黃半兩蠶頭二枚燒灰

鐵精

半兩研

右三味搗羅為末每服二錢匕空心米飲調下日晚再服仍將藥末少許裏

肛上灸故麻履底按入即不出

治瀉痢日久脫肛疼痛黑聖散方

大蜘蛛

一枚用瓠子葉兩重裹以線繫  
定合子內燒令黑色勿太過

右一味細研入黃丹少許研勻每先用白礬蔥椒煎湯洗浴拭乾後將藥摻在軟帛子上將手掌按托上肛頭即不下

治冷熱不和下部痛裏急後重虛滑或結澁腸頭脫出硝砂丸方

硝砂

飛一兩

硫黃

研

白礬

研各一分

已上三味同研勻用萊菔一枚重五兩者割開留元蓋子剗作坑子填上件末在內將瓦蓋用竹簽定以麩劑十五兩裹了開地坑子一枚方一尺鋪馬糞厚三寸安麩球在上更以馬糞蓋之上發火燒候麩黑即止去麩將萊菔藥爛搗如膏更入後藥

肉豆蔻

去殼

葫蘆巴

各半兩

訶梨勒皮

附子

炮裂去皮臍

補骨脂

炒各一兩

懷香子

一分炒

右六味搗羅為末通前藥膏同搗滴少好酒和納令勻丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸空心食前溫米飲下

治洞泄肛門脫出猪肝散方

猪肝一片切慢火熬乾

黃連去須

阿膠炒令燥

芎藭各一兩

烏梅取肉二兩半蒸艾葉醋炒

右六味搗羅為散每服二錢七温酒調下白米飲亦可食前日再服

治肛門脫出壁土散方

故屋東壁上土五合

皂莢三挺各長一尺者

右二味搗羅土為細末傅肛頭取皂莢炙暖更互熨入則止

治脫肛不收蒲黃傅方

右用蒲黃一味以猪脂和傅肛上手按抑令入日二三愈

治積冷下痢脫肛枳實熨方

枳實一枚石上磨令滑澤鑽安柄子蜜塗炙令暖熨之冷更易之肛縮入

即止

疝蟲

論曰疝有五種久變為蟲蟲一日白疝令人皮膚乾燥而無潤澤之氣二曰赤疝令人毛髮焦枯三日蟻疝令人腰脊強重四曰疝蟲令人下部學急背強不



能俯仰五日黑疔患者必死令人五藏俱損或下瘀血此蓋腸胃虛弱嗜甘味過度致脾氣緩弱穀氣衰微榮衛虛損腸間諸蟲因虛而動蟲蝕於上則手足煩疼心中懊懣嘿嘿不欲飲食腰脊無力食不知味精神恍惚夜夢顛倒咽生瘡齒斷黯黑損爛膿血俱出胃氣逆則變嘔噦下蝕腸胃便痢膿血或下瘀黑久不已則肛門爛開漸至危殆

治久患疔痢不差兀子礬散方

兀子礬燒研

黃連去須各二兩

白礬燒研

龍骨研

雲母粉研各一兩半

桂去麤皮

麝香研各半兩

無食子燒七顯

右八味搗研為散空心生薑汁三錢七日再服

治積年疔痢羸瘦面色萎黃方

硫黃研

黃連去須

艾各一兩

蜜合一

右四味以水二升先煮黃連艾取半升後內硫黃末更煮三五沸絞去滓又

內蜜更煮三五沸分三服

治疔痢久不差羸瘦欲死方

新出羊糞升一

右一味以水一升漬經宿明旦絞汁頓服之日午唯食煮飯極重者不過三服差

治久痢赤白痢濕諸疾五皮湯方

槐皮

桃皮

栲根白皮

柳皮

棗皮

各以患人手把外截一握

右五味細剉用水二盞煎至一盞去滓空心溫服未止再服

治久痢變疳下部生惡瘡惡寒壯熱二白湯方

桃白皮

槐白皮

各切五升苦參切五

大棗十枚

熟艾

三月三日者五月合

右五味以水五升煮取二升半去滓內熊膽一棗許大攪令勻取二升灌下

部餘分三服

治久痢成疳灌洗方

栲根白皮

一握搗絞取汁三合取時勿令見風日

大麻油

熱如車脂

酢泔淀

各二合

豉二合

椒

四兩去合口及目炒出汗

右五味以水五升先取椒豉煎絞取汁二升和栲汁麻油泔淀等三味分為

兩分用一分灌下部隔一日更取餘者復灌其藥溫用唯得食煮飯葱白爛

煮蔓菁芥等五六十日外以鹿脯下飯

治丈夫婦人小兒久痢成疳百方不差方

丁香

麝香研

黃連去須各一分

右三味搗研為散每以一錢匕取竹筒吹入下部小兒量度減之不過三四上差

治疳痢不止方

苦參

甘草剉

雄黃各二兩

右三味搗羅為細末先以水五升煮葱白五寸豉一合蜀椒三十粒至三升入藥末三撮於汁中候冷熱得所先飲少許豉汁食一口飯乃側卧徐徐灌下部訖多時卧不出為佳大急乃出之於淨地當有疳濕蟲如白馬尾頭黑是其效也若重者肚大難差當取桃枝綿裹頭浸前件藥汁適寒溫烙之近脊點烙一上三十度乃差

治久痢成疳便下白色食不為肌膚石榴丸方

石榴皮

焙剉二兩

無食子

四枚

厚朴

去麤皮生薑汁炙剉

乾薑

炮各一兩半

橡實

附子

炮裂去皮臍各二兩

右六味搗羅為末米飲和眾手丸如梧桐子大每服三十九丸食前生薑湯下

日再

濕蠱

論曰凡下痢不止或時氣之餘為水濕所乘客於腸胃令九蟲皆動侵蝕府藏故為濕蠱之病所謂蠱者蟲動於匿而難知故也謂其蟲因濕而動故名濕蠱其證上則蝕脣口下則蝕肛門上脣生瘡是蟲蝕五藏令人心煩懊懣下脣生瘡是蟲蝕下部令人肛門傷爛若胃虛氣逆則變為嘔噦甚即府藏被傷齒上下斷皆生瘡齒色黯黑是其候也下痢出瘀血者不可治

治濕蠱痢不止蕪荑丸方

蕪荑人

微炒

吳茱萸

湯洗焙炒

乾薑

炮各半兩

枳殼

去瓤麩炒

黃連

去須炒各三分

右五味搗羅為末煮漿飯和丸如梧桐子大每服二十丸空心日午米飲下

治濕蠱痢蕪荑黃連丸方

蕪荑人

微炒

黃連

去須炒一兩

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸空心食前煖米飲下加

至七丸

治疳蟲蝕下部苦參湯方

苦參

青柏子

各一兩甘草

熊膽

研各半兩

右四味除熊膽外麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去滓入膽半分攪和空心頓服日午再煎服之

治濕蠹痢蟲蝕下部參連湯方

苦參

一兩半

黃連

去須炒二兩

阿膠

炙令燥一兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治疳濕蠹蝕口齒及下部青柏子散方

青柏子

苦參

甘草

生剉各一兩

右三味搗羅為散每服一錢匕食前煖生地黄汁調下

治痢濕蠹下部瘡爛黃連湯方

黃連

去須四兩

熟艾

炒二兩

苦參

槐白皮

各三兩

右四味細剉如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至八分去滓溫服重者不過

三劑

治疳蠹蝕人下部通見五藏痢下膿血舉體不安徧身疼痛面無顏色手足虛

腫苦參散方

苦參

礬石熱令汁盡

青箱子

各半藜蘆一分

右四味搗羅為散每用二錢七置竹筒中吹下部日二三度小兒只一錢七

治疳蠱下部上攻移熱殺蟲豬膽煎方

豬膽一枚

米醋五合

右二味煎醋令百沸入膽汁更三五沸滿口飲之蟲死即差

治疳蠱無問所在皆治之方

右取死蝦蟇燒灰研末以油和塗瘡上

治疳蝕人諸處但是赤血痢久不差用之即差方

蝦蟇一枚五月五日採燒灰研

金銀土鍋

人屎灰

一方云髮灰各五兩

麝香

研一分

銀末

小豆許錯

右五味搗研為末每用少許傅瘡上即差痢者吹下部

治疳蠱蝕下部生瘡膿血雜下身面有浮氣雄黃散方

雄黃研

青箱子

各二兩苦參

三兩

礬石

熱令汁枯

雌黃研

藜蘆

鐵衣

各一兩

麝香

研半兩

右八味搗研為散每和酸棗大以竹管送內下部中日小兒以大豆許此



方能殺死

治疔濕蟲下赤黑血肛門蟲蝕赤爛日夜疼痛熏黃散方

雄黃 研

丹砂 研

食鹽 研

青黛 研

丁香

鐵衣

礬石

熬令汁枯研

梔子人

麝香 研各一分

良莖子

細辛 去苗葉

土瓜根

乾薑

炮

甜葶藶

紙上炒

上菖蒲

蝦蟆

燒灰研

蜀椒

去目及閉口炒出汗

故靴底

燒灰研各一錢

天靈蓋

枯腐者一分炙

右一十九味搗研為散每用一錢匕以綿裹內下部中日再易有瘡即傳其上

治疔濕蟲洗燄下部丁香散方

丁香 一分

麝香 研一錢

犀角 鈔

甘草 剉各三分

右四味搗研為散以鹽椒各三合豉二合水三升都煎至一升去滓乘熱用

綿蘸洗燄下部冷即再煖用

治疔濕蟲殺蟲青箱子散方

青箱子

雄黃 研

硫黃 研

蕪荑人

雷丸

各半兩

苦參 剉

狼牙

各三分

藜蘆

去蘆頭一分

右八味搗研為散以綿裹一錢七內下部中日再易之

治下部疳蠹瘡經年不差丁香散方

丁香

青黛研

黃連去須

木香研

石灰研

蚺蛇膽各半麝香一錢

右七味搗研為散每用半錢七傅瘡上日三兩易

大德重校聖濟總錄卷第七十八