



胡餅劉熙氏合餅之漫疑也  
之大饅頭也  
胡餅之為餅隨之  
又曰胡餅作





新刊增人良方補遺大全終本

存第三四五六一冊十三十四十五十六十七十八

一冊十九二十廿一廿二廿三廿四一冊行款與德及

光刻同惟改裝編作新刊本林三之訪古

志載有明正德八年刊本以存或共

零強自本也日奉人燕校頗密其書

肩以所引書詳其本原在外無秘要所慮  
 方之類非傳通醫籍者不能又所補本  
 即朝鮮國活字本蓋日本之種朝鮮  
 為韓國者位三韓古稱也又可知上島  
 影與陳自明本出日朝鮮活字本也  
 宣統庚戌八月官初楊心野記



新刊婦人良方補遺大全卷之三

臨川陳自明良甫編集

齋峯熊宗立道軒補遺

此一卷論中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口噤口眼  
 喎斜風眩頭痛血風心神驚悸癲狂骨節痛風血風走注  
 瘙癢癩疹風痰脚氣腰痛諸疾已上諸証雖各有方論亦  
 要先明其大射察脉之虛實辨証之冷熱相入之強弱入  
 臟入腑在絡在經首以蜀方調治未要猛浪用藥今之治  
 法先宜順氣然後治風萬不失一蓋有中風中寒中暈中  
 痰中氣皆能令人涎潮昏塞所謂朱紫相凌玉石不分醫  
 者不可不詳而究之如中風若作中氣治之十愈八九氣  
 中若作中風治之十無一生所以疑惑之間不問中風中

氣首以蘇合香散。虛者則宜積散。如中痰則有參蘇散。如中寒則有理中湯。如中暈則有白虎湯。如的然身得是中風。如三生飲。木香散。排風續命風引大小竹瀝。大八風湯。至寶丹。辛黃清心圓。辨其冷熱虛實而投之。未有不安者也。然此疾積襲之久。非一日所能致。今人服藥三五服。便責無效。其責醫者亦速矣。正宜大劑久服。方有其效。孟子曰。七年之病。求三年之艾也。

○婦人中風方論第一

夫中風者。虛風中於人也。風是四時八方之氣。常以冬至之日。自坎而起。候其八方之風。從其鄉來者。主長養萬物。若不從其鄉來者。各為虛風。賊害萬物。人休虛者。則中之。當時雖不即發。傳在肌膚。後或感傷於風。前後重者。因射

虛則發入臟腑。今人得在中風。多從俞。隨所中之。而乃發病。婦人血氣虛損。故令中風也。當察口眼開闔。以別重輕。涎沫有无。以明証治。如眼閉口開。手足不開。涎不作聲者。可治。如眼閉口開。聲如鼾。腰流泉者。死。

至寶丹 蘇合香圓 五積散 牛黃清心圓 煎方

大八風湯 方見偏枯

探風湯 治男子婦人風虛濕冷邪氣入藏。狂言妄語。精神錯亂。及風入五藏等証。詳見和劑方。

白鮮皮 白朮 白芍藥 桂心

川芎 當歸 防風 杏仁 去皮 大

甘草 各二兩 白茯苓 麻黃 去節 獨活 各二兩

右咬咀。每服三錢。水一盞半。生薑四片。煎至捌分。去滓。

通汗

得甚 便作府 者

六次 一時請證未及

之中絕許 之其疾 之此證 日得走此 證

以 請者 此候

志意不 答 所用之藥 之

濕服無時假... 內三少... 則口中... 不仁... 傷多... 而熱... 以十... 之... 急... 未... 且... 後... 三日... 証... 風... 也... 風... 六... 心... 暖... 生... 知...

濕服無時假... 內三少... 則口中... 不仁... 傷多... 而熱... 以十... 之... 急... 未... 且... 後... 三日... 証... 風... 也... 風... 六... 心... 暖... 生... 知... 知不...

一二日... 脈亦... 又... 數... 則... 則... 則... 則...

香壹錢... 末... 溫服... 右... 生南星... 痰氣... 浮盛... 生南星... 木香... 香壹錢...

同 者 下 本 方 富 古 此 物 造 引 藥 者

天參散治虛飲停滯中脘閉塞嘔吐痰涎眩暈嗜烟  
必悸噦逆及痰氣中人停留胸膈手足臂心口眼喎斜半  
身不遂食已即嘔頭疼發熱狀如復發

人參 紫蘇葉 半夏 茯苓  
前胡各三分 甘草 木香

陳皮 枳殼製 苦梗

右咬咀煎服。每服水壹球半。當藥煎畢。投前藥分去  
滓。空心溫服。服加芍藥。

木香 茯苓 枳殼製 苦梗 前胡 半夏 人參 甘草  
進食宜中

陳皮 枳殼製 苦梗 前胡 半夏 人參 甘草

牛膝

人參

甘草

右咬咀。每服四錢。水壹大瓠半。煎至物分  
去滓。熱服。大便不通。加大黃心。腹脹。加芍藥。滑石。腸

上壅滯。咳嗽。氣促。加夏川升麻。天門冬。知母。熟地。黃芩。人參

以木香香。散而愈。

百子理中湯

治五臟中寒。口噤。四肢強。人參。首。不。音。有。

武士守邊。大雪。山帳。外。觀。踏。忽然。軍。倒。仆。木。香。作。隨。行。醫  
官。灌。以此。藥。為。劑。遂。解。

大附子 人參 去芦 乾薑 甘草

已辨後事 以六  
又享十年之壽

周厚也承年七月間。裕齋曹氏  
不進作治之投書示  
之投書示。裕齋  
曰也答以所製之  
特之證。四股屬脾。可也答  
藥之答用  
治此第一投而左

白朮等分

右細劉每服四錢。水壹錢半。煎七分。去滓不以時服。口

禁食開灌之。事觀文夫人。於五月間。病氣弱。伏暑。二  
作虛寒。必欲。無效。乃召僕診之。六脉。弱而兩關。差其。中  
問。是何証。僕曰。六脉。弱而兩關。差其。中。焦寒也。中焦  
脾也。脾。胃。既。寒。木。但有。此。証。必有。腹痛。吐。瀉。今。四肢。厥  
冷。脾。弱。四。肢。是。脾。胃。虛。冷。五。臟。皆。冷。曰。未。見。腹。痛。吐。瀉。之  
証。合。用。何。治。僕。曰。宜。附。子。理。中。湯。未。派。藥。問。  
旋。即。腹。痛。而。瀉。莫。不。神。之。即。投。此。藥。而。差。

加減小續命湯治卒中風不省人事漸覺半身不遂口

眼喎斜手足戰掉語言蹇澀肢麻痺痺神昏亂頭自眩  
重痰涎併多筋脉拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側及

治諸風服之皆驗若治脚氣緩弱久服得差又病風人每  
遇天色陰晦即作變更宜預服之以防疴疔

麻黃 附子 沙 已 人參 去 黃芩

杏仁 各壹分 附子 炮半兩 防風 壹兩

右咬咀每服伍錢。水壹錢半。煎七分。去滓不以時服。口  
夫。津。不。以。時。候。服。取。汁。隨。人。虛。實。輕。重。所。中。輕。重。有。人。脚  
弱。服。此。六。七。劑。得。瘥。 精神恍惚。加茯神。遠志。 骨節

煩痛有熱者。去附子。倍芍藥。心煩多驚者。加犀角半兩。  
骨間冷痛者。倍用杜仲。 嘔逆腹脹者。倍人參。加半夏

壹兩。 躁悶大便澀者。去附子。倍芍藥。又竹瀝壹合。煎  
服。 臟寒下利者。去防已。黃芩。倍附子。壹兩。加白朮壹

兩。 白朮。無。杏仁。 救急。無。芍藥。杏仁。 止。十。味。 延年。無  
防風。 便利。產後。失血。并。老人。小兒。用。麻黃。桂。心。

甘草各貳兩。 一法治瘵或歌哭或笑語無所不及用麻



黃參兩。人參桂枝白朮各貳兩。無附子防風生薑各壹兩。歸壹兩。自汗者去麻黃杏仁加白朮。脚弱加牛膝右解各壹兩。身疼痛加秦艽壹兩。腰疼加桃仁杜仲各半兩。失音加杏仁壹兩。春加麻黃三兩夏加黃芩三分秋加芍藥

**小風引湯**

防風

獨活

細辛

川芎

北五味子

白茯苓

人參

白芍藥

白朮

甘草二分

右以咀。每服參錢。水壹錢。薑參三片。杏仁伍箇。去皮尖。搥碎。同煎至柒分。去滓。溫服。如加麻黃從容附子當歸。羚羊角陸味。即小風引湯

**十金湯**

大熱即生風

右以咀。每服參錢。水壹錢。薑參三片。杏仁伍箇。去皮尖。搥碎。同煎至柒分。去滓。溫服。如加麻黃從容附子當歸。羚羊角陸味。即小風引湯

秦艽

防風

獨活

附子

右以咀。以水片。搥。煎。至。貳。錢。入。生。地。黃。汁。淡。竹。瀝。各。半。錢。煎。煎。四。五。沸。去。滓。分。作。四。服。無。時。熱。服。病。勢。去。以。他。藥。扶。持。未。愈。再。作。近。世。貴。人。用。之。多。有。神。效。

**漆竹瀝法**

新竹截。尺許長。去節。作兩邊。用兩磚對立。相去八寸。置竹仰在磚上。急着。火燒之。磚外兩頭。以泥。成。漆。瀝。盡。以絹。渣。清。夏。秋。酒。沉。冷。水。中。以。防。瀝。酸。凡。大。熱。有。風。人。亦。可。單。服。冷。暖。隨。久。勿。過。度。荆。瀝。亦。然。

中風痰厥服熱藥不得者

南星 八錢 木香 二錢

咬咀每四錢薑十片水一盞煎七分溫服

皇清湯治中風痰壅六脈沉伏昏不知人服涼藥不得者

附子 小甲 南星 附子 木香 半兩

右咬咀每四錢水一大盞薑九片煎七分溫服虛寒甚

者加天雄川烏各三錢湯燂其如牽鋸服藥不下宜於

關元丹田二穴多灸之

烏藥酒治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼痛

逆身頑麻凡卒中風手足癱瘓言語蹇澀者皆宜先服此

藥以疎氣道然後隨證投以風藥

烏藥 陳皮 川芎

白芷 枳殼 甘草

乾薑 一兩

為菴米每參錢水一錢薑三片棗一箇煎溫服如虛寒

壯熱頭痛肢體倦怠加葱白三寸煎服出汗或閉挫

身體不能屈伸溫酒調服遍身瘙痒抓之成瘡用薄荷煎

○婦人中風角弓反張口噤方論第二

夫婦人角弓反張者是體虛受風風入諸陽之經也人之

陰陽經絡周環於身風乘虛入於諸陽之經則腰背反折

筆意如角弓之狀宜用小續命湯方用時

活人書論曰婦人產後血虛多汗出喜中風身體強直口

噤背反張作瘳治之屬太陽經先因傷風又感寒濕而致

然也古人謂之瘳病外證發熱寒者宜用其法

斷法各作斷是

冬亦出此証當察有汗無汗以分別柔二症無汗者有汗不  
 柔寒名陽症屬剛症陰症屬柔症無汗者葛根湯主之有汗  
 桂枝加葛根湯主之凡剛柔二症小續命湯並可與之有  
 汗者去麻黃加葛根若審知剛症者曾滿口噤其人卧不  
 着席脚攣急咬齒當行大承氣湯注云外臺云熱而折者死  
 也附木湯散桂枝湯散附子防風湯散八物白木  
 湯散桂枝散可選而用之傳感論云公口而折者死  
則發汗多  
**葛根湯**治剛症無汗惡風產後有汗用  
 葛根一兩 麻黃去根 薑錢各三 桂枝  
 粉草 芍藥各半兩 大棗三  
 姜錢各三

右咬咀每服分三服。水一斗。煮取三升。分三服。汗出為度。  
**桂枝加葛根湯**治柔症有汗不惡寒。  
 桂枝 芍藥 甘草炙 乾葛二兩  
 生薑一兩 棗四枚  
 右咬咀。每服分三服。水一斗。煮取三升。分三服。取汗為度。  
**大承氣湯**馬詳之產後難  
 附木散治傷寒手足逆冷。筋脉拘急。汗出不止。項強。直。搦  
 頭口噤。  
 附子 白朮各一兩 川芎二錢 肉桂二錢  
 獨活半兩  
 右為細末。每服分三服。水一斗。煮取三升。分三服。取汗為度。  
**桂心白朮湯**治傷寒陰症。手足厥冷。筋脉拘急。汗出不止。

聖惠方曰柴胡散

聖惠方曰柴胡散

聖惠方曰柴胡散

聖惠方曰柴胡散

白朮

桂心

附子炮

防風

川芎

甘草

右咬咀每服伍錢水煎或薑四片棗子一枚煎七分去滓溫服

汗出不止

柴胡

五味子

白朮

茯苓

甘草

乾薑

附子炮

防風

桂心

右為粗末每服參錢薑四片水一錢煎七分去滓溫服

八物白朮散治傷寒陰歷三日不差手足厥冷筋脉拘急無汗恐陰氣內傷

白朮

麻黃

茯苓

五味子

羌活

附子

桂心

白朮

右為粗末每服錢水一錢薑四片煎七分去滓溫服

白朮散治婦人中風角弓反張口噤不能言身膚痲痺筋脉抽掣

僵蚕

烏蛇肉炙

天麻

獨活

商星炮

川烏炮去皮

防風

蟬蛻洗

白附子炮

犀角骨

朱砂研

桑螵蛸各半

麝香

右為細末每服一錢溫酒調下無時服

烏蛇肉炙 天麻 白附子炮 商星炮

烏蛇肉炙

天麻

白附子炮

商星炮

聖惠

獨活

烏犀骨

獨活

全蝎

半夏麴

麻黃

去根節

當歸

晚蚕沙

右為細末煉蜜元如梧桐子大每服七元溫酒吞下亦治角弓反張

**補遺** 治婦人中風卒然倒仆牙關緊急角弓

反張口歪不省人事并解上膈壅熱痰涎咽喉腫閉

欝金 二錢半

巴豆

去殼

雄黃

二錢半

右為末醋煮糊丸黍豆大每服七圓熱茶清吞下吐出

頑涎立甦

**通關散** 治卒暴中風昏塞不省牙關緊急角弓反張藥不

得下咽

細辛

薄荷葉

牙皂

雄黃 各一錢

右為末每片少許溫酒吞下入中風昏塞不省牙關緊急者可用

用白梅擦牙更以膏油夫著舌下牙關緊急者可用

○婦人中風口噤方論第三

夫婦人中風口噤者是體虛受風風入頷頰夾口之筋也

手三陽之筋結入於頷頰足陽明之筋上夾於口而風挾

冷乘虛入其筋則筋攣故引牙關急而口噤也

**天南星散** 治婦人中風口噤四肢拘急

天南星

薑汁

白附子

炮

黑附子

炮

烏蛇肉 酒炙

全蝎 等分炒

右為細末每服半錢以生薑汁溫酒調下無時初開瀝

**走馬散** 治婦人中風口噤四肢強直

黑附子

炮

天麻

各半兩

桂心

石膏

麻黃 去根節 蠟精 心 川烏 炮去 南星 一分

麝香 研分

右為細末。入研藥令停。每服一字。無時。豆淋酒調灌。

**烏龍散** 治婦人中風口噤

烏蛇肉 炙 全蝎 炒 天麻 南星 炮

僵蚕 炙 膩粉 半分

右為細末。入膩粉令停。每服一字。以生薑酒調灌下。

**補遺** 治中風口噤不知人事四肢強直

先以鹽梅擦牙齦。後用白木四兩水三升。濃煎。頓服。効。

○婦人中風不語方論第四

巢氏云。脾脉絡胃。夾咽。連舌本。散舌下。心之別脉。係舌本。今心脾貳臟受風邪。故舌強不得語也。喉痛者。氣之所以

上下也。會厭者。言舌之穴。舌有聲之機。唇者。聲之系。風寒客於會厭之間。故卒然無音。皆由風邪所傷。故謂之中風。失音不語。經云。脾主當風。使人發瘖。

**神仙雜語** 治心脾經受風。言語蹇澀。舌強不轉。涎唾溢。

盛衰。瘖淫邪搏陰。神內鬱塞。心脉閉滯。暴不能言。

白附子 炮 石膏 蒲 去毛 遠志 去心甘草

天麻 全蝎 酒炒 羌活 白僵蚕 炒

南星 牛膽酸如無 木香 半兩

右為細末。煮麪糊為圓。如梧桐子大。量入辰砂為衣。每

服貳拾圓。至參拾圓。生薄奇湯吞下。無時候。

**治中風內虛脚弱語蹇心風湯**

石斛 醋炒 乾地黃 杜仲 去皮切 丹參 各壹兩

防風湯 治同上

防風

川芎

麥門冬去心

川獨活各壹兩

右咬咀每服伍錢水薑半棗二枚煎至捌分去滓溫服  
陷中風入肝脾經年四肢不遂舌強語謇

威靈仙

附子炮

苦梗

蔓荊子

防風

枳殼法蒸

川芎

當歸各壹分

右咬咀每服四錢水一盞枳殼半棗薑半片煎至八分  
溫服日四服忌茶

補遺黃獨活湯

治中風手足拘攣煩熱心亂無寒不食

半身不遂笑音不語

蘇黃去節

黃耆半兩

黃芩七錢

獨活一兩

右咬咀每四錢水煎服取汗為效心熱加大黃氣滿加

按氣逆加人參六錢性如寒加附子  
小省風湯治中風左癱右瘓口眼喎斜口噤全不語  
身不遂手足頑麻

防風去節

南星湯炮各其草炙一兩

右坐散每四錢薑薑十片水大棗煎熱服

○婦人風痺手足不隨方論第五

夫婦人風痺者由風寒濕三氣合而為痺風多者為風痺  
其狀肌膚盡痛諸陽之經皆起於手足而循行於身體風  
寒之氣客於肌膚始為痺後傷陽經隨其虛處而痺  
血氣相搏血氣行則痺緩使機關弛縱故風痺而復手足  
不隨也

三痺湯治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾皆療

在韓本見方下有不得發錄四字

川續斷

杜仲

杜心

華陰細辛

人參

白茯苓

當歸

白芍藥

甘草各壹兩

秦朮

生地黃

川芎

川獨活各半

黃耆

川牛膝各壹

右以咀為末。每服伍錢。水貳錢。薑壹片。棗壹枚。煎至壹錢。去滓熱服。無時候。但腹稍空服。有人病左臂不隨。後已痊。平。而手指不使無力。宜諸藥不驗。服此藥。絕半。安。

三五七亦妙

方在局方

補遺金澤湯治風寒濕氣發留肌體手足緩弱麻痺不仁

片子薑黃

羌活

白朮

防已各一兩

甘草炙半兩

右以咀。每四錢。薑七片。煎。病在上。食後服。病在下。食前服。

○婦人口風自汗方論第八

尋古治中風方。續命。祛風。越婢。桂。桑。能除去。而千。多用。麻黃。令人不得慮虛。凡以風邪不得汗。則不能泄也。然此治中風無汗者為宜。若治自汗者。更用麻黃。則津液轉使。脫泄。反為大害。中風自汗。仲景雖處。以桂枝湯。至於不住。發搐。口眼。動。遍身汗出者。豈勝對治。當此之時。獨活湯。續命。煮散。復。榮衛。却風邪。不可闕也。

獨活湯治風虛昏憤。不自覺。短。手足棄。縱。坐臥不能。或發

寒熱。血虛不能服。發汗藥。及中風自汗。尤宜服之。

川獨活

羌活

人參

防風

當歸

北細辛

茯苓去木

半夏

桂心

白薇

遠志去心

菖蒲去毛



川芎 各半兩 甘草 三分

右咬咀。每服五錢。水盞半。姜五片。煎七分。去滓。无時服。  
**續命散** 治風氣壅滯。心中昏憤。四肢无力。口眼闞動。或時搐搦。亡失津液。渴欲引飲。此能扶榮衛。去虛風。中風自汗。及產後中風自汗。尤宜服之。

防風 獨活 當歸 人參

細辛 葛根 芍藥 川芎

甘草 熟地黃 半夏 遠志 去心

荆芥穗 各半 桂心 七錢半

右以咀。每服五錢。水一瓊。生姜三大片。煎至七分。去滓。温服。不拘時。汗多不止者。加牡蠣粉一分半。

**續命散** 治中風自汗不止

白朮 牡蠣

煮末酒調下米飲亦可。服之。汗不止。可服黃耆建中湯。

○婦人臂痛方論第七

論曰。夫婦人臂痛。筋脉亦急。不得屈伸。遇寒則劇。由肝虛為風寒邪氣。流於血脉。客於經絡。搏於筋筋。不榮則乾急而痛。其脉緊細。宜服栝子仁圓舒經湯。若臂痛不能舉。或左或右。時復轉移一臂。由中腕伏痰。脾氣滯而不行。上與氣相搏。四肢皆屬於脾。脾氣滯而氣不下。上攻於臂。故痛。其脉沉細。宜茯苓圓舒經丹。

**栝子仁圓** 王氏持送方

栝子仁 乾地黃 各二 茯苓 枳實 去心

覆盆子 北五味 附子 石斛

鹿茸 酸棗仁 桂心 沉香

黃耆 各一兩 蜜水 方寸分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下三十九

**舒經湯** 治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾

片子薑黃 甘草 羌活 各一兩 白朮

海桐皮 當歸 赤芍藥 各二兩

右為粗末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服如

腰以下疾空心服服以上疾食後服

**茯苓圓**

茯苓 一兩 半夏 一兩 枳殼 半兩 風化朴消 一兩

右四味為末姜汁煮糊為丸如梧桐子大生姜湯下二

此方在... 方有... 下兩科... 作分

十圓食後服 補遺 茯苓圓 治臂痛不能牽手或在或

右... 時停滯脾氣不行... 搏四肢... 也後人謂此臂痛乃痰証也用以治痰無不... 以此藥治人隨服隨愈... 茯苓丸之速也

**控涎丸**

凡人忽患背手足頸項腰膝隱痛不可忍連筋

骨牽隱釣痛坐卧不寧時時走易不定俗醫不曉謂之

症使用風藥及針灸皆无益又疑是風毒結聚... 亂以藥貼亦非也此乃痰涎伏在心膈上下變為此症或

令人頭痛不可牽或神意昏倦多睡或飲食无味痰唾稠

粘夜間喉中如鋸聲多流唾涎手脚重腿冷痺氣脈不通

龍

誤認為癱瘓亦非也凡有此疾但以此藥不過數服即愈

甘遂去心 大戟去皮 真白芥子各等分

右為細末糊丸如梧桐子人臨卧淡姜湯吞下五七丸如疾猛加至十丸

**白芥子散**治臂痛外連肌肉牽引背脚時發時止此由榮衛之氣循行失度留滯經絡故止氣相搏其痛發則有似癱瘓

真白芥子 木鼈子各等分 沒藥別研

桂心 木香

右為細末入研藥之酒中下以溫酒調下

**流氣散**

赤芍藥 青皮 羌活 大黃

當歸

川芎

甘草

右以咀每服五錢十二丸

補遺交加散治臂痛冷痺

五積散煎毒散對和每服四錢

片水一錢半煎服未効加

羌活木瓜

**四物湯**治血滯作臂痛加紅花煎

○婦人賊風偏枯方論第八

論曰賊風偏枯者是体偏虛受風風客於半身也人有勞傷血氣半身偏虛者風乘虛入客於半身各為偏風也其

誤認為癱瘓亦非也凡有此疾但以此藥不過數服即愈

甘遂去心 大戟去皮 真白芥子各等分

右為細末糊丸如梧桐子人臨卧淡姜湯吞下五七丸如疾猛加至十丸

**白芥子散** 治臂痛外連肌肉牽引背脚時發時止此由榮衛之氣循行失度留滯經絡故止氣相搏其痛發則有似癱瘓

真白芥子 木鼈子 沒藥別研

桂心 木香

右為細末入研藥入酒調下

羌活 黃芩 青皮 大黃

當歸 扶苓

川芎 黃芩

甘草 橘皮

右以咀每服五錢半二錢

補遺交加散治臂痛冷痺起

五積散煎毒散對和每服四錢

片水一錢半煎服未効加

羌活木瓜

四物湯治血滯作臂痛加紅花煎

○婦人賊風偏枯方論第八

論曰賊風偏枯者是体偏虛受風風客於半身也人有勞

傷血氣半身偏虛者風乘虛入客於半身也名為偏風也其

風邪入深真氣去邪氣晉發為偏枯此由血氣衰損為風  
 所客。令血氣不相周榮於肌。故令偏枯也。  
 論曰。夫偏枯者。其狀半身不隨。肌肉枯瘦。骨間疼痛。神智  
 如常。名曰偏枯。僕原疾之由。皆由陰陽偏虧。臟腑怯弱。經  
 絡空虛。血氣不足。當風衝坐。風邪乘虛而入。疾從斯作。如  
 經云。汗出偏沮。使人偏枯。詳其義理。如樹木。或有一邊津  
 液不蔭。注而先枯槁。然後被風所害。人之身體。或有一邊  
 血氣不能榮養。而先枯槁。然後被風所害。其理顯然。王子  
 事有云。舟行於水。人處於風。水能泛舟。而亦能覆舟。風能  
 養徒。而亦能害體。蓋謂舟漏水入。體漏風傷。古人有云。醫  
 風先醫血。血行風自滅。是也。治之先宜養血。然後驅風。無  
 不愈者。宜用大八風湯。增損茵芋酒。續斷湯。

時  
大

疑可將又有時之字可考  
少

治中風偏枯。手足不遂。口眼歪斜。語言不清。筋骨疼痛。神志恍惚。

當歸 杏仁 甘草 桂心

乾薑 附子 升麻 川烏

黃芩 芍藥 僵蠶 防風

川芎 茯苓 天麻 石斛

人參 茯神 石膏 黃耆

紫苑 各一兩 人豆 三兩 去

右為粗末。每服。每服。每服。每服。酒。壹食。則至。壹。去。滓。溫  
 服。恍惚者。不用酒煎。

病名偏枯。治半身不隨。肌肉乾燥。漸漸細瘦。或時時痛。

茵芋葉 川烏 石楠葉 防風

川椒炒出汗 附子炮 北細辛

獨活 羌活 肉桂 天雄炮去

秦光 防己各一兩 薺歸花 當歸

生乾地黄各二兩 芍藥一兩

右以酒貳斗漬之。冬七日。夏三日。春秋各五日。初服一合。漸增之。以知為度。令酒氣相續。出指迷方

**續斷湯** 治偏枯少血

當歸三兩 陳皮 芍藥 北細辛各一兩

生乾地黄二兩

右為粗末。每服伍錢。水貳錢。煎至八分。去滓溫服。臍寒多利者。入熟附子壹兩。和前藥。

**補遺** 全生虎骨散 治半身不遂。肌肉乾瘦。名曰偏枯。忌用

**虎骨酒** 治中風偏枯。四肢不隨。一切風痺。拳拳者。

當歸 赤芍藥 續斷 白朮

藥本 虎骨 烏龍肉

為末。每服二錢。酒調下。骨中痛。加生地黄一兩。膩自利者。加天雄半兩。

**虎膠骨酒** 治中風偏枯。四肢不隨。一切風痺。拳拳者。

石斛 石楠葉 防風 虎膠骨

當歸 茵芋葉 杜仲炒 川牛膝

續斷 芎藭 巴戟去心 狗脊去毛

右剉豆大。以絹囊盛。藥用酒一斗。漬藥十日。每服一錢。

溫溫服

○偏風口喎方論第九 九五方

論曰備風口喝者是體虛受風風入於夾口之筋也足陽  
明之筋上夾於口其筋備虛風因虛而乘之使其筋備為  
不調故令口喝僻也。

**防風湯**治卒然口喝斜言語重急四肢如故別無所苦。

防風 芍藥 甘草 一分

右為粗末每服位錢水貳錢煎至壹錢去滓入麝香研  
上法服。

治口眼喝斜

用草麻子七粒去殼細研作餅安在手心  
拍却用銅玉匙搗碎以藥汁浸之即流大不用麻子

**廣濟**

生薑黃汁竹葉  
右相和煎取一升服之  
神方

人參

防己

麻黃

白木

川芎

甘草

黃芩

桂心

附子

防風

生薑

右切以水一斗二升煮取二升分為三服不差復作忌  
海藻松菜桃李生菜葱雀肉猪肉

又千金方

炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服 又方用大  
皂莢五兩去皮子為末以三年大醋調如左喝塗右

喝塗左乾更塗

補遺天麻白芷治卒中風白服喝斜

商正

白及

草烏

大者

僵蚕 七筒

為未用生鱧魚血調成膏傳喝處竟正使洗去

灸法治口喝斜

耳垂下麥粒大艾炷三壯左灸右右灸左

○婦人血風心神驚悸方論第十

夫婦人血風驚悸者是風乘於心故也。心藏神為諸藏之主。若血氣調和則心神安定。若虛損則心神虛弱致風邪乘虛干之。故驚而悸動不定也。其驚悸不止則變恍惚而愛懼也。辨風濕

天麻散治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

聖

天麻

人參

黃連

細辛

酸棗仁治風

遠志

杜仲

細辛

白朮

厚朴

乾薑

右為粗末每服四錢水煎至八分大澤溫服

龍齒治婦人血風上攻心神恍惚服即不安

龍齒

茯神

朱砂

人參

當歸

天麻

犀角

檳榔

防風

生乾地黃

兩

遠志

赤箭各一分

齊香

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓薄酒溫服

朱貫琥珀散治婦人血風

琥珀

沒藥

木香

當歸



二分藥作三分

芍藥 白芷 羌活 乾地黃

延胡索 川芎 各一兩 土瓜根 牡丹皮 各五分

白朮 桂心 各一兩

右為末每服一錢水一錢煎至七分益酒一分其煎少時熱服重者數服效

補遺 治婦人血風身體骨節疼痛心忪恍惚

失血過多心忪不安第十一

酸棗仁 人參 茯苓 芍藥 白朮 桂心 各一兩

治婦人血風身體骨節疼痛心忪恍惚

一物作又

婦人風邪顛狂方論第十二

夫婦人顛狂病者。惟血氣虛弱。風邪所為也。人向於陰。陰之氣而生。而風邪又并於陰。則為顛。入并於陽。則為狂。其與陽有虛有實。隨其虛時。為邪所并。則發也。顛者。不絕。直視仆地。吐涎沫。口喎目急。手足撩戾。無所覺也。夜及乃甦。狂者。少卧不飽。自高賢也。自辨智也。自貴也。妄笑好歌樂。妄行不休。故曰顛狂也。

防風散 治婦人風邪顛狂。或啼泣不止。或歌笑無節。或心神忪懼。或言語失常。

防風 茯神 獨活 人參

遠志 龍齒 葛蒲 石膏

牡蠣略壹 秦光 禹餘糧 桂心略半  
甘草叁分 蛇蛻壹尺炙

右為粗末。每服叁錢。水半。煎半。煎半。分。去滓。溫服。  
又一方

羚羊角壹分 獨活 遠志去心 首蒲去毛

防風各半兩 茯神去木 石膏 麥門冬去心

龍齒別研 白鮮皮各壹兩 人參 生乾地黄各

右為粗末。每服叁錢。水半。煎半。煎半。分。溫服。無時。

素問云。陽厥狂怒。發以鐵落。鐵落。金也。此以金屑。用麻末。鐵

落。曾治一女人。眼目昏。物言。語法。皆。精。衣。直。視。衆。醫。多。用。飲。佐。之。立。愈。又。一。男。子。亦。胃。病。諸。力。用。此。藥。效。然。後。正。用。此。方。一。方。抱。膽。則。無。異。抱。膽。則。內。中。無。餘。其。有。乳。方。

補遺 治諸風緩縱不隨。語言寒澀。痰涎纏唇。

心怔健忘。或發顛狂。

風濕 治婦人風虛。濕冷邪氣入臟。狂言妄語。精神恍惚。

志亂心驚。或顛。直視吐沫。眼口喎斜。方見前中風第一

婦人飛尸血厥方論第十三

夫飛尸者。遊走皮膚。穿藏府。每發刺痛。變作無常。遺尸者。

附骨入肉。攻擊蓋脉。每發不可得近。見尸喪。聞哀哭。便發。

風尸者。滿灌四肢。不知痛之所在。每發昏沉。得風雪。便作。

沉尸者。纏骨結臟。衝心脇。每發然切。遇寒。冷便作。注尸者。

舉身沉重。精神錯雜。常覺昏發。每節氣至。變轉成大惡。皆宜用此方。

忍冬葉數斤 煎黃 冷服如雞子大 日叁服。

長開散  
灌藥法

廢 至肘後方作改事作致

六一神清丹出千金方治中風之要藥治客忤霍亂腹痛

尸注惡風顛狂鬼語蠱毒妖魅癩瘕積聚溫瘧積久百方

不差但是一切惡毒無所不治但近世少得曾青磁石為

難合耳故不錄

亦治此疾方見和劑更不贅錄

治因喪驚憂鬱不煩惱感尸氣而成變動不已似

冷似熱風氣觸則發

雄黃研 朱砂研 苦梗 羌活

當歸 升麻 川烏炮 龍齒別研

犀角屑 白朮 芍藥 鬼箭羽

白殭蚕炒 木香 虎頭骨酥炙 紫蘇子炒

川芎 南星炮 山柰子 陳皮

莽草 枳殼去穢 黃芩 麻黃去根

蜈蚣去頭足 檳榔 全蝎 蘇合

者為細末每服貳錢溫酒調下一日三服

人平居無疾卒忽如死人身不動搖默默不知入目閉不

能開口禁不能言或微知人惡聞人聲但如眩暈移時方

寤此由汗過多血少氣併於血陽獨上而不下氣壅塞而

不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰

冒亦名血厥婦人多有之宜服白微湯倉公散

白微湯方

白微 當歸各壹兩 人參半兩 甘草壹分

右咬咀每服伍錢水貳瓶煎至壹瓶溫服

倉公散治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血便死不知人

及目癢齒脚趾不覺者并諸毒氣等疾

瓜蒂末瓜蒂末有皂用末 梨蘆末

雄黃研

礬石礬石研各

右為末研俱用少許吹入鼻中得嚏氣通便活未嚏再吹以得嚏為度此藥能起死人恐皂莢者為正

補遺補遺治尸厥脉動而無氣氣閉不通靜而若死名

卒厥

石菖蒲去毛為末每用一字內鼻中吹之令入仍以桂末安於舌下

治尸厥奄然死去四肢逆冷不省人事腹中氣壯如雷鳴

煇硝半兩 硫黃壹兩

右細研分三服酒調灌服如人行五里又進一服

白木散治中風身重不能動

白木

當歸 虎骨 烏

右為細末每服二錢溫酒調下城實

煩煎者加生地黃一兩

新刊婦人良方補遺大全卷之三

此方為母  
轉錄食散下有北方按  
牛書以天改虎骨散下有  
北方為母

新刊婦人良方補遺大全卷之四

婦人血風身體骨節疼痛方論第一

凡五方

夫婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調為風冷所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉懸於骨節邪氣與正氣交擊故令疼痛也

① 治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思飲食

川芎 壹兩

赤茯苓

赤芍藥

酸棗仁

桂心

當歸

木香

川牛膝

羌活

細辛

枳殼

去穢炒

甘草

各半兩

右為籠末每服參錢水壹大盞薑棗煎至柒分去滓熱服無時候

② 治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑 酸棗仁炒 生乾地黃 檳榔各

五加皮 防風 赤芍藥 當歸

骨碎補抄去毛 海桐皮 川芎各五分 甘草半兩

右為末每服貳錢溫酒調下

**通靈元**治男子婦人手足痛風不可忍者

白附子 殭蚕各壹兩 抄去絲 全蝎半兩 抄 麝香壹字

右為末煉蜜元如梧子大每服柒圓溫酒下一日三服

**當歸沒藥元**療婦人血風血氣腹脇刺痛筋攣骨痺手足

麻木皮膚癢痒

當歸 五靈脂各壹兩 抄 沒藥半兩

右為末醋糊圓如梧桐子大每服叁拾圓生薑湯空下

**大效虎骨散**治血風走疰疼痛丈夫筋骨疼及打撲傷損

效尤甚者

虎骨附炙 敗龜各壹兩 炙 當歸 桂心

地龍去土 牛膝 漏蘆 威靈仙

玄胡索 自然銅各壹兩 炙

右各等分為末每服貳錢熱酒調下每日一服

**白木散**治中風身體麻痺不仁

白木炒 芍藥 蕪本去苗上 各壹兩 續斷者 烏蛇肉各半兩

當歸酒洗 各壹兩 附炙 虎骨附炙

右為細末每服貳錢溫酒調下藏寒多利者加附子

半兩骨中煩熱者加生地黃壹兩

**補遺蒼耳散**治血風遍身骨節疼痛及頭旋倒地

嫩蒼耳草心不拘多少陰乾為末酒調壹錢時常服

婦人血風白虎歷節走疰方論第二 凡七方

夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫易皮膚卒然掣痛遊走無有常處故名為走疰也加减小續命湯主之

**漏蘆散** 治婦人血風走疰疼痛無有常處

漏蘆 當歸 牛膝各三分 桂心

地龍去土 防風 羌活 白芷

沒藥研 甜瓜子酪半 虎脛骨酥炙 敗龜各二箇兩

右為細末每服貳錢熱酒調下無時候

**四生丸** 治血風骨節疼痛攣舉臂不起行履不得并渾身

麻痺

白僵蚕炒去 地龍去土 白附子生 五靈脂

草烏去毒

右為末以米泔洗如枳椇子大每服一錢茶清送下

或作末酒調半錢亦可

**香酒** 治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蠱蠱書靜

夜劇及一切手足不測疼痛

大八角川烏頭二箇六分 生全蝎一個 生黑豆二粒

生地龍去土 右為細末入麝香一字同研停糯米糊為丸如菽豆大

每服七丸甚者十丸夜臥令萬空溫酒吞下微出冷汗

一身便瘥前奉士云予得此方凡患歷節及不測疼痛

走疰夜痛全夜則發如虫蠱其肌多作

鬼邪治予曰此正歷節病也三服效

**白濁** 治諸肢節疼痛身體瘦弱脚腫加脫頭眩短

氣溫溫欲吐 三四方

一字奉手方作半字

便瘥轉本作立效

病事作風

有出全區要畧

桂心

甘草

石叻咀每服四錢水一錢半生薑五片煎七分去滓空  
心服一法有白木川芎杏仁半夏

附子入湯治風痺節四肢疼痛如錐銀不可忍

附子

乾薑

芍藥

茯苓

人參

甘草

桂心

白木

右叻咀每服四大錢水一錢煎七分去滓食前服一方

去桂用乾地黃二兩

獨活寄生湯

小續命湯

大治白虎歷節痛不可忍  
此方見第一卷  
至外腎痛不可忍及白虎上於膝一二日流於體或如中風

命神作木

補遺精湯治白虎歷節風注四肢疼痛徹骨

羌活

附子

秦艽

桂心

木香

川芎

當歸

川牛膝

桃仁

骨碎補

防風

甘草

右劉散每服四錢水一錢薑五片煎溫服

婦人血風癩瘡痒方論第三

凡八方

治婦人時發遍身瘙癢或赤腫癢疹五心煩熱血風  
致痒與人參荆芥散消風散四物湯加荆芥煎或人參當  
歸散或消風散或消風散或消風散或消風散或消風散



可人服如服皂角圓不退者此凝滯熱甚者宜先服青木  
 香圓三兩服以開氣道却服前藥即效  
 夫婦人體虛為風邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起風  
 癢癢癢者若赤疹者由涼濕折於肌肌中之極熱結成赤癩  
 也得天熱則劇取冷則差白癩者由風氣折於肌中肌中  
 熱熱與風相搏所以為白癩也得天陰雨冷則劇出風中  
 亦劇得晴暖則減着衣暖亦差也脉當浮而洪浮即為風  
 汗即為風風氣相搏則為癩癩身體為痒凡人汗出不可  
 露肌及浴時宜用酒調生側  
 雷外炮制用酒調生側  
 何首烏 防風 白芷 枳殼  
 天麻 僵蚕 胡麻 羌活  
 蔓荆子 各等分  
 右為細末每服貳錢煎茵陳湯調下無時服  
 附子酒 治痛風婦人血風身上癢痒 出張氏方  
 生附子 壹兩 壹錢 皂角刺 貳拾箇 黑豆 壹合  
 右參味細剉分為二處用好酒貳瓶入上件藥慢火燂  
 候乾至半瓶却合作一處密縛泥頭經貳宿每服壹錢  
 溫服無時候未効又服  
 治女人風痒癩癩不止 聖惠方  
 蒼耳花葉子 各等分  
 右為細末用豆淋酒調下二錢

何

何首烏 防風 白芷 枳殼  
 天麻 僵蚕 胡麻 羌活  
 蔓荆子 各等分  
 右為細末每服貳錢煎茵陳湯調下無時服  
 附子酒 治痛風婦人血風身上癢痒 出張氏方  
 生附子 壹兩 壹錢 皂角刺 貳拾箇 黑豆 壹合  
 右參味細剉分為二處用好酒貳瓶入上件藥慢火燂  
 候乾至半瓶却合作一處密縛泥頭經貳宿每服壹錢  
 溫服無時候未効又服  
 治女人風痒癩癩不止 聖惠方  
 蒼耳花葉子 各等分  
 右為細末用豆淋酒調下二錢

治癩癧

白蜜多不以好酒調下已試有效

治皮膚有風熱遍身生癩癧方初實世

牛蒡子

水浸壹兩半

浮萍

煮湯

右為細末每服貳錢薄荷湯調下日貳服

又治風氣客於皮膚搔之不已方

蟬蛻

洗

大葉薄荷

右等分為細末無時溫酒調下方寸匕

又方

露蜂房

洗過蜜

蛇蛻

洗

右為細末溫酒調下壹錢日二三服

補遺烏刺圓

治諸風緩縱言語蹇澀遍身頑麻皮膚癢癢

又治婦人血風頭眩

川烏

洗 荆芥穗

右為末醋煮麪糊為丸梧子大每服一丸

消風散治証同上

婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四

夫婦人風眩是體虛受風風入於腦也

注於目其血氣與脉并上屬於腦也

急故令眩也其眩不止風邪甚者變成痼疾也

養命丹

治虛風頭旋吐涎不已蓋此藥升降除濕補接真

氣非止頭旋而已

黑鉛

水銀

硫黃

朱砂

右用建瓯壺集火上鎔鉛成汁次下水銀用柳枝子打

停取下歇少時入真味打停候冷取下研為粉少許  
軟飯元如綠豆大每服叁拾圓棗湯吞下空心食前日  
貳服

鈞藤散治肝厥頭暈清頭目。出本事方

鈞藤

陳皮

半夏

麥門冬去心

茯苓

茯苓

人參去芦

甘菊花

防風各半兩

甘草壹分

石膏壹兩

右咬咀每服肆錢水壹瓊半生薑柒片煎至捌分去滓

熱服

秦問云頭痛頭眩下虛上實過在足少陰巨陽其  
勝厥陰其則在肝下重若腎虛也故腎厥則頭痛上虛  
者肝虛也故肝虛則頭暈若腎虛也故腎厥則頭痛上虛  
不定眩暈目昏皆量之狀故

斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事

蒼耳

喝起草取其嫩心不以多少陰乾為末以常酒服  
一大錢七無時候其功大効服之多連服蓋善通頂

雙刺子散治婦人風眩頭目昏悶煩疼言語謇澁痰逆不  
下飲食

雙刺子

防風

羌活

川芎

羚羊角屑

枳殼

前胡

石膏

赤茯苓

麻黃去根節

荆芥穗各叁分

北細辛

甘菊花

白芷

藁本

旋復花

甘草各半兩

右為粗末每服肆錢薑叁片水壹瓊煎柒分去滓溫服

無時候

四神散治婦人血風眩暈頭痛

菊花

當歸

旋復花

荆芥穗各等分

右為細末每服壹錢水壹瓖煎白參寸茶末壹錢煎至柒分通口服良久去枕仰臥少時

治風眩頭暈

小川芎

山藥

白茯苓

甘菊花不與菊

人參各半兩山藥黃肉壹兩

右為細末無時候酒調貳錢日叁服

治女人頭旋即天動地轉名曰心眩非血風也見普濟方

膽子禁言房細研用胡椒劑子壹箇拌停放版子上按

平一指厚以篋子勒成如散子大塊不須界斷於瓦上煨乾每服一散子大為末煎燈心竹茹湯調下

三五七散

聞人聲自旋運轉耳內蟬鳴

附子

細辛

乾薑

山藥

防風

山藥各七

右為末每服二錢溫酒調下

婦人血風頭痛方論第五有破頭痛附九九方

許叔微云婦人患頭風者十居其半每發必持腰如在車船上蓋因血虛肝有風邪襲之爾予嘗處此方以授人比

他藥效而捷

川芎壹兩

當歸叁分

羌活

旋復花

華陰細辛

蔓荊子

防風

石膏

藥本

荆芥穗

半夏麩

乾地黄

甘草各半兩

右咬咀每服參錢水壹瓊薑參片煎至柒分去滓溫服  
**七生元**治男子婦人八般頭風及一切頭痛痰厥腎厥飲  
厥傷寒傷風頭痛不可忍者並皆治療治明神先生方

川烏

草烏

南星生去皮並半夏去滑

川芎

石膏

白芷並生用

右爲細末研韭菜自然汁圓如梧子大每服柒負加至  
拾負嚼生葱茶送下無效加丸制辛等分全蠲戒半爲

**聖手湯**治狀如前但發熱者不可服

生附子去皮生烏頭法去脂附生

乾薑

北細辛

川芎各壹兩甘草叁分

治神效

三四次各等分

聖手湯治男女一切虛弱  
風寒骨痛任傷正勁痲痺連筋  
吐逆惡心日睡身重耳鳴  
耳聾口苦舌燥心煩  
神志不清手足麻木  
筋骨痠痛腰膝痠軟  
頭暈眼花心驚肉跳  
氣短喘促食慾不振  
精神萎靡形體消瘦  
遺精早洩白濁帶下  
婦女經閉不通  
產後血暈不止  
一切無名腫毒

右咬咀每服肆錢水貳瓊薑柒片茶牙少許煎至陸分  
去滓食前溫服中脘素有寒者不用茶牙

**局方如聖新方**加北細辛如半夏數自合服之見効甚速

若頭痛筋攣骨重少氣噓噫腹滿時驚不嗜臥效嗽煩寃  
其脉舉之則弦按之石堅由腎氣不足而內著其氣逆而  
上行謂之腎厥頭痛宜玉真圓與硫黃圓

**玉真圓方**

石膏

半夏

硫黃

硝石

右研令停生薑自然汁打糊圓如梧桐子大生薑湯下  
參拾圓一方無半夏

**黃圓**治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不治服此  
除根

硝石 壹兩 硫黃 貳兩

右研令極細滴水負如指頭大空心蠟茶清嚙下。白附子散方云中暑者以冰水服之下咽即洒然治傷冷以艾湯若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒中於骨髓留而不去腦為髓海故頭痛齒亦痛謂之破逆頭痛宜白附子散灸曲鬢穴此穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右

**白附子散方**

麻黃根不去 烏頭炮去 南星炮 白附子炮壹

全蝎炒伍枚 辰砂研壹分 麝香壹錢 白芷壹分

右為細末酒調壹字服訖去渣服少時

俗傳王荆公治頭暈方云是禁中秘方用生虜服汁即

治頭痛灸

壹肆肆七

見蘇沈二書

一規般仰注。注在右。或兩鼻皆注亦可。數十年患皆一注而愈。東坡云。荆公與僕言。已愈數人。此方自後果將仕。是有効。

治頭風痛不可忍者

硝石 人中白 腦子 等分

右研令極細用壹字搗入鼻中。

**補遺** 治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛

薄荷 川芎 荆芥 羌活

白芷 防風 甘草 各二兩 細辛 一兩

右為末每服二錢食後茶清調下

都梁園治風吹項背頭目昏眩以及腦痛產前產後傷風

一切頭痛 方見下

項筋強痛方論第六

凡五方

此一卷論項筋拘攣強痛每得斯疾療之似易而實難然方冊中所載亦少縱有言之議論亦略以僕考之然既有斯疾必有是方何古人言此疾證尚且略又無的然之論詳之必是挾諸疾而生所以絕無專門之因暇日披古名方以備檢閱然自明學識淺鄙未必全備博學之士見其遺缺僅能補而完之不亦宜乎咸淳元年上元日藥隱老人書于存心堂

夫頸項之處乃足太陽膀胱之經又許太學云是足少陰腎之經蓋腎與膀胱為表裏故也以感外邪論之則有太陽經先因感風又感寒濕致令外證發熱惡寒與傷寒相以頸項強急腰身反張如中風狀瘈瘲口禁其身體凡

三五七散  
二州  
旺字

古人以強直為症其狀以遲弦細新產而重多汗此中風亦有此證已上非載第二卷第一論中言之其詳不復贅錄又有挫枕轉項不得者與三五七散同治風散仍與急風散搽項上若因被風吹頭目昏眩太陽并腦俱痛項背筋脉拘急可與蠲附散同治許太學治項筋強痛不可轉側者以木瓜煎

追風散治年深日近偏正頭疼又治肝藏久虛血氣衰弱

風毒之氣上攻頭痛頭眩目暈心忪煩熱百節酸疼腦昏

目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若蟲行

及一切頭風兼療婦人血風攻注頭目昏痛皆治之

川烏去尖 防風去芦 石膏煨 川芎

甘草炙 荆芥穗 白朮各等分

醫方考

項筋強痛方論第六

凡五方

此一卷論項筋拘攣強痛。每得斯疾。療之似易而實難。然方冊中所載亦少。縱有言之。議論亦略。以僕考之。然既有斯疾。必有是方。何古人言此疾。證尚且略。又無的然之論。詳之。必是挾諸疾而生。所以絕無專門。亦因暇日。據古名方。以備檢閱。然自明學識淺鄙。未必全備。博學之士。見其遺缺。儻能補而完之。不亦宜乎。咸淳元年上元日。藥隱老人書于存心堂。

夫頸項之處。乃足太陽膀胱之經。又許太學云。是足少陰腎之經。蓋腎與膀胱為表裏故也。以感外邪論之。則有太陽經。先因感風。又感寒濕。致令外溢發熱惡寒。與傷寒相似。頸項強急。腰身反張。如中風狀。瘰癧口噤。其身體凡

三五七散  
項筋

古人以強直為瘕。其脈必遲弦細。新產而重者。中風亦有此證。已上並載第二卷第一論中。言之甚詳。不復贅錄。又有挫枕轉項不得者。與三五七散。初起追風散。仍與急風散。搽項上。若因被風吹。頭目昏眩。太陽并腦俱痛。項背筋脉拘急。可與蠲附散。鄒梁真。許太學治項筋強痛。不可轉側者。以木瓜煎。

追風散治年深日近。偏正頭疼。又治肝藏久虛。血氣衰弱。風毒之氣。上攻頭痛。頭眩目暈。心忪煩熱。百節酸疼。腦昏目痛。鼻塞聲重。項背拘急。皮膚瘙癢。面上遊風。狀若蟲行。及一切頭風。兼瘰癧婦人血風攻疰。頭目昏痛。皆治之。

- 川烏去尖
- 防風去芦
- 石膏煨
- 川芎
- 甘草炙
- 荆芥穗
- 白僵蚕炒大

皆上方有並字



石方無科

風下局方有死字亦正有是

聖濟

天南星炮

羌活

天麻

地龍

白附子炮

全蝎去尾針

白芷各半兩

草烏炮去皮

沒藥研

乳香研

雄黃研各一分

右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及臨卧服常服清頭目利咽鼻消風化痰

急風散方

草烏頭三兩壹半燒存性於醋內蒸令冷餘壹半生用

生黑豆壹分兩味壹分兩味

丹砂壹兩

麝香壹分

右為細末研令停酒調塗痛處

喝附散治一切風邪頭痛夾腦風氣痰涎壅盛嘔逆惡心口吐清水暗風旋暈眼見黑花牙關緊急口眼喎邪面目暈動頭項拘急脊背引疼耳痒目昏四肢麻木及沐頭浴

出感風邪頭目昏痛兩太陽穴疼遠年頭風如感風作藥下發服藥無效者並皆治之

附子炮去

川烏炮去

麻黃去節

僵蚕炒

南星

防風各叁錢

雄黃

朱砂

全蝎各錢半

白芷

藁本各半兩

右為細末每服半錢葱茶調下食後服孕婦不可服京城之醫用此藥兼嚼如聖餅子治眼生眵翳眵眵不明羞明多淚見物不明有效

都梁散方

香白芷

正驪土大塊白用沸湯洗香者止凡以細末去煉蜜負如

彈子大每服一負多用荆芥點搗茶細嚼下食後服

服只乾嚼下亦可都無所忌此藥大治諸風眩暈

此藥專治諸風眩暈

人產前產後下傷風邪頭目昏重及血風頭痛服之  
令人目明凡浴沐後服一二粒尤佳暴寒乍暖神思  
不清傷寒頭目昏暈並宜服之。

**木瓜煎方**

宣木瓜一個取蓋去核

沒藥二兩

乳香壹分

右貳味內木瓜中用蓋子合了以簽定之飯上蒸三四

次爛研成膏子每服三匙生地黄汁半瓊無灰上醞二

瓊和之用八分瓊熱暖化膏子服有人患此病自汗後

患必先從足起經言上一經終各骨節痛足因少陰之

陽中自足至頭大抵筋者肝之合也白中至黃昏天之

之時故靈璧畢法云陽中之陰肺也自離至氣陰壯陽

藏受陰氣故發於是時烏藥順氣散多加羌活木瓜獨活專治頸項強急筋

分下李有二字

頸項作頸事作項

乾邦本作乾是之集作作松

神本無字故發作傷也

按神作神

痛方見前

**婦人腰痛方論第七**

凡二方

夫腎主於腰女人腎臟繫於胞絡若腎氣虛弱外感寒

內傷七情皆致腰痛古方亦有五種之說如風濕痛宜小

續命湯加桃仁杜仲煎服脾胃氣液及寒濕腰痛宜五積

散加桃仁如虛損及五種腰痛者青蠶元神應元腦方並

皆可用也如氣滯腰痛如神保真黑牽牛茴香搗核必有

功也。

**如神湯治男子婦人腰痛**

陳總領方

延胡索

當歸

桂心

右為末溫酒調下一錢甚者不過數服方得之於

散

麻黃湯

新用老藥實具是

李重元下字

按千金方醫斷宋臣寄生脚註  
去字經論用經斷本春誤作  
入方中宜刪去又按本方有日字  
本各漏之

獨活寄生湯 夫腰痛者皆由腎氣虛弱卧冷濕地當風所  
得不時速流喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱痿重或腰痛  
拘攣脚重痺宜急服之

獨活 三兩

桑寄生

續斷

杜仲

北細辛

川牛膝

秦龜

茯苓

白芍藥

桂心

川芎

防風

人參

熟地黃

當歸 各二兩

右咬咀每服三錢水一錢煎至七分去滓溫服空心氣  
虛下利除地黃并治新產腹痛不得轉動及腰脚攣痛  
痺弱不得屈伸此藥最能除風消血肘後有附子壹枚  
無寄生人參當歸粉草近人將治歷節風脚氣流注筋  
脈痛治腰痛神效閉控亦良

六胡索

杜仲

官桂

羌活

芍藥

等分為末酒調下

又方橘核炒香研酒除渣下青木香  
又方天羅布瓜子仁炒焦搗酒熱服留身白炒熟封瓶取效  
婦人腰脚疼痛方論第八

夫腎主於腰脚女人腎氣繫於胞絡若勞傷腎氣虛而  
風冷客於胞絡邪氣與負氣交爭故令腰脚疼痛也

酸棗仁治婦人血氣虛腰痛頭目昏悶食少

川芎

川牛膝

當歸 各二分 羌活

海桐皮

桂心

防風

木香

川續斷

杜仲

附子炮

草薢

粉草 各半兩

右咬咀每服四錢水壹盞半薑參片煎七分去滓溫

骨碎補前浴婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇拘急肢節

骨碎補炒 萆薢 川牛膝 桃仁

海桐皮 當歸 桂心 檳榔各壹兩

赤芍藥 附子 川芎各叁分 枳殼半兩

右為粗末每服三錢水壹大錢置三片棗一箇煎至七

分去滓食前熱服

補遺 養骨散治腰脚筋骨間疼痛不能步履其効如神

蒼朮 一兩 乾蝎 三錢 天麻 草烏頭去

黑附子 炮去皮

右為末如腎氣用烏豆淋酒調服一大錢藥氣所至麻

痺少時隨愈如骨節中痛用胡桃酒下孕婦勿服

婦人脚氣 凡十一方

凡頭痛身熱肢節痛大便祕或嘔逆而脚氣者脚氣也

輕者可與香蘇散加木瓜攪體生薑煎服然後隨證治之

要知有脚氣之人先從脚起或先緩弱疼痛或行起忽倒

或兩脛腫滿或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁或

有無或舉體轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或得清氣或

遍體酸痛皆脚氣候候候候候候候候候候候候候候

頑弱名緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必冷小續命湯

主之煎成入生薑 暑中三陰所患必熱小續命湯去附子

減桂一半主之犬煩躁者紫雪最良若無紫雪以白合薄

苛煎冷水調服極妙大便祕者脾約真麻仁真三和散主

之防並用中仍針灸為佳服補藥與湯淋洗皆醫之大

次之字有無之字與此

聖惠方婦人脚氣論

夫婦人脚氣與丈夫不同。男子則腎臟虛弱為風濕所乘。女子以胞絡氣虛為風毒所搏。是以胞絡屬於腎也。腎主於腰脚。又肝脾腎三臟經絡起於十足指。若臟腑虛損。則風邪先客於脚。從下而上。動於氣。故名脚氣也。此皆由體虛。或當風取涼。或久坐卑濕。或產後勞損。或恚怒傷肝。心氣滯。致令月候不通。因其虛傷。風毒搏於肌骨。則令皮膚不仁。筋骨抽痛。五緩不遂。六急拘攣等。或即冷疼。或即腫痛。或兩脚痺弱。或舉體轉筋。目眩心煩。身食即嘔。精神昏憒。肢節煩疼。小便赤黃。大便秘澀。並皆其證也。其婦人脚氣治之。與丈夫不同者。以其氣血不調。懷胎難產。崩傷之異。是以清澄痰。真婦節。凡與妻妾殊別。即其義也。凡婦人有此症。痰者必先清之。

聖惠

同

治脚氣。清血。凡月候不通。

川牛膝

荊羊角

檳榔

人黃

芒硝

黃芩

芍藥

杜仲

杜仲

赤芍藥

甘草

桃仁

右為粗末。每服三大錢。水壹碗。煎至七分。去滓。溫服。利下惡物為度。亦要引其強弱用之。

大腹皮。治婦人風毒脚氣。肢節煩疼。心神癡悶。

大腹皮

紫蘇

木通

桑白皮

羌活

荆芥

赤芍藥

青皮

木瓜

獨活

枳殼

右咬咀。每服四錢。水壹碗。薑伍片。葱白七寸。煎至七分。去滓。空心溫服。

去滓。空心溫服。

半夏散治婦人脚氣發動心腹脹滿飲食不下嘔逆不止

半夏

陳皮

木通

人參

大腹皮

桂心

各三分

檳榔

紫蘇 各兩半

右咬咀每服肆錢水壹錢半。薑棗二片煎藥分去滓溫服。

獨活散治婦人脚氣勿發衝心悶亂四肢煩疼有熱者

犀角屑

木香

紫蘇

赤茯苓

檳榔 各壹兩

赤芍藥

紅花 各壹分

右咬咀每服肆錢水壹錢煎至五分去滓溫服。

木香散治婦人脚氣卒發衝心悶亂

木香

郁李仁

赤芍藥

大腹皮

紫雪 各壹兩

桂心

檳榔

茯苓

右咬咀每服三錢水壹錢煎至五分去滓溫服。

治婦人脚氣衝心悶亂不識人宜服此散。

紫蘇

松節

吳茱萸

檳榔

乾木瓜

陳皮

右咬咀每服四錢水壹錢煎至一半入童子小便二合。

再煎三沸溫服。

紫蘇散治婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡不思飲食脚重

虛腫

紫蘇

木通

桑白皮

茴香根

枳殼

羌活

獨活

荆芥穗

木瓜

青皮

甘草

大腹子

右咬咀每服三錢水一瓊姜三片葱白一莖煎至七分去滓溫服。

**桑白皮散** 治婦人脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急坐卧不得。

桑白皮 郁李仁各一 赤茯苓二兩 木香

防已 大腹皮各半 紫蘇子 木通

檳榔 青皮 各三分

右咬咀每服三錢水一瓊薑三片煎至七分去滓溫服。

**黃芩散** 治婦人脚氣緩弱及頑痺腫滿心下急大便澀。

黃芩 防風 猪苓 川芎

防已 檳榔 郁李仁 大麻仁各一

桑白皮二兩 枳實三分 甘草半兩 羚羊角屑兩

行步艱難。吐酸水。或上七分。去滓。放溫服。

**白豆蔻** 治男子婦人虛弱。夜多盜汗。不進飲食。四肢羸瘦。骨立拘攣。脚痛不能行。

黃耆 厚朴 益智仁 藿香

白朮 白扁豆 陳皮各一兩 半夏

白茯苓 人參 白豆蔻仁 天台烏藥

甘草各半兩 京南芍藥 檀香 沉香

右為細末。每服三錢。水一瓊薑三片。棗子一箇。煎至七分。溫服。

自後諸證退。只有脚攣痛不能行。以蒼朮元治之效。此藥

大治乾濕脚氣。筋脉拘攣疼痛不能行履。兼補下部。

蒼朮元方

乳香

沒藥各二錢

川牛膝

青鹽各半

熟艾四錢

川烏三錢

全蝎一錢炒

右除研藥為細末。入研藥合傳。以木瓜一箇大者。切一  
 頭留作蓋。去穢入上件藥於木瓜內。將蓋蓋定。安於瓜  
 於黑豆中。蒸令極爛。取出去皮。連藥研成膏。却入生薑  
 木末。詳令得所。真如梧桐子大。每服五十丸。空心用木  
 瓜湯下。此藥專治。一切骨節疼痛。手足麻木。筋骨不  
 舒。腰膝痠痛。頭暈目眩。耳鳴眼花。精神不振。飲食不  
 進。大便燥結。可與七寶丹神功。真上聖藥。宜三和散之。服之  
 諸方並見。

補遺 治脚氣 細刺無毒 可問此特効

土烏藥不可洗用 麈布揩淨 以瓦片刮下 筒收 欲  
 以好酒一升浸一宿 次日空心 盪熱去香 多服為妙

新刊婦人良方補遺大全卷之四



新刊婦人良方精論卷之五

勞瘵叙論第一

九十一

夫骨蒸瘵癯復連尸并勞瘵虫瘵黃瘵熱瘵冷瘵瘵在鬼  
 疰等皆曰傳尸以瘵者江也病自江下以前人相傳故  
 曰瘵其變有二十二種或三十六種或九十九種大略令  
 人寒熱盜汗夢遺鬼交遺泄白濁髮乾而落或腹中有塊  
 或腦後兩邊有小結核連復數箇或聚或散沈沈默默咳  
 嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或復下利瘵瘦困乏不  
 自勝持積月累年以至於死死後乃瘵身傍人乃至城門  
 者是也更有蠶尸道尸寒尸喪尸尸注等謂之五尸及大  
 小附着等蠶尸不知其所苦無處不聚乃挾諸鬼邪而害  
 人以三因致之內非七情所性外非四氣所襲雖若鬼乎

不內外因。奈其證多端。傳變難推。則故自古今。愈此病者。十不得一。所謂裡骨煩肝天靈蓋銅鑿鼻。徒有其說。未嘗見效。唯膏肓俞。棗氏丸。船如爐。若聞早。必之可。否幾半。晚亦不濟也。病者憎寒發熱。自汗而白。目乾口苦。精神不守。恐畏不能獨卧。其傳在肝。病者憎寒發熱。面黑鼻燥。怒忽喜忘。大便苦難。或復泄瀉。口乾。其傳在心。病者憎寒發熱。面青唇黃。舌本強不能嚥。飲食無味。四肢羸瘦。吐涎沫。其傳在脾。病者憎寒發熱。面赤鼻白。乾燥。毛折。咳嗽喘急。時吐白涎。或有血線。其傳在肺。病者憎寒發熱。面黃耳輪焦枯。筋骨痠痛。小便白濁。遺瀉。骨痛。其傳在腎。

二十四種氣病論

所謂勞氣者。一曰。勞氣。二曰。勞氣。三曰。勞氣。四曰。勞氣。五曰。勞氣。六曰。勞氣。七曰。勞氣。八曰。勞氣。九曰。勞氣。十曰。勞氣。十一曰。勞氣。十二曰。勞氣。十三曰。勞氣。十四曰。勞氣。十五曰。勞氣。十六曰。勞氣。十七曰。勞氣。十八曰。勞氣。十九曰。勞氣。二十曰。勞氣。二十一曰。勞氣。二十二曰。勞氣。二十三曰。勞氣。二十四曰。勞氣。二十五曰。勞氣。二十六曰。勞氣。二十七曰。勞氣。二十八曰。勞氣。二十九曰。勞氣。三十曰。勞氣。三十一曰。勞氣。三十二曰。勞氣。三十三曰。勞氣。三十四曰。勞氣。三十五曰。勞氣。三十六曰。勞氣。三十七曰。勞氣。三十八曰。勞氣。三十九曰。勞氣。四十曰。勞氣。四十一曰。勞氣。四十二曰。勞氣。四十三曰。勞氣。四十四曰。勞氣。四十五曰。勞氣。四十六曰。勞氣。四十七曰。勞氣。四十八曰。勞氣。四十九曰。勞氣。五十曰。勞氣。五十一曰。勞氣。五十二曰。勞氣。五十三曰。勞氣。五十四曰。勞氣。五十五曰。勞氣。五十六曰。勞氣。五十七曰。勞氣。五十八曰。勞氣。五十九曰。勞氣。六十曰。勞氣。六十一曰。勞氣。六十二曰。勞氣。六十三曰。勞氣。六十四曰。勞氣。六十五曰。勞氣。六十六曰。勞氣。六十七曰。勞氣。六十八曰。勞氣。六十九曰。勞氣。七十曰。勞氣。七十一曰。勞氣。七十二曰。勞氣。七十三曰。勞氣。七十四曰。勞氣。七十五曰。勞氣。七十六曰。勞氣。七十七曰。勞氣。七十八曰。勞氣。七十九曰。勞氣。八十曰。勞氣。八十一曰。勞氣。八十二曰。勞氣。八十三曰。勞氣。八十四曰。勞氣。八十五曰。勞氣。八十六曰。勞氣。八十七曰。勞氣。八十八曰。勞氣。八十九曰。勞氣。九十曰。勞氣。九十一曰。勞氣。九十二曰。勞氣。九十三曰。勞氣。九十四曰。勞氣。九十五曰。勞氣。九十六曰。勞氣。九十七曰。勞氣。九十八曰。勞氣。九十九曰。勞氣。一百曰。勞氣。

痲正字通曰先博音麻文示

口部作右

痲正字通曰先博音麻文示

眼昏淚下時復眩暈躁怒不常其蒸在肝。舌焦黑氣短  
煩悶洒洒浙浙其蒸在心。唇乾口瘡胃腹脹悶畏寒不  
食其蒸在脾。咳嗽喘滿咯痰吐血聲嘶音遠其蒸在肺。  
耳輪焦枯脚氣酸疼起若不得其蒸在腎。情想不寧無  
故泄精白物綿綿而下其蒸在右腎。心主胞絡心膈噎  
塞攻擊疼痛使仰煩勞其蒸在馬諸論雖曰不同其根多  
有虫齧其心肺治之不可不絕其根也。  
神效藥法取傳勞勞車服此藥須先擇良日焚香禱祝令  
病人設榻面向福德方服即有神效不可使病人知其藥  
味及子細。

青桑皮 楊柳枝 梅枝 桃枝  
青蒿 青蒿 青蒿 青蒿

真寶香

阿膠

右樹木除阿膠外用童子小便渣汁半盞取藥杜及一  
半去滓將藥汁化阿膠半盞十數沸去滓微溫自飲或  
調下作藥末。

朱砂 小檳榔 麝香

右參味研令極細分為貳服用前湯使調上五更初壹  
服三點兩壹服辰時開取下虫遂絕根本若見虫色白  
者此病必差若黑色則已傳入腎經不可救也服藥後  
只以淡粥補之並不動元氣効驗無比切須秘之世傳  
勞虫有靈輕易傳之則傷醫者此說殆醫者秘惜其方  
不可以授人耳要須密重之則無洩慢天機乃起死還  
生功同造化鬼神護助自有靈効大凡傳屍勞者必須

先服此一藥後拾伍方隨證治不可以既用藥調治三  
五箇月再服此取重藥則永除根本如取下虫色已黑  
縱服後藥亦無補也然則能使不傳它人  
治心胃精氣作胃痺引兩脇痛昏悶不收音聲不清虛熱  
上癰作鼻衄方

桑白皮三分 枳殼 木通 子芩

生乾地黄 白芍藥 甘草各半兩

右為粗末每服參文重水棧半煎至柒分去滓溫服後  
治伏痰血在心肺時作衄心胃微背痛方

白芍藥 牡丹皮各半兩 生犀屑半兩 生地黄參兩

右吹咀每服半兩水壹大棧煎至七八分去滓溫服  
調榮衛消痰血山嵐瘴氣治痰嗽消痰血方

此藥難得在治上下諸方  
並同

川當歸 牡蠣半斤 白芍藥 甘草

木通 麥門冬 甘草

生乾地黄壹兩

右吹咀每服參錢水壹棧薑參片煎至七八分去滓溫服

治虛熱昏冒倦怠心下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉半斤 黃耆半兩 甘草 川芎各半兩

防風壹兩 苦梗半兩 荆芥穗壹兩 甘菊花壹分

真腦子半錢 生乾地黄半兩

右為細末煉蜜圓如彈子大每服壹圓用麥門冬去心

煎湯嚼下又治肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不得喘

嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前子壹分

每服壹圓煎桑枝湯嚼下日可六七服桑枝剉炒香每

用水三錢煎至壹錢去滓下藥

治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此病因失血榮衛損也

**防風湯**

黃耆 壹兩

白芍藥

防風 各叁分

甘草 半兩

當歸

生乾地黄 各叁分

右咬咀每服叁錢水壹錢薑叁片棗壹箇煎至七分去

滓溫服食前服

治勞嗽 **溫命散**

甘草

黃芩

桑白皮

防風 各壹兩

杏仁 貳拾七粒

粒制

人參 壹兩

茯苓 各半兩

麥門冬 壹分

以前五味用米泔浸壹宿曬乾次入人參茯苓麥門冬  
參味同為細末每服壹錢水壹錢薑壹片大煎至捌分

食後溫服

治勞嗽有 **黑膏** 極妙方曰

治心氣不足解勞倦益血

苦梗

甘草

黃耆

人參 壹兩

麥門冬 兩

冬

青皮 半兩

右為末每服貳錢水壹錢煎至七分溫服

治胃痺 **瓜樓湯**

枳殼 肆箇

厚朴

薤白 各壹兩

瓜樓 壹箇

桂枝 壹兩

有熱

右咬咀水七升煎取四升去滓溫服

涼心肺解勞除熱使榮衛順血不絕 **守命散**

黃耆 壹兩

白芍藥

子芩

人參

白茯苓

麥門冬

苦梗

生乾地黄

右為粗末。先用竹葉一握。小麥七十粒。水三瓊。薑三片。煎至水一瓊半。入藥末。參錢重。煎至七分。去滓溫服。

治積氣堅硬作氣喘。身自發引背痛方。

白芍藥

鱉甲

枳殼

北柴胡

甘草

赤茯苓

右咬咀。每服錢。水壹大盞。薑三片。棗壹箇。煎至七八分。去滓溫服。

治伏連傳注。腹中有堅硬積氣。壅心胃作痺痛。引脇背痛。腕膈滿悶方。

皂角

天門冬

巴豆

不蛀皂角

附炙各

葉子雄黃

去白

右為細末。每服錢。水壹大盞。煎至七八分。去滓溫服。魚山猪鹿麋。

出聲音方

訶子

木通

甘草

右咬咀。用水灸升。煎至升半。入生地黃汁壹合。再煎數沸。放溫。分六服。食後。日作半料。

治咽喉痛方

百藥煎

去黑馬砂

甘草

生白礬

右四味。為細末。每服一錢。食後。飯調。細細呷。治肺間邪氣。胸中積血。作痛失音。含化圖方。

蛤蚧

訶子

阿膠

麥門冬

方名釋本如左

湯藥作湯非

能印... 罐

通錄律切

北細辛 甘草 生乾地黄各半兩

右為細末煉蜜為圓如雞頭子太食後含化壹圓。已上諸方辰州李俸畢通錄示云傳之於五羊大帥方侍郎

治療疾得効方。圓圓。治勞嗽。一切勞瘵虛損骨蒸等疾。

河車壹枚... 雲白茯苓... 右為細末。麪糊為丸如梧桐子大。以少許香末為衣。每服三五十圓。米飲溫酒鹽湯送下。空心服。嗽者。五味

服三五十圓。米飲溫酒鹽湯送下。空心服。嗽者。五味

子湯下。

又方。治肌瘦咯血肺痿等疾。

蛤蚧 人參 甘草

知母 貝母 杏仁 枇杷葉

鹿角膠 粉外

右各一兩。依方事治。淨秤為末。每服三錢。水一錢。入桑白皮煎至八分。溫服。日三夜貳。

治勞嗽補肺湯

桑白皮 熟地黄 人參 紫苑

黃耆 川五味子

右為細末。每服一錢。水一錢。煎至七分。入蜜少許。食後

溫服。

又四君子湯加秦艽黃蠟煎服尤妙

此乃安傳之仲弟愛救人其驗服藥止可食淡菜化歸肉仍須先煎熱肉去元汁再白湯熱者仍思房勞切生冷魚腥鹹毒醃藏等物无不痊愈修合藥及煎時忌生人考子婦人雞犬狗畜見仍勿令病人知用藥味大有功效

治傳尸出汗取蜚辟邪藥正膏

鼈甲醋炙 青蒿 淡豉三十粒 葱白兩莖

安息香研 分 挑柳桑枝各 桃仁四十九粒 天靈芝一片

右十味。隔夜以水一升浸至五更煎至半升。再以童便半升同煎取四合。又用檳榔一箇為末。麝香一錢。將所煎藥去滓調下。至日高二丈時。放溫頓服。以衣覆出。汗審看十指汗出如藕絲。五色臭穢。汗出後仍瀉下。其狀惡物盡。其者旬日再服。永効。

治骨蒸勞。唇頰赤。氣粗。口乾。身壯熱。或多虛汗。

大腸澁秘。小便赤黃。飲食全少。出神效

青蒿 鼈甲 北柴胡 木香

生乾地黄各兩 青皮半兩 宣黃連一兩

右為末。以猪肚一箇洗淨。入藥在內繫定。蒸令極爛。研如泥。為真如綠豆大。湯下拾伍元。空心日三服。忌熱炙毒物。

補遺阿膠圓治勞嗽并嗽血唾血咯血

阿膠炒 生地黄 卷栢葉 山藥炒

大薊根 五味子 雞蘇各一兩 栢子仁炒

人參 防風 麥門冬去心 各

右為末。煉蜜圓如彈子大。每一圓細嚼。麥門冬湯或小



麥濃煎湯嚥下

**神授散**治傳尸勞氣殺蟲

川椒貳斤去核并合口者炒為末每一錢空心米飲調下。雖痺悶少頃如不能禁以酒糊丸梧子大空心日服三五十九米飲下服盡見效。

**蘇合香圓**治傳尸骨蒸勞瘵殭殭肺痿疰疰鬼氣心痛

方在

婦人骨蒸勞方論第二

九十五方

夫骨蒸勞者由熱毒氣附骨故謂之骨蒸也亦曰傳尸亦謂殭殭亦稱復連亦名無辜。丈夫以痿癰為根女人以血氣為本無問少長多染此病內既傷於臟腑外則損於肌膚日久不痊遂致羸瘦因服冷藥過度則傷於脾脾氣既

殭於切切帶天計切極困

此方在蘇合香圓中

衰而傳尸臟腑初受病或服攻伐藥加減劑助肉瘦瘠轉增瘵黃四肢無力飲食少味脾既受病及傳於心及傳於肺時時盜汗體察冷及夢見交信等症皆由受病傳於心也既受病往往於心或喜或悲或驚或恐或怒或

朱下熱下寒神氣不安心既受病及傳於肺肺既受病曾滿短氣咳嗽多唾皮膚甲錯狀如鱗片肺既受病及傳於

肝肝既受病兩目昏暗脇下妨痛不欲見人常懷忿怒五臟既病漸漸羸瘦即難療也

**天靈蓋散**治婦人骨蒸勞四肢無力每至晚間即執兩頰

紅色不食飲不下心神煩躁

**天靈蓋** 蘇合香 安息香 地骨皮 當歸

山梔子仁 人參 去心 貝母 去心 黃耆

天靈蓋散

蘇合香

安息香

地骨皮

當歸

聖惠作連轉高

桃仁去皮尖及黃 檳榔各乙

生乾地黄 赤茯苓

右為粗末。以童子小便一大椀。桃柳枝各七寸。薑五

葱白五寸。藥四錢。煎至七分。去滓。溫服。

**類用** 治婦人骨蒸勞熱。體瘦煩疼。不欲飲食。

獺肝乙貝 酸甲醋炙

桃仁去皮尖及 川升麻

梔子仁 地骨皮

甘草半兩 麝香乙

右為細末。煉蜜為丸。如梧子大。溫水下。三十丸。無時。

**類用** 治婦人骨蒸勞熱。四肢羸瘦。及痛。口乾。心燥。不

得候。

酸甲醋炙

麥門冬略乾 阿魏乙

北柴胡

北柴胡略切 朱砂

大靈蓋附炙 犀角屑

知母各乙 黃耆乙

甘草

郁李仁

人參

赤芍藥

右為細末

無時飲

知母

黃耆

犀角

大靈蓋

知母

梧桐子

無時飲

北柴胡

朱砂

犀角

大靈蓋

知母

梧桐子

無時飲

**類用** 治婦人骨蒸勞熱。人勞瘦。鬼氣伏連。凡上出。心

麝香二分

犀角屑

桃仁去皮尖及

右為細末。煉蜜為丸。如梧桐大。溫水下。二十丸。此藥

犀角

天靈蓋

雄黃

木香

白朮

白朮

辟瘟疫亦可帶之

**醫中**

治勞 見專治婦人方

雄鷓鴣之个 桂杏仁 去皮炒 北柴胡

知母 各四兩

右除... 以好酒伍升入鍋內將活鷓鴣在中... 候... 取鷓鴣人... 無時候... 日伍服。

家前... 治少男... 赤茯苓

少研... 生... 良...

常山

生乾地黄

石...

甘草

右為細末每服二錢水一瓊小麥... 後臨卧時温服有虛汗加麻黃根... 州吳判官方療骨蒸黃瘦... 甚多此方... 其功可知。

**醫中**

治諸虛勞疾羸瘦之力... 嘔血頑延壅盛睡卧有妨... 皮寒骨熱一切五勞七傷... 地骨皮

烏藥 粉草 北柴胡 前胡

苦梗

知母

天仙藤

小黃芩

苦梗

知母

天仙藤

小黃芩

小...

人參 生乾地黄 秦元 幣甲

黃耆 各半兩

右咳嗽。每服參錢。水壹碗。酒一分。燉同。骨一。至炙焦。分  
為四服。桃柳枝各七寸。杏仁五粒。去皮尖。槌碎。煎至七  
分。去滓。溫服。加烏梅半箇。尤妙。歸門方加當歸

華佗方大靈治傳尸明月冊方

雄黃

木香 各半兩

天靈蓋 壹分 輕粉 壹分

幣甲飛

東棗貳兩

右為末。用法。酒壹大升。天黃半兩為末。熬膏入煎藥。為  
元如彈子大。朱砂為衣。傳尸勞。肌瘦面黃。嘔吐咳嗽。不  
定。先燒安息香。令烟出。吸之不嗽。非傳尸也。不可用此  
藥。若煙入口。咳不能禁止。乃傳尸也。宜用此藥。五更初

五物作三

服法。凡此藥。有之字

每升。有公。應

此藥。能治。癆

數

蘇沈良方治諸勞明月冊

服。勿令人知。以童便。其酒壹錢。化壹元服。如人行十里  
久。必吐出虫狀。如燈心。細長及寸。或如爛瓜。李。或如蠟  
蠶狀。各不同。未効。次日再服。以應為度。

兔屎九枚

礪砂四枚

右細研。生蜜元。如梧桐子大。以甘草半兩碎之。水浸。宜  
宿。取汁。五更初下。七元。勿令病人知。勞瘵。下後。相。看。若  
有虫。急打殺。以桑火。煎。使焦。藥。急水。中。寒。日。不。下。更  
服。須在。月。望。前。日。服。忌。見。喪。服。色。衣。婦。人。猫。犬。之。類。後  
服。治。勞。補。氣。藥。取。差。沈氏內補丸。孫十。項。補。丸。沈。氏。內。補。丸。孫。十。項。補。丸。沈。氏。內。補。丸。孫。十。項。補。丸。  
夜。夢。人。睡。驚。醒。一。月。如。人。船。明。不。可。正。如。人。心。骨。皆  
寒。已。而。傳。寒。戰。一。月。如。人。船。明。不。可。正。如。人。心。骨。皆  
問。其。名。則。明。月。冊。也。始。無。向。之。所。發。大。体。比。藥。最。治。熱

此藥本件效

殺毒作砂

下下段

解勞生肌進食活血養心地黃煎元有人云華佗方

生地黄汁 杏仁汁 生薑汁 藕汁 各伍升

薄荷汁 鵝梨汁 各壹 法酒二升 沙蜜肆升

右慢火熬成膏丹入後藥

北柴胡去苦木香 人參 茯苓

山藥 栝子仁去破遠志去心 枳實去穢

白木各壹兩 秦元 苦梗各二兩 礬石各壹兩

熟地黄洗焙酒

右為末以前膏子和具如梧桐子大食後甘豆湯下貳

拾元

治骨蒸寒熱各醫錄云陸州楊寺丞有女事鄭山功女有骨蒸肉熱之病時發外寒寒過內熱附骨蒸盛之時四肢

微

微瘦足跌腫者其病在五臟六腑之中衆醫不瘳因遇魏州良醫看曰請為治之只單用石膏散服之體微涼如故

石膏散方

具石膏不以多少

右新汲水和服方寸匕取身無熱為度外臺秘要

青膏散治男子婦人肢體倦疲虛勞寒熱靈苑方

青膏八九月間成實時抹去枝梗以膏用童子小便

浸冬日熬乾為末每服貳錢烏梅壹箇煎五七分服

青膏散方出博濟方

九助驚中薑北柴胡二兩 甘草 杏仁

桔梗 當歸 人參 地骨皮

赤芍藥各壹分 胡黃連 宣連各壹分 官桂

至

木香各半兩 蘇香一字 酥

右拾四味同為細末用青蒿一斤童子小便伍升好酒一升熬青蒿汁約貳升已來搗去青蒿不用入酥蜜再熬成膏冷後入藥末搜和為元如梧桐子大每服拾伍元温酒下米飲亦得日進叁服如秋後合時更入桃柳枝桑葉此藥甚妙

**補遺** 崔氏灸骨蒸勞瘵若人初得此疾即便如法灸之無不効者用細繩一條約五六尺蠅之勿令展縮以病人順脚底貼肉量男左女右從大姆指頭齊起從脚板底當脚跟中心向後引繩指脚肚貼肉直上至曲脊中大橫紋截斷之令患人解髮分兩邊令見頭繩自額門平分至腦後乃平身正坐取前所截繩子一頭從鼻端齊引

繩向上正循頭縫至腦後貼肉引下循脊中縫至繩盡處當脊骨以墨點記此繩下第一繩令患人合口將繩子按於口上兩頭至吻却起繩子心至鼻端根下如人樣齊兩吻截斷將此繩自公前在脊骨上墨點處取中橫量勿令高下於繩子兩頭以白圈記之此繩子名曰繩子此繩子名曰繩子

**閉** 初灸此訖次令其人平身正坐稍縮臂膊取一繩透項向前雙垂兩端尾齊齊於前兩腋骨間取一繩尾是即截斷却背翻繩頭向項後以繩子中傳取心正令當喉嚨結骨上其繩兩頭夾項雙垂循脊骨中繩頭齊會處以墨點記不是別取一繩子令其人合口橫量齊兩吻截斷遠於脊骨上第二次墨點處指中橫

量繩子兩頭以白圈記之此是灸穴初灸又將第二次  
量口繩子指中當脊直上下豎停中心有第二穴此縱橫  
上下繩頭盡處以白圈記之此是灸穴初灸又將第二次  
四方片四穴是名曰**四花**初灸各七壯治瘰癧其疾未  
効依前法復灸故云灸灸至百壯此以繩子量其穴  
若婦人或有繩帶繫足以至短小所有灸法第一次應  
門穴難灸者度不若只取骨有輪灸之其各穴下  
次灸而後灸亦可也常見人初有此疾即為加法灸  
之無任其功者

**地仙散**

治骨蒸肌熱一切熱勞煩燥能生津液

地骨皮二兩防風一兩麥門冬各一甘草灸半兩  
右剉散每二錢置四片水煎溫服

**十全大補湯**治虛勞發熱加北柴胡此骨皮余元氣

五心煩熱附

五心煩熱煩赤宜為方**消渴散**秦艽散  
**消渴散**治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏聩心忪  
煩赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不  
調臍腹脹痛寒熱如瘧又療至女血弱陰虛榮衛不和痰  
嗽潮熱肌體腫痛漸成骨蒸

白茯苓

白朮

當歸

白芍藥

北柴胡

甘草

右咬咀每服錢水煎服煨生薑一塊切片薄荷二葉  
同煎至七分去滓熱服無時候  
治婦人手足煩熱夜臥多汗肌肉黃瘦經候不調四肢煩

治婦人手足煩熱

煩赤

傳心... 狀如... 散

枳殼去穢 兩半 夏翹

赤芍藥 各壹 柴胡

黃芩各精 兩半

右為細末。每服貳錢水一瓊。生薑一塊。擘破。棗二枚。煎至八分。去滓。溫服。候五心煩熱。及身體壯熱。潮熱退。方續服。

補遺清心蓮子飲見局 麥蘇飲加黃芩麥門冬 風中並治

五心煩熱。手足掌心熱。甚者

婦人血風勞氣方論第三 九十四方

夫婦人血風勞者。由氣血虛損。經脈不調。或外傷風邪。或內挾宿冷。致使陰陽不和。經絡不流。腹中堅痛。四肢酸疼。月水或斷或來。面色萎黃。羸瘦。又有因產後未滿百日。不

則

將諸臟腑虛損。...

以參... 治婦人血風勞氣。身體羸弱。頭暈目眩。心忪煩倦。寒熱盜汗。頰赤口乾。痰嗽留滯。精神不振。或月水不調。臍腹疔痛。痰癖塊硬。疼痛發散。或時嘔吐。飲食不進。或因產將理失節。淹延瘦瘵。不起下卧。甚則者。有丹。

荊芥穗 人參 挂心 生乾地黃

北柴胡 鱉甲醋炙 酸棗仁炒 枳殼

羚羊角屑別為木 白木各七錢 川芎

當歸 防風 甘草各半兩

右為粗末。每服參錢水一瓊半。生薑煎。片前至八分。去滓。熱服。無時候。日二服。常服除一切風虛勞冷宿疾。孕婦休服。



醫甲元治婦人血風勞氣四肢麻痺疼痛經脈不利飲食無味漸加虛困。

醫甲

紫苑

桂心

川芎

防風

川牛膝

當歸

秦龜

人參

桃仁

琥珀

麝香

黃耆

赤芍藥

蝮虫

水蛭

鬼箭羽

白木

羌活

地黃

右為細末。煉蜜元如梧桐子大。飲用溫酒吞下。公於元。

琥珀

治血風虛勞。上熱下冷。或黃白濁。心下煩燥。胸膈

無力。不美飲食。醋心口。或氣喘。或時作。或時作。或時作。或時作。

或氣喘。或時作。或時作。或時作。或時作。或時作。或時作。或時作。

琥珀

常山

川芎

防風

獨活

羌活

桂心

吳白

柴胡

青皮

吳茱萸

地全

草豆蔻

赤芍藥

栝果

桃仁

敗龜

醫甲

右為細末。煉蜜元如梧桐子大。每日空心酒下貳粒。

午前近晚更進一服。如覺腹近晚不消。服如腹內埋第

攻築。於醫甲桃仁栝果三枚。各加一倍。為效。忌生以。

莖菜毒魚等物。

治婦人血氣虛勞。四肢少力。肌肉黃瘦。多困減食。遍身發

及真邪相擊。心腹撮疼。香厚。

木香

乾薑各三分

壯丹皮

赤芍藥

橘紅

桂心

人參

茯苓

熟地黄

秦艽

柴胡

白木

當歸炒

附子洗去酸甘草半兩

右為粗末。每服貳錢。水壹錢。生薑三片。棗二枚。煎至七分。去滓。稍熱服。如酒力心醉。入烏梅一兩。同煎為末。

**通經散** 治婦人血風勞心。松發執米。退。

生乾地黄

熟乾地黄

右貳味。等分為細末。用生薑自然汁。入水相和。打糊為

元。如梧桐子大。每服五粒。用酒下。或只茶酒配

湯下。亦可。食後日。分。早間先服。八味。負

一服。不可調

**木香** 治血風諸般疾。症後。並。服。諸疾除。去。

荊芥

雀腦等分

人參

桂心

牡丹皮

羌活

防風

苦梗

大腹子

甘草

蒲黃

白茯苓

枳殼

厚朴

半夏

杏仁

款冬花各二附子

乾地黄

鼈甲

白芍藥

北柴胡

黃耆各

乾薑

木香各半沉香一分

右為細末。每服二錢。薑三片。棗一枚。水一錢。煎至七分。

**刺芥散** 治婦人血海虛冷。手足煩疼。頰赤口乾。背甲勞。倦。寒熱往來。咳嗽痰涎。飲食進退。血經不調。多夢盜汗。骨

隔不快但是風勞氣冷並皆治之。

荆芥穗四兩北柴胡

秦艽

白芷

黃芩各二兩當歸

羌活

川芎

麥門冬

白茯苓

人參

白芍藥

沉香

海桐皮

枳殼

熟地黃

甘草

酸棗仁

木香

檳榔各一兩

鼈甲各一兩

白豆蔻

桂心

苦梗各二兩

右為細末每服貳錢薑錢三片烏梅一箇煎至七分無

時溫服如極虛去檳榔每日兩服臨卧服尤佳忌生冷

動風甜物腹有顆塊服之便消。

如聖散治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易發疾傷月水

不調久而心虛狀若心勞四肢怠倦筋骨少力盜汗身熱

或時不寧五心煩熱肌膚不長則依頭昏飲食無味胃弱

北柴胡

白茯苓

北草

熟地黃

人參

當歸各壹兩鼈甲

胡黃連

沉香

知母各半兩桑寄生

乾葛各一分

右為細末每服貳錢水壹錢烏梅壹箇棗二枚麥門冬

數粒煎至八分無時服

之方如散治血虛肌熱或治小兒脾虛蒸熱羸瘦不能飲

白朮

白茯苓

白芍藥各壹兩甘草半兩

右為細末薑棗煎貳錢服。

獨煎散治血虛寒熱四肢酸倦無力瘦瘠不進飲食日

川烏

海桐皮

地骨皮

五加皮

桂心

牡丹皮

陳橘皮

白芍藥

川芎

當歸

烏藥

白芷

我茂等分

右為末每服貳錢水或酒入生麻油三四點煎至七分

濕服無時候

天效油煎治血風勞氣攻注四肢腰背疼痛嘔逆醋心

不思飲食日漸羸瘦面色痿黃手足麻痺血海冷收服此

神效

五加皮

川烏

芍藥

海桐皮

牡川皮

乾漆

川芎各半兩

為細末每服二錢米酒或酒浸錢心文同煎至六分

溫服常服以油浸錢心煎至時不可吹

右方亦有

治血風

牡丹皮

地骨皮

防風

白芍藥

黑豆

白芷

白芍藥

白芍藥

川芎

右為細末每服八錢水或酒煎至五分

煎至八分濕服無時候

香甲散治熱病後虛勞或四肢倦怠脚上皮膚癢

肌膚黃瘦或熱瘡盜汗頭暈如神藥久服駐顏其效不

可具述

人參

羌活

川芎

沉香

木香

當歸

當歸

木香

肉豆蔻 酸棗仁 附子 檳榔

大腹子 駱半 北柴胡 兩半 厚朴 川牛膝

白茯苓 秦光 桂心 半兩

右咬咀。每服伍錢。水壹盞。生薑叁片。烏梅壹箇。煎至八分。大泮溫服。日叁服。空心。忌生冷麪食。雞肉。鮓醬之類。

寒作熱。飲食減味。並治之。...

馬鞭草 荆芥穗 北柴胡 烏梅

枳殼 白朮 白芍藥 木香

秦艽 大台藥 麻黃 杏仁

右為細末。...

作實作熱

婦人風虛勞冷者。...

婦人風虛勞冷者

夫婦人風虛勞冷者。...

治婦人風虛勞冷氣攻心腹疼痛肢節拘急體瘦無力經候不調飲食減少

牡丹皮 赤芍藥 柏子仁 續斷各半兩

麝香一分 澤蘭葉二兩 當歸 延胡索

桂心 附子炮 川牛膝 川芎

桃仁 乾漆炒 琥珀 沒藥

木香 各三分

右十七味為細末每服一錢溫酒調下

紫石英圓治婦人風虛勞冷經候不調四肢羸弱不能

紫石英 熟乾地黄 白石英 續斷

白芍藥 桂心 木香 當歸

白朮 乾薑 白薇各半兩 川牛膝

川芎 人參 三 版 紅 砂

空心跳

減食

婦人冷勞方 九七方

夫婦人冷勞者由山氣

令飲食不消腹內積

足無力肌膚羸瘦

治婦人冷勞氣滯經脈不通腹脇妨悶四肢羸瘦

不思飲食

聖惠

木香

阿子

白薑

桃仁

人參各半兩 陳皮

琥珀

桂心各半兩

赤芍藥

延胡索

赤茯苓

川牛膝

當歸

白朮

白朮三分

附子

右以咀每服四錢水一盞薑二斤煎至七分去滓空心

木香治婦人冷感經脈不調臟腑氣滯四肢疼痛以食無味漸加煎地

木香

琥珀

吳茱萸

當歸

牡丹皮

赤芍藥

三棱

附子

杜仲

川芎

白朮

附子

杜仲

白朮

白朮

附子

厚朴

右為末煉蜜元又法

各壹

無力月信不調少思飲食

乾熟地黃

鱉甲

陳皮

地五味

當歸

川芎

桂心

川牛膝

人參

白芍藥

白朮

附子

白茯苓

黃芩

甘草

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下之於元

調砂煎元治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢虛瘦

鹽印醋炙

桃仁去皮 木香

五靈脂炒

當歸各壹兩

砂砂升

右為細末用礪砂膏為元如梧桐子大空心温酒下貳拾元。

腹瘦口内生瘡不思飲食漸加無力宜服此藥。

- 比柴胡
- 縮砂仁
- 蒔蘿
- 胡椒
- 白芷
- 山茵陳
- 人參
- 白芍藥
- 白朮
- 陳皮
- 木香
- 紫苑
- 白芍藥
- 白朮
- 蘇美仁
- 北細辛

右為細末用礪砂膏為元如梧桐子大空心温酒下貳拾元。

小丸精新補脾丸

- 白芍藥
- 川芎
- 苦梗
- 厚朴
- 桂心
- 陳皮
- 白朮
- 當歸
- 荆芥穗
- 蒔蘿
- 胡椒
- 蘇美仁
- 藁木
- 柴胡
- 紫苑

右為細末每服半兩以饋猪肝一具用塩醋葱白各等許相和如尋常煮熟空心任意食之然後飲温酒一錢尤佳。

治婦人血臍風虛冷氣肌肉黃瘦飲食進退經候不調心腹多脹漸變如勞補血海調氣(大香甲)散



鼈甲醋炙

沉香

柴胡

人參

川芎

羌活

當歸

附子炮去皮

木香

安息香

桔梗

茯苓

藿香葉

陳皮

牡丹皮

三稜

厚朴

枳實

枳殼

牛膝

檳榔

和

和

和

右為如末。每服...

分溫服。餘...

同為末。煉蜜...

參拾元與散...

補遺

新刊

新編

婦人乾

夫婦人乾

帶熱毒積毒作

赤頭或眼道

沉多目小起

膚日漸消瘦

黃耆散

治婦人乾

人參

黃耆

生地黃

右咬咀每服四錢水一...

皮料作苗

和

**半夏散** 治婦人熱勞煩渴口乾身瘦無力四肢疼痛或時  
寒熱痰逆嘔吐不思飲食

半夏 知母 苦梗 人參

赤茯苓 秦艽 赤芍藥 麥門冬

烏梅肉 醋炒 薑中醋炙 北柴胡 黃耆 各二兩

大腹皮 三分 甘草 一分

右為粗末每服四大錢水一盞半生薑二片煎至七分

去滓溫服無時候

**續命** 治婦人熱勞羸瘦

北柴胡 赤茯苓 人參 黃耆 各二兩

黃連 三兩 地骨皮 木香 各二兩 桃仁

各二兩

**秦艽散** 治血經有熱月脈滯五心煩倦

麥門冬 秦艽 生地黄 當歸

地骨皮 鐵金 蘇木 各一分

右為細末每服一錢水一盞紅花少許同煎至七分

溫服若經脈調不用紅花忌酒與熱物此方可服一年

**補遺地山散** 治婦人熱勞煩躁月候不調口苦舌乾四肢

怠健 方在骨蒸補遺

**醫甲地黃湯** 治熱勞手足煩心怔忡悸悶婦人血室有乾

血身體羸瘦食不為肌肉

柴胡 去芦

當歸 酒洗

麥門冬 去心 鱉甲 醋炙

石斛

白朮

熟地黃 酒浸 茯苓

秦艽 去芦 各一人參

肉桂 不見火 甘草 炙 各半

右劉每四錢薑四片烏梅半箇煎溫服此藥專治熱勞其性差寒脾胃快者方可服虛甚汗多者不可服

婦人交熱方論卷二

九三方

夫婦人有氣血陰陽臟腑虛實則生熱虛則受邪邪熱加人陰陽冷熱自相乘也今云交熱者是外虛而將溫溫度外執知之非臟腑自生故云交熱其狀上焦留而之間虛執口躁心煩手足壯熱者是也

麥門冬 治婦人交熱四肢煩悶寒痛不下飲食

麥門冬

北柴胡

赤茯苓

羚羊角屑

犀 同

犀名犀

時候

犀角散 治婦人交熱四肢煩悶寒痛不下飲食

犀角屑

赤芍藥

地骨皮

紅花

甘草 各半兩

北柴胡 一兩

黃芩 二兩

麥門冬

人參

枳殼

赤茯苓 各三分

右咬咀每服四錢水一盞半姜二片煎七分去滓無時溫服

犀角散 治婦人交熱心胃壅悶肢節煩疼不思飲食

生乾地黃

黃耆 各二兩

犀角屑

甘草

瓜蒌子仁 黃芩各半兩 人參 茯神各三分

右為細末。每服二錢。水一中盞。淡竹葉五片煎至七分。溫服。無時候。

補遺 治婦人客熱四肢悶煩。疼痛不思飲食。甚者

可加桂枝。或黃芩。是古方

婦人寒熱方。卷第三

凡四方

經云。陽不足則生寒。後熱。陰不足則生熱。從寒夫婦人勞。傷氣血。虛弱。陰陽交爭。虛實不調。故令寒熱如雷。此

治婦人血風氣腫。虛寒發熱。

北柴胡

地骨皮 桑白皮

枳殼

前胡

黃芩 白茯苓

五加皮

人參

甘草

桂心

白芍藥 各兩

右為細末。每服三錢。水一中盞。煎至五分。溫服。無時候。

生地黃散 治婦人血氣不調。或時寒熱。體痛。不思飲食。

生乾地黃

北柴胡 羌活

木香

桂心

防風 酸棗仁

羚羊角屑

白芍藥

白朮

黃芩

川牛膝

白茯苓

當歸

枳殼 各三分

右以明每服三錢。水一中盞。薑二片煎至七分。去滓。溫服。

空心

藥胡散 治婦人寒熱。躄瘦。肢節疼痛。口乾心煩。不欲飲食。

北柴胡

黃芩

赤茯苓

白朮 各二兩

人參

地骨皮

枳殼 炒

生乾地黃

妙軒傳家

同

同

苦梗

桑白皮

赤芍藥

鱉甲

麥門冬三兩 甘草半兩

右咬咀每服四錢水盞半薑三片煎七分去滓溫服無

時候

**荆芥散** 瘧時氣風溫寒熱瘧瘧往來潮熱並宜服之

陳皮

麻黃

香附子

甘草各二兩

荆芥穗

厚朴各二兩

草果仁三箇 川白芷

桂心各半兩

右咬咀每服二錢水一大盞薑三片棗壹枚煎至七分

去滓溫服無時候

**補遺** 婦人寒熱或如瘧証若不因胎產可如傷寒方法治

之此不重附補遺

去壹枚作兩枚

寘婦寒熱如瘧方論第四

九一方

綱目者元氣也  
綱目者元氣也  
綱目者元氣也  
綱目者元氣也  
綱目者元氣也  
綱目者元氣也  
綱目者元氣也  
綱目者元氣也  
綱目者元氣也  
綱目者元氣也

論曰寘婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄略而論

及言寘者孟子正謂無夫曰寘是也如師尼喪夫之婦獨

陰無陽故男子而不可得是以懣懣成病也易曰天地絪

縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰可乎夫既處

闕門慾心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘧疾久

則為勞又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黧瘦瘠等

證皆寘婦之病診其脉獨肝脉弦出寸口而上魚際究其

脉原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛

則懷胎觀其精血思過半矣

**白濁丸** 許學士云有一師尼患惡風體倦乍寒乍熱

面赤心煩或時自汗是時疫氣大行醫見寒熱作傷寒治

之大小柴胡湯雜進數日病劇予診視之曰三部無寒熱  
脉但厥陰肝脉弦長而上魚際宜服抑陰等藥予製此方  
治之愈

北柴胡 秦光 黃芩各半兩 生地黃二兩

赤芍藥 一兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大烏梅煎湯下冬拾元

無時候日參服許孝十一云身實史記倉公傳載齊北王

以為為寒熱病也倉公曰病得之必男子而不可得也何

以知欲男子而不可得也其脉用脉弦出寸口是以知

如瘧之證在本寒寒下論  
補遺子嘗治一寡婦寒熱如瘧諸藥未効後但以

加黃芩服之愈方在中風門

婦人惡寒方論第五 九一方

論曰夫婦人惡寒者亦有三證一證發於陰也發於陽也  
陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者其脈必浮  
數發於陰者其脈必沉細又有汗後利後惡寒者其  
惡寒已上疾證方治非載百問不復繁引僕嘗治一婦人  
但惡寒別無他證其脈寸部遂用敗毒散而安此藥能去  
表中風邪故也然惡寒家慎不可過當覆衣被及近火  
氣寒熱相薄脉道沉伏愈冷病人寒不可過但去被撤火  
兼以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不可近火寒  
氣入腹血室結聚針藥所以不能治矣

補遺 桂枝麻黃各半湯 甚効 方見活人書

婦人血風煩悶方論第六 九四方

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之得

於血使氣不宣而不滯則生於熱或肢節煩疼口乾少寐皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也  
治婦人血風虛冷月候不調或即脚手心煩熱或即頭面浮腫頑麻

川烏頭位所用好清油麥面兩錢於鉢內炭火炒不

右為細末更入臼中或乳鉢內研令停後將蒸餅水浸

後却濕去水漸漸入臼中和杵直待元得即元如梧桐子大空心溫酒或煎湯貳拾元忌動風物丈夫風疾

治婦人血不和心驚煩悶不思飲食四肢少力頭目昏眩身體疼痛  
壯升皮 白茯苓 赤芍藥 白芷

甘草 各等分 此藥性平

右為細末每服貳錢水煎服生薑二片棗一核同煎至

七分溫服食後臨川

**酸棗仁散** 治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁喫食不

酸棗仁 赤芍藥 當歸 羚羊角屑

赤茯苓 紅花 生地黃 各三

防風 羌活 川牛膝 麥門冬

桂心 川芎 地骨皮 甘草 各半兩

右咬咀每服肆錢水煎服生薑二片棗一核同煎至

**當歸散** 治婦人血風潮熱

當歸 二兩 芍藥 延胡索 不灰木

熟地黃 各一 大黃 二分 炙桂心 半兩 甘草 壹分

右為細末。每服貳錢。水壹盞。調服。小角子煎至陸分。去滓。如躁時。放冷服。細叩清者。

**補遺** 前五卷。婦人血風。勞氣方論。內可與此條通用。

婦人血風。攻脾不能食。方論第七。九四方。

夫脾象於土。脾為中州。意智之藏也。其肝心肺腎皆受脾之精氣。以榮養焉。脾與胃為表裏。脾主化穀。納食。胃為水穀之海。故經云。脾胃者。以胃氣為本也。婦人血氣不調。臟腑勞損。風邪冷氣。結聚在胃。攻於脾胃。脾胃既虛。為邪所乘。則不能食。故論云。不能食也。

人參 白茯苓 縮砂仁 枇杷葉 各三分

桂心 木香 青皮 枳殼 各三分  
右為粗末。每服貳錢。水壹盞。煎至陸分。溫服。無時候。

**神效** 治婦人血風。攻脾胃。腹脇氣痛。不思飲食。

白朮 附子 枳殼 訶子  
桂心 人參 木香 食茱萸 泡  
陳皮 各壹兩 苦梗 乾薑 各半兩

右為細末。以酒煮神曲。下貳兩。作糊。為元如梧桐子大。每服貳拾元。空心薑湯吞下。

**神效** 治婦人血風。攻脾胃。臟腑虛冷。全不思食。臍腹多痛。體瘦無力。

板紅 沉香 附子炮 莪茂

凡下...



訶子

當歸

白朮 各壹兩 良薑

白豆蔻仁

丁香 各壹兩 麝香 壹分

右為細末。酒煮麩糊。食如梧桐子大。空心溫酒下。十二元。

全不入食者。以兩服能食。此藥流。據愚見。此方既有川烏。

治血風攻脾。不食。豈無良驗。

青皮

陳皮

粉草

良薑

桂心 各壹兩 川烏

草豆蔻仁 訶子 伍箇

右為細末。每服壹錢。水煎。或薑汁煎。前藥分溫服。

草豆蔻仁 訶子

良薑

白朮

砂仁 各一兩 青皮

訶子肉 各半 肉桂 二錢半

生薑

厚朴

為末。每服一錢。溫湯煎服。及煎服。補入。此藥。無惟此藥。

又可平胃散。四君子湯。

婦人夢與鬼交方論第八

夫人稟五行秀氣而生。五臟神氣。而養之。陰陽調和。則臟腑強盛。風邪鬼魅。不能傷之。以攝血氣。而血氣虛衰。則風邪乘其虛。鬼邪干其正。然婦人與鬼交通者。由臟腑虛。神不守。故鬼氣得為病也。其証不欲見人。如有對。言笑或時悲泣。是也。脉息遲伏。或如魚啄。皆鬼邪為病也。又脉來綿綿。不知度數。而顏色不赤。此亦是此候也。夫神遊浴。婦人風虛。與鬼交通。要有所見聞。言語。種種。

兩

茯神 一兩半 茯苓

人參

石菖蒲 各兩

赤小豆 半兩

右吹咀每服三大錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

治婦人與鬼魅交通

辰砂

檳榔

當歸

桃仁 各一分

水銀

麝香

阿魏

蘇合

沉香 各一分

右為細末煉蜜元如梧桐子人空心桃仁湯吞下十

又方 似此

虎頭骨

朱砂

雄黃

硫黃

鬼臼

皂莢

蕪荑仁

思箭

梨乾

右件生為末煉蜜元為彈子大藥盛一元男左女右

補遺局方活人書卷之四婦人心氣不足精神恍惚頭倒與用交通... 然後以前方治之

婦人傷寒傷風方論第九

凡九

論曰古人治病先論其所主... 室不蓄則二氣諸和血室... 盛即宜下人迎緊盛即宜汗... 其汗以救血室... 云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語... 為熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣



右咬咀每服五錢水一盞半姜四片棗二個煎至七分去滓溫服良久再服汗出而解。

婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食宜用枳實芍藥湯治之

黃芩 白芍藥 白朮 生乾地黄

右各一兩咬咀每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服

寒則加生姜

婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下宜服

**當歸湯**

柴胡 白朮 人參 甘草

赤芍藥 當歸各一兩 五味子 木通各半兩

右咬咀每服半兩水一盞半生薑四片棗二枚煎至八

分去滓溫服

各

婦人傷寒六七日身熱出而渴者大柴胡湯主之

川大黃 枳實 芍藥 黃連

右為粗末每服四錢水一盞煎至八分去滓溫服取微

利如目赤睛痛者加茯苓散散竹葉瀉肝之餘氣

婦人傷寒差後猶有餘氣不去謂之遺熱宜用黃芩湯

乾地黄一兩 大黃 黃連 黃芩

柴胡 白芍藥 甘草一兩半

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服取酒

利汗出解

男子病新差婦人與之交合得病名曰陽易其證裏急腰

膝及腹內痛身重宜用**陽易散**

用男子襦襦燒灰為末以水調方寸匕服即愈。  
婦人病未平復因有所動致熱氣上衝曾手足拘急攣攣  
如中風狀宜用白木湯

括樓根二兩淡青竹如半升

右以水二升半煮取一升二合去滓分作三服

婦人病未平復因有所動小腹急痛腰膝疼四肢不任舉

動無力發熱者宜用白木湯

桂枝

白朮

當歸

甘草

芍藥

人參

黃芩二分生附子破一作

八片各一分生薑半兩

右以水二升半煮取一升半去滓通口服一湯盞食前

再服溫覆微汗若

寒

向有仲景

人參

當歸

甘草

婦人傷寒發熱惡水瀉來者白朮人參

此為熱入血室故使如瘧疾宜服白木湯

婦人傷風入血必結故使如瘧疾宜服白木湯

入血室其血必結故使如瘧疾宜服白木湯

柴胡

黃芩

人參

生薑地黃

甘草

半夏

右以水二升半煮取一升二合去滓分作三服

澤溫服

補遺

小柴胡湯法用人參不用生乾地

局方四物湯不用熟地黃只用生乾地黃加北柴胡等分

煎服亦療此證  
婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜服

柴胡

四兩

桂枝一兩半

括樓根二兩 牡蠣

乾薑

甘草各一兩

右咬咀每服五錢水棧半煎七分去滓溫服初服微煩  
再服汗出而愈

婦人傷寒血結胸脇揉而痛不可撫近宜  
結胃法當針期門伸舉無藥如此方疑非仲景然其言有  
理姑存焉

海蛤

滑石

廿五錢各一兩

右為細末每服一錢雞子清調服小腸通利則胃膈血

散膈中血聚則小腸通小腸既通則血行而痛自除

此方小便利而數行更宜桂枝湯以助其力

婦人傷風發熱寒經水不通來得此方除其寒

和胃腸下滿如結胃狀諸苦者此方為入血行

凡婦人病法當針期門用行子午法恐纏藏膜引氣上

但下針令病人吸五吸停針良久徐徐出針此是平瀉法

也凡針期門必瀉勿補可肥人二寸瘦人寸半深也

補遺期門穴活人書云婦人乳頭向下盡動骨間文

夫及乳小者以一指為率陷中有動脈是穴咳逆灸之

良艾炷如小豆大灸三炷或五壯婦人熱入血室譫語

者刺之下針令病人吸五吸停針良久出針

期門穴



婦人咳嗽方論第十一 九九方

夫婦人咳嗽者。皆由肌腠虛外。受於寒熱風濕。所得也。肺為四臟之華。蓋內統諸臟之氣。外合於皮毛。若為寒熱風濕所傷。邪氣自皮毛而入於肺。則中外皆傷。故今咳也。大抵治

咳不可一藥治。當以寒熱辨之。其肺虛而咳者。起於風濕。而弱者。起於濕熱。其而數者。起於熱。其而滿者。起於寒。風者散之。濕者燥之。熱者涼之。寒者溫之。虛者補之。未有不安者也。

咳嗽用溫藥方論第十二 初虞世

經曰。微寒為嗽。其甚為肺癆。古人立方治嗽。未有不以溫藥。如乾薑。桂心。細辛之屬。以寒氣入裏。非辛甘不能散。以此準之。未有不因寒而嗽也。又曰。熱在上焦。則為肺痿。又實則為肺癰。虛則為肺痿。此人其始或血不足。或酒色滋味太過。或因服利藥。重亡津液。燥氣內傷。肺金受邪。脉數發熱。咳嗽膿血。病至於此。亦已危矣。古人立方亦用溫藥。如建中之屬。今人但見發熱咳嗽。率用味胡散。甲

門冬草麻等藥旋踵受弊而不知非可為深戒就使不可  
進以溫藥亦須妙以湯元委曲調治無為鹵莽致傷人命  
治虛中自執咳嗽膿血口苦咽乾黃芩甘草

黃耆各兩 甘草二兩

右為細末。湯點宣貳錢服。日二。方甘草一兩。黃耆

六兩。各黃耆六兩。湯只吹咀。水煎服。

蛤蚧 紫苑 欵冬花 驚甲炙

貝母 桑白皮 杏仁 炒法微尖

右為細末。煉蜜其如和。子。命服貳錢。入。火。湯吞。

**信世元** 昔有婦人患肺熱。久。如。交。肌。瘦。將。成。肺。勞。服

此。方。宗。通。方。

枇杷葉 桑白皮 欵冬花

紫苑 杏仁 大黃

右為細末。煉蜜元如櫻桃大。食後。夜。用。分。

**具母湯** 治諸嗽久不差。出本事方。

貝母 北五味子 黃芩 乾姜

陳皮 半夏 桑白皮 桂心

北柴胡 木香 甘草

右為粗末。每服伍錢。水壹瓊。半杏仁。染筒。去皮。尖。碎。之。

生薑貳片。煎至。茶。分。去滓。熱。服。黃師文云。戊申冬。有姓

蔣者。其妻。積年。嗽。製此方。授之。一投而瘥。以此治諸嗽。

悉皆愈。



定喘湯治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上氣喘急喉中  
涎聲穿滿氣逆坐卧不安飲食不下及治肺感寒邪咳嗽  
聲重語音不出寒痰頭昏目眩皆治之。

半夏麩

明阿膠炒

甘草各錢半

罌粟殼製半兩

北五味子

桑白皮

麻黃去節

人參各四分

右咳嗽每服參天錢姜炙片烏梅半箇煎至七分去滓  
漸漸溫服食後臨卧服

滄州李官人宅清肺湯

治狀同前

又名清金湯

罌粟殼製

人參

粉草各半兩

陳皮

茯苓

杏仁製

白朮

明阿膠炒

北五味子

桑白皮

薏苡仁

紫蘇葉

右咳嗽為末每服參天錢水錢半姜炙片棗兩枚

半箇。而寒者宜。臨卧溫服。僕每用則無效。遂加白合。因  
母夫心平。夏麩炒。冬花各壹兩。服之良驗。

金不換散治男子女人肺胃虛寒。咳嗽不止。喘促。喉  
嗽涎成。腹脇脹。背脊疼痛。或虛勞。冷嗽。咳吐紅痰。或  
年日近。一切喘咳。痰諸藥不效者。並治之。

罌粟殼製

杏仁

甘草

右咳嗽每服參天錢水壹盞半。姜炙片烏梅半箇煎至八

分。食後臨卧。漸漸熱服。昔治一婦人。咳嗽不止。服諸藥無

效。漸成勞瘵。求余治之。六脈皆弱。以黃芩湯。治之。必愈。

又治一婦人。時行感熱。咳嗽。遂用小柴胡湯。去人參。薑

只加北五味子煎服愈。

古今錄驗 補腦湯 寒春冬傷寒 秋夏冷濕 咳嗽喉中作聲 上氣不得下 頭痛方

陳皮

紫苑

麻黃 去根

杏仁 製

當歸

桂心

甘草

黃芩

各等分

右以咀 每服伍錢 水琰半 煎至壹錢 去滓 熱服

補腦膏 治肺感寒邪 咳嗽聲重 留膈煩滿 頭目昏眩

金沸草散 治肺感寒 鼻塞聲重 咳嗽不已 痰濃壅盛

小青龍湯 治感寒 咳嗽喘息 加杏仁 煎有汗 去麻黃

細辛五味子湯 治肺經感風邪 咳嗽

冬蘇飲 治上膈有痰 聲重 咳嗽加杏仁 五味子 煎風門

勞嗽方論第十三

九二方

經曰 人感於寒 則受病 微則為咳 甚則為泄 為痛 凡咳嗽

嬌

解外堂引子  
按之  
當任氣邪

五臟六腑皆有之 惟肺先受邪 蓋肺主氣 司呼吸 及毛脈之 初傷 先客皮毛 故咳為肺病 五臟則各以受邪 六腑 則又為五臟所移 古人言 肺病難愈 而善於死 其病 藏怕寒而惡熱 故邪氣易傷 而難治 以其 不及故也 十種咳嗽 若肺咳 心咳 脾咳 腎咳 肝咳 胃咳 支飲 咳 膽咳 厥陰咳 肝咳 所謂五嗽者 冷嗽 氣嗽 燥嗽 飲嗽 邪嗽 孫真人亦有方 治寒毒 注嗽者 歷代方論 著之 甚詳 惟今之所謂勞嗽者 無所經見 意其華佗所謂邪嗽 真入所謂注嗽者是也 此病 蓋酒色過度 勞極傷肺 損動 經絡 其重者 咯唾膿血 輕者 時發時差 又有因虛感邪 惡 之氣 且傳注得之 或先嘔血 而後嗽 或先咳嗽 漸就沉痾 此則非特內損肺經 又挾邪惡傳注之氣 所以持甚病之

醫說引雜書云馬...是

散

毒害無過此也。其治注嗽通氣元方用蜈蚣四節又云  
爰與鬼交通及飲食者全用蜈蚣外毒毒四痛元治五嗽  
亦用蜈蚣遇世名公能推原其旨意率用蛤蚧天靈蓋  
柳枝麝香丹砂雄黃安息香之類以通神明之藥療之  
出古人之意矣。又肺中有虫如蚕令人喉痒而咳嗽湯嗽  
延過鍼灸不及以藥含化虫死即嗽止。見張...  
深師療五嗽一上氣嗽二飲嗽三解嗽四冷嗽五邪嗽。

四遠定

乾薑

桂心

躑躅花

首窮

紫苑

荒花根皮

蜈蚣

甘草

思督部

人參

半夏

古拾貳味為細末...元如大豆許每服伍元米飲下

錫

生藥海...米

五冷嗽寒療之方

蜈蚣

元花

躑躅花

乾薑

首窮

桂心

人參

細辛

右為末煉蜜元如梧桐子大米飲下一十食日二服加  
至拾伍元息生葱生菜

補遺温金散

治勞嗽喘悶咯痰中有血方見前勞療類下補遺

阿膠

治勞嗽并嗽血咯血

方見前勞療類下補遺

團魚散

治骨蒸勞嗽累効

貝母

前胡

知母

杏仁

北柴胡 等分 生團魚 二箇

右藥與魚同煮熟提起去頭取肉連汁食之却將前藥焙乾為末就用團魚裙田及骨更煮汁一椀和藥為食梧子太每服二十食煎黃耆六一湯空心吞下病安仍服黃耆六一湯補肥

喘滿方論第十四

夫喘之為病，問岐伯對曰：夜行則喘出於腎，淫氣病肺有所隨，喘出於肺，淫氣逆肺有所驚，喘出於肺，淫氣傷心，逆水則喘出於腎，與胃當是之時，男者氣行則已，怯者則自逆，為病逆，原處之山，無日皆不能與氣然，感外邪則有太陽證，肺浮無汗而喘者，宜麻黃湯，以陽汗出不惡寒，脈浮而喘，有潮熱者，宜承氣湯，以表邪未解，用下利而喘者，宜麻黃湯，以表邪未解，用下利而喘者，宜麻黃湯。

未解，用下利而喘者，宜麻黃湯。若微喘者，利以黃耆湯，以肺浮汗出而喘者，宜麻黃湯。黃杏子甘草石黃耆湯，以表邪未解，心下微滿，胃氣上逆者，宜麻黃湯。嘔者，宜黃耆湯，以胃氣上逆者，宜麻黃湯。逆冷脈自沉，宜麻黃湯。硬或冷汗自出，宜麻黃湯。是本氣極虛，內外皆虛，宜麻黃湯。愈宜返陰丹上之。相乘而喘者，以杏子散，如感寒伏逆而喘者，宜麻黃湯。實湯，若暴寒，向火覆衣，被過熱，傷熱肺實而喘者，其狀多有熱證，宜洗心散，冷水調服。若因氣字不調，或盛喘促者，宜四七湯。無官局積梗湯，置煎服。若涎多而喘者，宜于

緡湯橘皮半夏湯若不得臥臥即喘者此由水氣逆行上乘於肺肺得水則浮而開使氣不得通流其脉沉大宜神秘湯肺之積名曰息賁在右脅下大如杯令人洒淅寒熱喘咳發癰疽宜棗膏元若上氣喘者神授湯若上盛下弱而喘促者宜蘇子降氣湯吞黑錫丹若尊年之人素來稟賦太厚不任熱藥者不可輕投丹劑及諸熱藥但以秘傳降氣湯分心氣飲論之種藥不出於此矣若素有脚氣而喘者當作脚氣治之又有骨蒸勞傷自有專門不敢濫及神祕湯治水氣乘肺而喘兼療支飲而喘

陳橘皮洗去白

蘇葉

人參

桑白皮

生薑等分

右咳吐每服半兩水煎去滓溫服

此湯治肺虛寒喘下氣急痰飲積胸中妨息發喘服湯後不吐得此二服遂愈  
 蘇子 杏仁 橘皮 半夏 桑白皮 生薑 麻黃根 芍藥 甘草 茯苓 杏仁 橘皮 半夏 桑白皮 生薑 麻黃根 芍藥 甘草 茯苓 杏仁 橘皮 半夏 桑白皮 生薑 麻黃根 芍藥 甘草 茯苓

蘇子

杏仁炒黃

橘皮洗去白

右和前橘皮湯調下貳錢無時服

千緡湯

齊州半夏洗去白

甘草炙一寸

皂角去核多

生薑如指大

右同以水壹碗煮去半頓服沈興宗待制嘗病喘不能卧人扶而坐數日客有見之曰我曾如此得良藥壹服差我以千緡酬之謂之千緡湯可試為之興宗得湯壹服而差

棗膏心療息賁

葶藶研細

陳皮

苦梗各等分

右後武味為末入葶藶令傷黃肥棗肉研為膏和真如  
梧子大每服伍茶元飲下 許學士云予嘗患傳飲水  
積肺經食已必噴漸喘覺肺系急服此良驗  
**神效湯**治上氣喘急不得卧

橘紅 苦梗 紫蘇 人參  
北五味子 五分

右咳咀每服肆錢水壹錢煎空陸分去滓食後服

**九寶湯**治感風伏熱一切咳嗽喘急不問高年小兒空女  
產前產後皆可服惟虛勞自汗不可服

薄荷葉 紫蘇 大腹皮洗 蘇黃欲嗽  
桑白皮 桂心 杏仁 大皮尖 陳橘皮  
甘草 各武分

右... 分大... 秋冬... 之... 復發...  
分大... 秋冬... 之... 復發...  
分大... 秋冬... 之... 復發...  
分大... 秋冬... 之... 復發...

官苟... 四七... 交上... 少年... 散皆...  
官苟... 四七... 交上... 少年... 散皆...  
官苟... 四七... 交上... 少年... 散皆...  
官苟... 四七... 交上... 少年... 散皆...

補遺... 治肺... 喘候... 不安...  
補遺... 治肺... 喘候... 不安...  
補遺... 治肺... 喘候... 不安...  
補遺... 治肺... 喘候... 不安...

方見和劑本方前夜類  
聲重亦有定喘湯但分兩不同

四磨湯治七情鬱結上氣喘急滿悶

人參 檳榔 沉香 烏藥

右四味各濃磨白沸湯取七分錢溫服

五味子湯治喘促脉伏而厥見活人書

婦人風痰積飲方論第十五 九八方

夫婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於膏膈所成也  
人皆有痰少者不能為妨多者成患但膏膈有痰飲漬於  
五臟則令眼暈亦令頭眩頭痛也

評曰夫痰之為害多因外感五邪內傷七氣  
此等者或因五邪而得者得風為風痰得寒為寒痰  
得冷為冷痰得熱為熱痰得暑為暑痰因七氣所傷者

多因婦人精血虧損

冷而成哉所以外感五邪內傷七氣皆能成痰

淡汗涕唾身中濕者故濕變而成痰也

不清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然有痰涎

飲沫四種相類宜子細詳辨調治因風而生痰者宜服

三生飲星香飲青州白二子化痰元陽丸因寒冷而得

者宜服降氣湯黑錫丹養正丹磁石丸因熱而得者宜服

金沸草散柴胡半夏湯因暑而得者消暑元陽丸因氣

宇不調鬱結而成者宜服參蘇飲四七湯二陳湯痰在

上者以瓜蒂散吐之在下者以控涎丹利之雖曰可吐

可下亦要觀人之勇怯察脉之虛實方可投之切勿不

宜痛擊其下所以初集世有金虎聖藥之戒者此也

論曰此方與...  
早方已見...

朝子...  
二...

三生飲 方見第三卷 養正丹 方見第四卷

控涎丹 方見第三卷 治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶

旋覆花 去蒂 枇杷葉 去毛 川芎 北細辛

藿香 桂心 枳殼 去穢 前胡

人參 去芦 辰砂 半夏 各半兩 甘草

羚羊角 屑 赤茯苓 各三錢

右為粗末每服參錢水煎服

服

治婦人風痰心膈

天南星 各一兩 白附子 各一兩 黃芩 各一兩 半夏 各一兩 麩 各一兩

石為細末以酒煮麩糊食如梧桐子大每服拾元生薑薄荷湯吞下

又方

半夏 天南星 各一兩 肥皂莢 一兩 生薑 二兩

右以水伍升壹同煎取公升去皂莢生薑只用半夏而

星燈乾為末以酒煮麩糊食如梧桐子大生薑薄荷湯

下七元

柴胡半夏湯治痰熱頭痛利脇除煩則手足煩熱榮衛不

調肢節拘倦身軀疼痛皆由少力飲食無味兼治五嗽痰

癥

柴胡八分 半夏 參 兩半 人參 去芦 甘草

黃芩 麥門冬 各三 白朮 兩



法入各節一項字

四針

善後... 傷風... 傷寒...

同... 傷風... 傷寒...

右咬咀每服伍錢水瑤半盞伍片棗壹枚煎至捌分去滓服

寒熱皆類傷風 寒熱比皆類傷風 寒熱比皆類傷風

荆芥穗四兩半夏 甘草 北細辛 旋覆花

右為細末每服貳錢水壹錢生薑伍片棗壹枚煎至陸分熱服未知時服

瓜蒂 赤小豆 瓜蒂 赤小豆 瓜蒂 赤小豆

右為細末取宜錢七枚煮令湯沸合先清之須臾煮作

稀糜去滓取汁和散 諸亡血虛家不可與之

半夏 白茯苓 生薑

右咬咀作壹服有滿腸間有寒痰以水貳盞煎半盞或

去滓臨卧温呷如有熱痰加炙甘草壹分加脾胃不和

如梅核在咽喉之間咯不出燕不下此七氣所為也或

嘔逆惡心並宜服之 婦人情性執着不能寬解多被七

氣所傷遂致氣填膈或如梅核上塞咽喉其者病相似

晚

絕產婦尤多此證宜服此劑間以香附子藥丸服取効切  
不可謂紫蘇耗氣且謂新產氣血俱虛不肯多服用之効  
驗不可具述

紫蘇葉 厚朴 三兩

茯苓 四兩

半夏 五兩

右咬咀每服肆錢水壹瓊半盞七片棗一箇煎至六分  
去滓熱服無時候若因思慮過當下使白濁用此藥去  
青州白元子極妙

補遺 治一切痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通

半夏 煨 四兩 南星

枳實 伏苓

橘紅 各一兩 甘草

右咬咀每四錢薑十片煎 食後服

新法半夏湯 治痰飲 治痰飲 治痰飲 治痰飲 治痰飲

佳

婦人 治痰飲 治痰飲 治痰飲 治痰飲 治痰飲

夫心胃嗜雜婦人多有吐酸... 痰涎變成痰... 是也... 嗜令人多... 用指餘... 而食... 則愈... 詳其此理是以... 歸原爾... 恰如以... 我不... 若用許學士... 治心腹中... 痰涎... 水自出... 脇肋... 脹滿... 痛... 嘈雜腸鳴多... 睡口中... 清水... 胃氣虛冷所致其... 肺... 弦... 細... 是其證也

旋覆花湯方

旋覆花

北細辛

橘紅

桂心

人參

甘草

苦梗

白芍藥

半夏 各半兩 赤茯苓 三分

中...


右以咀每服四錢水藥盡七片煎老樹分去滓油煎

尚以香煎阻半夏茯苓湯亦妙方見燕阻論中

川助服治一婦入心胃嘈雜而愈亦名茯苓補心湯

...

...



7

1