

醫方類聚卷之二百五十

小兒門 十二



大小便 二

小兒藥證直訣

消積丸治大便酸臭

丁香九 縮砂仁十二 巴豆二 皮烏梅

肉三介

右爲細末麩糊丸黍米大三歲已上三五

丸已下三二丸溫水下無時



郁李仁丸治襁褓小兒大小便不通并驚熱痰實欲得漉動者

川大黃青兩去渣皮用實者剉碎酒浸半日住乾炒為細末郁李仁

壹兩院方按粹方半兩滑石十兩細研○御藥

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二歲服三二丸更量大小與之以乳汁或薄荷湯下食前

捻頭散治小便不通

延胡索 川苦練各等分

右同為細末每服半錢或一錢捻頭湯調下量多少與之如無捻頭湯卽湯中滴油數點食前

是齋醫方

治小兒白濁都下醫者孫琳嘗以此醫一貴

人不數服而愈淡豆豉不以多少研細入

剉淨大蒜逐旋同研可元為度如菘豆大

每服十元米飲湯下

治小兒初生不飲乳及不小便葱白一寸四

破之以妳汁二合於銀石器內煎收壹合  
灌之立愈經驗良方同吳內翰曾外氏孫初生  
移時不飲乳及不小便皆驚以爲惡證取  
取外臺秘要檢之得兩證用此一方遂愈  
趙史君云其子年十餘歲因小遺爲犬所驚  
當時雖無它後旬日忽小便不通大便初  
覺自利後復如常率半月餘方壹小遺飲  
食起居間皆無所苦亦無腹脹肢體腫滿  
之患凡服通利水臟治淋澁藥並不効移

書問一醫姓劉忘其名寄三方來第一方  
用地骨皮一兩防風半兩并草壹分爲細  
末煎麥門冬湯調下不四五日卽通服之  
不已卽三日壹通終劑已兩日一通矣可  
服第二方用青皮陳皮通草之類不能盡  
記數服卽平愈第三方不曾用也

直指小兒方大小便諸證今遇此出

遺尿證治遺尿證治

小便者津液之餘也腎主水膀胱爲津液之

腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能約制其水出而不禁謂之遺尿睡裏自出謂之尿床此皆腎與膀胱俱虛而挾冷所致也用雞腸散

雞腸散

雞腸燒 牡礪灰 白茯苓 真桑螵蛸微炒

各半 兩 粹桂 龍骨各二錢半

右麤末每服一錢薑棗得效方水壹盞薑二片棗一枚煎

服

又方雞臍脰具一 雞腸燒存性○得效方加猪胞炙魚

右為末每一錢酒調下男用雌雞女用雄

雞

尿白證治

小兒尿如白米泔狀由乳哺失節有傷於脾致使清濁不分而色白也久則成疔亦心膈伏熱兼而得之用伏苓散

伏苓散

京三稜 蓬莪朮煨 縮砂仁 赤伏苓各半

兩 青皮 陳皮 滑石 甘草 微炙各二錢半

右末每服一錢麥門冬燈心煎湯調下 得效

同方

又方大甘草頭煎湯服 得效方同

大便不通證治

沒藥散治小兒風與滯血留蓄上焦胃膈高

起大便不通

沒藥 大黃 枳殼 炒 北梗 各二錢 木香

甘草 炙各一錢

右對每壹錢薑二片水 得效方煎服

保童秘要 水介類

身熱不小便諸方 或吐瀉干大豉熨長持

大黃 桑皮 葶藶 葵子 各壹分 朴消

大湯成通草 各二分 下 淋李 大黃

右切以水五合煎取二合半服之

又取滿石 二分 葵子 一分 葶藶 一分 大通草 一分 大小

右以水五大合煎取二合半去滓服之

體熱漸羸瘦大便青結 或山

驚甲 大黃 升麻 各壹分 常山 壹分 杏仁 大竹葉

切半

右切以水四大合煎取壹大合隨兒大小

以意加減之 大合煎取二合半

又方 人參 驚甲 各二分 郁李仁 別搗 大黃

梔子 黃芩 各三分 甘草 壹分

右為末蜜和為丸如梧子大壹歲兒每服

五丸溫水化破下

大便不通諸方 世二引水一益煎服

大黃 二分 枳殼 半片 厚朴 壹分 朴消 三分

右以水四大合煎取二合下朴消去滓三

歲已下當日分作兩服與喫

又方 大黃 五分 枳殼 梔子仁 郁李仁 別搗 麻

仁 別搗各三分

右為末蜜和為丸如梧子大三歲已下每

服七丸溫水研化下

尿血諸方 月煎服

紫菀 甘草 大黃 連翹 各壹分 葱鬚 兩 淡豉 一匙

右切以水六大合煎取三合半去滓三歲  
已下壹日與服盡

又方甘草

五分

右以水六大合煎取三合去滓三歲已下

一日與服盡

衛生易簡方水六合煎二

或

入少許朴消尤妙

又方蜀升麻

五分

右以清水五合煎取二合去滓三歲已下

壹日服盡

備預百要方壹歲日一服

小腸熱尿後時有鮮血諸方

黃芩

甘草

炙

升麻

大黃

黃耆

各一分

生地黃汁

壹合湯成下

右以水五大合煎取壹合半下地黃汁去

滓三歲已下

又方赤小豆

壹合炒令紫色

蜀當歸

半

右為末每服歲兒壹日與三錢以蜜水調

服之

大便色青方夫大便色青者亦數數腹內疼

痛蓋腸虛冷而致也

白朮 芍藥各二分 當歸 黃連 茯苓各三分

右為末蜜和為丸如梧子大每日空腹壹歲兒以米飲研化五丸與服之

澹軒方

初生不飲乳不小便

葱頭壹寸四分開乳汁先按二合來銀石器中煎取半溫溫灌盡莫遲回

白濁

小兒白濁病胡然淡豉還同大蒜研恰好細淋元如菉豆米湯吞下十來元

肘後方

卒不得溺取垢灰二刀圭以酒若米飲服

又方髮灰以酒下之

又方以少許鷄子白亦佳

治大便不通蜂窠刀圭酒服

治小兒大便不通猪苓壹兩以水少許煮雞



尿白壹錢調服立差

千母祕錄治小兒大小便不通露蜂房燒末

酒服三錢衛生易簡方一錢日再服

藥性論云主小兒卒不尿安插於臍上灸之

備預百要方此

拔粹方

郁李丸治襁褓小兒大便不通小便澀滯并

驚熱痰實欲得溘動者方見小兒藥證直訣合發

瀉青丸方見傷寒瀉白丸方並見瀉黃丸方並見

握宜丸治小兒大小便難嘔吐藥食不下命

在頃刻

巴豆壹錢硫黃半檳榔長薑小附子

甘遂各等分

右為細末藥米飯和丸棗豆大用椒湯洗

小兒男左女右手握之用絲裹定看行數

多少置藥洗去不用柳並香藥木

醫方集成

御藥院方氣散治脾肺氣逆喘嗽面浮胃

隔痞悶小便不利

桑白皮

南北經驗方

桔梗

甘草

各壹兩

皮

去白

赤茯苓

去皮

藿香葉

半兩

木通

右咬咀

每服二錢水小盞姜二片煎服

和劑方八正散治心經積熱大小便秘結北南

經驗方袖珍方同方見大方科諸淋門

湯氏方木香散治心經伏熱小便不通

牽牛子

半兩

木通

壹兩

滑石

壹兩

右爲末燈心葱白煎服

南北經驗方袖珍方同

永類鈴方

小兒小通不通心氣積熱并於小腸經速用

生大地龍數條蜜少許研傅莖卵仍燒蠶

紙蛻紙灰存性朱砂腦十射香同研煎麥門

冬燈心湯調服

初生不乳小便難乳汁四合葱白壹寸煎灌

之初生小兒谷道無穿不得通利此肺經結

熱閉於肛口乾燥而合須用金玉簪子刺之

尤勝火筋攻刺以蘇合香內孔中此通變之

說耳或服洗心散或四順飲加荆芥以疎利  
之  
便血證治  
演山口議兒生七日之內大小便有血出者  
由胎氣熱盛或母食酒麪炙煨醃穢流入心  
肺兒在胎受之熱毒亦傳心肺且女子之臟  
其熱即入心故小便有之男子之臟其熱即  
入於肺故大便有之或淡如坯水或血加鮮  
又不可謂熱過服涼劑其血愈甚只以生地

黃根取研自然汁五七匙酒三匙蜜半匙和  
勻溫溫與服移刻安愈或和劑甘露飲兼服  
男女一同

保嬰槐花散

- 荆芥穗
- 槐花
- 制枳殼
- 甘草

右爲末蜜湯調治熱便血

胃風湯枳殼煎治久新冷便血壹方茶箸葉  
或椽斗子合白梅各燒灰存性米湯下  
鄭氏五倍元治小兒大便下血如腸風臟毒

五倍子焙為末蜜元小豆大米湯化下  
經驗良方

小兒大小便不通有甘草木通梔子仁等分  
為粗末水壹大盞燈心壹莖連根葱白七  
个煎半盞服

雞腸散治小兒尿床睡裏自出不覺

雞腸草

牡蠣

煨各七錢半

麥門冬

去心 龍骨

桑白皮

白茯苓

各半兩

右為細末每服壹錢水半盞姜棗煎服無

時大少

又方用破故紙炒為末煮芡實煎湯調下壹  
錢芡實雞頭子是林

治小兒尿床及治產婦後損脬遺尿不知出

豬脬各豬肚各糯米各白

右將糯米入脬內又將脬入豬肚內爛煮

搥椒調勻如飲食日常服不過數次效能

補脾暖下元水二三三十式日三服

衛生易補方

治小兒睡中遺尿川桂末雄雞肝等分搗丸  
如小豆大溫水下二三十九日三服

大小便食治

聖惠方

治小兒小便不通肚痛漿水葱白粥方

粟米

二合

葱白

三七莖去  
鬚細切

右件以漿水煮作稀粥臨熟投葱白攪令  
勻溫溫食之

大小便鍼灸

千金方

治小兒尿血方灸第七推兩傍各五寸隨年  
壯

治小兒遺尿方灸臍下壹寸半隨年壯  
又灸大敦三壯亦治尿血

淋病

目錄

天分大第三根亦皆氣血

下分大第三根亦皆氣血

淋

淋小兒氣血沈危帶下淋前附各正下開平

下分大

目錄

諸淋

論

附效方

千金方

葵聖惠方

藥液始

治小兒諸淋諸方

石鷲丸 石葶散 車前子散 滑石散

木通散 石葶散 干蟾牛子丸 軍前子

散 榆白皮散 淋諸方

治小兒石淋諸方

葵子散 滑石散 雞糞白散

治小兒血淋諸方

犀角屑散 冬葵子散 露蜂房灰散

直指小兒方 車前子散 諸淋證治

諸淋證治

葵子散 導赤散

保童秘要

得效方

淋閉

目錄

導赤散 順經散

肘後方

省翁活幼口議

治諸病雜方

石韋散 犀灰散 薑黃散

永類鈴方

五漿散 三白散

備預百要方

小兒雜方 藥性論 齊民要術 本草

本草綱目卷之二十一

十一

餘藥無名者散見木方

水瀉

下利

巢氏病源

氣淋候

氣淋者腎虛膀胱受肺之熱氣氣在膀胱膀胱則脹肺主氣氣為熱所乘故流入膀胱膀胱與腎為表裏膀胱熱則氣壅不散小腹氣滿水不宜利故小便澁成淋也其狀膀胱小腹滿尿澁常有餘瀝是也亦曰氣癃診其少陰脉數者男子則氣淋也

熱淋候

本草綱目

十一



熱淋者三焦有熱氣傳於腎與膀胱而熱氣流入於胞而成淋也

### 血淋候

血淋者是熱之甚盛者則尿血謂之血淋心主血血之行身通徧經絡循環腑臟其熱甚者血即散失其常經溢滲入胞而成血淋矣

### 寒淋候

寒淋者其病狀先寒戰然後尿是也小兒取冷過度下焦受之冷氣入胞與正氣交爭寒

氣勝則戰寒正氣勝則戰寒解故得小便也  
十形三療

### 沙石淋

酒監房善長之子年十三病沙石澀已九年矣初因瘡疹余毒不出作便血或告之令服太白散稍止後又因積熱未退變成淋悶每發則見鬼神號叫驚隣適戴人客鄧瑤寺以此病請戴人曰諸醫作腎與小腸病者非也靈樞言足厥陰肝之經病遺溺閉癢閉謂小

洩不行癰爲淋瀝也此乙木之病非小腸與  
腎也木爲所抑火來乘之故熱在脬中下焦  
爲之約結成沙石如湯瓶煎煉日久熬成湯  
鹵今夫羊豕之脬吹氣令滿常不能透豈真  
有沙石而能滿者邪以此知前人所說服五  
石丸散而致者恐未盡然內經曰木鬱則達  
之先以芫蕪散越之次以八正散加湯鹵等  
分頓啜之其沙石自化而下

又屨村張氏小兒年十四歲病約壹年半矣

得之麥秋發則小腸大痛至握其峻跳躍旋  
轉號呼不已小洩數日不能下下則成沙石  
大便秘澁肛門脫出壹二寸諸醫莫能治聞  
戴人在朱葛寺避暑乃負其子而哀請戴人  
戴人曰冷日冷今日效時日在辰巳間矣以  
調胃承氣僅一兩加牽牛頭末三錢汲河水  
煎之令作三五度咽之又服苦未丸如芥子  
許六什粒將加哺上涌下泄晝時齊出有膿  
有血涌瀉既覺定令飲新汲水壹大盞小洩

巴利膏二次矣是夜凡飲新水二三十遍病  
去九分止哭膏次明日困卧如醉自晨至暮  
猛然起走索食於母歌笑自得頓釋所苦繼  
與太白散八正散等調壹日大差恐暑天失  
所養留五日而歸戴人曰此下焦約也不吐  
不下則下然何以開不令飲水則小溲何以  
利大抵源清則流清也  
又栢亭劉十三之子年六歲病沙石淋戴人  
以苦齊三涌之以益腎散三下之立愈

千金方

治小兒淋方車前子壹升水二升煮取壹升  
分服○聖惠方治小兒諸淋水道中澀痛  
車前子壹兩右件藥搗細羅爲散每服壹錢  
以水壹小盞煎至五分去滓不計時候量  
兒大小分減溫服  
又方煮冬葵子汁服之○聖惠方冬葵子壹兩  
右搗麤羅爲散每服壹錢以水壹小盞煎  
至五分去滓不計時候量兒大小分減溫

服

又方取蜂房亂髮燒灰以水服壹錢七日再  
○聖惠方治小兒諸淋澀心煩悶亂露蜂  
房亂髮已上各壹兩右件藥都燒為灰細研為  
散每服以溫水調下半錢日三四服量兒  
大小以意加減

聖惠方

治小兒諸淋諸方  
夫小兒諸淋者由腎與膀胱熱也膀胱與腎

為表裏俱主於水水入小腸下脬行於陰為  
小便也腎氣下通於陰水液之道路也膀胱  
為津液之腑津液內溢而流於腎水道不通  
水不上不下停積於脬腎氣不通於陰腎熱  
其氣則澀故水道不利小便淋澀故謂為淋  
其狀小便出少起數小腹急痛引臍是也又  
有石淋氣淋熱淋血淋寒淋勞淋膏淋諸淋  
形證殊異主療不同今各以其方治之者故  
謂之諸淋也

治小兒諸淋臍下妨悶心神煩熱石驚丸方

石驚細研 蘧麥 梔子 人參 滑石細研 木通剉

葵子 海蛤細研已上 各半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大每

服以葱白湯下七丸日三四服量兒大小

水以意加減

治小兒諸淋澀水道中痛臍下痞滿石韋散

方 石韋去毛 葵子 木通剉 赤茯苓 車前子

蘧麥 榆白皮剉已上 滑石壹兩

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小

盞入葱白五寸煎至六分去滓分為二服

如人行十里再服量兒大小以意加減

治小兒諸淋澀不通車利子散方

車前子 滑石已上各半兩

右件藥搗細羅為散每服以清粥飲調下

半錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒諸淋澀每尿之時叫啼不出滑石散

方

滑石兩半 甘草壹分 川朴消三分

右件藥搗細羅為散每服以葱白湯調下  
半錢日三四服量兒大小以意加減

治小兒諸淋及熱結赤澀不通木通散方

木通壹分 桑根白皮壹分 滑石兩半 冬葵子

一分 川芒消一分

右件藥搗細羅為散每服以葱白湯調下  
半錢日三四服量兒大小以意加減

治小兒諸淋澀痛不利石韋散方

石韋去毛 赤芍藥 川大黃剉微 麥門冬去心

焙甘草炙微 川升麻 川朴消已上各一分

右件藥搗羅羅為散每服壹錢以水壹小  
盞煎至六分去滓不計時候量兒大小分  
減服之

治小兒諸淋澀臍不連兩膀胱妨悶及大腸  
氣壅牽牛子丸方

牽牛子微炒 川大黃剉微 川升麻 郁李仁

治小兒諸淋澀心煩悶亂車前子散方

湯浸去皮川朴消已上各滑石壹兩海蛤壹兩細研

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大每服以溫水研下七九日三四服量兒大小以意加減

治小兒諸淋澀心煩悶亂車前子散方

車前子 石鸞 麥門冬各半兩

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服

又方冬葵子壹兩蓬麥半兩

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至六分去滓不計時候量兒大小分

減溫服

又方小麥壹兩葱白兩莖

右件藥都以調壹大盞煮取五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

治小兒諸淋水道中澀痛榆白皮散方

榆自皮

剉 蘧麥 已上各一兩

右件藥擣麤羅爲散每服壹錢以水壹小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

又方右取臘月猪脂鍊過去滓每服壹栗殼大用暖酒壹合研攪令勻空心間午各一服更量兒大小分減服之  
又方右取小豆葉搗絞取汁每服壹合量兒大小分減服之

### 治小兒石淋諸方

夫小兒石淋者爲小便中出石也腎主於水水結則化爲石故巢氏病源此下腎爲熱所乘熱則成淋其狀小便莖中痛尿不能出時小便痛引膀胱裏急巢源此下云砂石甚者水道塞痛令悶絕也

治小兒石淋水道中澁痛不可忍葵子散方

冬葵子

石南

榆白皮

剉

石韋

去毛

木通

剉已上

滑石

膏兩各半兩

細研





雞糞白 壹兩炒  
黃

右件藥搗細羅為散以水一大盞露一宿  
每服用此水一合調散半錢服之日三四  
服當下砂石量兒大小以意加減

又方遠麥 兩一

右搗細羅為散每服以溫酒調下半錢日  
三四服量兒大小以意增減

又方桃膠 兩半

右以熱湯一中盞化膠令消去滓量兒大

小分減頻服

又方車前子 半兩  
搗碎

右以水一中盞煎至六分去滓量兒大小

又分減頻服

夫治小兒血淋諸方大小分減頻服

夫小兒血淋者是熱淋之甚則變成血淋也

心主於血血之行身通於膀胱而熱氣流入

於膀胱血淋矣

治小兒血淋澀痛心躁體熱犀角屑散方藥

犀角屑 黃芩 石韋去毛 常歸剉 赤芍藥

半兩 各蒲黃壹兩

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小  
夫蒸入生地黃半分青竹茹半分煎至六分  
去滓不計時候量兒大小分減服之

又方車前子 茅根剉各壹兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小  
蒸入生地黃一分煎至六分去滓不計時  
候量兒大小分減服之

治小兒血淋不止水道澀痛冬葵子散方

冬葵子剉 蒲黃各半兩

右件藥以水一大盞入生地黃半兩煎至  
六分去滓不計時候量兒大小分減服之

治小兒血淋日夜淋瀝小腹及陰中疼痛露

蜂房灰散方

露蜂房灰壹分 亂髮灰壹分 滑石壹兩 海蛤半兩

右件藥都細研為散不計時候以溫水調  
下半錢量兒大小以意加減

又方榆白皮

剉

蘧麥

蒲黃

已上各半兩

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至六分去滓不計時候分溫二服

又方車前葉汁

壹

冬瓜汁

壹

蜜一合

右件藥相和令勻看兒大小分減服之

又方石韋

壹兩去毛

白膠

半兩炙

戎塩

半兩

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服

又方牯牛陰聚毛

燒灰

右件藥細研不計時候以粥飲調下半錢

量兒大小加減服之

又方蜥蜴

一枚燒灰

右件藥細研為散不計時候以

下半

錢量兒大小加減服之

直指小兒方

諸淋證治

葵子散治小兒諸淋

搏效方兼小便不通

葵子 車前子 木通 蓬麥 桑白皮

炒赤茯苓 山梔仁 甘草微炙

右剉每壹錢井水小盞葱白二寸煎七分

食前溫服

導赤散治小兒血淋

生乾地黄 木通各二錢 黃芩 甘草生各一錢

右為末每服壹錢井水入燈心煎服仍以

米飲調油髮灰空心灌下

尿血方

生蒲黃 生地黃 赤茯苓 甘草微炙

右剉每壹錢水小盞煎七分調髮灰食前

服得效

保童祕要

淋諸方

滑石二分 甘草六分 葱白三 朴消三分 湯成下

右以水五合煎取三合去滓服之

又方痛草 桑皮 芒消各三分 滑石 葵子

各二分

右以水五大合如前法

又方嚼揅末封臍效  
得效方

淋閉

導赤散治血淋仍以米飲調油髮灰少許空

心灌下 方見諸熱

順經散治十餘歲因驚之候心氣下行小便

淋瀝日夕三四十次漸覺黃瘦宜服

韭子 炒琥珀研 益智 去殼炒 金毛狗背 去毛白

茯苓 去皮石熱子 火煨醋淬研 石韋 去毛 壹錢

布為末每服一錢韭湯調日二服

時後方

孫真人備急方治孩子淋疾榭葉三片煎湯

服壹鷄子小便當時下

省翁活幼口議

惡毒治諸病雜方

治小兒熱淋沙淋石淋石韋散方

石韋 去毛 海金沙 木通 滑石

右爲末水小盞煎至半通口服

治小兒心經虛熱小便澀痛簡管內疼不可

忍者犀灰散方

蠶蛻紙

不拘多少

右燒留性爲末人麝每服半錢七燈心湯

調

薑黃散治小兒血淋方

薑黃爲末

右每服半錢用紅酒調下連二三服以通

爲度

永類鈐方

小兒諸淋并小便出血陰莖中痛右以桃膠

膏塊如棗大水半錢煎三分服下石子如

豆不盡止一法炒塩帛包熨臍腹加生

葱入炒更佳一方琥珀爲末燈心湯調

立效

鄭氏治小兒小便淋瀝不通

鬱金 海金沙

滑石

甘草

各等分

右爲末三歲乙錢燈心木通湯調下冬瓜  
最治小便不通并渴

五漿散治小便不通莖中淋痛心燥煩渴

滑石乙兩甘草二錢

右爲末三歲壹錢燈心湯下

和劑三白散小兒膀胱蘊熱風濕相乘陰囊  
腫脹大小便不利

白牽牛二兩桑白皮 白朮 木通去節淨陳

皮各半兩

右爲末姜湯空心服

備預百要方

小兒雜方

小兒淋疾方椽葉三片煎服

小兒石淋方牡牛陰頭毛燒末以醬壹服壹

刀圭膏刀圭如豆大



氏主

小泉  
小泉  
小泉  
小泉

小泉

小泉

諸痢  
附泄瀉  
脫肛  
白濁  
目錄

論  
香  
骨  
黃

青  
汗  
金  
方  
會  
此

小兒痢  
此

龍頭  
溫中湯  
溫中大黃湯  
黃蘗

湯  
治中結腸  
圓  
梔子圓  
藜蘆圓

四物梁米湯  
竜骨湯  
大黃湯  
生金

牛蒡湯  
澤漆菜萸湯  
枳實散

海止仙方  
散

小兒瀉痢

食醫心鑑 蘇宋煎散 珠寶煎

四聖惠方 蘇宋煎散 大黃散 止金

治小兒脫肛諸方 下圓 藥丸

龍頭散 附子散 赤石脂散 黃藥

治小兒疳痢諸方

青黛散 神聖散 盧會丸 麝香丸

木香丸 龍骨丸 熊膽丸 黃連散

青黛散 煞疳丸 青黛丸 白龍骨丸

肉荳蔻丸 砒霜丸 丁香丸 麝香丸

肉荳蔻丸 砒霜丸 丁香丸 麝香丸

治小兒疳痢久不差諸方

青黛散 胡黃連散 黃連散 蠟牛散

竜骨散 白礬丸 朱砂丸 蟬殼丸

龍膽丸 夜明砂丸 殺疳丸 砒霜丸

麝香丸 燕黃丸 盧會丸 蘇宋煎散

蘇宋煎散 治小兒痢渴不止諸方 蘇宋煎散

黃耆散 黃芩散 當歸散 龍骨散

藍葉散 地龍糞散 地榆散 黃連散

檉皮散 烏梅散 骨草散 訶梨勒散

天竹黃散 桃白皮散 黃芩丸 楮葉

湯 治小兒疳痢腹痛諸方

白朮散 草薺散 附子散 木香丸

治小兒赤白痢諸方

白朮散 地榆散 訶梨勒散 地榆散

鹿茸散 三骨散 當歸丸 訶梨勒丸

鹿角丸 蚺蛇膽丸 香連丸

治小兒久赤白痢諸方

黃連散 丁香散 真蘖丸 木香散

肉豆蔻散 黃丹丸 龍骨丸 朱砂丸

治小兒洞泄下痢諸方

厚朴散 蜜陀僧丸 龍骨丸 三聖散

如聖散 黃連丸 治小兒水穀痢諸方

厚朴散 調中散 地榆散 神效木香

散 竜骨散 椽子散

治小兒無辜疳痢諸方

朱砂散

胡粉散

乾蟾丸

漏蘆丸

煮肝散

小兒門 十三

諸痢二

聖惠方 二

治小兒熱痢諸方

梔子人散

犀角散

烏梅散

白頭翁

散 當歸散

龍骨散

丁香散

艾葉

散

吳茱萸丸

乳香丸

附子丸

醋

石榴皮散

麝香丸

治小兒冷熱痢諸方

犀角散

訶梨勒散

石榴皮煎

烏梅

散 黃連丸

治小兒血痢諸方

黃連散

羚羊角散

茜根散

沒石子

散

地榆散

犀角散

治小兒膿血痢諸方

吳藍散 樗根皮散 人參散 雞屎糖

丸

治小兒暴痢諸方

胡黃連散 乾薑散 黃連散 甘草散

竜骨散

治小兒一切痢久不差諸方

當歸散 人參散 木香散 青金散

黃丹散 蜜陀僧散 鹿角散

治小兒曩痢諸方

肉豆蔻散 厚朴散 黃連丸 通玄丹

治小兒蠱毒痢諸方

蘘荷散 黃連散 犀角散

治小兒久痢羸瘦諸方

蕪荑散 桔梗丸 雄黃散

治小兒疳痢下部濕蟻諸方

丁香散 麝香丸 黃丹丸

治小兒久痢脫肛諸方

龜頭散 黃連丸 鼈甲丸

和劑局方

進食圓 香連圓 開胃圓 沒食子圓

助胃膏 當歸圓 豆蔻香連圓 木香

白朮散 附子散 小黃連阿膠圓 小

駐車圓

小兒藥證直訣

如聖丸 白附子香連丸 豆蔻香連丸

小香連丸 二聖丸 沒石子丸 溫白

丸 溫中丸 史君子元 青金丹 黃

蘖丸

大全本草

三因方

水聖散子 麻麻圓 香連圓

助道方

白朮治小兒冷熱泄痢證

是齋醫方

白龍元

白瑣碎錄

易簡方

白朮散小兒令熱時麻痘

簡易方

雙金圓干和潤圓 香連圓

直指方

敗毒散本草

直指小兒方

此泄瀉證治史氏十五 普金丹 黃

鍾乳震靈丹 木香益黃散 肉蔻散

和安散

木香瀉痢證治

脫肛證治

竜骨散

朱氏集驗方

藿香散 塌氣丸 地榆散 豆蔻散

修月魯般經後錄

三法六門散

益黃散 香連丸

保童秘要

銀液丹

省明論

厚朴散

御藥院方

木香豆蔻丸

得效方

泄瀉

木香豆蔻丸

豆蔻丸

安神圓 小驚圓 白朮散 白朮散

蟾酥圓 史君餅 消積圓 益黃散

平胃散 縮砂香附湯 五苓散 通心

飲 勻氣散 白朮散 觀音散 益黃

散 五苓散 南星散 金液丹 理中

湯 豆蔻散 和安散 枇杷葉散 回春

復丹 養臟湯 香連圓 震靈丹 香

葛湯

下痢



地榆散 小黃連阿膠圓 四生散 大

柴胡湯 木香散 朴附圓 香連圓

養臟湯 小駐車圓 嬰粟飲 石蓮散

真料參苓白朮散 等住圓 駐車圓

感應元 靈砂元 牛乳湯

脫肛

釣腸元 瓜萘圓 龍骨散 紫葳膏

澹軒方

腸頭出

肘後方

白頭公丸 雞子餅 雞子湯

衛生寶鑑

益黃散

聖濟總錄

鉉丹散 青金散 百中湯 訶梨勒散

烏梅丸 阿膠丸 龍骨散 竜齒散

丹砂丸 熊膽丸 肉豆蔻丸 使君子

丸 六神丸 厚朴丸 麝香丸 香蘭香

散 大疔丸 至聖丸 黃連木香丸  
 安神散 沉香煎 胡黃連丸 葇蓉丸  
 胡黃連丸 驚甲散 丁香丸  
 小兒疳痢久不差  
 豬鬃膽丸 雄黃散 蟬蛻丸 救急散  
 當歸湯 丁香散 胡粉散 麝香丸  
 丁香散 龍骨散 黃連散 玉靈脂散  
 異效散  
 拔粹方

五倍子散 木香丸  
 醫方大成  
 訶子湯 六神圓 四柱散 木香散  
 紫霜元 香連元 木香散 水煮木香  
 元 木香元 胃風湯 真人養臟湯  
 赤石脂散  
 南北經驗方  
 厚朴散 人參散  
 省翁活幼口議

痢疾證候方議

豆蔻散 生熟飲子 鷄青圓 大效至

聖千金飲子 大艾煎圓 白餅子 木

柴麩 鷄青圓 香脯

泄瀉證候方議

殭腸散 契聖既濟丹 木附湯 茶連

圓

永類鈴方

泄瀉證治

益黃散 觀音散 香朴飲子 消食元

和胃元 感應元 白龍元 附苓元

半硫元 人參膏 參朮散 醒脾散

二順散 人參黃芪散 木參苓白朮散

震靈丹 六和湯 理中湯 胃苓湯

來復丹

八痢證治

蘇感元 小柴湯 黃連香薷散 正氣

散 四君子湯 養臟湯 雞蠟元 小

津元 石蓮散 桃花元 沒石子圓

香連元 艾薑元 神仙斷下元 六神

元 升麻葛根湯 流氣飲 薑茶散

艾葉湯

經驗良方

抵聖散 沒石子圓 木香散

小兒門 十四

諸痢 三

醫林方

妙應丸 珍珠丸

煙霞聖效方

施圓端效方

定粉散 翠湖散

小吳氏集驗方 瓜散 降淋散 養胃散

木驚子圓 益胃散 四胃散 水瀉散

武新效方 茵陳散 木甘草散 養神散

金玉機微義 痘毒 豆蔻香散 二聖

白朮散 異功散 益黃散 沒石子丸

五苓散 羌活膏 溫白丸 回生散

金液丹 玉露散 豆蔻香連丸 二聖

丸 羌活黃芩蒼朮甘草湯 茯苓半夏

湯 升陽益胃湯 助胃膏 水浸丹

小香連丸 胃風湯 訶梔散 挑花丸

瀝腸丸 厚腸丸

壽域神方

衛生易簡方

金匱鈎玄

備預百要方

餘藥無名者散見本方

食治

禁忌

鍼灸



變眼痛生障下焦偏冷熱結上焦熏於肝故也  
也  
非也利後虛羸候  
腸胃虛弱受風冷則下利利斷之後脾胃尚  
虛谷氣猶少不能榮血氣故虛羸也  
春則赤白滯下候  
小兒體本挾熱忽為寒所折氣血不調大腸  
虛弱者則冷熱俱乘之熱搏血滲腸間其利  
則赤冷搏腸津液凝其利則白冷熱相交血

滯相雜腸虛者泄故為赤白滯下也

赤利候

小兒有挾客熱客熱入於經絡而血得熱則  
流散滲入大腸腸虛則泄故為赤利也

冷利候

小兒腸胃虛或解脫遇冷或飲食傷冷冷氣  
入於腸胃而利其色白是為冷利也冷甚則  
利青也

卒利候

小兒卒利者由腸胃虛暴為冷熱之氣所傷而為卒利熱則色黃赤冷則色青白若冷熱相交則變為赤白滯利也

久利候

春傷於風至夏為洞泄小兒春時解脫為風所傷藏在肌肉至夏因為水穀利經久連滯不瘥也凡水穀利久腸胃虛易為冷熱得冷則變白膿得熱則變赤血若冷熱相加則赤白相雜利久則變腫滿亦變病墜亦令嘔噦

皆由利久脾胃虛所為也

重下利候

重下利者此是赤白滯下利而挾熱多者熱結肛門利不時下而久嘔氣謂之重下利也

熱利如膏血候

此是赤利腸虛極腸間脂與血俱下故謂利如膏血也

小利兼渴候

此是水穀利津液枯竭腑臟虛燥則引飲若



小便快者利斷渴則止若小便澀水不行於  
小腸滲入腸胃渴亦不止利亦不斷凡如此  
者皆身體浮腫脾氣弱不能尅水故也亦必  
眼痛生障小兒上焦本熱今又利下焦虛上  
焦熱氣轉盛熱氣重肝故也

和劑指南

論小兒痢疾證

赤白痢或泄瀉者可與小駐車圓益黃散胃  
風湯香連圓久不止者每遇欲下痢先須

腹痛次下痢痢了其腹痛漸止者恐有冷積  
先服感應圓挨積圓磨積圓紫霜圓次與前  
件痢藥或渴者兼服參苓白朮散人參散不  
能飲食者先與異功散助脾次服治痢藥  
血痢者可與地榆散次服黃連阿膠圓胃風  
湯小香連丸久不止者有積欲下痢時兜  
腹痛次下痢可與感應圓挨積圓紫霜圓之  
類次服前件下痢藥

小兒藥證直訣

病篤訣安黃承務子二歲病瀉衆醫止轉十  
餘日其證便青白乳物不消身涼加哽氣昏  
睡鑿謂病困篤錢氏先以益脾散三服補肺  
散三服三日身溫而不哽氣後以白餅子微  
下之又與益脾散三服利止何以然利本脾  
虛傷食初不與大下措置十日七實下虛脾  
氣弱引肺亦虛補脾肺病退卽身溫不哽氣  
是也有所傷食仍下之也何不先下後補曰  
便青爲下藏冷先下必大虛先實脾肺下之

則不虛而後更補之也

治病兩法

久瀉不止

夫小兒久瀉不止者至八九月間變爲秋深  
冷利瀉泄清白時復撮痛乳瓣不化可用養  
脾丸丸如黍米大每服二三十九米飲下日  
三服則愈若治芻蕘之兒萬舉萬全富家且  
宜消息  
治法雜論

凡小兒水泄不止可用五苓散與益元散各  
停用新水調下三二錢頻服不拘時候若暴  
速注下甚者屬火涼隔通聖亦然治之用者  
勿輕非深於造化者未易此語  
此水煎可  
澹察方  
小兒暑月多瀉者一則伏暑心藏熱小水不  
利清濁不分因成泄瀉可服五苓散或大順  
散二藥皆用沸湯調若小水快而瀉者冷瀉  
也宜於六神散內加附子煎服若肚大瀉色

白者疝瀉也宜服官局六神圓瀉者不可急  
以熱藥止之若以熱藥止之便變成痢凡痢  
者皆因有積赤痢熱積也白痢冷積也赤白  
痢冷熱不調之積也赤多白少者熱多而冷  
少也白多赤少者冷多而熱少也  
小兒糞青此脾虛生風之證也脾屬土其色  
黃糞黃則是脾家正色今乃青肝木剋脾也  
肝屬木其色青肝盛脾虛受肝之剋故糞青  
也當服益脾去風藥如半硫圓加白附子蝎

將可以治之雖然小兒青糞拋下便青者是  
風冷也良久然後青者非病也小兒糞自然  
如此  
省翁活幼口議

議痢熱

凡小兒患痢之時未熱久則氣虛其臟腑虛  
極作熱此屬惡候纔見痢後作熱此兒臟腑  
虛弱同於虛熱主治其或三焦熱引飲不歇  
四肢脞腫者理宜溫補臟腑散除濕氣喘則

難凡痢熱疳熱吐瀉熱並不可發散退熱不  
任寒涼藥但理其病源調其臟腑和其榮衛  
生其胃氣令進飲食次與痢藥服之參酌赤  
白多少膿血相雜裏急後重用行血厚腸胃  
和中脘溫臟腑其熱自然退愈凡兒患痢不  
問輕重悉禁葷腥冷熱炙煨醃鹹應毒之物  
若恣口腹愈而腹作若也求安須用戒絕之  
矣  
議曰幼幼患痢悉由積毒而受虛熱而發

三焦不和五臟蘊伏冷熱相攻陰陽反逆  
是以作疾腸胃洞虛所言正患之時不熱  
稍愈其體溫壯衆莫能知此等皆由勞其  
形役其氣食其毒觸其臟餘毒不化所以  
作熱隱伏於百脉經絡之間無由歸本若  
更逐抑何得而安所用正氣調胃智者默  
而唯然疴痢之熱安自內和若利則上下  
氣相承表裏相順使飲食以自然而然行  
坐以快樂而樂是謂和矣其或蹙眉垂首

控腹揉臍撼體拘攣焦唇煩躁皆由不和  
也所欲和者食飼粳粟藥餌參苓葱湯滌  
肚卧避風濕仍常以調胃散與服雖疾無  
加惟熱必愈能禁能戒且安且樂而也  
千金方  
小兒痢  
鼈頭圓治小兒積冷久下後餘脫肛不瘥  
腹中冷肚中疼痛不得入者方  
死鼈頭 二枚炙 小蛭皮 壹枚炙 磁石 四桂

心三

右四味為末蜜丸如大豆兒三歲至五歲

服五丸至十九日三兒年大以意加之

溫中湯治小兒夏月積冷洗浴過度及乳母

亦將冷洗浴以冷乳飲兒兒壯熱忽值暴雨

涼加之兒下如水胃虛弱則面青肉冷眼陷

乾嘔者宜先與此調其胃氣下即止

乾姜 厚朴 各一分 當歸 桂心 甘草 各一分

人參 茯苓 白朮 桔梗 各二分

右丸味咬咀以小二升煮取九合六十日

至百日兒一服二合半餘皆隨兒大小

溫中大黃湯治小兒暴冷水穀下或乳冷下

青結不消或冷實吐下乾嘔煩悶及冷滯赤

白下者良若已服諸利湯去實胃中虛冷下

如水乾嘔眼陷煩擾不宜利者可除大黃若

中乳乳母洗浴水氣未消飲兒遂為霍亂者

但用大黃小兒諸霍亂宜利者使用大黃不

須利宜溫和者除之

大黃分桂心 厚朴 甘草 乾姜各壹分

人參 茯苓 白朮 當歸各壹分 桔梗三分

右十味以水二升半煮取八合凡兒三十

日至六十日一服二合七十日至壹百日

壹服二合半二百日已來壹服三合

黃蘗湯治小兒夏月傷暴寒寒折大熱熱入

胃下赤白滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩

此太陽之氣外傷寒使熱氣使人胃服此方

良若誤以利藥下之或以溫脾湯下之則熱

劇以利藥下之便數去赤汁如爛肉者或下  
之不瘥宜以溫熱藥斷之下既不止倍增壯  
熱者服之即效或是溫病熱盛復遇暴寒折  
之熱入腹中下血如魚腦者服之良方

黃蘗 黃連 升麻 白頭翁一作當歸

牡蠣 石榴皮 黃芩 寄生 甘草各

分犀角 艾葉各壹分

右十二味咬咀以水三升煮取一升二合  
百日兒至二百日一服三合二百餘日至

其歲壹服三合半

一則三合二百符日正

治中結腸圓斷冷滯下赤白青色如魚腦脫  
肛積日腹痛經時不斷者方

赤石脂五分吳茱萸三分乾薑一分附子一分甘當歸

厚朴一分白朮一分木蘭皮一分白頭翁一分黃連

石榴皮一分黃蘗一分各二分

右十二味為末蜜丸如大豆五歲兒服並  
丸三歲已上服十九十歲已上五丸暴  
下者服少許便瘥積下者盡壹劑更合

梔子圓治小小熱痢不止方

梔子七枚大棗四枚黃蘗三分黃連五分礬石四分

右五味為末蜜丸如小豆木服五丸日三

夜二服不知稍加至十九

藜蘆圓治小小泄清痢方

藜蘆二分附子壹分黃連一分

右三味為末蜜丸如麻子大以粥飲服二

丸立驗

四物梁米湯青親養老書治小小泄注方



梁米 稻米 黍米 各參升○蠟如彈丸

親半彈丸大

右四味以水五升壽親東流東向竈煮梁

米三沸去滓復以汁煮稻米三沸去滓復

以汁煮黍米三沸去滓以蠟內汁中和之

蠟消取以飲之數試有驗

龍骨湯治小兒壯熱渴引飲下痢方武日三

龍骨 甘草 大黃 赤石脂 括蕁根

石膏 寒水石 桂心 各二兩

右八味治下篩以酒水各五合煮散二合

二沸去滓量兒大小服之

大黃湯治小兒下痢若熱不食傷飽不乳方

大黃 甘草 麥門冬 各壹兩

右三味咬咀以水二升煮取壹升二三歲

兒分三四服

生金牛黃湯治小兒積下不止因發癩方

生金 三銖一方用六銖無牛金用熟金亦得法應作屑今方盡成器者合牛

黃 麻黃 黃連 乾姜 人參 甘草

各壹分 細辛半

右八味咬咀以水一升六合煮取八合去滓臨服研牛黃以煮湯中嫌兒熱者用生姜代乾姜今世乏生金仙用成器金亦善二三兩皆得用也  
澤漆茱萸湯治小兒夏月暴寒寒入胃則暴下如水四肢被寒所折則壯熱經日不除經月許日變通身虛滿腹痛其脉微細服此湯壹劑得數漸漸安神

澤漆各二 青木香各二 海藻各二 吳茱萸各二 茯苓

又苓各二 白朮各二 桔梗各二 芍藥各二 當歸各二 大

黃各二 壹分

又有十味咬咀以水四升煮取壹升半五百日至壹歲兒壹服二合半壹歲已上至二歲壹服四合麻式熱藥干二代藥音出則積實散治少小久痢淋瀝水穀不調形羸不堪大湯藥者宜此方枳實二兩治下篩三歲已上飲服方寸匕若兒小以意斟酌日

五服○衛生易簡方治小兒久痢淋瀝水  
穀木消煇枳實為末飲汁調壹錢匕服三  
時歲已止五錢匕酸棓木燻不隨紙歸不  
治少小洞油香荆方葵藜子二升擣汁温服  
以療為度辰沙二合半炒盡了土至二  
又方取木瓜汁飲之○聖惠方右以木瓜葉  
擣絞汁時時與兒飲之差

又方酸石榴燒灰末服半錢七日三○聖惠  
方醋石榴皮燒右細研為散每服以粥飲

調下半錢日三四服量兒大小加減服之  
又方炒倉米末飲服

又方狗頭骨燒灰水和服之○聖惠方狗頭  
燒右細研為散每服以粥飲調下半錢日

三四服量兒大小加減服之  
又方羊骨灰 鹿骨灰

又右二味並水和服之隨得壹事即用之○  
聖惠方治小兒洞泄下痢不差乳食全少

羊脛骨壹兩鹿角壹兩右件藥細研為散

每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小臨時加減

又方豉炒焦水淋汁服之神驗冷則酒淋

又服羊乳

又方五月五日百草末吹下部

治小兒赤白滯下方

薤白壹鼓

右二味以水三升煮取二升分三服

又方栢葉各壹升麻子末各壹升

右二味以水五升煮取三沸百日兒每服

三合

又方檮石榴汁服之

又方牛角觶灰水和服方寸匕

又方燒蜂房灰水和服之時後方露蜂

又方亂髮灰鹿角灰

右二味等分參歲兒以水和服三錢七日

參○聖惠方右件藥細研不計時候以粥

飲調下半錢量兒大小加減服之

治小兒赤白痢方

白蘘荷根汁各五 生地黄汁各五

右二味微火上煎壹沸服之

單方治同前服生地黄汁壹合

又方五月五日蝦蟆灰飲服半錢○聖惠

方蝦蟆一枚五月五日 右剉研每服以粥

飲調下半錢日叁四服量兒大小加減服

之

治小兒熱痢方煮木瓜葉飲之

治小兒冷痢方蓼菜搗汁量大小與之一方

作芥菜

又方搗蒜傅兩足下

治小兒暴痢方小鯽魚一頭燒末服之亦治

大人○聖惠方右取小鯽魚尾燒灰細研

不計時候以粥飲調下半錢量兒大小加

減服之

又方燒鯉魚骨末服之一方作龍骨

又方赤小豆末酒和塗足下日叁度油和亦

得

治小兒蠱毒痢方藍青汁壹升二合分爲四服○聖惠方藍汁合三右量兒大小每日四五度分減服之

治小兒渴痢方搗冬瓜汁飲之或熱或冷海上仙方

小兒瀉痢

瀉痢脫肛病槐花爲細末米飲調末服喫後卽安樂

食醫心鑑

治小兒疳痢垂死方衛生易簡方治小兒疳痢久不差右取

益母葉煮與食卽差備預百要方同○聖惠方治

小兒疳痢困篤垂死宜服此方益母草壹

右以水煮熟令兒食之卽差壽域神方治

疳痢痔疾用益母草葉煮粥食之取汁飲

之亦可

治小兒血痢方備預百要方小兒腹痛血痢右取馬齒葉

生搗絞取汁壹合和蜜一匙攪調空心食

之

治小兒瀉痢腹肚絞痛方右取益母草葉煮

食之

聖惠方一

治小兒脫肛諸方

夫小兒脫肛者為肛門脫出也肛門為大腸

之候小兒多因利大腸大腸虛冷即肛門脫

出故謂之脫肛也

治小兒大腸虛冷久脫肛龜頭散方

龜頭

壹枚枯死者塗酥炙令黃燠

卷栢

壹兩 龍骨

壹兩

右件藥搗細羅為散以散一錢傅上按按

內之

治小兒脫肛宜傅附子散方

附子

壹兩生龍骨

壹兩

去皮

右件藥搗細羅為散每用散一錢傅在肛

上按按令人頻頻用之以差為度

治小兒脫肛久不差方

龍頭

三枚枯者塗酒炙令黃焦

莨菪子

半兩水淘去淨者煮令牙出候

乾炒令黃黑色

右件藥細研為散每空腹以粥飲調下半

錢量兒大小以意加減

又方雀糞

半斤乾薑壹分炮裂碎到

右件藥搗細羅為散每服一錢白麩半匙

同溲作餽飪煮熟入塩醋少許每日早晨

壹服量兒大小以意增減服之

又方龜頭

壹兩炙龍骨兩

右件藥搗細羅為散每用壹錢粉腸頭按

內之日三上用之

又方蒲黃

壹兩猪脂二兩

右件藥鍊猪脂相和為膏塗腸頭上即縮

入拔粹方同

治小兒因痢後軀氣下推出肛門不入宜用

赤石脂散方

又赤石脂

壹分○小兒藥證直訣永類

伏竜

肝壹分

右件藥細研為散每以半錢傅腸頭日三



上用之和劑局方衛生寶鑑經

又方右用白竜骨末溥腸頭不過三匕差

又方右細墨末每服以温酒調下壹字日三

服

又方鼈頭壹枚炙

右擣羅爲末每服以米飲調下半錢日二

服量兒大小以意加減

又方馬蘭花兩半

右擣細羅爲散用温漿水先洗拭乾摻藥

末半錢於故絛子上接入每日用之以差

夫爲度

又方蜘蛛燒

又右細研傅之更燒桑葉熏之○肘後方卒

脫肛者燒蜘蛛爲灰傅肛上

又方生鐵二斤

右以水三椀煮至一椀候冷煖得所洗之

立差

治小兒大腸虛冷脫肛方

莨菪子

壹兩炒  
令黑色

右搗羅爲末先以煖水淨洗乾拭塗藥半錢却內入腸不過三上不出便以莨菪子熟研爲末壹錢以醋調塗餠餅上炙乾分減與食之

又方右用女萎五兩燒熏下部三五上差

治小兒疳痢諸方

夫小兒疳痢者由因乳哺不節生冷過度傷於脾胃致臟腑不調冷熱相搏大腸虛弱小

穀不聚變爲下痢也其候面色萎黃肌體羸

瘦盜汗壯熱皮毛乾枯嗜食酸鹹心腹虛脹

洩痢惡物日夜無恒故名曰疳痢也

治小兒疳痢脊脊如鋸眼口鼻痒自咬指甲

頭髮乾焦下部急痛青黛散方

青黛

細研

朱砂

細研

雄黃

細研

附子

炮裂去  
皮臍

藜蘆

去蘆 胡黃連

細辛

麝香

細研

白礬灰

黃礬灰 莨菪子

外淘去浮者水煮令芽  
出曝乾炒令微焦各壹

分

右件藥搗細羅為散都研令勻每服以粥飲調下半錢早晨晚後各壹服量兒大小加減服之

治小兒疳痢腹大口乾四肢羸弱下痢不止神聖散方

乾蚶蟆一枚五月五日獨顆蒜是顆川椒是顆

半兩去目

已上二味入蝦蟆腹中用春大麥麩餅子裏燒令焦黃色搗羅為末

麝香壹錢龍腦半錢盧會一分朱砂二錢雄黃壹錢

右件藥與前藥同細研為散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒疳痢四肢羸瘦腹脹鼻痒皮膚乾燥

下痢不恒盧會丸方

盧會細研雄黃細研沒石子 蛇蛻皮燒丁香

熊膽細研蟬散微炒蟾酥研入已上麝香壹錢

黃連半兩炒去目

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如黃米粒大

每服以粥飲下三丸別研一丸吹鼻中量  
兒大小加減服之

治小兒疳痢不止體瘦食少腹痛羸弱麝香

丸方

麝香研細朱砂研細盧會研細雄黃研細母丁香

鶴蝮研細白礬研細蜜陀僧研細沒藥研細龍膽

去蘆地龍炒熊膽細研各肉荳蔻半兩黃

連半兩定粉半兩艾葉半兩炒錢蟾酥壹

右件藥搗羅為末入研了藥令勻以麪糊

和丸如菉豆大每服以粥飲下三丸日三  
服量兒大小以意加減

治小兒疳痢日夜不止體瘦無刀不能飲食

木香丸方

木香去足蟬殼去足肉荳蔻去足黃丹炒朱砂

研細夜明砂微炒各麝香青錢赤石脂半兩

黃連半兩炒去鬚田父壹枚蝸牛二十枚

右件藥搗羅為末入研了藥令勻以湯浸

蒸餅和丸如菉豆大每服以溫粥飲下五

先日三服量兒大小以意加減

治小兒疳痢日夜度數不恒肌體羸瘦龍骨

丸方

龍骨半兩雄黃壹錢麝香壹錢朱砂一分蝸

牛二十枚炒微黃橡實半兩牛黃壹錢白土壹錢青

黛壹分訶梨勒壹分煨用皮

右件藥擣羅爲末入研了藥同研令勻用

麪糊和丸如菜豆大每服以粥飲下五丸

日三服量兒大小以意加減

治小兒疳痢脾胃虛冷乳食不化臍腹疼痛

熊膽丸方

熊膽壹分附子壹枚炮裂去皮巴豆七枚去皮心

油定粉壹兩炒微黃黃丹二兩點醋紫砒霜一錢細研

硫黃壹分乾姜壹分訶梨勒壹分煨用皮

右件藥擣羅爲末湯浸蒸餅和丸如黃米

大每服以冷水下二丸量兒大小以意加

減切忌熱物

治小兒疳痢不止黃連散方

黃連半兩去白茯苓半兩搗碎黃  
 蘗半兩微炒人參半兩去丁香一分訶梨勒皮去  
 半兩炙桃白皮半兩去沒石子二枚  
 微煨  
 右件藥搗細羅為散每服以米飲調下半  
 錢量兒大小加減服之○聖濟總錄治小  
 兒疳痢久不差青連去白茯苓去阿膠  
 炒黃蘗去人參各半訶梨勒三枚  
 核炙桃白皮三分無食子無孔者右九味搗  
 羅為散每服半錢匕米飲調下空心日午

近晚各一更量兒大小加減

治小兒疳痢不止下部痒青黛散方

青黛壹分蟾灰壹分赤石脂半兩訶梨勒皮壹兩  
 胡粉壹分黃連壹分麝香壹分  
 右件藥搗羅為散每服以乳汁調下半錢

日三四服量兒大小加減服之

治小兒疳痢久不止煞疳丸方

雄黃壹分麝香一分牛黃壹分蘆會壹分  
 朱砂壹分胡黃連壹分蜜壹分僧壹分赤壹分燒壹分令壹分童

骨青分燒青黛半兩金薄十片肉苳蔻二

去蟾酥化如泥

右件藥搗羅為末入研了藥及蟾酥研令  
勻湯浸蒸餅和丸如黃米大每服以溫水  
下三九煎黃連苦參湯洗身上用青衣蓋  
出蟲後便差

治小兒疳痢不止體熱口乾心煩瘦弱青黛  
丸方

青黛壹分熊膽壹錢麝香壹錢定粉壹錢炒蟾酥壹錢

半寒食蒸餅壹錢

右件藥都研如粉用獾猪膽汁和丸如黃  
米大每服以粥飲下五九日三服量兒大

小如減服之

治小兒疳痢不止再龍骨丸方

白龍骨 白石脂 雞屎燒令黃連去

炒胡粉微白茯苓微阿膠令黃燥已各

半兩

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如麻子大每

服以粥飲下五九日三四服量兒大小加減服之

治小兒疳痢不喫乳食四肢瘦弱肉豆蔻丸

方  
肉豆蔻壹枚木香半兩朱砂細研人參去蘆頭訶梨勒煨用皮麝香細研各壹分

右件藥搗羅為末都研令勻用軟飯和丸如麻子大每服以粥飲化下三九日三四服量兒大小加減服之○聖濟總錄治小

兒疳痢及吐豆蔻丸肉豆蔻去殼壹枚木香半兩

丹砂研人參訶梨勒煨去核麝香研各壹分右六

味搗研為末用飯丸如麻子大每服二丸空心米飲下日再服更量兒大小加減

治小兒疳痢砒霜丸方

砒霜一分白礬半兩乾蟾燒灰半兩夜明沙半兩

微炒黃丹半兩朱砂一分

右件藥搗羅為末都研令勻以軟飯和丸如菉豆大每服以冷水下三丸服藥後以



桃柳湯洗衣服裏之蟲子當出白黃即易  
差黑者難差忌食熱物

治小兒疳痢不止漸至困弱丁香丸方

丁香壹分巴豆十枚以醋漿水壹椀半煮盡為度去皮心研紙裏壓去油

黃連壹分橡子壹分白礬壹分

右件藥搗羅為末以麵糊和丸如黍米大

每服以冷粥飲下三丸日三服量兒大小

加減服之

治小兒疳痢羸瘦麝香丸方

麝香壹分鐵粉半兩龜甲半兩塗醋炙黃連壹分

半兩蝦蟆壹枚燒灰

右件藥搗羅為末以軟飯和丸如麻子大

每服以溫水下五丸日三服量兒大小加

減服之

治小兒疳痢不止肉豆蔻丸方

肉豆蔻壹枚胡黃連壹分砒霜半分巴豆十枚

去皮心油煮色黑紙裏壓去油

右件藥搗羅為末用糯米飯和丸如黍米

大每服以冷水下一丸切忌熱物

治小兒因喫交妳變成疳痢色轉不定宜服

此方

狗骨腐爛者不限多少

燒為灰

右細研為散每服濃煎桃葉湯調下半錢

日三服量兒大小以意加減

又方右取鷄子壹枚敲開頭以巴豆壹粒線

子穿之內入雞子內用紙裏以生麵糊糊

定於飯甕內蒸令熟去巴豆每日喫雞子

一枚至二枚當瀉下惡物即差

治小兒疳痢不止宜服此方

菘菘子

四兩水淘去淨者水煮令芽出曝乾却炒令黑色搗羅為末

右以白麵四兩和浚作餅子焙乾却搗細

羅為散每服以粥飲調下壹字空心午後

各一服量兒大小加減服之

治小兒疳痢久不差諸方

夫小兒疳痢久不差者因由藏腑宿挾疳氣

或乳食不節冷熱相乖腸胃既虛遂令下痢

痢而不差連滯日月故名久疳痢也

治小兒疳痢久不差日漸羸瘦青黛散方

青黛一兩麝香半兩雄黃半兩朱砂半兩

蝮蛇膽半兩黃藥半兩苦參半兩桂心半兩

杏仁半兩雙人半兩湯浸半兩去皮半兩尖乾薑壹分炮白

禁半兩燒半兩細辛壹分黃連半兩微半兩藜蘆壹分

頭附子半兩炮裂半兩芫荽子半兩水淘半兩去浮

候乾炒半兩黃黑色半兩右件藥擣細羅為散都研令勻以井華水

調下半錢日三服一歲兒服一字三歲兒

服半錢量兒大小以意加減若口有瘡及

鼻痒酥和菘豆大安鼻中若頭上疳瘡及

下部有瘡赤爛並用散傅之

治小兒疳痢久不差肌肉消瘦面黃髮焦啼

叫不恒胡黃連散方

胡黃連半兩白竜骨末半兩白禁半兩燒胡

粉一分微炒

右件藥同細研為散壹歲兒每服以米飲

調下壹字二歲兒每服半錢隨兒大小量  
病輕重加減服之

治小兒疳痢經久不差肌膚羸瘦宜服黃連  
散方

黃連壹分微炒胡黃連壹分朱砂一分細研麝香兩

細研一分蝸牛壹分微炒牛黃壹錢細研鈔霜壹錢細研訶黎勒

一分煨沒石子壹分微煨使君子壹分肉荳蔻壹分

去壹分定粉壹分微炒黃丹壹分微炒龍骨壹分

右件藥擣細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小以意加減

又方黃丹壹兩胡粉壹兩炒醋石榴皮三分

炒訶黎勒壹兩棗三十枚去皮判微

右件藥擣細羅為散每服煎糙米粥飲調

下半錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒疳痢久不差肌膚黃瘦愛食泥土蝸

牛散方

蝸牛三十枚蛇蛻皮壹分葺荖子半兩水淘乾

蟻蝦兩臭黃壹分夜明沙壹分

右件藥都入堯餅子內以泥封餅口燒令藥熟候冷取出搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小以意加減

治小兒疳痢久不差龍骨散方

龍骨半兩訶梨勒壹分赤石脂半兩蜜壹分隨僧

分壹分醋石榴皮壹分麝香壹分

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小以意加減

又方母丁香七枚雞屎一兩黃蘗壹兩皮壹兩微壹兩燒壹兩

剉麝香壹分細研

右件藥搗研為散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒疳痢經年不差發歇不定狀如膠飴

白礬丸方

白礬壹兩燒兩寒水石半兩燒兩水蓼半兩雄黃半兩

細研朱砂半兩水飛兩研黃丹半兩硃霜壹錢

川大黃半兩碎兩雞子殼半兩燒兩

右件藥搗羅為末都研令勻用蟾酥半分

及麩糊和凡如粟米大每服以新汲水下  
三丸量兒大小加減服之

治小兒疳痢久不差體瘦羸弱皮毛乾燥髮  
無潤澤朱砂丸方

朱砂半兩細研青黛半兩麝香壹分粉霜壹分盧

會壹分雄黃壹分田父灰兩蛇蛻皮三尺胡黃

連三分虎睛壹對酒浸壹宿牛黃兩蟾酥錢

右件藥都研為末用軟飯和丸如麻子大  
每服以粥飲下五丸日三服量兒大小以

意加減

治小兒疳痢久不差日夜度數無恒蟬殼丸  
方

蟬殼一分去足微炒蝸牛殼一分乾漆壹分擗碎狗

頭灰三分夜明沙壹分微炒

右件藥搗羅為末湯浸蒸餅和丸如菉豆

大壹歲以粥飲下壹丸兒大即隨年加之

治小兒疳痢久不差體熱心煩不欲乳食龍

膽丸方

龍膽壹分去使君子半兩胡黃連半兩苦棟樹

根皮半兩炙麝香壹分蟾酥半錢臭椿根皮兩

炙微黃剉

右件藥搗羅為末更都研令勻以麪糊和丸如棗豆大壹歲以粥飲下壹丸兒稍大以意加之

治小兒疳痢久不差可喫乳食漸加黃瘦夜明沙丸方

夜明沙一分微炒訶梨勒半兩煨用皮竜骨半兩熊膽

壹分朱砂一分細研牛黃壹分細研麝香壹分細研黃連半兩微炒去鬚

右件藥搗羅為末都研令勻以獾猪膽汁和丸如黍米大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小以意加減

治小兒疳痢久不差四肢羸瘦或多心忪驚悸神效殺疳丸方

砒霜半兩天靈蓋壹箇人糞半兩乾者胡黃連末半兩

芡苳子壹分芽出候乾炒令黑色搗末麝香一分

右件藥先將砒霜天靈蓋人糞用濕紙三五重裹以黃膠泥固濟曬乾於炭火中燒令通赤取出候冷與胡黃連芫荳子麝香等三味都研令細川軟飯和丸如黍米大每服以乳汁研化一丸灌之不限時節孫子昏昏似醉以衣服蓋覆候睡覺看兩手十指節頭有毛白者立差赤者五日內差青黑者難差看兒大小一丸已上不得服之

治小兒久疳痢不差宜服砒霜丸方

砒霜壹分雄黃壹分朱砂壹分麝香壹分乾蟾壹分

右件藥同研為末湯浸蒸餅和丸如粟米大每服以冷粥飲下壹丸日再服忌熱物

治小兒久疳痢不差腹脇鼓脹麝香丸方

麝香壹分巴豆半兩入油中煎令黑色去皮心研紙裏壓去油

右件藥同研令勻用燒飯和丸如黍米大右服以粥飲下壹丸空心午後各服

治小兒久疳痢不差蕪荑丸方



蕪荑兩半 羊子肝一枚

右件藥先以子肝切作片子以蕪荑末摻在肝內線纏之以米泔煮令熟搗爛糯米飯和丸如麻子大每服以粥飲下五丸早晨晚後各一服量兒大小加減服之○聖濟總錄蕪荑炒為末 羊子肝一枚 右二味先用米泔煮羊肝令熟候冷切作薄片將蕪荑末摻在肝內搗爛更入少糯米糊和丸如麻子大每服五丸米飲下早晚食前

各一更量兒大小加減

治小兒疳痢久不差肚大有青脉四肢漸瘦

盧會丸方

盧會壹兩 粉霜一兩

右件藥同研為末以日煎黃連汁至濃和丸如菉豆大每服食前以粥飲下五丸量兒大小以意加減

治小兒痢渴不止諸方

夫小兒痢渴不止者此是水穀津液枯竭腑

藏乾燥則引飲若小便快利斷者渴則止若  
小便澀水不行於小腸胃間虛渴亦不止痢  
亦不斷凡如此者皆身體浮腫脾氣虛弱不  
能剋水故也亦必眼痛生障小兒上膈本熱  
今又痢下膈虛上膈熱氣轉盛熱氣熏心肺  
故也

治小兒痢渴心胃煩悶不欲飲食宜服黃耆  
散方

黃耆三分烏梅肉三枚麥門冬三分去黃

芩二分白朮兩半龍骨兩黃連半兩炒去鬚黃芩兩

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服食後不情知量兒大小分

治小兒痢渴不消黃耆散方

黃耆兩半蘇蘇根五分黃連三分烏梅肉一分炒

訶梨勒兩用皮兩楊樹皮兩當歸二分炒

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大

小分戒服之

治小兒痢渴腹內疼痛不止當歸散方

當歸三分黃連三分乾姜半兩黃

耆三分甘草半兩微赤半兩乾姜半兩黃

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小

盞至五分去滓不計時候量兒大小分減

溫服

治小兒痢渴體熱煩悶龍骨散方

白龍骨兩茯苓三分人參三分胡黃連兩

麥門冬三分心焙三分茅根三分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服

治小兒痢渴煩熱不止藍葉散方

藍葉壹分黃連半兩微半兩赤茯苓壹分冬瓜人半

醋石榴皮半兩微半兩赤石脂壹兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓入蜜半茶匙更煎三兩

沸不計時候量兒大小分減服之

治小兒痢渴煩熱不止地龍糞散方

地龍糞半兩去龍骨壹兩烏梅肉兩

微炒青兩蝸牛殼微炒

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水壹小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減服之

治小兒痢渴或下五色惡物心神煩熱不止

宜服地榆散方

地榆兩白扶苓壹兩黃蘗壹兩

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減服之

治小兒痢渴煩熱水不足黃連散方

黃連半兩去牡蠣半兩燒烏梅肉壹分甘

草一分炙訶梨勒壹分

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服

治小兒痢渴不止

樺皮散方  
樺樹皮一兩 藟藟根三分 白茯苓三分 人參半兩  
頭去蘆

右件藥搗細羅為散不計時候以粟米飲

調下半錢量兒大小以意加減

治小兒痢渴不止烏梅散方

烏梅肉半兩 白茯苓壹兩 乾木瓜兩

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小

盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大

小分減服之○和劑局方治小兒下痢後

津液減少藏腑虛燥煩渴引飲及治諸病

煩渴引飲無度烏梅肉微炒 白茯苓乾木

瓜各壹兩 右為龕散三歲兒每服一錢水一

小盞入生姜錢一片煎至五分去滓溫服

不計時候服量兒大小加減

治小兒痢渴不止甘草散方

甘草壹分 烏梅肉微炒 訶梨勒二枚 煨用皮

右件藥搗羅爲散每服一錢以水壹小  
盞入生姜少許煎至五分去滓放溫不計  
時候量兒大小分減服之

治小兒痢渴不止腹脹訶黎勒散方

訶黎勒壹兩半桑葉二兩半

右件藥搗羅爲散每服壹錢以水一小

盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大

小分減服之

治小兒痢渴不止身體壯熱天竹黃散方

天竹黃半兩細研黃連半兩去赤石脂兩梔子

人半兩葛根半兩甘草壹分炙牛黃壹分枳

樹根皮半兩炙龜背兩犀角屑壹土瓜根分壹

右件藥搗細羅爲散每服以熱滾水調下

半錢日三四服量兒大小以意加減

又方龜骨兩甘草半兩炙使君子兩黃芩兩

黃連半兩去蘇蘇根兩黃芩兩

右件藥搗細羅爲散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小以意加減

治小兒痢渴頭熱煩悶不欲乳食桃白皮散

方木外藥微炒綠蘇州桃白皮半兩黃連半兩去龍骨兩木香

桃白皮半兩黃連半兩去龍骨兩木香

豐分右件藥搗細羅為散每服以粳米粥飲調

下半錢日三四服量兒大小以意加減

治小兒痢渴不止壯熱腹痛黃芩丸方

黃芩三分蘇蘇根三分黃連三分去烏梅肉五

微訶梨勒半兩煨當歸三分剉臭椿樹皮

炒訶梨勒用皮當歸微炒臭椿樹皮

半兩微黃芩

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如棗豆大每

服以粥飲下五九日三四服量兒大小加

減服之

又方蝸牛殼豐兩夜明沙三分龍骨一分黃連

三分去鬚微炒

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大

每服以粳米粥飲研化七丸服之日三四

服量兒大小臨時加減

又方夜明沙壹分微炒乾蝦蟆半兩塗酥令黃焦蝸牛三七

枚炒令微黃麝香壹錢細研朱砂壹分細研龍骨半兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下

錢日三四服量兒大小臨時加減

治小兒痢渴不止宜服此方

定粉半兩細研

右用雞子清和為餅子以慢火炙令黃焦

碾為細散每服以粥飲調下半錢日三四

服量兒大小臨時加減○聖濟總錄治兒

兒疳痢兼渴不止定粉散定粉炒研半兩雞子

壹枚取白右二味將定粉與雞子白相和更研

如膏壹二歲每服半錢匕水七分煎至三

分放溫服之更量兒大小加減

治小兒痢渴小便澀羸瘦宜服此方

榆樹根白皮壹兩炙微黃剉

右搗羅為末以粳米飯和丸如菜豆大每

服以粥飲下七九日三四服量兒大小臨

時加減



治小兒痢渴不止或時嘔逆不下食宜服楮葉湯方

楮樹葉

二十片

木瓜

半兩

人參

壹分去蘆頭剉

右件藥以漿水一中盞煎至六分去滓不計時候量兒大小分減細細溫服

治小兒痢渴不止方

醋石榴

壹枚和皮搗

右用漿水壹大盞煎至五分去滓入蜜半合放溫不計時候量兒大小分減服之

治小兒痢渴不止羸瘦方

椿樹根皮

乾者

右搗羅為末以好粟米淘去泔研取米濃煮作糊和丸如棗豆大每服以粥飲下五丸日三四服量兒大小加減服之

治小兒疳痢腹痛諸方

夫小兒疳痢腹痛者由疳多而腸胃虛弱冷氣在內與藏氣相搏真邪交擊故令腹中疴痛也

治小兒疳痢腹脹疔痛日夜三二十行宜服

白朮散方

白朮壹兩當歸半兩地榆半兩木香微

赤芍藥半兩甘草半兩炙微赤

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小

蒸煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服

治小兒疳痢腹痛不下乳食草豈菘散方

草豆蔻三分龍骨壹兩醋石榴皮三分高

良薑壹分當歸半兩乾姜壹分子芩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小

盞入薤白一莖煎至五分去滓不計時候

量兒大小分減溫服

治小兒疳痢多有白膿腹內疔痛宜服附子

散方

附子壹枚炮裂龍骨半赤石脂半蜜隨

僧青研黃丹微炒胡粉微黃烏賊魚骨

九

九

九

九

九

青分 赤芍藥 壹分 棗 五枚 訶梨勒 一分 煨炭

皮分

右件藥擣細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小以意加減

治小兒疳痢腹脹疔痛木香丸方

木香 兩半 附子 半兩 生用 巴豆 半兩 去皮心

油 蟾酥 半兩 研入 青橘皮 半兩 湯浸 肉豆蔻 兩半

去 朱砂 壹分 人參 壹分 去 殼 蘆頭

右件藥擣羅為末用醋煮麵糊為丸如粟

米大每服以粥飲下二九日二服量兒大小以意加減

治小兒赤白痢諸方

夫小兒赤白痢者由乳食不節腸胃虛弱冷

熱之氣入於腸間變為痢也然而赤白者是

熱乘於血而滲入腸內則赤也若冷氣搏於

腸津液凝滯則白也冷熱相交赤白相雜重

者狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脉

薄血狀如魚腦亦謂之魚腦痢也

治小兒赤白痢腹內疝痛羸弱不能飲食白  
木散方

白木半兩人參半兩去蘆頭厚朴三分去蘆皮塗

熟黃連半兩去鬚當歸半兩判地榆半兩

木香半兩檉樹皮半兩微甘草半兩炙

右件藥搗羅羅為散每服一錢以水壹小  
蓋煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服

治小兒赤白痢煩渴寒熱腹痛羸瘦不欲飲

食地榆散方

地榆三分微醋石榴皮半兩判龍骨壹兩

當歸半兩判黃耆半兩判阿膠三分燻碎黃

連三分去鬚赤石脂壹兩燒赤烏梅肉半兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半  
錢不計時候量兒大小加減服之

治小兒赤白痢腹脹疼痛不欲飲食四肢瘦

弱訶梨勒散方

訶梨勒三分煨當歸半兩判黃芩半兩龍骨

半兩地榆炒乾姜半兩炮陳橋皮半兩湯浸

去白兩白木兩甘草半兩炙

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服

又方地榆半兩黃連半兩去木香半兩當歸三分

炒

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服

治小兒赤白痢地榆散方

地榆三分醋石榴皮半兩白竜骨兩赤

石脂兩黃連三分

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大

小分減服之

治小兒赤白痢不止鹿茸散方

鹿茸半兩去毛塗甘草半兩炙訶梨勒兩

煨用皮

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢不計時候量兒大小加減服之

治小兒赤白痢不止三骨散方

拘頭骨壹兩羊骨壹兩鹿骨壹兩

右件藥並燒為灰細研每服以粥飲調下半錢不計時候量兒大小加減服之

治小兒赤白痢腹痛不止當歸丸方

當歸半兩剉微炒黃連壹分去微炒竜骨一分人參壹分

去蘆頭沒石子二枚鹿角灰壹兩豆豉壹分炒微煨

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如菜豆大不計時候以粥飲研下十丸量兒大小臨時

加減

治小兒赤白痢瘦弱腹痛不欲飲食訶梨勒丸方

訶梨勒半兩煨用皮黃連三分去微炒地榆半兩微炙剉

赤石脂半兩當歸半兩剉微炒吳茱萸青分湯五遍焙乾

微炒

右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如菉豆大不計時候以粥飲下五丸量兒大小加減服之

治小兒赤白痢腹痛不欲乳食鹿角丸方

鹿角屑壹分 蕪荑人壹分 附子一分炮裂 赤石

脂半兩 黃連半兩去鬚 當歸壹分剉

右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如菉豆大不計時候以粥飲下五丸量兒大小以意加減

治小兒赤白痢努嘔腸頭出蚘蛇膽丸方

蚘蛇膽壹分 烏梅肉七枚 蕪荑壹兩 黃連兩

去鬚剉 微炒

右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下三九日三四服量兒大小以

意加減

治小兒赤白痢香連丸方

木香半兩 黃連三分 訶梨勒半兩 肉豆

蔻二枚 丁香壹分

右件藥搗羅爲末以燒飯和丸如黍粒大  
每服以粥飲下五九日三四服量兒大小  
加減服之

又方黃連壹兩去鬚微炒 葦葶子壹分水淘去浮者

炒令黃 黑色煎下三式口三四服量兒大小

右件藥搗羅爲末用麴糊和丸如棗豆大  
每服以粥飲下五九日三四服量兒大小

加減服之

又方黃丹壹兩 黃連壹兩 白燕蕒一兩

右件藥搗羅爲末以棗肉和爲壹炭火

斷令烟盡候冷細研以軟飯和丸如棗豆

大每服以溫水下五九日三四服量兒大

小加減服之

又方川烏頭一兩炮裂 香墨半

右件藥搗羅爲末用醋麵糊和丸如棗子

大每服以溫二宜湯下二九日三四服量

兒大小加溫服之

又方蘇麻子炒令香



又右疳如膏丸如梧桐子大每服以蜜水化下二九日三四服量兒大小加減服之

大治小兒久赤白痢諸方

夫小兒久赤白痢者由冷熱不調熱乘於血血滲腸間與冷氣津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連滯久不差也

治小兒久赤白痢不止腹痛羸弱不欲飲食

黃連散方

黃連一兩去鬚微炒厚朴半兩去麤皮塗生乾姜半兩去麤皮塗生

半兩炮木香半兩當歸三分剉黃牛角鯁

艾葉半兩改炒烏梅肉壹分龍骨半兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒久赤白痢漸至羸弱胃氣全虛不欲

飲食下香散方

丁香半兩煨朴半兩姜汁令香熟木香一分黃

連半兩去鬚微炒當歸半兩剉訶梨勒半兩煨

白米半兩剉赤石脂兩伏龍肝兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒久赤白痢腹脹疔痛黃蘗丸方

黃蘗壹兩微當歸壹兩到

右件藥搗羅為末煨大蒜和左如菜豆大

每服以粥飲下七九日三四服量兒大小

加減服之

治小兒久赤白痢腹脇疼痛木香散方

木香半兩訶梨勒半兩臭檮樹皮半兩

水賊半兩黃連半兩去半兩炒半兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小以意加減

治小兒久赤白痢腹內疔痛全不思食漸至

困羸肉豆蔻散方

肉豆蔻三枚青橘皮半兩湯浸半兩當歸半兩

炒黃牛角鯁半兩厚朴半兩去半兩薑汁半兩炙半兩香

熟地榆半兩黃連半兩去半兩乾姜壹分炮

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小臨時加減隨下

治小兒久赤白痢累醫不效黃丹丸方

黃丹兩半蜜隨僧兩半定粉兩半

已上三味同細研用醋拌於生鐵銚子內

因燒如茶褐色

砒霜壹分巴豆十枚去皮心研紙裏壓去油訶梨勒半兩

皮搗羅錢壹麝香錢壹瓜蒌

右件藥同研為末用生姜自然汁濃研香

黑浸蒸餅和丸如黍粒大每服以冷甘豆

湯下三九日三四服量兒大小加減服之

治小兒久赤白痢不止腹痛龍骨丸方

白龍骨壹分胡粉三錢炒黃連壹分去黃蘗

一分微訶梨勒壹分煨白礬半兩燒乾姜

半兩炮當歸半兩剉木香壹分

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如茶豆大每

服以粥飲下五九日三四服量兒大小臨

時加減○和劑局方小兒久患赤白痢日

夜頻併腹痛羸弱不欲飲食訶梨勒皮炮去核

藥學彙編

卷之

黃連去鬚微炒 黃藥微炒 木香 白竜骨各壹分 當歸

去苗 白礬研枯 乾姜炮各半兩 胡粉微炒三分 右為

末煉蜜和圓如棗豆大三歲兒每服十圓

溫粥飲下日三服量兒大小臨時加減

又方鹿角屑壹分 蕪荑人微炒 附子壹分炮裂

赤石脂兩半 黃連壹分 地榆壹分

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如棗豆大每

服以粥飲下五丸日三四服量兒大小臨

時加減此日三四服量兒大小臨時加減

治小兒久赤白痢肌體羸瘦四肢煩熱朱砂

丸方

朱砂兩半 巴豆七枚去皮心研 麝香壹錢 雄黃

壹分 硫黃壹分 右件藥都研為末湯浸蒸餅和丸如黍粒

其大每服以新汲水下二九日三服量兒大

小加減服之

治小兒洞泄下痢諸方

夫小兒春傷於風冷則夏為洞泄小兒多因

...

...

春時解脫衣服為風冷所傷藏在肌肉脾主  
肌肉故也至夏因飲食居處不調又被風冷  
入於腸胃先後重杏為風邪所乘則為痢也  
其冷氣盛則痢為洞泄洞泄不正則為注下  
痢也

治小兒脾胃氣不和洞泄下痢不止羸瘦食

少厚朴散方

厚朴壹分去蘆皮塗生人參一分去蘆頭訶梨

勒一分肉豆蔻壹枚白朮壹分乾姜半分

剉黃連壹分去鬚微炒地榆壹分微炙甘草半分炙

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小以意加減

治小兒洞泄下痢不止漸至羸困蜜陀僧丸

方

蜜陀僧 黃丹 定粉 白礬各一兩

右件藥以新瓷鉢盛用紙筋泥固濟以文  
火燒令通赤候冷取出入竈骨末壹兩同  
研令細每服以粥飲調下半錢日三四服

量兒大小加減服之

治小兒冷熱不調時有洞泄下痢不止龍骨丸方

龍骨半兩黃連半兩去鬚微炒白石脂半兩白礬半兩

汁乾薑半兩炮薑製到

右件藥搗羅為末醋煮麵糊和丸如麻子大每服以粥飲下五九日三四服量兒大小加減服之

治小兒洞泄下痢羸困三聖散方

地榆半兩微炙到厚朴三分去麤皮塗生訶梨

勒半兩煨用皮

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小臨時加減

又方沒石子半兩微煨訶梨勒半兩煨用皮

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小臨時加減

治小兒洞泄下痢不差乳食全少宜服如聖散方

鹿茸半兩去毛塗黃連三分去鬚微炒厚朴半兩去麩

皮塗生薑汁炙香熟

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小加減服之

又方楮樹葉半兩訶梨勒一分煨用皮橡實七枚微炒

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒洞泄下痢不止黃連在方

黃連壹兩去鬚微炒女萎半兩微炒

右件藥搗細羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以熱水化下三九日三四服量兒大小加減服之

又方牛角鰓燒灰

右細研為散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒水穀痢諸方

夫小兒水穀痢者由寒溫失宜乳哺不節或當風解脫而氣俱虛為風冷所傷留連在於

肌肉因其脾胃不和，大腸虛弱，風邪入於腸胃，腸胃既虛，不能制於水穀，故變為下痢也。治小兒水穀瀉，瀉瘦面黃，不欲飲食，厚朴散方。

厚朴半兩去蘆皮塗生薑汁炙令香熟 黃連半兩去鬚微炒 丁香壹分 肉苳蔻壹分去殼 常歸一分判微炒 木香壹分 龍骨半兩 白朮壹分

右件藥搗細羅為散，每散以粥飲調，下半錢，日三四服，量兒大小加減服之。

治小兒水穀痢不止，羸瘦腹脹，不欲飲食，調中散方。

厚朴壹兩去蘆皮塗生薑汁炙令香熟 木香半兩 黃連壹兩去鬚微炒

右件藥搗鹿羅為散，每服壹錢，以水壹小盞煎至六分，去滓，不計時候，量兒大小分減溫服。

又方：訶梨勒壹兩煨用皮 當歸一兩判微炒 白朮壹分

右件藥搗羅為末，鍊蜜和丸，如棗豆大，不



計時候以粥飲下七丸量兒大小加減服之

又方白礬壹兩燒令汁盡訶梨勒半兩煨用皮醋石榴皮

三分剉微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大不

計時候以粥飲下五丸量兒大小加減服

之

治小兒水穀痢日夜不止地榆散方

地榆三分微炙到厚朴三分去蘆皮塗生薑汁炙令香熟黃連

壹兩去鬚微炒阿膠半兩搗碎炒令黃燥

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調

下半錢量兒大小加減服之

又方乾棗十顆去核胡粉壹兩

右件藥相和搗為一餅子急火中燒令赤

取出置地上以梳合之勿令透氣待冷細

研為散不計時候以粥飲調下半錢量兒

大小加減服之

治小兒水穀痢腹痛神效木香散方

木香兩半訶黎勒三分異龍骨兩壹黃連一兩去髮

微炒赤芍藥一兩當歸壹兩剉微炒

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓溫服不計時候量兒大

小分減服之

治小兒水穀痢不止竜骨散方

白竜骨三分白石腹三分黃連三分去胡粉三分

炒令乾姜半兩炮黃裂剉

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調

下半錢量兒大小加減服之

又方附子半兩炮裂乾姜半兩炮赤石脂兩

橡實兩當歸半兩剉微炒大腹瀉兩煎

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調

下半錢量兒大小加減服之

治小兒水穀痢日夜略不暫止橡子散方

橡實二兩乾栢葉半兩剉微炒

右件藥搗細羅為散不計時候以水煮烏

梅汁調下半錢量兒大小加減服之

又方訶梨勒二兩煨良大小川椒亦煨之  
 右搗羅爲末煉蜜和丸如麻子大每服以  
 溫水研化五丸日三四服量兒大小以意  
 量加減水瀉除目赤如未瀉止將干端代  
 不洽小兒無辜疳痢諸方之

大小兒無辜疳痢者是腦後有瘰如蠟如蠟  
 之狀下轉動者是也若漸長大即隨氣血流  
 散所在得瘰子母相生侵蝕臟腑肉或即  
 生瘰矣楊梅瘰血毛髮皮瘰枯槁肌體日

漸瘦羸腸胃既虛痢無時節故名無辜疳痢  
 也

治小兒無辜疳痢久不差漸至羸弱朱砂散  
 方

朱砂壹分白馬夜眼壹分丁香壹分地榆壹分  
微炙

右件藥搗細羅爲散每服以粥飲調下半  
 錢日三服服訖即喫雉肝粟米粥飲效  
 治小兒無辜疳痢鼻中乾塞眼內有白暈黃



量兒大小分減服之

又方雄肝

一具薄切博乾

右搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日

三服每喫藥後宜喫粳米軟飯少許

治小兒無辜腹脹或時瀉痢寒熱不調煮肝

散方

漏蘆

一兩

右搗細羅為散每服壹錢以猪肝壹兩入

搥少許以水煮肝熟空腹與兒食之量兒

大小以意加減

又方地膽草

壹兩

右搗細羅為散每服壹錢以猪肝壹兩入

搥少許煮熟不勒時候量兒大小分減食

之散與藥之二百五十

治小兒無辜疳痢不止方

没石子

二枚炒赤黑色

右搗細羅為散以麩半匙和作餅子博熱

却研為末不計時候以粥飲調下半錢量

兒大小如減服之類以淡煎隔下不驗  
 亦發喘脈微結以豉半升研并搗干與煎  
 豉下下二升也  
 命小兒無辜傷喘不止式之在後小兒  
 醫方類聚卷之二百五十一

落小兒驚風不識親親量良大小合煎食  
 亦發喘脈微結以豉半升研并搗干與煎  
 大式煎服也  
 大小以豉煎也