



病因精義

三

ヤ 9
1161
3





79  
1161  
3

病因精義目次

卷之三 二篇上

眩暈卒厥第十一

不寐第十二 興寤昏聩

癩第十三

健忘第十四

鬱愁第十五

癲狂第十六

眼病第十七 上。眼嫩腫

病因精義  
卷之三 目次



91-2023



病因精義卷之三

眩暈卒厥第十一

眩暈之近因。瞳白脈之反常也。甚者則卒厥從焉。是腦管亦依然壅塞也。其遠因。則係多血衝逆。脫血虛衰。大汗暴下。過房斷食。神驚氣怯。鬱憤劇怒。照映光彩。視物旋轉。勉強勞動。貪飲烈酒。過用煙草等。或又於寒壞液。胃中疾病。難產。或兒枕痛。子宮衝逆病等。兼發者也。第有證同而虛實相反者。當須用意診辨也。

桃塢小森先生講述

男 桃郭義真筆記





眼ノ物タル静定留影ヲ常トス。而ルニ今忽然ト轉  
 回シテ留影スルヲ能ズ。且ツ視ニ勝ズシテ閉目昏  
 倒シ。此時ニ當テ脈微細呼吸甚トキハ則人事不省  
 至ル者ハ是其眼膜諸液等ニ故アリテ尋常眼病  
 ヲ發スルノ類ニ非ズ。殊ニ其視觀ヲ司ドル所ノ官  
 ニ於テ變アルコト知ヌベシ。故ニ六膜三液ノ一ハ  
 姑ク舍テ論ゼズ。其官ニ主タル者ハ即チ腦髓第二  
 對司瞳白脈是ナリ。尚ルニ第三第四第六對モ亦皆  
 來テ眼中ノ諸具ヲ循行シ。分布白脈ノ枝條モ亦來  
 リ交ル。故ニ腦髓ヨリ出ル白脈十對ニシテ。而テ一

小眼部ヲ循行スル者。殆ンド其半ニ及トス。是ヲ以  
 テ一身ノ中。精神ノ發動スル最第一器トシテ。凡ソ  
 心志ノ嫌嗜。識覺ノ知愚ヨリ。以テ元氣ノ盛衰強弱。  
 情意ノ喜怒哀樂ニ至マデ。腦中諸般ノ消息茲ニ現  
 レザルヲ無シ。然ルニ今其常ヲ失ヒ。且神氣昏聩ス  
 ルトキハ。則其根ザシ起所。腦ニ在ザルヲ得ズ。蓋  
 亦腦病ノ前茅稿矢ノミ。故ニ其甚者ニ至テハ。則卒  
 厥コレニ從フナリ。卒厥ハ外證卒中ノ如クニシテ。  
 而テ内。腦管全ク壅塞シ。呼吸脈動ニ至マデ盡ク廢  
 絶スルノ病ナリ。若夫卒中癰瘧ノ如キニ於ルモ。其



將ニ發セントスルニ當テ。必先眩暈ヲ發セズンバ  
アラズ。而テ屢此證ヲ患ル者。繼テ彼證ニ陷入スル  
ト少カラザルナリ。蓋其發ルニ當テ額上ヨリ起ル  
ガ如キヲ覺ル者ハ則輕ク。或ハ變シテ頭痛ニユク。  
此其腦外ヨリ衝逆侵入スル者ア。若シ後腦ヨリ發  
スルガ如キヲ覺ル者ハ則重シ。動スレバ輒チ卒中  
癱瘓等ニ陷入ス。知ズンバアルベカラズ。此先腦内  
テ而テ眼ニ及ブ者ナリ。本文論ズル所ノ多血衝逆。若  
リ。故ニ重トスルナリ。ハ鬱憤激怒ヨリ來ル者ハ。則チ其血ノ腦ヲ騷擾ス  
ル者。先ツ瞳白脈ニ交ル所ノ動脈ニ於テ亂行シ。以

テ轉回ノ運動ヲ起發セシムルナリ。諸般ノ脫血。或  
ハ過泄。或ハ過房。或ハ不寐。或ハ不食ノ後ニ發スル  
者ハ。コレニ反シテ腦中血ニ乏ク。靈液ノ原醅ヲ缺  
ガ為ニ。其瞳白脈ニ灌注スル所ノ者。先ツ損乏スル  
ノ致ス所ナリ。病後若ハ老人若ハ平素虛家ニ於ル  
モ亦同機ナリ。但其微甚ナルト。繼テ後精氣徐徐ニ  
灌注シ來ルト得ルト得ザルトノ異アルノミ。物  
ニ驚キ。若ハ高ニ登リ。深ニ臨ミ。危懼シテ眩暈スル  
者ハ。靈液ノ原醅不足スルニハ非レドモ。是其稟賦  
腦質脆弱ナルガ為ニ。白脈恐怖畏縮シテコレヲ發



スルナリ。照映光彩ヨリ来ル者。是ナリ。望等及視物旋  
轉ヲ乘船シテ岸ノ動ヲ見。或ハ風前ニ物ノ動搖スル  
テ馬乘船等ヨリ来ルハ。亦其身體ヲ蓋搖シ等ヨリ来  
ルモ亦其白脈畏縮シテ其静定ヲ失フニ於テハ。則  
前證ニ同シト雖モ。此ハ是其以テコレヲ畏縮セシ  
ムル所ノ者ガ外ニ在テ。而テ必ズ内腦質ノ虚弱ナ  
ルニモ非ズ。又勉強シテ勞動スルヨリ發スルハ。血  
ノ騷擾衝逆スルト精氣ノ勞憊乏弱ナルノ二因ヲ  
聚會シ来ルナリ。貪飲烈酒。過用煙草。若シ他ノ烈香  
臭氣ニ中レルヨリ来ルハ。皆其慄悍精烈ノ氣ノ直

徑ニ頭腦ヲ衝テ瞳白脈ヲ牽引攣急セシムルノ致  
ス所ナリ。又兼發ノ證寒壞液ニ於テスルガ如キハ。  
則其稀涼酷厲ナル液ガ眼底ニ侵淫シテ瞳白脈ヲ  
刺傷スルヨリ發シ。又胃病。殊ニ惡液ヲ蓄藏シテ所  
在ノ白脈ヲ刺衝セラル者。胃中ニ汚液。或ハ腐敗  
ニ治スルモナリ。然モ若シ此證ヲ惡性熱ノ初發  
ニ於テ得ルトキハ。則大ニ危險ナリトスルモ亦屢  
酷厲液ニ非ズト雖モ。尋常ノ胃家蓄水ノ證モ亦屢  
眩暈ヲ發スルヲアリ。是レ其蓄水ガ胃ノ白脈叢ヲ  
障遏シテ以テ靈液ノ運行ヲ妨害スレバナリ。頭痛  
篇ヲ参考及諸ノ白脈攣急病ニ發スル者ハ。皆其運  
動ヲ以テ瞳白脈ニ連及セシムルノ致ス所ナリ。凡



眩暈ノ因發癩ノ因ト相同キ者多シ。蓋シ癩ハ他トノ  
 コレヲ發スベキ原因アリテ。而テコ、ニ癩ル因トノ  
 相聚會スレバ。則茲ニ陥入シ。コレ無レハ則但眩暈  
 ニ止ルナリ。ニ篇ヲ通考セバ。則自カラ瞭然タラシ  
 ○此病或ハ稱スルニ心厥ノ名ヲ以シテ。心藏ノ病門  
 ニ算入スルアリ。蓋シ此ヲ卒中ニ比スルニ。彼ハ脈  
 動呼吸猶存シ。此ハ皆共ニ絶ス。加ルニ心瘤大幹脈  
 瘤アル者。及多血家。脫血家ニ於テ皆眩暈卒厥ノ患  
 ヲ將來スルヲアルガ為ニ。遂ニ繫テ心病ニ屬セル  
 ナリ。然ドモ今コレヲ考ルニ。其因其證皆腦ニ屬ス  
 ル者多ク。且ツ諸家大率腦病ニ算入スルヲ以テ。乃チ  
 此ニ編出スルナリ。然ドモコレヲ心ニ屬スルモ亦

一 理ナキニハ非ズ。故ニ舉テ以テ参考ニ備フ。

○ 治法。多血衝逆ヨリ來ル者俗ノ所謂ハ。速ニ刺絡

一回スベシ。其他ハコレヲ禁ズ。且ツ醋ヲ取テ鼻ニ

嗅シメ。顛顛及手ノ關節等ニ。醋ニ温湯ヲ和シテコ

レヲ摩擦スベシ。又飲ヲ得バ。醋ニ水ヲ和シテ口

中ニ注キ入ベシ。熱病若ハ炎暑ニ中リテ眩暈スル

モ亦此法ニ宜シ。脫血ニ由ル者ハ。芸香迷迭香。或ハ

揮發鹽ヲ鼻ニ嗅シメ。繃帶ヲ取テ腹部ヲ卷縛シ。次

ニ桂酒少ヅ、ヲ服用セシムベシ。此レ最勝ノ壯心

藥ナリ。乘船騎馬。登高臨深。若ハ烈酒煙草。諸香臭氣



等ヨリ来ル者ハ。先ツ其因ヲ去ベシ。而テコレヲ寒  
 煖適宜ノ處ニ安置シ。醋水飲ヲ與テ鎮静スレバ則  
 愈ユ。中ニ就テ諸氣ニ中タル者ハ。速ニ戸牖ヲ開テ  
 其氣ヲ散ゼシムベシ。而テ外用方ハ唯其面ニ水ヲ  
 喫クヲ可ナリトス。其他嗜藥ノ如キハ。反テ其因ヲ  
 益スニ足ル。腦質虚弱ヨリ来ル者ハ。鹿角精或ハ礞  
 砂加石灰等ノ揮發鹽ヲ嚙シ。或ハ燒酒或ハ琥珀  
 油若ハ華耶普的油等ヲ用テ顛顛ヲ摩シ。鳩尾ニ安  
 シ。其他外用法ヲ以テ其急ヲ救ヒ。既ニ醒覺シテ後  
 ハ。大率壯腦強心劑ヲ與テコレヲ補ベシ。特ニ各其

因ヲ推テ適宜ノ方ヲ擬用スベシ。卒厥昏倒持久ス  
 ル者ハ。宜ク先ツ刺絡ヲ施シ。次ニ有益ノ瀉導劑ヲ  
 施シ。而テ接骨木花醋糖浸ヲ與フベシ。刺絡スルニ  
 由テ發スル眩暈ハ危カラズ。速ニ臥床ニ就シムレ  
 ハ便チ愈ユ。若シ愈ズンバ醋水飲ヲ與フベシ。疝痛  
 風難産兒枕痛等ヨリ来レル眩暈ハ阿芙蓉劑ニ宜  
 シ。子宮衝逆ノ證時トシテハ卒厥ニ混スルアリ  
然モ彼證ニハ必ズ咽喉苦道ノ徵アリ。卒厥ニハ  
コレ無シ。而テ其救急法モ亦阿魏劑。若ハ羽角皮自  
毛ヲ燒テ其臭ヲ嗅シムルニ宜キノ異アルナリ。自  
 餘他病ニ兼發スル者ハ。救急ノ外各其原因ヲ詳ニ  
 シテ隨宜ノ方法ヲ施スベシ。諸方劑總テ泰西方鑑



不寐第十二

不寐之近因。神氣所攪擾。而腦管不能閉也。其遠因。血液變壞為稀涼酷厲之所致也。或有所思而神氣自不能安者。亦有之。此皆專發之證。若其兼發。則於熱病。或諸疼痛。或哮喘不利病等者是也。蓋此病甚似輕易動輒漸重險不可蔑視矣。

興寤ノ間。神氣外物ニ交リ。靈液諸部ニ注キ。漸ク疲レ。漸ク乏ク。腦中將ニ虛セントスレバ。則自然ニ睡ヲ催シ。腦管自ラ閉合シテ。而テ其神氣ヲ藏メ。白脈

委弛シテ。而テ其外管ヲ休シ。熟睡時ヲ經ルノ間ニ。靈液漸ク滋息シテ。而テ神氣復發揚シ。睡リ始テ醒覺ス。此ヲ無病平全ノ機トシテ。即チ自然良能ノ以テ。此生ヲ保ツ所ノ一大緊要事タリ。然ルニ血液變壞シテ。其常性ヲ失シ。稀涼酷厲ノ質ト為ルトキハ。此レ壞血質及膽液敗黑家。若ハ長病衰弱ノ人ノ此患ニ嬰ルト多キ所以ナリ。則居恒其腦管ヲ刺戟寧急シテ閉合スルヲ能ハザラシメ。夜間物ニ接スルヲ無キ。常テ其意識ニ記スル所ニ就テ種ノ妄想ヲ發セシメ。正ニ睡ント欲シテモ睡得ルヲ能ハザルナリ。故ニ多ハ尋テ癩ヲ發シ。若ハ精神錯



亂スルナリ。凡物ヲ合著スルハ粘膠質ノ物ニ非レ。粘液多ク且鈍性ノ人ハ必ズ睡リ易キモノナリ。如  
 今此ニ反シテ血液稀ク且酷厲ナルトキハ則其睡  
 ルヲ能ザル者。理ニ於テ曉リ易シ。夫ノ一虚家ニシ  
 テ。而テ睡ヲ喜ムト睡ルヲ能ザルト。甚懸隔スル  
 アルガ如キハ。當ニ此理ヲ若夫當ニ思慮スベキ事  
 件アリテ。神氣是カ為ニ伏藏セズ。内ヨリ動テ其腦  
 管ヲ閉合セザル者ハ。是其事ヲ了スレバ則復故ス  
 算シテ病トハ為スベカラズ。然ドモ此亦持續シテ  
 休ザレバ。則遂ニ腦虚ノ因トナル。又熱病ニ因テ血  
 液騷擾シ。其熱氣ノ酷厲ヲ以テ腦管ヲ刺傷哆開シ  
 因テ不寐ヲ發スル者ハ。是謬妄發狂若ハ昏睡熱ニ

陷スルノ前徴ナリ。諸疼痛ニ發スル者ハ。即チ其痛  
 意識ニ響觸シテ腦管ヲ感動スルヲ以テ睡ルヲ能  
 ザルナリ。呼吸不利シテ不寐スル者ハ。即チ呼吸ヲ  
 作サシムルノ機關ニ障アルガ故ニ。自然ニ腦管モ  
 静收シ難キニ因ル。蓋寢息ハ。精神ヲ養フノ大本ナ  
 リ。故ニ不寐久ヲ經テ愈ザレバ。則精氣日日ニ費耗  
 シテ。遂ニ腦虚諸證。昏冒。癩瘕。卒中。狂亂等ノ病ニ陷  
 シ。或ハ他ノ不起ノ病ヲ誘發スルヲ少カラザルナ  
 リ。速ニコレヲ救療スベシ。

○治法。催睡藥ニ酷厲ヲ緩和スル驚癩鎮止劑ヲ兼用



スベシ。熱毒ヨリ起ル不寐ニハ。龍消散ヲ大麥煎ニ  
テ送下スベシ。甚良ナリ。兼發ノ證ハ。治本病ノ上ニ  
在ト雖ドモ。證ニ由テハ催睡藥ヲ兼用シテ可ナル  
者アリ。其中患者自カラ其意ヲ用ルニ非レバ呼吸  
スルヲ得ザル者ニハ催睡藥ヲ與ルヲ勿レ。若コ  
レヲ與レバ。則意識ノ運動休スルガ故ニ。以テ呼吸  
ヲ遏止シテ而テ其死ヲ促シ来スニ足ル。然ドモ若  
其呼吸不利スル。白脈攣急ニ因テ發スル喘ノ如  
キハ。復催睡藥ニ佳ナリ。施治ノ當否ハ。唯病因ヲ明  
辨シテ而テ方劑ヲ處スルニ在リ。諸方劑總テ泰  
西方鑑ニ載ス

○又別ニ興寤昏睡ト名ヅクル者アリ。此病ハ晝夜ト  
モ半睡半覺ノ證ニシテ。其因。腦管ハ弛緩痿弱シテ  
當ニ睡ルベキニ。稀涼酷厲ノ液アリテ。以テコレヲ  
刺傷スルカ。或ハ稀涼液ト粘稠液ト間雜混在スル  
ナリ。此ヲ昏睡不寐合病トス。治法。下劑引降劑脚湯  
法等ニ宜シ。亦前ノ諸篇ヲ通考シテ處置スベシ。蓋  
此ヨリ變ジテ卒中ニユキ。或ハ他ノ腦病ニ陷スル  
ト多シ。忽卒輕視シテ誤治スベカラズ。

癩第十三



魔之近因。歷過白脈而障身靈液之循行。且以妨害心肺運動之機。而呼吸寒難之所致也。其遠因。仰臥抑腦飽滿。衝膈腦間溜液。心囊溢液。恐悵鬱憤。情意不了。或有麻澀性液稠凝血液。黑膽液質之血等也。此病尋常輕證。非可甚恐者。但有頭腦病。諸血證。或肺藏膈膜等本病。而兼發者。則不易也。不可不知矣。

癡ハ每夜臥床ニ就テ半睡半醒ノ時若ハ深夜熟睡ノ時ニ於テ夢中ニ心膈ヲ厭カ如ク呼吸殆ンド促迫シテ叫喚セント欲スレドモ發聲スルヲ能ス舉動セント欲スレドモ運轉スルヲ能ズ煩悶苦惱甚

則傍人ヲ驚カシ。蓋搖醒覺セラレテ而テ后止ム。蓋仰臥シテ後腦ヲ壓抑スレバ。則第八對白脈ノ根原ヲ壅グガ故ニ。胸部及胃ヲ循ル所ノ靈液十分ニ灌注シ快行スルヲ能ズ加ルニ項椎ヲ壓抑シテ橫膈白脈ヲ支障シ。此等ノ諸白脈皆牽張シ。或ハ牽縮シテ。而テ心肺ノ運動妨害セラレ。因テ心悸動心肺牽ノ縮スレバ。心血常度ノ如ク宜流スルヲ能ハズ。蹶躍シテ而テ激行スルノ致ス所ナリ。呼吸不利。心下拘攣ノ證ヲ將出シ來リ。是ガ為ニ苦悶シテ驚懼スベキノ夢ヲ見。或ハ號ント欲スレトモ。亦其九對白脈即チ循舌ノ神經ナリヲモ共ニ抑塞スルヲ以テ。聲ヲ發



シ難キナリ。或ハ舉動セント欲スレドモ支體動ク  
ヲ得ザル者ハ。則脊髓白脈ノ根ヲ抑ヘテ外部四  
肢ヘ行ク諸白脈運行シ難ケレバナリ。加旃傍人コ  
レヲ盪揺スレドモ容易ニ醒覺セザル者ハ。是其諸  
白脈ヲ上方ヘ牽擥スルガ為ニ。血行モ亦コレニ逼  
迫セラレテ上部ヘ輸スルヲ多ク。頭中ニ滿盈シテ  
全腦ヲ抑塞スルガ故ナリ。胃中飽滿シテ横膈ヲ上  
衝スルヨリ來ル者モ。其抑塞セラル、所ハ則本末  
ヲ異ニスト雖モ。其害ヲ為ス所以ハ則同シ。又腦間  
ノ溜液ハ。其本ヲ妨害シ。心囊ノ溢液ハ。其末ヲ障導



シ因異ナリト雖モ亦其證ヲ同スルナリ。凡少壯  
ノ人。心少壯ヲ  
ナリ。又衰者ノ人ハ反テ常ニ手ヲ以テ心ヲ按ハ  
セシ。心蔵運轉ノ精カ乏缺スルガ故ナリ。恐怯鬱憤  
情意不了ヨリ來ル者ハ。凡人是ノ如キノ事件アレ  
バ。則居恒頭腦ヲ苦シノテ而テ白脈舒暢セス。胸腹  
諸藏盡ク上方ヘ引擧テ而テ背ニ著ガ如ク。胸膈苦  
悶ヲ覺ユル。或ハ醒寤ノ時ト雖モ猶麗夢ノ時ノ  
如ク然リ。而レドモ寤時ハ元氣發動ノ力ニ因テ尚  
甚ダ迫ラザレドモ。睡時ハ則神氣收藏シテ元運ノ  
力減ジ。乃切迫驚恢セシメテ以テ麗夢ヲ致スナリ。

病因精義 卷之三



麻澀性液以下ノ物。氣管或ハ肺囊ニ滯著シテ。其運  
 動ヲ妨グレバ。則亦同病ヲ發スル。猶心囊ニ溢液  
 アルガ如ク一般ナリ。蓋但一時白脈ノ運行ヲ妨尋  
 シテ發スル者ハ。大概コレヲ省覺セシムレバ則愈  
 ヲ。若他ノ本病アリテ傍發スル者ハ。是一箇ノ害ヲ  
 重テ危險ニ進ムノ候ナリ。故ニ輕證ニ非ズトス。  
 ○治法。他故ナキ尋常ノ證ハ。大抵夕飧ヲ減ジテ胸下  
 ヲスカシ。按撫シテ氣血ヲ引降シ。或ハ時ニ下劑ヲ  
 用テ滯液ヲ導泄シ。而テ后ニ續桂散ヲ用レバ則愈  
 ヲ。兼發ノ證治ハ當ニ各其本病ニ從フベシ。

健忘第十四

健忘之近因。靈液衰敗。腦管虛弱。或腦内有障礙。而其所  
 見聞者難達于識府也。其遠因。稟賦腦質不全。或外傷。壓  
 腦管。或血性不良。黏凝汚液。或勞神苦思。女謁過度。或老  
 衰病損。過用麻藥等也。但稟賦自幼然者。及自然老衰者。  
 不治。

記憶ハ腦神ノ作用ニシテ靈液ノ管領スル所ナリ。  
 靈液ニ意識及運化ノ別故ニ靈液衰敗シテ其精力  
 アリ。醫範提綱ニ見タリ。如クナルナリ。則其見聞  
 ヲ脱スレバ。宛モ參酒ノ如クナルナリ。則其見聞



觸知スル所ノ者ヲシカト攝納スルヲ能ズ。又腦管  
虛弱ニシテ其括約ヲ失シ。其見聞觸知セシ所ノ者  
ヲ印定固持スルヲ能ザル。共ニ健忘ヲ為ス所以ナ  
リ。又腦内ニ障尋アリト云ハ。即下文ニ所謂ル腦質  
不全ナルカ。若ハ腦蓋ヲ外傷シテ強ク腦ノ外面ヲ  
壓迫シ。以テ淡黑髓解膜圖賦ヲ損シテ腦管狭窄ニ  
ナリ。其見聞スル所ノ事件ヲ十分ニ引攝スルヲ能  
ザルナリ。又血質不良ニシテ粘凝汚液ヲ含蓄シ。不  
斷腦内ニ料チ来レバ。イツトナリ其レガ腦ノ空陷  
ニ溜瀦シ。以テ腦管ニ逼テ狭窄ナラシメ。且靈液ノ

質モ亦不良ニナリテ自ラ腦内ニ溜瀦シ。宜流輸達  
シ難キト。攝受固持シ難キトノ患ヲ相兼テ健忘ヲ  
發スルナリ。勞神苦思スレバ腦管先ヅ弛緩緩慢シ。  
兼ルニ事件繁多ニシテ受容ニ任ヘザルカ。若ハ内  
ニ主トスル事件アリテ他ヲ受容セザルノ患ヲ以  
テスルナリ。甚トキハ則靈液モ亦虛乏ヲナス。女謁  
過度スレバ。先ツ靈液ヲシテ虛衰無カナラシメ。尋  
テ腦管ヲモ亦漸ク緩弱ナラシムルナリ。老衰及病  
後等ハ。凝形流動トモニ全體虛衰ヲ致スナリ。然ト  
癩癲狂卒中等ノ後ヲ承ル者ハ。專ラ腦虛ニ在ルナリ。麻藥催眠藥等ヲ過用ス



ルニ由ル者ハ。則腦管ヲ麻痺セシメテ以テ其作用  
ヲ失セシムルノ致ス所ナリ。

○外傷ニ由ル者ハ。手術ヲ先務トシテ治スベシ。血質  
痰濁ハコレヲ清スベシ。粘凝汚液ハコレヲ稀スベ  
シ。苦思女謁ハ先ヅ其因ヲ去テ而テ後其損失ヲ補  
フベシ。病損藥毒ハ亦各其宜キニ從テ而テ方法ヲ  
處置スベシ。諸方劑總テ泰西方鑑ニ集載ス。撰用スベシ。但稟賦ト老衰ト  
ハ天ナリ。終ニ醫藥ノ及ブ所ニハ非ルナリ。

鬱愁第十五

鬱愁之近因。有毒迫攻神府。或神氣虛弱自苦也。其遠因。  
膽液敗黑。自敗壞液。或遺傳。或閒居後神恐驚動情。或攝  
生非節。過分勞力。或長病衰弱。婦人產後。或血液脫失。腦  
髓枯燥。或通血閉止。中麻毒者等也。此病太率持久不愈。  
勿貪急效誤治矣。

沈神鬱愁ハ。精神錯亂ノ一種ニシテ故ナキニ悲哀  
憂悶シ。或ハ些事ヲ懸念シテ左右コレヲ苦慮シ。或  
ハ鬼怪魔障ノ如ク。或ハ怨恨忌惡ヲナシ。愚昧癡騃  
種種妄想シテ胸臆ニ絶ルナシ。豈其以テ因トス  
ル所ノ者アルコト無ランヤ。是ソノ腦質本來薄弱。



精神不爽ナル人ニシテ加ルニ内其神府ヲ侵襲劫掠スル者アルノ致ス所ナリ。今コレヲ徴スルコト必ズ敗黒セル膽液ノ在アリテ門脈中ニ鬱積シ。此カ血中ニ滯シテ而テ腦ニ傳來シ。其酷厲ナル質ヲ以テ不斷腦髓ヲ刺戟シテ安キヲ能ハサラシムルニ由テナリ。故ニ其始ノ必ズ先ヅ其鬱積スル部分。大腹兩側ニ於テ痞靱悶難スルヲ覺ヘ。其既ニ血中ニ滯スルニ當テハ。則全身ニ泛濫シテ而テ面色痿黃ヲ發シ。尋テ此病ヲ發シ來ルナリ。或ハ先天ヨリ遺傳スルモ亦コレアリ若此ガ陰部ヘ灌注スレバ。則亦其部ヲ衝動シテ以

テ房欲ヲ催起スルヲアリ。或ハ反テ過房ヨリ此證ヲ發スルモ亦コレアリリ故ニ多少膽液敗黒質ノ血アリテ沈黙性ノ人ハ大概多滯ナル者ナリ。此證ヲ夾毒ノ鬱愁病ト名ク○前ニ所謂ル膽液敗黒ノ因ナクシテコレヲ發スルアリ。此ヲ無毒ノ鬱愁病ト曰フ。是證連綿タル熱病後。或ハ強キ發汗。大ナル失血。劇キ下利。或ハ勞碌疲困。婦人産後等ニテ養液ヲ飛散消ヒシテ血質濃稠ヲナシ。靈液ノ原醅缺乏シテ。腦髓衰弱或ハ枯燥スルナリ諸部不順シ。或ハ細絡ヲ快通スルヲ能ハザルガ故ナリ因テ自敗ノ壞液ヲ生シタルヨリ發スルナリ。○夫



稟受膽液敗黑様ノ質ハ論勿シ。然ラズシテ膽液敗  
黒ヲ致ス所以ノ者ハ。是其怠惰逸居。苦思勞役。及攝  
養非度ナルヨリ漸シ来ルナリ。又凡間居シテ身體  
ヲ運動セザル人。加ルニ憂セ困難。或ハ思慕愛戀。或  
ハ恐驚不安。或ハ嫉妬怨恨ヲ以テシテ。而テ所思達  
セズ。為ニ精神ヲ疲勞センムレバ。遂ニ此病ヲ發シ  
テ。此ヨリ狂病ニ變ズルヲ多シ。蓋シ尋常輕淺ノ證  
ハ。肝脾ノ閉塞。胃弱痞懣。通血閉止家ノ時時兼發ス  
ル所ニシテ。夾毒ノ證ニハ非ズ。然ドモ多少黒膽液  
ヲ兼ルニ於テハ。遂ニ真證ニ陷入スルヲアリ。解剖

書ノ說ニ。此病尸ヲ解觀セシニ。腦部ノ血脈ニ黒色  
ノ凝血充滿シ。及腦室ニモ是ノ如キ物充滿シ。或黄  
色ナル鹹渣充滿ス。或ハ心蔵燥硬シ。及其膜狹窄緊  
迫固著シ。或ハ腸胃肝脾叢胞腸間膜等ノ造成アシ  
ク。黒膽液充滿シ。或ハ硬結腫ヲ生シ。或ハ心腸等ガ  
異常ニ小ナル者アリト云リ。按ニ婦人ニ子宮ノ沉  
神病ト云モノアリ。蓋  
亦腹腔内ノ造成不良ナルヨリ。其白脈ノ交通スル  
所硬結シ。或ハ子宮街逆ヲ兼ル等ヨリ名ケタル者  
ベナル

○凡夾毒ノ證ハ。大便多少黒色ヲ帶ビ。且ツ燥結シ。小  
便微黄稀淡ニシテ光ルガ如クシテ少ク。時時寒熱



ヲ發シ。或ハ譫忘シ。或ハ言語寒澀シ。脈遲浮ナリ。無  
毒ノ證ハ。大抵小便白色稀淡ニシテ。脈緩弱ナリ。若  
平生輕心多言家ハ。狂ニ轉ズル。少カラズ。夾毒鬱  
愁甚キ者ハ。自死ヲ致ス。一アリ。

○治術ハ。凡ソ先ヅ思慮ヲ逐除シ。歡喜悅樂スベキ譚  
話。及舞樂戲場等ニテ情ヲ慰シ。又毎日騎馬或ハ緩  
步逍遙セシメテ體ヲ動シ。以テ神氣ヲ活揚シ。且血  
液ヲ快行セシムベシ。總テ閉塞ヲ開達スルノ務ヲ  
要ス。必ズ患者ノ意ニ任シテ。密室ニ籠居セシムル  
ヲ勿レ。血ノ腦ニ上衝スル。多キ者ハ。刺絡ヲ施シ。

緩緩ニ其毒ヲ下導ス。酒石飲。消石散等コレニ宜シ。  
利尿劑モ亦良ナリ。通血壅閉ヨリ發スル者ハ。コレ  
ヲ情意ノ感觸ヨリ發スル者。及ヒ遺傳ノ證等ニ比  
スレバ。治ヲナシ易シ。温浴。或ハ發疱膏。貫線法。呼膿  
法等ヲ施テ尤良ナリ。不寐ヲ兼ルハ。強心壯腦劑ニ  
宜シ。然ドモ熱性ノ品ニ宜カラズ。龍腦散ヲ與フベ  
シ。固滯シテ虛候アル者ハ。下劑ヲ用ユベカラズ。但  
其毒ヲ和解シ且蒸發スルニ。麝香丹ヲ與フベシ。無  
毒ノ證モナラ白脈ヲ強クシ。心氣ヲ壯ニスルノ藥  
品。麝香龍腦等ニ宜シ。コレヲ主トル。

諸方劑總テ泰  
西方鑑ニ出ス



癲狂第十六

癲狂之近因。靈液過行度。而強暴躁動也。其速因。多血稠厚。而精氣溢餘者。或常用酷烈諸飲者。或男女精液盈滿。而慾情不遂者。或大勞神智。而思慮紛糾者。或沈神鬱愁。窮極而濫者。或諸瘡毒內陷。上攻者。或熱毒強盛。炎上等也。若夫先天遺毒。世世發狂者。及經日彌久者。不治輕證。或繼發。搐搦。瘳。或見諸失血者。則有自愈矣。

夫靈液ハ神ノ資ニシテ。凡人身知覺運動ノ事件ハ。皆其與ル所ナレバ。則諸病精神知識ニ關係スル

アル者ハ。必定靈液ノ運行ニ於テ常ニ反スル所アルハ。則論ヲ須スシテ知ヌベシ。中ニ就テ鬱愁癲狂ノ如キハ。其尤モ著キ者ナリ。而レドモ此ニ證ニ就テ其因ノ以テ辨別スベキ所ヲ論ズルニ。虛實ノ分大ニ同カラザルナリ。蓋シ鬱愁病ハ。概括シテ靈液ノ乏損スルカ。否ザレバ則微力ニシテ邪物ニ敵對シ克服スルナリ。能ハザル者ノ患フル所ナリ。癲狂病ハ。則靈液ノ有餘過行スルカ。否レバ激スル所アリテ而テ奮起妄動スルノ致ス所ナリ。然ト雖モ若シ他ノ本病アリテコレヲ傍發スル者ハ。亦概シ



テ論シ難キノミ。蓋シ其人多血稠厚ニシテ而テ精  
 氣有餘ナル者ハ。則腦内靈液ヲ釀スルヲ自ラ過分  
 ニシテ。説来テ靈液ト精氣ト反リテ論ズレバ則一ナ  
 成リ。蓋シ者ニシテ。即ナク其本水ノ精液ヨリ成レル所ノ血  
 中ノ精氣ヲ腦ニ於テ分ニ離シ取リ。再釀煉シテ而  
 テ醇粹ニ至テ。畢竟一物ノニシテ。凡ル人身ノ非ルナリ。蓋シ  
 即チ靈液ハ至テ。微妙ノ物ニシテ。凡ル人身ノ非ルナリ。蓋シ  
 靈液ハ至テ。微妙ノ物ニシテ。凡ル人身ノ非ルナリ。蓋シ  
 事件。臨テ育長養一ノ事ヲ主トシテ。論スル所ナリ。然バモ  
 生ノ天地ト起テ。同スル者ニ就テ。活撥運動ノ機ヲ作ス  
 有セテ。元氣ルニ就テ。其身體ヲ長育シテ。稱シテ。生氣ト保  
 日。其精爽。覺感ノ應。一ニ就テ。ハ。則稱シテ。精氣ト曰  
 。

其血中若ハ諸液内ニ散在スル者ヲモ亦精氣ト曰  
 シ。其精液ニ蓄ヘテ。以テ生スル用ニ供スル者ヲ稱  
 白脈内ニ灌注スル者。及其體用ヲ兼舉グベキト而  
 名ハ則稱シテ。靈液ト曰フ。皆是同一物ニシテ。而  
 ハコレヲ智ヲ見テ。フコガレヲ仁ト曰ヒ。智者ハコレヲ見  
 者ハ。則純駁同シカ。ラザル。其白脈ヘ灌注スルヲ居  
 恒ニ夥多ニシテ。溢越衝行。激射途流シ。加之其靈液  
 ノ質中ニ鹽氣ヲ含有スル。トモ亦太甚夥多ニシテ。  
 常常ニ熱沸スルガ故ニ。僅ニ耻辱ヲ蒙リ。若ハ意ニ  
 逆フ。アリテ。憤悶ニ勝ザルカ。或ハ不圖。愾躍スル  
 下アリテ。神氣度ニ越テ。發暢スルカ。若ハ驚快スル



一アレバ。則精氣沸溢。元運行度ヲ失シテ。神騷癡狂  
 スル一アルナリ。又尋常酷烈ノ酒漿ヲ用ヒ。若ハ此  
 ノ如キ類ヲ過用スル人ハ。軼スレハ輒チ醉狂スコ  
 レヲ真狂ニ比スルニ。其一時ニシテ醒來ルカ。持久  
 シテ醒ル一ヲ得ザルカト云ノ異ナルノミ。故ニ此  
 因重疊スレバ。則習テ常トナリ。遂ニ真ノ狂病トナ  
 ル一アリ。又男女精盈テ而テ血中ニ酷厲ナル鹽氣  
 ヲ含有スル者ハ。斷ヘズ陰部ヲ衝動シテ以テ媾心  
 ヲ誘發スルモノナリ。然ルニ情ヲ忍シテ鬱陶タル  
 ガ。一時意ノ動ク一常ニ違ヒ。忿怒若クハ驚駭スレバ。

則逆氣腦ヲ衝テ以テ靈液運行ノ序ヲ失ハシメ。恭  
 敬ノ心忽チ亾亂シ。媾事ヲ言ヒ。陰所ヲ露シ。耻辱ヲ  
 忘レテ狂行スルナリ。神ヲ勞シ智ヲ後シテ思慮紛  
 錯スル者。若シ其欲スル所ヲ得ザレバ。則煩惱鬱積  
 シテ自ラ其神氣ヲ亂リ。或ハ卒然トシテコレヲ得。  
 神氣悵躍シテ却テ其行度ヲ錯リ。共ニ發狂スル一  
 アリ。又鬱愁病ニ嬰テ而テ靈液未ダ虛セザル者ハ。  
 則鬱極テ奮激シ。因テ狂病ニ變ズル一アリ。若虛極シハ  
 テ繼死投水者アリ。若夫諸毒内攻ノ證ハ。是其毒氣ガ腦ヲ  
 攪亂シ。良能コレト相戰テ以テ靈液ノ行度ヲ過ツ



ノ致ス所ニシテ。本来精神ニ患アルニハ非ズ。故ニ其毒ヲ驅逐スレバ則愈ユ。腦焮腫熱毒發狂モ亦同  
シ。熱病門腦焮腫ノ先天ノ遺毒ハ血質ノ酷厲ナル條下参考スベシ  
 既ニ長シ且老シテ而テ其毒重厚ニナレルヨリ  
 發スル者ナルガ故ニ藥モ亦解スルヲ能ズ或ハ腦  
惡キアリ来凡此病久ヲ經レバ。則其異ナル運動ガ  
 常トナリテ。以テ一身ノ主宰トナル故ニ僻ヘバ柱  
 礎ノ朽陷セシ家ノ如ク。脩理ヲナスベキ所ナキナ  
 リ。若其レ搖擗發癩ヲ兼ル者ハ。コレニ賴テ病毒ヲ  
 排擯斥出スルヲアリ。故ニ自愈シ。或ハ治ヲ得テ而

テ愈ユ。又諸失血ノ證アル者ハ。則良能ノ為ニシテ  
 以テ其過ル所ノ者ヲ減損スルガ故ニ。元氣血液共  
 ニ其度ヲ得テ而テ復常スルヲ期望スベシ。然ド  
 モ總テ難治ナリ。且治ヲ得ルヲアルモ。亦再ヒ發シ  
 易シ。解剖書ノ説ニ。狂人及癡人ノ尸ヲ解觀セシニ。  
 腦及腦膜ニ黒斑點アリテ而テ甚燥キ。且黄色ヲ帶  
 ビ。或ハ黒膽液ノ留著スル者アリト云ヘリ。  
 ○治法ハ。大率刺絡角法。吐劑。下劑等ヲ用テ以テ其運  
 動大過ヲ減損セシメ。清血鎮神下後催睡藥少許ヲ用テ良效ヲ奏スルヲ  
 リ。若ハ酷厲ヲ和柔スルノ劑ヲ内服外用セシメ



テ以テ其本ヲ治シ。諸方劑總テ泰西方鑑及熱毒發  
狂ハ。因證共ニ各其條下ニ就テ考究シ。方劑モ亦其  
意ヲ以テ方鑑ヲ探ルベシ。一様ノ看ヲナス勿レ  
或ハ其情ヲ遂シ。或ハコレヲ慰安シ。或ハコレヲ  
嚴戒シテ以テ調理保攝スベシ。既ニ治功ヲ得ルト  
キハ。則毎年春秋平線ノ頃。其血ノ溢滿スルニ先テ  
コレヲ瀉シ。且清涼藥劑ヲ用テ。其再發ヲ豫防スベ  
シ。夏ノ土旺ニハ血沸騰漲溢スルモノナリ。  
此等ノ時候ニモ亦意ヲ用テ是可ナリ。

眼病第十七上

眼疾者。焮腫眼。膿眼。眼星。眼釘。曇暗眼。昏暗眼。內障。瞳子

散大。及縮小。流淚眼。內眥膿瘍。淚管癭等也。

五官ハ腦下ニ昵近シテ。聲色臭味觸唯觸ハ周ヲ辨  
知シ。以テ神識ニ達スルノ具ナリ。而テ眼其最トシ  
テ殊ニ腦ニ密邇ス。精神ノ外交スル。此ヨリ先ナル  
ハナク。其役使スルモ亦此ヨリ甚キハナシ。故ニ五  
官ノ病ヲ得モ。亦眼ヨリ多キハナク。而テコレヲ治  
スルモ。亦他具ヨリ難シ。豈ソレ詳ニコレヲ論セザ  
ルベケンヤ。夫レ病ヲ治スルハ常ヲ知ルニ在リ。加  
ルニ眼科ハ手術ニ關涉ル者多シ。故ニ其器具。及其  
以テ看取スル所ノ機ヲ知ズンバアルベカラザル



ナリ。蓋シ眼ノ外部上下ノ驗児ハ開闔以テ使役休  
 息ノ用ヲナシ。瞬動以テ拂拭清明ノ便ヲナス。便コノ  
 フ閉ナル所以ノ者ハ即チ筋ナリ。上下環筋ハコレ  
 眉毛ハ汗液ノ下滴ヲ防キ。睫毛ハ風塵ノ吹入ヲ遮  
 ル。驗端ニ弓形柔骨アリ以テ驗ノ形状ヲナシ。裏面  
 ニ細泌胞アリ。眵ヲ漉出シテ球外ヲ滋潤シ。丁骨ハ  
 内眥ヲ造成シ。裏面ニ淚囊ヲ納レ。淚管アリテ其末  
 端ニ著キ。以テ鼻中ニ達スルナリ。内部ハ六膜三液  
 及筋脈等ヲ以テ集束造成スルモノナリ。六膜ハ最  
 上ヲ白膜ト云フ。中空ニ連リ。内環状ヲナシ。外圍ハ上  
 環状ヲ作ス所以ノ物ナリ。乃其内ヲ暗黒ナラシメ。且其影ヲ  
 テ以テ照映スル所ノ物ナリ。乃其内ヲ暗黒ナラシメ。且其影ヲ  
 カ縮ナリ。次膜ヲ強膜ト云フ。水脈ト附着ス。其前面ハ  
 白膜ヲ被ハズシテ甚透明ナル膜ニ變ズ。コレヲ玲  
 瓏角膜ト云フ。此鳥睛ノ最又次ニ脈質膜アリ。細毫  
 ヲ以テ織成シ。其前面ヲ葡萄膜ト云フ。正中ニ瞳孔  
 ヲ穿ツ者ナリ。其下ニ二薄膜アリ。テ前面中部ニ著  
 被布セザルナリ。故ニ此ヲ脈質最裏ヲ羅紋膜ト云  
 膜ニ屬隸シテ敢テ枚舉セズ。最裏ヲ羅紋膜ト云  
 フ。白脈織成ス。以テ形凹状ニシテ。前圍ハ瞳子ニ接シ。後  
 底ハ司瞳白脈ニ著ク。別ニ蜘蛛絲膜アリ。甚薄キ膜  
 ノ著スルモ三液ハ第一ヲ水樣液ト云フ。性燒酒ノ如ク。

環状ヲ作ス所以ノ物ナリ。乃其内ヲ暗黒ナラシメ。且其影ヲ  
 テ以テ照映スル所ノ物ナリ。乃其内ヲ暗黒ナラシメ。且其影ヲ  
 カ縮ナリ。次膜ヲ強膜ト云フ。水脈ト附着ス。其前面ハ  
 白膜ヲ被ハズシテ甚透明ナル膜ニ變ズ。コレヲ玲  
 瓏角膜ト云フ。此鳥睛ノ最又次ニ脈質膜アリ。細毫  
 ヲ以テ織成シ。其前面ヲ葡萄膜ト云フ。正中ニ瞳孔  
 ヲ穿ツ者ナリ。其下ニ二薄膜アリ。テ前面中部ニ著  
 被布セザルナリ。故ニ此ヲ脈質最裏ヲ羅紋膜ト云  
 膜ニ屬隸シテ敢テ枚舉セズ。最裏ヲ羅紋膜ト云  
 フ。白脈織成ス。以テ形凹状ニシテ。前圍ハ瞳子ニ接シ。後  
 底ハ司瞳白脈ニ著ク。別ニ蜘蛛絲膜アリ。甚薄キ膜  
 ノ著スルモ三液ハ第一ヲ水樣液ト云フ。性燒酒ノ如ク。



シ 玲瓏角膜ト葡萄膜トノ間室コト名ク前ニ滿ル者是  
 ナリ。第二ヲ水晶液ト名ク。後透明固球形ニシテ前  
 全ク顯微鏡中ノ顯微 葡萄膜後ニ在リ。第三ヲ硝子  
 フナス硝子ト同シ。液ト云フ。第一液ニ比スレバ稠。第二液ニ比スレバ  
 稀。其質大率雞子白ノ如ク。其量ハ甚多ク。  
 眼ノ球形由ルナリ。水晶液ノ裏面ニ附著シテ。其  
 絲膜ヲ以テ蜘蛛 其後半形ヲ擁抱シ。後面外圍ノ硝子液  
 前ニ向テ水晶液ニハ羅紋膜ヲ以テ包裹スコレヲ  
 抱キ著ク所是ナリ。蓋シ眼ノ物ヲ視ルヤ。萬景先ツ  
 後大囊ト謂フナリ。蓋シ眼ノ物ヲ視ルヤ。萬景先ツ  
 玲瓏角膜ニ映シテ而テ水様液ニ入り。瞳孔ヲ縮穿  
 シテ而テ水晶液ニ倒寫シ。再ヒ硝子液ニ反照シテ

而テ正影ニ復シ。羅紋膜ノ白脈コレヲ知覺シテ而  
 テ司瞳白脈幹ニ輸シ。以テ神識ニ達スルナリ。若其  
 運轉自由ヲナスハ。則六筋ノ為ス所諸液ニ養榮ス  
 ルハ。則血脈ノ管スル所ナリ。六筋ハ。斜上。斜下。外向。内向。斜上。斜下。是ナリ。  
 先ヅ此等ノ義ヲ領解シテ。而テ後チ事ニ治術ニ從  
 フベシ。若尚詳ナルヲ知ント欲セバ。解藏圖賦ヲ參考スベシ。

眼焮腫之近因。血液聚攻于白膜也。或延及于諸膜。眼胞  
 等。其遠因。乳糜稠厚。以使養液黏凝。乃留滯于眼膜之細  
 絡。兼以眼部蒸氣閉塞之事件。而鬱熱沸騰之所致也。又  
 自泄物閉塞。熱病毒。傷冷毒。淋疾閉塞。癩毒。及痘疹毒。丹



毒諸瘡毒等侵淫于眼部發之。或緣刺傷摩擦倒睫過飲。若侵雨傷風煙薰塵入向日瞻火等誘之。其證大率相同。而有差異宜診別而施治也。

焮腫眼或ハ風眼或ハ赤眼ハ焮熱疼痛上脰腫脹以テ氣光ヲ受ニ堪ズ。眼中屢劇痛シテ宛モ毒刺ヲ用テ刺スガ如ク。或ハ眼中ニ木屑若ハ砂ナドノ侵入スルガ如ク。或ハ蚊蟲ナドノ飛過スルガ如ク。若ハ蛛絲羅網ナドヲ引過ルカ如キヲ覺ヘ。瞼内ニ眵滿チ。コレヲ開ントスレバ淚大ニ出テ脈數ニシテ強ナリ。劇キ者ハ支體寒慄シ。顫顫ノ動脈鼓搏ス。蓋シ

焮腫ノ在ル所ハ大率白膜ヲ常トスレドモ。或ハ角膜ニ在テ而テ白膜ニ延及スルアリ。或ハ内部ノ蒲桃膜若ハ脈質膜ニ在ルアリ。或ハ唯内眥外眥ニノミ在ルアリ。又各部一處ニ發スルアリ。眼膜一體ニ發スルアリ。然ドモ眼部ハ固ヨリ狹隘ナルガ故ニ。大抵内部ニ在ハ外部ニ連及シ。外部ニ在ハ内部ニ侵入ス。意ヲ用テ診別スベシ。○乳糜ハ飲食ノ精諸液ノ原故ニ此ガ稠厚ヲ致セバ。則諸部ノ輸養液粘凝ス。中ニ就テ眼ハ内質都テ水液ヲ以テ主トスル者ナレバ。其原醅ノ稠厚ナル。如何ソ留滯ノ患ヲ



將出シ来ルナカラシヤ。コレニ加ルニ眼膜ノ膜  
理ヲ壅塞シテ。其蒸氣ヲ抑遏セシムレバ。所謂風等  
ヲノ事件此害則聚滿鬱蒸シテ。茲ニ焮赤疼痛スル十  
リ。泄物トハ痔血。經血。汗。涕。尿。糞等ナリ。此等ガ閉塞  
シテ。而テ鬱滯酷厲ノ剩液トナリ。血中ニ含蓄シテ  
而テ眼部ニ滲シ来リ。或ハ熱毒以下ノ諸病毒ガ滲  
シ来ルトキハ。則先ヅ其酷厲氣ヲ以テ眼中ノ脈絡  
ヲ刺傷シテ癢痒熱痛シ。遂ニ焮腫ノ患ヲ引出シ来  
ルナリ。刺傷摩擦以下ノ諸因ヨリ来ルハ理會シ易  
シ。是等ハ但一二ノ輕證ヲ發シテ而テ已ム。然ドモ

若シ兼ルニ他ノ内因ヲ以テスレバ。則重證危篤ニ  
至ルナリ。

○凡焮腫眼ニ七種ノ別。及急發持久。休作ノ異。内因。外  
因。單發。兼併。傍發ノ差等アリ。七種ハ乾證ニ無眇有  
眇ノ二種アリ。濕證。丹毒樣證。有腫瘍證。腫子陷凹證。  
損傷證等ナリ。

○乾燥無眇ノ證ハ。痛少ク淚出デズ。膿無ク。而テ眼球  
甚腫起ス。其原眼瞼脂泌胞ノ細絡閉塞スルナリ。有  
眇ノ證ハ。乾タル糖ノ如キ眇ガ彼此ニ附着スコレ  
泌胞ハ全ク閉スシテ。樹脂樣ノ液ヲ泄出スルヲ焮



熱ニテ乾燥スルナリ。

治法。翳及肘等ヲ刺テ瀉血シ。和酷龍腦水ヲ施テ可

ナリ。一種乾證。但眼驗赤。搔痒シ。此ハ血液ノ酷屬ナルヨリ来

ルモ利尿劑ヲ用テ。苛毒ヲ導泄シ。乳水。或ハ温湯ニテ眼

部ヲ洗淨蒸

○濕證ハ淚出夥多ナルナリ。此レ血液酷厲質ナルヨ

リ来ル者ニシテ。甚者ハ其淚ノ浸漬スル處盡ク糜

爛シ。劇痛焮腫スルナリ。此證小兒ニ多ク。或ハ鼻及

アヲ第ル

治法。數數刺絡シ。且ツ蜚鍼法ヲ眼昔ニ施シ。下劑及

溉導方ヲ施シ。又貫線法打膿法。發疱膏脚湯法等ヲ

行ヒ。内服酷厲ヲ和スル劑。或ハ利尿劑。或ハ發汗劑。

等兼證ヲ察シテ宜ニ隨フ。外用蒸湯劑。外敷藥及和

酷眼水等ヲ施スベシ。

○丹毒様證ハ白膜及其他焮腫シ。大熱疼痛シ。眼中周

圍ニ浸淫小瘡。粟疹様ノ者ヲ發シテ痛痒シ。落痂ス

レバ癰痕ヲナス。其因ハ壞血病毒。或ハ丹毒ノ侵入

スルナリ。

治法。其兼證ヲ診シ。其因由ヲ察シ。内本病ノ治法藥

劑ヲ與ヘ。外刺絡ヲ行ヒ。鉛糖水ヲ點ズ。



○腫瘍アルノ證ハ。白膜或ハ角膜ニ小粒膿腫ヲ生ズルナリ。

治法。宜ク初發ニ於テ速ニ刺絡スルヲ數回。焮腫減退シテ膿腫消セズンバ。則コレヲ熟膿セシムルノ

蒸藥ヲ施シ。且ツ清眼膏ヲ眼上ニ被ヒ貼スベシ。若潰破セザルトキハ。則鍼ヲ執テコレヲ破ル。

○瞳子陷凹證ハ。白膜劇腫。瞳子渦ノ如ク陷シ。劇痛シ。頭痛昏冒シ。或ハ葡萄膜ノ焮腫ヲ兼ヌ。尤險惡ノ證ナリ。

治法。屢ク肘跗頸等ノ靜脈ヲ刺シ。或ハ顳顬ヲ刺シ。

或ハ發疱膏ヲ頭頂ニ施シ。蟬鍼法ヲ普ニ施シ。峻下

劑ヲ與ヘ。又清熱和痛ノ内服劑ヲ兼用シ。外用初ノ

緩和止痛ノ蒸湯劑ヲ施シ。焮腫稍減シテ痛解セザル者ハ。龍腦阿鉛水ヲ點滴スベシ。若十ホ功ヲ奏セザル者ハ。直ニ其腫脹セル眼脈ヲ刺テ可ナリ。

凡内  
部焮  
腫劇  
證亦  
皆  
此法  
ニ宜  
シ

○損傷ヨリ來ル者ハ。其輕重淺深ヲ察シテ。宜ニ随テ蒸湯。外敷。洗淨。滴入ノ劑ヲ換デコレヲ治スベシ。

○急發ノ證ハ。發熱疼痛四五日。若ハ一二七日ニテ退ク。尋常他部焮腫ト同ク施治シ。且下劑ヲ用ヒ。眼水



劑ヲ施スベシ。

○持久證ハ。焮赤アリテ疼痛ナシ。此レ脈絡衰弱ノ致ス所ナリ。内服幾那飲。外用礬石水等ノ收斂強壯劑ニ宜シ。

○發作休止アル證ハ。眼中赤色ノ者アリ。否者アリ。先ツ導泄劑ヲ用ヒ。後チ幾那飲ヲ與フ。

○内因ハ所謂ル乳糜稠厚及泄物閉塞以下論スル所ノ諸因ナリ。蓋シ乳糜稠厚ハ。即前ニ舉ル所ノ乾證及瞳凹證等ノ發スル所ナリ。宜ク本證諸治ノ外。清涼稀解。淡泊滋潤ノ食料。即麥飯ノ類ヲ換用シ。固ク

膏粱美味ヲ禁ス。凡諸證ニ通ズシテ○泄物閉塞ヨリ

来ル者ハ。各其本路へ順導スベシ。多血家稠血家ハ特ニ數ク瀉血スベシ。○熱病及傷冷毒ヨリ来ルハ。

各其本ヲ治シ。兼ルニ刺絡下劑及隨證眼水劑等ヲ

換用スベシ。熱病腦焮腫ノ證。譫妄搐掣等ヲ發シテ

後眼焮腫ヲ患ル者ハ殆ニト死兆ナリテ

赤傷冷毒ハ。隨淚多ク。但疼痛ヲ排シテ愈ユ。○淋

疾閉塞ヨリ来ル者ハ。則淋尿膿様ノ淚ヲ泄シ。甚險

惡ナル者ナリ。速ニ治セザレバ。則明ヲ喪フニ至ル。

刺絡下劑發疱打膿及眼藥ノ外。汞劑ヲ内服セシメ。又汞乳水ヲ以テ洗ヒ。或ハ他ノ淋膿ヲ取テ尿道ニ



挿入シ。再ヒ淋疾ヲ發セシメテ自カラ導泄スルモ亦效アリ。○癩毒ヨリ眼疾ヲ發スル。帝ニ焮腫眼ノミニ非ズ。壹ニ是ミ十朮劑ニ非レバ效ヲ奏スル不能ハザルナリ。○痘疹。丹毒。疥癬。及經年ノ潰瘍。或ハ小兒ノ頭瘡。泌胞腫等ノ愈テ後發スル焮腫眼ハ。是其毒ノ餘殃ナルヲ知ヌベシ。其治先ツ苛毒ヲ和シ。若クハ滌除シ。若クハ發疱。角法等ヲ用テコレヲ驅リ。而テ後其内攻スル所ノ毒ヲ導テ其初ニ復ラシメ。若クハ其便ニ就テコレヲ排泄スル等。各其宜ニ從フベシ。

○外因ハ。則刺傷摩擦以下ノ諸因是ナリ。刺傷重キハ則前ニ謂フ損傷ノ證ナリ。摩擦ヨリ来ルハ。緩和止痛ノ蒸溺劑ヲ施セバ則愈ユ。○倒睫ハ。上脣低垂シテ蓋覆スルニ由テ。睫毛内ニ勾テ眼球ヲ刺戟シ。以テ焮痛ヲ發スルナリ。治其低垂ヲ引上シテ。倒スル者ヲ復常セシムルニ在リ。事手術ニ關ルガ故ニ輒クコレヲ畧ス。法。科摘要。○烈酒ヲ過飲シテ發スル者ハ。先ツ攝養ヲ慎テ其所因ヲ去リ。且諸辛熱ノ品ヲ禁シ。下劑ヲ與ヘ。刺絡ヲ施シ。肘靜脈宜シ。清涼眼水ヲ外用スベシ。○侵雨傷風ハ。前文ニ所謂ル表發ノ蒸氣ヲ遏止スルヨ



り来ル。治法。發汗開達利尿ノ劑捷功アリ。外用ハ緩  
 和蒸漏ノ方ニ宜シ。凡傳染流行ノ焮腫眼ハ。殊ニ濕  
 時後ニ於テスル者多シ。シ又焮腫眼ヲ患ル者。卒然ト  
 肉片ヲ生ズルアリ。是其血ノ甚熱スルヲ俄ニ寒  
 氣ノ爲ニ凝固稠結セシムルニ由テ。後來ノ血進行  
 滞シテ腫脹スルナリ。○煙薰塵入。及向日瞻火等ヨ  
 リ發スルハ。乳汁ヲ用テ蒸漏シテ偉功アリ。○凡外  
 因ヨリ来ルハ輕シ。大抵一二ノ眼水劑等ヲ撰用ス  
 レバ則愈ユ。然ドモ持久シテ劇證ニ變スルハ。則亦  
 内外ヲ論ズルヲ無ク。其終リ眼星ヲ生ジ。或ハ視力  
 乏弱ヲ致シ。太甚キ者ハ則盲スルニ至ル。時ニ後レ

治ヲ誤テ悔ヲ致サシムルヲ勿レ。病勢將ニ進  
 急時ニ刺絡及下劑ヲ用テ其勢ヲ挫グニ在リ。コレヲ  
 其時ニ及ブト謂フ。○焮腫治後。角膜ニ白星點ヲ殘  
 シテ鑿視ヲ妨ル者ハ。蘭方樞機  
 中出ス所ノ清華水ニ宜シ。良效

○單發ハ論ヲ須ズ。兼發ハ他ノ眼疾ヲ併發スルヲ謂  
 フナリ。傍發ハ他病アリテ而テ焮腫眼ヲ兼ルヲ謂  
 フナリ。治法左右相照シテ宜ニ随フベシ。諸藥劑總  
 鑑ニ集載ス  
 撰用スベシ

病因精義卷之三終







