

~~4115~~

A8.9.089

000389

外科

卷一



御纂醫宗金鑑卷十一

編輯外科心法要訣目錄

歷節

三里發

黃蠶癰

接骨發

內踝疽

穿膝疽

腎氣遊風

鱗漏

1960

非端發

青蛇毒

咬陰疽

外踝疽

濕毒流注
附小筋纏

腫瘡

四空風

風疽

足部

足發背

脫疽

用疽

厲癰

貝田螺

土栗

脚氣瘡

肉刺



漫泉疽

乾疽

足跟疽

四淫

半穉

冷疔

田螺炮

御纂醫宗金鑑卷十一

編輯外科心法要訣

三裏發露集三子初如三眼老青墨若有皆同

三裏發圖



三里發

三里發腫牛眼形膝眼之下冷痛凝勞力傷筋兼胃熱腫色青

黑紫血膿

註此證生膝眼下三寸外側前廉兩筋間初腫形如牛眼拘

急冷疼由勞力傷筋胃熱凝結而成漸增腫痛甚色青紫

潰出紫血次出稀膿內外治法俱按癰疽腫痛潰瘍



肥 膈 發 圖



肥膈發生腿胫正申左右以高

編者外科心法要訣

非膈發

非膈發在小腿肚憎寒煩躁積熱成癩腫痛潰膿血吉漫腫平

場清水凶

註此證發於非膈即小腿肚也由腎水不足膀胱積熱凝結而成古方云不治若焮赤高腫疼痛潰出正膿而兼血者吉為順或漫腫平場紫黯臭痛潰出清水者凶為逆初服仙方活命飲潰服八珍湯氣血虛者服十全大補湯下虛者以桂附地黃丸補之外治法同癰疽潰瘍門

仙方活命飲見腫門

八珍湯

十全大補湯俱見潰瘍門

桂附地黃丸見面部癰瘍

黃 火 蘇 癱 圖

黃火蘇癱生腿肚裏長數寸紅腫形如泥鰍左有昆白



黃鯀癰

黃鯀癰生腿肚旁疼痛硬腫若鯀長肝脾濕熱微紅色順出稠

膿逆敗漿

註此證生在小腿肚裏側疼痛硬腫長有數寸形如泥鯀其

色微紅出肝脾二經濕熱凝結而成應期潰破出稠膿者

為順若出污水敗漿者屬逆初服五香流氣飲其次內外

治法俱按癰疽腫瘍潰腐

五香流氣飲

金銀花二兩

小茴香

殭蠶炒

羌活

獨活

連翹去心

栝蓐仁 俗一兩五 藿香 五不

丁香 二不

木香


沉香

甘草 各一不

分爲十劑 水煎 隨病上下服

歌五香流氣治黃魚流注結核也能瘰疬木茴沉殭霍草銀

花羌獨翹栝蓐



青蛇毒圖



青蛇毒生腿肚之下長三三寸結腫紫塊頭大尾細若筒

青蛇毒

青蛇毒生腿胫下形長三寸紫塊壙腎與膀胱濕熱結急鍼蛇

頭血出良

註此證又名青蛇便生於小腿胫之下形長三三寸結腫紫

塊壙硬憎寒壯熱大痛不食由腎經素虛膀胱濕熱下注

而成蛇頭向下者毒輕而淺急刺蛇頭一牛寸出紫黑血

隨鍼孔搽拔毒散外敷離宮錠內服仙方活命飲加青葉

牛膝木瓜亦有蛇頭向上者毒深而惡急刺蛇頭二二寸

出紫黑血鍼孔用白降丹細條挿入五六分外貼巴膏餘

腫敷太乙紫金錠內服麥重丹俟毒減退次服仙方活命

一編外刊心法要訣

飲調和之若毒入腹嘔吐腹脹神昏岷躁俱為逆證

撥弄散 見齒部

離宮錠

仙方活命飲

麥靈丹 俱見腫瘍門

良降丹

良膏 俱見九瀆瘍門

太乙紫金錠 見胸膈腫發疽



接 胃 發 中 醫 藥 學 圖



接骨發是脛骨今足後跟相接處如胡桃形似牛折公細之森兩足皆出


一編輯外利心法西要訣 六

接骨發

接骨發如核桃形腿肚之下硬脹疼色紅漫腫宜速潰潰損筋

血缺踵行

此證生於腿肚之下接骨之一脛骨與足後跟骨相接處
故名接骨發屬膀胱經濕熱凝結而成初如核桃其硬如
物打磕破之狀急脹微痛色紅漫腫膿宜速潰遲則膿毒
損筋筋血既傷腿缺踵行踵行者不能全足踐地惟恃足
指着力而行也始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門



附陰疔圖



附陰疔星內與之三寸紅腫如雞卵左右皆同

疔毒下斗法要訣

附陰疽

附陰疽發內踝上初如紅粟日增疼堅硬赤腫漸如卵三陰交

會濕熱凝

此證生於內踝骨之上三寸初如紅粟疼痛日增堅硬赤腫漸如雞卵係三陰交會濕熱積聚而成始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰腐則三陰交係純陰之穴收斂遲緩調養不可不慎

內踝疽外疽圖

二疽堅硬漫腫不紅

內踝疽

外踝疽



外科心法要訣

內踝疽 外踝疽

內外踝疽濕寒成血滯氣滯阻於經三陽外側三陰裏初用宣

通蒜灸靈

註此二證生兩足踝近腕之處在內踝者名走經又名鞋帶

疽在外踝者名脚採毒蓋內踝骨屬三陰經血絡也外踝

骨屬三陽經血絡也俱由濕寒下注血滯氣阻而成其堅

硬漫腫皮色不變時時隱痛難於行立者初服蒼科流氣

飲加牛膝木瓜防已以宣通之外用蒜片灸法以消之發

三陰經者服內托黃者湯發三陽經者服內托羌活湯若

虛弱作欲作膿跳痛無時者俱服十全大補湯外敷烏龍

膏其腫潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門


瘡科流氣飲見皆部

內托黃耆湯見股部

內托羌活湯見醫部

十全大補湯見潰瘍門

烏龍膏見腫瘍門



穿 踝 疽 疔 圖



穿踝疽係裏外踝骨通腫不紅

行在醫全圖

穿踝疽

穿踝疽由脾濕寒裏發串外踝骨間有頭屬陽陰臨腫潰出清

水廢疾纏

註此證由脾經濕寒下注血澀氣阻而成先從裏踝骨發起

串及外踝致令裏外通腫以有頭為陽易破若惟悶腫無

頭為陰難潰其證初起寒熱往來有紅暈兼有熱也宜服

荆防敗毒散皮色不壞者服萬靈丹其餘腫潰治法俱同

內外二踝疽若潰出清水或投方不應纏綿日久者必成

廢疾難治

荆防敗毒散見項部

萬靈丹見腫門

外科心法要訣

濕毒流注圖

一說初如牛眼次則漫腫色紫者輕重者其左右皆同

濕毒流注生於骨三個者是也



瓜籐纏繞透腔而生

從身圖之全金

濕毒流注 附瓜藤纏

濕毒流注腿脛生頂如牛眼漫腫形紫輕黑重膿水清寒濕暑

熱在膝凝

此證生於腿脛流行不定或發二三處瘡頂形似牛眼根

脚漫腫輕則色紫重則色黑潰破膿水浸漬好肉破爛曰

久不斂由暴風疾雨寒濕暑火侵在膝理而肌肉為病也

初覺急服防風通聖散加木瓜牛膝防已蒼朮消之若腿

脛至晚發執者宜服歸拮痛湯加牛膝外治初搽三妙

散腫痛全消換搽輕粉散斂之即效若透脛而發即名瓜

藤纏結核斂後日久腫痛腐爛不已亦屬濕熱流注而成

後集醫方全錄卷之二

治法同前

輕粉散

輕粉 一名五分

密陀僧

麝香 五分

共研末先用葱熬湯洗患處再搽此藥

方歌 輕粉香丹 密陀僧末 茶乳麝共研 成濕毒流注 臙瘡膿化

腐除濕之止癢

防風通聖散 見頭部

三妙散 見腹部

黃丹

高末茶

黃蘗

乳香 各三錢

當歸拈痛湯 見股部

九

腎氣遊風中圖



腎氣遊風生於腿臍鼻如雲片

卷之二 風症 一

腎氣遊風

腎氣遊風腿肚生紅腫如雲火燥疼證由腎火蘊於內膀胱氣

滯外受風

註此證多生於腎虛之人腿肚紅腫形如雲片遊走不定痛如火烘由腎火內蘊外受風邪膀胱氣滯而成也初服紫蘇流氣飲次服檳榔丸外用豆腐研調黃蘗末貼敷之甚

效

紫蘇流氣飲

紫蘇

檳榔

黃蘗

香附

木瓜

陳皮

川芎

厚朴薑炒

白芷

蒼朮

米泔水浸炒烏藥

荊芥

防風

甘草

獨活

枳殼

麩炒

等分薑三片棗一枚水煎服

方歌紫蘇流氣藥瓜椰香附陳芎厚朮蒼朮烏藥荊防甘獨枳殼

氣遊風服最昌

檳榔

檳榔

枳殼各二兩
麩炒

木瓜

一兩五子

木香

一兩

大黃

四兩

本草綱目卷之九十一
編補科心法要訣
十三

共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸空心白滾
湯送下黃酒送下亦可

方歌檳榔枳殼木瓜研木香大黃煉蜜丸腎氣遊風紅腫癰空
心水送自然痊



圖 瘡 之 賺



賺瘡在兩腿腰之裏廉骨

膿瘡

膿瘡當分內外廉外廉易治內難痊外屬三陽濕熱結內屬三陰虛熱經法宜搜風除濕熱外貼三香夾紙餞

註此證生在兩脛內外廉骨外廉屬足三陽經濕熱結聚草

治易於見效內廉屬三陰有濕兼血分虛熱而成更兼

骨皮肉澆薄難得見效極其綿纏初發先癢後痛紅腫成

片破津紫小新起宜貼三香膏色紫貼夾紙膏日久瘡色

紫黑崩解毒紫金膏又年久頑膿瘡皮烏黑下陷身穢不

堪者用蜈蚣餞法去風毒化癩腐蓋貼黃臘膏漸效初服

黃耆丸日久者服四生丸下元虛冷者宜虎潛丸常服甚

效但腿脛在至陰之下生瘡者宜戒勞動發物其證可愈
否則難痊

三香膏

輕粉

乳香

松香 各等分

共為末香油調稠用夾紙一面以鍼密刺細孔將藥灰搽
紙內先以葱湯洗淨患處將藥紙有鍼孔一面對瘡貼之

三日一換

夾紙膏

黃丹 炒

輕粉

兒茶

沒藥

雄黃

血竭

五倍子炒

銀朱

枯礬各等分

共為末量瘡大小剪油紙二張夾藥於內紙周圍用麵糊

粘住紙此用鍼刺孔先將瘡口用葱椒煎湯洗淨拭乾然

後貼上以帛縛之三日一洗再換新藥貼之

方歌夾紙膏貼膿瘡破黃丹輕粉兒茶沒雄黃錫倍銀朱礬油

紙夾貼腐可脫

解毒紫金膏

明淨松香

皂礬各一 勛赤

共研極細末香油調稠先用葱艾甘草煎湯洗淨患處再

搽此藥用紙蓋住以輟布覆藥三日一換此藥又治楊梅

結毒腐爛作臭膿水淋漓用之甚效

方歌解毒紫金賺瘡爛明淨松香皂礬煨二味研末香油調葱

艾草湯先洗患

蜈蚣

蜈蚣

白芷各一錢

甘草

獨活

桐油二兩將藥煎滾先以水泔水洗淨賺瘡水和白麪作
圈圍在瘡之四邊勿令洩氣將腿放平以茶匙挑油漸漸
乘執加滿待油溫取下巴後風毒自散腐肉漸脫其功甚
速

方蜈蚣餞治久曠瘡皮黑帶
陷臭難當桐油煎草獨活芷白

麩圈瘡油湯強

黃蠟膏

血竭

赤石脂煨

龍骨各三錢煨

共為細末香油一兩入血餘粟子大一團煤枯去渣再入

黃蠟一兩白膠香三錢容化盡離火下血竭等末攪勻候

冷磁罐盛之用時捏作薄片貼瘡上絹帛縛定三日後翻

過貼之

方黃蠟血餘白膠石脂龍骨人油調蜈蚣餞後此膏益肌

肉能生痛自消

黃耆是

黃耆

川烏頭

炮去皮眩

赤小豆

藜炒去刺

地龍

去土炒

川棟子鹽水泡去核

茴香炒

防風

各兩

烏藥五斤

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸空心

溫酒送下鹽湯亦可婦人用醋煎潔候溫送下

方黃耆是治癰瘡起川烏赤豆共炙藜地龍川棟茴香炒防

風烏藥酒糊宜

四生丸

地龍去土炒

白附子

僵蠶炒

編輯劉心法西醫

七

草烏去皮尖泡

五靈脂各口年寸分

右為細末米糊為丸如梧桐子大每服三四十九丸食前茶

酒任下

方歌四生膝瘡久纏綿骨節多疼痛動難地龍白附及蠶沙

烏靈脂米糊丸

虎潛丸

敗龜板酥炙四兩

熟地各三兩

陳皮各二兩鹽水潤

虎脛骨醋炙一兩

知母

牛膝酒蒸

瑣陽酒潤

黃蘗二味鹽酒炒

白芍酒炒


當歸各一兩五不酒洗

共研末羯羊肉酒著
爛攤膏和人藥末內為丸如梧桐子

大每服三錢空心淡
鹽易送下及月加乾薑一兩

功虎潛丸療筋骨痠下
元虛冷精血虧龜板瑣陽膝虎脛知

藥苟陳熟地歸



醫心小...

鯁漏中圖



系車外...

鱗瀰

鱗瀰生在腿肚間孔如鑽眼津水綿皮類濕瘡濕熱發艾湯薰洗覺癢痊

註此證由濕熱而成初起頗類濕瘡生於腿肚癢痛相兼破

津蓄水綿綿不已其孔深如鑽眼復受寒氣侵入瘡孔以致口寒肌冷法宜艾葉老葱熬湯每日先熏後洗瘡口發

熱覺癢時即貼黃蠟膏收斂而愈

黃蠟膏見臘瘡

四 彎 風 圖



四彎風生兩脚及兩脚彎破如蟻

復發醫身

四彎風

四彎風生腿脚彎每月一發最纏綿形如風癩風癩搥破成

瘡癢難堪

註此證生在兩腿彎脚彎每月一發形如風癩風癩搥破成

膝理而成其癢無度搥破津水形如濕癩法宜六麥一升

熬湯先薰後洗次搥三妙散溼殺蟲其癢即止緩緩取

效

妙散見腹部
臍癰

風 疰 圖



風疰生兩腿脛骨曲凹之處紅腫發痛

風疽

風疽生於四肢癢搔皮損津汁膿風邪留於血脈內煩執鬱

富肌腫痛

此證生脛骨及曲凹之處癢搔皮損津黃汁極其黏濃中

風邪留於血脈相搏而成因其根深故有疽名甚則身熱

煩執鬱而肌肉透紅更增腫疼宜服防風湯外抹毒粉

大豆油即效

防風湯

防風

附子製

麻黃

皂莢

木通

柴胡

編輯外科心法要訣

三

當歸焙

桔槔

甘草炙

羌活各五分

其為粗末水一鍾半煎八分澄去滓食後服臨睡再用

服如欲出汗俟空心頭煎落滓併一服之後食稀粥生黃

食畢被覆臥取汗避風

歌防風湯療風熱搏留於血脈津液破附子麻黃芷木通紫


胡歸活甘羌活

青竹大皂油

青竹筒截三尺長徑一寸半筒內裝黑豆一升以穀糠馬糞

物燒火當竹筒中炙之以磁盤兩頭接取油汁先以清米

疥癩和臨
洗患處拭乾即塗豆油不過三度極效
方青竹筒
蘇三尺長徑要寸半黑豈裝穀糠裏糞燒火雀鼠
疽搔瘡與塗良



...
...
...
...
...

足發背圖



足發背生足背左右同

從醫圖卷之十一

足部

足發背

足發背屬膽胃經七情六淫下注成詳別善惡分順逆細辨疽

癰疔死生

註此證一名足跗發凡足背雖行三陽而偏在膽胃二經若

多證由七情內鬱或兼六淫外傷而成經云死背不宜生

瘡惟足背多筋多骨肉少皮薄又在至陰之下發瘡疽者

升發遲慢所以謂為險候也宜別五善七惡而分順逆發

背者大瘡之通名也須當細辨或疽或癰順逆既分則生


死定焉初宜服仙方活命飲及隔蒜灸之令瘡速潰餘與

編輯外科心法要訣 一三

腫癰潰瘍門治同

仙方活命飲見腫門

噤喉灸法灸法見首卷



湧泉之灸疽圖

涌泉生足心兩足同



從身醫宗金卷二
湧泉疽

湧泉疽發在足心腎虛濕滯多屬陰速破清淺癰可治黑陷為
瘕命難存

此證生在足心湧泉穴一名足心發又名穿筋天蛇俗名
病穿板屬足少陰由督經虛損兼濕熱下注而成若十四
日內卽潰膿淺為癰猶可調治初服仙方活命飲外用神
燈照法虛其膿生遲者十全大補湯潰後兼用桂附地黃
丸服之餘治按癰疽腫瘍潰瘍疔若黑陷不疼二十一日
之內不潰膿者為疽屬陰敗之證難救


仙方活命

欠見腫
有瘡門

神燈照法卷見首

十全大補湯見漢

桂附地黃丸見面部



神燈照法... 十全大補湯... 桂附地黃丸... 卷見首... 見漢... 見面部

此

痘疹圖

胎痘先足指色黑勞有瘡畢指同



YUNNAN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
1960

脫疽

脫疽多生足指間黃胞如粟黑爛延腎竭血枯五敗證剖切仍

黑疔歸泉

註此證多生足指之間手指生者間或有之蓋手足十指乃

藏府枝幹末氣疽之先煩燥發熱煩消湯自久始發此

患初生如粟黃胞一點皮色紫暗猶如煮熟紅棗黑氣侵

漫腐爛延開五指相傳甚敗攻於脚面痛如湯澆火燃其

臭氣雖異香難辨由膏梁藥酒及房術丹石熱藥以致陽

精竭感淫火猖狂癰蓄於藏府消燠陰液而成斯時血死

心敗皮死肺敗筋死肝敗肉死脾敗骨死腎敗此五敗證

雖遇靈丹亦難獲效初起宜服解毒濟生湯外用大麥米
者飯拌芙蓉葉菊花葉各五錢貼之止痛消之不應者必
施割法須患者情願將死生付於度外遵古法毒在肉則
割毒在骨則切然割切之法須直早施乘其未及延散時
用頭髮半餘根緊纏想指本節盡處造染十餘轉切令毒
氣攻延好肉隨用蟾酥餅放於初起黃地頂上加艾灸之
至肉枯瘡深為度次日病指盡藥方用利刀疔至本節縫
中將患指從順次不血流不止者用如聖金刀散止之餘
腫以離宮錠塗之次日倘有黑氣未盡單用蟾酥餅研末
撒之用此僧膏益見熱氣自退患上生膿兼貼生肌玉紅

膏及生肌等藥生肌護骨斂此為吉兆內宜滋腎水養
氣血健脾安神之劑如陰陽二氣丹清神散金液戊土丹
俱可服之若內外始終無變證十中可保三四若割切之
後復生里氣過節侵漫疔肉疼痛尤甚者屬逆此證初起
不痛者宜雌雄霹靂火灸之其餘滋補燙洗等法俱按癰
疽腫瘍潰瘍門按諸書論脫疽單生於足大指而別指生
者俱名敗疽此非確論然脫疽偏生於屬陰經之指者居
多屢經如此後之學者宜詳審焉可也

解毒濟生湯

當歸

遠志去心

川芎

一編外科心法要訣

三

花粉

柴胡

黃芩

犀角鎊

麥冬去心

知母

黃蘗

茯苓

金銀花各一斗

紅花

牛膝

甘草各五分

水三鍾煎八分入童便一杯食前服

如生手指間去牛膝加升麻

解毒濟生歸遠香花粉柴胡犀麥冬知藥茯苓銀紅膝草

痘初起煩熱薑

如聖金刀散

松香七兩

生白礬

枯白礬各一兩五錢

共研極細末磁罐收貯臨用時撒於患處

防如聖金刃散刃傷血流不止撒之良自樂枯礬松香等共

研為末罐收藏

陰陽二氣丹

天門冬去心

麥門冬去心

二冬湯洗去粗皮以
上二味各搗膏

五味子炒

人中白生

黃礬各一兩

甘草生

澤瀉

枯白礬

青黛各三小

冰片一小

各研細末同天門冬等膏加煉蜜少許再搗千餘下輕確
得中丸如梧桐子大硃砂為衣每服六十九童便人乳各



一酒鍾空心送下安睡一時

歌方陰陽二氣丹脫疽腎水枯乾燥熱欺天麥元參甘瀉味中

白水燻藥壺賞

治神散

綠豆粉一兩

牛黃二分

甘草節五分

冰片五分

硃砂三分

右共為極細末每服一錢淡竹葉燈心煎湯調服

歌方清神散治脫疽發悶亂心煩調服在豆粉牛黃甘草節研

加水片共研砂

液成土丹

茯神

胡黃連

烏梅肉

人中黃

五味子各一兩

硃砂

雄黃

消石

遠志去心

石菖蒲各三斤

牛黃

冰片各一斤

各研細末共和一處再研千轉於端午七夕或春秋二分

冬夏一至吉辰在淨室中先將烏梅肉搗膏和入藥末內

加煉蜜少許搗千餘下軟硬得中為丸每丸重一兩金鉞

為衣每服一丸人乳童便各一酒鍾隨病上下化服修和

之時服藥之際忌婦人僧尼孝服雞犬等見之此藥用蠟

封固收藏不洩藥味愈久愈效

方歌金液戊土灰牛黃硃雄消遠片石菖胡連梅肉中黃味昂

治脫疽發背瘡

雌雄霹靂火

雌黃

雄黃

丁香各二分

麝香一分

右為細末用新艾茸二錢將藥末搗入艾內作豌豆大丸

安患上灸之母論癢痛以肉焦為度如毒已紅走散就紅

暈盡處排炷灸之痛則至癢癢則至痛以瘡紅活為度

防霹靂火治陰疽方脫疽不疼灸更強此黃丁香雄黃末煎

艾茸搗藥末良

蟾酥餅餅即蟾酥丸作餅見疔瘡門

離宮錠見腫門

陀僧膏

生肌玉紅膏俱見潰瘍門



敦

疽

圖



敦疽之足指色紅十指同

敦疽

敦疽多生足指疼腫色紅活出血膿血燥精竭無敗色膏梁勞脾腎經

此證多生於足指而手指亦間有生者由膏梁太過則損

脾房勞太過則傷腎脾既損則血生少腎既傷則精必竭

更兼濕熱壅盛而成初起黃粟小疱痛如湯發火燃其色

經活腫無黑暈潰破有膿腐無敗色此屬血脈未死之候

然此證雖無敗色亦由臟腑發出不可視為小毒也法宜

急服滋陰救燥補血理脾之藥初服解毒濟生湯六味地

黃湯瀆服人參養榮湯桂附地黃湯外初宜蜈蚣拔毒散

塗之將潰貼蟾酥餅兼貼巴膏潰腐之後換搽生肌玉紅膏生肌斂口初終禁用灸法患者宜清心寡慾調理庶免

變證

解毒濟生湯見肌

桂附地黃湯見面部

巴膏

蚪蚪坂毒散見腫

六味地黃湯見面部

人參養榮湯

生肌玉紅膏見潰

蟾酥餅餅見行瘡門



甲 痘 圖



甲痘生足指甲紫及肉高交色紅十指同

用疽

用疽多因別甲傷甲長侵肉破成瘡肉高突痛難忍消糜化
努效非常

註此證因割散指甲傷肉或剔甲傷肉或甲長侵肉穿窄小
靴鞋以致甲旁焮腫破爛時津黃水努肉高突疼痛難忍
不能著衣原係好肉受傷宜用鹽湯洗外敷華陀累效
散白膏葉蓋貼努肉消盡即愈

華陀累效散

乳香

硃砂各一分

輕粉五分

橄欖核二枚
燒存性

黃丹二分

共研細末香油調敷

方華陀累效敷以黃土輕粉少石椒少檀核燒同碾細香

油調濃患處搽

白膏藥見濟門



足 跟 疽 圖



定跟疽生足攀跟紫腫形如兔咬空者同

足跟疽

足跟疽生脚縫根狀如魚咬紫紅炊楊躄積熱潰難斂初宜隔

蒜艾炙勤

註此證生足跟俗名脚攣根由臟腑積熱汗出涉水遠行傷

筋而成初腫紅紫疼痛潰破膿水淋漓狀如夜陵經云免

齧狀如赤豆至骨急治遲則害人蓋謂毒之深惡也屬是

太陽膀胱經穴各申蠟即鳴躄蠟發源之所又係腎紅所

過之路瘡口久潰不合陽躄蠟氣不能冲發腎氣曰此漏

洩以致患者益虛初起宜隔蒜片灸之服仙方活命散加

肉桂午膝燙後宜補中益氣湯人參養榮湯桂附地黃丸

隨證滋補治之餘按癰疽潰瘍門海藏云免齧久不收斂
用鹽湯洗之白木研末撒之兩日一易謹戒一切勞碌自

效

隔蒜灸法

見首卷灸法

仙方活命飲

見腫瘍門

補中益氣湯

人參養榮湯

俱見潰瘍門

傳附地黃丸

見而卻煩瘍

YUNNAN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1960

厲家醫術圖



厲家醫術即聖方小如聚慶左右同

厲家醫術即聖方小如聚慶左右同

四淫圖



四淫是也之前上下其大如羅左右向

厲癰 四淫

厲癰勢小足旁生四淫在足上下凝三陰虧損為疽重三陽濕

執發癰輕

註靈樞去發於足上下名曰四淫其狀大癰急治之百日死

發於足旁名曰厲癰其狀不大急治之去其黑者不消

益不治百日死此二證俱由足三陰經虧損為疽者重若

兼足三陽經濕熱下注而成癰者輕若紅腫疼痛潰破有

膿腐脫無黑氣漫漫屬濕熱偏盛順證易治若微紅微腫

潰出膿水屬陰氣凝結不能化膿險證難治若黑暗漫腫

痛不清膿煩執作渴小水淋漓為陰敗惡證屬逆四淫無

痛不清膿煩執作渴小水淋漓為陰敗惡證屬逆四淫無

邊沿屬癰類敷疽初俱宜仙方活命飲外宜隔蒜灸以宜
壅毒將潰宜服人參養榮湯兼六味地黃丸以滋補之若
色黯不痛卽用桑柴烘法以行經滯助陽氣更宜十全大
補湯兼桂附地黃丸壯脾滋水治之或可成功若妄用苦
寒剋伐之藥多致不救外治法同敷瘡

仙方活命飲見腫門

隔蒜灸法見首卷

人參養榮湯

十全大補湯俱見潰瘍門

六味地黃丸見面部

桑柴烘法見首卷

桂附地黃丸見面部



臭家田螺學

圖




臭家田螺學起自她亦如聚粒左看同

臭田螺

臭田螺滄鼻纏綿脚了搔癢起白斑搥破皮爛腥臭臭治宜清
執滲濕痊

註此證由胃經濕熱下注而生脚了破爛其患甚小其癢搥
之不能解必搥至皮爛津腥臭水覺寒時其癢方止次日
仍癢經年不愈極其纏綿法宜甘草薏苡仁煎湯洗之嚼
細茶葉塗之乾則黃連膏潤之破爛甚者宜用鴛掌皮根
存性研末香油調敷甚效

黃連膏 見鼻部



牛程躑圖



牛程躑脚底板起硬填色黃不能着地左右同

...
...
...
...
...
...
...
...



牛程躩

牛程躩因奔走急脚熱着水寒風龍氣滯血凝起硬塊法宜鶴

糞沈湯漬

註此證生於足跟及足掌皮內積硬腫起高塊色黃疼痛不能行履由脚熱着冷水或遇寒風龍於血脈令氣滯血凝而成法宜用盆一箇內安新磚磚上安鶴糞糞上合篋篋以脚踏篋篋上以滾水從旁冲入蒸之浸漬之冷則易之或用新磚燒紅韭菜汁滾之將病足踏於其上湯之早治或有消者久則破裂膿水津流每曰米泔水淨洗擦牛角散四圍頑皮淨起剪之按擦生肌玉紅膏月白珍珠散

生肌斂口自愈

牛角散

松香

輕粉

水龍骨即舊腦底

牛角尖

燒灰


共為末牛骨髓調搽

歌方
牛角散治年程躑久破膿水流不痊松香輕粉水龍骨牛

角燒灰須用尖

生肌王冠膏

月白珍珠散俱見真



本草綱目卷之六十一 外科 生肌斂口自愈

士栗圖



上栗告是跟考初知深栗色黃煙短玻璃香同

土粟

土粟生在足跟旁腫若琉璃亮色黃行路崎嶇傷筋骨急服仙

方合五香

註此證又名琉璃疽生在足眼之旁形如粟粟亮而色黃腫

若琉璃由行崎嶇之路勞傷跟骨血脈而成急服五香湯

及仙方活命飲宜通竅膿膿熱滅之膿少而多水者以陀

僧膏貼之餘按癰疽潰瘍治法

五香湯

乳香

沉香

藿香

丁香

青木香各三錢半

水一鍾前八分服之

歌方五香湯善治土栗行路勞傷血脈積乳霍丁沉青木香煎

服舒羅功效極

仙方活命飲見腫湯門

陀僧富見潰湯門



冷疾方圖

冷疾生足跟底形如黍粟起紫白胸左右同



冷疔

冷疔濕寒足 跟生疼痛徹骨紫皮形黑爛深孔流血水氣穢

燻法靈

詳此證生 在足跟由濕寒凝結而成形如棗栗起紫白皴

痛徹骨 漸生黑氣腐爛孔深時流血水氣穢經久不斂者

宜神燻 照法照之鐵粉散敷之初服內補十宣散次按

瘍治同

鐵粉散

生鐵粉即 鐵砂如無用黑鉛四兩鐵杓化開傾水中冷定
取出再化再傾以錫化盡為度去水取末三不

黃丹飛

輕粉

松香各一

麝香 一分

各研細末共和一處再研勻將患處以葱湯洗去血水腐

臭香浦調藥搽於患上油紙蓋之

歌鐵粉散 醫足浴疔能蝕黑腐肌肉生黃丹輕粉松香麝香

押調搽紙蓋靈

甲燈照法 卷首

內補十宣散 見胸部 瘰癧

脚氣瘡圖



脚氣瘡生膝之下足之上腫痛用藥水結實如左右同

脚氣瘡

脚氣瘡在足膝生濕熱相搏風氣乘壯熱腫痛津黃水心神煩

躁犀角靈

注此證生於足膝

由濕熱內搏滯於膚腠外為風乘不得宣

通故合脚膝生瘡癢痛作腫破津黃水形類黃水瘡惟身

體壯熱心神煩躁經久難瘥宜服犀角散外以瀉蘆湯洗

之兼敷龍骨散甚效

犀角散

犀角屑

天麻

黃耆

枳殼麩炒

白鮮皮

黃芩

編醫小科心法要訣 四三

防風

羌活

白茯苓 各七錢

檳榔 一兩

烏梢蛇 二兩
酒浸

甘草 五錢

右研細末每服

八錢水一鍾半生薑五片煎一鍾去渣不

拘時溫服

防風角散醫脚氣

瘡天麻者枳白鮮柳烏蛇芩草風羌活疾

以藜粗末引加薑

漏蘆湯

漏蘆

甘草 生

槐白皮

五加皮

白飲 名一兩五錢
白茯苓 四兩

共為粗末每用五兩水八升煎五升去渣淋洗

方歌漏蘆湯甘槐白皮五加白欵白蒺藜脚氣瘡疥癢津水熬

湯洗患散濕急

龍骨散

白龍骨研

輕粉各二錢五分 檳榔一錢

積豬糞新瓦上焙乾再入火中燒出研末五錢

共研勻先以口含鹽水或濕鹽湯洗令瘡淨見肉却用香

油調藥隨瘡大小敷之未愈再敷

歌龍骨散能去濕腐脚氣瘡敷自然無腫柳豬糞香油灰

遠惡瘡用亦除

田螺炮炙圖

田螺炮炙是掌起如豆粒昔炮至石同



田螺炮

田螺炮在足掌上裏濕外寒蒸鬱成豆粒黃胞悶脹硬破津臭

水腫爛瘡

註此證多生足掌而手掌罕見由脾經濕熱下注外寒閉塞

或因熱體涉水濕冷之氣蒸鬱而成初生形如豆粒黃胞

悶脹硬疼不能着地連生數胞皮厚難於自破傳度三五

成片濕爛甚則足跖俱腫寒熱往來法宜苦參黃芩蒲野艾

熬湯熱洗次用線絨將皮挑破放出臭水加味六乙膏貼

之又將炮皮剪去宜用石膏輕粉等分研末撒之仍以加

味六乙膏蓋貼內服解毒瀉脾湯更有經年不愈者係下

祛濕寒以金匱腎氣丸常服甚效

解毒瀉脾湯

石膏煨

牛蒡子炒研

防風

黃芩

蒼朮炒

甘草生

木通

山梔各一錢
生研

水二鍾燈心二十根煎八分服之

方解毒瀉脾芩芩子風膏蒼朮葛通梔田螺皮起宜煎服清

熱疎風文去濕

加味太乙膏貞潰

金匱腎氣丸即桂門地黃丸加車前子
朱勝各一制見面部頰瘡

肉刺

肉刺證由纏脚生或著窄鞋遠路行步履艱難疼痛甚玉簪根

搗貼塗靈

註此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根陷肉裏頂起硬

凸疼痛步履不得或因纏脚或著窄鞋遠行皆可生之法

宜貼加味太乙膏滋潤之或用紫玉簪花根搗爛貼塗以

油紙蓋之又地骨皮紅花等分研細香油調敷其效

加味太乙膏見潰瘍門

