



37





from Countway Lib

OCT 11 1999

赤水玄珠婦人門第二十一卷目錄

小便出血

陰腫

陰痒

陰挺下脫

陰瘡

交接輒血出痛

胎前惡阻痰逆

胎動不安

胎漏下血

胎氣上逼

妊娘心腹痛

妊娘腰背痛

妊娘小腹痛

妊娘心腹脹滿

妊娘數墮胎

胎不長



墮胎血下不止

未足月欲產

過期不產

妊娠欬嗽

妊娠吐血衄血

丁煩

赤水玄珠婦人門第二十一卷

新安生生子孫一奎著輯

小便出血

良方曰心主於血通行經絡循環臟府得寒則凝  
溢得熱則妄行失其常道則溢滲於腠則小便  
出血也

薛氏曰前症肝經血熱者加味逍遙散怒氣血傷  
者同治調送血餘灰妙若肝經風熱用前散送  
子芩丸氣血俱虛者八珍散送血餘灰膏梁積



熟者清胃散加槐花甘草風熱傷胃者四君子  
加防風枳壳胃虛不能攝血者補中益氣鬱結  
傷脾不能攝血者濟生歸脾湯

一婦小便出血服四物蒲黃之類更加發熱吐痰  
加芩蓮之類又飲食少思虛症蜂起肝脉弦而  
數脾脉弦而緩此因肝經風熱為沉陰之劑脾  
傷不能統血發生諸臟而然也用補中益氣六  
味地黃丸而痊

蒲黃鹿茸散 治勞損尿血發熱內熱或寒熱往

來口乾作渴

蒲黃

炒

鹿茸

炙

當歸

生地

葵子

炒

續斷

酒炒各等分

為末每服二錢酒調日三服

髮灰散 起居所傷小便尿血或忍尿脬轉臍下

急痛小便不通又治肺疽心血衄內崩吐血舌

上出血俱妙

本草云能療瘀血通關膈利水

瘡療脬轉通大便止咳嗽鼻衄

右每服二錢米醋湯調下

生地黄散 血熱尿血

生地

二錢

黃芩

炒五錢

阿膠

炒

側柏葉

炒各一錢

右水煎食前服

當歸散 血分熱尿血

川歸 羚羊角屑

赤芍 各五分

刺薊葉 一錢

生地 一錢 右水煎服

又方 治血分有熱生地黃搗汁每用一 小盞日

又方 治血分熱尿血用炒蒲黃末每以 三服

鹿角膠散 鹿角膠炒為末二兩作二服長流水 二錢酒下

調妙

陰腫

良方曰陰腫因胞絡素虛風邪客之乘于陰部血

氣相搏故也

薛氏曰氣血虛弱補中益氣湯肝經濕熱龍胆瀉

肝湯又當與陰痒陰挺陰冷相參而治

又云一婦陰中腫悶小便澀滯兩脇作腫內熱晡

熱月經不調時或寒熱此因肝經鬱怒元氣下

陷濕熱壅滯朝用歸脾湯加柴胡升麻解鬱結

補脾氣升元氣夕用加味道遙散清肝火生肺

血除濕熱各數劑諸症悉愈又用四君芎歸丹

皮調補肝脾而經水如期

菖蒲散 治月水澁滯陰戶腫痛

菖蒲 當歸炒各一兩 秦艽二兩

右每服五錢入葱白水煎服

白礬散 治陰腫堅痛

白礬五錢 甘草五分 大黃一兩

石為末水調如東大綿裹內陰中一日兩換

以愈為度

陰痒

良方曰陰痒為三虫在腸胃之間因臟虛而蝕輕

則陰中痒甚則陰中痛也

生生子曰前症亦有虛者古人有用人參一兩煎

湯服之而愈予曾治一宦婦年廿一疹出未彌

月而犯房事熱目下陷陰中痒甚每一發神魂

颯然而手抓壁口中咬物鮮血淋漓爪脫肉破

而不遑顧七日肌肉如削諸洗挿方歷試無功

作虫治尤劇欲懸梁求死予為籌之乃虛熱陷

入至陰當從陰引陽以黃芪六錢甘草二錢防



風一錢柴胡二錢水煎食前服之其疾頓止此引金伐木之法也

薛氏曰前症屬肝經所化當用龍胆瀉肝湯逍遙散以主其內外以菝仁研膏和雄黃末或鷄肝內陰中以制其重

一婦胸膈不利內熱作渴飲食不甘肢體倦怠陰中悶痺小便赤澀此鬱怒傷肝脾所致用婦脾湯加山梔而愈復曰怒患處并小腹脹痛用小柴胡加芎歸山梔芍藥痛止用山梔入逍遙散

而痊又因勞役患處腫脹小便仍澀用補中益氣加山梔茯苓丹皮而瘳

一方新菝葉搗綿裹內陰中一日三易

大黃散 治陰痒

大黃微炒 黃芩 黃芪各五兩 赤芍 玄參

蛇床子 山茱萸 為末酒調服二錢

又方杏仁燒灰乘熱綿裹納陰中日二易之

又詩曰 玉戶生瘡時痛痒皆回房色損其元黃

葱水洗二三次杏仁燒灰油調痊加麝香尤妙

又方 鯽魚胆搽之妙

陰挺下脫

良方曰婦人陰挺下脫或目絕絡傷損或日子臟虛冷或目分娩用力所致

薛氏曰前症當升補元氣為主若肝脾鬱結氣虛下陷用補中益氣湯若肝火濕熱小便瀦滯龍胆瀉肝湯

一婦陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱晡熱似痒似痛小便重墜此肝脾鬱結蓋肝火濕熱而腫痛脾虛下陷而重墜也先以補中益氣加山梔茯苓車前子青皮以清脾火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱外以生豬脂和藜蘆末塗之而收

一婦陰中挺出五寸許悶痛重墜水出淋漓小便澀滯夕與龍胆瀉肝湯分利濕熱朝與補中益氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸脾湯加山梔茯苓川芎黃柏間服調理而愈後因勞役或怒氣下部濕痒小水不利仍用前藥即愈

一方 治陰挺下脫

當歸

黃芩

各二兩

牡蠣

二兩

蝟皮

炙一兩

赤芍

兩半

右為末每以二錢食前溫

酒調下米飲亦可

治陰挺長出玉戶數寸者疼痛不可忍飲食不進

用前方治其內仍以 大黃 山茨姑 石羔

牡蠣 乳香 為細末水調搗熟捏作条子如

中指大陰乾插入玉戶其痛即止

陰瘡

薛氏曰此症乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下流其

外症陰中突出如蛇如菌如鷄冠或生虫濕痒

或潰爛出水或腫悶墜痛其內症体倦內熱經

候不調或飲食無味嘔熱發熱或胸脇不利小

便痞脹或赤白帶下小水淋瀝其治法腫痛者

四物加柴胡丹皮山梔胆草濕痒者歸脾湯加

柴胡山梔丹皮淋瀝者龍胆瀉肝湯加白朮丹

皮潰腐者逍遙散山梔川芎腫悶墜痛者補中

益氣湯加山梔丹皮佐以外治之法

一婦素性急陰內痛小便赤瀉怒而益甚或發熱

或寒熱此肝經濕熱所致用芎歸炒梔柴胡苓  
木丹皮澤瀉炒芍車前炒連甘草數劑漸愈乃  
去黃連澤瀉又數劑全愈

一婦臍腹上下并玉戶遍生濕瘡狀如馬尻瘡他  
處並無熱痒而痛大小便瀉出黃汁食減身面  
微腫衆作惡瘡治反劇愈痛急令洗去乃用馬  
齒莧四兩青黛一兩同搗爛敷瘡上即時痒止  
痛定而熱亦退仍服八政散日三服分散客熱  
每敷藥僅得一時久藥已乾燥再塗新濕藥又

安凡如此二日僅減三之一五日減三之二自  
此二十日全安 緣此婦嗜酒貪啗魚蟹發風  
之物而中下焦蓄風熱之毒氣當作腸癰內痔  
等疾后當禁酒及發毒之物

一方 治玉戶生瘡 杏仁燒存性 雄黃 明凡錢

麝香一錢二分 右為末敷之

又方 飛丹研極細生桐油調搽二三日効

交接輒血出痛

薛氏曰一婦每交接便血出作痛此肝火動脾而

不能攝血用補中益氣濟生歸脾二湯而愈若  
出血過多而見他症但用前藥調補肝脾

千金方

療交接血出

伏龍肝

桂心

等分

為未每服一錢酒調下

胎前惡阻及痰逆不食

惡阻者謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也脉息和  
順但覓肢體沉重頭目昏眩好食醎酸甚者或  
作寒熱心中憤悶嘔吐痰水不能支持古謂之  
子病由胃氣怯弱中脘停痰之所致也

薛氏曰脾胃虛弱嘔吐不食用茯苓半夏湯蓋半  
夏乃健脾化痰滯之主藥也痰涎壅滯飲食少  
思胎氣不安為必用之藥須倍加白术然半夏  
白术陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃也予嘗用  
之驗甚若兼氣惱更加柴胡因風寒須用參  
生生子曰前症亦有因火者故丹溪用抑青丸前  
人亦有用濟生竹茹湯者予歷々見為火症者  
多寒者間而有之亦有愈治而愈逆者便當勿  
藥待之俟胃氣和當自瘳矣

茯苓半夏湯 妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏泡炒 陳皮各一錢 白茯苓二錢 砂仁炒一錢

炙甘草五分 姜棗烏梅水煎服二帖后用茯苓丸

茯苓丸 妊娠煩悶頭暈聞食吐逆或胸腹痞悶

赤茯苓 人參 桂心 炮姜 半夏泡炒

橘紅各一兩 白木炒 葛根 甘草炙 枳壳炒各

右蜜丸梧子大每服五十九米飲下日三服

白米湯 胃虛惡阻吐水甚至十餘日粥湯不入

白木炒一錢 人參五分 丁香 炙甘草各二分

右姜水煎服

保生湯 妊娠惡阻少食嘔吐或兼吐瀉作渴

人參一錢 炙甘草 白木炒 香附 烏梅

橘紅各五分 右姜水煎服

仲景乾姜人參半夏丸 治妊娠嘔吐不止

乾姜 人參 半夏等分 為末姜汁糊丸梧子

大米飲下十日三服

歸原散 惡阻嘔吐不止頭痛全不入食諸藥無效

人參 甘草 川芎 當歸 芍藥 丁香各五錢

茯苓

白朮

陳皮

各一兩半

桔梗

炒

枳壳

各二兩半

半夏

泡炒黃一兩

右每服五錢加姜六片束一枚

水煎服已上五方治寒痰惡阻之劑也

竹茹湯

惡阻嘔吐不下食

青竹茹

橘紅

各二兩

生姜

茯苓

各四兩

半夏

五兩

右水六升煮取

二升半分三服

人參橘皮湯

惡阻嘔吐痰水

人參

橘皮

白朮

麥冬

各一兩

甘草

二錢

厚朴

制

白茯苓

各五錢

右每服五錢加青竹茹一錢生姜三片水煎服

妊娠嘔吐痰水不食

生芦根

橘紅

七錢

生姜

一兩

枳柳

三錢

右作三次

水煎服

妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

竹茹

麥冬

各二兩

前胡

二兩

橘紅

一兩

芦根

一握

水一大升煮半

升作二次食前服

已上

四方治熱

痰惡阻之劑也

羅太無半夏茯苓湯 惡阻心中憤悶頭目眩暈

四肢怠倦百節煩痛胸膈痰逆嘔吐惡心嫌聞

食氣好噉酸醎多卧少起全不進食先服此湯

次服前茯苓丸

半夏

泡炒黃一兩

二兩

赤茯苓

熟地黄

各七錢半

芍藥

旋覆花

金方無此而

橘紅

人參各半

兩

川芎

桔梗

甘草

各五錢

右每服五錢姜七片水煎空心服○若有客

熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知母七錢半

若腹冷下利去地黄加炒慧心五錢○若胃中

虛熱大便秘小便赤瀉加大黃七錢半去地黄

加黃芩二錢半

胎動不安

妊娠胎動或飲食起居不節或

任經虛或因過

酒房室擊觸跌撲損動臟府或脾氣虛弱誤服

藥餌或感冒風寒當各推其目而施治之有因

母病而胎動者但治其母而胎自安有胎不堅

固動及母疾但安其胎而母自愈面赤舌青其

胎已死面青舌赤吐沫其母必死唇口色青兩

邊沫出子母俱死也

薛氏曰前証胎氣鬱滯者紫蘇飲脾氣虛弱者六

君子湯加紫蘇枳壳鬱結傷脾者歸脾湯加柴

梔鬱怒傷肝脾者四七湯加芎歸怒動肝火者



加味小柴胡湯若胎已死急用平胃散加朴硝腐化之

丹溪曰產前當清熱養血曰火動胎逆上喘急者以条芩香附之類為末調下墮胎乃氣虛血虛血熱所致懷妊嗜物乃一臟之虛黃芩安胎妙藥乃上中二焦之劑能降火下行加白朮為安胎聖藥也俗不知以為寒而不取用殊不知產前宜清熱令血循經而不妄行故能養胎又曰將臨月胎熱以三補丸加炒香附白芍鉉餅

為丸服抑熱以三補丸以地黃膏為丸○孕至八九個月必用順氣須枳壳紫蘇梗

固胎方法 川芎 地黃 黃芩 各五分 歸身

人參 白芍 陳皮 各錢 白朮 半錢 甘草 三分

黃栢 黃連 俱少許 桑寄生 錢一 右每服五六錢

加糯米五十粒水煎服 血虛不安者加阿膠

腹痛者加砂仁能止痛安胎行氣故也

連名固孕丸

仲景云妊娘宜常服當歸散 當歸 黃芩

芍藥 芍藥 各一兩 白朮 半斤 右為末酒調服方寸七日二服常服之即易產胎無苦疾產後百病悉主之

肘後方 治胎動不安 取芎根如足大指者一

尺水煎服 一方有生薑五片○丹溪云芎根大能補陰血而行滯血

立効散 治胎動不安如重物所墜冷如冰 即佛手散也

縮砂散 治胎動不安墮在須臾痛不可忍神効

砂仁 連壳炒黑為末 每服二錢酒下

釣藤湯 妊娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕者

釣藤鈎 當歸 茯神 去木 人參 各一錢 苦梗 半錢

桑寄生 一錢 右水煎服煩熱者加石膏

黃芪湯 氣虛胎動腹痛下水 糯米 一合 炙黃芪

川芎 各一兩 水煎分三服

順氣飲子 產前服之安胎 紫蘇葉 木香 煨

人參 草薏薹 茯苓 各一兩 炙甘草 五錢

大腹子 一兩氣虛者去之 右每服三五錢加芎根三

寸糯米三十粒水煎服

安胎寄生湯 妊娠下血或胎不安或腰腹痛

桑寄生

白朮

各五分

茯苓

四分

甘草

一錢

水煎服

安胎飲 躰倦惡食或胎動腹痛或下血發熱腰痛

炙甘草

茯苓

川歸

熟地

川芎

白朮

黃芪

白芍

炒

半夏

泡

阿膠

炒

地榆

加姜棗水煎服

又方 好銀煮取水入葱白作羹食之妙

生生子曰按良方云妊娠婦人倘氣血虛弱無以

滋養其胎終不能成也宜下之以免其禍若胃

氣壯實衝任榮和如魚之處淵得其所也宜必

盡方技以補養之庶無所悞設曰病而胎不能

安者不得不下之藥劑亦須謹慎

桂心散 妊娠曰病而胎不能安者以此下之

桂心

瓜蒌

牛膝

藟麥

各五分

歸尾

一錢

右水煎服

又方 牛膝兩酒煎食前空心服下

又方 生鷄子一枚鹽三錢攪勻服之立下

佛手散更妙 凡胎死者即下生者即安

胎漏下血

附卒然下血下如荳汁

良方曰妊娠經水時下由衝任氣虛不能約制蓋  
心小腸二經相為表裏上為乳汁下為月水故  
妊娠經水壅以養胎蓄之以為乳若經水時下  
名曰胞漏血盡則斃矣

丹溪曰胎漏有曰氣虛者有曰血虛者有曰血熱  
者不可不察也

薛氏曰前症有風熱者以防風黃芩丸若曰血熱  
加味逍遙散血虛二黃散血去太多八珍湯未  
應補中益氣湯若曰肝火用柴胡山梔散脾虛

加味歸脾湯若曰事下血作痛八珍湯加阿膠  
熟艾脾胃虛者補中益氣湯加五味子下陷者  
倍升麻柴胡補熱內熱用逍遙散亦有血氣盛  
養胎之外而有餘者不必服藥

卒然下血良方謂冷熱不調七情失宜氣血不和  
所致若傷於胎則痛血去多則墮矣 薛氏云  
前症氣怒者小柴胡湯風熱用一味防風丸血  
熱用一味子芩丸脾氣虛六君子湯中氣下陷  
補中益氣湯

一婦妊娠六月無怒下血甚至寒熱頭痛脇脹腹痛作嘔少食子謂寒熱頭痛乃肝火上冲脇脹腹痛乃肝氣不行作嘔食少乃肝侮脾胃下血乃肝火血熱用小柴胡加芍藥炒黑山梔茯苓白朮而愈 訶子能止胎漏及胎動欲生脹悶氣喘

安胎散 治卒然腰痛下血

熟地 艾葉 白芍炒 川芎 茜草炒 川歸

阿膠炒 甘草炙 地榆各五分 加姜枣水煎服

子芩丸 治肝經有熱妄行用細条芩沉實者炒為末每服一錢以鉄秤鎚燒赤淬酒熱調服若脾胃虛者不宜用

防風丸 治肝經有風血目妄動而不歸經 防風為末每服一錢白湯調下

防風黃芩丸 治肝經有風熱致血崩便血尿血用条芩炒焦防風等分為末酒糊丸梧子大每服三五十九食前米飲或酒下

二黃散 治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈

煩躁作渴或脇肋脹痛等症

生地 熟地 為末每用三錢煎白朮枳壳湯

調服 二黃杵膏為丸尤妙 庶不枯槁而有力也

芎歸膠艾湯 妊娠下血腹中痛為胞阻以此安

艾葉 阿膠炒 川芎 當歸各三兩 甘草一兩

右細切以水八升煎取三升內膠溶盡分三服

立聖散 治妊娠下血不止

雞肝三枚用酒一升煮熟頓食之大効

阿膠散 妊娠無故下血不止

阿膠三兩炒為末酒一升半煎令溶一服愈

又方 治血熱下血及胎漏下血不止

阿膠二兩為末 生地黃半斤搗取汁以清酒

三升絞汁分三服

又方 治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之

生地黃汁一升 陳酒五合 全煎三五沸温三服為止為度

枳壳湯 治虛熱胎漏下血或回事下血

枳壳 黃芩各半兩 白朮一兩 水煎食前分三服

本事方 治胎下血不止

菝奴菝樹上乾不  
落菝子是也燒存性為末水調服妙

妊娠胎漏下黃汁或如荳汁白漿或如赤荳汁予

歷見此症不早治其胎必墮

大千方 治妊娠忽然下黃汁如膠或如荳汁胎

動腹痛乃氣虛也

糯米升五 黃芪兩六 水七升煎取二升分四服

薛氏云若肝脾濕熱用升陽除濕湯肝脾風熱加

味道遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯脾胃氣虛用

錢氏白朮散若脾氣下陷補中益氣湯風入腸

### 胃用胃風湯

東垣升陽除濕湯 治婦人女子漏下惡血月事

不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食

失節或勞傷形躰或素患心氣不足因飲食

勞倦致令心火乘脾其脉緩而弦急按之洪

大皆脾土受邪也

柴胡 羌活 蒼朮 黃耆炒各錢半 防風 升麻

甘草各錢 藁本各錢 蔓荊子七分 獨活 當歸各五分

右水煎食前服

胃風湯 治風邪乘虛客於腸胃水谷不化泄瀉  
下注腹脹虛滿腸鳴作痛及腸胃虛熱下如  
荳汁或瘀血日夜無度

人參 白朮 茯苓 川芎 川歸 白芍

桂皮 粟米 右水煎食遠服

銀芎酒 治妊娠下黃汁或如赤荳汁

芎根去黑皮 好銀各一斤 水九升煮取四升每服入

酒半升煎分二服

脉經曰婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胎必

倚而墮此非時孤漿預下也胎漏下水乃徐徐而下今暴下而多

故知胎墮

胎上逼子懸也

妊娠將養如法則血氣調和胎得其所而產亦易  
否則胎動氣逆上逼臨產亦難甚至危矣

陳良甫云治一婦人有孕七個月遠歸忽然胎上  
冲心而痛坐卧不安兩醫治之無效遂說胎已  
死矣用草麻子研爛加射香貼臍中以下之命  
在垂亡名陳胗視兩尺脉絕他脉平和陳問二



醫作何症治答曰死胎也陳曰何以知之曰兩尺脉絕是以知之陳曰否此子懸也若是胎死却有辯處面赤舌青子死母活面青舌赤吐沫母死子活唇口俱青母子俱死今面不赤舌青其子未死是胎上逼心宜以紫蘇飲治之至十服其胎遂不逼而下安矣

紫蘇飲

治妊娠胎氣不和逼上脹滿疼痛

謂之懸子

兼治臨產驚恐氣結連日不下

紫蘇葉一兩

大腹皮

人參

川芎

陳皮

白芍

各五錢

當歸

三錢

甘草

一錢

右剉分三服

每服加姜四片葱白七寸水煎至七分空心

服○曾有累日產不下遍服催生藥不効此

必坐草少早心存一點畏懼氣結而不行非

不順也素問云恐則氣下蓋恐則精神怯

則上焦閉；則氣還；則下焦脹氣乃不行

得此藥一服便產及治妊娠六七月子懸每

用此數；有驗不十服胎便近下而安

大全方 治胎上逼煩悶併治胎動困篤

葱白二七莖濃煮汁飲之若胎未死則安已死

即下如未效再服○若唇口青黑手足厥冷

須佐以當歸湯○本草云葱白通陽氣安胎此方神妙脉浮滑者宜之

當歸湯 治胎動煩躁或生理不順唇口青黑手

足厥冷 人參 當歸 阿膠炒 炙甘草各錢

葱根連白握 右水四碗煎四味減半去渣入葱

再煎至一碗分二服

薛氏云一妊婦每因恚怒其胎上逼左關脉絃洪

乃肝火內動用小柴胡加茯苓枳壳山桅而愈

但躰倦不食用六君子調養脾土加柴胡枳壳

調和肝氣乃瘥

又一妊婦胎上逼胸滿暖氣飲食少思此脾氣鬱

滯用紫蘇飲頓安又用四君子加枳壳柴胡山

桅而瘥

大聖散 治妊娘怯悸夢驚心腹脹滿連脐急痛

白茯苓 川芎 麥冬 黃芪炒 川歸各一錢

人參 炙甘草 木香各五分 加生姜水煎服

白木湯 妊娘遍身痛或冲心欲死不能飲食

白朮五兩 黃芩二兩 芍藥四兩 右水六升煮取

二升半分三服○緣胎有水致痛兼易產

妊娠心痛腹痛

妊娠心腹痛或宿有冷疾或新觸風寒或痰飲相

搏若痛傷胞絡必至動胎甚則傷墮

妊娠卒心痛氣欲絕

川芎 當歸 茯苓 厚朴制各一錢 水煎服

當歸芍藥湯 妊娠心腹急痛或去血過多而眩

暈 白芍炒 當歸 茯苓 白朮炒

澤瀉各一錢 川芎二錢 右水煎服

阿膠散 治胎痛腹痛 白茯苓 白朮炒

川芎 阿膠炒各一錢 當歸 陳皮各二錢

甘草炒三分 右姜枣水煎服

熟艾湯 治妊娠心腹痛或吐血衄血

熟艾如拳大水煮服之効○中惡亦妙

有癥者宜去癥凡胎動多在當臍今動 此症宜以

仲景桂枝茯苓丸主之

桂枝茯苓丸 妊娠腹痛不能忍或偶有所傷胎

動不安命將絕者砂仁不以多少連皮炒黑色或單用仁炒為末熟酒調下二錢不飲酒者未飲下但養腹中熱胎已安矣懸命須臾者以砂仁湯吞桂枝茯苓丸又名奪命丸專治婦人小產下血子死腹中其婦增寒手指唇口爪甲青白面色黃黑胎上搶心悶絕欲死冷汗自出或食物或誤食草藥傷動胎氣下血不止胎或未損者服此即安胎已死者服此即下腐爛者亦能取下此方原係異傳

丹溪亦稱其神此即仲景桂枝茯苓丸但用

淡醋湯嚼下耳 桂枝 茯苓 牡丹皮

莢仁去皮 赤芍藥 右各等分蜜丸彈子大

淡醋湯嚼下一丸不知漸加至三丸

妊娠腰背痛

腎主腰胎繫于腰痛甚者或因勞役傷損則胎墮也

薛氏曰若外邪所傷用獨活寄生湯勞傷元氣八珍湯杜仲砂仁膠艾脾腎不足以前藥加白朮

補骨脂氣血鬱滯用紫蘇飲加桔梗枳壳肝火  
所動以小柴胡湯加白朮枳壳山梔肝脾鬱結  
用歸脾湯加柴胡枳壳

一妊婦頸項強直腰背作痛此膀胱經風邪所致  
用按萃羌活湯一劑而愈又用獨活寄生湯及  
八珍湯以祛邪固本而痊

通氣散 腎虛腰痛神効 破故布炒為末空心

每服二錢嚼胡朮肉半個以溫酒下

杜仲丸 治妊娘腰背痛 杜仲炒 川續斷酒浸

各等分為末煮枣肉為丸梧子大每服七十  
丸酒或米飲下

膠艾湯 治腰腹疼痛胎動欲落即前妊娘下血

安胎飲是也 熟地 艾葉 白芍 川芎

黃芪 阿膠 川歸 甘草炒 各等分加

姜枣水煎服

獨活寄生湯 治足三陰虛風濕所侵腰膝歷節作痛

獨活 桑寄生 續斷酒炒 杜仲姜汁炒 細辛

秦艽 牛膝酒炒 茯苓 白芍炒 桂心

川芎

防風

人參

熟地

川歸

粉草

炙各五分

右水煎服

一婦苦腰痛數年不愈用白朮一味大劑服不三月而痊乃胃氣虛閉之症白朮能利腰膂之血故安胎而治痛也

援萃羌活勝濕湯

治頭疼脊痛腰似折項似拔

羌活

獨活

錢各一

藁本

防風

炙甘草

分各五

川芎

蔓荊子

分各二

右水煎服如身重腰

沉之然是濕熱也加黃柏一錢附子五分蒼朮二錢

### 妊娠小腹痛

薛氏曰一妊婦小腹痛作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後曰怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍胆瀉肝湯一劑諸症頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

龍胆瀉肝湯

治肝經濕熱兩脇腫痛或小腹痛

脇痛小便澀滯等症

龍胆草

酒拌炒黃

澤瀉

各一錢

木通 生地 川歸 車前子炒 山梔炒

黃芩炒 甘草各五分 水煎服

阿膠散張氏名湯 不問妊娠月數深淺或顛仆或已

毒藥胎動不安腰疼腹痛搶心短氣

熟地 艾葉 白芍 川芎 黃芪 阿膠

川歸 甘草各一兩 右剉每服五錢入姜棗水

煎服 金櫃方無黃芪

妊娠心腹脹滿

薛氏曰若外感風寒內傷飲食用藿香正氣散若

食傷脾胃用六君子湯若陽氣壅滯用紫蘇飲

一妊娠飲食停滯心腹脹滿或用人參養胃湯加

山查青皮枳壳其脹益甚其胎上攻惡心不食

右關脉浮大按之則絃此脾土不足肝木所侮

用六君子加升麻柴胡而愈後小腹痞悶用補

中益氣湯升舉脾氣乃瘥

妊娠數墮胎

夫胎乃陽施陰化榮衛調和經水完全十月而產

若血氣虛損不能養胎所以數墮也凡妊娠腰

痛多致墮胎

薛氏曰丹溪云陽施陰化胎孕乃成血氣虛乏不能榮養其胎則墜譬如枝枯則果落藤痿則花墜嘗治賈氏婦每有姪至三月前後必墜診其脉左右大而無力重則瀋知其血虛也補其中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯下黃芩末二錢與數十帖得保而生因而思之墮於內熱而虛者於理為多曰熱曰虛蓋姪至三月上屬相火所以易墜不然何以黃芩熟艾阿膠等為安胎之妙如此也大抵治法須審某月屬某經育養而藥之

生生子曰胎猶瓜也瓜生於藤肥而瓜壯未熟而凋者由藤稿而風搖也胎藏母腹繫于命門命門者督脉之所循也又衝任二脉為血之海妊婦而經不行者血蓄以養胎也足月而生者猶瓜熟而蒂落也苟內無所傷外無所感何墮之有衝任督三脉一宗衝脉由氣街而行足少陰任脉起於胞門子戶由會陰而行腹督脉繫



廷孔由會陰而行背歷長強循腰腧命門而上  
巔驗今之墮胎者苟非衝任之不足必由色慾  
之縱恣淫火一動則搖撼其督脉胞門亦由之  
而不閉胎斯墮也胎墮必腰痛者腰腧命門皆  
督脉之所歷胎又繫于命門故也現牝獸之護  
胎則可推其所慎矣牝牝交合有節懷胎之後  
牝獸近身則蹄而遠之是以交而必孕；而必  
育者由交合之有節也懷妊而不遠慾即幸不  
墮生子亦必脆弱多疾痘疹亦多險逆皆淫火

煨煉所致觀丹溪曰虛曰熱抑豈無其所自乎  
予故揭而告諸保孕者當知其所慎重至于藥  
劑則虛熱二字為之本矣是以八珍阿膠杜仲  
黃芪黃栢黃芩桑寄生香附為安胎之妙者得  
非治其本歟

凡保胎當理脾胃脾胃為倉廩五臟六府之所稟  
受胚胎由之以滋養也胃屬陽明陽明者衝任  
之長也

一方 鯉魚二斤者一尾粳米一升用鹽醬和煮

食之甚善一月食三次為佳

芎藭補中湯 懷妊血氣不能榮養以致半產早

能服此預先補之不致于墮

乾姜煨 阿膠炒 芎藭 五味子各五分 黃芪炒

川歸 白木炒 杜仲炒 白芍藥各一錢 人參

木香 甘草各五分 右水煎服虛寒所宜

千金保孕湯 氣血不足每至三四月而墮當預服之

人參 黃芪 白木 川歸 甘草 黃芩

杜仲 桑寄生 川續斷 白芍藥 砂仁

加粳米五十粒水煎食遠服○若氣痞悶不

舒加厚朴蘇梗○若腹疼加熟艾葉香附○

見血下加升麻地榆椿根白皮阿膠

醋附丸 治數墮胎者此藥甚妙 亦治崩漏帶

下積聚癥瘕臍腹疔痛

香附子擦去毛淨 用好醋煮透焙乾為末仍以醋打

糊為丸梧子大每服三五丸米飲下

脉經曰婦人懷胎一月之時足厥陰脉養之二月

足少陽養三月手心主脉養四月手少陽脉養

五月足太陰脉養六月足陽明脉養七月手太  
陰脉養八月手陽明脉養九月足少陰脉養十  
月足太陽脉養諸陰陽脉各養三十日手少陰  
太陽不養者上為乳汁下主月水也值養胎之  
經者不可針灸犯之必墮胎  
胎不長

良方曰妊娠而胎不長者因有宿疾或因失調以  
致臟腑虧損氣血虛弱而胎不長也當治其疾  
痰益其氣血則胎自長矣

生生子曰曾見一宦婦每妊至五六月則墮如此  
者三次胎甚瘦小詢知少時患哮喘因而背駝  
軀亦矮小因腹中不舒其胎不能長后治其哮  
嗽再孕乃不墮竟足月而產一子此固偶然則  
良方宿疾之說似不誣矣

薛氏曰一婦胎六月躰倦懶食面黃晡熱而胎不  
長因勞欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍加參  
朮茯苓三十餘劑脾胃漸健胎安而長矣  
生生子曰昔在西吳有張氏婦年二十三孕適三

月迎予胗之其脉兩尺皆瀯左手短弱右關不  
充據脉瀯不當有妊而其夫云向已受胎者二  
俱彌月而產躰皆不完始無舌次無水火門戶  
產下隨死而無生氣今第三孕矣心憂之以翁  
治法多竒思幸投劑而保全之也予以脉叅之  
多為神志不足因處一方曰壯神益志保孕湯  
即語之曰是方每月可服十帖過八月則不必  
服矣彼欣然從而服之足月產一女形全而氣  
壯及再有妊未服藥雖生一女完矣而頭面為

白膜遮蔽隱：僅見耳目口鼻而亦隨死也後  
又孕適予歸省其婦心憂失措夫諭之曰無恐  
前保孕方在向以未服乃致乖舛今可亟服也  
照方服如前至期生一子而無恙舉家以此方  
為神錄而置之香火堂中尸祝之此亦愚見之  
偶中者人以旋服旋効而遂神之也亦其家為  
富而甚不仁丘里啣之當其產而偵之其產而  
怪以為作惡之報迨產子而無恙即以鄙為保  
孕之神至今傳頌不衰也予因記其事并戒夫

人之為惡者

壯神益志保孕湯 茯神 當歸 酸棗仁

人參 遠志 山藥 黃芪 鹿角膠各一錢

白木二錢 砂仁三分 甘草四分 加真眼肉五枚 棗二

枚水煎服

黃芪湯 治妊娠不長更安胎和氣 黃芪炒

白木炒 陳皮 麥冬 白茯苓 前胡

人參各五分 川芎 甘草炒三分 右姜枣水煎服

集驗方 用鯉魚長尺許者如食法整理飲其汁

則胎漸大而長矣然亦須每月服數次為妙

墮胎後血下不止

墮胎後復損經脉而下血不止甚則煩悶致死皆

以調補胃氣為主

薛氏曰一妊婦墮胎昏憤不時吐痰自用養血化

痰之劑昏憤不省自汗發搐痰涎湧出彼以為

中風欲用法祛風化痰予曰此屬脾氣虛寒所致

遂用十全大補湯加炮姜二十餘劑尋愈

墮胎下血煩滿寒熱狂悶鎊鹿角屑為末每服三

錢水調下日三服

墮胎下血腹痛

阿膠

炒一兩

艾葉

錢五

水煎服

補中益氣湯

加鹿角膠一錢

臨服入童便半酒

杯立止

人參黃芪湯

治小產氣虛血下不止

人參

黃芪

炒

當歸

白木

炒

白芍

炒

艾葉

各錢

阿膠

炒二錢

水煎服

未足月欲產

妊娠未足月而痛欲產者知母丸佳氣血不足者

芎歸補中湯倍加知母或八珍湯內加之

血熟所宜

薛氏曰一妊婦八月胎欲墜如產卧久少安日哺

益甚此氣血虛弱朝用補中益氣湯加茯苓半

夏隨愈更以八珍湯調理而安

芎歸補中湯 治氣血虛而欲產

艾葉

代姜

阿膠

炒

川芎

五味子

炒

川歸

白木

炒

黃芪

炒

人參

芍藥

炒

各錢

甘草

炙五分

杜仲

錢一

水煎作二次服

知母丸 十月未足而痛如產兼治產難及子煩

知母為末蜜丸梧子大米飲下三十九或酒下  
又方 月數未足而似欲產腹痛

槐子 蒲黃 等分為末蜜丸梧子大酒吞三

十九痛止為度 蒲黃味一以井水調服亦焦

千金方 治月未足而欲產

菖蒲根搗汁一二升灌下

本草云菖蒲治胎動不安下血

過期不產

妊娠月足而過期不產者當補血行滯羅先生以  
四物湯加香附菴仁枳壳縮砂紫蘇水煎服之

數帖即生

妊娠咳嗽

夫肺內主氣外主皮毛腠理不密寒邪乘之則咳

嗽秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則

心受之其嗽不已則傳于臟府妊娠病久不已

則傷胎也

薛氏曰若秋間風邪傷肺用金沸草散夏火邪尅

金用人參平肺散冬寒邪傷肺用人參敗毒散

春風邪傷肺用參蘇飲若脾肺氣虛用六君子

芎歸桔梗若血虛桑皮杏仁桔梗腎火上炎用  
六味丸加五味子煎服脾胃氣虛風寒所傷種  
中益氣湯加桑皮杏仁桔梗

又治一妊婦氣喘痰甚諸藥不効素有帶下始于  
目下有浮氣兩月其面亦然此氣虛而有痰飲  
也用六味丸料數劑而愈

一妊婦嗽則小便出此肺氣不足腎氣虧損不能  
司攝用補中益氣湯以培土金六味丸加五味  
以生腎氣而安

一妊婦咳嗽其痰上湧日五六碗許諸藥不應予  
以為此水泛為痰用六味丸料及四君子湯各  
一劑稍愈數帖而安

一妊婦因怒咳嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金  
以小柴胡湯加山梔枳殼白朮茯苓治之而愈  
但欲作嘔此肝侮脾也六君子加柴胡升麻

桔梗散 治風寒咳嗽喘急不食 天冬去心

赤茯苓各一錢 桑皮 桔梗炒 紫蘇 貝母

人參各五分 麻黃去節 炙甘草各三分 右加姜水煎服



馬兜鈴散 治咳嗽氣喘 馬兜鈴 苦梗

人參 甘草 貝母各五分 紫蘇一錢 橘紅

大腹皮 桑皮各一錢 五味子十一粒 右姜水煎服

百合散 咳嗽胸膈煩悶 川百合 此死

麥冬 苦梗 桑皮各五分 甘草三分 竹茹二分

加姜水煎服

妊娠傷寒涎多咳嗽 知母 杏仁 天冬

桑皮各五分 姜水煎服

加味參蘇飲 治項背拘急鼻塞頭眩時發寒熱

咳嗽 即參蘇飲加五味子杏仁是也

妊娠吐血衄血

妊娠吐血衄血由七情臟腑所傷氣逆于上致血

上溢不止心悶甚者多死或墮胎也宜用局方

必勝散

薛氏曰若肝經怒火先用小柴胡山梔生地次用

前葉合四物後用加味道遙散若肝經風熱防

風子芩丸心經有熱硃砂安神丸心氣不足茯

苓補心湯思慮傷心妙香散胃經有火犀角地

黃湯膏梁積熱加味清胃散肺經有火黃芩清  
肺飲因氣鬱滯紫蘇飲子氣不攝血用補中益  
氣湯腎經虛火六味地黃丸

紫蘇飲 治妊娠失調胎氣不安上攻作痛或氣

逆失血 方在胎上通卷中

一妊娠因怒失血兩脇脹痛小便淋瀝此怒而血

蓄于上隨火出也用小柴胡合四物四帖血止

用六君子安胎飲調理全安

必勝散 治男子婦人血妄流溢或吐衄血並

小蘗用 人參 蒲黃 熟地 川歸

川芎 烏梅去核各一錢半 水煎服

黃芩清肺飲 治妊娠肺熱吐衄及治肺熱小便

不利 黃芩炒 山梔炒 鹽豉二十粒 水煎服

加味清胃散 治醇酒厚味唇齒作痛或齒齲潰

爛并頭面頸項疼痛及妊娠吐衄 川歸

黃連炒一錢半 生地 丹皮各一錢 犀角 連翹一錢

升麻二錢 甘草五分 右水煎服 便秘加大黃

子煩

良方曰妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火以養精六月受少陽相火以養氣若母心驚胆寒多有是症產寶云是心肺虛熱或痰積于胸若三月而煩者吐涎惡食大凡停痰積飲寒熱相搏吐甚則胎動不安

薛氏曰內熱子煩用竹葉湯氣滯用紫蘇飲痰滯用二陳加白木黃芩枳壳氣鬱用分氣飲加川芎脾胃虛弱用六君子加紫蘇山梔

竹葉湯 妊娠心驚胆怯終日煩悶名曰子煩

白茯苓

錢二

防風

黃芩

麥冬

錢各一

竹葉

錢一

水煎服

一方有知母

人參散

熱乘心脾煩熱乾渴

人參

麥冬

赤茯苓

地骨皮

黃芩

炒

乾葛

甘草

五分

犀角

錢各一

水煎服

竹茹湯

妊娠煩躁或胎不安

淡竹茹一兩水煎服之

知母丸

知母一味炒為末枣肉丸如彈子大每

服一丸人參湯下

分氣飲 脾胃虛弱氣血不和胸膈不利或痰氣

喘嗽飲食少思 陳皮 茯苓 半夏 桔梗

大腹皮 蘇葉 白朮炒 枳壳炒 山梔炒 各錢

甘草分 右加姜枣水煎服

治子煩口乾不得卧用黃連為末每服一錢米飲

調下

