



本草綱目果部目錄第三十三卷

○果之四味類一十三種

秦椒 本經

蜀椒 本經

崖椒 圖經

蔓椒 本經

地椒 嘉祐

胡椒 唐本

畢澄茄 開寶

吳茱萸 本經

食茱萸 唐本

鹽麩子 開寶

鹹草附

醋林子 圖經

茗 唐本

阜蘆 拾遺

右附方舊五十四新九十六

本草綱目果部第三十二卷

○果之四 味類一十三種

秦椒

本經中品

校正

自木部移入此

釋名大椒

爾雅檉

花椒

集解

別錄曰秦椒生泰山山谷及秦嶺上或瑯琊八月九月采實弘景曰今從西來形似椒而

大色黃黑味亦頗有椒氣或云卽今樛樹子樛乃豬椒恐謬恭曰秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味

短實細爾雅曰秦嶺間大有之類曰今秦鳳明越金商州皆有之初秋生花秋末結實九月十月采

之爾雅云檉大椒郭璞注云椒叢生實大者爲檉也詩唐風云椒珥之實繁衍盈升陸機疏義云椒

樹似茱萸有針刺葉堅而滑澤味亦辛香蜀人作茶吳人作茗皆以其葉合煮爲香今成臯諸山有

竹葉椒其木亦如蜀椒小毒熱不中合藥也可入飲食中及蒸雞豚用東海諸島上亦有椒枝葉皆

和似子長而不圓甚香其味似橘皮島上麋鹿食其葉其肉自然作椒橘香今南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶氏及郭陸之說正相合當以實大者為秦椒也宗奭曰此秦地所產者故言秦椒大率椒株皆相似但秦椒葉差大粒亦大而紋低不若蜀椒皺紋為高異也然秦地亦有蜀椒種時珍曰秦椒花椒也始產于秦今處處可種最易蕃行其葉對生尖而有刺四月生細花五月結實生青熟紅大於蜀椒其目亦不及蜀椒目光黑也范子計然云蜀椒出武都赤色者善秦椒出隴西天水粒細者善蘇頌謂其秋初生花蓋不然也

修治 同蜀椒

椒紅氣味辛温有毒

別錄曰生温熟寒有毒權曰苦辛○之才曰惡苦萋防葵

畏雌黃 **主治除風邪氣温中去寒痺堅齒髮明目久**

服輕身好顏色耐老增年通神 本經 **療喉痺吐逆疝**

瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五臟 別錄 **上氣欬**

嗽久風濕痺 孟詵 **治惡風遍身四肢瘡痺口齒浮腫**

搖動女人月閉不通產後惡血痢多年痢療腹中

冷痛生毛髮滅癩 甄權 **能下腫濕氣** 震亨

附方 舊六新 **膏痺尿多** 其人飲少用秦椒二分出泔瓜蒂二分為末水服方寸匕

日三服傷寒類要 **手足心腫** 乃風也椒鹽末等分醋和傅之良 **損瘡** 別後方

中風 以麴作餠包秦椒于灰中燒之令熟斷 **久**

患口瘡 大椒去閉口者水洗麴拌煮作粥空腹吞之 **以飯壓下重者可再服以瘡為度**

療本 牙齒風痛 秦椒煎醋含漱 百蟲入耳 椒末一錢醋半

草 盞浸良久少少滴入 自出 續于金方

蜀椒 本經 校正 自木部 移入此

釋名 巴椒 別錄 漢椒 日川椒 綱 南椒 炮炙 唐點

椒 詩珍曰 蜀古國名漢水名今川西成都廣漢潼

州順慶閬中諸處是矣巴亦國名又水名今川東重慶夔

岷沱黑白四大水分東西南北為四川也

集解 別錄曰 蜀椒生武都山谷及巴郡八月采實

裹白氣味濃江陽晉康及建平間亦有而細赤辛

而不香力勢不如巴郡者恭曰今出金州西域者

最佳頌曰今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃

種之木高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑

可煮飲食四月結子無花但生干枝葉間顯如小

豆而圓皮紫赤色八月采實焙乾江淮北土亦有

之莖葉都相類但不及蜀中者良而皮厚裏白味

烈也時珍曰蜀椒肉厚皮皺其子光黑如人之瞳

人故謂之椒目他椒子雖光黑亦

不似之若土椒則子無光彩矣

修治 教曰凡使南椒須去目及閉口者以酒拌濕

器中勿令傷風也宗奭曰凡用秦椒蜀椒並微炒

使出汗乘熱入竹筒中以槌搗去裏面黃殼取紅

用未盡再搗或只炒熟隔紙鋪

椒紅氣味辛溫有毒 別錄曰大熱多食令人乏氣

食椒損氣傷心令人多忘 李廷飛曰久食令人失

明傷血脈之才曰杏仁為之使得鹽味佳畏款冬

花防風附子雄黃可收水銀 主治 邪氣欬逆溫中

本草綱目卷三十一 二

逐骨節皮膚死肌寒熱痺痛下氣久服頭不白輕

身增年本經除六腑寒冷傷寒温瘧大風汗不出心

腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風

邪痲結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服開腠

理通血脉堅齒髮明目調關節耐寒暑可作膏藥

別錄治頭風下淚腰脚不遂虛損留結破血下諸石

水治欬嗽腹内冷痛除齒痛甄權破癥結開胸治天

行時氣產後宿血壯陽療陰汗暖腰膝縮小便止

嘔逆大明通神去老益血利五臟下乳汁滅癥生毛

髮孟詵散寒除濕解鬱結消宿食通三焦温脾胃補

右腎命門殺蛇蟲止泄瀉時珍

發明頌曰服食方單服椒紅補下宜用蜀椒乃佳

段成式言椒氣下達餌之益下不上衝也時

珍曰椒純陽之物乃手足太陰右腎命門氣分之

藥其味辛而麻其氣温以熱稟南方之陽受西方

之陰故能入肺散寒治欬嗽人脾除濕治風寒濕

痺水腫瀉痢入右腎補火治陽衰溲數足弱久痢

諸證一婦年七十餘病瀉五年百藥不效予以感

應九五十九粒之大便二日不行再以平胃摻加

椒紅茴香棗肉為丸與服遂瘳勿因怒食舉發服

之即止此除濕消食温脾補腎之驗也按歲時記

言歲旦飲椒柏酒以辟疫癘椒乃玉衡星精服之

令人體健耐老柏乃百木之精為仙藥能伏邪鬼

故也吳猛真人服椒訣云椒稟五行之氣而生葉

青皮紅花黃膜白子黑其氣馨香其性下行能使

火熱下達不致上薰芳艸之中功皆不及其方見
下時珍竊謂椒紅丸雖云補腎不分水火未免誤
人大抵此方惟脾胃及命門虛寒有濕鬱者相宜
若肺胃素熱者大宜遠之故丹溪朱氏云椒屬火
有下達之能服之既久則火自水中生故世人服
椒者無不被其毒也又上清訣云凡人喫飯傷飽
覺氣上衝心胸痞悶者以水吞生椒一二十顆即
散取其能通三焦引正氣下惡氣消宿食也又戴
原禮云凡人嘔吐服藥不納者必有蛇在腸間蛇
聞藥則動動則藥出而蛇不出但於嘔吐藥中加
炒川椒十粒良蓋蛇見椒則頭伏也觀此則張仲
景治蛇厥烏梅丸中用蜀椒亦此義也許叔微云
大凡腎氣上逆須以
川椒引之歸經則安

附方 椒紅丸

治元臟傷憊目暗耳聾服
此百日覺身輕少睡足有

力是其效也服及三年心智爽悟日明倍常面色
紅悅髭髮長而用蜀椒去日及合口者炒出汗曝

乾搗取紅一斤以生地黄搗自然汁入銅器中煎
至一升候稀稠得所和椒末丸梧子大每空心暖
酒下三十九合藥時勿令婦人雞犬見詩云其椒
應五行其仁通六義欲知先有功夜間無夢寐四
時去煩勞五臟調元氣明目腰不痛身輕心健記
別更有異能三年精自秘回老返嬰童康強不思
睡九虫頓消忘三尸自逃避 **補益心腎** 仙方椒苓
若能久餌之神仙應可冀 丸補益心
腎明目駐顏順氣祛風延年真川椒一斤炒去汗
白茯苓十兩去皮為末煉蜜丸梧子大每服五十
丸空心鹽湯下忌鐵 **虛冷短氣** 川椒三兩去目并
器 邵真人經驗方 合口者以生絹袋
盛浸無灰酒五升 **腹內虛冷** 用生椒擇去不折者
中三日隨性飲之 用四十粒以漿水浸
一宿令合口空心新汲水吞下久服暖臟 **心腹冷**
腑駐顏黑髮明目令人思飲食 斗門方
痛 以布裹椒安痛處用熨斗熨 **冷蟲心痛** 川椒四
令椒出汗即止 孫真人方

汗酒一椀淋之服 **陰冷入腹** 有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿日夜疼

酒 壽域神方 悶欲死以布裹椒包囊下熱氣大 **呃噫不止** 川椒

通日再易之以消為度 千金 炒研麩糊丸梧子大每服十丸 **傳尸勞症** 最殺勞

醋湯下神効 邵以正經驗方 川椒紅色者去子及合口以黃草紙二重隔之炒

出汗取放地上以砂盆蓋定以火灰密遮匹旁約 一時許為細末去殼以老酒浸白糕和丸梧子大

每服四十九食前鹽湯下服至一斤其疾自愈此 藥兼治諸痺用肉桂煎湯下腰痛用茴香湯下腎

冷用鹽湯下昔有一人病此遇異人授是方服至 二斤吐出 一虫如蛇而安遂 **歷節風痛** 白虎歷節

名神授丸 陳言三因方 理枯虛生虫遊走痒痛兼治痺疾 **寒濕脚氣** 川椒

半身不遂即上治勞瘵神授丸方 升踈布囊盛之日以踏脚 **諸瘡中風** 生蜀椒一升

貴人所用 大全良方 裹椒勿令漏氣分作兩裹于塘灰火中燒熟刺頭

作孔當瘡上卷之使椒氣射入瘡中冷即易之須 吏瘡中出水及遍體出冷 **瘡腫作痛** 生椒木全下

汗即瘥也 韋宙獨行方 **分研醋和傅之** 紅椒七粒葱頭七箇煮

外臺秘要 **囊瘡痛痒** 水洗之 一人途中苦此 湘山寺僧授此方數日 **手足皴裂** 椒四合以水煮

愈名驅風散 經驗方 食頃出令燥須臾再浸候乾 **漆瘡作癢** 譚氏方用

塗豬羊腦髓極妙 勝金方 洗之 ○相感志云凡至漆所 **夏月濕瀉** 用椒炒取

嚼川椒塗鼻上不生漆瘡 煨各一兩為末粳米飯丸梧 **餐瀉不化** 及久痢小

子大每量人米飲服百丸 蒼木二兩土炒礮末醋糊丸梧 **久冷下痢** 或不痢

子大每米飲服五十九 普濟 **老小洩瀉** 腰腹若

冷用蜀椒三升酢漬一宿麴三升同椒 一升拌作粥食不遇三升瘥 千金方

小兒水瀉及人年五十以上患瀉用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾碾末瓦器貯之每服二錢七酒及米飲

水瀉奶疳 椒一分去目碾漠酥調少少下 譚氏 全腦上日三度 姚和仲延

齡 **食茶面黃** 川椒紅炒碾漠糊丸梧子大傷寒齒方 每服十九茶湯下 簡便方

傷寒嘔血繼而齒縫出血不止用開口川椒四十九粒入醋一盞同煎熟入白礬少許服之

直指 **風蟲牙痛** 總錄用川椒紅漠水和白麩丸皂方 子大燒熱咬之數度愈○一方花

椒四錢牙皂七七 頭上白禿 花椒漠豬脂調傳三箇醋一椀煎漱之 五度便愈 普濟方

婦人禿鬢 漢椒四兩酒浸密室內日日蠍螫作痛搽之自然長也 聖惠方

川椒嚼細塗之微麻 百蟲入耳 川椒碾細浸醋灌卽止 杏林摘要 肘後方 蛇入人口 因熱取凉

毒蛇咬螫 以閉口椒及葉擣封之良 川椒碾細浸醋灌卽止 杏林摘要 肘後方 蛇入人口 因熱取凉

蛇入口不得出者用刀破蛇尾納生椒二小兒暴三粒裹定須臾卽自退出也 聖惠方

驚啼哭絕死蜀椒 左顧壯蠟各六銖以酢漿水一升煮五合每灌一合 千金方 **舌蹇語**

吃 川椒以生麩包丸每服十痔漏脫肛 每日空心粒醋湯送下 救急方

錢涼水送下三五 **腎風囊痒** 川椒杏仁研膏塗掌次卽收 同上 心合陰囊而卧甚効

指方 直 椒日氣味苦寒無毒 權曰苦辛 主治水腹脹滿利

小便 蘓恭治十二種水氣及腎虛耳卒鳴聾膀胱急

甄 權 **止氣喘** 震 豆菖蒲同碾細以松脂黃蠟溶和爲挺納耳

發明 權曰椒氣下達故椒日能治腎虛耳鳴用巴

豆菖蒲同碾細以松脂黃蠟溶和爲挺納耳

中抽之治腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒暴聾者一日一易神驗宗奭曰椒目治盜汗有功將目微炒碾細用半錢以生豬上唇煎湯一合睡時調服無不效蓋椒目能行水又治水蠱也
震亨曰諸喘不止用椒目炒碾二錢白湯調服二三服以上劫之後乃隨痰火用藥時珍曰椒目下達能行滲道不行殺道所以能下水燥濕定喘消蠱也

附方

新水氣腫滿 椒目炒搗如膏每酒 留飲腹痛
服方寸七 千金方

椒目二兩巴豆一兩去皮心熬搗以棗膏和丸麻子大每服二九吞下其痛即止○又方椒目十四枚巴豆一枚豉十六枚合搗為 痔漏腫痛 椒目一
二丸服之取吐利 肘後方 椒目炒碾細每温酒 撮碾細
空心水服三錢 崩中帶下 椒目炒碾細每温酒 撮碾細
如神 海上方 服一鈞 金匱鈞玄 眼
生黑花 年久不可治者椒目炒一兩蒼朮炒一兩 為末醋糊丸梧子大每服二十九醋湯下

○本 事方

葉氣味辛熱無毒 **主治**奔豚伏梁氣及內外腎鈞

并霍亂轉筋和艾及葱碾以醋拌罨之 大殺蟲洗

脚氣及漆瘡 時珍

根氣味辛熱微毒 **主治**腎與膀胱虛冷血淋色瘀

者煎湯細飲色鮮者勿服 時珍 出 證治要訣

崖椒 宋圖

釋名野椒

集解 頌曰施州一種崖椒葉大於蜀椒彼土人四季采皮入藥時珍曰此即俗名野椒也不甚

香而子灰色不黑無
光野人用炒雞鴨食

椒紅氣味辛熱無毒

思益時珍曰有毒

主治肺氣上喘兼

咳嗽并野薑為末酒服一錢七

蘇頌

蔓椒

本經下品

校正

自木部移入此

釋名豬椒

別錄

豕椒

別錄

彘椒

別錄

豨椒

弘景

狗椒

別錄

金椒

圖經時珍曰此椒蔓生氣臭如狗彘故得諸名

集解

別景曰蔓椒生雲中山谷及丘冢間采莖根似椒樞而小不香一名豨椒可以蒸病出汗時珍曰蔓椒野生林箐間枝軟如蔓子葉皆似椒山人亦食之爾雅云椒檉醜採謂其子叢生也陶氏所謂樛子當作採子諸椒之通稱非獨蔓椒也

實根莖氣味苦溫無毒主治風寒濕痺歷節疼除

四肢厥氣膝痛煎湯蒸浴取汁

本經

根主痔燒末服

并煮汁浸之

藏器

賊風孿急

孟詵

通身水腫用枝葉煎

如汁熬如飴狀每空心服一匙日三服

時珍○出千金

地椒

宋嘉祐

校正

自草部移入此

集解

禹錫曰地椒出上黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朵色紫白因舊莖而生時珍曰

地椒出北地即蔓椒之小者貼地生葉形小味微辛土人以煮羊肉食香美

實氣味辛溫有小毒主治淋瀝腫痛可作殺蛀蟲

藥

嘉祐

本草綱目卷三十一
附方 新牙痛 地花椒川芎薊尖等分為漢擦之海上名方

胡椒 唐本草 校正 自木部移入此

釋名 昧履支 時珍曰胡椒因其辛辣似椒故得椒名實非椒也

集解 恭曰胡椒生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣慎微曰按段成式酉陽雜俎云胡椒出摩伽陀國呼為昧履支其苗蔓生莖極柔弱葉長寸半有細條與葉齊條條結子兩兩相對其葉晨開暮合合則聚其子于葉中形似漢椒至辛辣六月采今食料用之 時珍曰胡椒今南番諸國及交趾滇南海南諸地皆有之蔓生附樹及作棚引之葉如扁豆山藥葦正月開黃白花結椒纍纍纏藤而生狀如梧桐子亦無核生青熟紅青者更辣四月熟五月采收曝乾乃皺今遍中國食品為日用之物也

實氣味 辛大温無毒 時珍曰辛熱純陽走氣助火昏目發瘡 均曰多食損肺令人

人生 血 主治 下氣温中去痰除臟腑中風冷 唐 去胃

口虛冷氣宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上

衝 李 調五臟壯腎氣治冷痢殺一切魚肉鼈蕈毒

大去胃寒吐水大腸寒滑 宗 暖腸胃除寒濕反胃

虛脹冷積陰毒牙齒浮熱作痛 時

發明 宗 奠曰胡椒去胃中寒痰食已則吐水甚驗大腸寒滑亦可用須以他藥佐之過劑則走

氣也 震亨曰胡椒屬火而性燥食之快膈喜之者眾積久則脾胃肺氣大傷凡病氣疾人益大其禍也牙齒痛必用胡椒葦荻者散其中浮熱也 時珍曰胡椒大辛熱純陽之物腸胃寒濕者宜之熱病

人食之動火傷氣陰受其害時珍自少嗜之歲歲
病日而不疑及也後漸知其弊遂痛絕之目病亦
止纔食一二粒即便昏澀此乃昔人所未試者蓋
辛走氣熱助火此物氣味俱厚故也病咽喉口齒
者亦宜忌之近醫每以綠豆同用治病有效蓋豆
寒椒熱陰陽配合得宜且以豆制椒毒也按張從
正儒門事親云噎膈之病或因酒得或因氣得或
因胃火醫氏不察火裏燒薑湯中煮桂丁香未已
荳蔻繼之華芩未已胡椒繼之雖曰和胃胃本不
寒雖曰補胃胃本不虛况三陽既結食必上潮止
宜湯丸小小潤之可也時珍竊謂此說雖是然亦
有食入反出無火之證又有痰氣鬱結得辛熱暫
開之證不可執一也

附方 舊二新 心腹冷痛 胡椒三匙 棗子酒吞之或
孟詵食療

心下大痛 壽域方用椒四十九粒乳香一錢研勻
男用生薑女用當歸酒下○又方用椒

五分沒藥三錢研細分二服溫酒下○又
方胡椒綠豆各四十九粒研爛酒下神效 **霍亂吐**

利 孫真人用胡椒三十粒以飲吞之○直指方用
胡椒四十九粒綠豆一百四十九粒研勻木瓜

湯服 **反胃吐食** 戴原禮方用胡椒醋浸日乾如此
一錢 七次為漢酒糊丸梧子大每服三

四十丸醋湯下○聖惠方用胡椒七錢半煨薑一
兩水煎分二服○是齋百一方用胡椒半夏湯泡

等分為漢薑汁糊丸梧子大 **夏月冷瀉** 及霍亂用胡椒
子大每薑湯下三十九丸 碾漢飯丸梧子

大每米飲下四十 **赤白下痢** 胡椒綠豆各一歲一
丸 衛生易簡方 粒為漢糊丸梧子大

紅用生薑白用米 **大小便閉** 關格不通脹悶二三
湯下 集簡方 日則殺人胡椒二十

一粒打碎水一盞煎六分去滓 **小兒虛脹** 塌氣丸
入芒硝半兩煎化服 總錄 用胡椒

一兩蠍尾半兩為漢麩糊丸粟米大每服五 **虛寒**
七丸陳米飲下一加萊蕪子半兩 錢乙方

積癖 在背膜之外流於兩脇氣逆喘急久則營衛凝滯潰為癰疽多致不救用胡椒二百五十

粒蠟尾四箇生木香二錢半為漢粟米飯丸綠豆大每服二十九橘皮湯下名磨積丸 濟生方

房勞陰毒 胡椒七粒葱心二寸半麝香一分擣爛以黃蠟溶和做成條子插入陰內少頃

汗出即愈 **驚風內釣** 胡椒木鱉子仁等分為末孫氏集効方 醋調黑豆末和杵丸綠豆

大每服三四十九 **發散寒邪** 胡椒丁香各七粒碾荆芥湯下 聖惠 碎以葱白擣膏和塗

兩手心合掌握定夾於大腿內 **傷寒欬逆** 側溫覆取汗則愈 傷寒蘊要 日夜不

攻胃也胡椒三十粒打碎麝香半 **風蟲牙痛** 錢酒一鍾煎半鍾熱服 聖惠方 易簡

方用胡椒葦炭等分為漢蠟丸麻子大每用一九塞蛙孔中○韓氏醫通治風虫客寒三般牙痛

吟不止用胡椒九粒綠豆十一粒布裹槌碎以絛綿包作一粒患處咬定涎出吐去立愈○普濟方

用胡椒一錢半以羊脂并打四十九粒擦之追涎 **阿伽陀丸** 治婦人血崩用

金茜根小檗皮等分為漢水丸梧子大每服二十丸阿膠湯下○時珍曰按西陽雜俎胡椒出摩伽

陀國此方之名 **沙石淋痛** 胡椒朴硝等分為末每因此而訛者也 服用二錢白湯下日二

名二物散 **蜈蚣咬傷** 胡椒嚼封之即不普濟方 多能郵事

畢澄茄 宋開寶 **校正** 自草部移入此

釋名毗陵茄子 時珍曰皆菴語也

集解 藏器曰畢澄茄生佛誓國狀似梧桐子及蔓荊子而微大○珣曰胡椒生南海諸國向陰者

為澄茄向陽者為胡椒按願微廣州志云澄茄生諸海國乃嫩胡椒也青時就樹采摘柄粗而帶圓

頰曰今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子微大八月九月采之○時珍曰海南諸菴皆

有之蔓生春開白花夏結黑實與胡椒一類二種正如大腹之與檳榔相近耳

修治 聖日凡采得去柄及皺皮了用酒浸蒸之從巳至酉杵細晒乾入藥用

實氣味辛溫無毒 功日辛王治下氣消食去皮膚

風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身

藏治 一切冷氣痰瀉并霍亂吐瀉肚腹痛腎氣膀胱冷

附方 新舊一脾胃虛弱胸膈不快不進飲食用畢澄

附方 新舊一脾胃虛弱胸膈不快不進飲食用畢澄

附方 新舊一脾胃虛弱胸膈不快不進飲食用畢澄

附方 新舊一脾胃虛弱胸膈不快不進飲食用畢澄

附方 新舊一脾胃虛弱胸膈不快不進飲食用畢澄

附方 新舊一脾胃虛弱胸膈不快不進飲食用畢澄

附方 新舊一脾胃虛弱胸膈不快不進飲食用畢澄

附方 新舊一脾胃虛弱胸膈不快不進飲食用畢澄

附方 新舊一脾胃虛弱胸膈不快不進飲食用畢澄

附錄 **山胡椒** 唐本草恭曰所在有之似胡椒色黑顆粒大如黑豆味辛大熱無毒主心

腹冷痛破滯氣俗用有效

吳茱萸 本經中品 **校正** 自木部移入此

釋名 藏器曰茱萸南北總有入藥以吳地者為好

黃有俞由二音

集解

別錄曰吳茱萸生上谷及冤句九月九日采
陰乾陳久者良頌曰今處處有之江淮蜀漢
猶多木高丈餘皮青綠色葉似椿而潤厚紫色三
月開紅紫細花七月八月結實似椒子嫩時微黃
至熟則深紫或云顆粒緊小經久色青綠者是吳
茱萸顆粒大經久色黃黑者是食茱萸恐亦不然
按周處風土記云俗尚九月九日謂之上九茱萸
到此日氣烈熟色赤可折其房以挿頭云辟惡氣
禦冬又續齊諧記云汝南桓景隨費長房學道長
房謂曰九月九日汝家有灾厄宜令急去各作絳
囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景
如其言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一時暴死
長房聞之曰此代之矣故人至此日登高飲酒戴
茱萸囊由此爾時珍曰茱萸枝柔而肥葉長而皺
其實結於稍頭纍纍成簇而無核與椒同一種
粗大一種粒小小者入藥為勝淮南萬畢術云井
上宜種茱萸葉落井中人飲其水無瘟疫懸其子
於屋辟鬼魅五行志云合東種白楊茱萸增年除

害

修治

數日凡使去葉梗每十兩以鹽二兩投東流
水四斗中分作一百度洗之自然無涎日乾
入丸散用之若用醋煮者每十兩用醋一盞煮三
十沸後入茱萸熬乾用宗奭曰凡用吳茱萸須深
湯中浸去苦烈汁七次始可焙用
氣味辛溫有小毒權曰辛苦大
日辛苦熱氣味俱厚陽中陰也半浮半沉入足太
陰經血分少陰厥陰經氣分思邈曰陳久者良閉
口者有毒多食傷神令人起伏氣咽喉不通時珍
日辛熱走氣動火昏目發瘡之才曰萸實為之
使惡丹參消石白堊畏紫石英
主治溫中下氣止痛除濕血痺逐

風邪開腠理欬逆寒熱

本經

利五臟去痰冷逆氣飲

食不消心腹諸冷絞痛中惡心腹痛

別錄

霍亂轉筋

胃冷吐瀉腹痛產後心痛治遍身癢痺刺痛腰脚

軟弱利大腸壅氣腸風痔疾殺三蟲甄權殺惡蟲毒

牙齒蟲蠱鬼魅疰氣藏器下產後餘血治腎氣脚氣

水腫通關節起陽健脾大明主痢止瀉厚腸胃肥健

人孟詵治痞滿寒胃咽膈不通潤肝燥脾好古開鬱化

滯治吞酸厥陰痰涎頭痛陰毒腹痛疝氣血痢喉

舌口瘡時珍

發明頌曰段成式言椒氣好下茱萸氣好上言其

也宗奭曰此物下氣最速腸虛人服之愈甚元素曰氣味俱厚浮而降陽中陰也其用有三去胸中

逆氣滿塞止心腹感寒疴痛消宿酒為白豆蔻之

使也杲曰濁陰不降厥氣上逆咽膈不通食則令

人口開日登陰寒隔塞氣不得上下此病不已令

人寒中腹滿膨脹下利宜以吳茱萸之苦熱泄其

逆氣用之如神諸藥不可代也不宜多用恐損元

氣好古曰衝脉為病逆氣裏急宜此主之震坤合

見其色綠故仲景吳茱萸湯當歸四逆湯方治厥

陰病及溫脾胃皆用此也時珍曰茱萸辛熱能散

能溫苦熱能燥能堅故其所治之症皆取其散寒

溫中燥溼解鬱之功而已案朱氏集驗方云中丞
常子正苦寒飲每食飽或陰晴節變率同十日一
發頭疼背寒嘔吐酸汁即數日伏枕不食服藥罔
效宣和初為順昌司祿于太守蔡達道席上得吳
仙丹方服之遂不再作每遇飲食過多腹滿服五
七十九便已少頃小便作茱萸氣酒飲皆隨小水
而去前後痰藥甚眾無及此者用吳茱萸湯泡七
次茯苓等分為末煉蜜丸梧子大每熟水下五十
丸梅楊柳方只用茱萸酒浸三宿以茯苓末拌之

日乾每吞百粒温酒下又咽喉口舌生瘡者以茱
莫末醋調貼兩足心移夜便愈其性雖熱而能引
熱下行蓋亦從治之義而謂茱萸之性上行不下
者似不然也 有人治小兒痘瘡口噤者齧茱萸一

二粒拌之即開
亦取其辛散耳

附方 舊二十五 風癢痒痺 茱萸一升酒五升煮取
新二十一 孟詵 賊風口偏 不能語者茱萸一升薑豉三升清

食療 日三服得少汗 冬月感寒 湯服之取汗 頭風作
即瘥 同上

痛 茱萸煎濃湯以綿染頻 嘔涎頭痛 吳茱萸湯用
拭髮根良 千金翼方

二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升 嘔吐胸
煎取三升每服七合日三服 仲景方

滿 方同 脚氣冲心 吳茱萸生薑橘汁 腎氣上臧 腎
上 飲甚良 孟詵方

自腹中起上築于咽喉逆氣連属而不能出或至
數十聲上下不得喘息此由寒傷胃院腎虛氣逆
上乘于胃與氣相併難經謂之噦素問云病深者
其聲噦宜服此方如不止灸期門關元腎俞穴用
吳茱萸醋炒熱橘皮附子去皮各一兩為末麩
糊丸梧子大每薑湯下七十九 孫氏仁存方 陰

毒傷寒 四肢逆冷用茱萸一升酒拌溼絹袋二箇
包蒸極熱更互熨足心候氣透痛亦即止

累有效 聖惠方 中惡心痛 吳茱萸五合酒三升煮
沸分三服 楊氏產乳 心腹

冷痛 方同上 冷氣腹痛 吳茱萸二錢搗爛以酒一
煎熱傾茶酒入鍋煎一滾 鍾調之用香油一盃入鍋

取服立止 唐珣經驗方 脾元氣痛 發歇不可忍
用茱萸一兩

茱萸一兩和炒茱萸去茱萸仁去皮尖 寒痲往
研細葱白三莖煨熟酒浸温服 經驗方

來 吳茱萸一兩生薑半兩清酒 小腸疝氣 奪命丹
一升煎温分服 用後方 治遠年

小腸疝氣 奪命丹 治遠年

小腸疝氣 奪命丹 治遠年

小腸疝氣 奪命丹 治遠年

小腸疝氣 奪命丹 治遠年

近日小腸疝氣偏墜掣疼臍下撮痛以致悶亂及
 外腎腫硬日漸滋長及陰間淫痒成瘡用吳茱萸
 去梗一斤分作四分四兩酒浸四兩醋浸四兩湯
 浸四兩童子小便浸一宿同焙乾澤瀉二兩為末
 酒糊丸梧子大每服五十九空心和劑局方
 小兒腎

酒吞下如宜方各星斗丸
 乃初生受寒所致用吳茱萸硫黃各半兩同大
 蒜研塗其腹仍以蛇牀子烟熏之
 聖惠方

婦人陰寒
 十年無子者用吳茱萸川椒各一升為
 末煉蜜丸彈子大綿裹內陰中日再易

之但子宮開即有
 子也
 經心錄
 子腸脫出
 茱萸三升酒五升煎

手醋心上攻
 如濃酸用茱萸一合水三盞煎七分
 頓服近有人心如蜚破服此二十年

不發也累用
 食已吞酸
 胃氣虛冷者吳茱萸湯泡
 有
 效
 同上

湯服一錢
 聖惠方
 轉筋入腹
 茱萸炒二兩酒二盞煎一盞
 分二服得下即安
 聖濟錄

霍亂乾嘔
 不止吳茱萸泡炒乾薑炮
 等分水煎服之
 多年脾泄
 人老

多此謂之
 水土同化吳茱萸三錢炮過人水煎汁
 入鹽少許通口服蓋茱萸能暖膀胱水道既清大

腸自固他藥雖熱不能分
 臟寒泄瀉
 倦怠減食吳
 解清濁也
 孫氏仁存方

炒猪臟半條去脂洗淨裝滿紫定文火煮熟擣
 元梧子大每服五十九米飲下日二服
 普濟

痢不止
 方同
 下痢水泄
 吳茱萸泡炒黃連炒各二
 錢水煎服未止再服
 聖

惠
 赤白下痢
 和劑局方
 戊巳丸治脾胃受溼下痢
 腹痛米穀不化用吳茱萸黃連白芍

藥各一兩同炒為末蒸餅丸梧子大每服二三十
 丸米飲下
 百一選方變通丸治赤白痢日夜無

度及腸風下血用川黃連二兩吳茱萸二兩湯泡
 七次同炒香揀出各自為末粟米飯丸梧子大另

收每服三十九赤痢甘草湯下黃連丸白痢乾薑
 湯下茱萸丸赤白痢各用于五丸米湯下此乃浙

西河山純老以傳蘇韜光者救人甚効○鄧筆峯

襍與方二色丸治痢及水泄腸風用吳茱萸二兩

黃連二兩同炒香各自為末以百草霜末二兩同

黃連作丸以白芍藥末二兩同茱萸作丸各用飯

丸梧子大各收每服五十九丸赤痢烏梅湯下

連霜白痢米飲下茱萸丸赤白痢各半服之

赤痢 茱萸合黑豆湯 下部痒痛如虫咬

臍痛 吞之 千金方 腸痔常血 者掘地作坑燒赤

以酒沃之 檇茱萸二升入坑乘熱坐有孔

板熏之冷乃下不過三四度愈 肘後方 **腹中瘕**

塊 茱萸三升檇和酒煮熟布裹熨瘕上冷更炒熱

更番熨之瘕移走逐熨之消乃止 姚僧坦集

驗 產後盜汗 薑膏惡寒茱萸一雞子大酒

方 三升漬半日煮服 千金翼 **口瘡口**

疳 茱萸末醋調塗足心 咽喉作痛 方同

朱萸煎酒含漱 小兒頭瘡 吳茱萸炒焦為末入承

之 孟詵本草 粉少許猪脂醋調塗之

聖方 小兒瘰癧 一名火灼瘡 一名火爛瘡 茱萸

風疹 方同上 瘰癧發背 及發乳諸毒用吳茱萸一

上貼之 陰下濕痒 吳茱萸煎湯頻 骨在肉中 不

外臺秘要 者咀茱萸封之骨當 魚骨入腹 刺痛不得出者吳

腐出 孟詵食療 蛇咬毒瘡 川吳茱萸一兩為末

服其骨必軟出未 蛇咬毒瘡 冷水和作三服立安

出再服 同上 並用吳茱萸鹽淹過炒研 寒熱怪

金方 肩疽白禿 醋和塗之 活幼口議 病 寒熱不止數日四肢堅如石繫之信鐘磬聲日

漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲之愈 夏子 葉氣味辛苦熱無毒 主治 霍亂下氣止心腹痛冷

氣內外腎鈞痛盭碾菴之神驗乾即易轉筋者同
艾壽以醋和菴之明大治大寒犯腦頭痛以酒拌葉
袋盛蒸熟更互枕熨之痛止為度時珍

枝主治大小便卒關格不通取南行枝如手第二

指中節含之立下蘇頌○出姚僧坦集驗方

根及白皮氣味同葉主治殺三蟲本蟻蟲治喉痺欬

逆止洩注食不消女子經產餘血療白癬殺牙

齒蟲止痛藏器治中惡腹中刺痛下痢不禁療漆瘡

甄權

附方舊二寸白蟲洗去土四寸切以水酒各一升

漬一宿平旦分再服肝勞生蟲眼中赤脉吳茱萸

當取虫下千金方根為末一兩半粳

米半合雞子白三箇化蠟一兩半和丸脾勞發熱

小豆大每米湯下三十九當取虫下

有虫在脾中為病令人好嘔者取東行茱萸根大

者一尺大春子八升橘皮二兩三物咬咀以酒一

斗浸一宿微火薄暖之絞去滓平旦空腹服一升

取虫下或死或半爛或下黃汁凡作藥時切忌言

語腎熱肢腫拘急茱萸根一合半桑白皮三

方濟合酒二升煮一升日二服普

食茱萸唐本校正自木部移入此

釋名殺音殺音艾子圖越椒轉樵子拾辣子弘景

記名藜而俗中呼為櫟子當是不識藜字也恭曰爾雅云椒櫟醜椹陸机詩疏云椒櫟屬也並有櫟名陶詭誤矣時珍曰此即櫟子也蜀人呼為艾子楚人呼為辣子古人謂之藜及櫟子因其辛辣蜇口慘腹使人有殺藜黨然之狀故有諸名藜藜謂菜藜之開口者為食菜藜之閉口者為櫟子馬志謂粒大色黃黑者為食菜藜粒緊小色青綠者為吳菜藜陳藏器謂吳食二菜藜是一物入藥以吳地者為良不當重出此條只可言漢與吳不可言食與不食時珍竊謂數說皆因菜藜二字相混致誤耳不知吳菜食菜乃一類二種菜黃取吳地者入藥故名矣菜藜櫟子則形味似菜黃惟可食用故名食菜藜也陳藏器不知食菜藜即櫟子重出櫟子一條正自誤矣按曹憲博雅云櫟子越椒菜藜也鄭樵通志云櫟子一名食菜藜以別吳菜藜禮記三牲用藜是食菜藜也二說足正諸人之謬

集解

藏器曰櫟子出閩中江東其木高大似樗莖以寄遠吳越春秋云越以其密在櫟報吳增封之禮則櫟之相贈尚矣頌曰食菜藜南其皆有之其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青黃上有小白

黑葉類油麻其花黃色蜀人呼為艾子禮記所謂藜者是也藜艾聲相近也宜入食羹中能發辛香時珍曰食菜藜櫟子辣子一物也高木長葉黃花綠子叢簇枝上味辛而苦土人八月采搗濾取汁入石灰攪成名曰艾油亦曰辣米油始辛辣蜇口入食物中用周處風土記以椒櫟薑為三香則自古尚之矣而今貴人罕用之

實氣味

辛苦大熱無毒時珍曰有小毒動脾火病目者忌之頌曰發瘡痔浮

腫虛恚之才

主治功同吳菜藜力少劣爾療水氣

用之佳

蒸心腹冷氣痛中惡除欬逆去臟腑冷温

本草綱目身音

卷三十一

中甚良

孟 療蠱毒飛尸着喉口者刺破以子搯之

令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消

殺腥物

藏器

治冷痢帶下暖胃燥濕

時珍

附方

新

赤白帶下

樵子石苜蒲等分爲末每旦以鹽酒溫服二錢 經驗方

瀉虛痢

腹痛者樵子丸治之樵子肉豆蔻各一兩陳米一兩半以米一分同二味炒黃爲末

一分生礬爲末粟米粥丸梧子大每陳米飲下五十九日三服 普濟方

鹽麩子

開寶

校正

自木部移入此

釋名

五構

鹽膚子

綱目

鹽梅子

同

鹽椀子

同

木鹽

通天鹽

靈草

叛奴鹽

拾遺

酸桶

拾遺藏器曰蜀人謂之酸桶亦曰酢桶吳

人謂之鹽麩戎人謂之木鹽時珍曰其味酸鹹故

有諸名山海經云橐山多構木郭璞注云構木出

蜀中七八月吐穗成時如有鹽粉可

以酢羹卽此也後人譌爲五倍矣

集解 子成穗粒如小豆上有鹽似雪可爲羹用嶺

南人取子爲末食之酸鹹止渴將以防瘴時珍曰

膚木卽構木東南山原甚多木狀如椿其葉兩兩

對生長而有齒面青背白有細毛味酸正葉之下

節節兩邊有直葉貼莖如箭羽狀五六月開花青

黃色成穗一枝纍纍七月結子大如細豆而扁生

青熟微紫色其核淡綠狀如腎形核外薄皮上有

薄蓋小兒食之滇蜀人采爲木鹽葉上有虫結成

五倍子八月取之詳見虫部後魏書云勿吉國水

氣鹹凝塩生樹上卽此物也別有成

平樹鹹草酸角皆其類也附見于左

附錄 咸平樹 真臘國人不能爲酸但用

酸角 雲南臨安

諸處有之狀如猪牙皂
味鹹彼人食之
扶桑東有女國產鹹
草葉似邪蒿而氣香

子氣味酸鹹微寒無毒
鹽霜制 汞硫
主治除痰飲瘴瘧

喉中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行

寒熱咳嗽變白生毛髮去頭上白屑壽末服之
歲

生津降火化痰潤肺滋腎消毒止痢收汗治風濕

眼病
時珍

發明時珍曰鹽麩子氣寒味酸而鹹陰中之陰也
鹹能爽而潤故降火化痰消毒酸能收而澀

故生津潤肺止痢腎主五液入肺為痰人脾為涎
人心為汗入肝為淚自入為唾其本皆水也鹽麩

五倍先走腎肝有救水之功所以痰濕
盜汗風濕下淚涕唾之證皆宜用之

樹白皮主治破血止血蠱毒血痢殺蛇蟲并煎驅

之
開寶

根白皮主治酒疸壽碎米泔浸一宿平旦空腹温

服一二升
開寶 諸骨鯁以醋煎濃汁時呷之
時珍

發明時珍曰按本草集議云鹽麩子根能軟雞骨
岑公云有人被雞骨哽項腫可畏用此根煎

醋燉至三枕便吐出也又彭醫官治骨哽以此根
壽爛入鹽少許綿裹以線繫定吞之牽引上下亦

鈞出
骨也

醋林子
經圖

校正
自外類 移入此

釋名 時珍曰以

集解 頌曰醋林子生四川邛州山野林箐中木高丈餘枝葉繁茂三月開白花四出九月十月

子熟纍纍數十枚成朶生青熟赤畧類櫻桃而蒂短熟時采之陰乾連核用土人以鹽醋收藏充果食其葉味醋夷獠人采得入鹽和魚鮓食云勝用醋也

實氣味酸温無毒主治久痢不瘥及痔漏下血妙

咬心痛小兒疳蚘心痛脹滿黃瘦下寸白蟲單禱

為末酒服一錢七甚效鹽醋藏者食之生津液醒

酒止渴多食令人口舌粗拆也

茗 唐本草

校正 自木部移入此

釋名 苦楛

楛途二音 唐本

楛 爾雅

設

音 苻

音外頌曰郭璞云早采為茶晚

采為茗一名苻蜀人謂之苦茶陸羽云其名有五

一茶二楛三設四茗五苻時珍曰楊慎月鉛錄云

茶即古茶字音途詩云誰謂茶苦其甘如薺是也

顏師古云漢時茶陵始轉途音為宅加切或言六

經無茶字 未深致耳

集解 神農食經曰茶茗生益州及山陵道旁凌冬

谷爾雅云楛苦茶郭璞註云樹小似卮子冬生葉

可煮作羹飲頌曰今閩浙蜀江湖淮南山中皆有之通謂之茶春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可飲與古所食殊不同也陸羽茶經云茶者南方嘉木自一尺二尺至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如瓜蘆葉如卮子花如白薔薇實如栝欄莘如丁香根如胡桃其上者生爛石中者生樂壤下者生黃土藝法如種瓜三歲可采

陽岸陰林紫者上綠者次筍者上芽者次葉卷者
上筍者次在二月三月四月之間茶之筍者生于
爛石之間長四五寸若蕨之始抽凌露采之茶之
芽者發于叢薄之上有三枝四枝五枝於枝顛采
之采得蒸焙封乾有干類萬狀也畧而言之如胡
人靴者蹙縮然如犂牛鹿者煎沽然出山者輪困
然拂水者涵澹然皆茶之精好者也如竹籜如霜
荷皆茶之瘠老者也其別者有名南芽枸杞芽棍
杞葉皆治風疾又有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘
其芽和茶作之故今南人輪官茶往往雜以衆葉
惟茅蘆竹筍之類不可入自餘山中草木芽葉皆
可和合椿柿尤奇真茶性冷惟雅州蒙山出者温
而主疾毛文錫茶譜云蒙山有五頂上有茶園其
中頂曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老父謂
曰蒙之中頂茶當以春分之先後多聚人力俟雷
發聲併手采擇三日而止若獲一兩以木處水煎
服即能祛宿疾二兩當眼前無疾三兩能固肌骨
四兩即為地仙矣其僧如說獲一兩餘服之未盡

而疾瘳其四頂茶園采摘不廢惟中峯草木繁密
雲霧蔽虧驚獸時出故人跡不到矣近歲稍貴此
品製作亦精于他處陳承曰近世蔡襄述蜀茶極
備惟建州北苑數處產者性味與諸方畧不同今
亦獨名蠟茶上供御用碾治作餅日曬得火愈良
其他者或為芽或為末收貯若微見火便硬不可
久收色味俱敗惟鼎州一種芽茶性味畧類建茶
今汴中及河北京西等處磨為末亦冒蠟茶者是
也宗奭曰苦茶即今茶也陸羽有茶經了謂有北
苑茶錄毛文錫有茶譜蔡宗顏有茶對皆甚詳然
古人謂茶為雀舌麥顆言其至嫩也又有新芽一
發便長寸餘其粗如針最為上品其根餘水土力
皆有餘故也雀舌麥顆又在下品前人未知爾時
珍曰茶有野生種生種者用子其子大如指頂正
圓黑色其仁入口初甘後苦最戟人喉而閩人以
榨油食用二月下種一坎須百顆乃生一株蓋空
畧者多故也畏水與日最宜坡地蔭處清明前采
者上穀雨前者次之此後皆老茗爾采蒸揉焙修

造皆有法詳見茶譜茶之稅始于唐德宗盛于宋
元及于我朝乃與西番互市易馬夫茶一木爾下
為民生日用之資上為朝廷賦稅之助其利博哉
昔賢所稱大約謂唐人尚茶茶品益眾有雅州之
蒙頂石花露芽穀芽為第一建寧之北苑龍鳳團
為上供蜀之茶則有東川之神泉獸目硤州之碧
潤明月夔州之真香邛州之火井思安黔陽之都
濡嘉定之峨眉瀘州之納溪玉壘之沙坪楚之茶
則有荆州之仙人掌湖南之白露長沙之鐵色蘄
州蕪門之團面壽州霍山之黃芽廬州之六安英
山武昌之樊山岳州之巴陵辰州之淑浦湖南之
賣慶茶陵吳越之茶則有湖州顧渚之紫筍福州
方山之生芽洪州之白露雙井之白毛廬山之雲
霧常州之陽羨池州之九華丫山之陽坡袁州之
界橋睦州之鳩坑宣州之陽坑金華之舉岩會稽
之日鑄皆產茶有名者其他猶多而猥雜更甚按
海隱居註苦茶云西陽武昌廬江晉陵皆有好茗
飲之宜人凡所飲物有茗及木葉天門冬苗菽莢

葉皆益人餘物並冷利又巴東縣有真茶火編作
卷結為飲亦令人不眠俗中多煮檀葉及大皂李
葉作茶飲並冷利南方有瓜盧木亦似茗也今人
采楮櫟山檉南獨烏燕諸葉皆可為飲以亂茶云
葉氣味苦甘微寒無毒藏器曰苦寒又食令人瘦
去人脂使人不睡飲之宜

熱冷則聚痰胡洽曰與樞同食令人身重李廷飛
曰大渴及酒後飲茶水入腎經令人腰脚膀胱冷
痛兼患水腫攣痺諸疾大抵飲茶宜熱宜少不飲
尤佳空腹最忌之時珍曰服威靈仙土茯苓者忌
飲王治癭瘡利小便去痰熱止渴令人少睡有力

悅志神農食經下氣消食作飲加茶萹蔥薑良蕪恭破熱

氣除瘴氣利大小腸藏器清頭目治中風昏憤多睡

不醒好古治傷暑合醋治泄痢甚效陳承炒煎飲治熱

毒赤白痢同芎藭葱白煎飲止頭痛吳濃煎吐風

熱痰涎時珍

發明好古曰茗茶氣寒味苦入手足厥陰經治陰

相似經云苦以泄之其體下行所以能清頭目穉

雖昏而氣則薄乃陰中之陽可升可降利頭目蓋

本諸此注頴曰一人好燒鴛炙燻日常不缺人咸

防其生癰疽後卒不病訪知其人每夜必啜涼茶

一椀乃知茶能解炙燻之毒也楊士瀛曰薑茶治

痢薑助陽茶助陰並能消暑解酒食毒且一寒一

熱調平陰陽不問赤白冷熱用之皆良生薑細切

與真茶等分新水濃煎服之蘇東坡以此治文潞

公有效時珍曰茶苦而寒陰中之陰沉也降也景

虛實若少壯胃健之人心肺脾胃之火多盛故與

茶相宜溫飲則火因寒氣而下降熱飲則茶借火

氣而升散又兼解酒食之毒使人神思闊爽不昏

不睡此茶之功也若虛寒及血弱之人飲之既久

則脾胃惡寒元氣暗損土不制水精血潛虛成癆

飲成痞脹成痿痺成黃瘦成嘔逆成洞瀉成腹癆

成疝瘕種種內傷此茶之害也民生日用蹈其弊

者往往皆是而婦嫗受害更多習俗移人自不覺

爾况真茶既少雜茶更多其為患也又可勝言哉

人有嗜茶成癖者時時咀噉不止久而傷營傷精

血不華色黃瘁痿弱抱病不悔尤可嘆惋晉于寶

搜神記載武官周時病後啜茗一斛二升乃止纔

減升合便為不足有客令更進五升忽吐一物狀

如牛腓而有口澆之以茗盡一斛二升再澆五升

即滿出矣人遂謂之斛茗瘕嗜茶者觀此可以戒

矣陶隱居雜錄言丹丘子黃山君服茶輕身換骨

壺公食忌言苦茶久食羽化者皆方士謬言誤世

者也按唐補闕毋臧茶序云釋滯消壅一日之利

暫佳瘡氣侵精終身之累斯大獲益則功歸茶力
貽患則不謂茶矣豈非福近易知禍遠難見乎又
宋學士蘇軾茶說云除煩去膩世故不可無茶然
持中損人不少空心飲茶入盞直入腎經且冷脾
胃乃引賊入室也惟飲食後濃茶漱口既去煩賦
而脾胃不知且苦能堅齒消蠹深得飲茶之妙古
人呼茗為酪奴亦賤之也時珍早年氣盛每飲新
茗必至數椀輕汗發而肌膚清頗覺痛快中年胃
氣稍損飲之即覺為害不痞悶嘔惡即腹冷洞泄
故備述諸說以警同好焉又濃茶能令人吐乃酸
苦涌泄為陰之義
非其性能升也

附方 舊六新 氣虛頭痛 用上春茶末調成膏置瓦
蓋內覆轉以巴豆四十粒

作二次燒烟熏之晒乾乳細每服一字別
入好茶末食後煎服立效 醫方大成 熱毒下

痢 孟詵曰赤白下痢以好茶一斤炙搗末濃煎一
二盞服久患痢者亦宜服之○有指用臘茶赤

痢以蜜水煎服白痢以連皮自然薑汁同水煎服
二三服即愈○經驗良方用蠟茶二錢湯點七分

入麻油一蜆殼和服須臾腹痛大下即止一少年
用之有效○一方蠟茶末以白梅肉和丸赤痢甘

草湯下白痢烏梅湯下各百丸 大便下血 榮衛氣
○一方建茶合醋煎熱服即止 虛或受

風邪或食生冷或啖炙博或飲食過度積熱腸間
使脾胃受傷糟粕不聚大便下利清血臍腹作痛

裏急後重及酒毒一切下血並皆治之川細茶半
斤碾末川百藥煎五箇燒存性每服二錢米飲下

日二服 產後秘塞 以蒸涎調蠟茶末丸百丸茶
善濟方 服自通不可用大黃利藥利

者百無一生 久年心痛 十年五年者煎湖茶以
郭稽中婦人方 煎茶五合投醋二合 嗜茶成癖 一

部手 腰痛難轉 顛服 孟詵食療 病此一方士令以新鞋盛茶令滿任意食盡再盛
一鞋如此三度自不喫也男用女鞋女用男鞋用

之果愈也
集簡方
解諸中毒
芽茶白礬等分碾末
冷水調下
痘瘡作

房中宜燒茶
陰囊生瘡
用蠟面茶為末先以甘
草湯洗後貼之妙
經

驗方
脚極濕爛
茶葉嚼爛傳之
蠅虻尿瘡
初如糝粟
漸大如豆

更夫如火烙漿炮疼痛至甚者速以草茶并蠟
茶俱可以生油調傳藥至痛乃止
勝金方
風

痰顛疾
茶芽庵子各一兩煎濃汁一
霍亂煩悶
茶

一錢煎水調乾薑末一錢
服之即安
聖濟總錄
月水不通
茶清一瓶入
沙糖少許露

一夜服雖三箇月胎亦
通不可輕視
鮑氏
痰喘欬嗽
不能睡卧好末
茶一兩白僵蠶

一兩為末放盆內蓋定傾沸湯一小
盞臨卧再添湯點服
瑞竹堂方

茶子氣味苦寒有毒
主治喘急欬嗽去痰垢禱仁

洗衣除油膩
時珍

附方
新上氣喘急
時有欬嗽茶子百合等分為末
蜜左梧子大每服七丸新汲水

下聖
喘嗽齁齶
不拘大人小兒用糯米泔少許
磨茶子滴入鼻中令吸入服

之口咬竹筒少頃涎出如線不過
二三次絕根屢驗
經驗良方
頭腦鳴響
狀如
虫蛀

名大白蟻以茶子為末吹入
鼻中取効
楊拱鑿方摘要

臯蘆
拾遺
校正
自木部
移入此

釋名瓜蘆
弘景
苦菴
藏器曰南越志云龍川縣有菓
蘆一名瓜蘆葉似茗主人謂之

過羅或曰物
羅皆夷語也

集解
弘景
苦菜註曰南方有瓜蘆亦似茗苦摘取
其葉作屑煮飲即通
夜不睡者蓋人惟資此

飲而交廣最所重客來先設乃加以香茗之物李
〔詢曰〕按此木即臯蘆也生南海諸山中葉似茗而
大味苦澀出新平縣南人取作茗飲極重之如蜀
人飲茶也〔時珍曰〕臯蘆葉狀如茗而大如手掌按
碎泡飲最苦而色濁風味比茶不
及遠矣今廣人用之名曰苦蒼

葉氣味苦平無毒〔時珍曰〕寒胃〔主治〕煮飲止渴明

目除煩令人不睡消痰利水〔藏器〕通小腸治淋止頭

痛煩熱李噙嚙清上膈利咽喉時珍

本草綱目果部三十二卷終

本草綱目果部目錄第三十三卷

○果之五 瓜類九種

甜瓜嘉祐西瓜日用葡萄本經蔓蕪綱目即野葡萄

彌猴桃開寶甘蔗別錄沙糖唐本

石蜜唐本刺蜜拾遺

右附方舊十二新四十

○果之六 水果類六種 附錄二十三種

蓮藕本經紅白蓮花拾遺芡實別錄

芡實本經烏芋別錄慈姑日華

○附錄諸果 綱目三十一種拾遺一種

津符子 必思荅 甘劍子 楊搖子

海梧子 木竹子 櫓咭子 羅晃子

槿子 夫編子 白緣子 繫彌子

人面子 黃皮果 四味果 千歲子

候騷子 酒杯藤子 藺子 山棗

隈支 靈牀上果子

諸果有毒 拾遺

右附方舊十五新六十三

○互考

楮實 梧桐子 枸杞子 金櫻子

山茱萸 桑椹 木半夏 胡頹子

松花 桂花 櫟實 已上果部

黃精 葳蕤 已上 蒲黃

菰首 菟醬 豆蔻 益智子

使君子 燕覆子 蓬蘽 覆盆子

本草綱目果部第三十三卷

果之五

蒹類九種

甜瓜 宋嘉祐

校正 自菜部移入此併入本經瓜蒂

釋名 甘瓜 唐本 果瓜 時珍曰瓜字篆文象瓜在鬚蔓間之形甜瓜之味甜于諸瓜故

獨得甘甜之稱舊列菜部誤矣按王積云瓜類不同其用有二供果者為果瓜甜瓜西瓜是也供菜者為菜瓜胡瓜越瓜是也 在木曰果在地曰蒹大曰瓜小曰瓠其子曰瓠其肉曰瓠其跗曰環謂脫花處也其蒂曰壺謂繫蔓處也禮記為天子剖瓜及瓜祭皆指果瓜也本草瓜蒂亦此瓜之蒂也

集解 別錄曰瓜蒂生高高平澤七月七日采陰乾瓜蒂即甜瓜蒂也處處有之園圃所蒔

有青白二種子色皆黃入藥當用早青瓜蒂為良時珍曰甜瓜北土中州種蒔甚多二三月下種延

蔓而生葉大數寸五六月花開黃色六七月瓜熟其類最繁有團有長有尖有扁大或徑尺小或一捻其稜或有或無其色或青或綠或黃斑斑或白路黃路其瓢或白或紅其子或黃或赤或白或黑按王禎農書云瓜品甚多不可枚舉以狀得名則有龍肝虎掌兔頭狸首羊髓蜜筒之稱以色得名則有烏瓜白團黃瓠白瓠小青大斑之別然其味不出乎甘香而已廣志惟以遼東燉煌廬江之瓜為勝然瓜州之大瓜陽城之御瓜西蜀之温瓜永嘉之寒瓜未可以優劣論也甘肅甜瓜皮瓢皆甘勝饒蜜其皮暴甘猶美浙中一種陰瓜種于陰處熟則色黃如金膚皮稍厚藏之至春食之如新此皆種藝之功不必拘以土地也甜瓜子曝裂取仁可充果食凡瓜最畏麝氣觸之甚至一蒂不收

瓜瓢氣味甘寒滑有小毒
大明曰無毒思邈曰多食發黃疸令人虛羸多忘解藥力病後食多或反胃脚氣人食之患永不除也說曰多食令人陰下濕痒生瘡動宿令癢

病破腹發虛熱令人憊憊氣弱脚手無力少食則可龍魚河圖云凡瓜有兩鼻兩鼻者殺人五月瓜沉水者食之得冷病終身不瘥九月被霜者食之冬病寒熱與油餅同食發病○多食瓜作脹者食鹽花即化弘景曰食瓜多即入水日漬便消時珍曰張華博物志言人以冷水漬至膝可頓啖瓜至數十枚漬至項其啖轉多水皆作瓜氣也則水浸消瓜亦物性也瓜最忌麝與酒凡食瓜過多但飲酒及水服麝香丸

主治 止渴除煩熱利小便通三

焦間壅塞氣治口鼻瘡
嘉祐 暑月食之永不中暑宗奭

發明
宗奭曰甜瓜雖解暑氣而性冷消損陽氣多食未有利者夏月多食深秋作痢最為難治惟以皮蜜浸收之良皮亦可作羹食弘景曰凡瓜皆冷利早青者尤甚熟瓜除瓢食之不害人時珍曰瓜性最寒曝而食之尤冷故稽聖賦云瓜寒於曝油冷於煎此物性之異也王冀洛都賦云

瓜則消暑蕩滯解渴療飢又奇効良方云昔有男子病膿血惡痢痛不可忍以水浸甜瓜食數枚即愈此亦消暑之驗也

瓜子仁修治數日凡收得曝乾杵細馬尾篩篩過成粉以紙三重裹壓去油用不去油其方短也西氣味甘寒無毒瓜子仁同主治腹內納聚破潰

膿血最爲腸胃脾內壅要藥別錄止月經太過研末去油水調服藏器○炮炙論序曰血泛經過飲調瓜子炒食補中宜人

孟詵清肺潤腸和中止渴時珍

附方舊一口臭用甜瓜子杵末蜜和爲丸每旦漱新二口後含一丸亦可貼齒千金

腰腿疼痛甜瓜子三兩酒浸十日爲末每服三錢空心酒下日三壽域神方腸癰

已成小腹腫痛小便似淋或大便難澀下膿用甜瓜子一合當歸炒兩蛇退皮一條咬咀每

服四錢水一盞半煎一盞食前服利下惡物爲妙聖惠

瓜蒂本經釋名瓜丁千金苦丁香象形修治數日凡使

蒂要取青綠色瓜氣足時其蒂自然落在蔓上采得繫屋東有風處吹乾用宗奭曰此甜瓜蒂也去瓜皮用蒂約半寸許曝曝乾臨時研用時珍曰按唐瑜云甜瓜蒂以團而每瓜團瓜者良若香甜瓜及長如瓠子者皆供菜之瓜其蒂不可用也氣味苦寒有毒大明曰主

治大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及

食諸果病在胸腹中皆吐下之本經去鼻中瘰肉療

黃疸別錄治腦寒熱癰眼昏吐痰大明吐風熱痰涎治

風眩頭痛癩癩喉痺頭目有濕氣時得麝香細辛

治鼻不聞香臭好

發明張機曰病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微

中有寒也當吐之太陽中身熱頭痛而脉微弱

此夏月傷冷水水行皮中也宜吐之少陽病頭痛

發寒熱脉緊不大是膈上有痰也宜吐之病胸上

諸實鬱鬱而痛不能食欲人按之而反有濁唾下

利日十餘行寸口脉微茲者當吐之懊濃煩躁不

得眠未經汗下者謂之實煩當吐之宿食在上腕

者當吐之並宜以瓜蒂散主之惟諸亡血虛家不

可與瓜蒂散也成無已曰高者越之在上者涌之

故越以瓜蒂香豉之苦涌以赤小豆之酸酸苦涌

泄為陰也果曰難經云上部有脉下部無脉其人

當吐不吐者死此飲食內傷填塞胸中食傷太陰

風木生發之氣伏于下宜瓜蒂散吐之素問所謂

木鬱則達之也吐去上焦有形之物則木得舒暢

天地交而萬物通矣若尺脉絕者不宜用此恐損

真元令人胃氣不復也宗奭曰此物吐涎甚不損

附方

瓜蒂散治證見上其方用瓜蒂二錢

每用二錢以香豉一合熬湯七合名煎藥上滓

和服少少加之快吐乃止仲景傷寒論

中暍身熱頭痛而脉微弱此夏月傷冷水水行皮

吐金風涎暴作氣寒倒仆用瓜蒂為末每用一

灌良久涎自出不出含沙糖諸風諸癩

涎涌用瓜蒂炒黃為末量人以酸薑水一盞調下

取吐風癩加蠟稍半錢濕氣腫滿加赤小豆末一

錢有虫加狗油五七點雄黃一錢甚則加風癩喉

荒花半錢立吐虫出東垣活法機要

風欬嗽及遍身風痧急中涎潮等證不拘大人小

兒此藥不大吐逆只出涎水瓜蒂為末壯年服

一字老少半字早晨并華水下一食頃含沙糖一

塊良久涎如水出年深者出墨涎有塊布水上也

涎盡食粥一兩日如吐多人困甚即以此急黃喘息

窮香泡湯一盞飲之即止瓜蒂二小合赤小豆一合

心上堅硬欲得水喫者瓜蒂四十九枚丁香四

研末暖漿水五合服方寸七一炊久當吐不吐再

服吹鼻取水亦遍身如金瓜蒂四十九枚丁香四

可傷寒類要為末每用一字吹鼻取黃熱病發黃

水亦可指牙追涎經驗方瓜蒂為末以大豆許

吹鼻中輕則半日重則一日黃疸瘡黃並取瓜蒂

流取黃水乃愈千金翼黃疸瘡黃丁香赤小

豆各七枚為末吹豆許入鼻少時黃水身面浮腫

流出隔日一用瘡乃止孟詵食療瓜蒂末并水

方同十種蠱氣服三十九丸棗湯下甚効瑞竹堂

方濕家頭痛瓜蒂末一字啗入鼻中口含瘧疾寒

熱瓜蒂二枚水半盞浸發狂欲走瓜蒂末并水

即愈宿頓服取吐愈千金瓜蒂七枚研末綿裹塞

聖惠方大便不通瓜蒂末吹之日三次瘡乃已又方

肉聖惠用陳瓜蒂末吹之日三次瘡乃已又方

瓜蒂末白礬末各半錢綿裹塞之或以猪脂和

挺子塞之日一換○又方青甜瓜蒂二枚雄黃麝

香半分為末先搗破後貼之日三次○湯液用瓜

蒂十四箇丁香一箇黍米四十九下乃止風熱牙痛瓜蒂

位研末口中含水啗鼻取下乃止雞屎白禿甜瓜蔓連蒂

妙研麝香少許和之綿裹不拘多少以

咬定流涎聖濟總錄

水浸一夜砂鍋熬取苦汁去滓再熬如飴盛收每
劑去痂疔洗淨以膏一盞加半夏末二錢薑汁一
匙狗膽汁一枚和勻塗之不過三
上忌食動風之物 儒門事親
齋為木水調服吐痰
即止 朱氏集驗方

蔓 陰 主治女人月經斷絕同使君子各半兩甘草

六錢為末每酒服二錢

花 主治心痛欬逆 別錄

葉 主治人無髮擣汁塗之即生 嘉祜 補中治小兒疳

及打傷損折為末酒服去瘀血 孟詵

附方 新 面上麤子 七月七日午時取瓜葉七枚直入北堂中向南立逐枚拭麤

即滅去也 淮南萬畢術

西瓜

用日

釋名寒瓜 見下

集解 瑞日契丹破回紇始得此種以牛糞覆而種

之結實如斗大而圓如匏色如青玉子如金

色或黑麻色北地多有之時珍曰按胡嶠陷虛記

言嶠征回紇得此種歸名曰西瓜則西瓜自五代

時始入中國今則南北皆有而南方者味稍不及

亦甜瓜之類也二月下種蔓生花葉皆如甜瓜七

八月實熟有圍及徑尺者長至二尺者其稜或有

或無其色或青或綠其瓢或白或紅紅者味尤勝

其子或黃或紅或黑或白白者味更劣其味有甘

有淡有酸酸者為下陶弘景註瓜蒂言永嘉有寒

瓜其大可藏至春者即此也蓋五代之先瓜種已

入浙東但無西瓜之名未遍中國爾其瓜子曝裂

六

瓜瓠氣味甘淡寒無毒瑞曰有小毒多食作吐利
損脾時珍曰按延壽書云北人稟厚食之猶慣南
人稟薄多食易至霍亂冷病終身也○又按相感
志云食西瓜後食其子即不噫瓜氣以瓜割破曝
日中少頃食即冷如水也得酒氣近糯米即易爛
貓蹄之即易沙主治消煩止渴解暑熱吳瑞療喉痺在寬中

發明穎曰西瓜性寒解熱有天生白虎湯之號然
俗以為醜醜灌頂甘露洒心取其一時之快不知
其傷脾助濕之害也真西山衛生歌云瓜桃生冷

宜少殮免致秋來成瘧痢是矣又李廷飛延壽書
云叻州太守陳逢原避暑者食瓜過多至秋忽腰腿
痛不能舉動遇商助教療之乃愈此皆食瓜之患
也故集書于此以為鑑成云又洪忠宣松漠紀聞
言有人苦日病或令以西瓜切片暴乾
日日服之遂愈由其性冷降火故也

皮氣味甘涼無毒主治口舌唇内生瘡燒研噙之

附方新閃挫腰痛西瓜青皮陰乾為末鹽酒食瓜
過傷瓜皮煎湯解之諸瓜事林廣記
瓜子仁氣味甘寒無毒主治與甜瓜仁同時珍

葡萄本經上品

本草綱目果部卷三十三

釋名蒲桃古草龍珠時珍曰葡萄漢書作蒲桃可

釀故有是名其圓者名草龍珠長者名馬乳葡萄

西域還始得此種而神農本草已有

集解魏國使人多賫來南方狀如五味子而甘美

可作酒云用葉汁殊美北人多肥健耐寒蓋食斯

乎不植淮南亦如橘之變于河北也人說卽是此

間葉相似亦堪作酒葡萄取子汁釀酒陶云用藤

汁謬矣頌曰今河東及近汴州郡皆有之苗作藤

蔓而極長太盛者一二本綿被山谷間花極細而

黃白色其實有紫白二色有圓如珠者有長似馬

乳者有無核者皆七月八月熟取汁可釀酒按史

記云大宛以葡萄釀酒富人藏酒萬餘不火者十

數年不敗張騫使西域得其種還中國始有差其

果之最珍者今太原尚作此酒寄遠也其根莖中

空相通暮溉其根而晨朝水浸子中矣故俗乎其

苗爲木通以利小腸江東出一種實細而酸者名

嬰菓子宗奭曰段成式言葡萄有黃白黑三種唐

書言波斯所出者大如雞卵此物最難乾不乾不

可收不問土地但收皆可釀酒時珍曰葡萄折藤

壓之最易生春月萌苞生葉頗似屠樓葉而有五

尖生鬚延蔓引數十丈三月開小花成穗黃白色

仍連着實星編珠聚七八月熟有紫白二色西人

及太原平陽皆作葡萄乾貨之四方蜀中有綠葡

萄熟時色綠雲南所出者大如棗味尤長西邊有

瑣瑣葡萄大如五味子而無核按物類相感志云

甘草作釘鍼葡萄立死以麝香入葡萄皮內則葡

萄盡作香氣其愛憎異于他草如此又言其藤穿

過棗樹則實味更美也三元延壽書

言葡萄架下不可飲酒恐虫屎傷人

實氣味甘平瀉無毒

說曰甘酸溫多食

令人卒煩悶眼暗

主治筋骨

濕痺益氣倍力强志令人肥健耐饑忍風寒久食

經身不老延年可作酒本逐水利小便別除腸間

水調中治淋權時氣痘瘡不出食之或研酒飲甚

効蘇頌

發明頌曰按魏文帝詔羣臣曰蒲桃當夏末涉秋

而不酢冷而不寒味長汁多除煩解渴又釀為酒

甘于麴藥善醉而易醒他方之果寧有匹之者乎

震亨曰葡萄屬土有水與木火東南人食之多病

熟西北人食之無恙蓋能下走滲道西北人稟氣

厚故耳

附方新除煩止渴生葡萄搗濾取汁以瓦器熬稠

入熟蜜少許同收點湯飲甚良

若家必用熱淋澀痛葡萄搗取自然汁生藕搗取自

然汁生地黃搗取自然汁白沙

蜜各五合每服一盞胎上衝心

石器溫服聖惠方胎上衝心葡萄煎湯飲之

根及藤葉氣味同主治煮濃汁細飲止嘔噦及霍

亂後惡心孕婦子上衝心飲之即下胎安孟治腰

脚肢腿痛煎湯淋洗之良又飲其汁利小便通小

腸消腫滿時珍

附方新水腫葡萄嫩心十四箇螻蛄七箇去頭尾

同研露七日曝乾為末每服半錢淡

酒調下暑月尤佳潔古保命集

嬰菓音嬰郁校正原附葡萄

釋名 燕蕒 毛詩 嬰舌 廣雅 山葡萄 唐註 野葡萄 俗名 藤名木

龍 時珍曰名義未詳

集解 恭曰 蔓蕒 蔓生苗葉與葡萄相似而小亦有莖大如椀者冬月惟葉凋而藤不死藤汁味甘子味甘酸即干歲蕒也 頌曰 蔓蕒子生江東實似葡萄細而味酸亦堪為酒 時珍曰 蔓蕒野生林野間亦可挿植蔓葉花實與葡萄無異其實小而圖色不真紫也 詩云 六月食蕒即此其莖吹之氣出有汁如通草也

正誤 藏器曰 蘇恭註干歲蕒即是蔓蕒妄言也干歲蕒藤如葛而葉背白子赤可食蔓蕒藤斫斷通氣更無甘汁詳見草部干歲蕒下 時珍曰 蘇恭所說蔓蕒形狀甚是但以爲干歲蕒則非矣

實氣味甘酸平無毒 主治 止渴悅色益氣 蕒恭

藤氣味甘平無毒 主治 噦逆傷寒後嘔噦搗汁飲之良 蕒恭 止渴利小便 時珍

附方 新 嘔噦厥逆 蕒煎汁呷 目中障翳 蕒以

水浸過吹氣取汁滴入目中 五淋血淋 木龍湯用去熱翳赤白障 拾遺本草 五淋血淋 木龍即野葡萄藤也竹圍萎淡竹葉麥門冬連根苗紅棗肉燈心草烏梅當歸各等分煎湯代茶飲 百一選

根氣味 同藤 主治 下焦熱痛淋悶消腫毒 時珍

附方 新 男婦熱淋 野葡萄根七錢葛根三錢水二鍾煎七分入童子小便三分空

心溫服 乾坤秘韞 女人腹痛 方同 一切腫毒 赤龍散用野

爲末水調塗之即消 赤遊風腫 忽然腫痒不治則殺

也 儒門事親方 赤遊風腫 殺

殺 人用野葡萄根

殺 人用野葡萄根

殺 人用野葡萄根

殺 人用野葡萄根

殺 人用野葡萄根

殺 人用野葡萄根

擣如泥塗之即消 通變要法

獼猴桃 宋開寶

釋名 獼猴梨 開寶 藤梨 同 陽桃 日 木子 時珍曰其形如梨其色如

桃而獼猴喜食故有諸名聞人呼為陽桃

集解 志曰生山谷中藤着樹生葉圓有毛其實形似雞卵大其皮褐色經霜始甘美可食皮堪

作紙宗奭曰今陝西永興軍南山甚多枝條柔弱高二三丈多附木而生其子十月爛熟色淡綠生

則極酸子繁細其色如芥子淺山傍道則有子者深山則多為猴所食矣

實氣味 酸甘寒無毒 藏器曰鹹酸無毒多食冷脾

宜食之太過則令人臟寒作洩 **主治** 止暴渴解煩熱壓丹石下淋

石熱壅 開寶曰一說曰並宜 調中下氣主骨節風癱

肥瓠和蜜作煎食 緩不隨長年白髮野雞內痔病 藏器

藤中汁氣味甘滑寒無毒 **主治** 反胃和生薑汁服

之又下石淋 藏器

枝葉 **主治** 殺蟲煮汁飼狗療癩疥 開寶

甘蔗 音柘 ○ 別錄中品

釋名 竿蔗 草木 諸 音遮 ○ 時珍曰按野史云呂惠

種根上庶出故字從庶也稽合作竿蔗謂其莖如竹竿也離騷漢書皆作柘字通用也諸字出許慎

說文蓋蔗音之轉也

集解 弘景曰蔗出江東為勝廬陵亦有好事者廣州

甚益人又有荻蔗節疎而細亦可噉也頌曰今江

浙閩廣湖南蜀川所生大者亦高丈許其葉似荻

有二種荻蔗莖細短而節疎但堪生噉亦可煎穉

糖竹蔗莖粗而長可竿汁為沙糖泉福吉廣諸州

之作之鍊沙糖和牛乳為乳糖惟蜀川作之南人

販至北地者荻蔗多而竹蔗少也說曰蔗有赤色

者名崑崙蔗白色者名荻蔗竹蔗以蜀及嶺南者

為勝江東雖有而劣于蜀產會稽所作乳糖殆勝

于蜀時珍曰蔗皆畦種叢生最困地方莖似竹而

內實大者圍數寸長六七尺根下節密以漸而疎

抽葉如蘆葉而大長三四尺扶疎四垂八九月收

莖可留過春克果食按王灼糖霜譜云蔗有四色

曰杜蔗即竹蔗也綠嫩薄皮味極醇厚專用作霜

曰西蔗作霜色淺曰芳蔗亦名蠟蔗即荻蔗也亦

可作沙糖曰紅蔗亦名紫蔗即崑崙蔗也止可生

啖不堪作糖凡蔗榨漿飲固佳又不若咀嚼之味

也雋永

蔗氣味甘平 穡無毒

大明曰冷說曰其酒食發痰

相感志云同樞

主治 下氣和中助脾氣利大腸

別錄

利大小腸消痰止渴除心胸煩熱解酒毒大止嘔

噉反胃寬胸膈時珍

發明

時珍曰蔗脾之果也其漿甘寒能瀉火熱素

而助濕熱所謂積溫成熱也蔗漿消渴解酒自古

稱之故漢書郊祀歌云百味甘酒布蘭生泰尊柘

漿析朝醒唐王維櫻桃詩云飽食不須愁內熱大

官還有蔗漿寒是矣而孟詵乃謂共酒食發痰者

本草綱目身音 卷三十三
與生漿之性異矣按晁氏客語云甘草遇火則熟麻油遇火則冷甘蔗煎飴則熱水成湯則冷此物性之異醫者可不知乎又野史云盧絳中病疔疾瘦瘵忽夢白衣婦人云食蔗可愈及旦買蔗數挺食之翌日疾愈此亦助脾和中之驗與

附方 舊三發熱口乾 小便赤澀取甘蔗去皮嚼汁新五 嘔之飲漿亦可 外臺秘要

痰喘氣急 方見山藥反胃吐食 朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者用甘蔗汁七升

生薑汁一升和勻日乾嘔不息 蔗汁溫服半升日細呷之 梅師方 三次入薑汁更佳

疔 疔瘡疲瘵 前見眼暴赤腫 疹澀疼痛甘蔗汁二後方 內慢火養濃去 虛熱欬嗽 升半青梁米四合煮粥

津點之 普濟 小兒口疳 蔗皮燒研搽

日食二次極潤 董氏方 簡便方

滓 主治燒存性 研末烏柏油調塗小兒頭瘡白禿

頻塗 疔瘡燒烟 勿令入人目 能使暗明 特珍

沙糖 唐本草

集解 恭曰波糖出蜀地西戎江東並有之笨甘蔗汁煎成紫色瑞曰稀者為蔗糖乾者為沙糖

毬者為毬糖餅者為糖餅沙糖中凝結如石破之

如沙透明白者為糖霜時珍曰此紫沙糖也法出

西域唐太宗始遣人傳其法入中國以蔗汁過榨

木槽取而煎成清者為蔗糖凝結有沙者為沙糖

漆甕造成如石如霜如冰者為石蜜為糖霜為冰

糖也紫糖亦可煎化印成鳥獸果物之狀以克席

氣味甘寒無毒

恭曰冷利過于石蜜詵曰性溫不

米錫諸物不可不知

冷多食令人心痛生長重消肌肉

損齒發疔蠱與鯽魚同食成疔至與葵同食
生流澀與笋同食不消成癥身重不能行
主治

心腹熱脹口乾渴
唐本潤心肺大小腸熱解酒毒臘

月瓶封窖糞坑中患天行熱狂者絞汁服甚良
大明

和中助脾緩肝氣
時珍

發明
宗奭曰蔗汁清故費煎鍊致紫黑色今醫家治暴熱多用為先導兼啖駝馬解熱心兒多

食則損齒生虫者土制水課虫属土得甘即生也震亨曰饊生胃火乃濕土生熱故能損齒生虫與

食棗病齩同意非上制水也時珍曰沙饊性溫殊於蔗漿故不宜多食與魚筍之類同食皆不益人

今人每用為調和徒取其適口而不言陰受其害也但其性能和脾緩肝故治脾胃及瀉肝藥用為

先導本草言其性寒蘓恭謂其冷利皆味此理

附方
舊一 新五下痢禁口
沙饊半斤烏梅一箇水二碗煎一椀時時飲之 摘玄方

腹中緊脹
白饊以酒三升煮服之 痘不落
沙饊

汲水一盃服之白湯調亦可日二服 劉提點方 虎傷人瘡
水化沙饊一椀服并塗之

摘玄方 上氣喘嗽
煩熱食即吐逆用沙饊薑汁等分相和慢煎二十沸每曠半匙取効

食韭口臭
沙饊解之 摘要方

石蜜
唐本草

釋名白沙饊
恭曰石蜜即乳饊也與虫部石蜜同名時珍曰按萬震涼州異物志云石

蜜非石類假石之名也實乃甘蔗汁煎而曝之則凝如石而體甚輕故謂之石蜜也

集解
志約曰石蜜出益州及西戎煎鍊沙饊為之可作餅塊黃白色恭曰石蜜用水牛乳米粉

和煎成塊作餅堅重西戎來者佳江左亦有殆勝于蜀〔說日〕自蜀中波斯來者良東吳亦有不及兩處者皆煎蔗汁牛乳則易細白耳〔宗奭日〕石蜜川浙者最佳其味厚他處皆次之煎鍊以銅象物達京師至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及紙裹包外用石夾埋之不得見風遂可免今人謂之乳糖其作餅黃白色者謂之檢糖易消化入藥至少〔時珍日〕石蜜即白沙糖也凝結作餅塊如石者為石蜜輕白如霜者為糖霜堅白如冰者為冰糖皆一物有精粗之異也以白糖煎化模印成人物獅象之形者為饗糖後漢書註所謂猓糖是也以石蜜和諸果仁及橙橘皮縮砂薄荷之類作成餅塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸註皆以乳糖即為石蜜殊欠分明按王灼糖霜譜云古者惟飲蔗漿其後煎為蔗錫又曝為石蜜唐初以蔗為酒而糖霜則自大曆間有鄒和尚者來住蜀之遂寧織山始傳造法故甘蔗

所在植之獨有福建四明番禺廣漢遂寧有冰糖池處皆顆碎色淺味薄惟竹蔗綠嫩味厚作霜最佳西蔗次之凡霜一窰其中品色亦自不同惟疊如假山者為上團枝次之窰鑑次之小顆塊又次之沙脚為下紫色及如水晶色者為上深琥珀色次之淺黃又次之淺白為下

氣味甘寒冷利無毒主治心腹熱脹口乾渴唐本治

目中熱膜明目和棗肉巨勝末為丸噙之潤肺氣

助五臟生津孟詵潤心肺燥熱治嗽消痰解酒和中

助脾氣緩肝氣時珍

發明〔震亨日〕石蜜甘喜入脾食多則害必生于脾〔西北地〕高多燥得之有益東北地〔時珍日〕石

之未有不病者亦兼氣之厚薄不同耳〔時珍日〕石蜜糖霜冰糖比之紫沙糖性稍平功用相同入藥

勝之然不冷利若久食則助熱損齒生虫之害同也

刺蜜

拾遺

校正

自草部移入此

釋名草蜜

拾遺

給教羅

集解

藏器曰交河沙中有草頭上有毛毛中生蜜胡人名為給教羅時珍曰按李延壽北史云

高昌有草名羊刺其上生蜜味甚甘美又梁四公子記云高昌貢刺蜜杰公云南平城羊刺無葉其蜜色白而味甘鹽城羊刺葉大其蜜色青而味薄也高昌即交河在西番今為火州又段成式酉陽雜俎云北天竺國有蜜草蔓生大葉秋冬不死因受霜露遂成蜜也又大明一統志云西番撒馬兒罕地有小草叢生葉細如藍秋露凝其上味甘如蜜可熬為錫土人呼為達即古賓蓋甘露也按此二說皆草蜜也但不知其草即羊刺否也又有舖齊樹亦出蜜云可入藥而不得其詳今附于左

附錄舖齊

音別按段成式云舖齊出波斯國拂林國亦有之名頃敕梨化頃音奪樹長

丈餘皮色青薄光淨葉似阿魏生于枝端一枝三葉八月伐之臘月更抽新條七月斷其枝有黃汁如蜜微香可以入藥療病也

氣味甘平無毒主治骨蒸發熱痰嗽暴痢下血

胃止渴除煩

藏器

○果之六 水果類六種

蓮藕

本經上品

釋名其根藕

爾雅

其實蓮

同上

其莖葉荷

韓保昇曰藕生水中其葉

名荷按爾雅云荷芙蓉葉其莖茄其葉蓮其本密其華齒蒼其實蓮其根藕其中葍葍中葍葍邢昺註云

芙蓉總名也別名芙蓉江東人呼為荷齒苳蓮花也苳蓮實也薏苳中青心也郭璞註云苳乃莖下白苳在泥中者蓮乃房也苳乃子也薏乃中心若薏也江東人呼荷花為芙蓉北人以藕為荷亦以蓮為荷蜀人以藕為苳此皆習俗傳誤也陸機詩疏云其莖為荷其花未發為齒苳已發為芙蓉其實蓮蓮之皮青裏白其子苳苳之殼青肉白苳內青心二三分為苦薏也時珍曰爾雅以荷為根名韓氏以荷為葉名陸機以荷為莖名按莖乃負葉者也有負荷之義當從陸說苳乃嫩苳如竹之行鞭者節生二莖一為葉一為花盡處乃生藕為花葉根實之本顯仁藏用功成不居可謂退藏于密矣故謂之苳花葉常偶生不偶不生故根曰藕或云藕善耕泥故字從耦耦者耕也苳音加加于苳上也遐音遐遠于密也齒苳函合未發之意芙蓉敷布容艷之意蓮者連也花實相連而出也苳者的也子在房中點點如的也的乃凡物點注之名薏猶意也含苦在內也古詩云食子心無棄苦心

是矣

集解

別錄曰藕實莖生汝南池澤八月采當之

葉團青大如扇其花赤子黑如羊矢時珍曰蓮藕荆揚豫益諸處湖澤陂池皆有之以蓮子種者生

遲藕芽種者最易發其芽穿泥成白藕即苳也長者至丈餘五六月嫩時沒水取之可作蔬茹俗呼

藕絲菜節生二莖一為藕荷其葉貼水其下旁行生二藕也一為菱荷其葉出水其旁莖生花也其葉

清明後生六七月開花花有紅白粉紅三色花心有黃鬚莖長寸餘鬚內即蓮也花褪連房成苳苳

在房如蜂子在窠之狀六七月采嫩者生食脆美至秋房枯子黑其堅如石謂之石蓮子八九月收

之斫去黑殼貨之四方謂之蓮肉冬月至春掘藕食之藕白有孔有絲大者如肱臂長六七尺凡五

六節大抵野生及紅花者蓮多藕劣種植及白花者蓮少藕佳也其花白者香紅者艷千葉者不結

實別有合歡並頭者有夜舒荷夜布畫卷睡蓮花
交入水金蓮花黃碧蓮花碧繡蓮花如繡皆是異
種故不述相感志云荷梗塞穴鼠
自去煎湯洗鑿垢自新物性然也

蓮實釋名藕實

本經

菡萏

爾雅音吸

石蓮子

別錄

水芝

木經

澤芝

古今注

修治

弘景曰藕實即蓮子八九月采黑堅如石者乾薄破之 領曰其菡至秋黑而沉水為石蓮

子可磨為飯食時珍曰石蓮剝去黑殼謂之蓮肉以水浸去赤皮青心

或晒或焙乾用亦有每一斤用續豬肚一筒盛貯煮熟搗培用者今藥肆一種石蓮子狀如土石而

味苦不知何物也

氣味甘平澹無毒

別錄曰寒天明日蓮子石蓮性俱溫時珍

曰嫩菡性平石蓮性溫得茯苓山藥白朮枸杞子良說曰生食過多微動冷氣脹人蒸食甚良大便

燥澹者不可食

主治補中養神益氣力除百疾久服輕身

耐老不饑延年

本經

主五臟不足傷中益十二經脉

血氣

孟詵

止渴去熱安心止痢治腰痛及泄精多食

令人歡喜

大明

交心腎厚腸胃固精氣強筋骨補虛

損利耳目除寒濕止脾泄久痢赤白濁女人帶下

崩中諸血病

時珍

搗碎和米作粥飯食輕身益氣令

人強健

蘇頌

安靖上下君相火邪

嘉謨

發明

時珍曰蓮產于淤泥而不為泥染居于水中而不為水沒根莖花實凡品難同清淨濟用

羣美兼得自藕菡而節節生莖生葉生花生藕由齒首而生蓋生蓮生菡生薏其蓮菡則始而黃黃

而青青而綠綠而黑中含白肉內隱青心石蓮堅
 剛可歷永久菘藏生意藕復萌芽展轉生生造化
 不息故釋氏用為引譬妙理具存醫家取為服食
 百病可却蓋蓮之味甘氣溫而性嚮稟清芳之氣
 得稼穡之味乃脾之果也脾者黃宮所以交媾水
 火會合木金者也土為元氣之母母氣既和津液
 相成神乃自生又視耐老此其權輿也昔人治心
 腎不交勞傷白濁有清心蓮子飲補心腎益精血
 有瑞蓮丸皆得此理藏器曰經秋正黑石蓮子入
 水必沉准煎焙鹵能浮之此物居山海間經百年
 不壞人得食之令髮黑不老說曰諸鳥猿猴取得
 不食藏之石室內人得三百年者食之永不老也
 又雁食之糞于田野山巖之中不逢陰雨經久不
 壞人得之每旦空腹食十枚身輕能登高涉遠也

附方 舊西 服食不饑 說曰石蓮肉蒸熟去心為末
 煉蜜丸梧子大日服三十丸
 此仙家 清心寧神 宗奭曰用蓮蓬中乾石蓮子肉
 於砂盆中擦去赤皮留心同為

末入龍腦 補中強志 益耳目聰明用蓮實半兩去

點湯服之 合作粥入末攪 補虛益損 水芝丹用蓮實半升酒

勻食 聖惠方 洗淨入蓮在內縫定煮熟取出晒乾為末酒煮米

糊丸梧子大每服五十九丸食前溫酒送下 醫學

發 小便頻數 下焦真氣虛弱者 白精遺精 石蓮肉

明 智仁等分為末每服二錢空心米飲下 心虛赤

普濟用蓮肉白茯苓等分為末白湯調服 蓮子六一湯用石蓮肉六兩炙甘草一

濁 兩為末每服一錢燈心湯下 直指方 久痢禁

口 石蓮肉炒為末每服二錢陳倉米調下便覺 脾

泄腸滑 方同 噦逆不止 石蓮肉六枚炒赤黃色研

蘇頌 產後欬逆 嘔吐心忪目運用石蓮子兩半

屬經 白茯苓一兩丁香五錢為末每

米飲服二錢
良方補遺
眼赤作痛
蓮實去皮研末一盞梗米半升以水煮熟常食

濟
小兒熱渴
蓮實二十枚炒浮萍二錢半生薑反
少許水煎分三服
聖濟總錄

胃吐食
石蓮肉為末入少肉豆蔻末米湯調服之
直指方

藕氣味甘平無毒
大明曰溫時珍曰相感志云藕以薑水供食則不損口同油糜

麩米果食則無
渣煮忌鐵器
主治熱渴散留血生肌久服令人

心懽
別錄
止怒止洩消食解酒毒及病後乾渴
藏器

汁服止悶除煩開胃治霍亂破產後血悶擣膏罍

金瘡并傷折止暴痛蒸煮食之大能開胃
大生食

治霍亂後虛渴蒸食其補五臟實下焦同蜜食令

人腹臃肥不生諸蟲亦可休糧
汁解射茵毒蟹

毒
徐之才
擣浸澄粉服食輕身益年
仙

發明
弘景曰根入神仙家宋時太官作血鮑音勤
庵人削藕皮誤落血中遂散渙不凝故醫家

用以破血多効也
鮑者血羹也
說曰產後忌生冷

物獨藕不同生冷者為能破血也
時珍曰白花藕大而孔扁者生食味甘煮食不美紅花及野藕生

食味澀者蒸則佳夫藕生于甲汚而潔白自若質柔而穿堅居下而有節孔竅玲瓏絲綸內隱生于

嫩弱而發為莖葉花實又復生芽以續生生之脉四時可食令人心懽可謂靈根矣故其所主

者皆心脾血分之疾與蓮之功稍不同云
附方
舊四時氣煩渴
生藕汁一盞生蜜一傷寒口

乾
生藕汁生地黄汁童子小便各半
霍亂煩渴
藕汁

蓋煎溫服之
雁安時傷寒論

一鍾薑汁半鍾和
自飲 聖濟總錄 霍亂吐利 生藕搗汁 上焦痰熱

藕汁梨汁各半
產後悶亂 血氣上衝 乾腹痛梅 師方用生藕汁三升飲

之○ 隨安時用藕汁生地
小便熱淋 積在胸腹 唾血無數者 黃汁葡萄汁

各等分每服半
墜馬血瘀 乾藕根為末 酒服方寸 蒸熟藕

七日二次
食蟹中毒 生藕汁飲 凍脚裂坼 搗爛塗

之 塵芒入目 大藕洗搗 綿裹滴汁入 普濟方

藕蓉釋名藕絲菜
五六月嫩時采為蔬 茹氣味甘 老則為藕稍味不堪矣

平無毒 主治生食主霍亂後虛渴煩悶不能食解

酒食毒 功與藕同 解煩毒下瘀血 汪頌

藕節氣味澀平無毒
伏疏黃 主治搗汁飲主吐

血不止及口鼻出血
消瘀血解熱毒產後血悶 權甄

和地黃研汁入熱酒小便飲
大能止欬血嚙血血 明

淋溺血下血血痢血崩
時珍

發明 時珍曰一男子病血淋痛脹祈死予以藕汁
調髮灰每服二錢服三日而血止痛除按趙

潛養病謾筆云宋孝宗患痢眾醫不效高宗偶見
一小藥肆召而問之其人問得病之由乃食湖蟹

所致遂診脉曰此冷痢也乃用新采藕節搗爛熱
酒調下數服即愈高宗大喜就以搗藥金杵曰賜

之人遂稱為金杵曰嚴防禦家可謂不世之遇也
大抵藕能消瘀血解熱開胃而又解蟹毒故也

附方 新鼻衄不止 藕節搗汁飲 卒暴吐血 雙荷散

五 并滴鼻中 用藕節

荷葉各七箇以蜜少許搗爛用水二鍾煎大便下

八分去滓溫服或為末丸服亦可聖惠遺精白濁心虛不寧

血藕節晒乾研末人參白蜜煎湯全幼心鑑

金鎖玉關丸用藕節蓮花鬚蓮子肉芡實肉山藥

白茯苓白伏神各二兩為末用金櫻子二斤搥碎

以水一斗熬八分去滓再熬成膏入少鼻淵腦瀉

麩和藥丸梧子大每服七十九米飲下

藕節芎藭焙研為末每服二錢米飲下普濟

蓮薏即蓮子中釋名苦薏氣味苦寒無毒藏器曰食蓮子

不去心令人作吐

主治血渴產後渴生研末米飲服二錢立愈士止

霍亂大清心去熱時珍出統旨

附方新勞心吐血蓮子心七箇糯米二十一粒為末酒服此臨安張上舍方也

是齋百小便遺精蓮子心一撮為末入辰砂一分每服一錢白湯下日二醫林

集要

蓮蕊鬚釋名佛座鬚花開時采取陰乾亦可克果食氣味甘瀋溫

無毒大明曰忌地黃葱蒜主治清心通腎固精氣烏鬚髮悅

顏色益血止血崩吐血時珍

發明時珍曰蓮鬚本草不收而三因諸方固真丸巨勝子丸各補益方中往往用之其功大抵與蓮子同也

附方新久近痔漏三十年者三服除根用蓮花蕊黑牽牛頭末各一兩半當歸五

錢為末每空心酒服二錢忌熱
物五日見効 孫氏集効方

蓮花釋名芙蓉古今注芙蕖同水華氣味苦甘溫無

毒忌地黃 葱蒜

主治鎮心益色駐顏身輕大明○弘景曰花入 神仙家用入香尤妙

附方售二 新二服食駐顏七月七日采蓮花七分八月 八日采根八分九月九日采

實九分陰乾搗篩每服方寸七溫酒調服○太清草木方天泡濕瘡荷葉貼之 簡便方

難產催生蓮花一葉書人字吞 肘後方墜損嘔血墜跌積 血心背

嘔血不止用乾荷花為末每酒服方寸七其效如神楊拱醫方摘要

蓮房釋名蓮蓬殼陳父良氣味苦澁溫無毒主治破

血孟詵治血脹腹痛及產後胎衣不下酒煮服之水

煮服之解野菌毒藏器止血崩下血溺血時珍

發明時珍曰蓮房入厥陰血分消瘀散血 與荷葉同功亦急則治標之意也

附方新六經血不止瑞蓮散用陳蓮蓬殼燒存性研 末每服二錢熱酒下 婦人經

驗方血崩不止不拘冷熱用蓮蓬殼荆芥穗各燒存 性等分為末每服二錢米飲下 聖

惠方產後血崩蓮蓬殼五箇香附二兩各燒存性為 末每服二錢米飲下日二 婦人方

方漏胎下血蓮房燒研麩糊丸 梧子大每服百 九湯酒任下日二 朱氏集驗方 小

便血淋蓮房燒存性為末入麝香少許每服 二錢半米飲調下日二 經驗方 天泡

濕瘡蓮蓬殼燒存性研末并 泥調塗神効 海上方

荷葉釋名嫩者荷錢

象形

貼水者藕荷

生藕者

出水者

菱荷

生花者

蒂名荷鼻修治

大明日入藥並多用

氣味苦平無毒

時珍曰畏桐油

伏白銀伏硫黃

主治止渴落胞破血治產後口乾心肺

煩

大明治血脹腹痛產後胎衣不下酒煮服之荷鼻

安胎去惡血留好血止血痢殺菌蕈毒並煮水服

藏器

生發元氣裨助脾胃澀精滑散瘀血消水腫癥

腫發痘瘡治吐血咯血衄血下血溺血血淋崩中

產後惡血損傷敗血

時珍

發明

果曰潔古張先生曰樛松木丸方用荷葉燒飯為丸當時未悟其理老

者動也人感之生足少陽甲膽是屬風木為生化

萬物之根蒂人之飲食入胃營氣上行即少陽甲

膽之氣與手少陽三焦元氣同為生發之氣素問

云履端于始序則不愆荷葉生于水土之下汗穢

之中挺然獨立其色青其形仰其中空象震卦之

體食藥感此氣之化胃氣何由不升乎用此為引

可謂遠識合道矣更以燒飯和藥與白朮協力滋

養補令胃厚不致內傷其利廣矣大矣世之用巴

豆牽牛者豈足語此時珍曰燒飯見穀部飯下按

東垣試効方云雷頭風證頭面疔瘡腫痛憎寒發

熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒藥重劑誅伐

无過一人病此諸藥不効余處清震湯治之而愈

用荷葉一枚升麻五錢蒼朮五錢水煎溫服蓋震

為雷而荷葉之形象震體其色又青乃涉類象形

之義也又案聞人規痘疹八十一論云痘瘡已出

復為風寒外襲則竅閉血凝其點不長或變黑色

此為倒靨必身痛四肢微厥但溫肌散邪則熱氣復行而斑自出也宜紫背荷葉散治之蓋荷葉能升發陽氣散瘀血留好血僵蠶能解結滯之氣故也此藥易得而活人甚多勝于人牙龍腦也又戴原禮證治要訣云荷葉服之令人瘦

附方 舊四新 陽水浮腫 敗荷葉燒存性研末每服二錢米飲調下日三服

證治 脚膝浮腫 荷葉心藁本等分煎湯淋洗之 永類方 痘瘡倒靨 紫背

荷葉散又名南金散治風寒外襲倒靨勢危者萬無一失用霜后荷葉貼水紫背者炙乾白僵蠶直者炒去絲等分為末每服半錢用胡

荈湯或溫酒調下 聞人規痘疹論 諸般癰腫 止痛荷葉中心蒂如錢者不拘多少煎湯淋洗拭乾以飛過寒水石同臘猪脂塗之又治癰腫作木飲方中亦用 打撲損傷 惡血攻心悶亂疼痛者以

每服錢童子熟尿 蓋食前調下 產後心痛 惡血

日三服利下惡物為度 聖惠方 也荷葉炒香為末每服方寸匕沸湯或童子胎衣

小便調下或燒灰或煎汁皆可 救急方 不下 上方同 傷寒產後 血運欲死用荷葉紅花薑黃

二錢 雁安 孕婦傷寒 大熱煩渴恐傷胎氣用嫩常傷寒論 半為末每服三錢新汲水入蜜調 妊娠胎動 已見

服并塗腹上各單胎散 鄭氏方 者乾荷蒂一枚炙研為末糯末淘 吐血不止 嫩荷

汁一鍾調服即安 唐氏經驗方 箇搗水服之甚佳 又方乾荷葉生蒲黃等分為末每服三錢桑白皮煎湯調下 〇肘后方用經霜

敗荷燒存性研 吐血咯血 荷葉賠乾為末米湯調末新水服二錢 服二錢一日二服以知

為度 〇聖濟總錄用敗荷葉蒲黃各 吐血衄血 陽

一兩為末每服二錢麥門冬湯下

于陰血熱妄行宜服四生九陳日華云屢用得効
用生荷葉生艾葉生柏葉生地黃等分搗爛丸雞
子大每服一九水三盞煎
一盞去滓服 濟生方 崩中下血 荷葉燒研半
合一兩為末每 血痢不止 荷葉蒂水煮汁 下痢赤
空心酒服三錢 痛蜜白痢沙糖湯下 脫肛不收 貼水荷葉焙
白 仍以荷葉盛末坐 牙齒疼痛 筒以濃米醋一盞煎
之 經驗良方 赤遊火丹 入鹽塗之 摘
半盞去滓熬成膏時時 唐氏經驗方 赤遊火丹 入鹽塗之 摘
祥之妙 乾荷葉煎湯洗 偏身風癢 荷葉三十
方 漆瘡作痒 之良 集驗方 偏身風癢 荷葉三十
斗淋汁合煮漬之半日乃 偏頭風痛 升麻蒼朮各
出數日一作良 聖惠方 偏頭風痛 一兩荷葉一
筒水二鍾煎一鍾食後溫服 或燒荷 刀斧傷瘡 荷
葉一筒為末以煎汁調服 簡便方

燒研搽之 陰腫痛痒 荷葉浮萍蛇床等分煎
集簡方 水日洗之 醫壘元戎

紅白蓮花 遺拾 校正 自草部 移入此

集解 藏器曰紅蓮花白蓮花生西國胡人將來也
時珍曰此不知即蓮花否而功與蓮同以類
相從姑 移入此

氣味甘平無毒 主治 久服令人好顏色變白却老

藏器 麥實 音妓 〇 別 錄上品

釋名 菱 別錄 水栗 風俗 沙角 時珍曰其葉支散故字
菱而俗呼為菱角也昔人多 不分別惟王安貧武
菱記以三角四角者為菱兩角者為菱左傳屈到

大草綱目卷之二十一

二五

二五

者菱卽此物也爾雅謂之厥藪音眉又許慎說文云菱楚謂之菱秦謂之薜薜楊氏丹鉛錄以菱爲雞頭引離騷緝菱荷以爲衣言菱葉不可緝衣皆誤矣案爾雅薜薜乃决明之名非厥藪也又埤雅菱荷乃藕上出水生花之莖非雞頭也與菱同名異物許楊二氏失于詳攷故正之

集解

弘景曰菱實廬江間最多皆取火燔以爲米充糧今多蒸暴食之頌曰菱處處有之葉浮

水上花黃白色花落而實生漸向水中乃熟實有二種一種四角一種兩角兩角中又有嫩皮而紫色者謂之浮菱食之尤美江淮及山東人暴其實以爲米代糧時珍曰菱菱有湖澤處則有之菱落泥中最易生發有野菱家菱皆三月生蔓延引葉浮水上扁而有尖光面如鏡葉下之莖有股如蝦股一莖一葉兩兩相差如蝶翅狀五六月開小白花背日而生晝合宵炕隨月轉移其實有數種或三角四角或兩角無角野菱自生湖中葉實俱小其角硬直刺人其色嫩青老黑嫩時剥食甘美老

則蒸食之野人暴乾剥米爲餅爲粥爲饌爲果皆可代糧其莖亦可暴收和米作餅以度荒歉蓋厚農有利之物也家菱種于陂塘葉實俱大角爽而脆亦有兩角彎卷如弓形者其色有青有紅有紫嫩時剥食皮脆肉美蓋佳果也老則殼黑而硬墜入江中謂之烏菱冬月取之風乾爲果生熟皆佳夏月以糞水澆其葉則實更肥美案段成式西陽雜俎云蘓州折腰菱多兩角荆州郢城菱三角無刺可以按莎漢武帝昆明池有浮根菱亦口青水菱葉沒水下菱出水上或云玄都有雞翔菱碧色狀如雞飛仙人鳧伯子常食之

氣味甘平無毒

說曰生食性冷利多食傷人臟腑損陽氣痿莖生蟻虫水族中此物

昆不治病若過食腹脹者可暖薑酒服之卽消亦可含吳茱萸咽津時珍曰仇池筆記言菱花開背日茨花開向日故菱寒而茨暖別錄言菱實性平豈生者性冷而乾者則性平與

主治安中補五臟不饑輕身別錄蒸暴和蜜餌之斷

穀長生弘景解丹石毒蘇頌解暑解傷寒積熱止消渴

解酒毒射茵毒時珍痔爛澄粉食補中延年臞仙

芟花氣味瀉時珍入染鬢髮方時珍

烏菱殼時珍入染鬢髮方亦止泄痢時珍

芡實音儉○本經上品

釋名雞頭本經鴈喙同鴈頭古今注鴻頭韓退之雞雍莊子

卯菱管子為子音淮水流黃弘景曰此即今為子也莖

曰其苞形類雞鴈頭故有諸名時珍曰芡可濟儉

故謂之芡雞雍見莊子无鬼篇卯菱見管子五

行篇揚雄方言云南楚謂之雞頭幽燕謂之鴈頭

徐青淮泗謂之芡子其莖謂之為亦曰荻鄭樵通

志以鉤芡為芡誤矣鉤芡陸生草也其莖可食水流黃見下

集解別錄曰雞頭實生雷池池澤八月采之保昇

大形作雞頭實苦石榴榴其皮青黑肉白如菱米也

頌曰處處有之生水澤中其葉俗名雞頭盤花下

結實其莖嫩者名為蕝亦名荻菜人采為蔬茹宗

輿曰天下皆有之臨水居人采子去皮持仁為粉

蒸煉作餅可以代糧時珍曰芡莖三月生葉貼水

有刺其莖長至丈餘中亦有孔有絲嫩者剥皮可

食五六月生紫花花開向日結苞外有青刺如蜩

刺及栗毬之形花在苞頂亦如雞喙及蝟喙剥開

肉有斑駁軟肉裏子累累如珠璣殼內白沫狀如

魚目深秋老時澤農廣收爛取芡子藏至

困石以備歛荒其根狀如三稜煮食如芋

修治 說曰凡用蒸熟烈日晒裂取仁亦可春取粉用時珍曰新者煮食良入醒精藥連殼用亦可案陳彥和可日記云芡實一斗以

防風四兩煎湯浸過用且經久不壞

氣味甘平瀆無毒 弘景曰小兒多食令不長說曰生食多動風冷氣宗奭曰食多

不益脾胃兼難消化

主治 濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令

耳目聰明久服輕身不饑耐老神仙 本經 開胃助氣

日華 止渴益腎治小便不禁遺精白濁帶下 時珍

發明 弘景曰仙方取此合蓮實餌之甚益人恭曰作粉食益人勝于菱也頌曰取其實及牛子

檇爛暴乾再搗篩末熬金櫻子煎和丸服之云補下益人謂之水陸丹時珍曰案孫升談圃云芡本

不益人而俗謂之水流黃河也蓋人之食芡必阻嚼之終日嚼嚼而芡味甘平腹而不膩食之者能使華液流通轉相灌溉其功勝于乳不也淮南子云狸頭愈瘋雞頭已瘦註者云即芡實也

附方 舊一雞頭粥 益精氣強志意利耳目雞頭實新三 三合煮熟去殼粳米一合煮粥

日日空心 **玉鎖丹** 治精氣虛滯用芡實蓮莖方見藕節下 **四精丸** 治

慮色慾過度損傷心氣小便數遺精用秋石白茯苓芡實蓮肉各二兩為末蒸棗和丸梧子大每服

三十九空心鹽湯送下 **分清丸** 治濁病用芡實粉白茯苓粉黃蠟化蜜和丸梧

桐子大每服百丸 **雞頭菜** 即菝菜 芡莖也

氣味甘平無毒 **主治** 止煩

渴除虛熱生熟皆宜 時珍

根氣味

同莖

主治小腹痛結氣痛煮食之

良土

附方

一新

偏墜氣塊

雞頭根切片煮熟鹽醋食之

法天生意

烏芋

別錄中品

釋名

鳧茈

音鹿

茈

音窰

蒨

衍義

黑三棱

傳濟方

芍

音曉

栗

鄭樵通志○時珍曰烏芋其根如芋而色烏也

為勃躑蓋切韻烏勃同一字母音相近也三棱地栗皆形似也瑞曰小者名鳧茈大者名地栗

集解

頰曰烏芋今鳧茈也苗似龍鬚而細色正青根如指頭大黑色皮厚有毛又有一種皮薄

無毛者亦同田中人並食之宗奭曰皮厚色黑肉

硬而白者謂之豬勃躑皮薄澤色淡紫肉軟而脆者謂之羊勃躑正二月人采食之此二等藥中罕用荒歲人多采以克糧時珍曰鳧茈生淺水田中

其苗三四月出土一莖直上無枝葉狀如龍鬚肥

田栽者粗近葱蒲高二三尺其根白蒨秋後結顆

大如山查栗子而躑有聚毛累累下生入泥底野

生者黑而小食之多滓種出者紫而大食之多毛

吳人以沃田種之三月下種霜后苗

枯冬春掘收為果生食煮食皆良

正誤

別錄曰烏芋一名藉姑二月生葉如芋三月

三日采根暴乾弘景曰藉姑生水田中葉有

極狀如澤瀉不正似芋其根黃似芋子而小疑有

烏者根極相似細而美葉狀如菟草呼為鳧茈恐

即此也

恭曰烏芋一名檉丫一名茨菰時珍曰烏

芋慈姑原是二物慈姑有葉其根散生烏芋有莖

無葉其根下生氣味不同主治亦異而別錄誤以

藉姑為烏芋謂其葉如芋陶蘓二氏因鳧茈慈姑

字音相近遂致混註而諸家

說者因之不明今正其誤

根氣味甘微寒滑無毒

說曰性冷先有冷氣人不

可食令人腹脹氣滿小兒

秋月食多臍
下結痛也
[主治]消渴痺熱溫中益氣
別錄下丹石

消風毒除胸中實熱氣可作粉食明耳目消黃疸

孟開胃下食
明大作粉食厚人腸胃不饑能解毒服

金石人宜之
頌療五種膈氣消宿食飯後宜食之

治誤吞銅物
汪主血痢下血血崩碎蠱毒
時珍

[發明] 機曰烏芋善毀銅合銅錢嚼之則錢化可見
其為消堅剗積之物故能化五種膈疾而消

宿食治誤吞銅也
時珍曰按王氏博濟方治五積
冷氣攻心變為五膈諸病金鎖丸中用黑三稜註

云即鳧茛乾者則汪氏所謂消堅之說蓋本于此
又董炳集驗方云地栗晒乾為末白湯每服二錢

能碎蠱毒傳聞下蠱之家知有此
物便不敢下此亦前人所未知者

[附方] 新大便下血
勃臍搗汁大半鍾好酒半鍾空
心溫服三日見効
神秘方

下痢赤白
午日午時取完好勃臍洗淨拭乾勿令
損破於瓶內入好燒酒浸之黃泥密封

收貯遇有患者取二枚細嚼空
心用原酒送下
唐琦經驗方
婦人血崩
鳧茛一箇

燒存性研末酒
服之
李氏方小兒口瘡
用勃臍燒存性研末
搽之
揚起簡便方
誤

吞銅錢
生鳧茛研汁細細呷之自然
消化成水
王璆百一選方

慈姑
華
[校正] 原混為芋下今分出仍
併入圖經外類剪刀草

[釋名] 藉姑
別錄水萍
別錄河鳧茛
圖經白地栗
同苗名剪

刀草
圖經箭搭草
救荒槎丫草
恭燕尾草
大明○時珍

歲生十二子如慈姑之乳諸子故以名之作茨菰
者非矣河鳧茛白地栗所以別烏芋之鳧茛地栗

也剪刀箭搭槎丫
燕尾並象葉形也

集解 別錄曰藉姑三月三日采根暴乾弘景曰藉

子而小煮之可啖恭曰藉姑生水中葉似鐔箭之

族澤瀉之類也頌曰剪刀草生江湖及汴洛近水

河溝沙磧中葉如剪刀形莖餘似嫩蒲又似三稜

苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內扯出一兩莖

上分枝開小白花四瓣蓋深黃色根大者如杏小

者如栗色白而瑩滑五六月采葉正二月采根

即藉姑也煮熟味甘甜時人以作果子福州別有

一種小異三月開花四時采根功亦相似時珍曰

慈姑生淺水中人亦種之三月生莖青莖中空其

外有稜葉如燕尾前尖後岐霜後葉枯根乃練結

冬及春初掘以為果須灰湯煮熟去皮食乃不麻

澀戟人咽也嫩莖亦可燥食又取汁可制粉霜唯

黃又有山慈姑名

同實異見草部

癩時珍

葉 王治諸惡瘡腫小兒遊瘤丹毒痔爛塗之即便

消退甚佳蘇頌治蛇蟲咬痔爛封之大明調蚌粉塗瘡

附錄諸果 綱目二十一種拾遺一種

時珍曰方冊所記諸果名品甚多不能詳其性味

狀既列于果則養生者不可不知因畧采附以俟

津符子

時珍曰孫真人千金方云味苦平滑多食令人口爽不知五味

必思荅

又曰忽必烈飲膳正要云味甘無毒調中順氣出回回田地

甘劍子

又曰范成大桂海志云狀似巴欖子仁附肉有白麝不可食發人病北人呼為海胡

桃是也

楊搖子

又曰沈瑩臨海異物志云生閩越其子生樹皮中其體有脊形甚異而味甘無奇色

五月黃長四五寸

海梧子

又曰稽含南方草木狀云出林邑樹似梧桐色白葉似青桐其子如大栗肥甘可食

木竹子

又曰桂海志云皮色形狀全似大此把肉味甘美秋冬實熟出廣西

櫓罌子

又曰桂海志云大如半升益數十房攢聚成毬每房有絳冬生青至夏紅破其瓣食

之微甘出廣西

羅晃子

又曰桂海志云狀如橄欖其皮七層出廣西顧玠海槎錄云橫州出九層皮果至九

層方見肉也夏熟味如栗

槎子

又曰徐表南州記云出九真交趾樹生子如桃實長寸餘二月開花連着子五月熟色黃

鹽藏食之味酸似梅

夫編子

又曰南州記云樹生交趾山谷三月開花仍連着子五六月熟入雞魚猪鴨羹中味

美亦可鹽藏

白緣子

又曰劉欣期交州記云出交趾樹高丈餘實味甘美如胡桃

繫彌子

又曰郭義恭廣志云狀圓而細赤如款棗其味初苦後甘可食

人面子 〔又曰〕草木狀云出南海樹似含桃子如桃實無味以蜜漬可食其核正如人面可玩

祝穆方輿勝覽云出廣中大如梅李春花夏實秋熟蜜煎甘酸可食其核兩邊似人面口目鼻皆具

黃皮果 〔又曰〕海槎錄云出廣西橫州狀如棟子及小棗而味酸

四味果 〔又曰〕段成式酉陽雜俎云出祁連山木生如棗剖以竹刀則甘鐵刀則苦木刀則酸

蘆刀則辛行旅得之能止饑渴

千歲子 〔又曰〕草木狀云由交趾蔓生子在根下鬚綠色交加如織一苞恒二百餘顆皮殼青

黃色殼中有肉如栗味亦如之乾則殼肉相離撼之有聲桂海志云狀似青黃李味甘

侯騷子 〔又曰〕酉陽雜俎云蔓生子大如雞卵既甘且冷消酒輕身王太僕曾獻之

酒杯藤子 〔又曰〕崔豹古今註云出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒夾章映澈實大如指

味如豆寇食之消酒

張騫得其種于大宛

藺子 〔又曰〕賈思勰齊民要術云藤生交趾合浦間綠樹木正二月花四五月熟如梨赤如雞

冠核如魚鱗生食味淡

山棗 〔又曰〕寰宇志云出廣西肇慶府葉似梅果似荔枝九月熟可食

隈支 〔又曰〕宋祁益州方物圖云生邛州山谷中樹高丈餘枝修而弱開白花實大若雀卵狀似

荔枝肉黃膚甘

靈牀上果子 拾遺藏器云人夜讖語食之即止

諸果有毒 拾遺

凡果未成核者食之令人發癰癩及寒熱

本草綱目果部第三十三卷終
凡果落地有惡蟲緣過者食之令人患九漏

凡果雙仁者有毒殺人

凡瓜雙蒂者有毒殺人沉水者殺人

凡果忽有異常者根下必有毒蛇食之殺人

本草綱目果部第三十三卷終

