

第五卷

玉石部下品

總共九十三種今疏其要者二十三種

伏龍肝

石灰

百草霜附

砒霜

鑄墨

硃砂

鉛丹

鉛

粉錫

東壁土

赤銅屑

銅青

井底泥

代赭

戎鹽

地漿

自然銅

梁上塵

礞石

麥飯石

花乳石

蓬砂

鉛霜

古文錢

伏龍肝味辛微溫主婦人崩中吐血止欬逆此

血消癰腫毒氣

此竈中對釜月下黃土以年久如赤色石中黃者佳研細水飛

用

疏○伏龍肝得火土之氣而成本經味辛氣

微溫無毒甄權言鹹其質本土味應有甘以

寵有神故古方多以之治顛狂癩癧及卒中
邪惡等證本經主婦人崩中吐血止欬逆止
血者蓋以失血過多中氣必損甘能補中微
溫能調和血脉故主之也消癰腫毒氣者辛
散臧軟之功也日華子主催生下胞及小兒
夜啼者取其土中有神而性本冲和復能鎮
重下墜也

主治叅互

千金方卒中惡氣伏龍肝末一雞子大水服
取吐 救急方產後血氣攻心痛惡露不下
竈中心土研末酒服二錢瀉出惡物立效
傷寒類要妊娠熱病伏龍肝末雞子許大水
調服之仍以水和塗臍上方寸乾則再上
外臺秘要一切癰腫伏龍肝以蒜和作泥貼
之乾再易或雞子黃和亦可

陰虛吐血者不宜用以其中有火氣故也
腫毒盛難消者不得獨用

石灰味辛溫主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌
墮眉殺痔蟲去黑子息肉療髓骨疽

疏○石灰燒青石而成故其味辛氣溫本經
不言其毒觀所主皆不入湯其爲毒可知矣
火氣未散性能灼物故主去黑子息肉及墮
眉也其主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌髓

骨疽者皆風熱毒氣浸淫於骨肉皮膚之間
辛溫能散風熱毒氣且能蝕去惡肉而生新
肌故爲諸瘡腫毒要藥也辛而燥故又能殺
痔蟲古方多用合百草團末治金瘡殊勝者
以其性能堅物使不腐壞且血見石灰則止
而百草又能活血涼血故也

○古墓中石灰名地龍骨火毒已出燥烈大減
故主頭瘡婁瘡濃水淋漓及飲諸瘡口尤效

○艫船油灰名水龍骨得油性之潤復得水氣
之陰故主金瘡跌撲傷損破皮出血及諸瘡
瘦血風腫瘡也

主治叅互

入三仙膏點一切癰疽腫毒輕者可消重者
勢亦減 普濟方疔瘰癧贅石灰一兩用桑
灰淋汁熬成膏刺破點之 又方去癰疽瘰
肉石灰半斤麥稈灰半斤淋汁煎成霜密封

每以針劃破塗之自腐落有毒不入湯丸故
無簡誤

○百草霜乃煙氣結成其味辛氣溫無毒辛主
散故能消化積滯及下食也凡血見灰則止
此藥性能止血復能散瘀滯故主上下諸血
及崩中帶下胎前產後諸病

主治參互

筆峰雜興方胎動下血或胎已死百草霜二

錢櫻灰一錢伏龍肝五錢爲末每服二錢白
湯入酒及童便調下 杜壬方治橫生倒逆
胎前產後虛損月候不調崩中帶下百草霜
白芷等分爲末每服二錢童子小便醋各少
許調勻熱湯化服不過二服瘥

簡誤

雖能止血無益腸胃救標則可治本則非故
不宜多服

砒霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在胸膈可作吐

藥不可久服能傷人飛鍊砒黃而成畏棗豆冷水入藥醋

煮殺毒用

疏○砒霜稟火之毒氣復兼煅煉本經雖云

味苦酸而其氣則大熱性有大毒也酸苦涌

泄故能吐諸瘧風痰在胸膈間大熱大毒之

物故不可久服能傷人也更善落胎及枯痔

殺蟲

按砒黃既已有毒見火則毒愈甚而世人多用砒霜以治瘧不知內經云夏傷於暑秋必痎瘧法當清暑益氣健脾是爲正治豈宜用此大熱大毒之藥如果元氣壯實有痰者服之必大吐雖暫獲安而所損真氣實多矣初燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死以之毒鼠鼠死猫犬食之亦死人服

至一錢許則立斃若得酒及燒酒服則腸胃
腐爛頃刻殺人雖菜豆冷水亦難解矣其於
鈎吻射罔之毒殆又甚焉奈何今人用之治
瘡是以必死之藥治必不死之病豈不誤哉
除枯痔殺蟲用於外傳之藥此外慎毋服之
切戒切戒

血
鎊墨主蠱毒中惡血暈吐血亦塗金瘡生肌止

疏○鑛墨釜月中墨也本經無氣味然觀其
所主大約與伏龍肝相似而其用則少劣也
凡血見灰見黑則止蠱毒惡氣得辛溫則散
故本經主蠱毒中惡吐血血暈以酒或水細
研溫服亦塗金瘡生肌止血也慎勿入傅面
瘡藥中其黑入肉如黥不能去也血暈宜用

米醋研服

硃

作

砂味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破

結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好

肌柔金銀可為鐸藥形如牙硝光淨者良凡用水飛

去塵穢入釐器
中重湯煮乾
忌羊血畏醋梅及一切酸

疏○礪砂乃鹵液所結秉陰毒之氣含陽毒

之精其味極鹹極苦極辛氣溫有毒甄權酸

鹹有大毒能消五金八石腐壞人腸胃生食

之化人心為血其毒之猛烈如此可畏矣其

主積聚結血宿冷者以鹹能入血軟堅辛能

散結溫能除冷故也積聚散則痛自止氣自
下因寒以致頑痰壅結則欬嗽作故暫用以
散之柔金化石之性故能爛胎及去惡肉也
金石見之卽化其能生好肌乎此前人之誤
耳

主治參互

普濟方損目生瘀赤肉弩出不退杏仁百粒
蒸熟去皮尖研濾取淨汁入礪砂末一分水

錢

煑化日點一二次自落 白飛霞方鼻中息
肉礪砂點之卽落此方須入明礬牛黃鉛粉
象牙末真珠末乃佳 集效方面上疣曰礪
砂少許礪砂鐵鏽麝香等分研搽三次自落
急以甘草汁浸洗

簡誤

按礪砂大熱有毒之物近出於唐世而方書
不著古人單服一味伏火作丸子亦有兼礪

黃馬牙硝葷合餌者不知方出何時殊非古
法此物雖能攻積聚凝結化有形癥塊然多
食腐壞人腸胃觀其柔化金銀銅錫及庖人
煮硬肉入礪少許卽爛可以類推矣惟去惡
肉及惡瘡息肉目翳弩肉是其所長亦須與
真牛黃龍腦鉛華象牙末等同用其內服諸
方雖唐慎微已收附本草末然服必害人命
悉不敢載一名狄鹽一名北庭砂一名氣砂

一名透骨將軍中其毒者生棗豆研汁一二升飲之畏漿水忌羊血

鉛丹味辛微寒主吐逆胃反驚癇癩疾除熱下氣止小便利除毒熱臍攣金瘡溢血鍊化還成

九光久服通神明自炒成者佳市中多雜砂土礬硃紅不堪用凡用以水漂去礬等毒去砂石澄乾微火炒紫色用紙盛於石上去火毒再用

疏○鉛丹即熬鉛所作黃丹故其味辛氣微

寒性應無毒鉛稟先天壬癸之氣得火成丹

則又有靈通變化之神其體重而降胃反吐

逆火氣上升也驚癇癰疾心氣虛怯也得濕
下鎮重之性則火不上炎熱氣自下心腎得
交而前證除矣稟天一所生之氣故能除熱
毒及金瘡溢血也止小便利者心與小腸爲
表裏心神寧歛則小便自有節也臍攣者卽
小兒臍風也風熱入肝則筋自攣急辛寒鎮
重能散風熱金液之性能平肝木故主之也
久服通神明者以其得先天之氣故能鎮心

安神也今世又用以解散熱毒長肉去瘀治
惡瘡腫毒及入膏藥爲外科必用之物

主治參互

單用傅瘡能止痛長肉生肌 入一切膏藥

貼惡瘡腫毒 仲景柴胡加龍骨牡蠣湯治

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語
身重者鉛丹龍骨柴胡牡蠣黃芩生薑人參

桂枝茯苓各一兩半夏復二合半大黃二兩

棗六枚以水八升煮取四升內大黃更煮一
兩沸去查溫服一升 集驗方治吐逆不止
碧霞丹黃丹四兩米醋半升煎乾炭火三秤
就銚內煅紅冷定爲末粟米飯丸梧子大每
服七丸醋湯下 劉涓子鬼遺方小兒癰瘡
壯熱不寒黃丹二錢蜜水和服冷者酒服名
鬼哭丹 痘癩方痘癩生翳黃丹輕粉等分
爲末吹少許入耳內左患吹右右患吹左

子母秘錄小兒重舌黃丹一豆大安舌下

普濟方小兒口瘡糜爛黃丹一錢生蜜一兩
相和蒸黑每以雞毛蘸搽甚效 集玄方金

瘡出血不止以藥速合則內潰傷肉只以黃
丹滑石等分爲末傅之 陸氏積德堂方血

風癩瘡黃丹一兩黃蠟一兩香油五錢熬膏
先以葱椒湯洗貼之 集效方遠近癩瘡黃

丹水飛炒黃藥酒浸七日焙各一兩輕粉半

兩研細以苦茶洗淨輕粉填滿次用黃丹
之外以檗末攤膏貼之勿揭動一七見效

簡誤

吐逆由於胃虛及因寒發吐者皆不宜服

鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦
蛇蟻所咬炙熨之

畏紫背天葵

疏○鉛稟先天壬癸之氣以生一者數之始
水者物之初故曰天一生水中含生氣爲萬

物之先金丹之母八石之祖五金之寶千金
爲清癸水爲濁清爲陽氣濁爲陰質陽氣爲
生陰質有毒範以法象招攝陰陽烹煉得宜
是成丹藥餌之仙去生氣之初味固應甘潤
下之性無毒可知心藏神而法火寧謐則安
妄炎則病重而潤下使水火旣濟而不妄炎
故主鎮心安神傷寒毒氣者卽陽證熱毒也
先天真水性含生氣而屬至陰故能解之也

反胃嘔噦者火氣上浮陰陽將離故氣逆升而發嘔噦也茲得鎮墜以下之則陽火歸元而前病自止矣蛇蝎之毒無非熱氣諸毒得水則解故亦主之也五行萬物之中能解一切毒氣者無過先天生氣土中冲氣鉛兼有之故爲解諸毒之首藥也

主治參互

黑鉛入養正丹治一切上盛下虛孤陽發越

上浮煩躁面赤恍忽驚惕嘔吐反胃等證用
此以鎮墜陽氣使火入陰分則上焦得寧而
後可以隨證施治 入黑錫丹治一切下元

虛冷陽氣垂絕陰陽將離及沉寒痼冷諸病
聖濟錄治小兒驚熱心肺積熱夜臥多驚

鉛霜牛黃各半分鐵粉一分研勻每服一字
竹瀝調下 普濟方驚風癇疾喉閉牙緊鉛

白霜一字蟾酥少許爲末烏梅肉蘸藥於齦

上搯之仍吹通關藥良久便開 聖濟錄

消渴煩熱鉛白霜枯白礬等分為末蜜丸炙

實大綿裹含化嚥汁又方鉛白霜一兩黃消

石一兩為末每冷水服一錢 喉痺腫痛鉛

白霜甘草各半兩青黛一兩為末醋糊丸炙

子大每含嚥一丸立效 宣明方治口疳齲

爛氣臭血出不拘大人小兒鉛白霜銅綠各

二錢白礬豆許為末掃之 普濟方梳髮令

黑鉛霜包梳日日梳之勝於染者

簡誤

鉛性沉重未經烹煉癸水之陰質尚存多服
能損傷心脾蓋金石與人身氣血異悟真篇
云非類難爲巧是已凡脾胃虛寒陽火不足
飲食不化下部陰溼諸證法咸忌之

粉錫味辛寒無毒主伏尸毒螫殺三蟲去鼈瘕

療惡瘡墮胎止小便利
一名鉛粉一名惡雌黃

疏○粉錫陶隱居云卽化鉛所作胡粉也其
味辛氣寒無毒體用與鉛相似性善殺蟲故
去伏尸三蟲鼈痕寒能解熱毒故療惡瘡毒
螫重而下降故能墮胎澀而黏膩故止小便
利甄權主積聚不消炒焦止小兒疳痢藏器
主久痢成疳和雞子白服以糞黑爲度皆爲
其消積殺蟲止痢也 附李時珍云胡粉卽
鉛之變黑爲白者也其用雖與鉛及黃丹同

內有豆粉蛤粉雜之止能入氣分不能入血
分此爲稍異人服食之則大便色黑者此乃
還其本質所爲色壞還爲鉛也亦可入膏藥
代黃丹用

主治叅互

肘後方勞復食復欲死者水調胡粉少許與
之 子母秘錄小兒腹脹或腹皮青色不速
治須臾死胡粉鹽熬色變以摩腹上 救急

方杖瘡腫痛水粉一兩赤石脂生一錢水銀一分以麻油杵成膏攤油紙貼之肉消者填

滿緊縛 備急方陰股常溼胡粉摻之 邵

真人方黃水膿瘡官粉煨黃松香各三錢黃

丹一錢飛礬二錢爲末香油二兩熬膏傅之

備急方小兒疳瘡熬胡粉猪脂和塗 集

簡方妒精陰瘡鉛粉二錢銀杏七箇銅銚內

炒至銀杏黃去杏取粉出火毒研搽效 聖

惠方翻花惡瘡胡粉一兩臙脂一兩爲末鹽湯洗淨傅之日五次 孫氏集效方血風臙瘡官粉四兩水調入盃內以蘄艾燒煙熏乾入乳香少許同研香油調作隔紙膏反覆貼之 千金方小兒丹毒唾和胡粉從外至內傅之 又方瘡傷水溼胡粉炭灰等分脂和塗孔上水卽出也 又方蠛蠓屎瘡酢和胡粉塗之 直指方發背惡瘡諸癰腫好錫粉

二兩真麻油三兩慢火熬以柳枝急攪至滴水成珠入白膠末少許入瓷器水浸二日油紙攤貼名神應膏

簡誤

胡粉雖能消疔逐積殺蟲止痢然其性冷走而不守脾胃虛弱者不宜用娠婦忌之

東壁土主下部瘡脫肛

疏○東壁土先得太陽真火之氣其氣溫和

其味甘無毒脾主四肢而惡溼下部生瘡溼
氣侵脾也得陽氣之壯故能燥溼除瘡脫肛
亦大腸溼熱所致甘溫而燥故亦主之藏器
止洩痢霍亂煩悶者取其土能補脾胃溫能
和中也得太陽初氣能祛暑溼之邪故又主
溫瘧及猝中暑熱攪土漿與之卽解

主治參互

甄權法同蜆殼爲末傅豌豆瘡 肘後方藥

毒煩悶欲死者東壁土調水三升頓飲之

通變要法解烏頭毒不拘川烏草烏毒用多

年陳壁土泡湯服之外臺秘要肛門突出

東壁土一升研末傅肛門頭出處以長皂莢

炙熟互熨之氣味甘溫性無偏至故不著

簡誤

赤銅屑主賊風反折燒赤銅五斤內酒二斗中

百遍服

畏蒼朮巴豆乳香胡桃慈姑牛脂

疏○赤銅屑日華子云苦平微毒亦能接骨
理傷功用與自然銅相等第其性有毒耳本
經主賊風反折者風氣通於肝肝屬木金能
平之故也藏器曰赤銅屑能鐸人骨及六畜
有損細研酒服直入骨損處六畜死後取骨
視之猶有鐸痕可驗朝野僉載云定州崔務
墮馬折足醫者取銅末和酒服之遂瘥及亡
後十年改葬視其脛骨折處猶有銅束之也

打熟銅不堪用

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉生銅皆有青青則銅之精華淘洗用

疏○銅稟土中陰氣以生青則其英華秀出於外所結凡銅入地久或沃以鹹酸之味乃生青其義可見矣本經氣平無毒然觀今人用入吐風痰藥應是酸苦澀之味而氣則微

寒也酸入肝而主斂故能止血合金瘡風熱入肝經則目生膚翳息肉或赤爛淚出苦寒能除風熱則所苦去而目自明矣本經又主婦人血氣心痛者蓋苦能泄結而平則又兼辛散之義也

主治參互

經驗方碧林丹治痰涎潮盛卒中不語及一身風癱用生綠二兩研細水化去石曼火熬

乾取辰日辰時辰位上修合再研入麝香一分糯米粉糊丸彈子大陰乾卒中者每丸作二服薄荷酒研下吐出青碧涎瀉下惡物大效又方口鼻疔瘡人中白一錢銅綠三分研傅之衛生易簡方爛弦風眼銅青水調塗盃底以艾熏乾刮下塗爛處

簡誤

目痛膚翳不由風熱外侵而因於肝虛血少

者非所宜用

井底砂泥作至冷主治湯火燒瘡用之

疏○井底砂稟地中至陰之氣味甘而大寒者也故本經主湯火燒瘡用又能療妊娠熱病取傅心下臍及丹田可護胎無失 肘後方臥忽不寤勿以火照火照之殺人但痛嚙其踵及足拇指甲際而多唾其面以井底泥塗其目令人垂頭於井中呼其姓名便甦

代赭石味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精
物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病
產難胞衣不出墮胎養血氣除五藏血脉中熱
血痺血瘀痢大人小兒驚氣入腹及陰痿不起入藥
煨赤醋淬三次研水飛過用
畏天雄附子乾薑爲之使

疏○代赭石稟土中之陰氣以生本經味苦
氣寒別錄加甘無毒氣薄味厚陰也降也入
手少陰足厥陰經少陰爲君主之官虛則氣

怯而百邪易入或鬼疰邪氣或精物惡鬼或
驚氣入腹所自來矣得鎮重之性則心君泰
定而幽暗破邪無從着矣其主五臟血脉中
熱血痺血瘀賊風及女子赤沃漏下帶下百
病皆肝心二經血熱所致甘寒能涼血故主
如上諸證也甘寒又能解毒故主蠱毒腹中
毒也經曰壯火食氣少火生氣火氣太盛則
陰痿反不能起苦寒泄有餘之火所以能起

陰痿也重而下墜故又主產難胞不出及墮胎也

主治參互

仲景旋覆代赭湯治傷寒汗吐下後心下痞
鞭噫氣不除者代赭一兩旋覆花三兩人參
二兩生薑五兩大棗十二枚半夏升甘草
三兩水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫
服一升日三直指方急慢驚風弔眼撮口

搖擗不定代赭石火燒醋淬七次細研水飛
日乾每服一錢或半錢煎真金湯調下連進
三服兒脚脛上有赤斑卽是驚氣已出病當
安也無者不治如慢驚用冬瓜仁煎湯調亦
妙 普濟方婦人血崩代赭石煨爲末白湯
服二錢

簡誤

下部虛寒者不宜用陽虛陰痿者忌之

戎鹽味鹹寒無毒主明目目痛益氣堅肌骨去

毒蠱心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽一名

青鹽

疏○戎鹽稟水中至陰之氣凝結而成不經

煎煉而生於涯埃坂墳之陰其味鹹氣寒無

毒入手足少陰經經曰熱淫於內制以鹹寒

血熱則目痛不明鹹寒能入血除熱故主目

痛明目也心腹痛者心虛而邪熱客之也吐

血齒舌上出血者火迫血妄行溢出於上也
鹹主潤下俾火氣不上炎則有坎離交之象
焉故能主諸證也溺血者小腸熱也心與小
腸爲表裏心火降則小腸熱自除也經曰熱
傷氣又曰腎主骨熱則氣散骨消筋緩鹹能
入腎寒能除熱故主益氣堅肌骨也鹹爲水
化諸毒得水則解故又能去毒蠱日華子云
助水臟益精氣除五臟癥結心腹積聚者取

主治參互

仲景金匱方戎鹽湯治小便不通用戎鹽彈丸大一枚茯苓半斤白朮二兩水煎服之

唐氏經驗方風熱牙痛青鹽一斤槐枝半斤水四盃煎汁二盃煮鹽至乾炒研日用揩齒洗目
普濟方風眼爛弦戎鹽水化點之

簡誤同食鹽

地漿寒主解中毒煩悶

疏○地漿弘景云此掘地作坎以水沃其中攪令濁俄頃取之以解中諸毒蓋取土爲萬物之母諸毒遇土則化故也山中有毒輩人不識煮食之無不死又楓樹輩食之令人笑不止惟飲地漿皆瘥餘藥不能救也

主治參互

聖惠方熱渴煩悶地漿一盞飲之 千金方

中暑霍亂不吐不利脹痛欲死地漿三五盞
服卽愈大忌米湯 金匱方中閉口椒毒吐
白沫身冷欲死者地漿飲之 集玄方中砒
霜毒地漿調玄明粉服之立解

自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚
生邕州山巖中出銅處於坑中及石間採得方
圓不定其色青黃如銅不從鑛煉故號自然銅

人藥火煨醋淬七
次研細水飛過用

疏○自然銅稟土金之氣以生故其味辛氣平無毒乃入血行血續筋接骨之神藥也凡折傷則血瘀而作痛辛能散瘀滯之血破積聚之氣則痛止而傷自和也大明主消瘀血排膿續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒磨服者可謂悉其用矣寇宗奭云有人以自然銅飼折翅胡雁後遂飛去今人打撲損傷研細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調服

仍以手摩痛處卽時見效

主治參互

同乳香沒藥麝蟲五銖古錢麻皮灰血竭胎
骨作丸煎當歸地黃續斷牛膝牡丹皮紅花
濃湯送下治跌撲損傷或金刃傷骨斷筋皆
效

簡誤

雷公云石髓鉛卽自然銅也凡使勿用方金

牙其方金牙真似石髓鉛若誤餌吐殺人石
髓鉛色似乾銀泥味微甘也凡使中病乃已
不可過服以其有火金之毒走散太甚

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡

疏○梁上塵乃是空中煙氣結成本經無氣
味應是辛苦之物辛能散苦能洩故主腹痛
噎膈中惡也體輕而上騰故入肺味辛而清
熱故又主鼻衄及小兒軟瘡也一名倒掛塵

一名烏龍尾

主治參互

孫氏集效方喉痺乳蛾烏龍尾枯礬猪牙皂
莢以鹽炒黃等分爲末或吹或點皆妙一
法用燈心以鹽中苦鹵浸過入雞子殼中煨
存性取出研細加龍腦香一二分研勻明礬
末五分同梁上倒掛塵五分青魚膽調點入
喉治喉痺咽痛有效

礞石治食積不消留滯藏府宿食癥塊久不瘥
及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹一
名青礞石 得煇硝良

疏○礞石稟石中剛猛之性體重而降能消
一切積聚痰結其味辛鹹氣平無毒辛主散
結鹹主軟堅重主墜下故本經所主諸證皆
出一貫也今世又以之治小兒驚痰喘急入

袞痰丸治諸痰怪證

主治

王隱君養生主論滾痰丸通治痰為百病惟
水瀉娠婦不宜服礞石焰硝各二兩煨過研
飛曬乾一兩大黃酒蒸八兩前胡黃芩八兩沉香
五錢為末水丸梧子大常服一二十丸欲利
大便則服一二百丸溫水下

簡誤

礞石消積滯墜痰涎誠為要藥然而攻擊太

過性復沉墜凡積滯癥結脾胃壯實者可用
虛弱者忌之小兒驚痰食積實熱初發者可
用虛寒久病者忌之如王隱君所製滾痰丸
謂百病皆生於痰不論虛實寒熱槩用殊爲
未妥不知痰有二因因於脾胃不能運化積
滯生痰或多食酒麪溼熱之物以致膠固稠
黏咯唾難出者用之豁痰利竅除熱泄結應
如桴鼓因於陰虛火炎煎熬津液凝結爲痰

或發熱聲啞痰血雜出者如誤投之則陰氣
愈虛陽火反熾痰熱未退而脾胃先爲之敗
矣可見前人立方不能無敵是在後人善於
簡擇耳

麥飯石

疏○麥飯石出自蘇頌圖經附於薑石條內
因薑石有疔腫之用故引及之其味氣必與
薑石相似但得火煨醋淬之後復有溫煖收

歛之功昔呂子華秘方麥飯石膏治發背瘡
神效取此石碎如棋子炭火燒赤投米醋中
浸之良久又燒又浸如此十次研末極細如
飛塵鹿角一具連腦骨者二三寸截之炭火
燒令煙盡卽止白歛末與石末等分鹿角倍
之用三年米醋入銀石器內煎令魚目沸卽
下前藥不住手攪熬一二時稀稠得所傾出
待冷以鵝翎拂膏於腫上四圍赤處中畱腫

頭洩氣如未膿卽內消已作頭卽撮小已潰
卽排膿若病久肌肉爛落見出筋骨者卽塗
細布上貼之乾卽易逐日瘡口收斂但中膈
不穴者卽無不瘥已潰者用時先以猪蹄湯
洗去膿血搥乾然後上藥其瘡切忌手觸動
嫩肉仍不可以口氣吹風及腋氣月經孕婦
見之合藥時亦忌此等初時一日一換十日
後二日一換此藥要極細方有效若不細塗

之即痛也煨久亦無效臨用方煨煨過即研
若飛塵一二兩可治一癰疽矣

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝
華諸郡色正黃形之大小方圓無定欲服者當
以大火燒之金瘡止血刮末傅之即合仍不作

膿潰或名花蕊石

凡使火煨置石上去火毒研細水飛晒乾用

疏○花乳石本經無氣味詳其所主應是酸

辛溫之藥其功專於止血能使血化為水婦

人血暈惡血上薄也消化惡血則暈自止矣
以酸斂之氣復能化瘀血故傅金瘡卽合仍
不作膿也

主治參互

葛可久十藥神書花乳石散治五內崩損噴
血出升斗用此治之花蓋石煅存性研如粉
以童子小便一鍾男入酒一半女入醋一半
令溫食後調服三錢甚者五錢能使瘀血化

爲黃水後以獨參湯補之按此石性溫味辛
又加火煨虛勞吐血多是火炎迫血上行於
藥性非宜除是膈上原有瘀血停凝者乃可
暫用亦須多服童便獨參湯乃肺熱咳嗽所
忌尤不宜於虛勞內熱火炎之人戒之戒之
和劑局方花蕊石散治一切金刃箭鏃傷
及打撲傷損狗咬至死者急以藥摻傷處其
血化爲黃水再摻便活更不疼痛如內損血

入臍腑熱童便入酒少許熱調一錢服立效
婦人產後敗血不盡血暈惡血奔心胎死
腹中胞衣不下至死但心頭溫煖者急以童
便調服一錢取下惡物愈若膈上有血化爲
黃水卽時吐出或隨小便出甚效用硫黃四
兩花蕊石一兩並爲粗末以膠泥固濟日乾
瓦礫一箇盛之泥封口烘乾安在四方磚上
磚上書八卦五行字炭一秤簇匝從巳午時

自下生火煨至炭消冷定取出爲細末甕瓶
收貯封固取用無時

簡誤

無瘀血停畱者不宜內服不由內傷血凝胸
膈板痛而因火炎血溢以致吐血者忌之
蓬砂味苦辛煖無毒消痰止嗽破癥結喉痺及

鐸金銀用一名鵬砂

畏知母 芸薑 紫蘇 何首烏

疏○蓬砂出於西南番採取煎淋而結亦知

礞石礞砂之類本經味苦辛氣煖無毒然詳
其用味應有鹹氣亦微煖色白而體輕能解
上焦胸膈肺分之痰熱辛能散苦能洩鹹能
軟故主消痰止嗽喉痺及破癥結也寇宗奭
云含化嚥津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便
治不能成喉痺也兼能去口氣消障翳除噎
膈反胃積塊瘀肉陰癘骨硬惡瘡折傷及口
齒諸病

主治參互

同龍腦香人中白青黛爲末傅口舌瘡效
經驗方咽喉腫痛破棺丹用蓬砂白梅等分
搗丸芡子大每噙化一九 集玄方小兒陰
癩腫大不消鵬砂一分水研塗之大效 直
指方弩肉瘖突南鵬砂黃色者一錢龍腦香
少許研末燈草蘸點之

蓬砂其性能柔五金去垢膩剋削爲用消散
爲能宜攻有餘難施不足此慙用之藥非久
服之劑

鉛霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療胸膈煩悶

中風痰實止渴

一名鉛白霜用鉛雜水銀十五
分之一合鍊作片置醋甕中密

封經久
成霜

疏○鉛霜乃鉛假汞氣交感因醋以拔其英
華所結道家謂之神符白雪其味甘酸氣大

寒無毒凡中風驚悸未有不因痰熱所生胸膈煩悶多渴亦火熱炎灼所致甘寒能除熱生津則痰結消驚悸平風自愈也其主解酒毒者亦取其除熱生津之意耳并治吐逆鎮驚去怯黑鬚髮

主治參互

諸方俱見鉛條下

簡要濟衆治室女月露

滯澀心煩恍忽鉛白霜細研爲散每服一錢

地黃汁一合調下 十全普救方治鼻衄鉛
白霜爲末取新汲水調服一字

簡誤

鉛霜墜痰去熱定驚癇止吐逆皆有奇效然
其性極冷非久服常用之物病已卽去之胃
弱脾虛腸滑者不宜用風寒咳嗽多痰者并
忌之

古文錢平治翳障明目療風赤眼鹽鹵浸用婦

人橫逆產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用

疏○古文錢其金毒火毒悉去性應平無毒
而寇宗奭云古錢其銅焦赤有毒不知本草
內赤銅之毒已微况古錢又多於古穴坑塹
中得之歷年既久毒性必失甚則有但存形
質者其味辛氣平平卽涼也日赤翳障肝經
風熱也辛涼能散風熱則翳障赤痛除日自

明矣婦人生產橫逆者血氣壅塞道路不開

也心腹痛者亦氣血結聚也月閉者月事不
來胞脉閉也五淋者衝任熱壅也此藥能走
下焦陰分散凝滯之氣血開壅塞之道路則
諸證無不除矣又能主跌撲損傷其爲散凝
滯之藥無疑

主治參互

同自然銅胎骨塵蟲血竭無名異黃荆子沒
藥乳香狗骨治跌撲損傷及金刃傷神效

青囊錄跌撲損傷半兩錢五箇火煨醋淬四
十九次甜瓜子五錢真珠二錢研末每服一
字好酒調隨上下食前後古方麥斗散治
一切傷損自然銅煨一兩古文錢煨一兩麝
香五分爲末每服五分酒下

簡誤

其味辛涼但能治風熱眼有佐以薑汁點眼
者即從治之意昔其熱以拔出火毒也如肝

腎虛而內障生者必不宜用

本草經疏卷五

綠君亭