

醫方類聚卷之一百五十八門冬
目錄

火門

附燥

論

三法六門

火

涼膈散
黃連解毒湯
瀉心湯
八正

散
調胃散
三黃丸
芍藥藥皮丸

大金花丸
清涼飲子
黃連清心湯

犀角散
黃連木通丸



燥

神功丸

脾約丸

麻仁丸

潤體丸

丸

新効方

大補丸

清金丸

抑青丸

回令丸

玉機微義

火

瓜蒂散

三聖散

勝金丸

瀉陰火升

陽湯升陽散火湯十麥門冬湯口地骨

皮散

梔子仁湯 沐陽毒升麻湯

葛根

橘皮湯

涼膈散

調胃承氣湯

當歸

承氣湯 麥門冬散

黃連解毒湯

真

珠散 大金花丸

當歸龍膽丸

神芎

丸 防風通聖散

川芎石膏湯

紅雪

通中散

紫雪 黑奴丸

六味地黃丸

大補丸

補陰丸 玄參湯

左金丸

溫膽湯

茯苓散

茱萸散

瀉熱湯

桂苓甘露飲

橘皮湯

生姜泄腸湯

腎氣丸 五苓散

燥

大秦芎湯 麻仁丸 潤腸丸 當歸龍

膽丸 清涼飲子 導滯通幽湯 四物

湯 脾約丸 潤體丸 神功丸 六味

地黃丸 大補丸

千金匱鈎玄門冬餅 黃連散 補腎丸 真

火

餘藥無名者散見本方

火門 附燥

治病百法 斷續火動 壯熱散 及濕火 寒熱之發

源及火 夫熱亦誠人少則熱滯于衣白赤熱

夫火者少陽相火之主也 諸暴死發熱惡寒

痛病大作傳為水腫而黃身痿泄注膿血赤

白為利癰腫疽毒丹燥瘍疹小兒疳瀉腹脹

暴下如木心胃中熱甚則軌衄胃脇皆痛耳

聾口苦舌乾與藏毒下血味酸不化腸鳴切

痛消渴上喘肺金為病

涼膈散 黃連解毒湯 瀉心散 神芎

丸 八正散 調胃散 調胃承氣湯

燥

夫燥者是陽明燥金之主也諸氣憤鬱腸胃
乾涸皮膚皴揭脇痛寒瘧喘咳腹中噎注泄
驚漉脇肋暴痛不可反側噎食面塵肉脫色
惡及丈夫癩疝婦人少腹痛帶下赤白瘡瘍
瘰癧喘咳潮熱大便澁燥及馬刀挾瘦之瘡
肝木為病

神功丸 脾約丸 麻仁丸 潤體丸

四生散

治法雜論

論火熱

凡傷寒中風溫疫時氣冒暑感四時不正之
氣若邪毒之氣入或感之始于巨陽受之二
日陽明受之三日少陽受之前三日在于表
陽也後三日在于裏陰也內經熱論通謂之
傷寒熱病者言壹身之熱氣也傷寒者外感

于寒邪也夫傷寒之寒熱者惡寒爲表熱裏和故惡寒脉浮大也發熱爲裏熱表和故發熱脉沉實也可以發汗而解之用拔雪湯主之生薑葱白豆豉同煎葶藶苦酒湯上而越之若病人脉沉實者或不大便喘滿譫語不必拘日數急攻于裏可用通解丸胃中消濕散大承氣湯下之慎不可用銀粉巴豆粉霜杏仁芫花熱性之藥用之必致危殆仲景云調理傷寒者皆在汗下之理當明表裏無不

愈矣差之毫釐失之千里深可慎之汗下之後切宜慎口可服淡粥而養之不然其病復作

又論傷寒七八日潮熱腹滿發黃有班者何藏使然內經云手太陰肺經足太陰脾經足陽明胃經手少陰心經此四經受病也仲景云兩寸口脉俱浮滑胃中有痰攻上者可用葶藶散吐之吐後隨證用調法處藥發黃之證皆因陽明中風太陽中濕瘀血與宿穀相

搏令人發黃煎梔子茵陳蒿湯調加減五苓散服之後利小便快者如皂角色汁此爲効矣發斑者心經受熱故有此證詳斑輕重用藥之理輕者班紅可用越桃飲子重者班紫毒氣胃中盛也大青四物湯玄參升麻湯主之漸熱腹滿者謂邪熱在胃中也可以蕩滌邪熱流濕潤燥宜急治之雜病寸口脈沉實者亦在胃中有啓玄子注云上盈不愈者吐而奪之此病乃瘳矣班黑者危而難治也黃

病血病問其小便利與不利也驗又有頭痛數日不止者此乃太陽受病也手之三陽從手走至於頭足之三陽從下走至於足蓋太陽之取會也久痛不愈者令人喪其目胃痛亦有宿痰故也先以羌活散涌之以川芎石膏散白虎湯選而服之則愈矣
又一法治頭痛不愈者吐煎連須葱白豆豉湯多服之後吐爲効吐後可服川芎薄荷湯辛涼之劑清上之藥疎風丸散之類仲景云

傷寒頭痛脉寸口急而頭痛是也
凡男子有病而黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧
狀更加涎嗽不止或喘滿面目浮腫者或身
體俱熱或有自汗內瘳安病名傷寒夾勞之
證也治之奈何病在上者其高者因而越之
可用防已散吐之吐後切用通解丸壹服次
服人參耑耑散當歸飲子加減小柴胡湯據
而用之內經謂男女之證皆同類用其治法
也依此調治無不取效矣

凡人病心胃痞悶不欲飲食身體壯熱口燥
舌乾大小便不利有一工治之說下充虛冷
便投煖藥十數服其病不愈又一醫所論與
前亦同又投煖藥五七日其證轉加困弱請
余治之診脉而說曰審問日數飲食大小便
何似小便赤色大便黑色便言傷寒瘀血之
證切用大黃芍藥湯二劑次服犀角地黃湯
二服後用通經丸壹服換過大便黃色以爲
効驗此藥服十餘服可病差矣

凡男子婦人所顯診候皮膚發熱肌肉消瘦
四肢倦怠兼有頭痛頰赤心忪唇乾口燥日
肺潮熱夜有盜汗涕唾稠粘胃脘不利或時
喘嗽五心煩熱睡則不安飲食減少多思水
漿經脈不通病名曰何病奇病論曰女子不
月血滯之病也男子腎虛精不足也凡治此
證降心火益腎水此之謂也可先用通解丸
瀉三二行次服當歸飲子又用加減五苓散
木香三稜丸人參黃耆散犀角散之類詳其

虛實選而用之若咯膿咯血大小便血但亡
血者不可宣吐勿服酸辛熱物薑附之類藥
不可不戒慎也若犯諸亡血之證者不可發
汗不可溫補脾胃之藥若服之雖進飲食不
生肌肉此病轉加危篤乃成虛勞之病也
凡醫人不明發表攻裏亂投湯劑有悞性命
更大忌夏月燔灸中脘臍下關元氣海背俞
三里等燔灸千百壯者全無一効使病者反
受其殃豈不痛哉虛勞之疾私嗜肉食麪辛

酸之物不可食之但可食者謹按神農食療而與之菠稜葵菜冰水清涼之物不可禁而且圖寒涼滑利腸胃使氣血並無凝礙澀經日穀入乎胃脈道乃行水入於經其血以化若不思慎致令病人胃口閉澀則形軀漸瘦此乃死之由也諸勞皆倣此但諸人咯膿血衄血大小便血者可服一黃丸黃連解毒丸涼膈散加桔梗當歸人黃芍藥犀角地黃湯大作劑料時時啣之內經曰所謂邪熱傷

於肝心之病依此調治萬舉萬全矣凡人年四十以上日久多言以致虛損面色黧黑飲食無味心腎痞悶四支倦怠肌體余執大小便不利治之奈何內經曰不可熱補之夫男子腎虛水不足也凡補虛之劑多用烏附天雄之類豈知腎惡燥也女子陰虛血不足也凡補虛多以陽劑是以知陽勝而陰虧也不可用性熱之藥補之空心可服加減八物丸當歸飲子減桂五苓散煩渴加益元

名曰淡滲散更服通解丸顯仁丸亦可服之
大有神効
凡人有藏毒下血何謂也生氣通天論曰邪
熱傷肝因而大飽筋脉橫解腸澀爲痔故膿
血者血隨熱行參差入于腸胃之間乃成瀉
血也若身體壯熱則爲難治身涼者可治也
可先調中消血蕩除積血瀉之三二行瀉後
服芍藥藥皮丸茵連解毒湯五苓散益氣散
各停新汲水調下五七錢甚者取地黃汁半

蓋服之則愈矣

凡下利膿血腹痛不止者何也諸痛痒皆屬
於心火也可用通解丸加減瀉之量其虛實
用之次用消濕散加生薑人棗芍藥服之瀉
訖又用新水調五苓散服之
又一法煎燈心湯調下益元散五七錢此病
大忌油膩脾葷熱物
宣明論
諸燥

燥乾者金肺之本肺藏氣以血液內損氣虛
成風則皴揭風能勝濕熱能耗液皆能成燥
故經云風熱人兼為陽寒濕燥同為陰又燥
濕亦異也然燥金雖屬秋陰而其性異於寒
濕燥陰異於風熱火也故風熱甚而多以同
於燥也然中寒吐瀉亡液而成燥者亦以少
矣故經云諸滿枯涸乾勁皴揭皆屬於風燥
也

玉機微義

火
內經敘火為諸證
諸執贅癩暴瘡冒昧躁擾狂越罵詈驚駭肘
腫疼酸氣逆衝上禁慄如喪神守嚏嘔瘡瘍
喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明暴
注瞶瘵暴病暴死皆屬於火
丹溪曰太極動而生陽靜而生陰陽動而變
陰靜而合而生水火木金土各一其性惟火

有二曰君火人火也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因動而見故謂之相天主生物故恒於動人有此生亦恒於動其所以恒於動者皆相火助之爲也見於天者出於竈雷則木之氣出於海則水之氣也其於人者寄於肝腎二部肝屬木而腎屬水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心胞絡者腎之配

三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能有生天之火雖出於木水而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而爲火者也腎肝之陰悉其相火人而侗乎天也或曰相火天人所同何東垣爲元氣之賊又曰火與元氣不相兩立一勝則一負然則如之何則可使之無勝負乎曰周子曰神發知矣五性感動而

萬事出有知之後五者之性爲物所感不能
不動謂之動者卽內經五火也相火易起五
性厥陽之火相扇則妄動矣火起於妄變化
莫測無時不有煎熬真陰陰虛則病陰絕則
死君火之氣經以暑與熱言之相火之氣經
以火言之蓋表其暴悍酷烈有甚於君火者
也故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之
以中正仁義而主靜朱子亦曰必使道心常
爲一身之主而人心每聽命焉此善處乎火

者人心聽命於道心而又能主之以靜彼五
火將寂然不作而相火者惟有裨補造化而
爲生生不息之運用奈何賊之有或曰內經
相火注言少陰少陽矣宋曾言及厥陰太陽
而吾子言之何也曰是太陽少陰東垣嘗言
之矣治以炒栝取其味辛能瀉水中之火是
也戴人亦言膽與三焦尋火治肝火胞絡都
無異此歷指龍雷之火也予亦備述天人之
火皆生於動如上文所云者實推廣二公之

意或曰內經言火者不一在往於六氣中見
之言臟腑者未之見也二公豈他有所據耶
乎能爲我言之乎經曰百病皆生於風寒暑
濕燥火之動而爲變者歧伯歷舉病機壹十
九條而屬火者五此非相火爲病之出於臟
腑者乎考諸內經少陽病爲瘧癘太陽病時
脈仆少陰病脅暴痛鬱冒不知人非諸熱脅
瘕之屬火者乎少陽病惡寒鼓慄臍痛振寒
少陰病洒淅惡寒振慄厥陰病洒淅振寒非

諸振鼓慄如喪神守之屬火者乎少陽嘔逆
厥氣上行膀胱病衝頭痛太陽病厥氣上衝
胃少腹控睪引腰脊上衝心少陰病氣上衝
胃嘔逆非諸逆衝上之屬火者乎少陽病譫
妄太陽病譫妄膀胱病狂癩疾非諸躁狂越
之屬火者乎少陽病附腫善驚少陰病脅熱
以酸附腫不能久立非諸病附腫痛酸驚駭
之屬火者乎又原病式曰諸風掉眩屬於肝
火之動也諸氣憤鬱病痿屬於肺火之升也

諸濕腫滿屬於脾火之勝也諸痛痒瘡瘍屬
於心火之用也是皆火之爲病出於臟腑者
然也注文未之發今以陳無擇之通達且以
暖熾論君火之用之火皆相火而又不曾深
及宜乎後人之不無聾瞽也悲夫
論火豈君相五志俱有
原病式曰五臟之志過度則勞傷本臟凡五
志所傷皆熱也所謂陽動陰靜故形神勞則
躁不寧靜則清平也是故上善若水小德若

火如卒暴僵仆多因五志七情過度而卒病
也故喜爲心火之志病笑者火之甚也五志
過極皆爲火也

謹按或曰火之爲病其害甚大其變甚速
其勢甚彰其死甚暴何者蓋能燔灼焚焰
飛走狂越消爍於物莫能禦之遊行乎三
焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰相
火也猶龍火也火性不妄動能不違於道
常以稟位聽命運行造化生存之機矣夫

人在氣交之中多動少靜欲不妄動其可
得乎故凡動者皆屬火化火一妄行元氣
受傷勢不兩立偏勝則病移害他經事非
細故動之極也病則死矣經所謂一水不
勝二火之火出於天造君相之外又有厥
陽臟腑之火根於五志之內六欲七情激
之其火隨起蓋人怒則火起於肝醉飽則
火起于胃房勞則火起於腎悲衰動亦則
火起於肺心爲君主自焚則死矣丹溪又

啓火出五臟主病曰諸風掉眩屬肝火動
之類經所謂壹水不勝五火之火出自人
爲又考內經病機壹十九條內舉屬火者
五諸熱贅瘕皆屬於火之類而河間又廣
其說火之致病者甚多深契內經之意曰
諸病喘嘔吐酸云云見傷寒門此皆少陰君火之
熱乃真心小腸之氣所爲也若贅瘕暴瘡
冒昧云云見前此皆少陽相火之熱乃心包絡
三焦之氣所爲也是皆火之變見爲諸病

也爲脈虛則汗大實則洪數藥之所主各因其屬君火者心火也可以濕伏可以水滅可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以水濕折之從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此虛實多端不可不察以臟氣司之如黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能寫有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣

火不兩立爲陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日漸煎熬爲血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實爲陽強之病以鹹冷之劑折之如大黃朴硝之屬若腎水受傷其陰失守無根之火爲陰虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄參之屬若右腎命門火衰爲陽脫之病以溫熱之劑濟之如附子

乾姜之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土爲火鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之屬不明諸此之類而求火之爲症施治何所依據故於諸經集畧其證備處方之用庶免實實虛虛之禍也

又按火熱之極者經曰壯火散氣壯火之氣衰故有陽極似陰之證河間治身冷唯心骨微暖昏冒不知人事不能言脉微而欲絕者用涼膈散養陰以退陽此因病陽

厥而尙不下所致身冷脉微而似陰證亢則害承迺制極變病例也然人火竜火治法與論唯太僕河間丹溪之意已詳其未悉之旨今輯于左

王安道曰予讀內經六微旨論至于亢則害承乃制喟然嘆曰至矣哉其造化之樞紐乎王太僕發之於前劉河間闡之於後聖人之蘊殆靡遺矣然學者尙不能釋然得不猶有未釋之旨也歟謹按經帝曰願

問地理之應六節氣位何如歧伯曰云云
常觀夫陰陽五行之在天地間也高者抑
之下者舉之强者折之弱者濟之蓋莫或
使然而自不能不然也不如是則高者愈
高下者愈下强者愈弱者愈弱而乖亂
之弊日已極矣天地豈能位乎雖然高也
下也強與弱也亦莫或使然而自不能不
然也故易也者造化之不可常也惟其不
可常故神化莫能以測莫測故不息也可

常則息矣亢則害承乃制者其莫或使然
而自不能不然者歟夫太僕河間把發揮
者茲不贅及其未悉之旨請推而陳之夫
自顯明之右止君火治之十五句言六節
所治之位也自相火之行下止陰精承之
十二句言地理之應乎歲氣也亢則害承
乃制三句言抑其過也制生則化止生化
大病四句言有制之常與無制之變也承
猶隨也然不自隨而曰承者以下言之則

有土奉之象故曰承雖謂之承而有防也
之義存焉亢者過極也害者害物也制者
克勝之也然所承也其不亢則隨之而已
故雖承而不見既亢則克勝以承之承斯
見矣然而迎之不知其所來迹之不知其
所止固若有不可必者然可必者常存乎
杳冥恍惚之中而莫之或欺之河間曰亢
亢過極則反似勝已之化似也者其可以
形質求哉故後篇厥陰所至爲風生終爲

肅少陰所至爲熱生終爲寒之類其爲風
生爲熱生者亢也其爲肅爲寒者制也又
水發而爲雹雪土發而飄驟之類其水發
土發者亢也其雹雪飄驟者制也若然者
蓋造化之常不能以無亢亦不能以無制
焉耳夫前後二篇所主雖有歲氣運氣之
殊然亢則害承迺制之道蓋無往而不然
也惟其無往而不然故求之於人則五臟
更相平也壹臟不平所不勝平之五臟更

相平非不亢而防之乎壹臟不平所不勝
平之非既亢而克勝之乎姑以心火而言
其不亢則腎水雖心火之所畏亦不過防
之而已一或有亢卽起而克勝之矣餘臟
皆然制生則化當作制則生化蓋得寫之
誤而釋之讀之者不覺求之不迥遂併遺
四句而弗取殊不知上二句止言亢而害
害而制耳此四句乃害與制之外之餘意
也苟或遺之則無以見經旨之周悉矣制

則生化正與下文害則敗亂相對辭理真
順不勞曲說而自通制則生化者言有所
制則六氣不至與亢而爲平平則萬物生
生而變化無窮矣化爲生之盛故生先於
化也外列盛衰者言六氣分布主治迭爲
盛衰昭然可見故曰外列害則敗亂生
化大病者言既亢爲害而無所制則敗壞乖
亂之政行矣敗壞乖亂之政行則其變極
矣其災甚矣萬物其有不病者乎生化指

所生所化者言謂萬物也以變極而災甚故曰大病上生化以造化之用言下生化以萬物言以人論之制則生化猶元氣周流茲營一身凡五臟六腑四脈百骸九竅皆籍焉以爲動靜云爲之主生化大病猶邪氣恣橫正氣耗散凡五臟六腑四肢百骸九竅舉不能遂其運用之常也或以害爲自害或以承爲承襲或以生爲自無而有化爲自有而無或以二生化爲一意或

鑄以大病爲喻造化之機息此數者皆非也且夫人之氣也固亦有亢而自制者苟亢而不自制則湯液鍼石導引之法以爲助若天地之氣其亢而自制者固復於不亢亢而不制者其孰助哉雖然造化之道代苟變至於極則亦終必自反而復其常矣于學者能本之太僕問而參之此論則造化樞紐之詳亦庶矣乎

氣屬陽動作火論

詳見諸氣門

論陰虛火動

詳見傷寒門

論積溫畜熱成火宜汗吐下法

下法

子和曰李屏山素飲酒得病醫用酒燻
 丹熱藥後目覩天地但見紅色遂成龍火藥
 不能救棠溪李濟之常病掛及居者掾每
 服補肝散以致晴脹但見窓檻橫排幾至喪
 明令涌泄五七次繼服涼劑方始如故以丹
 霞朱僧氏代章宗出家既病三陽畜熱常居
 靜室不敢見明明則頭疼如錐每置冰於頂

上不能解其熱歷諸醫莫能辨其病後治之
 七日而愈其法用汗吐下三法而己後用涼
 物清鎮之平復如故

謹按已上病例非汗吐下法則不能已人
 惟陰平陽秘神氣以寧蓋昧者徇情縱恣
 因致積熱之證非一朝壹夕改也治當如
 此其為治不能究其源委豈得不遂致誤
 入者哉奈以積熱沉寒論附錄于左
 王安道曰人之所藉以生者氣也氣者何

陰陽是也夫陰與陽可以相而平可以乖
而不善攝與否吉凶於是乎之夫惟攝之
不能以皆善也故偏寒偏熱之病始莫逃
於乖否之微矣雖然寒也熱也苟未至於
甚粗工爲之而不難設熱積而寒沉其工
猶弗能以爲計况某下乎柰之何俗尙顧
蒙恪恃方藥愈投愈盛迷不之反豈知端
本澄源中含至理執其樞要衆妙俱呈且
以積熱言之始而涼和次而寒取寒取不

愈則因熱而從之從之不愈則技窮矣內
是苦寒頻歲而弗停又以沉寒言之始而
溫和次而熱取熱取不愈則因寒而從之
從之不愈則技窮矣由是辛熱比年而弗
止嘆夫苦寒益深而積熱彌熾辛熱太過
而沉寒愈滋苟非大聖慈仁明垂樞要生
由孰從而全之經曰諸寒之而熱者取之
陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬也屬
也者其樞要之所存乎斯旨也王太僕知

之故曰益火之原以消陰翳壯水之主以
制陽光又曰取心者不必齊以熱取腎者
不必齊以寒但益心之陽寒亦通行強腎
之陰熱之猶可吁混乎千言萬語之間殆
猶和璧之在璞也夫寒之而熱者徒知以
寒治熱而不知熱之不衰者出乎真水之
不足也熱之而寒者徒知以熱治寒而不
知寒之不衰者出乎真火之不足也不知
真水火不足汎以寒熱藥治之非惟臟腑

習熟樂反見化於其病而有者弗去無者
復至矣故取之陰所以益腎水之不足而
使其制夫心火之有餘取之陽所以益心
火之不足而使其勝夫腎水之有餘也其
指水火也屬猶主也謂心腎也求其屬者
言水火不足而求之於心腎也火之原者
陽氣之根則心是也水之上者陰氣之根
卽腎是也非謂火爲心而原爲肝水爲腎
而主爲肺也寒亦益心熱亦強腎此太僕

類聚

五

達至理於規矩準繩之外而非迂生曲士
之可以跂及矣

則燥 附結燥

言內經論燥為諸證

諸滯枯涸勁斂揚皆屬於燥

按此河間論治已詳然當分大便閉結或

消渴之類為裏證皮膚燥澁乾疥爪枯之

類為表證而於陽結陰結氣盛血少痰鬱

風熱可得而來

燥本風熱論

原病式云經曰風熱火同陽也寒燥濕同陰

也又燥濕小異也然燥金雖屬秋陰而異于

寒濕故反同其風熱也故火熱勝金衰而風

生則風能勝濕熱能耗液而反寒陽實陰虛

則風熱勝于水濕而為燥也凡人風病多因

熱甚而風燥者為其兼化以熱為其主也然

陽實陰虛而風熱太甚以勝水濕因而成燥

肝主于筋而風氣自甚又燥熱加之液還於

胸膈則筋太燥也燥金主于收斂勁切緊澹
故爲病筋脈勁強緊急而口噤也或病燥熱
太甚而脾胃乾涸成消渴者或風熱燥甚拂
鬱在表面裏氣平者善伸數欠筋脈拘急或
時惡寒或筋惕而搖脈浮數而弦也風熱燥
并鬱甚于裏故煩滿而或悶結也及風癘之
發作者由熱甚而風燥爲其兼化涎溢胃膈
燥爍而瘳癢昏冒僵仆也凡此諸證皆由熱
甚而生風燥各有異者由風熱燥各微甚不

等故也所謂中風或筋緩者因其風熱勝濕
而爲燥乃燥之甚也然筋緩不收而痿痺故
諸臍髀病痿皆屬金肺乃燥之化也如秋深
燥甚則草木痿落而不收病之象也是以手
得血而能握足得血而能步夫燥之爲病者
血液衰少也而又氣血不能通暢故病然也

論燥熱勝陰

見消渴門

論結燥病本不同

東垣曰金匱真言論云北方黑色入通于腎

開竅于一陰藏精於腎又云腎主大便大便
難取足少陰夫腎主五液津液潤則大便如
常若飢飽勞逸損傷胃氣及食辛熱味厚之
物而助火耶伏於血中耗散真陰津液虧少
故大便結燥然結燥之病不一有熱燥有風
燥有陽結有陰結又有年老氣虛津液不足
而結者治法云腎惡燥急食辛以潤之結者
散之如少陰不得大便以辛潤之太陰不得
大便以苦瀉之陽結者散之陰結者熱之仲

景云小便利大便硬不可攻下以脾約丸潤
之食傷太陰腹滿食不化腹響然不能大便
者以苦藥瀉之大抵津液耗少而燥者以辛
潤之有物而結者當下之若不究其源一槩
巴豆牽牛之類下之損其津液燥結愈甚有
復下復結極則以至引導於下而不能通者
遂成不救之證不可慎哉

三按此只是論結燥言裏證也河間所論則
兼表裏而言之矣猶宜與燥熱勝陰相火

許同煎至七分去滓溫服
入正散

大黃 藿麥 木通 篇竹 車前子

山梔子 甘草 已上一兩 各滑石二兩加木香一兩尤佳

右為麤末每服三五錢水浸盡入燈心煎

至七分去滓溫服

調胃散治傷寒吐逆四肢厥冷

水銀 舶上硫黃 各半兩

右二味先研硫黃極細次入水銀同研至

深黑每服壹錢病重者二錢溫米飲調服
不拘時

三黃丸 大日二三上水打散也

大黃 黃芩 黃柏 各等分 各為末水煎水

右為末水丸每服三十九水吞 又方去黃芩用黃連

芍藥 藥皮丸藥 黃芩 大黃 各七分

芍藥 白黃藥 壹兩 當歸 黃連 各半兩

右為末水丸桐子大每服三十丸水吞食

大前 此丸 運辦 煎藥 印中 代 煎 藥 書 文

右為末生薑汁打麵糊和丸每服三十九
食後燈心湯下日三服

神功丸

大青麵裏呵子皮 麻子仁另搗人參去蘆
各一兩

右為細末入麻子仁搗研勻煉蜜丸如桐
子大每服二十九溫水下或酒或米飲下
食後臨臥如大便不通加服

肥約丸

...

大麻仁壹兩二錢半枳實炒厚朴皮芍藥已上

兩四兩杏仁去皮尖炒黃

右為細末煉蜜為丸桐子大每服二十九

玉機微義臨臥溫水下

麻仁丸

郁里仁去皮另搗大麻子仁另搗大黃二

半半生半蒸玉機微義炒檳榔半乾山藥 防風

去去蘆枳殼七錢半羌活 木香各五錢半

右為細末入另搗者三味攪勻煉蜜丸如

桐子大每服二十九至三十九溫水下食
後加牽牛滑石亦炒

潤體丸

郁里仁大黃桂心黑牽牛大當歸

黃蘗並生用輕粉少許

右為細末滴水丸如桐子大每服三十九

至四十九溫水玉機微或生薑湯送下

新效方

大補丸治腎經火燥下焦濕去筋骨軟

黃蘗炒色粉

右壹味末之水丸梧子大每服五七十九

氣虛者以補氣藥煎湯下血虛者以補血

藥煎湯下

清金丸治肺火去上膈熱痰宜與他丸藥同

用

黃芩炒木之銀此器于大二三寸或隨本

右一味末之水丸菉豆大每服三五十九

時溫水下一友用黃芩六兩神麴壹兩

抑青丸瀉肝火

黃連劉碎薑汁拌炒

水共煮豆大粒如三五十五

右壹味末之粥九梧子大二三十九温水

下

回令丸瀉肝火行濕為熱甚之反佐開痞結亦可治咽酸

黃連兩吳茱萸

湯煮少時一兩

右壹味末之粥九梧子大每服五七十九

白朮陳皮湯下

玉機微義

火

東坡吐劑

仲景瓜蒂散 搐子和三聖散 元戎勝金丸

方並見 咳嗽門

按賈元良曰宜劑者湧吐是也以君召臣

曰宣言以止召下之義也俚人以瀉為宣

非也古曰春宣五臟之積滯仲景大法春

則人病在頭故宜吐之南地人服屠蘇自

下而上是也下攻者非也然一切風熱積熱或火熾者其證寸口脈滑而有力胃中實滿煩悅氣上而不化面赤痰盛罵詈驚駭等證並宜吐之但已上諸方恐非所宜

義見咳嗽門

升散之劑
東垣瀉陰火升陽湯治肌熱煩熱面赤食少

喘欬痰盛脈右關緩弱或弦或浮數

羌活 甘草 黃芪 蒼朮 升麻 八錢

此胡 一兩 人參 黃芩 各七錢 黃連 半兩 石

膏 半兩 秋 深勿用

右 咬咀 每服 壹兩 或 半兩 水煎

按此發脾胃火邪之劑又心膽肝肺膀胱

藥也瀉陰火升發陽氣榮養氣血者也

升陽散火湯治男子婦人四肢發熱肌熱筋

痺熱骨髓中熱發困熱如燎捫之烙手此病

多因血虛而得之或胃虛過食冷物抑遏陽

氣於脾土火鬱則發之

升麻 葛根 獨活 羌活 各半 防風 二錢

半 柴胡 錢 甘草 錢 人參 白芍 各半 甘

草 生二錢

右咬咀每服半兩或壹兩水煎稍熱服

按此胃膽脾肺膀胱經藥也

千金麥門冬湯治諸病後火熱乘肺欬唾有

血胃脇脹滿上氣羸瘦五心煩熱渴而煩悶

麥門冬 桑白皮 生地黃 各一兩 半夏

紫苑 桔梗 淡竹茹 麻黃 各七錢半 五味

子 甘草 各半

右咬咀每服五錢或壹兩入姜煎

按此心肺藥也然麻黃恐非病後所宜

拔萃方地骨皮散治渾身壯熱脉長而滑陽

毒火熾發渴 地骨皮 茯苓 各半 此胡 黃芩 生地

黃 知母 各一兩 石膏 二兩 羌活 麻黃 各七錢半

有汗並去之

右咬咀每服壹兩入姜煎

按此肝心脾肺腎藥又表裏氣血之劑也
雲歧子曰在五臟之標本者皆可用

梔子仁湯治發熱潮熱發狂煩躁面赤咽痛

梔子仁 赤芍 大青 知母 各一錢 升麻

黃芩 石膏 各二錢 杏仁 二錢 芫胡 半錢 甘草

二錢百粒

右咬咀水煎

按此脾肺肝膽胃經藥也

陽毒升麻湯治傷寒雜病汗吐下後變成陽

毒發狂譫妄喉痛下利

升麻 五錢 犀角 射干 黃芩 人參 甘

草 各二錢半

右咬咀水煎

按此升散肺胃火熱藥也

葛根橘皮湯治諸熱證濕毒成班或欬或心

悶或嘔

葛根 三錢 橘皮 杏仁 知母 黃芩 麻

黃 甘草 各二錢

右咬咀入姜煎

按此肺胃膀胱經藥也

謹按古方治火升散之劑其例少得姑採

已上諸方以備其旨

折制之劑

局方涼膈散

按此瀉脾胃肺心主膽三焦大腸火熱藥

也

調胃承氣湯

按此瀉胃火之藥也

當歸承氣湯

方並見傷寒門

按此瀉脾胃肝火藥也

麥門冬散治丈夫婦人蘊積邪熱心胃煩悶

咽乾口燥睡臥不安或大小腸不利口舌生

瘡

芒硝

兩

麥門冬 三錢 小草干黃連 兩 升麻

犀角屑

兩

甘草 兩 黃芩 兩 枳殼 兩 太清 兩

右爲末每三錢小煎

按此瀉心肺肝胃火熱之劑與已上諸方皆鹹寒之藥經云火滯于內治以鹹寒而爲正治然亦有氣血上下之分也川者自即宜取擇藥則不安起人小熱不眠口舌生黃連解毒湯方規三按此太倉公火劑湯也瀉心肺腎膀胱大小腸胃火之藥見門真珠散治男女五臟積熱毒氣上攻心胃煩

悶口乾舌燥精神恍惚悶亂坐臥不安

琥珀 真珠粉 天花粉 鐵粉 朱砂

生甘草 寒水石煨 牙硝 大黃各等分

右爲細末每壹錢竹葉湯調下

按此瀉心腎胃火之劑鎮墜藥也木香

宣明大金花丸方見三法六門

按此解毒湯之變法也出陽明例但云治肌瘦弱頭痛已下諸證猶宜詳審用之對其當歸竜膽丸治腎水陰虛熱蘊積時發驚

悸筋惕搐搦神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩
肌肉瞶瘵胸膈咽嗑不利腸胃燥澁躁擾狂
越罵詈驚駭火熱等證

草龍膽 大梔子 黃連 黃柏

黃芩 各一兩 大黃 各一兩 蘆薈 各一兩 青黛 各半兩 木香

錢麝 各半錢 朱砂 各半錢 冰片 各半錢 麝香 各半錢

右為末煉蜜丸如小豆大姜湯下三二十

丸

按此瀉心肝脾肺腎胃火之藥也

神芎丸治一切熱證常服保養除痰飲消酒
食清頭目利咽膈能令遍身結滯宣通氣利
而愈神強體健耐傷省病

大黃 各二兩 牽牛 各二兩 滑石 各四兩 黃連

薄芎 各半兩 川芎 各半兩

右為末水丸如小豆大溫水下十粒至十

五二十九

按此瀉肝心脾胃肺膀胱火熱之劑又氣
血藥也下濕熱導滯甚捷但云常服神強

體健省病與前方云治腎水陰虛虛損者
恐未必然
升散折制之劑

宜明防風通聖散 川芎石膏湯 方並見諸風門

局方紅雪通中散治煩熱躁熱毒熱喉閉狂

躁胃爛發斑酒毒

麝香 半兩 朱砂 一兩 川朴 硝斤 羚羊角 斤 黃

芩 兩 升麻 各三兩 赤芍 兩 竹葉 兩 枳殼 兩 人

參 兩 木香 兩 枳榔 兩 甘草 各二兩 葛根 兩 大

青 藍葉 梔子 桑白皮 木通 各一兩半

蘇木 六兩

右件藥製合見局方

按此表裏氣血之藥也

紫雪治內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走

解諸熱毒藥毒邪熱小兒驚癇百病

黃金 百兩 寒水石 斤 磁石 斤 石膏 斤 滑石 各三斤

碎打

已上用水壹石煮至四斗去渣入下項

甘草炙八兩 羚羊角屑 犀角屑 青木香

沉香各五兩 丁香一兩 升麻 玄參並剉細各一斤

已上再煮至壹斗五升入下項

硝石四升升芒硝亦得每升七兩七錢半 朴硝十斤提淨者

已上入前藥汁中微火煎柳枝不住手攪

候有七升投放木盆中半日欲凝入下項

藥攪令勻

朱砂研三兩 麝香當門子一兩二錢半

右藥成霜雪紫色每服壹錢或二錢冷水

調下大人小兒臨時以意加減並食後服
按此心脾肺腎胃經藥也

千金黑奴丸治火熱陽毒發狂發斑煩躁大渴倍常

黃芩 釜底煤 芒硝 竈突墨 梁上

塵 小麥奴 麻黃 大黃各壹兩

右為末煉蜜丸如彈大新汲水化服不定
再服半丸飲水盡足當發寒寒已汗出乃
差未汗再服半丸不大渴者不可與

按此山陽明藥例取諸火化者為從治之意又表裏之劑也

滋陰壯水之劑

拔萃六味地黄丸治腎氣虛久新憔悴寢汗

發熱五臟齊損瘦弱虛煩骨蒸下血

丹溪大補丸降陰火補腎水

補陰丸降陰火治發渴骨熱補腎水真陰不

足方並見諸虛門

按此三方足少陰藥下三方入陰中至陰

之劑經云壯水之主以制陽光所謂求其屬也

局方玄參湯治腎臟實熱心胃煩滿耳聽無

聲腰背俛仰強痛口乾溺赤

生地黃 玄參 五加皮 黃芩 赤茯苓

苓 通草 石菖蒲 甘草 羚羊角屑

蘇麥門冬各等分

丹石咬咀水煎服

按此滋腎通心氣血之劑也

從治之劑

丹溪左金丸瀉肝火行濕為熱甚反佐開痞
結治肝邪

黃連六兩 吳茱萸一兩

右為末粥糊丸

局方溫膽湯治膽虛痰熱驚悸不眠

半夏 竹茹 枳實各二兩 陳皮 生姜四兩

甘草二兩

右咬咀水煎每服壹兩

治要狀苓散治心實熱口乾煩渴眠臥不安

茯神 麥門冬各壹兩半 通草 升麻各壹兩

紫苑 桂心各七錢半 知母壹兩 赤石脂壹兩七錢半

大棗拾二枚 淡竹茹半兩

右咬咀每服壹兩井花水煎煎訖下酥

茱萸散治小腸虛熱或酒後頻吃冷水等物

其病臍下結塊連外腎俱腫者

吳茱萸二錢半 川芎兩半 木通兩半 半夏壹兩

右咬咀每三四錢入葱煎服

瀉熱湯治脾臟熱面黃目赤季脇痛滿

半夏各捌 母姜各捌 枳實 梔子 茯苓

苦硝各三兩 細辛各兩 白朮 杏仁各四兩 生地

黃淡竹葉各壹斤

右咬咀每服壹兩或兩半水煎後下硝溫

服

桂苓甘露飲治胃受濕熱頭疼身熱煩渴吐

瀉口乾方見傷寒門

橘皮湯治肺熱氣欬息喘奔

橘皮各三兩 麻黃各二兩 紫蘇 芫胡各二兩 宿姜

杏仁各四兩 石膏各兩

右咬咀每服壹兩水煎

生姜泄腸湯治大腸實熱腹脹不通口舌生

瘡

生薑 橘皮 淡竹茹 黃芩 梔子 仁

白朮各三兩 桂心壹兩 茯苓 芒硝各二兩 生地

黃拾兩

右咬咀入大棗煎每服壹兩

金匱腎氣丸治腎經虛熱

方見諸虛門

五苓散治發熱而渴小便不利煩躁頭痛

世瀉門

按內經註曰若調寒熱之逆冷熱必行則

熱物令服下咽之後冷體既消熱性便發

由是病氣隨愈矣

去拒格之熱可臨證選用求其意例也

燥

治風之劑

機要大秦芩湯治血弱陰虛不能養筋筋燥

而手足不能運動指爪乾燥屬風熱

諸風門

按此散風熱養血之劑太陽例藥也

麻仁丸

方見三法六門

按此手足陽明足太陽經藥表裏之劑氣

分藥也

東垣潤腸丸治脾胃中伏火大便秘澀或乾

燥秘塞不通全不思食乃風結秘論結秘皆

令閉塞也以潤燥和血疎風自然通矣

麻子仁 桃仁 各一兩去皮尖另研 羌活 當歸尾

大黃 煨各半兩 皂角仁 秦艽 各五錢

右除另研外為細末五上火煉蜜丸如桐子大每三五十九食前白湯下又有潤燥丸一方於本方加郁李仁防風是也

按此足太陰手足陽明表裏藥也

治熱之劑

宣明當歸竜膽丸 方見前 清涼飲子 方見傷寒門

和血潤下之劑

東垣導滯通幽湯治大便難幽門不通上衝

吸門不開噎塞不便燥閉氣不得下治在幽

門以辛潤之

當歸 升麻 桃仁 各壹錢 生地黃 熟

地黃 各半錢 紅花 炙甘草 各三分

右作壹服水煎調栝榔細末半錢服加大黃名當歸潤燥湯

元戎四物湯治臟結秘澁者

當歸 熟地黃 川芎 白芍 大黃煨

桃仁各等分

右咬咀水煎或為丸服亦得末半發

按此手足厥陰經藥也

子和脾約丸潤體丸方並見三黃潤燥法六門

按已上二方一氣分藥一血分藥也二方

故所主不同然氣血不能宣通者非此莫

能療而氣虛津液不足者慎之不

神功丸方見咳嗽門

按此手足太陰藥也氣分之劑

滋陰之劑

拔萃六味地黃丸治下焦燥熱小便澀而數

丹溪大補丸治陰虛燥熱方並見前益壽不

余匱鈎玄本水立天

水火之入益火益氣用生

陰虛火動為難治火燄當發在何經

輕者可降重則從其性而升之不實火

可瀉小便降火極速凡氣有餘便是火

山梔子仁大能降火從小便泄去火急甚其性能屈曲下行火從而降也
 重者必緩之生甘草兼瀉兼緩麥朮亦可
 人壯氣實火盛顛狂者可用正治或硝水
 冰水飲之人虛火盛狂者用生薑湯主之
 若投以冰水立死有補陰即火自降者
 炒黃柏生地黃之類凡火盛者不可驟
 用涼藥寒藥必用溫散又方治肝火左
 金丸 黃連 六兩 茱萸 一兩

虛煩門

目錄

論

大全本草

酸棗人湯 酸棗人湯

三因方

虛煩證治

淡竹茹湯 溫膽湯 酸棗仁湯

嚴氏濟生方

虛煩

竹葉湯 小草湯 地仙散

得效方

虛煩

清心蓮子飲

醫方大成

虛煩

竹葉石膏湯

人參竹茹湯

人參竹葉湯

橘皮湯

南北經驗方

虛煩

辰砂妙香散

衛生易簡方

虛生內熱 傷寒大病不復常霍亂吐瀉 此不分而分也 傷寒大病不復常霍亂吐瀉 之後皆使人心虛煩悶 人虛煩者有此病 其餘內熱身不覺熱 頭目昏疼 口乾咽燥 不 渴清利 不寐 虛煩也 方例有虛煩近傷寒

醫人必辨藥無名沐清貝木火

虛熱

清心火

桂皮湯

清心散

清心丸

虛煩門 辨發非人藥論不賤於何謂之虛

三因方

虛煩證治 辨發非人藥論不賤於何謂之虛

虛煩者方論中所謂心虛煩悶是也大抵陰虛生內熱陽盛生外熱外熱曰燥內熱曰煩此不分而分也傷寒大病不復常霍亂吐瀉之後皆使人心虛煩悶婦人產後多有此病其證內煩身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥不渴清清不寐皆虛煩也方例有虛煩近傷寒

之說不可不辨又平人自汗小便頻併遺泄
白濁皆憂煩過度之所致傷寒屬外因憂煩
屬內因霍亂兼不內外因學者當辨析而調
治不令而公也辨寒大熱不射常審論也
嚴氏濟生方益主代後後款曰熱內熱曰熱
夫虛煩者心虛煩悶是也且人之有血氣分
為榮衛別乎陰陽榮衛通適然後陰平陽秘
精神迺治攝養乖方榮衛不調使陰陽二氣

有偏勝之患或陰虛而陽盛或陰盛而陽虛
素問云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外
熱陰盛則內寒今虛煩之病陰虛生內熱所
致也但虛煩有數證不可不辨傷寒大病不
復霍亂吐瀉之後及婦人產後皆使人心虛
煩悶又有虛煩之人心火內蒸亦致心煩治
療之際不可不詳審也
醫方大成 榮衛不和則熱則汗液自出
虛煩 非止一證其共大類

虛煩之疾非止一端究其大槩多是體虛者攝養有乖榮衛不調使陰陽二氣有所偏勝或陰虛而陽盛或陰盛而陽虛素問云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒此固不易之論而今虛煩之病多是陰虛生內熱所致如虛勞之人腎水有虧心火內蒸其煩必躁吐瀉之後津液枯竭煩而有渴惟傷寒及大病後虛煩之證却無霍亂臨病之際又宜審之治法宜用以平和之藥清心

實下未可峻用補藥又若婦人產後去血過多虛煩發熱又當各以類求

大全本草

胡洽治振悸不得眠有酸棗人湯酸棗人二升茯苓白朮人參甘草各二兩生姜六兩三六物切以水八升煮取三升分四服
深師主虛不得眠煩不可寧有酸棗人湯酸棗人二升蜾蠃乾薑茯苓各二兩牡草壹兩炙並切以水壹斗先煮棗減三升

後內五物煮取三升分服一方更加桂壹兩六湯酸棗並用療不得眠豈便以煮
 煎湯為熟乎
 三因勞心以水八升煮取三升分四服
 長虛煩證治人參甘草各二兩土姜六兩
 淡竹茹湯治心虛煩悶頭疼短氣內熱不解
 心中悶亂及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕
 麥門冬各二兩 甘草炙一兩 人參白
 茯苓各一兩 半夏湯洗七次
 黃連各一兩 芍藥各一兩 人參白

右為判散每服四大錢水二盞姜七片棗
 三個淡竹茹壹塊如指大煎七分去滓食
 前服虛勞煩悶尤宜服之得效

溫膽湯治大病後虛煩不得眠此膽寒故也

此藥主之又治驚悸得效方此下云

半夏湯洗七次 竹茹炙 枳實麸炒去穢 陳皮三

甘草炙 茯苓一兩 人參一兩 白朮一兩

右為判散每服四大錢得效 水壹盞半

姜五片棗壹枚煎七分去滓食前服得效

下云未効加遠志去心薑汁炒此五
 味子各一兩酸棗仁一兩蚌粉炒 ○醫
 方大成治大病後虛煩不得睡臥及心膽
 虛怯觸事易驚短氣悸乏或復自汗並宜
 服之半夏一兩湯先七次枳實泡洗製炒一兩
 錢橘紅一兩半○永類鈔方衛生易簡方一
 苓三分○易簡方右以咀每服四錢水壹盞
 半鈔方易簡方壹盞薑七片棗壹枚竹茹壹塊如
 錢大煎至六分空心熱服醫方集成南北經驗方補珍方

同

酸棗仁湯治霍亂吐下增劇虛勞煩擾奔奔
 在胷中不得眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁炒壹兩 人參 桂心各壹分 知母

茯苓各三字 石膏兩 甘草多二錢

右剉散每服四錢得効水壹盞半姜三

片得効方棗壹枚煎七分去滓食前服

嚴氏濟生方兩 甘草兩

汗虛煩門 人參 茯苓小

竹葉湯治傷寒大病後及霍亂吐瀉後心虛

煩悶內熱不解

竹葉湯泡七次麥門冬去心人參去皮茯苓去皮小麥炒

半夏湯泡七次甘草炙半

右咬咀每服四錢水壹盞半薑五片煎至

八分去滓溫服不拘時候

小葦湯治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不

安

赤小葦去蘆黃芪去蘆當歸去蘆麥門冬去心石斛

酸棗仁炒去殼各壹兩得人參甘

草炙各

右咬咀每服四錢得効方冰壹盞半薑方

集成南北經驗方珍方類方壹盞薑五斤煎至八分去

醫萍想服不拘時候

地仙散治傷寒後伏暑後煩熱不安醫方

衛生易簡方虛勞煩熱

地骨皮去木二兩○易防風去蘆一兩○

半甘草簡方末半錢

右咬咀每服四錢得効方水壹盞半大成

方壹 生薑五片煎至八分去滓溫服不拘

時候 醫方集成南北經驗方抽

得效方 夫木二兩○ 薑一兩○

虛煩 清心蓮子飲治心中蘊積虛熱煩燥湯方見前

醫方大成 不問此效 治虛煩

和劑方竹葉石膏湯治大病後表裏俱虛內

無津液煩渴心躁及諸虛煩熱與傷寒相似

但惡寒身不疼痛不可汗下宜服之醫方集成

南此經驗方抽移方承

三因方人參竹葉湯治汗下後表裏虛煩不

可攻者

竹葉 二把口承類鈔人參 廿草炙各二

方集成抽移 半夏 二兩半鈔方制石膏 麥門

冬 各五 兩大承氣湯 煎服

右改吐每服四錢水盡半薑五片粳米一

撮煎熟去滓空心服濟生方除石膏加茯苓

煎服

煎服

煎服

煎服

煎服

煎服

苓小麥二味 北經 驗方同

三因方橘皮湯治動氣在下不可發汗發之

反無汗心中大煩骨節疼痛目眩惡寒食返

嘔逆穀不得入宜服此藥 下膏 卷門

橘皮 青兩半 類鈔方淨 甘草兩 炙半 人參 壹 竹茹

兩半

三右咬咀每服四錢水壹盞薑三片棗壹枚

煎七分空心溫服活人書加生薑壹兩棗

子八枚作六味 醫方集成南北經 驗方補珍方同 ○衛生

易簡方用橘皮 二錢 甘草 炙 竹茹 各一 人

參 許 水壹盞姜三片棗壹枚煎七分空心

溫服

三因方人參竹茹湯治胃口有熱嘔吐咳逆

虛煩不安 香薷散 類鈔方

人參 兩半 竹茹 壹兩 煎方集成南北

煎在作六服用水壹盞半薑七片竹茹壹團

煎溫服一方加橘紅壹兩 類鈔方

○衛生易簡方用人參壹錢半夏五錢

竹茹壹團姜七片煎溫服一方加橘皮二

錢蘇州一古瓜洲法宜兩

南北經驗方

人虛煩下良

和劑方辰砂妙香散治心氣不足精神恍惚

虛煩少睡抽參方同方見心腹痛門

衛生易簡方

虛煩薑黃三九

治心煩悶用白朮末水調半錢七服

各一人

治膽虛睡臥不安心多驚悸用酸棗仁壹兩炒

香為末每服二錢竹葉湯調下不拘時

治不得眠用榆白皮陰乾為末每日朝夜用

水五合末三錢煎如膏服兼治齲五淋

治大疝之後晝夜虛煩不得睡用酸棗仁榆

白皮等分煎汁溫服則自睡矣大妙

白史善衣煎書... 自錄矣大收

本正合末... 歸正林

不拆... 歸正林

香... 歸正林

各... 歸正林

驚悸門... 歸正林

論... 歸正林

千金匱方... 歸正林

桂枝... 歸正林

千金... 歸正林

聖風... 歸正林

遠志湯... 歸正林

大定心湯... 歸正林

補心湯... 歸正林

散 小鎮心散 鎮心圓 大鎮心圓

小鎮心圓 定志小圓 紫石酒

聖真方

下治風驚諸方

扶神散 人參散 金薄散 伏神丸

鐵精丸 苜蒲丸 犀角丸 雄黃丸

竜齒丸 鐵粉散

治風驚悸諸方

犀角散 遠志散 伏神散 紫石英散

犀角散 麥門冬散 丹砂丸 牛黃丸

小大全木茸散 正麥散 定甘草散

瓜三四方 瓜三四方 瓜三四方

養心驚悸證治 養心驚悸證治 養心驚悸證治

温膽湯 鎮心丹 定志圓 寒水石散

是齋醫方

心氣 心風

引神歸舍丹 乳珠砂 香參散 朱雀

元 軟朱砂法 十四友元 小補心元

補心神効元 瓜蒂散 寧志元 抱膽
元 歸神丹

瑣碎錄

直指方

驚悸證治

養心湯 寧志圓 參乳圓 蜜陀僧散

加味四七湯 茯苓甘草湯 薑朮湯

小半夏茯苓湯 五苓散 炙甘草湯

寧志膏

嚴氏濟生方

十和怔忡湯 十四代圓 驚悸圓

益榮湯 龍齒丹 法片 茯苓飲子

排風湯 壽星圓

驚悸

遠志圓

得効方 金剛 刺艾氏 續神丹

心恙 蘇合香丸 一續丹

朱砂圓 洗心散 瀉心湯 甘遂散

辰砂妙香散 引神歸舍丹 茯神圓

驚氣圓 鎮心圓 鐵粉散 一醉散

蕊珠圓 鬱金散 陳艾湯 歸神丹

平補鎮心丹 獨効苦丁香散

怔忡

棗肉靈砂 五苓散

驚悸

十味温膽湯 十四友圓 驚氣圓

澹軒方

驚入心路 口痞

痰癖截驚

引神後方

治卒得驚邪恍惚方

澹寮方

辰心恙 附癩癩

洗心散 鎮心丹 控涎圓 歸神丹

引神歸舍丹

木拔粹方

朱砂安神丸

醫方大成

歸脾湯

永類鈴方

怔忡 驚悸

驚氣元 育神散 龍齒湯 定心湯

玉匱元 雄牙元 人參固本元 鎮心

爽神湯 十補湯 雙補元 茯苓補心

湯 靈砂寧志元 辰砂遠志元 補心

元 心丹 引神歸舍丹 補心神効元

秘傳酸棗仁湯

壽域神方

怔忡部

驚憂喜笑部

金匱鈎玄

御醫撮要

人蔘丸

餘藥無名者散見本方

禁忌

鍼灸

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

驚悸門

附怔忡

心恙

巢氏病源

風驚邪候

風驚邪者由體虛風邪傷於心之經也心為
手少陰之經心氣虛則風邪乘虛傷其經入
舍於心故為風驚邪也其狀乍驚乍喜恍惚
失常是也風津淵除又極而餘風也乘虛吸
除與風驚恐候
風驚恐者由體虛受風入乘臟腑其狀如人

將捕之心虛則驚肝虛則恐足厥陰爲肝之經與膽合足少陽爲膽之經上決斷衆事心肝虛而受風邪膽氣又弱而爲風所乘恐如人捕之

三因方

驚悸證治

夫驚悸與忪悸二證不同驚悸則因事有所大驚或問虛響或見異相登高涉險夢寐不祥驚忡心神氣與涎鬱遂使驚悸名曰心驚

膽寒在心膽經屬不內外因其脉必動忪悸則因汲汲富貴戚戚貧賤久思所愛遽失所重觸事不意氣鬱涎聚遂致忪悸在心脾經意思所主屬內所因或冒寒暑濕塞閉諸經令人忽忽若有所失恐恐如人將捕中脘忪悸此乃外邪非因心病况五飲停蓄閉於中脘最使人忪悸治屬飲家徐飲悸與外內因所治各見本門驚悸治方備列于后

直指方

驚悸方論

人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所肇端也曰驚曰悸其可無辯乎驚者恐怖之謂悸者怔忡之謂心虛而驚痰則耳聞大聲目擊異物遇險臨危觸事喪志心為之忤使人有惕惕之狀是則為驚心虛而停水則胃中滲漉虛氣流動水既上乘心火惡之心不自安使人有悒悒之狀是則為悸驚者與之豁痰定驚之劑悸者與

之逐水消飲之劑所謂扶虛不過調養心血和平心氣而已若一切以剛燥用工或者心火自炎又有熱生風之證

嚴氏濟生方

怔忡論治

夫怔忡者此心血不足也蓋心主於血血乃心之主心乃形之君血富則心君自安矣多因汲汲富貴戚戚貧賤又思所愛觸事不意真血虛耗心帝失輔漸成怔忡怔忡不已變

生諸證舌強恍惚善憂悲少顏色皆心病之候難經云損其心者益其榮法當專補真血真血若富心帝有輔無不愈者矣又有冒風寒暑濕閉塞諸經令人怔忡石飲停蓄埋塞中脘亦令人怔忡當隨其證施以治法

驚悸論治

夫驚悸者心虛膽怯之所致也且心者君主之官神明出焉膽者中正之官決斷出焉心氣安逸膽氣不怯決斷思慮得其所矣或因

事有所大驚或聞虛響或見異相登高陟險驚忤心神氣與涎鬱遂使驚悸驚悸不已變生諸證或短氣悸乏體倦自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安皆心虛膽怯之候也治之之法寧其心以壯膽氣無不瘥者矣

十形三療
驚

衛德新之妻旅中宿于樓上夜值盜劫人燒

舍驚墮牀下自後每聞有響則驚倒不知人
家人輩躡足而行莫敢冒觸有聲歲余不痊
諸醫作心病治之人參珍珠及定志丸皆無
効戴人見而斷之曰驚者爲陽從外入也恐
者爲陰從內出驚者爲自不知故也恐者自
知也足少陽膽經屬肝木膽者敢也驚怕則
膽傷矣乃命二侍女執其兩手於高拈之上
當而前下置一小几戴人曰娘子當視此一
木猛擊之其婦大驚戴人曰我以木擊几何

必驚乎伺少定擊之驚少緩又斯須連擊三
五次又以杖擊門又暗遣人畫背後之窓徐
徐驚定而笑曰是何治法戴人曰內經云驚
者平之平者常也平常見之必無驚是夜使
人擊其門窓自夕達曙夫驚者神上越也從
下擊几使之下視所以收神也一二日雖聞
雷亦不驚德新素不喜戴人至是終身厭服
汞類鈴方

雜病怔忡 卽怔忡

怔忡者心血不足蓋心主血血富則心君安多由汲汲富貴戚戚賤貧久思所愛遽失所重觸事不意其血虛耗氣鬱涎聚遂致怔忡在心脾經脾主意意思所主屬內所因經云損其心者益其榮法當生補真血心君有補矣或冒六淫閉塞諸經令人怔忡此乃外邪非因心病况五飲停蓄埋塞中腕亦令怔忡

脉病證

治法

心脉浮大而散

三因茯苓補心湯清心

爲平脉

蓮子飲 溫膽湯

弦爲虛

風寒暑濕各所因

濟生排風湯加棗仁小

緩爲實

便不調五苓散加辰

怔忡則

砂生四君湯加減參

心血不

苓白朮散

足爲虛

濟生益榮湯補心元去

必弦細

附子心丹 局方平補

而長是思慮傷心血鎮心丹十四友元簡

脈之乘易育神散荆公好香

心助之散雄朱元龍齒元人參

歸子為固本元以

虛邪雖淵膽湯壽星元濟生

病易治伏令飲子龍齒丹二

痰飲停蓄陳易加棗仁麥門冬

本事辰砂遠志元虛

者參香散

經絡蓄熱

清心蓮子飲熱勞濟

生驚甲地黃湯局方

清神散牛黃清心元

簡易集本事清心元

酒過吐逆舌燥而悸

生四君加棗仁麥門

冬

大雜病驚悸

驚悸者心虛膽怯所致心者君主之官神

明出焉膽者中正之官決斷出焉或因事
太驚氣與痰鬱變生諸証或短氣悸乏體
倦自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐
卧不安皆其候也心驚膽寒治之當寧心
壯膽無不瘥矣

脉病證

治通見諸虛門

肝氣虛

温膽湯 簡易雄朱元

心氣弱

氣鬱生痰自

鎮心爽神湯自汗沉

脉弦而汗

香靈砂半夏選奇鐵

弱虛動而

因事大驚寐

瓮先生交感丹三方

濟生遠志元寧志膏酸

棗仁湯濟生補心元簡

易抱膽元龍齒湯兼心

腹痛濟生加減七氣湯

十四友元臨眠服空心

大兔絲元玉關元寧志

膏簡易雙補元百一選

猪腰子補心神效元簡

房事失精人

悵悶驚悸

易心腎元鍾乳靈砂茯
苓益智羊肝糊元

壬子冬余得怔悸之疾夜卧不安五心流汗
精神恍惚空心養榮湯食後參香散臨臥酸
棗仁湯或溫膽湯嚙心丹并靈砂丹先有寒
戰背心冷如瘧收效鹿茸大補湯兼導引升
降之力逾月而愈

金匱方

驚悸病脉證治

十日脉動而弱動即為驚弱則為悸
火邪者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨桂枝
湯主之

桂枝棊逆湯方

桂枝三兩 去皮甘草二兩 炙生姜三兩牡蠣五兩 熬龍

骨四兩 去心蜀漆三兩 洗 去腥

右為末以水壹斗二升先煮蜀漆減二升
內諸藥煮取三升去滓溫服壹升

心下悸者半夏麻黃丸主之

半夏麻黃丸方

半夏

肘後方湯洗去滑乾

麻黃

等分

右二味末之煉蜜和丸小豆大飲服三丸

日三服

肘後方服如大豆三丸日三稍增之

千金方

風虛驚悸

遠志湯補心治心氣虛驚悸喜忘不進食方

遠志 茯苓 白朮 桂心 黃耆 紫

石 各三兩 防風 當歸 人參 茯苓 甘

草 芎藭 茯神 羌活 各二兩 麥門冬

半夏 各四兩 大棗 拾二枚 五味子 二合

右十八味咬咀以水壹斗三升煮取三升

半分五服日三夜一

又方治中風心氣不足驚悸言語謬誤恍惚憤憤心煩悶耳鳴方

遠志 黃耆 茯苓 甘草 芍藥 當

歸 桂心 麥門冬 人參 獨活

四生薑 五附子 兩

兩

右十二味咬咀以水壹斗二升煮取四升
 每服八合入齋服五合日三夜一
 茯神湯治風經五臟大虛驚悸安神定志方
 茯神各三防風各三人參 遠志 甘草
 龍骨 桂心 石活各二白木各一細辛
 乾薑各一酸棗各一
 右十二味咬咀以水九升煮取三升分三
 服
 又方治風虛滿頸項強心氣不定不能食方

茯神 麥門冬四兩 人參 羌活 遠志
 當歸 甘草 紫石 五味子二兩 半夏
 防風 黃耆各三兩 生薑五兩 酸棗二升
 右十四味咬咀以水壹斗三升煮酸棗取
 壹斗去棗肉餘藥煎取三升半壹服七合
 日三夜二
 補心湯治心氣不足其病苦驚悸汗出心中
 煩悶短氣喜怒悲憂悉不自知常苦咽喉痛
 口脣黑嘔吐血舌本強不通水漿方

紫石英 茯苓 人參 遠志 當歸

茯神深師作桂 甘草 紫苑各二兩 麥門冬一升 赤

小豆合三升 大棗三十枚

右十壹味 㕮咀 以水壹斗二升 煮取三升

分三服

又方治心氣不足 多汗 心煩 喜獨語 多夢 不

自覺 咽喉痛 時吐血 舌本強 水漿不通

紫石英研 茯苓 人參 桂心各二兩 麥門

冬三兩 紫苑 甘草各壹兩 大棗七枚 赤小豆二

四枚

右九味 㕮咀 以水八升 煮取一升半 分三

服 春夏服佳

又方治奄奄忽忽 朝瘥暮劇 驚悸 心中憧憧

胃滿 不下食 陰陽氣衰 脾胃不磨 不欲聞人

聲 定志下氣方

人參 茯苓 遠志 甘草 枳實 當

歸 龍齒 桔梗各二兩 半夏 桂心各五

黃耆四兩 生薑六兩 茯神二兩 大棗二拾枚

右十四味咬咀以水壹斗二升先煮粳米五合令熟去滓次內藥煮取四升壹服八合日三夜二

又方治心氣不足心痛驚恐方

遠志 蒲黃一方用人參 茯苓各四

右四味咬咀以小一斗煮取三升半分三服

又方治心氣不足腹背相引痛不能俛仰方
或作傷心湯

茯苓 黃芩 遠志 乾地黄三兩 麥門冬

石膏各四兩 半夏 附子 桂心 生薑各二兩

甘草 阿膠 糖各壹兩 大棗三拾枚

右十四味十二味咬咀以水壹斗煮取三升去滓內糖及膠更煎取二升二合分三服此方與心腹痛門大補心湯相重分兩別三

小定心湯治虛羸心氣驚弱多魘方

茯苓四兩 桂心三兩 甘草 芍藥 乾薑 遠

志 人參 各二兩 大棗 拾五枚

右八味咬咀以水八升煮取三升分四服
日三夜一

大定心湯治心氣虛悸恍惚多忘或夢寤驚
魘志少不定

人參 茯苓 茯神 遠志 赤石脂

龍骨 乾薑 當歸 甘草 白朮 芍

藥 桂心 紫菀 防風 各二兩 大棗 二拾枚

右十五味咬咀以水一斗二升煮取三升

半分五服日三夜二

治驚勞失志方

甘草 桂心 各二兩 龍骨 防風 麥門冬

牡蠣 遠志 各一兩 茯神 五兩 大棗 二拾枚

右九味咬咀以水八升煮取二升分二服

相去如人行五里久再進

荆瀝湯治心虛驚悸不定羸瘦病方

荆瀝 二升 茯神 白鮮皮 各三兩 人參 二兩 白銀

拾兩以水一斗煮取三升

右五味三味咬咀以荆瀝銀汁中煮取壹
升四分三服相去如人行十里久進壹
服

又方荆瀝二升緩火煎取壹升六合分溫每
服四合日三夜壹

鎮心湯治風虛勞冷心氣不足喜忘恐怖神
志不定方

防風六分 當歸 大黃 麥門冬各五分此
兩澤瀉 大豆卷 白欬各四分此味 菖

蒲式人參 桔梗 桂心 遠志 萹蒨

石膏各三分 紫苑 乾薑 茯苓各二分壹

白朮 甘草各拾分 粳米五合 大棗五兩 附子三

茯神各二分 秦艽六分

右二十四味咬咀以水一斗二升先煮粳
米令熟去滓內藥煮取四升分服八合日
三夜一千金翼不用粳米蜜丸梧子大酒
服十九加至二十九

大鎮心散治心虛驚悸夢寤恐畏方

紫石英 茯苓 防風 人參 甘草

澤瀉各捌分 黃耆 秦艽 白朮 薯蕷

白斂各六分 麥門冬 當歸各五分 桔梗 大

豆卷 柏子人 桂心 遠志 大黃

石膏各四分 蜀椒 芍藥 乾薑 細辛各三分

右本十四味治下篩酒服二方寸匕日三

一方無紫石茯苓澤瀉乾薑有大棗四分

蜜丸如梧子酒下十五丸

又方治風虛心氣驚弱恍惚失常忽嘔肅悲

志意不樂方

紫石英 白石英 乾地黃一本無 朱砂

龍齒 人參 細辛 天雄 附子 遠

志 乾薑 茯苓 白朮 桂心 防風

各二兩

右十五味治下篩酒服兩方寸匕日三

小鎮心散治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚

心神不定惕惕然驚者方

小大參 遠志 白朮 附子 乾地黃

赤小豆 桂心 黃耆 細辛 乾薑

龍齒 正防風 蒼蒲 茯苓 兩 三

右十四味 治下篩 酒服二方寸匕 日三

鎮心 圓治男子婦人虛損 夢寤驚悸 或失精

神婦人赤白注漏 或月水不利 風邪鬼注 寒

熱 往來腹中積聚 憂恚結氣 諸病 力

紫石英 茯苓 芎藭 菴蓉 遠志

麥門冬 大黃 當歸 細辛 卷柏

大豆卷 乾薑 防風 人參 澤瀉

秦艽 丹參 石膏 芍藥 柏子人

三烏頭 桂心 桔梗 甘草 薯蕷

分白欬 鐵精 銀屑 前胡 牛黃

分乾地黃 白朮 半夏 麩 蠶 蠶

枚大棗 五味 為末 蜜棗和搗 五千杵 丸如

梧子大酒服 五丸 日三 加至二十九 一本

無大豆卷 人參

大鎮心圓所治與前方大同比是心病悉皆

主之

乾地黃六分牛黃五分羌活一分桂心一分麥

門冬一分秦艽 芍藥 人參 遠志 紫

石英 丹砂 阿膠 甘草 大黃 銀

屑一分白欬一分當歸一分乾薑一分防風各一分杏

子一分蜀椒各三分澤瀉 黃耆 茯苓 大

豆卷 薯蕷 茯神 前胡 鐵精 柏

子一分大棗四分桑螵蛸拾

右三十二味為末白蜜棗和丸酒服七丸

日三加至二十九

小鎮心圓治心氣少弱驚虛振悸胃中逆氣

魘夢參錯謬忘恍惚方

紫石英 朱砂 茯神 銀屑 雄黃

菖蒲 人參 桔梗 乾薑 遠志 甘

草 當歸 桂心各二分 防風 細辛 鐵

精 防已各一分 一方用茯苓二分為十八

味十分

右十七味末蜜丸如大豆飲服十九日三
加至二十丸

定志小圓治心氣不足五臟不足甚者憂愁
悲傷不樂忽忽喜忘朝差暮劇暮差朝發狂
眩者方

菖蒲 遠志 各二兩 茯苓 人參 各三兩

右四味為末蜜丸如梧子大飲服七九日
三加茯苓為扶神丸散服之亦佳

紫石英治久風虛冷心氣不足或時候怖方

紫石英 一斤 鍾乳 防風 遠志 桂心 各四兩

麻黃 茯苓 白朮 甘草 各三兩

右九味咬咀以酒三斗春月漬五日每服
四合日三亦可至醉常令有酒氣

聖惠方

治風驚諸方

夫風驚者由體虛心氣不足為風邪所乘也
心藏神而主血脉心氣不足則血虛虛則血
亂血亂則氣并於血氣血相并又被風邪所

乘故多驚心神不安各曰風驚也巢氏病源此下云診其脈至如數使人暴驚三四日自已

治風驚心神不安恒多恐怖宜服茯神散方

茯神壹兩生乾地黃一人參石菖蒲一兩去蘆頭

沙參壹兩去蘆頭天門冬一兩半去心焙犀角屑兩半

遠志半兩去心甘草半兩炙微赤剉

右件藥拍麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入赤小豆二七粒煎至六分去滓不計

時候温服

治風驚悶亂恍惚宜服人參散方

人參二兩去蘆頭生乾地黃一兩麥門冬一兩去心焙

白茯苓兩龍齒二兩犀角屑一兩小草一兩

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水壹中

盞煎至六分去滓不計時候温服

治風驚手足顛掉精神錯亂宜服金薄散方

金薄五拾片銀薄五拾片鐵粉二兩人參一兩

龍齒一兩琥珀一兩犀角屑一兩茯

神一兩酸棗人微炒防風三分葳蕤二分

麥門冬一兩半 去心焙 玄參三分 露蜂房三分 炙牛

黃半兩 細研

右件藥搗細羅為散入牛黃金銀薄更研

令勻每服不計時候以薄荷酒調下一錢

治風驚恍惚心神不安茯神丸方

茯神兩 牛黃一分 虎睛一對 酒浸 石膏二兩

細研 川升麻兩 麥門冬一兩半 去心焙 玄參兩 鐵粉

二兩 乾地黄兩 龍齒兩 金薄五拾片 銀

薄五拾片 細研

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時

候以人參湯下二十九

治風驚狂言妄語不得睡臥宜服鐵精丸方

鐵精一兩 龍齒兩 犀角屑壹兩 人參壹兩 去

菖蒲三分 遠志三分 去心 茯神壹兩 防風壹兩 去

門冬一兩半 生乾地黄一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二

十九

治風驚恍惚寢寐不安宜服菖蒲丸方

石菖蒲壹兩遠志壹兩白茯苓壹兩人參壹兩

半去防風三分去心去羚羊角三分鐵粉壹兩朱

砂壹兩金薄五拾片

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

丸如梧桐子大每服不計時候粥飲下二

十九

治風心神驚恐睡卧不安四肢煩熱宜服犀

角丸方

犀角屑半兩人參半兩去蘆頭去茯神半兩川升麻半兩

檀榔兩竜齒兩朱砂半兩細研細研金薄五拾片銀

薄五拾片

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗五七百杵丸如梧桐子大每服不計時

候以人參竹葉湯下二十九

治五藏風虛六腑邪熱風熱相搏令人寐即

驚恐憂恚寤即恍惚怔忡忽悲忽喜怕怖如

狂官服雄黃丸方

雄黃三分 人參壹兩 去盧頭 安息香分 川椒壹分

大目及開口 川大黃三分 剉鐵粉 半兩沉

香三分 防風半兩 去蒼黃 附子半兩 炮裂去皮臍

白茯苓半兩 朱砂三分 細研

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗五七百杵丸如梧桐子大每服不計時

候以人參茯苓湯下二十九

治風虛心驚不定龍齒丸方

龍齒壹兩 人參壹兩 去遠志 三分茯神 壹兩鐵

粉壹分 金甯五拾片 防風三分 去甘草 半兩

炙微 銀薄五拾片 赤剉細研

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時

候以粥飲下十五丸

治風驚心神不安宜服鐵粉散方

鐵粉兩 光明砂壹兩 天竹黃壹兩 鉛霜壹兩

右件藥都細研如麩每服不計時候以竹

瀝調下半錢

治風驚悸諸方

夫風驚悸者由體虛心氣不足故也心之經為風邪所乘則恐懼憂迫令心驚不得自安驚若不已則悸動不定其狀目睛不轉而不能言診其脉動而弱名驚悸也動則為驚弱則為悸也

治風驚悸心神不安宜服犀角散方

犀角屑半兩防風三分去蘆頭枳殼三分炒少微黃去瓢獨

活三分茯神壹兩黃連三分白鮮皮半兩麥門冬

壹兩半甘草半兩炙去心燒微赤到

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治風驚悸言語錯誤恍恍憤憤心中煩悶宜

服遠志散方

遠志壹兩白茯苓壹兩獨活三分白芍藥三分當

歸三分麥門冬三分人參三分去蘆頭羚羊角屑

三分黃耆三分桂心一分甘草半兩炙微赤到

右件藥擣篩為散每服四錢以水膏中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治風經五藏恍惚驚悸神思不安宜服茯神

散方

茯神壹兩人參壹兩防風半兩遠志半兩
去天麻壹兩羚羊角一分白鮮皮半兩菴骨壹兩
酸棗仁壹兩桂心壹兩獨活壹兩甘草半兩
右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治風虛心氣不足驚悸汗出煩悶短氣悲喜
恚怒不自覺知咽喉痛口唇黑嘔吐舌本強
水漿不通宜服紫石英散方

紫石英二兩麥門冬壹兩射干三分人參壹兩
蘆頭壹兩龍骨壹兩遠志三分茯神壹兩當歸壹兩
防風三分甘草半兩川升麻三分沉香壹兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中
蓋入赤小豆二十一粒煎至六分去滓不
計時候溫服

治風經五藏恍惚驚悸安神定志宜服犀角
散方

犀角屑壹兩人參壹兩去去遠志二分甘草半兩

炙微枳心三分獨活三分酸棗人壹兩生乾地

黃壹兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生薑半分薄荷二七葉煎至六分去
滓不計時候溫服

治風驚悸心氣不足其病苦滿汗出煩悶喜
恐不自覺知咽喉乾痛時時吐血五心常熱
宜服麥門冬散方

麥門冬壹兩半紫石英壹兩細研紫苑壹兩洗

白茯苓壹兩人參壹兩去去杜心半兩甘草半兩

赤壹兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生薑半分赤小豆三十粒煎至六分去滓不計時候溫服

治風虛驚悸心神煩悶睡卧不安宜服丹砂丸方

丹砂壹兩細研鐵粉壹兩細研金薄五拾片細研銀薄五拾片細研人參壹兩半去蘆頭茯神二兩秦艽壹兩去苗升麻壹兩子芩兩白鮮皮壹兩麥門冬壹兩半去心焙龍齒壹兩木香兩枳實壹兩炒微黃甘草半兩炙微赤剉右件藥搗羅為末入研了藥更研令勻鍊

蜜和壽五七百杵丸如梧桐子大每服不計時候以荆芥湯下二十九忌生血等

治風熱驚悸心風狂亂宜服牛黃丸方

牛黃壹分細研朱砂三分細研天竹黃半兩細研竜腦壹分細研木香壹分白附子壹分炮裂犀角屑兩天南星壹分炮裂半兩螂半兩炒去足微鉛霜壹分細研人參二分去蘆頭茯神三分天麻兩防風半兩去蘆頭右件藥搗羅為末入研了藥都研令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如菉豆大每服不計

時候以荆芥湯下二十九忌生血

大全本草

梅師方治卒驚悸九竅血皆溢出以井花水
噴面當止勿使知之

日華子云鐵胤粉止驚悸虛癩鎮五藏去邪
氣強志引筋治骨徙忘冷氣心痛炫癩癥
結脫肛痔瘻宿食等及傅竹木刺其所造
之法與華粉同惟懸於醬甕上就潤地及
刮取霜時研淘去麤汁鹹味烘乾

蛇黃椎破中間有如自然銅者佳治心悸動

火燒赤酒焙半酥二兩朱砂壹兩與蛇黃
同研水飛天麻二兩別為末與前二味令
勻每以半錢少以薄荷湯調食後夜臥服
殊効

三因方

驚悸證治

溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥
或異象惑遂致心悸膽懾氣鬱生涎涎與氣

搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安夢寐不寐

半夏湯洗七次竹茹 枳實麩炒去穢橘皮三兩

法甘草炙壹兩白茯苓壹兩半○嚴氏濟生乃去皮

右為剉散每服四大錢水壹盞半姜五片

棗一个煎七分去滓食前服濟生方溫服不拘時候

○直指方半夏製枳殼製白茯苓各壹兩橘

紅壹兩甘草炙半兩右剉每服叁錢半薑

片棗二枚刮青竹皮壹塊如錢大煎服或

加製遠志尤妙示未增益不詳減三

鎮心丹大治驚悸方見癩癩門

定志圓治心驚膽懾方見健忘門

寒水石散治因驚心氣不行僻而乍涎涎結

為飲遂為人疾忪悸憤懣不自勝持少水遇

驚尤宜服之仙中寒者不宜服

寒水石煨滑石水飛各壹兩甘草生壹分

右為末每服二錢熱則新汲水下怯寒則

煎姜棗湯下入龍腦少許尤佳小兒量歲

與之

是齋醫方

寒心氣

心風

治心氣不足方

得効方名鎮心元治心氣不足

心脉虛弱而心

羊並宜服之大附子壹箇去皮臍切作

片子踈絹袋盛用生地黃自然汁壹大升

銀石器中慢火熬候地黃汁將盡取出附

子燉乾為細末內人地黃餘汁研成劑元

如錄且大每服三十元米飲吞下若病二

三十年者只兩箇附子可較三二年者壹

箇附子可較

澹寮方與得効方同

治心氣虛損崑山神濟大師方獻張魏公丞

相韓子常知府閣中服之有効猪腰子壹

隻用水兩碗煮至壹盞半將腰子細切入

人參半兩當歸上去蘆下去細者取中段

半兩並切同煎至八分喫腰子以汁送下

有喫不盡腰子同上二味藥滓焙乾為細

末山藥糊元如梧桐子大每服三五十元

此藥多服為佳平江醫者丁御幹為葛樞
密云此藥本治心氣怔忡而自汗者不過
一二服即愈蓋奇藥也

引神歸舍丹治心氣亦治心風盛覺民傳王
宣子尚書方

大天南星

厚去皮取心附子一箇重七錢
秤一兩生用以上者炮去

皮朱砂壹兩
臍水飛

右為細末用猪心血為元如梧桐子大如
不稠粘入麵糊少許煎忘憂草根湯下
得効

方進寮

子午之交各壹服每服十五元神

方醫方大成集成成南北經驗
方補珍方永類鈔方同

治心氣桂真官方呂少張淳熙壬寅丁家難
積憂之後遂成狂易之疾服此壹劑即定繼
以麩仁之類心氣藥此日而後瘳碩夫知府
云采何

青右辰砂半兩為細末以好酒二升銀石或
砂器內慢火熬至半升許入麝香壹錢更
煎數沸取出隨意飲之以盡為度心神既

定知服補心氣藥即愈
 乳珠砂大治一切心氣盛覺民傳王宣子尙
 書方
 元朱砂壹兩有墻壁透明者方可用
 右用石葦葉裹之以布線縛定用人乳汁
 壹小甌入銀盃內以物覆之重湯內煮候
 乳汁乾研細元如梧桐子大空心溫酒下
 陸元不葦葉當以新布拭去毛方可用
 大治心氣育神養氣香參散道寧蘇先生仁

仲戊子年心氣大作服此而愈韜光傳韜光姓蘇

新羅人參剉薄片秤半兩濕紙裏煨大北棗三枚以丁香三粒

納其中濕紙裏煨生薑指大壹塊切作兩片以兩盞少許納其中濕紙裏煨

右件咬咀以水壹升於銀石器內慢火熬

大成壹盞以下睡覺煩悶時頓服若常服則

每料可作數劑

治心神不定恍惚不樂火不下降時有振跳

消陰養火全心氣朱雀元蘇韜光傳韜光姓蘇

不止

茯神二兩 並 沉香半兩 並

右煉蜜元如小豆大每服叁十元食後入

參湯下甚妙得効方澹

軟朱砂法補心氣輕捷手足治廢志趙從簡

方方

題塊有墻壁辰砂一兩 研

右以好清麻油四兩白及二兩木通壹兩

於油內煎令焦黃濾去放令油如人體温

於磁器內和辰砂末令如餛飩以皂角漿

水洗去油却用新汲水洗去皂角漿於磁

合內以新水養之每日早晨換水空心就

舌上麻七粒如桐子大若用壹匙頭許以

温酒化下亦得有人病心虛每見垂掛動

搖之物輒忘之服此遂愈

十四夜元補諸虛不足益血收斂心氣治怔

忡不寧精神昏倦睡卧不安

栢子仁別遠志去心

酸棗仁直指方湯浸紫石英明亮者

別熟乾地黃得効方澹川當歸洗淨去蘆白茯苓

神得効方去皮大人參得効方白茯苓得効方

方黃黃直指方得効方阿膠蛤粉肉

桂不見火已澹一兩直指方龍齒壹

半直指方壹兩辰砂半兩別研大成一

錢大成一

右為細末煉蜜為元如梧桐子大每服三

四十元棗湯下食後臨卧服大成每服三

湯下醫方集成南北經驗方拾元食後棗此韓魏公方

云予舊有心疾怔忡健忘夢寐恍惚多不

得睡睡狀無不有心藥無不服用尺醫工

謂此疾未思愁憂慮耗心而得之今欲

安心當用地黃當歸等滋養心血若更服

發散藥如葶蒲之類心氣愈散必有以收

斂之始見功又本用心過而成宜更用阿

膠煎者補之乃撰成此方大覺有神效續

謂收斂藥則神子謂訶子但及腸胃不

如竜齒肉桂大行血亦欲以行諸藥渾同

無害也

小補心元紹興府慧應都正方錢文子傳

天門冬斤 鹽麥門冬斤 鹽乾山藥斤 鹽熟乾地黃

五味子斤 夜蓀蒲各二斤 人參去蘆 茯神去木 伏

苓各拾兩 遠志法 官桂去皮 各拾兩 地骨皮酸

棗仁各四兩 龜齒各四兩 桐子仁三斤 心血 赤更 煎

右為細末煉蜜為元如梧桐子木朱砂麝

香為衣每服三十元溫酒送下

補心神効元翟參政家秘忘錄藥譜卷九

黃耆到了蜜湯少 茯神去木 人參去蘆 遠志去心

各四許拌勻焙乾 熟乾地黃三兩 桐子仁別 酸棗人湯泡

去殼炒熟 五味子各二兩 朱砂壹分 別研

右為細末煉蜜元如梧桐子大每服五十

元米飲或酒任下盜汗不止麥麩湯下亂

夢失精人參龍骨湯下卒暴心痛乳香湯

而下虛煩發熱麥門冬湯下吐血人參湯下

前大便下血當歸地榆湯下小便出血茯苓

車前子湯下中風不語薄荷生薑湯下風

癩涎潮防風湯下

治心風張德明傳其閤中失心數年服此藥

而愈後再作服第二方遂安

水銀半兩生薄荷壹大握和水麝香壹錢建茶

好者研壹分半夏一兩以生姜汁煮五拾沸

乾搗為細末右作藥都入在薄荷泥內更研千百轉元

如芥子大金銀湯下十五元臨睡時服三

日再進壹服

第二方

朱砂一分別研乳香壹分人參半兩白茯苓半兩伏

神半兩琥珀半兩酸棗仁溫酒浸半日去殼了

以壹兩半浸去遠志酒浸半日新布裏推

殼只得壹分仁去心焙乾半兩以壹

兩只得石菖蒲半兩小而節密者

右為細末煉蜜為元如梧桐子大每服三

十元食後酒下日進二服如不能飲酒以

棗湯下此藥可常服

治心風吐藥瓜蒂散全生指迷方張德明閤

中服之吐涎甚多遂安又以醫陳武功亦効

瓜蒂末 赤小豆末 等分

右二味研勻熱米飲調壹錢羸人半錢得

吐卽止德明閣中服三錢方吐數日後又

服遂全安

治失心張德明傳秦太師以治徐履之疾

黃丹 硝石 各二兩

右煨硝石成汁以皂角逐小段子投其中

直候無火方止去皂角以黃狗肝壹具用

竹刀切作片子摻藥末數錢於中同煮食

又方蛇含石 四兩煨通 鐵粉 二兩代赭石 四兩煨通

紅醋 麝香 二錢 朱砂 五錢 一半為衣

其右件為細末用糯米粉二兩作糊為元分

其作二百陸十元每服壹二元漿湯下

寧志元好辰砂壹兩將熟絹壹小片包裹以

線扎定獐猪心壹枚以竹刀子切破不得犯

鐵用紙拭去血入朱砂包子在猪心內却用

麻線縛合猪心又以刮笱殼再裹了麻皮扎
 定無灰酒二升入砂罐子或銀器內煮令酒
 盡為度去線并箏殼取辰砂別研將猪心以
 竹刀細切砂盆內研令爛却入後藥末六件
 并辰砂棗肉為元留少辰砂為衣藥末須隔
 日先碾下棗肉於煮猪心廿絕早煮熟剝去
 皮核取肉四兩用此方澣十太尉之子六將
 使傳乃姪嘗患心風服此壹料病減十之八
 矣

人參半兩 白茯苓半兩 當歸半兩 石菖蒲
洗去上蘆
 乳香同兩 酸棗仁半兩 湯浸去酸棗仁 五兩
淨仁炒令赤 可剝半兩
 香熟為度

右同和元如梧桐子火以留下朱砂為衣
 每服五升元人參湯下得効不拘時候干
 抱膽元治男子婦人一切癩癩風狂或因驚
 恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并
 室女月脉通行驚邪蘊結此方累曾經効本
 是忠懿王之子有疾忽得一僧投此服之即

効本名靈砂觀音丹忠懿得之未敢信忽然
 有一風犬飼以此藥藥效即破犬腹而視其
 藥乃抱犬膽因易今名張升之傳人
 水銀二兩朱砂一兩黑鉛一兩滴乳香十兩
 已出將黑鉛人銚子內下水銀結成砂子
 次下朱砂滴乳香二味乘熱用柳木棗研
 勻元如雞頭人每服一元空心用井花水
 吞下澹寮方同病者得睡切莫驚動覺來即安
 再進壹元可除根本得効方同

治驚氣入心絡暗不能言語夷堅已志十五
 卷章倅聿

蜜陀僧 研極細如粉

右以茶調服壹錢匕壹服即愈昔有人為
 狼及惡蛇所驚皆以此藥療而愈田師中
 太尉秘方亦治暗風蜜陀僧大如兩指者
 壹塊以鐵線密纏留鐵線一條懸空掛之
 四邊以火煨令通紅酒壹升醋壹升合和
 淬藥取酒醋盡為度出火毒一宿研令極

細每服一錢麝香酒調下吐涎不妨
歸神丹治一切驚憂思慮或夢思恍惚作事
多忘但是一切心氣不足癩癩狂亂悉皆治
之華宮使傳

顛塊朱砂二兩獷猪心二個燈心三兩

右將猪心切開入朱砂燈心在內麻線繫
合於銀石器內煮一伏時取出不用猪心
及燈心只將朱砂研極細用真茯神末二
兩酒煮薄糊和朱砂為元如桐子大每服

九元至十五元加至二十壹元用法心麥

門冬煎湯下癩癩至甚者乳香人參湯下

夜寢不寐或多亂夢炒酸棗仁湯下

瑣粹錄

主夜神呪持之夜行及寐可却恐怖惡夢呪

曰婆娑婆演底

直指方

驚悸證治

養心湯治心虛血少驚惕不寧

黃耆炙 白茯苓 伏神 半夏麴 當歸

川芎各半兩 遠志取肉薑汁淹焙 梓桂 栝子仁

酸棗仁浸去皮隔紙炒香 北五味子 人參各壹分

甘草炙肆錢

右上 齏末每服叁錢薑五片棗貳枚煎食前

服加檳榔赤茯苓治停水怔悸

寧志圓治心虛血虛多驚

人參 白伏苓 伏神 栝子仁 琥珀

當歸 酸棗仁溫酒浸半日去殼隔紙炒香 遠志酒浸半日

新布裏搥取 肉焙各半兩 乳香 朱砂別研 石菖蒲各一分

右末煉蜜圓桐子大每叁十圓食後棗湯

下

參乳圓治心氣不足怔忡自汗

人參半兩 當歸一兩 乳香一錢

右末山藥煮糊圓桐子大每叁肆十圓食

後棗湯下

蜜隨僧散治大驚入心敗血頑痰填塞心竅

不能言

蜜陀僧即是爐底研極細

右每服挑壹大錢七無熱者用熱酒調下

有熱者沸湯泡麝香調下亦治瘖風頗有

奇效出夷堅志

加味四七湯治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏製二兩半白茯苓厚朴製各壹兩半

伏神紫蘇葉各壹兩遠志薑汁煎濕甘草

右剉每服肆錢薑七片石菖蒲半寸棗貳

枚煎服方同

伏苓甘草湯治心下停水忪悸

伏苓桂枝各二兩甘草壹兩生薑三兩

右剉每服肆錢水煎服

博采湯治虛證停飲怔忡

白薑生白朮伏苓各半夏麴兩薤桂

壽域神方兩甘草壹分

右剉每服叁錢薑棗煎服○得効方在判

散每服三錢水壹盞生姜三片紅棗壹枚

煎神方七分温服不拘時候

小半夏伏苓湯五苓散並主水氣心下怔忡

方規木腫門

炙甘草湯治心下動悸其脉結代動而時止

曰代

甘草炙一兩人參兩半生乾地黄兩四桂枝三分麻

仁各一分麥門冬壹合生薑三分大棗八枚

右麤末每挑參大錢水壹盞半酒半盞煎

至八分入透明阿膠一片俟膠消温和服

日進三劑不拘時

寧志膏治因驚失心

人參湯浸去皮酸棗仁各壹兩辰砂兩半滴乳香

壹錢乳鉢坐水研

右末煉蜜和杵圓如彈子每一圓薄荷湯

化下○醫方大成治心氣虛耗神不守舍

恐怖驚惕恍惚健忘睡卧不寧夢涉危險

一切心疾並皆治之人參去蘆酸棗仁沙

皮取末辰沙研細水乳香二分以之坐右

和勻煉密圓如彈子大每服壹圓温酒棗

湯空心化下醫方集成南北經驗方

嚴氏濟生方

怔忡

益榮湯治思慮過制耗傷心血心帝無輔怔

忡恍惚善悲憂少顏色夜多不寐小便或濁

當歸酒浸黃芪去蘆小草去蘆酸棗仁炒去殼柏

子仁炒麥門冬去心茯神去木白芍藥

紫石英細研各一兩木香不見火人參 甘草炙

半兩○澹寮
加各一兩

右喚咀每服四錢水壹盞半醫方大成集

去滓温服不拘時候得効生薑五片棗壹枚煎至七分

龍齒治心虛寒怔忡不眠痰多恍惚

附子炮去皮切片遠志去心

酸棗仁炒去殼當歸酒浸官桂去皮不曉

琥珀研南星剉薑汁浸一宿各一兩木香不見

火紫石英煨醋淬沉香別研熟地黃

酒蒸各半兩 存為細末煉蜜為圓如梧桐子大朱砂為衣每服五十圓用漿湯送下不拘時候
 法丹治憂愁思慮謀用過度或因驚恐傷神
 失志耗傷心而怔忡恍惚夢寐不安

朱砂五拾兩 新羅人參 遠志去心甘草煮 熟地

黃洗淨酒 白朮 石薺蒲當歸 去蘆酒

麥門冬法 黃芪法 茯苓法 茯神法 柏子仁

揀木鱉仁炒去殼 石蓮肉去心炒 益智仁已上各五

兩

右加入參等十四味各如法修製剉碎拌勻次將此藥衮和以夾生絹袋盛貯用麻線緊繫袋口於尖上安大銀鍋壹口着長流水令及七分重安銀罐入白沙蜜二十斤將藥袋懸之中心勿令著底使蜜浸袋令沒以桑柴燒鍋衮沸勿令火歇煮三日蜜焦黑換蜜再煮候七日足住火取出淘去衆藥洗淨砂令乾入牛心內蒸七次蒸

煮砂時別安銀鍋壹口煖水候大鍋水耗
 從鍋弦添溫水候牛心蒸爛熟取砂再換
 牛心如前法蒸凡換七次其砂已熟即用
 沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研直候十分
 細米粽為圓如豌豆大陰乾每服十粒至
 貳十粒食後參湯棗湯麥門冬湯任下
 茯苓飲子治痰飲蓄于心胃怔忡不已
 赤茯苓去皮半夏湯泡七次茯神去木橘皮去白麥門
 冬去心各壹兩沉香不見火甘草炙檳榔各半兩

右咬咀每服四錢得効方水壹盞半醫方
 壹生薑五片煎至七分去滓溫服不拘時
 候醫方集成袖珍方永類鈔方與大成同
 排風湯治風虛冷濕閉塞諸經令人怔忡方
 諸風宜加炒酸棗仁煎永類鈔方同得効
 壽星圓得効方名加合驚憂思慮氣結成痰
 留蓄心胞怔忡驚惕痰逆惡心睡卧不安永類
鈔方同方見諸風門

驚悸

遠志圓治因事有所大驚夢寐不祥登高陟
 險神魂不安驚悸恐怯○醫方大成治因事
 有驚心神不定夜夢驚墮小便白濁不安
 遠志去心薑汁石菖蒲各二兩○有茯苓
 木白茯苓皮人參二道齒各一兩茯苓神皮
 右為細末煉蜜為圓如梧桐子大辰砂為
 衣每服七十圓用熱水送下食後臨卧醫方
 集或袖珍方永類
 鈞方與大成同
 得効方

一心恙

熱證朱砂圓鎮心神化痰涎退潮熱利咽膈
 止煩渴

鐵粉 天竺黃各一兩 金銀箔各二拾片 人參二錢

腦子半錢 生麝香一錢 輕粉二錢 真犀角上二錢 海金

砂一兩 朱砂五錢

右為末水圓朱砂為衣共圓作陸伯圓每

壹圓至五圓痰盛潮熱薄荷沙糖牛葛白

然汁井水下狂言謔語涎壅膈土地龍三

兩薄芎及沙糖水研心神不寧金銀箔薄
芎湯化下

洗心散治心神煩燥涎壅咽乾口苦多渴方
積熱

瀉心湯治心受積熱譫言發狂逾牆上屋

大黃 黃芩 黃連 各五錢

右剉散每服四錢水壹盞半煎服

甘遂散治癩癰及婦女心風血邪右以甘遂

一錢為末用猪心取三管血三條和甘遂

多少和之將心批作兩片入在內再合線

縛定外用皮紙裹濕慢火煨熟不可焦過

取藥細碾入辰砂末一錢和勻分作四圓

每服一圓將所煨猪心煎湯化下再服別

用猪心亦可過半日大便下惡物後調和

胃氣凡此病乍作乍醒者甦不食迷癡者

死

辰砂妙香散治男子婦人心氣不足志意不
定驚悸恐怖悲憂慘懣虛煩少睡喜怒不常

夜多盜汗飲食無味頭目昏眩

麝香一錢山藥姜汁炙人參半兩木香煨壹

○永類鈴二錢半茯苓焙茯神去皮黃耆各一桔

梗半兩甘草炙遠志去心姜汁辰砂三錢

右為末每服二錢温酒調不以時候

虛證引神歸舍丹方見是

茯神圓治心虛或癩或疼

附子大者壹枚作罌入槐粒朱砂半兩依

裹煨

右為末獐猪心血為圓人參湯下澹寮

驚氣圓治驚憂積氣心受風邪發則牙關緊

急涎朝昏塞醒則精神若癡

附子炮去南木香白僵蠶炒花蛇酒浸

皮橘皮去節麻黃去毒乾蝎去毒紫蘇子

兩炒天南星洗浸一夕牛兩朱砂壹分留

衣右為末入研腦子麝香少許同研勻煉蜜

圓如龍眼大用少朱砂為衣每服一圓金

銀蒲苛湯化下温酒亦可。○澹察方又云
因驚癡狂軍中有犯法者褫衣將受刃得
釋神失如癡與驚氣圓壹粒服訖而寐及
覺病已失矣又黃山沃巡檢妻狂厥踰年
更十餘醫而不驗卽其方去附子加鐵粉
亦不終劑而愈鐵粉非但化痰鎮心至如
摧抑肝邪特異若多恚怒肝邪大盛鐵粉
能制伏之素問云陽厥狂怒治以鐵落飲
金制木之意也 本事方

鎮心圓

方見是齋醫方

通治鐵粉散治顛狂譫語亂說神祟不避親
踈登高履險或歌或笑裸體不飲食數日昏
不知人及風訂狂怒或如醉如癡
顛塊大朱砂 壹兩 另研 紅明琥珀 一兩 另研 天南星
二圓白半夏 二兩 白礬 煨五錢 真鐵粉 白附
子 各二兩 大川烏 生去皮臍 一兩半 羌活 二兩 全蝎 十
介 真金箔 三拾片 僵蠶 一兩 去絲
右爲末每服四錢生姜四兩淨洗取自然

酒然再服稍甦多服此藥大能去痰安平必矣

陳艾湯治盜汗只自心頭出者名曰心汗

茯苓二兩半

右為末每服二錢濃煎艾湯調下

歸神丹治一切驚憂思慮恍惚作事多忘心氣不足癩癩狂亂及大病後心虛神不守舍

久服養神思益眼力

顛塊大朱砂

二兩入猪心內煨心纏縛用無灰酒蒸煨久取出另研

金箔二拾片另研

真銀箔

二十片另研

深紅琥珀

一兩

另研酸棗仁

去殼二兩

大遠志

取淨皮薑汁拌炒二兩

白茯苓

神去木羅參

二兩大當歸

去尾二兩

龍齒

二兩

右為末酒煮稀糊圓如梧子大每服二九

圓至三九圓去心麥門冬湯下癩癩甚至

者乳香人參湯下夜寢不寐或多亂夢炒

酸棗仁湯下

平補鎮心丹治丈夫婦人心氣不足志意不

定神情恍惚夜多異夢忪悸煩鬱及腎氣傷

敗血少氣多四肢倦怠足脛酸疼睡臥不穩
夢寐遺精時有白濁漸至羸弱○醫方大成
治心血不足時或怔忡夜多異夢如墮層崖
常服安心腎益榮衛

酸棗仁去皮隔紙微炒二錢半車前子去沙土碾一兩二錢半

南北經洗酒白茯苓去皮五味子去枝梗壹兩

地骨洗酒天門冬去心○經方四錢半遠

志去心甘草洗淨薑汁製茯神去皮

壹兩麥門冬去心肉桂不見火各一兩二錢

皮人參五錢○大成龍齒壹兩朱砂細研半兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服三十圓空

心飯飲下溫酒亦可醫方集成油珍方永類鈔方與大成同

加至五十圓常服益精髓養氣血悅顏色

獨效苦丁香散治忽患心疾癲狂不止得之

驚憂之極痰氣上犯心包當伐其源右以

苦丁香即瓜蒂半兩為末每服壹錢重井

花水調滿壹盞投之得大吐之後熟睡勿

令人驚起凡吐能令人日翻吐時令閉雙
目或不省人事則令人以手密掩之信乎
深痼之疾必投瞑眩之藥吐不止以生麝
香少許溫湯調即解
怔忡

棗肉靈砂專治虛人夜不得睡夢中驚魘自
汗忪悸

靈砂二錢 人參半錢 酸棗仁肉壹錢

右為末棗肉圓臨臥時棗湯吞下五七粒

澹寮方壽域神方同

五苓散治水氣心下怔忡見方諸暑門

驚悸

十味溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚夢寐不
祥異象感惑遂致心驚膽懼氣鬱生涎涎與
氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗四肢
浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安

半夏湯洗七次枳實去穢切陳皮去白各白茯苓

苓去皮酸棗仁微炒大遠志去心甘草水煮

北五味子 熟地黄切酒炒 條參各壹兩 粉草

五錢 右剉散每服四錢水盪半薑五片棗壹枚

煎不以時服五錢 治驚悸不寧方見是

十四友圓治驚悸不寧方見是 驚氣圓治挾風驚懾方見

澹軒方 驚入心路口瘡

火盜兵戈驚入心不言不語日成瘡蜜陀僧

未例如粉茶服壹錢徐有音

截驚 芭蕉汁付薄荷煎留取顛門塗腦遍更塗手

足只留心此藥絕驚無不驗

用後方 治卒得驚邪恍惚方

若驚憂怖迫逐或驚恐失助或激憤惆悵致

志氣錯越心行違僻不得安定者竜骨遠

志伏神防風牡蠣各二兩杜草七兩大棗

類聚百集

類聚百集

類聚百集

類聚百集

類聚百集

類聚百集

類聚百集

類聚百集

類聚百集

七枚以水八升煮取三升分再服日日作之取差

又方扶苓乾地黄各四兩人參桂各三兩甘草二兩麥門冬壹升去心半夏六兩洗滑生薑壹斤以水一斗又殺烏鷄取血及肝心煮取三升分四服廿三夜一其間少食無爽作三劑差

又方白雄鷄一頭治如食真珠四兩切薤白四兩以水三升煮取二升宿勿食旦悉食

深鷄等及飲汁盡

治女人與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者末雄黃壹兩以松脂二兩溶和鹿爪攪令如彈丸夜內火籠中燒之令女人侵坐其上被急自蒙唯出頭耳一令未差不過三劑過有斷也

又方雄黃壹兩人參壹兩防風壹兩五味子壹升擣篩清旦以井水服方寸匕三服差師往以針五枚內頭髻中狂病者則以器貯

水三赤新布覆之橫木刀於上悉乃矜莊
呼見其人其人必欲起走慎勿聽因取一
天噴之其呵視三通乃熟拔去木指彈額上
近髮際問欲愈乎其人必不肯答如此二
七彈乃答欲困杖鉅刺鼻不入近孔內
側空停針兩耳根前宛宛動中停針又刺
鼻直直入髮際意寸橫針又刺鼻直直入
其乃其詰問怱怱醒悞則乃止矣
若男女喜夢與鬼通致恍惚者鋸截鹿角屑

酒服三指撮日三

簡要濟衆方每心藏不安驚悸善忘上高風
熱化痰白石英一兩朱砂壹兩同研爲散
每服半錢食後夜卧金銀湯調下

心中客熱勝眩問連脇下氣妨常日憂愁不
樂兼心忪者取莎草根二大斤切齧令香
以生絹袋貯之於三大斗無灰清酒中浸
之春三月浸一日卽堪服冬十月後卽七
日近暖處乃佳每空腹服一盞日夜三四

服之令酒氣相續以知爲度若不飲酒
卽取莎草根十兩加桂心五兩蕪蕪三兩
和搗爲散以蜜和爲丸擣一千杵丸如梧
子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二
十丸日再服漸加至三十丸以差爲度
澹寮方

心恙

附癲癩

心乃神明之舍心旣病則神不守舍言不擇
理之常也甚則神飄於外知人之隱微言人

之禍福多疑其附於鬼邪固未必皆然縱有
之亦因於心先病而神先亂鬼邪乘隙而入
豈可獨信巫而不信醫耶况黃帝與岐伯問
荅之際已曰人生而癲者在母腹中有所失
驚氣上而不下精氣并居故子發爲癲又方
書謂陽虛陰實則癲陰虛陽實則狂癲狂乃
陰陽虛實而爲之可不以藥石均調之乎第
病旣有陰陽藥亦當有補瀉謹不以實實虛
虛故治各有方也

洗心散治風癰壯熱頭目昏痛肩背拘急肢體煩疼熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘心神煩躁眼澁時疼及寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴五心煩熱小便赤澀大便秘滯

下 附子 甘草 芍藥 麻黃 芩 大黃 麵裹煨 去麩切 甘 草 炙 當 歸 去 芍 藥 小 麻 黃 節 不去 荆 芥 穗 各 六 兩 白 朮 兩 半 芎 藭 兩 半 附 子 兩 半 同 右 為 細 末 每 服 二 錢 水 一 盞 入 生 姜 薄 荷 少 許 同 煎 至 七 分 去 滓 溫 服 如 小 兒 麩 豆

瘡疹欲發先狂語多渴及驚風積熱可服一錢並臨臥服如大人五臟壅實欲要瀉轉加至四五錢乘熱服之

鎮心丹治心氣不足病苦驚悸自汗心下煩悶短氣喜怒悲憂恐不自知亡魂失魄狀若神

治心氣不足老人虛人及用心過度者心脉
虛弱而心恙並宜服之方見是齋醫方

引神歸舍丹方見是齋醫方

心虛或癩或疼方見得效方

三方皆用附子無非療心虛者然亦當察
其所佐之劑何如庶幾主對詳悉愚見一
婦人心痛而心部脉微弱用此後一方有
效

凡人患癩狂叫喚打人者皆心經有熱當用

鎮心藥兼大黃與之瀉數日然後用安神
及風藥但得寧靜即是安樂不可見其瘦
弱減食便以溫藥補之補之病必再作戒
之戒之緩緩調治飲食可也御覽

夢魘人眠則魂魄外遊為邪鬼所魘屈其精
神弱者魂則不得寤乃至氣絕所以須旁
人助喚并以方術治之低聲遠喚即活雜方

治盜汗只自心頭出者名曰心汗

右為細末每服二錢濃煎艾湯調下

吳郡人顧歡字玄平隱於會稽山陰旧信仁

愛治疾或以厭禳而多所全獲有病邪者

問歡歡曰君家有書乎曰唯有孝經曰可

置病人枕邊恭敬之當自差如其言果愈

問其故曰善禳惡正勝邪

吳均齊春秋

韋綬李蟠俱以心疾癡蟠常疑遇毒鎖井而

飲李益少而疑病心亦心疾也心靈府也

為外物所中終身不差多思慮多疑感病

之本也

國史補

癡狂之疾何以別答曰狂之始發少臥少飢

自賢自貴妄笑好樂又曰癡者精神不守

言語錯亂甚則登高罵詈或至狂走癡者

發則仆地嚼舌吐沫手足搐搦或作六畜

之聲頃刻則蘇癡者邪入於陰經一日陽

併則狂癡者邪干於心其處方用藥亦皆

相類

素問

拔粹方

朱砂安神丸治心煩懊懣心亂怔忡胃中氣亂心下痞悶食入反出

朱砂四錢黃連五錢生甘草二錢

右為細末蒸餅為丸如黃米大每服卅丸

唾津送下

醫方大成

濟生方歸脾湯治思慮過度勞傷心脾健忘

怔忡

白朮去茯神去黃耆去龍眼肉思酸棗仁

人參各木香不見火甘草炙二錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗壹枚

煎七分溫服醫方集成南北經驗方袖珍方同

永類鈴方

怔忡 驚悸

驚氣元治心受風邪涎潮昏塞醒則精神若

癡及驚憂積氣者有就刑之卒得免心驚怖

不止用乙粒愈方見諸風門

簡易育神散理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小便白濁

人參白木白茯苓白茯苓白朮白朮當歸酒

乾姜炮白茯苓防風遠志去心龍骨別

赤石脂細研桂心別入紅芍藥細

各等分

右細末每二錢水盞半姜三片棗壹枚煎

七分食後服

龍齒湯理心下怔忡裳懷憂慮神思多驚如

隨險地小便或赤或濁

官桂二兩半夏制人參二白茯苓二甘

草多當歸別龍齒研桔梗炒遠志去枳殼去

制各乙兩半黃芪蜜炙茯神各乙

右細末三錢服水一盞姜三片棗乙个粳

米百粒煎服

定心湯理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢

中失精

人參白茯苓茯神黃芪蜜炙焙白

赤石脂制厚朴制川芎紫苑茸

防風各二兩麥門冬去心兩半肉桂半兩甘草各

右咬咀錢水壹盞赤小豆七十粒煎七

分食後服

玉匱元治心氣不足大補心腎大附子八錢

重乙个去皮臍作窠子辰砂乙兩研入附

子窠內不盡者留入木瓜內鋪蓋附子

大木瓜乙个去皮臍作缸子入附子在內

須留瓜蒂蓋之用竹簽釘定蒸熟一法以

人參切片砌定附子於木瓜內又用白磁

椀盛木瓜於甌上蒸一七日於沙鉢內研

如糊次入乾茯苓末拌和元梧子大每二

十元人參湯温酒亦可

雄宋元治丈夫婦人驚憂失心或思慮過多

氣結不散積成痰涎留灌心包窒塞心竅以

致狂言忘語叫呼奔走

揀大塊朱砂乙分白附子乙錢明淨雄黃

乙分研極細

右和勻以豬心血和元梧子大別用朱砂
為衣每三粒用人參菖蒲湯吞下常服之
粒能安魂定魄補心益氣

人參固本元夫心生血血生氣氣生精今人
滋補而氣多爪性熱藥此方用生地黃能生
精血用天門冬引入所生之地熟地黃能能
補精血用麥門冬引入所補之地人參能通
心氣使五味併歸于心此為滋補又名二黃
元消渴中地黃飲子全用此品

生地黃洗 熟地黃洗再 天門冬去 麥門冬
去心各 人參半

右細末蜜元梧子大空心搥酒或温酒下
三十元

鎮心爽神湯埋心腎不交上盛下虛心神恍
惚睡多驚悸小便頻數遺泄白濁

石菖蒲去毛 甘草炙四 人參 赤茯苓
當歸酒浸各 陳皮淨 山藥 紫苑 半夏
制川芎 五味子 細辛 栝子仁炒 枸

杞子各二錢半南星炮乙酸棗仁通草麥

門冬夫心覆盆子各乙山藥製半夏

右咬咀四錢水壹盞蜜壹匙煎五分去滓

取汁入麝香少許再煎一二沸溫服無時

十補湯治諸虛不足安益心腎不

白芍藥乙當歸酒浸黃芪炙生地黃洗茯苓

神各半人參白朮天台烏藥麥門

冬去心肉桂四錢北五味三錢酸棗仁炒陳

皮淨木香煨半夏制沉香各乙麥門冬

右咬咀每半兩水一盞姜五片棗二个煎七分溫服

雙補元平補精血不燥不熱八

熟地黃半斤兔絲子半斤

右細末酒糊元梧子大每七十元參湯下

氣不順沉香湯心氣虛茯苓湯下心煩不

睡酸棗仁湯下腎氣動茴香湯下小便少

車前子湯下小便多益智湯下

三因茯苓補心湯治心氣虛耗不能藏血以

致面色黃悴五心煩熱咳嗽唾血及婦人懷
娠惡阻嘔吐

白茯苓 人參 前胡 半夏 制川芎 各

分 陳皮 淨枳殼 制紫蘇 桔梗 甘草 炙

乾葛 各半 當歸 乙兩 白芍藥 二兩 熟地黃 乙

半

右咬咀四錢水壹盞姜五片棗壹枚同煎

空心服

楊氏靈砂寧志元治男子婦人大病後傷損

榮衛失血過多精氣虛損心神恍惚不得睡
眠減食瘦弱

明朱砂 二兩用夾絹袋盛懸於銀石器

內可八分別用椒紅三兩取井花水調入器

煮令魚眼沸三晝夜為度取砂細研水飛

人參 白朮 茯苓 鹿茸 去毛 黃芪 蜜炙

右細末入辰砂研勻用棗肉和杵一二千

下元梧子大每三十元溫酒米飲空心下

本事辰砂遠志元安神鎮心消風化痰止頭

眩

石菖蒲去毛遠志去心人參 茯神 川芎

山藥 鐵粉 麥門冬去心天麻 半夏 麩

南星炒白附子生各乙兩 細辛 辰砂各半

右細末生薑五兩取汁入水煮糊元茶豆

大朱砂為元每三十元臨臥姜湯下

補心元治憂愁思慮過度心血耗散故多驚

悸遺精盜汗

紫石英煨熟地黃洗石菖蒲 茯神 當

歸 附子炮 黃芪 遠志肉炒 川芎 肉

桂 竜齒各乙 人參半

右細末蜜元梧子大每七十元無時棗湯

下

心丹治男子婦人心氣不足神志不寧一切
心疾

朱砂五拾 羅參 遠志去心 甘草炙 熟地黃

酒蒸 白朮 石菖蒲 黃芪 當歸酒浸

麥門冬去心 茯苓 茯神 栢子仁 木鱉

養身百寶

子炒去殼 石蓮肉 益智仁各五兩 木鱉

右加人參等十四味各如法修製剉碎拌勻次將朱砂衮和以夾生絹袋盛貯線縛袋口却用瓦鍋壹口盛水七分重安銀罐壹个於鍋內入白沙蜜二十斤將藥袋懸之中心不令著底使蜜浸過藥袋以桑柴火燒令滾沸勿使火歇煮三日蜜焦黑再換蜜煮候七日足佳火取出淘去衆藥洗淨朱砂令乾入牛心內仍用銀罐於重湯

內蒸如湯乾復以熱水從鍋弦添下候牛心蒸爛取砂再換牛心如前法蒸凡十次其砂已熟卽用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分米糝爲元如碗豆大陰乾每二十元食後參湯棗湯麥門冬湯任下百一選引神歸舍丹治心氣不足并治心風

方見是齋醫方

補心神效元

菴芪蜜炙 茯神 人參 遠志肉各四兩 熟

養身百寶

五

地黃三兩 栢子仁別研 酸棗仁湯泡去殼 五味子各

兩 朱砂乙兩 別研

右細末蜜元梧子大每五十元米飲温酒

任下盜汗不止麥麩湯下亂夢失精人參

龍骨湯下卒暴心痛乳香湯下虛煩發熱

麥門冬湯下吐血人參湯下大便下血地

榆湯下小便出血茯苓車前子湯下坐風

不語薄荷姜湯風癩涎潮防風湯下

治心氣虛損猪腰子乙隻水二椀煮至盡半

細切腰子并人參半兩淨當歸半兩並切同

煎入分喫腰子以汁送下未盡腰子同上二

味藥滓焙乾為末山藥糊元梧子大每五十

元多服為佳

秘傳酸棗仁湯治心腎火水不交精血虛耗

痰飲內蓄怔忡恍惚夜臥不安

酸棗仁泡去皮 炒乙兩 遠志肉淨 黃芪 蓮肉去

羅參 當歸酒浸 焙 白茯苓 茯神各乙 陳

皮淨 粉草炙各 半兩

石咬咀四錢水蓋半姜三片罌乙个瓦器
煎七分日三服臨臥壹服

壽域神方

怔忡部

因事驚心神不守舍以政事多健忘或癡迷
心竅妄語如有所見用天南星一斤先用
炭火三十斤燒一地坑通紅去炭以酒五
升傾坑內候滲酒盡下南星在坑內以盆
覆坑周圍用灰擁定勿令漏氣次日取出

為末却入研細朱砂二兩琥珀壹兩用薑
汁攪麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸
加至五十丸煎石菖蒲人參湯食後送下
驚憂喜笑部

治憂懼成疾用人參半夏洗七次五兩肉桂

甘草炙各五錢玄明索炒壹兩乳香三錢咬

咀每服五錢薑三片煎七分食後服

治笑死凡口有微氣心下溫者用滄塩成塊

者二兩火燒令通赤候冷研細以河水壹

大碗同煎至三五沸放溫分三次服之後
 以鷄翎探於喉中吐去熱痰三五升後服
 黃連解毒湯三二服則笑自定人可活矣
 若笑脫下頰用線纏繚毬二箇塞於左右牙
 床後川手托上妙
 金匱鈎玄
 怔忡大故屬血虛 有慮便動屬虛 時作
 時止痰因火動 瘦人多因而少 肥人
 屬痰尋常者多是痰 直覺心跳者是血

少四物湯安神丸之類

驚悸有血虛 朱砂安神丸

御醫撮要

人參丸主鎮心安神化痰利胃膈療驚悸

人參大蘆頭 遠志去心 茯苓 生乾地黃各壹兩

右作爲末用棗肉杵和丸如桐子大每服

十五丸生薑薄荷湯下不計時候

驚悸禁忌

巢氏病源

風驚候

養生方云精藏於玉房交接大數則失精失
精者令人悵悵心常驚悸

驚悸鍼灸

壽域神方

驚死凡心下溫者刺手少陽之源卽是兌骨
也乃是真心之源在手掌後兌骨之端陷
中是穴用長針口中溫暖方刺入三分徐
徐出針以手捫其穴其人復甦也

暴驚欲死者針下廉入五分

憂死無氣手足冷心腹口鼻溫目中神彩不
轉口中無涎舌卵不縮可刺合骨穴針入
三分徐徐出針以手捫其穴人復活也

悲哭欲死四肢冷而身口溫者可針人中穴
三分徐徐出之灸百會穴三壯可活

一法針神道入三分或灸五壯

喜死四肢冷氣絕色不變者刺陽池穴用口
溫針勿冷針入三分徐徐出針以手捫其

穴即復甦也人三谷谷出檢以年際共

喜笑欲死者針列缺及天陵針三分穴風口

一巡檢輸散入三分強強五根

三谷谷出之灸百會穴三根何道

悲哭者取四根今而後以溫者何檢人中穴

醫方類聚卷之七百五十八穴人野野出

轉以中無痰舌眼不蘇何檢合骨穴健人

憂長無度平步少動日息甚日中轉錄不

以是為難