


外科理例



外科理例前序

外科者以其癰疽瘡瘍皆見於



外科名之然外科必本於內知乎內以
求乎外其如視諸掌乎經曰膏梁之變
足生大丁由膏梁蘊毒於內而生也又
曰榮氣不從遂於肉理乃生癰腫是癰
腫由榮氣逆于肉理之內而生也有諸
中然後形諸外治外遺內所謂不揣其

本而齊其末殆必已誤于人己尚不知
人誤于己人亦不悟嗚呼已雖不知天
必知之人雖不悟神必識之異日明受
天責陰獲神譴不在于身則在于子孫
矣予于是懼因輯此書名曰外科理例
蓋其中古人所論治無非理也學者能
倣其例而推廣之于焉而求古人不言
之妙旨庶幾小不悞己大不悞人抑亦

有補於將來矣輯已成編復得新甫薛
先生心法發揮讀之觀其論治亦皆一
本于理而予竊喜暗與之合于是復采
其說叅于其中庶得以爲全書而學者
無復有遺憾矣是爲序

嘉靖辛卯冬十一月長至日初門汪機識



外科理例序

夫天下之事莫不有理然有正有偏有崇
有文不可以察視如譬之兵子聲罪攻討
在正也潛師掠境在文也常為按圖布傳而
守據險憑高之法安有位顯出沒而有
鬼神不測之操夫醫之道六經是為其理
氣脈是為其審死生脈乃鑿理之正執方治病
信分處劑乃鑿學之偏按脈辨症審時製


方分經絡別表裏此鑿之處乎常也或憑
脈而不憑症或憑症而不憑脈或因情性而
處方或因形質而用藥此鑿之達乎常也
然正可守而偏可矯常可守而變難窮
鑿豈可以易言哉河內之業外科者惟視
外之形症瘡之腫潰而不察其脈理虛實
之殊經絡表裏之異形之生所以至而世
悟也雅矣先生深為之惜故輯此書名
曰外科理別蓋以正偏常變之用各為
一理而無不同歸于一理學在誦能因
是而求一書未盡之旨擴聖未言之妙至
臨病用藥必求法理而不至至治以殺
人矣此先生作書之志也

士名請丁酉西華年親見

新安祁門石鑿陳楠書



石山先生像



石山先生自贊

觀茲厥像貌焉寒微其容和粹其貌清癯心存仁術主好儒
書顏已垂白手不停披平居不敢于名而犯義交際不敢
口是而心違事求免于流俗禮合于先儒謙約節儉樂易
踈愚不求聞達甘守窮廬寧爲禮屈勿爲勢拘不知我者
謂我狂妄其知我者謂我坦夷噫顧我所行未必盡合于
道也然造次克念惟求無愧于心歟

試問林翁何名何氏細認來都不似好三分似得石山居士
一種心苗許多春意却不逐杏花飛去听傍人齊說是這
林翁廬扁再生今世

右錦堂春

鏡山李汛題

貌古心明言和行固咀英華以克日用之強恥奔競而却雲

霄之步學以爲已足圖醫以濟人爲務居窮不失其自然
處變弗愆于常度所以爲一代之偉人起四方之敬慕也

休陽程文杰師周書于率溪書院

舜顏具齒玉質卅啓襟度吞雲夢之澤英邁益蒼梧之雲學
足以泝河洛之趣醫足以逼岐黃之真出入造化弛張鬼
神棲情于煙霞泉石却步于雲路鵬程激勵之論足以迴
狂瀾于旣倒回天之術曾以極天札于同仁廟筭神謨余
蓋得之萬一生死肉骨迨不知其幾人著蔡之德未艾喬
松之壽方臻是益廬扁之能契其妙而豈摩詰之能狀其
親也歟

門生石壘陳楠惟宜拜題

先生姓汪氏名殿字省之別號石山世居徽祁之朴墅早
歲習春補邑庠第子員性至孝因思事親者不可不知醫
復精于醫賴以存活者衆鏡山李先生別傳詳矣所著有
素問抄本草會編脈訣刊誤推求師意傷寒選錄外科理
例運氣易覽痘治理辨石山醫案針灸問對諸書若干卷
行于世先生生天順癸未九月十六日酉時歿嘉靖己亥
十二月初四日戌時

嘉靖辛丑五月朔旦

楠續

外科理例目錄

卷之一上

一 癰疽脈

二 七惡五善

三 五逆

四 疽死地分

五 背上九處正面五處側面三處不可患癰

六 癰發有不可治

七 發背治之難易

八 占色候生死

九 癰之源有五

十 生癰所感不同

十 肺肝腎癰症

十一 癰生原于藏府

三 辨藏府內瘡

十二 明瘡瘍本末

五 論疔滯阻滯

十三 癰疽分三治

七 瘡腫分淺深

十四 癰與疽治法

九 瘡名有三

十一辨癰疽疔瘡

一辨癰

二瘡疽分虛實用藥

二治瘡須分補瀉

三男女癰疽治法不同

五小兒瘡疽

六癰疽當分經絡

七論內消

八內托

九腫瘍

十潰瘍

三外施貼藥

三瘡瘍作渴

三嘔逆

四瘡瘍寒熱用藥法

五瘡瘍面赤不得下

六論瘡瘍發寒熱或汗

七疽疾咽喉口舌生瘡

八瘡瘍食肉

九論氣血喜香惡臭

十四潰瘡論

一癰疽膿成十死一生

二論惡肉

三論蝕膿

四生肌止痛

五論瘻併治法

六附子餅豆豉餅

七隔蒜灸

八灸法論

九竹馬灸

十五論灸刺分經絡

一五針法總論

二五蟬針

三五金銀花酒

四五槐花酒

五五八味丸治驗

卷之二上

六五十六味流氣飲

七五十宣散

八五內托散

九五神仙追毒丸

六六獨聖散

一六柞木飲子

二六阿膠飲子

三六味車螯散

四六飛龍奪命丹

五六加味十全湯

六五香湯

六防風通聖散

六論大黃

九白蠟

七草麻子

皂角刺 神異膏 麥飯石膏

七論流氣飲十宣散

二七論敗毒散流氣飲

三蠟礬丸

四七汗之則瘡已

五七論瀕針決

六七論痛

七論癰疽虛實

八七論附骨疽

九七論瘡疽所致之由

八論癰可治不可治

一八腫瘍

二潰瘍

二八潰瘍作痛

四潰瘍發熱

附五論寒熱

六七情所傷

七八論精血

八論水腫

九八論婦人病

九論婦人熱勞

一自汗忌利小便

二九論下血

三九論血崩

四九論治病不可責效大速

五九論寡婦病

六九論痿與柔風脚氣相類

七九論病犯不治

八九論脚氣

九論表虛及小便多少

附肺痿肺癆

卷之三上

百頭面赤腫

附升麻 頰腫 子散

中和湯

百瘰癧

二流注

百懸癰

四囊癰 附婦人隱內瘡

百下疳

卷之四下

百便毒

百乳癰附無乳乳岩

百腹癰

百疔瘡

百痔漏

百髮瘡

百十勝疽

百十胸癆

百十腦疽

卷之五下

百十臂疽

百十背疽

百十腎癰附腿痛

腿癰

脚氣

百十腰疽

卷之六下

百十脫疽

百十面瘡附頤毒

百十口齒

百十舌瘡

百十咽喉

附楊梅瘡咽喉痛

百十諸哽

百十傷損脉法附破傷風

百十跌撲附墜馬壓研

百十杖瘡血熱作痛

百十火瘡

百十漆瘡

卷之七

百十天疱瘡

百十楊梅瘡咽喉門喉患起者見

百十斑疹附小兒丹毒

百十腸癰

百十肺癰肺痿

百十胃脘癰

百十腦疳

百十肺疳

百十蛔疳

百十脊疳

百十腎疳

百十鬼擊

百十歷節風

百十瘡疥

百四 諸虫傷 附大蛇傷

百四 吞水蛭

百四 虫入耳

百四 血風瘡 附陰瘡

附變飯石膏

補遺

百四 癰癤

百四 發背及癰毒

百五 發背欲死

百五 石癰堅如石不作膿者

百五 乳硬欲結膿

百五 癰癤欲愈必癢又治腎藏瘻

百五 刀傷 搥損血不止

外科理例目錄終

外科理例卷之一上

新安祁門朴里汪機省之編輯
同邑石野門生陳楠惟宜較正

瘡疽脉一

浮 主表症浮數之脉應發熱不發熱反惡寒癰疽也

洪 主血實積熱腫瘍洪大則瘡勢進膿未成宜下潰膿後

洪大難治若自利不可救

滑 主熱主虛膿未潰者宜內消膿潰後宜托裡所謂始為

熱終為虛也

數 主熱仲景曰數脉不時見生惡瘡又曰肺脉俱數則生

瘡諸瘡脉洪數裏欲有膿結也

散 膿潰後煩滿尚未全退其脉洪滑龜散難治以正氣虛

邪氣實也又曰肢體沉重肺脉大則斃謂浮散也

主血虛膿潰後見之易治

牢 按之實大而弦且沉且浮而有堅實之意癰癧結核得

之不可內消

實 久病虛人得此最忌瘡疽得此宜急下之以邪氣與臟

腑俱實故也

弦 浮弦不時見為飲為痛主寒主虛弦洪相搏外緊內熱

欲發瘡疽

緊 主痛瘡腫得之氣血沉滯

瀉 主氣滯血虛膿潰後得之無妨

短 諸病脉短難治瘡腫脉短真氣短也

細 主亡陽陽氣衰也瘡腫脉來細而沉時直者裏虛欲變

症也

微 主虛真氣復者生邪氣勝者危瘡腫潰後脉微而勻當

自差

遲 痼疾得之則善新病得之主血氣虛憊瘡腫潰後得之

自痊

緩 瘡腫潰後其脉瀉遲緩者皆易愈

沉 水氣得之則逆瘡腫得之邪氣深

虛 脉虛血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫得之宜托裡和

氣養血也

奕 瘡腫得之補虛排膿托裏

弱 主氣血俱虛形精不足大抵瘡家沉遲奕弱皆宜托裡

促 主熱蓄于裏下之則和瘡腫 脉促亦急下之
代 諸病見之不祥瘡腫脉促結 治况代脉乎
動 動于阳 阴虛發厥動于脉 脉虛發熱

治瘡脉訣

身重脉緩濕勝除濕 身熱脉大 心躁熱發腫下未下去除
熱 諸痛眩暈動推脉弦去風

脉滿氣滯燥渴亡津液脉滿寫氣補血 寒勝則浮食不入
便溺多惡寒脉緊細寫寒水

數脉不時見當生惡瘡 諸浮數脉應發熱反洒淅惡寒

若有痛處當發癰疽 脉滑而數滑則為實數則為熱

滑則為榮數則為衛榮衛相逢則結為癰熱之所過則為
癰膿

機按今之瘍醫多不診脉惟視瘡形以施治法蓋瘡有表
裏虛實之殊兼有風寒暑濕之變自非脉以別之安得而
察識乎東垣云瘡瘍憑脉此之謂也因詳列其脉之所主
揭之于首學者宜加意焉

七惡五善二

醫瘡舉七惡五善此特謂腸胃之內藏府瘡疽之證也發
背腦疽別有善惡載之於後

七惡者煩躁時救腹痛渴甚或泄利無度或小便如淋一惡
也 膿血既泄腫焮尤甚膿色敗臭痛不可近二惡也

目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上看三惡也 喘粗
短氣恍惚嗜卧四惡也 肩背不便四肢沉重五惡也
不能下食服藥而嘔食不知味六惡也 聲嘶色敗唇鼻

青赤面目四肢浮腫七惡也

五善者動息自寧飲食知味一善一便利調勻二善

膿潰腫消水鮮不臭三善 神彩精明語聲清亮四善

體氣平和五善

五善之中乍見一二善證瘡亦回也七惡之內忽見一二

惡證宜深慎之又_有證合七惡皮急緊而知善又_或證合

五善皮緩虛而知惡此又在人詳審大抵虛中見惡證者

不可救實證無惡候者自愈

膿潰後尚煩疼 脉洪滑粗散者難治 微瀉遲緩者易痊

諸惡瘡五逆三

白睛青黑眼小 服藥而嘔 腹痛渴甚肩項中不便聲嘶

色脫是為五逆其餘熱渴利嘔蓋毒氣入裏歲符之傷也

按已上不治
皆五歲氣已絕

定癰死地分四

一茯兔 二腓膈 三背 四五截俞 五項 六腦

七髑 八髑 九頤

背上九處不可病癰五

第一入髮際為玉枕亦為舌本 第二頸項部 第三推為

崇骨 第四大椎為五截 第五脊骨兩邊肺俞穴

第六夾脊兩邊脾俞及 第七脊骨兩邊腎俞二穴

第八後心鳩尾 第九鳩尾骨穴

附 正面五處不可患癰

第一喉骨為蜚膺 第二當胸為神舍 第三心鳩尾

第四當兩乳穴 第五臍下二寸為腸胃間

附 側面三處不可患癰

耳下近耳後牙車尖夾陷中為喉脉一穴
當膊下一穴為肩骨 承山上三寸一穴膈腸

癰發有不可治六

腦上諸陽所會穴則髓出 頸項近咽疾一有所礙藥食莫

進 腎俞與腎相抵乃命之所繫穴則透空 此三處有疽

並難治

發背透膜者不治此言已所未潰肉陷面青唇黑便瘀者死此

歲壞便右頤後一寸三分毒銳者不治 潰喉者不治陰入

腹者不治入囊者死 鬚深及寸餘者不治 病瘡腰背強

急癰瘰者皆不治

發背治之難易七

疽發背上以兩手上搭著者謂之左右搭頭多如蜂窠者

治 以兩手搭著者謂之腰疽亦易治 以兩手上下俱搭

不著者謂之發背此証最重

大抵已上所言地分背脉絡所會內系藏府患者得而早

言醫者審證按法治之皆為不死設不早治治不對證雖

發于不死地分恐亦致死也

占色候生死八

病人目中赤脉從上下貫瞳人一脉一年死二脉二年死若

脉下者療之差 面上忽多赤貫上下如脂 赤色從額上

下至鼻 黑色出額上大如指又連鼻至肩又有赤色垂並

為死候

機按赤脉屬火瞳人屬水赤脉貫瞳火反乘水面屬陽陽



P6

部赤色陽勝也微額上黑色陰微也勝故多危也
癱之源有五九

天行一 瘦弱氣滯二 怒氣三

腎氣虛四 服法酒食炙湯服丹藥熱毒五

蓋治癱疽不可一槩視為熱其治難易當自一而至五動
生癱所感不同十

膏梁之變足生大丁受如持虛膏梁厚味熱毒內積其變
多生大疽受毒部分其毒從虛處受之大丁大疽也以其
根深在內也 此言疽因厚味內熱為變而生

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大倮
陷脉為瘦留連肉腠

人身陽氣其精微以養神其柔和以養筋陽氣在身表則

氣

此言癰腫因腎寒傳脾而生

脾稜寒于肝癰腫筋攣

脾主肉肝主筋肉溫則筋舒今脾傳寒于肝故肉寒則衛
氣結聚為癰腫筋寒則急為筋攣

此言癰腫因脾寒傳肝而生

肝滿肺滿腎滿皆實則為肝肺腎癰

滿實脉氣滿實也以截氣邪盛滿實故脉氣如是

此言肝肺腎癰因截氣邪盛滿實而生當視脉氣滿實
而辨

肺肝腎癰症十一

肺癰主怯滿 肺藏氣而外主息其脉支別者從肺系橫出

腋下故喘而兩肢滿 此言肺癱所見症

肝 癱主小便 肝主驚肝脈循股入毛中環跳器抵少腹
直上貫肝膈布脇肋故兩肢滿兩肢滿卧則驚不得小便

此言肝癱所見證

腎癱主少腹滿 此言腎癱所見證

癱生原于截府十二

五截苑熟癱發六府

苑積也熟熱也五截積熱六府受之陽熱相薄熱之所過
則為癱也

此言五截積熱六府受之而生

六府不和留結為癱

六府屬陽而主氣肌肉上為陽脈和氣遊於六府則肌肉

上之脈不和邪氣停留肌膚結聚為癱腫矣

此言六府受邪而生

辨截府內瘡十三

中府隱隱痛者肺疽 其上肉微起者肺癱

巨闕隱隱痛者心疽 其上肉微起者心癱

期門隱隱痛者肝疽 其上肉微起者肝癱

章門隱隱痛者脾疽 其上肉微起者脾癱

京門隱隱痛者腎疽 其上肉微起者腎癱

中腕隱隱痛者胃疽 其上肉微起者胃癱

天樞隱隱痛大腸疽 其上肉微起大腸癱

丹田隱隱痛三焦疽 其上肉微起三焦癱

關元隱隱痛小腸疽 其上肉微起小腸癱

明瘡瘍本末十四

今富貴之人飲食肥膿日久太過其氣味俱厚之物乃於中
之陽不能走空竅先行陽道反行陰道逆于肉理則濕氣大
勝于土能令母火實火乃大旺熱濕既盛必來尅腎若雜以
不順必損其真水腎既受邪積久水乏水乏則從濕熱之化
而上行其瘡多出背出腦此為大丁之最重也若毒氣行于
肺或脾胃之部分毒之次也若出于他經又其次也濕熱之
毒所止處無不潰爛故經言膏梁之變足生大丁受如持虛
如持虛器以授物物無不受故治大丁之法必當瀉其營氣
以標本言之先受病為本非苦寒之劑為主為君不能除其
苦楚疼痛也

於滯于於為疽於滯于於為癰十五

癰疽因陰陽相滯而生蓋氣於也血於也血行於內氣行於
外相並周流寒與濕搏之則凝泣行遲為不反熱與火搏之
則沸騰行速為大過氣得邪而鬱則津液稠粘為痰為飲積
久滲入脈中血為之濁此於滯于於也血得邪而鬱隧道阻
隔或溢或結積久滲出脈外氣為之亂此於滯于於也病皆
由此不特癰疽於滯于於謂於盛而滯其於脈則浮洪弦數
於滯于於謂於弱而滯其於脈則沉弱細瀆於滯以寒治之
陰滯以熱治之

瘡疽分三治十六

瘡瘍者火之屬須分內外以治其本經曰膏梁之變足生大
丁其源在裡發于表也受如持虛言內結而發諸外皆是從
虛而出也假如大陽經虛從髮而出於明經虛從鬚而出於督

脉經虛從腦而出 經曰地之濕氣感則害人皮肉筋脉其源在外盛則內行也若脉沉實當先踈內以絕其源若脉浮大當先托裡以防邪氣侵內又有內外之中者邪氣至盛過絕經絡故發癰腫經曰營氣不從逆于肉理乃生癰腫是也此因失托裡及失踈通及失和榮衛而然也治瘡大要須明托裏踈通行榮衛三法托裡者治其外之內也踈通者治其內之外也行榮衛者治其中也內之外者其脉沉實發熱煩躁外無焮赤痛深在內邪氣沉于裡也故先踈通以絕其源如內踈黃連湯是也外之內者其脉浮數焮腫在外形證外顯恐邪氣極則內行或汗或先托裏以防入內如荆防敗毒散內托復煎散是也內外之中者外無焮惡之氣內則截府宣通知其在經當和榮衛如當歸黃耆湯東垣白芷并麻湯

是也用此三法雖未痊差必無變証亦可使邪氣峻減而為痊也其汗下和之間又有外治之次第詳見天容穴疔瘡條

瘡腫分淺深十七

瘡疽有三種高而軟者發于血脉腫下而堅者發于筋骨皮肉色不辨者發于骨髓又曰以手按搗瘡腫根牢而大深也根小而浮者淺也又驗初生瘡時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩燥飲冷瘡疽必深也若起居平和飲食如故其瘡浮淺也惡瘡初生其頭如粟微似有痛痒誤觸破之即焮展有深意酌其深淺浮則表之深則踈之

辨癰與疽治法十八

精要云始患高腫五七日勿平陷者是攻內之候以托裏散內補湯填補截府令實最怕透膜透膜者十無一生

丹溪曰癰之邪淺其積留壅遏濁在經脈之中而專于外故初發時身表便熱患處便如枕如盆高腫痛甚者縱欲下陷緣正氣內固不肯受故或便秘或發渴發逆以拒之是以骨髓終不焦枯五歲終不損也 疽之邪其積留壅遏內連五藏而不專攻于外故身或無熱患處或不腫痛甚者聲嘶色脫眼黑青小十指腫黑如墨多死也 治癰初發當以潔古法為主表者散之裡者下之火以灸之藥以敷之膿未成者必消已成者速潰 治疽初發當以消子法為主填補藏府令實勿令下墮邪延蔓外以火灸引邪透出使有穴歸而不亂攻可轉死為生變凶為吉今世不分癰疽一槩宜熱拔毒外以五香耗其氣內以大黃竭其血終不自悟其藥之非惜哉

瘡名有三曰癰曰癤曰疽十九

癰者初生突起浮赤無根脚腫見于皮膚止闊一二寸有少疼痛數日後微軟薄皮剝起始出青水後自破膿出如不破用簪針丸○癰者初生紅腫突起闊三四寸發熱惡寒煩渴或不熱抽掣疼痛四五日後按之微軟此證毒氣浮淺春夏宜防風敗毒散加葱姜末煎煉冬去葱姜末加木香身半已上加瓜蒌身半已下加射干又有皮色不變但肌肉內微痛甚發熱惡寒煩渴此證熱毒深沉日久按之中心微軟膿成用火烙烙開以決大膿宜服托裏之藥 疽者初生白粒如粟米便癢痒痛觸著其痛應心此疽始發之兆或誤觸著便竟微赤腫痛三四日後根脚赤暈展開渾身壯熱微渴瘡上亦熱此疽也疽上或漸生白粒如黍米逐筒用銀篦挑去勿

令見血或有少血亦不妨不見血尤妙却用老皮散付之五
七日瘡頭無數如蜂房膿不肯出冬用五香連翹湯夏用黃
連菴活散夏初用防風敗毒散加葱束煉去之加木香若形
氣實脈洪滑有力痛腫焮開壯熱便閉宜五利大黃湯復元
通氣散選用通利又有初生白粒誤觸後便竟情惡不暢昔
重如石身體煩疼胸膈痞悶怕聞食氣此謂外如麻裏如瓜
疽毒深惡內連府截疽頂白粒如椒者數十間有大如連子
蜂房者指捺有膿不流時有清水微腫不突根脚紅暈漸上
展開或痒痛或不痛疽不甚熱瘡反陷下如頰之皮漸變黑
色恍惚沉重脈若虛弱使用大料參耆歸朮濃煎調理
瘡瘍有癰疽癩癧輕重淺深或止發于一經或兼二經者
止當求責于一二經不可干擾餘經也若東垣用藥處方

是矣矧有蕪風蕪濕蕪痰蕪氣蕪血蕪陰虛等證者病本
不同治當求責

瘡瘍鬱冒俗呼昏迷是也宜汗之則愈
辨癰二十一

若發腫都軟不痛者血瘤虛腫而黃者水也發腫日漸增長
而不大熱時時牽痛者氣瘤氣結微腫久而不消後亦成膿
諸癰瘤疔贅等至年衰皆自內潰治于壯年可無後憂

疽分虛實用藥二十二

瘡疽痛息自寧飲食知味脈證俱緩緩則治本故可以王道
平和之藥徐而治之亦無不愈若脈實焮腫煩躁寒熱脈証
俱實非硝黃猛烈之劑不能除投以王道之劑則非也若瘡
瘍聚腫不潰出而膿水清稀或泄利腸鳴飲食不入嘔吐時

或手足並冷此脉證俱虛非大補之藥不能平投以硝黃攻伐之劑亦非也故治其證者當辨表裏虛實隨宜治之庶得萬全

治瘡瀆分補瀉二十三

東垣云瘡疽受之有內外之別治之有寒溫之異受之外者法當托裏以溫劑反用寒藥則是皮毛之邪引入骨髓矣受之內者法當疎利以寒劑反用溫劑托裏則是骨髓之病上徹皮毛矣殆必表裏通瀆共通為一瘡助邪為毒苦楚百倍輕則危重則死矣

男女癰瘡治法不同二十四

男婦癰疽精要謂治法無異丹溪曰婦人情性執著比之男子其難何止十倍雖有虛證宜補亦當以執著為慮向見

一婦早寡善飲啖形肥偉性沉毒年六十六七月間背疽近正脊醫乃橫直裂開取血雜以五香十宣散酒飲月餘未嘗及其寡居之鬱酒肉之毒執著之滯時令之熱竟至平陷淹延兩三月不愈

小兒瘡疽二十五

小兒純陽多熱心氣鬱而多瘡疽胎食過而受熱毒犀角散為最餘如常法大下恐傷其胃

癰疽當分經絡二十六

丹溪曰六腑六脉經有多氣少血者有少血多氣者有多氣多血者不可槩論諸經惟少脉厥脉生癰理宜預防以其多氣少血血少肌肉難長瘡久不合必成死證或者遽用驅毒利藥以伐脉分之血禍不旋踵終得腫痛叅之脉症若有虛

弱便與滋補氣血無虧可保終吉若用尋常驅熱拔毒及氣藥虛虛之禍如反掌耳

一人年三十左腿外廉紅腫一人年四十脇下紅腫二人皆不預防本經少陰血少猛浪用大黃攻裏而死

一人年六十左膊外側一核一女髀骨中痛二人亦不預防本經血少猛浪用五香十宣散表而死

按此分經不致有犯禁壞逆之失然手少陽少陰太陰足少陰少陽太陰俱多氣少血也手厥陰太陰足厥陰太陰俱多血少氣也手足陽明俱多血多氣也

已上病例不係膏梁丹毒火熱之變因虛勞氣鬱所致只宜補形氣調經脈瘡當自消不待汗下而已也若不詳脈證經絡受病之異下之先犯病禁經禁故致失手

論內消二十七

內消當審淺深大小經絡處所形脈虛實如腦背腰項鬢腦皆太陰經宜黃連羌活 背連脇處為近少陰宜敗毒散形

實脈實者宜漏蘆湯五利大黃湯等疎利之氣虛參耆為主血虛當歸人參為主佐以消毒加以引經六經分野各隨本

經標本寒溫氣血多少以行補瀉惟少陽一經治與氣血虛同法

內托二十八

此法 痲子 金銀花 木鱉 之類 皆內消之藥

一凡癰疽或已成血氣虛者邪氣深者邪氣散慢不能突起亦難潰膿或破後膿少或膿清稀或堅硬不軟或雖得膿而根脚紅腫開大皆氣血虛邪氣盛兼以六淫之邪變生諸症必用內托令其毒熱出于肌表則易愈也內托以補藥為主

活血驅邪之藥為臣或以芳香之藥行其鬱滯或加溫熱之藥禦其風寒

亦有瘡疽腫痛初生一二日便竟脉沉細而煩悶藏府弱而皮寒邪毒猛烈恍惚不寧外證沉深者即當用托裏散或增損茯苓湯及溫熱之劑以從治之

或問內托河間治腫爛于外根盤不深形證在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急瀆內托宜復煎散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料飲之如大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散如此使榮衛俱行邪氣不能內傷

腫瘍二十九

腫瘍內外皆壅宜托裏表散為主如用大黃宜戒猛浪之非

潰瘍三十

潰瘍內外皆虛宜以補接為主欲用香燥宜戒虛下之失

外施貼藥三十一

外施貼藥正是發表之意經曰發表不遠熱大九氣得熱則散得冷則凝庸醫敷貼冷藥豈理也哉 一人年五十嗜酒與煎燻後左絲竹空忽努出一角以硝黃腦子盒之致斃

瘡瘍作渴三十二

瘡瘍作渴不問腫潰但脉數發熱而渴用竹葉黃耆湯脉不數不發熱或脉數無力而渴或口乾用補中益氣湯若脉數便秘用清涼飲尺脉洪大按之無力而渴用加減八味丸若治口燥舌黃飲水不歇此丸尤妙

精要曰口渴與口乾不同不宜用藥鎮墜衲如反掌惟桑

枝煎五味湯以救水甚妙

丹溪曰不言食味起火怒氣生火房勞激火吾恐渴亦未易止也

精要曰瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡毒清腫湯千金漏蘆湯五香連翹湯六味車螯散萬金散皆可用利後仍渴却用生津補氣藥津液生氣血完渴自止

丹溪曰大渴而與利藥非明示脈證何以知其當下後言利後仍渴却用補藥又不明言脈證恐是但有大渴必下下後尚渴方與補藥古人治未病如此用藥可乎况渴屬上焦當腫瘍時猶或可用若潰瘍後渴多因血氣之虛何待利後方議其虛也

癰疽發渴乃氣血兩虛用參耆以補氣歸芩以養血或忍

冬丸黃耆六一湯

一人渴後發背未潰脈數無力比水虛火動用加減八味丸咬咀二劑稍緩次用丸劑而愈

一人腦疽作渴脈雖洪按之無力治以此藥不信自用茲陰等藥愈盛七惡併致而沒

東垣云論人病疽愈後發渴多致不救惟加減八味丸最妙蓋癰疽多因虛而得疽安而渴者服此丸則渴止安而未渴者服此丸永不發渴或未疽而先渴者服此不惟渴止而疽亦不作

一貴人疽未安而渴作一日飲水數升予用加減八味丸諸醫皆大笑云此能止渴我輩不復業豎矣皆用木瓜烏梅紫蘇參苓百藥煎等劑而渴愈甚不得已用此藥三日渴

止其疾本以腎水枯竭心火上炎是以生渴此藥生水降火為最患者鑒之

附子氣味勁悍有回陽之功命門火衰非此不補性雖有毒但炮製有法或用甘草防風同炒或童便久浸以去其毒復與地黃等味同用以制其熱潤其燥緩其急假其克捷之功而駕馭其慄悍之勢則雖久服亦無害也規東垣八味丸論則較然矣

精要曰疽疔安後發渴與加減八味丸

丹溪曰夫當此時氣血兩虛當用參耆補氣歸耆補血渴當自止何必澤瀉茯苓佐以肉桂以導水耶若忍冬丸黃耆六一湯亦為切當忍冬養血黃耆補氣渴何由作機按丹溪所言與前八味丸論治不合宜以脈證別之庶幾兩

得其宜而無背馳之失也

瘡瘍嘔逆三十三

精要云有二證一謂初發不曾得內托散伏熱在心一謂氣虛脾氣不正其伏熱在心者與內托散氣虛者宜嘉禾散有寒熱宜正氣散兼與山藥丸以補腎

丹溪曰諸逆衝上嘔噦皆屬于火托裏散性涼固有降火之理若嘉禾散徒溫煖以助火耳山藥丸補腎以壯下焦之陰類為近理然治嘔瀉分先後腫瘍時當作毒氣上攻治之潰瘍後當作陰虛補之若年老因疽潰後嘔不食者宜參耆白朮膏佐使藥隨時隨證加減亦用獨參湯而愈者山藥丸緩急未易治○河間謂病瘡嘔逆濕氣侵于胃也藥中宜倍加白朮

海藏云吐者有物無聲乃血病也噦者無物有聲乃氣病也
嘔者有声有物氣血俱病也仲景曰嘔家雖有少明証勿下
之欬逆者火自下衝上胃口而作声也病後胃虛所致少大
虛也病而至此多危善于治者豈可泛言嘔吐無分別耶
熱盛脉數精要與漏芦湯單煮大黃湯等若不甚熱脉緩
弱只投五香連翹湯

丹溪曰熱盛脉數若腫瘍時截府秘而體實者猶可與也若
潰瘍膿血出多熱盛脉數去死為近豈可下乎緩弱之脉古
人皆以為邪毒已散五香之飛走升散其可用乎

瘡腫寒熱用藥法三十四
嘗見治寒以熱而寒弥甚治熱以寒而熱弥熾何也假如心
實生熱者當益其腎腎水滋熱自除腎虛生寒者當補其心

心火降寒自退此所謂寒之而熱取之陰熱之而寒者取之
欬也又寒因熱用熱因寒用要在通其理類而已又聞微者
逆之甚者從之蓋治寒以熱必涼而行之治熱以寒必溫而
行之此亦欲其調和也其間有正有權者蓋病有微有甚微
者逆治理之正也甚者從治理之權也

瘡瘍面赤不得攻下三十五

瘡瘍及諸病面赤雖伏大熱禁不得攻裏為少氣怫鬱邪氣
在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不去宜
多攻其表以發散少氣加潤燥之藥若見風脉風證只可
用發表風藥便可以通利也若只乾燥秘澁只宜潤之不可
瘡瘍發寒熱或汗三十六

瘡瘍發寒熱多汗或先寒後熱或先熱後寒或連日作又有

或間日作必先嘔痰然後寒熱寒熱解大汗出精要言已上之証不可專以為熱亦有氣虛而得亦有因怒而得或先感寒邪脾氣不正而然者

丹溪曰因氣虛者當以補氣藥補之因怒者當以順氣藥和之脾氣不正者當以脾藥調養之今用不換金正氣散悉是溫散泄衛之藥欲以一兩人參收拾十四兩之泄衛可乎若用于腫瘍時感寒邪者猶或庶幾彼氣虛者因怒者脾氣不正者此方能兼治乎抑不知其用于腫瘍耶潰瘍耶

論疽疾咽喉口舌生瘡三十七

凡疽疾咽喉口舌生瘡精要歸罪不得內托以致熱毒衝心一貴人病此與琥珀犀角膏一日而安

丹溪曰腫瘍用之尚為近理若潰瘍後用之彼犀角之升散

寧不助邪致虛以速其死也後有犀角散以大黃佐黃耆黃耆則知為虛矣用大黃又似疑其有實熱夫瘡膿腫虛縱有蓄熱將自漸因膿血而消何必以峻冷利動藏府若在秋冬何異刀劔

論瘡瘍食肉三十八

東垣曰瘡瘍食肉乃自棄也瘡瘍乃營氣而作今反補之自棄何異雖用藥治不能愈也精要曰羊鷄牛鷄魚麵煎燂炒炙酒等味犯之必發熱用梔子黃芩湯最効

丹溪曰梔子苦參犀角佐輔人參固可解食毒之熱若寒月與虛人寧無加減乎內經謂膏粱之變足生大丁此言瘡疽之因也禁戒厚味恐其引起宿火之熱此誠富貴養口腹者所當謹若素貧者大不然矣予治

一人背癰徑尺穴深而黑家貧得此急作參耆歸木膏多肉
餽飽與之而安多肉餽飽補氣之有益者也

論氣血喜香惡臭三十九

精要曰凡血氣聞香則行聞臭則逆飲食調令香美益脾土
養真氣 瘡瘍或為穢氣所觸可用香藥薰之

丹溪曰甘而淡者可養脾土若香美者但能起火故經以熱
傷脾熱傷氣為戒今曰益脾養氣施之腫瘍似有暢達之益
潰瘍後用香美恐有發濕熱損真冰之患

論膿潰四十

夫癰疽瘡癤皆由氣血壅滯而生當推虛實表裏而早治之
可以內消此內托裏之意也若毒氣已結者勿泥此內消之
法當辨膿之有無淺深急酌量刺之緩則穿通藏府腐爛

骨可不慎哉若脈緊而數為膿未成緊去但數為膿已成
手按上熱者有膿不熱無膿按之牢硬未有膿按之半軟半
硬已有膿大軟方是膿成若大按之痛者膿深按之不甚痛
者膿未成按之即復痛者為有膿不復痛者無膿薄皮剝起
起者膿淺皮色不變不高阜者膿深淺者宜砭深者宜針手
足指稍及乳上宜膿大軟方開 麻豆後肢節有癰稍寬有
膿使用決破遲則成孿曲之疾

論癰疽膿成十死一生四十一

凡癰疽膿已成十死一生故聖人弗使已成已成膿血砭石
鋒針取之也但病者多喜內消而醫者即用十宣散敗毒
散流氣飲之類殊不知十宣散雖有參耆然防風白芷厚
朴桔梗皆足以耗氣况不分經絡時令氣血多少安可驟

用敗毒散乃表散藥也雖有表證不過一二服况非表證
寧用之乎流氣飲乃行氣散血之劑服之過度則氣血虛
耗何以為膿此三藥不可輕用明矣若膿既成味者待其
自穿殊不知少壯克實者或能自破若老弱之人又有攻
發太過不行針刺膿毒乘虛內攻穿腸腐膜鮮不誤事
一婦乳癰膿成針刺及時不月而愈 一人腿癰膿成畏
針幾殆後為針之大補三月而平 一人腿癰脉症俱弱
亦危症也治以托裏得膿不急針刺後膿水開泄不斂而
死 一婦發背待自破毒內攻 一人腹癰潰透穢從瘡
口出皆由畏針而斃

論惡肉四十二

惡肉者腐肉也癰疽潰後腐肉凝滯必須去之推陳致新之

意若壯者筋骨強盛氣血克溢真能勝抑或自去或自平不
能為害若年高及怯弱之人血液少肌肉澁設或留而不去
則有爛筋腐肉之患 一夫人取之及時而新肉早生得以
全愈 一人去之稍遲幾致不救 一人取之失期大潰而
斃嘗見腐肉既去雖少壯者不補其氣血亦不能收斂若怯
弱者不取惡肉不補養氣血未見其生也

腐肉可用手法去之或用雄黃輕粉傳之蠹肉努出用遠
志末酒調塗之 又法息肉突出烏頭五錢苦酒三升浸潰
三日洗之日夜三四次諸瘡努肉如蛇出數寸硫黃末傳
之即縮膿潰後蠹肉不腐亦用硫黃輕粉傳之四圍仍有
腫焮處用毫針燒赤刺之約一米深紅腫則縮

論蝕膿四十三

追蝕膿法使毒氣外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若
維其瘡血出不止者未可維但摻追蝕藥于瘡上待其熟可
維方維 維之痛應心者亦不可維誤觸其瘡焮痛必倍必生
變症 若瘡痂膿成未破者于上薄皮剝起者當用破頭代
針之藥安其上以膏貼之膿出之後用搜膿化毒藥若膿血
未盡便用生肌務其早愈則毒氣未盡必再發

生肌止痛四十四

肌肉脾之所主也潰後收斂遲速者乃氣血盛衰使然世人
但知生肌用龍竭止痛用乳沒予謂不然生肌之法當先理脾
胃助氣血為主則肌肉自生豈假龍竭之屬設若膿毒未盡
就用生肌反增潰爛壯者輕者不過復潰或遲斂而已怯者
重者必致內攻或潰爛不斂者亦多矣止痛之法熱者清之

寒者溫之實者損之虛者補之膿鬱者開之惡肉侵蝕者去
之如是則痛自止豈特乳沒之屬

一人發背毒氣未盡早用生肌竟背潰爛治以解毒藥而愈
又有患此毒氣始發驟用生肌其毒內攻而死 一人腿

癰因寒作痛與乳香定痛丸 一婦時毒因熱作痛與防風

通聖散 一人腿癰膿潰因虛作痛與益氣養榮湯 一人

腹癰因實作痛與黃連內疎湯 一人腿癰膿成作痛予為

刺之 一婦發背腐肉不去作痛予為取之痛各自止專用龍

竭生肌乳沒止痛未之察也

瘡痛不可忍者苦寒藥可施于資稟厚者若資稟素薄者霜
中益氣湯加苦寒藥血熱者四物湯加黃芩梟粘子連翹在
下加黃柏若肥人濕熱瘡痛者羌活防風荆芥白芷取其風

能勝濕也

每見瘡作先發為腫氣血鬱積蒸肉為膿故痛多在瘡始作時膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者虛也宜補參芪之屬亦有穢氣所觸者宜和鮮之乳香為藥之屬亦有風寒所逼宜溫散之羌桂之屬

論瘻併治法四十五

諸瘡患久成瘻常有膿水不絕其膿不臭內無歹肉須先服參芪歸朮等大劑托裏為主或服以丸尤宜用學浸透切作片厚二三分子瘡上著艾灸之仍服前托裏之藥隔三日再灸不五七次肌肉自長滿矣

至有膿水惡物漸潰根深者用麩硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚三分安瘡上用艾炷灸二十一

艾灸十四壯多至四十九壯 本事方云一人四月背疽治之踰月血甚矣安加瘡頭自且及暮灸百五十壯知痛乃已明日鑷去黑痂膿尽不痛始別以藥傳之日一易易時旋前去黑爛月餘乃平

灸法總論四十八

瘡瘍在外者引而拔之在內者疎而下之灼艾之功甚大若毒氣鬱結氣血凝聚輕者或可藥散重者藥無全功東垣云若不針烙則毒氣無從而散膿瘀無從而泄過時不烙反攻于內故治毒者必用隔蒜灸是而用苦寒之劑其壯實內有火者或可彼怯弱氣寒未有不敗者也又有毒氣沉伏或年高氣弱若服剋伐之劑氣血愈虛膿因不潰必假火力以成功

一人足患疔已十一日氣弱灸五十餘壯更以托裏藥而愈
黃君腿癰膿清脉弱 一婦臂結一塊潰不收斂各灸以
豆豉餅更飲托裡藥而愈 一人胸腫一塊半載不消明灸
有壯方潰與大補藥不歛復灸以附子餅而愈 一人發背
焮痛如灼隔蒜灸三十餘壯腫痛悉退更服托裏消毒而愈
一人發背瘡頭甚多腫硬色紫不甚痛不腐潰以艾鋪患
處灸之更服大補藥數日死肉脫去而愈 一人發背已四
五月瘡頭雖小根畔頗大隔蒜灸三十餘壯其根內消惟瘡
頭作膿而愈 精要曰灸法有回生之功信矣大凡蒸灸若
未潰則拔引鬱毒已潰則補接陔氣祛散寒邪瘡口自合其
功甚大嘗治四肢瘡瘍氣血不足者祇以前法灸之皆愈
疔毒甚者痛則灸至不痛不痛則壘痛亦無不愈 若中虛

壯一壯一易後隔四五日方用翠霞錠子并信効錠子互
用維入瘡內互肉尽去好肉長平然貼收斂之藥內服應
病之劑調理則差矣

論附子餅四十六 附豆豉餅

附子為末唾津和為餅如三錢厚安瘡上以艾炷灸之漏大
炷大漏小炷小但灸令微熱不可令痛乾則易之如困則止
來日如前再灸直至肉平為効仍用前補藥作膏貼豆豉餅
專治發背已潰未潰用江西淡豆豉為末唾津作餅置患處
灸之餅乾再用唾津和之瘡大用水和搗成硬泥依瘡大小
作餅子厚三分如已有瘡孔勿覆孔上四布豉餅列艾其上
灸之使微熱勿令破肉如熱痛急易之日灸二度先有瘡孔
者孔出汁即差

論隔蒜灸四十七

隔蒜灸 元戎云瘡瘍自外而入者不宜灸自內而出者宜灸外入者托之而不內內出者接之而令外故經云陷者灸之 丹溪曰癰疽之發或因內有積熱或因外寒而鬱內熱若于始發之際灸以散其毒治之之早亦可移重就輕轉深于淺 東垣曰初發背欲結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立視紙先乾處即癰頭也取蒜切片如三錢厚安頭上用大艾炷灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛早灸早灸為上一日三日十日活三日四日六七日活五六月三四活過十數日不可灸若有十數頭作處者用蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾燒之亦能活也若初發赤腫中間有一黃粟米頭便用獨蒜切去兩頭取中間片厚薄安頭上者

者不灸而服敗毒藥則瘡毒未除中氣先傷未有不敗者李氏云治疽之法著艾勝于用藥緣熱毒中隔外內不通不發泄則不解散又有處貧居僻一時無藥用灸尤便大槩蒜用大者取其警毒有力用著艾炷多者取其火力透也如法灸之瘡發膿潰繼以神異膏貼之不日而安一則瘡不開大二則內肉不潰三則瘡口易合見効甚神

辨精要曰始發時用針灸十死八九丹溪曰火以暢達拔引鬱毒此從治之意因灸而死者蓋虛甚孤冰將絕脈必浮數而大且鼓精神必短而昏無以抵當火氣故也豈可泛言始發不可灸以悞人 精要又謂頭上有毒不得灸恐火拔起熱毒而加病丹溪曰頭為諸穴所聚艾炷宜小而少小者如椒粒少者三五壯而已若猛浪如灸腹背炷大數多斯為悞

矣 按東垣灸元好問腦疽以大艾炷如兩核許灸百壯始
竟痛而安由是推之則頭上發毒灸之痛則炷宜小數宜少
不痛者炷大數多亦無妨也

經曰陷者灸之如外微竟木硬不痛者是邪氣深陷也急灸
之淺者不可灸又曰淺者有數頭腫痛亦灸之無妨

竹馬灸法四十九

丹溪曰諸項灸法皆好惟騎竹馬灸法尤為切要此消患于
未形也 先令病人以肘憑几豎臂腕腰直用篾一條自臂
腕中曲紋尺處男左女右貼肉量起直至中指尖尺處為則
不量指甲却用竹扛一條令病人脫衣騎定令身正直前後
二人扛起令脚不著地又令二人扶定勿令僵仆却將所量
臂腕從竹扛坐處尾骶骨尺處直豎竹上貼脊背量至篾

尺為則用墨點此只是取中非灸穴也另用薄篾量病人中
指節相去兩橫為則男左女右截為一則就前所點記處兩
邊各量開盡處即是灸穴兩穴各灸五壯或七壯不可多灸
不問癰在何處及乳癰並用此法灸之無不愈者 一云疽
發于左灸左發于右灸右甚則左右皆灸蓋此二穴心脉所
過處經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又云心主血心氣滯則血
不行故逆于肉理而生癰灸此穴使心火調暢血脉流通即
能奏効起死回生

論灸刺分經絡五十

河間謂灸刺瘡瘍須分經絡部分氣血多少俞穴遠近淺背
出者當從大陔五穴選用至陔在足小指外側去通谷在足
外側本節束骨在足小指外側崑崙在足外踝後委中在膕
前陷中 束骨在足小指外側崑崙在足外踝後委中在膕

約紋中從髮出者當從少陽五穴選用竅

動脈在足小指次指岐中臨泣本在足小指次指

非夾谷在足小指次指岐中臨泣本在足小指次指

骨端如前三分穴選用屬兌在足大指次指內庭在足大指次指從髀出者當從少陽五

即後衝穴在足大指次指陷中衝穴在足大指次指從腦出

者則以絕骨一穴在動脈上三寸一說癰疽初發必先當頭灸之以開其戶次看所發分野屬

何經脈即內用所屬經脈之藥引經以發其表外用所屬經

脈之俞穴針灸以泄其邪內外交治邪無容矣

針法總論五十一

經曰冬則閉藏用藥多而少針石少針石者非謂癰疽也癰疽不得頃時回回者遠也遠頃時而不寫則又曰癰疽之生

膿血之成積微之所生也故聖人自治于未有形愚者遭其

已成也已成膿者唯砭石鈹鋒之所取也

瘡瘍一科用針為貴用之之際須視其潰之淺深審其肉之

厚薄若皮薄針深反傷良肉益增其潰肉厚針淺膿毒不出

反益其痛至于附骨疽氣毒流注及有經久不消內潰不痛

宜燔針開之若治咽喉當用三稜針若丹瘤及癰疽四畔赤

焮疼痛如灼宜砭石砭之去血以洩其毒重者減輕者消

一婦患腹癰膿脹悶脅針膿出即蘇

一入囊癰膿熱腫脹小便利幾殆急針膿水大泄氣通而愈

大抵用針迎而奪之順而取之所謂不治已病治未病不治已成治未成正此意也今之患者或畏針而不用鑿者

又徇患者之意而不針遂或膿成而不得潰或得潰而所傷已深矣卒之夭枉十常八九悲夫

精要謂癰如椒眼十數頭或如蜂窠連房膿血不出者用針橫直裂之如煎椒眼之類只消直入取膿不必裂之去當椒眼上各灸之亦佳不必裂也

小兒瘡癩先當溫衣覆蓋令其凝泣壅滯血脉溫和則出血立已不如此血脉凝便針則邪毒不泄反傷良肉又益其瘡勢也

精要曰癰者皮薄腫高多有椒眼十數粒疽者皮膚頑硬狀如牛頭之皮癰成膿則宜針針宜用馬御鐵為之形如薤葉樣兩面皆利可以橫直裂開五六分許攻去毒血須先灸而後裂○疽成膿則宜烙可用銀篋大二寸長六寸火上燒令

赤急于毒上熨烙得膿利為効

又曰一婦病癰在背之左高大而熟未破醫云可烙傍有老成者曰九背之上五臟俞穴之所系膈膜之所近烙不得法必致傷人醫曰但宜淺而不宜深宜橫而不宜直入恐傷膈宜下而不宜上恐刺謂此訣終無妨也于是燒鐵筋烙之肉破膿出自此而愈當時直驚人非劊子手者不能為也

又曰方其已熟未潰之時用鐵筋一烙極是快意方扇火欲著時誠是驚人予嘗用矣臨時猶且顫悸况未曾經歷者乎烙後膿水流通百無所忌名曰熟瘡其瘡突者針口宜向下然須是熟于用烙者識淺深知穴道審生熟非其時則所出皆生血當其時則出黃膿瘡肉用尖針烙者不

得法尖針頭細其口易合惟用平員頭者為妙蓋要孔穴
通透或恐瘡口再合用細牛膝根如瘡口之大小畧割去
粗皮挿入瘡口外留半寸許即用嫩橘樹葉地錦草各一
握研成膏傳之牛膝能使惡血常流二草溫涼止痛隨乾
隨換此十全之功也

火烙針其針員如筋大如綿挺頭員平長六七寸一様二
枚撚蘸香油于炭火中燒紅於瘡頭近下烙之宜斜入向
軟處一烙不透再烙必得膿瘡口烙者名曰熟瘡膿水常
流不假按抑仍須維之勿令口合

論蟻針五十二

蟻針吮出血可施于輕小症候若積毒在藏府徒竭其血于
外無益壹塊貳歲亦軫取大蟻數條吮其血軫消予曰非

治也三日大熱而死外血去氣不能獨居故也

論金銀花酒五十三

金銀花生取藤葉一把磁器內爛研入白酒少許調和稀稠
得宜塗敷四圍中心留口以洩毒氣又法取藤五兩木杵
槌碎生甘草節一两二味以水二碗用砂瓶文武火煎至
一椀入無灰酒一椀再熬十數沸去粗分溫三服粗敷患
處一日夜吃尽病勢重日夜兩劑服至大小便通利藥力
到矣或用乾者終不及生者力大効速或只用藤五六兩
搗爛入熱酒一鍾絞取汁酒溫服查菴患處四五服而平
此藤延蔓附樹園圃墻垣之上藤方而紫葉似薜荔而青
三月間花微香帶帶黃色花初開色白經一二日色黃故
又名金銀花又名鷺鷥藤又名金釵股又名老翁鬚因藤

左纏又名左纏凌冬不凋又名忍冬在處有之治癰疽發背乳癰初發便當服此不問疽何處皆有奇效蕪麥飯石膏神異膏貼之尤效

論槐花酒五十四

槐花酒 槐花四五兩炒微黃棗熱入酒二鍾煎十餘滾去渣熱服未成者二三服已成者一二服 一人髀骨患毒痛甚服消毒藥不減飲槐花酒一服勢隨大退再服托裡消毒藥而愈 一人發背十餘日勢危脉大先飲槐花酒二服殺其勢退再服敗毒散二劑托裡藥數劑漸潰文用桑柴燒灸患處每日灸良久仍以膏藥貼之灸至數次膿潰腐脫以托裏藥白朮陳皮月餘而愈 一人肩疽脉數用槐花酒一服勢頓退更與金銀花黃耆甘草十餘服而愈

大抵腫毒非用蒜灸及飲槐花酒先去其毒雖服托裏諸藥其效未必甚速槐花治濕熱之功最為神速但胃寒人不宜過劑

八味丸治驗五十五

一人年踰三十素怯弱不能食冷臂癱愈後飲食少思或作脹或吞酸目漸羸瘦參苓等藥不應右尺脉弱此命門火衰不能生土遂以八味丸補土之原食進而愈

一人病脾胃服補劑及針灸脾俞等穴不應幾殆服八味丸

三料而平 一人脾虛發腫服此丸不半年而康

一人貌豐氣弱遇風則眩勞則口舌生瘡胸常有痰目常赤

溢服此而安 一人患脾服此將驗而庸醫阻之反用寒藥

遂致不救

嘗驗人有不耐勞不能食冷或飲食作脹大便不實或口
舌常破如瘡服涼藥愈盛盜汗不止小便頻數腰腿無力
或嚥津或呼吸竟令氣入腹或陰囊濕痒或手足冷或面
白或驚黑或畏寒短氣已上諸症皆屬腎非用附子不
治驗數條見前渴論

外科理例卷之一終

