

筆花醫鏡

述盦



民國三年仲冬

筆花殿酒鏡

海陵袁蔚山題

重刻醫鏡序

醫之道大矣哉素問難經傳自上古逮張仲景而下名醫輩出各有撰述無慮數十家總若千萬言蓋醫為生死攸關故所以闡發而指示之者諄諄乎不厭其詳也顧諸家之書多本其性情學力之所近抑或因時因地寓補偏救弊之苦心若黃岐遺編則又鈞深探幽粹難窺其涯矣學者不能融會而折衷之乃徒剽竊膚辭拘溺陳方以嘗試于出生入死之際盲于心而昧于目欲其如鏡照物也難矣歸安江氏筆花者醫鏡一冊首叙諸證受病之由次分五臟六腑表裏寒熱虛實之見證而各以方藥大概列于後以次及于稚于婦人靡不備焉蓋取諸家之精言融會而折衷之故雖寥寥四卷而句斟字酌神明變化能使閱者豁然心目間至其論察病之要在望與問而不徒以據脉定証作欺人之語則卓然自抒所見生面獨開名之為鏡洵不愧也爰付梓重病用廣流傳俾善學者慎思而明辨執簡以御繁於受病之源及現証之淺深夷險瞭如指掌朗若列眉吾知審方投藥起死回生必將有旋至而立效者則是書也誠不啻照胆之秦鏡也豈第洞見垣一方人已哉

道光二十四年十二月初吉安邑李天錫與三氏識

序

適得筆花醫鏡一編捧閱之餘竊喜註証分明列方詳慎刪繁就簡開卷了然而其中論肝氣之何以治與頭痛之所以然則于余尤為愜心憶先贈君偶患肝氣當時悞投藥劑竟至不起今是書論治肝之法剖晰詳明向使早閱是書何至為醫者所悞則甚矣余獲是書之晚也現太宜人患頭痛者三十餘年偏重良醫迄未一得余于是編雖未敢輕以相試要其竟委窮源各有治之之法設病非沈疴當必霍然奏效今夫人子之事親也苛瘡抑搔之外每遇床第呻吟莫不百方圖治而遐陬僻壤或有力而無處延醫茅舍窮簷或有醫而無力延致使于是書早為留意庶有身乎歸安江公為濟世之苦心余因其板在山左乃重刻而廣其傳實欲為世之事親者得一助也是為序

後明家輩出議論紛如而合諸病情變幻有難以按圖而索驥者暇何人斯而敢以一二淺言謂足以罄乃事乎然至變者病而可見者恃乎形至精者醫而可據者恃乎理以形求理即以簡馭繁達乎此通乎彼固有千萬言所不盡能而一二語足以賅之矣暇自中歲究心醫學往來于江浙之間深知其難亦不敢自安于拙迫服東粵學漸荒蕪而習見此邦醫士如文家相題布局理法未清其何以司活人之柄耶病家固不甚講求但以神鬼為福即偶醫診而默受其悞者亦終莫之知是誠不服藥為良矣可慨也夫暇久思引救礙于官箴茲將引退還山畧舉其要鑄為一編俾人人得有簡要之方偶一症自可按對病情審為何臟何腑是陰是陽不乘乎表裏虛實寒熱之真即知為心肝脾胃肺腎之疾症既洞澈為自效靈較諸受命于瞽以身為鵠者其損益可昭然判也誠願有志者熟玩是編據為要領而旁參諸大家之說自可一覽了然將近以事親遠以濟眾於生靈不無稍補焉是為序者

道光四年孟夏之月上澣浙江歸安江涵職自序

數頁書豈能療千萬病然有綱舉目張之法蓋病總由臟腑總不外虛實寒熱審知其為何臟何腑之虛實實症寒症熱症而聯其病類以集之則藥歸同路療一病可療千萬病亦無不可固不在多立病名多立方書也此所謂鏡也

凡人不願知醫者以卷帙浩繁見而生畏不知從何學起也茲但言其現何病象係何臟腑作何治法寥寥數語亦易知矣其一切經絡源委概不縷叙避繁瑣也若欲究其全則自有諸名家書在

用藥如用兵須量其材力之大小蓋有一利即有一弊如大補大攻大寒大熱之品誤用即能殺人各部後分為猛將次將俾閱者不敢輕用亦必斟酌分量庶知利害

人生一小天地病之輕者如日月之食不轉瞬自必回和斷不可輕易服藥恐益乎此則損乎彼也暇閱歷既久悉知其故益受眾怨不輕徇情此事如老將臨陣大賈航海愈歷鍊而愈知畏耳

是書淺近說法別無精意不過願人人稍知醫理不為庸醫所誤以延壽命且鄉僻間不及延醫者亦可對症自醫取其便耳至醫家讀書少而閱歷淺者得此亦有頭緒稍知把握便可活人

醫家首在立品古人云行欲方而智欲圓心欲小而胆欲大人之性命在我掌中專心揣摩求尚虞有失此事豈同兒戲乎若一涉利心則貧富歧視同道相攻偽約欺售置人命于腦後矣試仰觀蒼蒼者何物耶而為病家者亦宜以上賓禮貌相待須思此人為我父母妻子救命而來並非剃頭剔脚者可任我招

是編總挈之處用口分晰病由用△證明病狀用、切要處用○

是編大半採仲景東垣景岳鍾齡諸家之說亦述而不作之意凡古人立方寓有精意然斷不可呆用余嘗見溪醫未經閱歷者暑倦輒用清暑益氣湯而不知黃芪之悶遇熱喘輒用生脉散而不知五味子之斂卒至暑熱伏留纏綿牀褥而斃甚可哀也他如六味地黃湯及麻黃湯桂枝湯等必須斟酌萬萬而定或用次將之品代之否則一誤之下不挽回歸咎古人古人豈任受哉

目錄

卷一

診脈歌

望聞問切論

內傷外感雜治說

虛勞論治

望舌色

表裏虛實寒熱辨

傷寒症治

疫痢瘧腫論治

卷二

心部

脾部

腎部

膀胱部

大腸部

三焦部

肝部

肺部

胃部

膽部

小腸部

心包絡部

卷三

兒科目錄

兒科論治

外熱內熱辨

痰火閉症

大驚猝恐

初生保治

非驚論

木梅土症

夜啼

男  
形動校字

卷一  
目錄

目錄

一  
文益書在石印

吐瀉

傷暑

食積痞積蟲積痰積水積

疝症

盜汗自汗

咳嗽

解顛龜胸龜背

此外諸症治法與方脈同故不贅敘

卷四

婦科目錄

婦人證論

室女

月經

肝氣

帶下

嗣孕

胎前諸症

臨產將護法

產後諸症

天台程鍾齡女科一卷悉從諸大家論說中斟酌盡善而出之字字毫無遺憾並無近世臨証指南等纖巧習氣故依治每收實功茲卷大半宗此以為女科正範此外諸症與方脈同治者概不贅叙



診脈歌

病人雙腕仰。高骨定為關。依掌後之骨。定為關脈。寸脈量虎口。尺脈準臂彎。關前距虎口一寸。故曰寸。左寸心胞絡。左關

胆與肝。左尺司何職。膀胱腎係焉。右寸胸中肺。胃脾屬右關。要知大腸腎。右尺自照然。

口鼻一呼吸。脈來四五跳。此是無病者。平和氣血調。三至為遲候。六至作數教。遲則寒之象。數則熱之標。一二

寒愈盛。七八熱更饒。

輕舉得皮面。表邪脈故浮。若是病在裡。重取須沉求。洪長徵實健。細弱識虛柔。水濕並痰飲。滑利又弦道。緊促

氣內亂。伏瀆氣疑留。妊娠中止代。失血中穴孔。代脈中孔。抵脈中空。祇此尚易見。其他渺以幽。

望舌色

舌者。心之竅。凡病俱現于舌。能辨其色。症自顯然。舌尖主心。舌中主脾胃。舌邊主肝胆。舌根主腎。假如津液如

常。口不燥渴。雖或發熱。尚屬表症。若舌苔粗白漸厚而膩。是寒邪入胃。挾濁飲而欲化火也。此時已不辨滋味

矣。宜用半夏。藿香。迨厚膩而轉黃色。邪已化火也。用半夏。黃芩。若熱甚失治。則變黑。胃火盛也。用石膏。半夏。或

黑而燥裂。則去半夏。而純用石膏。知母。麥冬。花粉之品。以潤之。至厚苔漸退。而舌底紅色者。火灼水虧也。用生

地。沙參。麥冬。石斛。以養之。此表邪之傳裏者也。其有脾胃虛寒者。則舌白無苔而潤。甚者連口唇面色俱痿白。

此或泄瀉。或受濕脾無火力。速宜黨參。焦朮。木香。茯苓。炙草。干姜。大棗。以振之。虛甚欲脫者。加附子。肉桂。若脾

熱者。舌中苔黃而薄。宜黃芩。心熱者。舌尖必赤。甚至起芒刺。宜黃連。麥冬。竹捲。心肝熱者。舌邊赤。或芒刺。宜柴

胡。黑山梔。其舌苔厚而黃者。胃微熱者。用石斛。知母。花粉。麥冬之類。若舌中苔厚而黑燥者。胃大熱也。必用石

膏。知母。如連牙牀唇口俱黑。則胃將蒸爛矣。非石膏三四兩。生大黃一兩。加黃金汁。人中黃。鮮生地。汁。天冬。麥

冬汁銀花露大劑之投不能救也。此唯時疫發斑及傷寒症中多有之。余嘗治一獨子。先後用石膏至四十斤。餘而斑始退。病始退。此其中全恃識力。再有舌黑而潤澤者。此係腎虛。宜六味地黃湯。若滿舌紅紫色而無苔者。此名絳舌。亦屬腎虛。宜生地熟地天冬麥冬等。更有病後絳舌。如鏡發亮而光。或舌底嗑乾而不飲冷。此腎水虧極。大劑六味地黃湯投之。以救其津液。方不枯涸。

### 望聞問切論

望者看形色也。聞者聽聲音也。問者訪病情也。切者診六脈也。四事本不可缺一。而唯望與問為最要何也。蓋聞聲一道。不過審其音之依响。以定虛實。嗽之悶爽。以定升降。其他則無可聞也。切脈一道。不過辨其浮沉。以定表裏。遲數以定寒熱。強弱以定虛實。其他則胸中了了。指下難明。且時大時小。忽浮忽沉。六脈亦難準定。故醫家謂據脈定症。是欺人之談也。惟細問情由。則先知病之來歷。細問近狀。則又知病之淺深。而望其部位之色。望其唇舌之色。望其大小便之色。病情已得八九矣。而再切其脈。合諸所問所望。果相符否。稍有疑義。則默思其故。兩兩相形。虛與實相形。寒與熱相形。表與裏相形。其中自有把握之處。即可定斷。慎斯術也。以往其無所失矣。

### 表裏虛實寒熱辨

凡人之病。不外乎陰陽。而陰陽之分。總不離乎表裏。虛實寒熱。六子盡之。夫裏為陰。表為陽。虛為陰。實為陽。寒為陰。熱為陽。良醫之救人。不過能辨此陰陽而已。庸醫之殺人。不過錯認此陰陽而已。假如發熱惡寒。鼻塞咳嗽。頭痛脈浮。舌無苔口不渴。此病之在表者也。如或潮熱惡熱。口渴舌黃。腹痛便澀。脈沉。此病之在裏者也。假如氣短體弱。多汗驚悸。手按心腹四肢畏冷。脈來無力。此病之本虛者也。若病中無汗。或狂燥不臥。腹脹拒按。脈實有力。此病之又實者也。假如唇舌俱白。口不渴。喜飲熱湯。鼻流清涕。小便清大便溏。手足冷。脈遲。此病之犯寒者也。若舌赤目紅口渴。喜冷煩燥。溺短便秘。或唇燥舌乾。此病之患熱者也。凡此皆陰陽之分也。至于邪感正氣。陰虛火亢等。則又陰中之陽。陽中之陰。其間毫厘千里。命在反掌。辨之者。安得而不慎。

汗而熱即退。不必再服。但避風寒。忌油膩。未得汗。則再劑而止。若寒熱往來。欲作瘧狀。宜用柴胡分酒。分赤芍錢。製半夏五分。甘草分。大棗枚。生姜以和之。虛者加防黨錢。此其症在表。切勿妄用枳壳神糶麥芽消導之藥。引邪入內。

裏治宜歸經也。有虛實。有寒熱。宜辨其病在何臟腑。而治之。法詳臟腑門。惟喜怒哀憂思悲恐驚。謂之七情。此裏症之最難治者。但寬其心。而藥始效。否則無益也。然症在于裏。大忌發散。散之則虛者汗脫。熱者煽熾。醫者動輒用表。可懼哉。

虛治宜補也。然有陰虛。有陽虛。血虛者為陰虛。宜補其血。輕者用生地錢。四錢。首烏錢。二錢。歸身錢。五錢。酒芍錢。五錢。炙龜甲錢。二錢。檀豆皮錢。三錢。海參錢。三錢。北沙參錢。三錢。之類。重者用熟地錢。五錢。枸杞錢。三錢。五味分。黃肉錢。一錢。兔絲錢。一錢。以填之。氣虛者為陽虛。宜補其氣。輕者用黨參錢。三錢。白朮錢。二錢。山藥錢。二錢。茯苓錢。一錢。五分。甘草分。紅棗枚。生姜片。之類。重者用人參錢。黃芪錢。五分。以振之。氣欲脫。則并加附子錢。乾姜錢。以回陽。若氣血兼虛。則陰陽並補。八珍湯十全大補湯。皆之聖藥也。

實治宜瀉也。心有邪火。肺有風寒。脾有食積虫痞。濕熱。肝有鬱怒之氣。胆胃胞絡。膀胱大小腸。各能受邪。皆為實症。治法詳各臟腑門。然治實。以速為功。苟遷延日久。病未去而元氣虛。則難消導矣。

寒治宜溫也。寒在表。則惡風寒。宜蘇荈錢。藿梗錢。荊芥防風各錢。前一錢。胡五分。杏仁錢。三錢。生姜片之屬。以散其邪。甚則桂枝分。麻黃分。細辛分。寒在裏。則喜熱湯。宜製夏錢。藿香錢。五分。焦朮錢。五分。製朴錢。一錢。吳茱萸分。焦穀芽錢。煨姜片。砂仁粒之屬。以煖其中。甚則附子分。肉桂分。干姜分。凡寒症。唇舌必白。脉遲便利。腹或冷痛。一投寒涼。入口立脫慎之。

熱治宜涼也。然熱症。有實火。有虛火。實火之症。或因外感。或因內鬱所致。宜分臟腑治之。火之微者。黑山梔

五分石斛錢三地骨皮錢青蒿五錢丹皮錢連翹五錢麥冬二錢花粉五錢銀花錢三竹葉五錢燈心一握之屬甚加黃連分黃芩五分或石膏錢知母五分極甚則用大黃五分龍胆草分等虛火之症或陽虛外熱口不渴唇不紅脉不數宜四君子湯以補其陽若陰虛內熱舌或絳頭或痛目或乾過午便熱宜四物湯六味地黃湯以補其陰

內外傷感雜治說

前言表裏虛實寒熱六字病已盡在其中矣而表裏之中又有內傷外感之治焉內傷者裏症也而有氣血痰鬱四字之分外感者表症也而有風寒暑濕火燥六字之別再詳其法醫無餘蘊矣

內傷一曰氣氣虛者四君子湯若氣實而滯者宜香蘇散平胃散二曰血血虛者四物湯若血實而凝者宜手拮散三曰痰痰輕者二陳湯六君子若頑痰膠固變生怪症或停飲膈間宜滾痰丸小半夏加茯苓湯之類四曰鬱凡喜怒哀思悲恐驚皆可致鬱鬱小者起鞠丸逍遙散若五鬱互結腹膨腫滿二便不通宜神佑丸承氣湯之類此內傷之治也

外感一曰風真中風是也非表治中之偶感風寒也風有中腑中臟中血脉之殊中腑者與傷寒同太陽用加味香蘇散陽明用葛根湯少陽用小柴胡湯中臟者眩仆昏冒痰聲如鋸內有熱風寒風二種熱閉則先用搐鼻散次以牛黃丸灌之便結脹用三花湯冷脫則汗珠頭搖以附子理中湯急救之或三生飲中血脉者口眼喎斜半身不遂大秦羌湯加竹瀝姜汁勾藤二曰寒傷寒是也寒在表則與風之中腑治同寒入裏用附子理中湯法詳傷寒論三曰暑暑輕者但煩渴益元湯足矣暑重者汗喘昏悶消暑丸灌之寒包暑者頭痛惡寒而煩渴四味香薷飲加荆芥秦艸若暑天受濕而霍亂藿香正氣散主之更有乾霍亂症吐瀉不得俗名攪腸痧粥飲入口即散危症也陳香元煎湯救之四曰濕或受潮濕食冷面黃身重平胃散治之若黃疸則目溺色黃茵陳大黃湯茵陳五苓散茵陳姜附湯若發腫五苓散五皮飲若滲入

六日火。治法詳于前熱治中。更審其臟腑。投涼則得矣。然中寒則暴痛。中暑則猝悶。中濕則痠寒。中火則  
竅閉。皆能猝然昏倒。非中風而類中風。謂之類中。勿概作中風治。此外感之治也。

### 傷寒論治

傷寒之症。與春溫夏熱不同。溫熱症。頭痛發熱。心不惡寒。而口渴。若傷寒。則異是。其病由表而入裏。初起時。邪  
在太陽膀胱經。則頭痛惡寒。發熱脈浮。宜加味香蘇散。或桂枝湯麻黃湯。柴葛解肌湯。繼傳陽明胃經。則目痛  
鼻乾。唇焦不渴。宜葛根湯。再傳少陽胆經。則目眩耳聾。胸滿脇痛。口苦寒熱往來。頭汗脈弦。宜小柴胡湯。此三  
陽傳經之表症也。失治則傳入三陰矣。其傳入少陰脾經者。則腹滿。痛下利。脈沉。宜大柴胡湯。其傳入少陰腎  
經者。口燥咽乾。痛利清水。目不明危矣。宜小承氣湯。大承氣湯。至傳入厥陰肝經者。小腹滿。舌卷囊縮。厥逆。用  
大承氣湯。或有得生者。亦有不傳三陰。而傳入太陰脾腑者。則口渴溺赤。宜五苓散。傳入陽明胃腑者。則譫語  
狂亂。燥渴便閉。轉失氣自汗。不得眠。宜白虎湯。調胃承氣湯。以上謂傳經傷寒。因寒化火也。其有初起寒邪直  
中三陰者。其症腹冷痛。吐清沫利完穀。踈臥肢冷。囊縮吐蚘。舌黑而潤。脈沉細。此寒症也。中太陰脾。理中湯。中  
少陰腎。四逆湯。中厥陰肝。白通加豬胆汁湯。急投勿緩。此係醫中第一要症。故專論之。

### 虛勞論治

虛勞之症。大症也。固由真陰虧損。虛火鑠金而然。而其始。大半由于外感。感邪在肺。則作咳嗽。治失其宜。則咳  
不已。久咳則傷肺金。金傷不能生水。則腎水日枯。腎火日熾。上灼于肺。再復嗜色慾。受外邪以竭其水。而虛勞  
成矣。間有本元不足。思慮太過。而心血耗。心火旺。腎水乾。肺金痿者。其受病不同。及其成功一也。此等症。多見  
吐血痰湧。發熱夢遺。經閉以及肺痿肺癰。咽痛音啞。側臥傳尸鬼。注諸疾。唯在屏棄一切。不近女色。調飲食。慎  
風寒。息嗔怒。靜養二三年。服藥可不服藥亦可。自然生機徐轉。復其天和。非旦夕所能效也。然既有症。必治。列  
方備擇。仍在其人之能自養耳。

咳嗽初起用止咳散加蘇梗以散之。如或不已變生虛熱者佐以團魚丸。若病勢漸深更佐以月華丸。若吐血先用四生丸繼用生地黃湯道遙散之類。元氣虛五味異功散如氣血虛而熱八珍湯人參養榮湯俱可。咽痛用百葯煎散音啞用通音煎如道精用秘精丸。經閉澤蘭湯至五臟虛損則補天大造丸用藥之法不過如斯而已。此症十存一二其能存者皆自養之功非約力也。

### 疫痢瘡腫論治

疫痢瘡三症最多腫最難治。故合提而論。疫有由天時者有由人染者。由天時則邪從經絡入為頭痛發熱咳嗽頸腫發頤大頭天行之類。用香蘇散普濟消毒飲治之。由人染則邪從口鼻入為增寒壯熱胸膈滿悶口吐黃涎之類。用神朮散藿香正氣散治之。此兩路之邪若傳入臟腑漸至譫語腹脹唇焦口渴者宜治疫清涼散承氣湯治之。總不越乎發散解穢清中攻下四法而已。痢症則生死所關良由夏秋之際暑熱在中而為風寒生冷所遏火不得舒迫而為痢也。熱者為赤寒者為白熱傷血分者為赤熱傷氣分者為白。初起時不宜妄攻宜葛根治痢散以解之餘邪未已裏急後重則用治痢奇方以清之。腹脹痛有堅積則用朴黃丸下之。日久脾虛五味異功散加白芍黃連木香清補之。氣虛下陷者補中益氣湯升提之。如邪穢塞胃嘔逆不食者開噤散啟之。此一定之治法也。瘡則輕于痢矣。寒邪入內陰陽相搏初起寒熱往來用香蘇散逐之。隨用小柴胡湯和之。三四發後止瘡丹加白蔻仁醋炒薑甲以截之久瘡元虛六君子湯加柴胡補之。中氣下陷補中益氣湯舉之。此易治也。惟腫脹一症目胞與足先腫者水也。先腹大後四肢腫者鼓脹也。鼓脹症用和中丸。虛者白朮丸水腫症四肢腫而腹不腫者表也。腹亦腫者裏也。腰以上腫邪在表也。以下腫邪在裏也。宜利小便。五皮飲加赤小豆澤瀉車前草解防己。但煩渴便閉者陽水熱也。五皮飲加連翹黃柏黃芩。不煩渴者陰水寒也。五皮飲加附子干姜肉桂先腫而後喘或但腫而不喘者胃經蓄水也。五皮飲照前加減治之。若先喘而後腫者腎經聚水也。金匱腎氣丸治之。此症最難收功。慎勿誤治。更有中風後熱傷經絡足不任地腿腫脹痛者此脈痿也。用蒼朮黃柏苓連冬斛歸地苁蓉寄生草解丹參之類。又有腫痛在脚名曰腳氣風濕勝也。用麻柳防己丸。

首卷列方

六味地黃湯 滋水制火專治血氣亦可為丸 大熟地四錢 山萸肉 山藥各二錢 丹皮 茯苓 澤瀉

八珍湯 治氣血並虛即四君四物相併 大熟地四錢 西黨參三錢 白朮 當歸 茯苓各二錢 白芍一錢五分

十全大補湯 治陰陽並虛而畏冷即八珍湯加黃耆錢 肉桂分

四君子湯 治氣虛脾胃不足之症 人參錢 土炒白朮錢 茯苓錢 炙甘草分

六君子湯 加生薑二片大棗三枚。古方用人參如無力以西黨參代之 治氣虛挾痰即四君子湯加製半夏五分 陳皮錢

香砂六君子 治胃寒吐瀉即六君子湯加藿香錢 砂仁粒

五味異功散 治氣虛即四君子湯加陳皮錢

四物湯 治血虛肝腎不足之症 太熟地四錢 麥芽 白芍各二錢 川芎錢

香蘇散 治時邪感冒頭痛發熱等症 蘇葉五分 陳皮 香附各五分 荊芥 秦艽 防風 蔓荊子

平胃散 治脾胃不和脹滿嘔吐霍亂等症 藿香五分 厚朴二分 蒼朮分 陳皮錢

二陳湯 治肺胃寒痰 製半夏 陳皮 茯苓各五分 炙草分 加生薑一片棗二枚

手拈散 治血滯心腹作痛 元胡索醋炒 五靈脂醋炒 草菓 沒藥各分

深痰丸 治老痰變生怪症 大黃 炒黃芩各兩 青蒙石 沉香各錢 辰砂錢

右為細末每服三錢熱酒調下

以水為丸辰砂為末每服一二錢開水下

小半夏加茯苓湯 治飲停膈間加蒼朮更效 半夏炒 白茯苓各錢三 炙甘草錢 加生姜三片

越鞠丸 治鬱膈痞滿 香附 山查 炒神曲 炒麥芽 川芎 蒼朮 炒梔子各等分

右為末水調和如桐子大每服五七十九開水送下

逍遙散 治肝經血虛木鬱 柴胡 甘草 茯苓 白朮 當歸 白芍 丹皮 黑山梔各錢一 薄荷五分

神佑丸 治沉積變病氣虛血壅滯濕熱風痰鬱結 黑丑二兩 大黃兩一 芫花 大戟 甘遂各錢五 輕粉錢

右為末用皂角去子煎濃湯糊丸每服必瀉勿可輕用

大承氣湯治邪熱閉結或食積堅硬宜下之 大黃錢三 枳實錢五 厚朴錢 芒硝錢

小承氣湯 治症稍緩 即前大承氣湯去芒硝

葛根湯 治邪傳陽明以此解肌 葛根錢二 升麻 秦艽 荊芥 赤芍各錢一 甘草 半夏各錢一

生姜二片

小柴胡湯 治寒熱往來少陽瘧疾口苦耳聾胸滿脇痛 柴胡錢二 赤芍錢一 甘草 半夏各錢一 黃芩

一錢五分 人參分五 生姜三片 大棗二枚

搐鼻散 治一切關症不省人事吹入鼻中有嚏者生 皂角兩一 生半夏錢五 細辛兩一

右為細末入磁瓶勿泄氣

牛黃丸 治中風痰火閉結或喘噉痰壅不省人事 牛黃 射香 龍腦以上各六錢 羚羊角 當歸 防風

黃芩 柴胡 白朮 麥冬 白芍各七錢半 桔梗 茯苓 杏仁 川芎 大豆黃卷 阿膠各八錢

蒲黃 人參 神曲各錢一兩二錢五分 雄黃四錢 甘草二兩 白斂 肉桂各錢七分 乾薑七錢 犀角兩一 山藥五錢

大棗五十枚 金箔一百五十片為衣



附子理中湯 治臟寒將脫之症用以回陽 人參 白朮各錢 附子 乾姜 炙甘草各錢  
三生飲 治寒風中臟六脉沉細 生南星 生烏頭 生附子各五分 生薑片 生木香五分

此方用人參兩許同投更有益

大秦朮湯 治風中經絡口眼歪斜等症 秦朮五分 炙草 川芎 當歸 芍藥 熟地 茯苓 羌活

獨活 白朮 防風 白芷 黃芩各分 細辛分 如陰雨加生薑三片同煎

益元散 利數消暑 甘草兩 滑石兩 共研極細末冷開水調服

消暑丸 治中暑昏悶 製半夏兩 茯苓 甘草各兩 共為末生薑汁糊丸

四味香需飲 治風寒閉暑之症 香需 扁豆 厚朴各五分 炙甘草分

若兩足轉筋加木瓜茯苓

藿香正氣散 藿香 砂仁 厚朴 茯苓 紫蘇 陳皮各錢 白朮 製半夏 桔梗 白芷各分

炙甘草分

茵陳大黃湯 治黃疸熱閉 茵陳錢 梔子 大黃各錢

茵陳五苓散 治陰黃小便不利 茵陳 白朮 茯苓各五分 豬苓 澤瀉各分 薄荷分

茵陳姜附湯 治陰黃小便自利 茵陳錢 白朮錢 附子 乾姜各分 炙草錢 肉桂分

五苓散 治小便不通 茯苓錢 豬苓 澤瀉各分 白朮分 桂枝錢

四苓散 治伏暑小便不通 茯苓即五苓散去桂枝

五皮飲 治胃經蓄水發為水腫 大腹皮 茯苓皮 陳皮 桑白皮各五分 生薑皮分

秦朮天麻湯 治寒濕入絡肩背臂痛 秦朮五分 天麻 羌活 陳皮 當歸 川芎各錢 炙甘草分

生薑片 炒桑皮錢 挾寒加桂枝

蠲痺湯 治風寒濕三氣成痺 羌活 獨活各錢 桂心五分 秦艽錢 當歸 桑枝各錢 川芎分

海風藤錢 炙甘草分 乳香 木香各分

桂枝湯 治太陽中風寒 桂枝 芍藥 生姜各一錢 炙甘草錢 大棗四枚

麻黃湯 治太陽傷風無汗此方宜于西北 麻黃錢 桂枝錢 炙甘草錢 杏仁十二枚

柴葛解肌湯 治溫熱症發熱頭痛不惡寒與傷寒異 柴胡二錢 葛根五分 赤芍 知母 貝母各錢

生地錢 黃芩 丹皮各五分 甘草分

大柴胡湯 治傷寒邪入太陰 柴胡一錢 半夏分 黃芩 芍藥各錢 枳實錢 大黃錢

白虎湯 治陽明胃腑大熱 石膏錢 知母錢 甘草錢 粳米撮 若熱甚者倍之

調胃承氣湯 治胃熱譫語便閉繞臍硬痛 大黃錢 芒硝錢 甘草分

四逆湯 治少陰中寒肢冷厥逆 附子錢 乾薑錢 炙甘草錢

白通加猪胆汁湯 治陰盛隔陽熱藥不入 附子錢 乾薑錢 葱白錢 人尿杯 猪胆汁五茶匙

止嗽散 治一切咳嗽 桔梗 荆芥 紫苑 百部 白前各斤 甘草二兩 陳皮斤

共為細末每服三錢初感風寒生薑湯下

團魚丸 治久咳將成癆瘵 川貝 知母 前胡 柴胡 杏仁各錢 大團魚一個重十二兩 以上者去腸

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥渣焙乾為末煮魚骨汁為丸如桐子麥冬湯日三服

月華丸 滋陰保肺平肝為治癆之聖藥 天冬 麥冬 生地 熟地 山藥 百部 沙參 川貝

真阿膠各兩 茯苓 獺肝 廣三七各錢

用葯花二兩桑葉二兩熬膏將阿膠化入和葯煉蜜為丸日三服每一丸

四生丸 治血熱妄行而為吐衄 生地黃 生荷葉 生側柏葉 生艾葉各等分

舊金 廣三七 荷葉各分 加陳墨汁清童便各半杯冲服

人參養榮湯 治氣虛榮衛不固 白芍錢 人參 蜜炙黃芪 當歸 白朮 熟地各五分 炙甘草

茯苓 遠志各分 北五味 桂心 陳皮各分 加生姜斤 棗仁

百藥煎散 治咽痛 百藥煎錢 礪砂五分 甘草錢 共為末米飲調下

通音煎 治音啞 白蜜斤 川貝斤 款冬花兩 胡桃肉皮研爛

右將川貝款冬花為末四味和勻飲上蒸熟開水服下

秘精丸 理脾導濕治濁固精 白朮 山藥 茯苓 茯神 蓮子肉各兩 芡實兩 蓮花鬚 牡蠣各

五錢 黃柏錢 車前子兩 共為末金櫻膏為丸

澤蘭湯 治經閉調血脉 澤蘭錢 相子仁 當歸 白芍 熟地 牛膝 羌蔚子各五分

補天大造丸 補五臟虛損 人參兩 蜜黃芪 蒸白朮各兩 炒棗仁 當歸 山藥 茯苓各五分

枸杞子 大熟地各兩 河車具 鹿角斤 龜板八兩與鹿角共熬膏

以龟鹿二膠和藥煉蜜為丸

普濟消毒飲 治大頭痘症喉風發癰等症 甘草 桔梗 酒芩 酒黃連各錢 馬勃 元參 橘紅

柴胡各分 薄荷分 升麻分 連翹 牛旁子各分

神朮散 治時行不正之氣滿悶吐瀉發熱傷食 蒼朮 陳皮 厚朴各斤 炙甘草兩 藿香兩 砂仁

四兩 共為末每服二三錢

治疫清涼散 治疫邪入裏脹悶譫狂諸症 秦艽 赤芍 知母 貝母 連翹各錢 荷葉分 丹參錢

柴胡一錢 人中黃錢

葛根治痢散 治痢初起赤白皆效 葛根一錢 酒炒苦參分 陳皮錢 赤芍 陳松蘿茶炒麥芽

查肉各二錢 右為細末煎服有火者加川連五分

治痢奇方 治暑痢 川連分 山查錢 酒苓 厚朴 歸身 白芍各五錢 甘草五 桃仁 青皮

紅花各分 枳壳 地榆各錢 檳榔二錢 如白痢加木香六分

朴黃丸 治堅積作痢腹痛拒按 陳皮 厚朴各耐 二 大黃四耐 廣木香兩 荷葉水為丸

補中益氣湯 中氣下陷以此升之 黃芪五錢 當歸 炙草各錢 土炒白朮 人參各錢 柴胡

升麻各分 陳皮五 加生薑一片 大棗二枚

開噤散 治噤口痢 人參 姜汁炒黃連各五 石菖蒲分 丹參錢 石蓮子 茯苓 陳皮 冬瓜仁

去壳各一錢五分 陳米撮 荷葉蒂 仁

上瘧丹 治瘧二三發後以此止之 火酒炒常山 草薺仁去壳 半夏糶 炒 米酒炒香附 青皮醋 各兩

真六神糶二耐 為末米飲糊丸清晨面東服

和中丸 治腹脹實積 土炒白朮兩 炒扁豆兩 茯苓 砂仁各五錢 姜製半夏兩 曲炒枳實

炒神曲 炒麥芽 炒山查 姜汁炒香附 酒蒸丹參各兩 陳皮 五穀虫炒焦 各兩

右為末荷葉一枚煎水為丸

白朮丸 治氣虛中滿 白朮 茯苓 陳皮各兩 砂仁 神曲各五錢 五穀虫兩

用荷葉老米煎水為丸

金匱腎氣丸 治腎經聚水 此即六味丸加桂附車前牛膝 大熟地兩 山藥兩 山萸肉 丹皮

澤瀉 車前子 牛膝各兩 茯苓兩 查肉兩 附子兩

如水腫用五加皮八兩煮水煉蜜為丸

心部 手少陰屬臟

心體屬火。位南方。色現赤。胸下岐骨陷處。其部位也。凡額上手足心。皆其所轄。得血以養之。方能運慧思用才。智。心無表症。皆屬于裏。

心之虛。血不足也。脉左寸必弱。其症為驚悸。為不得卧。為健忘。為虛痛。為怔忡。為遺精。

驚悸者。惕惕然恐神失守也。七福飲秘旨安神丸主之。

不得卧者。思慮太過。神不藏也。歸脾湯。安神定志丸主之。

健忘者。心腎不交。神明不充也。歸脾湯。十補丸主之。

虛痛者。似饑似飢。似手撫心。喜得手按。洋參麥冬湯主之。

怔忡者。氣自下逆。心悸不安。歸脾湯主之。

遺精者。或有夢。或無夢。心腎不固也。清心丸。十補丸主之。

心之實。邪入之也。心不受邪。其受者。胞絡耳。脉左寸必弦而大。其症為氣滯。為血痛。為停飲。為痰迷。為暑閉。為虫啗。

氣滯者。或食脹。或怒冲煩悶而痛。沉香降氣散主之。

血痛者。血凝于中。痛有定處。轉側若刀針刺。手拈散主之。

停飲者。乾嘔吐涎。痛作水聲。小半夏加茯苓湯主之。如有飲囊。則加蒼朮名倒倉法。

痰迷者。頑痰壅閉。不省人事。清膈煎灌之。

暑閉者。汗喘昏悶。先以消暑丸灌之。再用香薷加益元散。

虫啣者。飢時作痛。面白唇紅。化虫丸主之。

心之寒。脉左寸必遲。其症為暴痛。

暴痛者。脉冷氣冷。綿綿不休。姜附湯加肉桂主之。

心之熱。火迫之也。脉左寸必數。舌尖赤。其症為目痛。為重舌木舌。為煩燥。為不得卧。為癩狂。為譫語。為赤濁。

為尿血。

目痛者。赤腫羞明。導赤散加連翹。菊花。蟬脫主之。

重舌木舌者。瀉心丸主之。

煩躁者。瀉心丸加竹捲心主之。

不得卧者。暑熱乘心也。導赤散加益元散主之。

癩狂者。棄衣罵詈。生銑落飲主之。

譫語者。邪熱攻心也。瀉心丸主之。

赤濁者。草解分清飲。加燈心丹參主之。

尿血者。阿膠散主之。

心部藥隊

補心猛將 北五味

補心次將 棗仁 柏子仁 遠志 丹參 龍眼 麥冬 當歸 白芍 茯神

瀉心猛將 石菖蒲 黃連 木通 硃砂 犀角

瀉心次將 山梔仁 連翹心 通草 車前子 竹捲心 燈心 蓮子心

心部列方

橘紅各五分 五味子樹 芩草五 生姜片 製羊夏各錢 當歸 炒白芍

歸脾湯 養血安神 人參 白朮 當歸 白芍 棗仁各五分 黃芪半錢 遠志分 炙草五 元眼肉五

安神定志丸 治心惕不卧 茯苓 茯神 人參 遠志各兩 石菖蒲 龍齒各錢

蜜為丸神砂為衣每服二錢

十補丸 治氣血大虧之症 黃芪 白朮 黃肉 杜仲 續斷 棗仁各兩 大熟地兩 人參 當歸

白芍 遠志各兩 茯苓 山藥各五兩 北五味 龍骨 牡蠣各五分

洋參麥冬湯 治心經虛熱而痛者 洋參 麥冬 當歸各錢 生地錢 白芍 丹參 釵石斛各五分

犀角 甘草各五

清心丸 清心火止夢泄 生地兩 丹參兩 黃柏錢 牡蠣 山藥 炒棗仁 茯苓 茯神 麥冬

各一兩 北五味 車前子 遠志各兩

沉香降氣散 治心滯氣痛 沉香錢 砂仁錢 炙草錢 鹽水炒香附兩 酒炒元胡索兩 煨川棟兩

共為末每服二錢姜湯送下

清膈煎 治痰壅心膈 製胆星錢 白芥子錢 海石錢 陳皮 木通 川貝各錢

化虫丸 治虫積心腹諸痛 蕪夷 白雷丸各錢 檳榔五分 雄黃五分 木香 白朮 陳皮各錢

妙神曲錢 以百部二兩熬膏糊丸每服一錢五分米飲下

薑附湯 治寒厥心痛 又真心痛手足青至節宜用本方大劑飲之或救十中之一二痛而喜按者更加

人參 干姜 熟附子各錢 水煎服

導赤散 治熱閉小便不通 麥冬錢 木通錢 生地錢 甘草分 竹葉汁 車前子 赤茯苓各五分

瀉心丸 治心火 川黃連錢 為末燈草湯下

生鉄落飲 治心熱 天冬 麥冬 川貝各錢 胆星 橘紅各錢 遠志 石菖蒲 連翹 茯苓

茯神各錢 元參 鈎藤 丹參各五分 辰砂錢 用生鉄落煎熬三炷香時取此水煎服

草解分清飲 治心移熱膀胱而為赤濁者並治諸淋 川草解 炒黃柏 石菖蒲各分 茯苓

白木各錢 蓮子心分 丹參 車前子各五分

阿膠散 治尿血 阿膠錢 丹參 生地各錢 黑山桅 血餘 丹皮 麥冬 當歸各分

手拈散 以下俱見首卷方

小半夏加茯苓湯

消暑方

香薷飲

益元散

肝部 足厥陰屬臟

肝與胆相符東方木也其性剛賴血以養自兩脇以下及小腹陰囊之地皆其部位最易動氣作痛其風又能上至巔頂而痛于頭色屬青常現于左顴目眦於婦人為尤甚

肝無表症皆屬于裏

肝之虛腎水不能涵木而血少也脉左關必弱或空大其症為脇痛為頭眩為目乾為眉棱眼骨眶痛為心

悸為口渴為煩燥發熱

脇痛者血不營筋也四物湯主之

頭眩者血虛風動也逍遙散主之

目乾者水不養木也六味地黃丸主之



心肝者血少而虛火燥也。甘露飲主之。

口渴者。血虛液燥也。甘露飲主之。

煩躁者。發熱者。虛火亢也。六味地黃丸主之。

肝之實。氣與內風充之也。脉左關必弦而洪。其症為左脇痛。為頭痛。為腹痛。為小腹痛。為積聚。為疝氣。為咳嗽。為泄瀉。為嘔吐。為呃逆。

左脇痛。肝氣不和也。柴胡疎肝散。瓜蒌散並主之。

頭痛者。風熱也。清空膏主之。或柴胡疎肝散。

腹痛者。肝木乘脾也。芍藥甘草湯主之。

小腹痛者。癥瘕之氣聚也。奔豚丸主之。有熱者。去附桂。

積聚者。肝積在左脇下。名曰肥氣。和中丸加柴胡。豨甲。青皮。莪朮主之。

疝氣者。氣結聚于下也。橘核丸主之。寒則加吳茱萸。肉桂。

咳嗽者。木火刑金也。止咳散。加柴胡。枳殼。赤芍主之。

泄瀉者。木旺剋土也。四君子湯。加柴胡。木香主之。

嘔吐者。木火凌胃也。二陳湯。加炒黃連主之。

呃逆者。氣鬱火冲也。橘皮竹茹湯主之。

肝寒之症。脉左關必沉遲。其症為小腹痛。為疝瘕。為囊縮。為寒熱往來。

小腹痛者。寒結下焦也。煖肝煎。奔豚丸主之。

疝瘕者。寒氣結聚也。橘核丸。加吳茱萸。肉桂主之。

囊縮者。寒主斂故縮也。奔豚丸。四逆湯主之。

寒熱往來者。欲化癘也。小柴胡湯主之。

肝熱之症。脈左關必弦數。其症為眩暈。為目赤腫痛。為口苦。為消渴。為頭痛。為脇痛。為瘰癧。為聾耳。為筋痿拘攣。為氣上衝心。為偏墜。為舌捲囊縮。為小便不禁。

眩暈者。風熱上升也。逍遙散主之。

口苦者。胆味苦。肝熱胆亦熱也。小柴胡湯主之。

目赤腫痛者。風火入目也。蟬花無比散主之。

消渴者。風燥其液也。一柴胡飲主之。

頭痛者。火上冲也。柴芩煎主之。

脇痛者。肝火鬱也。柴胡疎肝散。加瓜蒌霜主之。左金丸亦可。

瘰癧者。血燥筋急而生也。消瘰丸主之。兼服逍遙散。

聾耳者。風熱相搏。津液凝聚而瘖痛也。逍遙散去白朮。加荷葉木耳貝母香附菖蒲主之。

筋痿拘攣者。血氣熱也。五痿湯加黃芩丹皮牛膝主之。

氣上冲心者。火逆也。柴芩煎主之。甚則小承氣湯。

偏墜者。熱而羸丸舒縱也。柴胡疎肝散主之。

舌捲囊縮者。邪火入厥陰。血涸也。大承氣湯主之。

小便不禁者。肝氣熱。陰挺失職也。逍遙散主之。

### 肝部藥隊

補肝猛將 枸杞 北五味 烏梅

補肝次將 山茱萸 兔絲子 首烏 當歸 白芍 沙苑 蒺藜 龍甲 龍骨 牡蠣 木瓜

瀉肝猛將 鬱金 桃仁 青皮 莪朮 沉香

瀉肝次將 香附 木香 延胡索 柴胡 山梔 川芎 川棟子 赤芍藥 八寶丹

涼肝猛將 龍胆草 胡黃連

涼肝次將 羚羊角 夏枯草 石決明 青蒿 菊花

溫肝猛將 肉桂 桂枝 吳茱萸 細辛 胡椒 骨碎補

溫肝次將 兔絲子 艾葉 山茱萸 茴香

肝部列方

甘露飲 治血虛胃熱 枇杷葉 生地 熟地 天冬 麥冬 黃芩 石斛各錢 甘草伍 枳殼分

柴胡疎肝散 治肝氣左脇痛 柴胡 陳皮各二錢 川芎 赤芍 枳殼 醋炒香附各錢 炙草伍

瓜蒌散 治肝氣燥急而脇痛 大瓜蒌一枚連皮搗 甘草錢 紅花分 水煎服

清空膏 治肝經風熱入升為頭痛 羌活 防風各分 柴胡伍 黃芩二錢 川芎四 炙草錢

薄荷分三 酒炒黃連分

芍藥甘草湯 治木侮土而腹痛 酒炒白芍錢 炙甘草錢

奔豚丸 治小腹氣結作痛 川棟子兩 茯苓 橘核各半兩 肉桂錢 小茴香 木香各錢 附子

吳茱萸各錢 荔枝核錢

橘核丸 通治疝 鹽酒炒橘核錢 小茴香 川棟子 桃仁 醋炒香附 山查各兩 木香

紅花各錢 以神曲三兩打糊為丸

二陳湯 治胃經寒痰 半夏 茯苓 陳皮各錢 炙草伍 生姜片 大棗一枚

橘皮竹茹湯 治氣鬱火衝呃逆 陳皮錢 竹茹圓 半夏 人參 甘草各錢

煖肝煎 治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣 當歸 枸杞各錢 茯苓 小茴香 烏藥各錢 肉桂 沉香各

錢 生姜三片

蟬花無比散 治目赤腫痛 蟬脫二兩 羌活一兩 川芎 石決明 防風 茯苓各一兩 赤芍半兩

白茯苓斤 炙甘草 當歸各三兩 米泔浸蒼朮一兩 為末開水服

一柴胡飲 治外有邪而內有火肝燥胃渴 生地錢 白芍二錢 黃芩半錢 柴胡八分 陳皮八分 甘草五分

柴芩煎 治內火上衝或為痢瘧頭痛諸症 柴胡錢 黃芩 梔子 澤瀉各五分 木通 枳殼一錢

左金丸 治肝氣痛 川黃連一錢 吳茱萸七分

消瘰丸 治瘰癧初起即散久服亦消 蒸元參 醋煨牡蠣 蒸川貝母各四錢 蜜為丸每服三錢

五痿湯 治五臟受熱而痿 人參 白朮 茯苓各一錢 炙甘草四分 當歸半錢 苡仁三錢 麥冬二錢 黃柏

知母各五分

四物湯 以下俱見首卷方

逍遙散

六味地黃湯

和中丸

止咳散

四君子湯

小柴胡湯

四逆湯

大承氣湯

小承氣湯

七福飲 見心部方

脾土之功為最大。然其性喜燥而惡濕。一受濕漬則土力衰而肝木即乘以侮之。位中焦。眼胞鼻準及四肢皆其分野。與胃相表裏。故其約略同。

脾無表症皆屬于裏。

脾虛者。右關脈必細軟。其症嘔吐。為泄瀉。為久痢。為腹痛。為肢軟。為面黃。為發腫。為肌瘦。為鼓脹。為惡寒。為自汗。為喘。為積滯。不消。為飲食化瘦。為脫肛。為腸紅。

嘔吐者。中空也。六君子湯。加煨姜主之。

泄瀉者。土不勝濕也。五味異功散。加木香主之。

久痢者。氣虛下陷也。補中益氣湯主之。

腹痛者。肝木乘脾也。芍藥甘草湯。加木香主之。

肢軟者。脾屬四肢也。五味異功散主之。

面黃者。本色虛現也。六君子湯主之。

發腫者。皮不亮。手按成窟。補中益氣湯主之。去升柴。

肌瘦者。脾主肌肉也。十全大補湯主之。

鼓脹者。中空無物。氣虛也。六君子湯主之。

惡寒者。陽虛不達于表也。附子理中湯主之。

自汗者。脾主肌肉。表虛不攝也。五味異功散。加黃芪。五味主之。

喘者。土不勝金也。五味異功散。加北五味。牛膝主之。

積滯不消者。化穀無力也。六君子湯。加穀芽。砂仁。肉桂主之。

飲食化瘦者。土不勝濕也。六君子湯主之。

脫肛者。虛氣下陷也。補中益氣湯主之。

腸血者。脾不統血也。歸芍六君子湯主之。

脾實者。右關必洪實。其症為氣積。為血積。為食積。為痰積。為蟲積。為痰飲。為虫脹。為腹痛。為不能食。

氣積者。氣鬱發悶也。沉香降氣丸主之。

血積者。蓋血作痛如刺。有定處也。澤蘭湯主之。

食積者。堅滯脹滿也。大和中飲主之。

疔積者。血滯成瘡。癰疽疔瘡可按也。太無神功散和中丸主之。

虫積者。濕熱所化也。唇內有白點。化神丸主之。

痰飲者。或停心下。或兩脇有聲。咳則痛。小半夏。加茯苓湯主之。

虫脹者。中食有物。非虫即血也。和中丸主之。

腹痛者。中有滯也。香砂二陳湯。和查芽厚朴主之。

不能食者。食味消也。保和丸主之。

脾寒之症。右關必沉遲。唇舌必白。其症為嘔吐。為泄瀉。為白痢。為腹痛。為身痛。為黃疸。為濕腫。為肢冷。為厥

脫。

嘔吐者。食不消而反胃也。平胃散主之。

泄瀉者。土失職也。六君子湯加炮姜主之。

白痢者。積寒傷氣也。六君子湯加木香主之。

腹痛者。綿綿不減。香砂理中湯主之。如挾食拒按。木香丸主之。

身痛者。拘急為風。重墜為濕。風用香蘇散。濕用蒼白二陳湯。

濕腫者不順濕熱五苓散主之

肢冷者。陽氣不營于四末也。附子理中湯主之。

厥脫者。氣衰火息也。附子理中湯。加大劑人參主之。

脾熱之症。右關必數。舌苔薄而黃。唇赤。其症為熱吐。為流涎。為洞泄。為瀉。為赤痢。為腹痛。為目胞腫痛。為

酒疸。為眩暈。為陽黃疸。

熱吐者。食不得入也。橘皮竹茹湯。加姜汁炒黃連主之。

流涎者。睡中出沫也。脾熱蒸濕也。黃芩芍藥湯主之。

洞泄者。暑濕勝土。一泄如注也。四苓散。加益元散主之。

瀉。動者。暑熱內搏。利如蟹渤。將變痢也。黃芩芍藥湯主之。

赤痢者。暑熱傷血也。治痢奇方主之。或葛根治痢散。噤則開噤散。

腹痛者。乍作乍止。芍藥甘草湯。加黃連清之。

目胞腫痛者。火上升也。柴苓煎主之。

酒疸者。酒濕積而為疸也。加味枳朮湯。加茵陳葛根主之。

眩暈者。酒濕生熱上蒸也。葛花清脾湯主之。

陽黃疸者。黃如橘皮有光。目溺皆黃。梔子蘘皮湯主之。如便閉。茵陳大黃湯。

脾部藥隊

補脾猛將 白朮 黃精

補脾次將 山藥 扁豆 苡仁 大棗 炙甘草

瀉脾猛將 枳實 萊菔子

瀉脾次將 神曲 麥芽 山查 枳殼 厚朴 大腹皮 使君子 白芷 雞內金 陳皮 檳榔

溫脾猛將 附子 干姜 巴豆 內豆蔻 草菓 蒼朮 胡椒

溫脾次將 木香 煨姜 烏藥 益智仁 藿香 砂仁 白蔻仁 蕪夷 焦穀芽 川椒

涼脾猛將 大黃 黃芩 瓜萸霜

涼脾次將 黃柏 山梔 知母 銀花 武彝茶

脾部列方

歸芍六君子湯 治脾陰虛弱下血 歸身 白芍各二錢 人參 白朮 茯苓各錢 陳皮 半夏各一錢

炙甘草五

大和中飲 治食積脹悶 枳實錢 厚朴錢 麥芽 查炭各一錢 陳皮錢 砂仁分 澤瀉錢

太無神功散 治一切痞積 地扁蓄 瞿麥穗 麥芽各五錢 神曲二錢 沉香 木香各五分 炙草五錢

酒蒸大黃二 共為末每服二三錢燈心竹葉湯下 女人紅花當歸湯

香砂二陳湯 治脾滯腹痛 木香 砂仁各一錢 製半夏 陳皮 茯苓 炙草各五分

加生薑一片大棗二枚

蒼白二陳湯 治受濕身痛 即前方去木香砂仁加蒼朮白朮各一錢

保和丸 治傷食 麥芽 山查 萊菔子 厚朴 香附各一錢 炙甘草 連翹各五分 陳皮錢半

水煎服亦可

香砂理中湯 治脾寒腹痛 木香 砂仁各一錢 人參 白朮各二錢 干姜 炙草各一錢

木香丸 治寒積腹痛拒按名曰陰結 木香 丁香各錢 干姜三錢 炒麥芽錢 陳皮錢 巴豆三十粒

以神曲煮糊為丸每服十丸

黃芩芍藥湯 治脾熱流涎利如蟹渤等症 黃芩 白芍各二錢 生甘草一錢



茵陳 荷葉各錢 澤瀉五 如傷酒加葛根一錢

葛花清脾湯 治酒濕生熱生痰頭眩頭痛 葛花錢 枳椇子錢 赤苓三錢 澤瀉 茵陳 酒苓錢 二山梳

車前子 各錢 甘草五 橘紅 厚朴錢一

梔子蘗皮湯 治鬱熱在裏面發黃疸名曰陽黃 梔子錢 黃柏錢 炙草錢

六君子湯 附子理中湯 補中益氣湯 五味異功散 五苓散 香蘇散 十全大補湯 澤瀉湯

小半夏加茯苓湯 平胃散 茵陳五苓散 益元散 和中丸 葛根治痢散 治痢奇方

開噤散 以上諸方俱見首卷

沉香降氣丸 化虫丸 二方見心部

芍藥甘草湯 橘皮竹茹湯 柴苓煎 三方見肝部

肺部 手太陰屬臟

肺主氣屬西方而色白其形如華蓋為諸陽之首凡聲之出入氣之呼吸自肺司之其性驕嫩故與火為仇其體屬金而畏燥故遇寒亦咳凡目白及右頰鼻孔皆其分野然肺氣之衰旺關乎壽命之短長全恃腎水充足不使虛火燉金則長保清寧之體而壽臻永固

肺有裏症亦有表症肺主皮毛故也邪在表右寸脈必浮其症為發熱為噴嚏為鼻塞為咳為嗽為畏風為

胸滿痛為喉疼為鼻燥為傷暑風為中時疫

發熱者腠理閉也香蘇散主之

噴嚏者鼻塞者肺竅受邪也二陳湯加蘇葉生姜主之

咳者無痰而有聲氣為邪逼也杏更前胡湯主之

嗽者有聲而有痰液已化痰也止嗽散主之

喘者。風寒閉塞也。加味甘桔湯主之。  
畏風者。邪在皮毛也。香蘇散主之。

胸滿痛者。氣鬱而脹也。加味甘桔湯主之。

喉痛者。邪化火而內陷也。加味甘桔湯主之。

鼻燥者。邪化火而液乾也。貝母瓜蒌散主之。

傷暑風者。惡寒頭痛而煩渴。香薷散。加荆芥秦艽主之。

中時疫者。初頭痛發熱。漸嘔惡胸滿。或脹悶譫狂。唇焦口渴。先用香蘇散。次則神術散。又治疫清涼散。便

閉加大黃。

肺虛之症。右寸脉必細。其症為自汗。為咳嗽。為氣急。為咯血。為肺痿。為虛勞。

自汗者。氣虛表不固也。八珍湯。加黃芪北五味麥冬主之。

咳嗽者。肺虛不甯也。五味異功散主之。

氣急者。金不生水而虛火上炎也。知柏八味丸主之。

咯血者。陰虛動火也。初用四生丸。兼用生地黃湯。

肺痿者。火刑金而葉焦也。五痿湯。加天冬百合主之。或紫菀散。人參燕窩百合湯亦可。

虛勞者。吐血而成。月華丸歸脾湯。六味地黃湯並主之。

肺實之症。脉右寸必有方。其症為氣閉。為痰閉。為暑閉。為水閉。發喘。為風閉。為火閉。為咽痛。為右脇痛。為

肺癰。

氣閉者。氣壅塞其絡而滿悶也。加味甘桔湯主之。

痰閉者。頑痰壅塞也。清膈湯主之。

風閉者風鬱于肺而哮喘也。麻黃湯主之。

火閉者火鬱于肺而喘脹也。白虎湯加桑皮葶藶主之。

咽痛者諸閉皆能作火也。加味甘桔湯主之。

右脇痛者肝移邪于肺也。推氣散主之。

肺癰者隱隱而痛。吐痰腥臭也。桔梗湯主之。

肺寒之症。外感居多。脉右寸必遲。其症為清涕。為咳嗽。為惡寒。為面色痿白。

清涕者寒搏其液也。二陳湯加蘇梗主之。

咳嗽者金畏寒也。止嗽散主之。

惡寒者陰忌其類也。香蘇散主之。

面色痿白者寒傷正氣也。六君子湯主之。

肺熱之症。脉右寸必數。其症為目赤。為鼻衄。為咽痛。為吐血。為咳嗽濃痰。為酒積。為龜胸。為小便利。為便血。

目赤者火剋金也。瀉白散加黃芩荊花連翹主之。

鼻衄者血熱妄行也。茜根湯主之。

咽痛者火逼咽道也。加味甘桔湯主之。

吐血者火動其血也。四生散犀角地黄湯主之。

咳嗽濃痰者火刑金而灼肺液也。黃芩清肺飲。加葛花主之。

龜胸者肺熱而脹也。白虎湯主之。

小便利者火灼金而化源窒也。黃芩清肺飲。加鹽豉主之。

便血者。肺與大腸相表裏。火迫血行也。芍藥甘草湯加黃芩丹皮生地主之。

肺部藥隊

補肺猛將 黃芪 人參

補肺次將 黨參 沙參 百合 燕窩 阿膠 懷山藥 訶子 麥冬 冰糖

瀉肺猛將 葶藶 麻黃 白芥子 桔梗 升麻 胆星

瀉肺次將 蘇子 牛蒡 杏仁 前胡 紫菀 桑白皮 殭蚕 竹茹 貝母

涼肺猛將 石膏 竹瀝 馬兜鈴 山如姑

涼肺次將 洋參 元參 山梔 花粉 天冬 地骨皮 知母 麥冬 薄荷 海石

溫肺猛將 麻黃 天南星 北五味

溫肺次將 蘇梗 欵冬花 製半夏 生姜

肺部列方

桔梗前胡湯 治肺氣閉塞悶咳 桔梗錢 前胡 蘇子 赤芍 桑白皮錢 陳皮錢 杏仁錢

姜汁炒竹如錢 生甘草分

加味甘桔湯 治肝鬱哮喘等症 甘草分 桔梗 貝母 百部 白前 橘紅 旋覆花 茯苓錢

貝母瓜蒌散 治肺熱液乾 貝母錢 瓜蒌仁錢 胆星 黑山梔錢 黃芩 橘紅 炒黃連錢

甘草分

知柏八味丸 滋水降火 知母 黃柏錢 大熟地錢 萸肉 山藥 茯苓錢 丹皮 澤瀉錢

紫菀散 潤肺止咳並治肺痿 人參 紫菀 知母 川貝 桔梗 茯苓 阿膠錢 五味子

炙甘草 各三分

人參燕窩百合湯 潤肺清金 人參 燕窩 百合 沙參 麥冬 生地 黃芪 甘草 紫菀 知母 川貝 山藥 茯苓 丹皮 澤瀉 杏仁 蘇子 前胡 桑白皮 陳皮 橘紅 旋覆花 茯苓 黃芩 橘紅 炒黃連 瓜蒌仁 胆星 黑山梔 白前 百部 貝母 甘草 蘇子 牛蒡 杏仁 前胡 紫菀 桑白皮 殭蚕 竹茹 貝母 石膏 竹瀝 馬兜鈴 山如姑 洋參 元參 山梔 花粉 天冬 地骨皮 知母 麥冬 薄荷 海石 麻黃 天南星 北五味 蘇梗 欵冬花 製半夏 生姜

推氣散 治右脇氣痛 枳壳 鬱金各一錢 桂心 炙草各五 桔梗 陳皮各八 生姜 大棗各

桔梗湯 治肺癰 桔梗 白芨 橘紅 炒甜葶藶各六 甘草 貝母各錢 苡仁 金銀花各五錢

瀉白散 治肺熱 蜜炙白桑皮錢二 地骨皮錢三

茜根湯 治衄血神煩 茜根 黃芩 阿膠 側柏葉 生地各二錢 甘草一錢

犀角地黄湯 治血熱妄行及癰疹 犀角尖 鎊先煎 丹皮 麥冬 白芍各錢 生地四錢

黃芩知母湯 治火嗽煩熱 黃芩 知母 桑白皮 杏仁 天花粉 山梔 川貝 桔梗 甘草各一

黃芩清肺飲 治肺熱小便不利 梔子二錢 黃芩一錢

香蘇散 止嗽散 香薷飲 神朮散 八珍湯 治疫清涼散 五味異功散 生地黄湯

月華丸 六味地黃湯 消暑丸 五皮飲 麻黃湯 六君子湯 四生丸 白虎湯 以上諸方俱見首卷

歸脾湯 清膈煎 二方見心部

二陳湯 五癩湯 芍藥甘草湯 三方見肝部

腎者。天一之水。先天之本也。位北方故黑。其體常虛。處腰左右。介其中者。有命門火。蒸化穀食。名曰真陽。腎水充足。自多誕育。享大壽。凡夙夜宣勞。晝而不倦者。皆腎氣之固也。好色之流。先竭腎水。喪其本矣。腫神下頰。兩膜皆其部位。望氣者。覘之。

腎無表症。皆屬於裏。

腎主虛。脈左右尺常細軟。其症為頭痛。為耳鳴。為耳聾。為盜汗。為夜熱。為健忘。為咳嗽。為喘。為吐血。為腰痛。為腿痠足軟。為目視無光。為大便結。為小便不禁。為戴陽。為久痢久瘧。

頭痛者。血不能充髓海也。六味地黄丸主之。

耳鳴者。血虛火旺也。六味地黄丸。加牛膝。知母主之。

耳聾者。虛閉也。六味地黄丸。加枸杞。人參。石菖蒲。遠志主之。

盜汗者。虛熱也。生地黃煎入珍珠湯。加黃耆。北五味。並主之。

夜熱者。虛火也。四物湯。加丹皮。地骨。青蒿主之。

健忘者。心腎不交也。棘皮湯。十補丸主之。

咳嗽者。虛火燔金也。六味地黄丸。加白蜜。胡桃主之。

喘者。水虧火炎也。知柏八味丸主之。

吐血者。血虛血熱也。生地黃湯主之。

腰痛者。水不足也。六味地黄丸。加杜仲。川續斷主之。

腿痠足軟者。血不營筋也。十全大補湯主之。

目視無光者。水不足也。六味地黄丸主之。

大便結者。血虛液枯也。六味地黄丸。加白蜜胡桃主之。

小便不禁者。腎氣不約也。十補湯主之。

戴陽者。陰火上亢。陰躁似濕躁也。金匱腎氣丸主之。

久痢久瘡者。脾腎皆虛也。王母桃主之。

### 腎無實症

腎之寒。腎之虛也。脈左右尺必遲沉。其症為命門火衰。為不欲食。為雞鳴泄瀉。為天柱骨倒。為踈卧厥冷。為奔豚。

命門火衰者。虛象百出。左踈飲右踈飲主之。

不欲飲食者。火力微也。八味地黄丸主之。

雞鳴泄瀉者。腎虛也。加味七神丸主之。

天柱骨倒者。督脉空也。右踈飲主之。

踈卧厥冷者。火衰也。右踈飲理中湯並主之。

奔豚者。腎氣上衝也。奔豚丸主之。

腎之熱。水將涸也。傷寒門有之。而雜症罕見。左尺右尺必沉數。或浮而空。舌黑無液。其症為口燥咽乾。為目

不明。為小便不利。為小便濁。為小便出血。為大便閉。

口燥咽乾者。水涸也。大承氣湯主之。

目不明者。目無血養也。知柏八味丸主之。

小便不利者。水少也。滋腎丸主之。

小便濁者。濕熱結於下焦也。萹蘆分清飲主之。

小便出血者。腎水熱也。生地黃湯主之。

補腎猛將 熟地 枸杞 淫羊藿 北五味

補腎次將 生地 巴戟天 首烏 杜仲 龜板 女貞 稽豆皮 海參

瀉腎猛將 猪苓

瀉腎次將 澤瀉 知母 赤苓 苡仁

涼腎猛將 朴硝 元明粉 苦參

涼腎次將 生地 丹皮 知母 滑石

溫腎猛將 破故紙 鹿茸 鹿角膠

溫腎次將 山茱萸 兔絲子 大茴香 艾葉

腎部列方

生地黃煎 治陰火盜汗 生地 當歸 炙黃芪 麻黃根 浮小麥 炙甘草 黃連 黃芩 黃柏各

錢 水煎服

王母挑 培補脾腎 炒冬白朮 大熟地各二 何首烏 炒白戟 枸杞子各一 共為細末煉蜜為丸

如圓眼大每月三四丸飢時服

左隄飲 壯水之劑 熟地錢五 山藥 枸杞各二 茯苓錢一 山茱萸 炙艸各一

右隄飲 補命門真火不足 熟地錢五 山藥 枸杞 杜仲各二 山茱萸 肉桂 製附子 炙甘草各一

錢

八味地黃丸 治命門火衰 製附子 肉桂各一 大熟地錢四 山藥 萸肉 茯苓各一錢 丹皮 澤

瀉錢各一

加味七神丸 治腎虛雞鳴泄瀉 肉豆蔻 吳茱萸 廣木香各一 蒸茯苓 補骨脂各一 車前子各一



二 土炒白朮兩 大棗煎湯為丸每服三錢

滋腎丸 治下焦血熱用此滋陰化氣 黃柏 知母各二兩 肉桂錢一 煉蜜為小丸

六味地黃湯 八珍湯 四物湯 十全大補湯 歸脾湯 生地黃湯 金匱承氣丸 理中湯 大承氣

湯以上諸方俱見首卷 十補丸 草薢分清飲二方見心部 奔豚丸見肝部 知柏八味丸見肺部

胃部足陽明屬

胃屬中土。司受化穀食。經云得穀者昌。失穀則亡。其能受與否。生死係焉。其性與脾同。而畏木侮。舌之中反。牙環唇口。而交人中。皆其分野。色現黃。

胃謂陽明。有經有腑。故有表症。右關脉必浮。傷寒邪入陽明經。其症為目痛。鼻乾唇焦。嗽水不欲嚥。若他表症。為面浮腫而痛。為癩疹。

目痛鼻乾唇焦者。邪熱作火也。葛根湯主之。

面浮腫而痛者。風也。葛根湯主之。

癩疹者。邪熱所化也。葛根湯加牛蒡子主之。

胃之虛。其唇必白。脉右關必軟弱。其症為吐為噎膈。為不能食。為胃脘痛。為停滯。為濕腫。為痰為雜嗜。

吐者。土虛木侮也。香砂六君子湯加柴胡主之。

噎膈者。胃脘乾槁也。上脘槁能飲水而食難進。下脘槁食可久而久復出。啟膈散主之。佐以四君子湯有

鬱則道遙散。

不能食者。胃氣虛而難受也。六君子湯主之。

胃脘痛者。心悸怔忡。喜按。脾脾湯。或四君子湯加柴胡木香。

停滯者。土虛不化也。枳朮丸主之。

嘈雜者。躁擾不盜也。得食暫已。氣促食少。中虛快腹也。五味異功散主之。  
胃之實。脘右關必洪。按胸則痛。其症為結胸。為痞氣。為食積。為痰飲。為水腫。為胸脹悶。為胸痛。嘔  
膿。為不得臥。為便閉。謔語發狂。

結胸者。傷寒下早。邪熱結聚也。大小陷胸湯主之。  
痞氣者。脾之積在胃脘。腹大如盤。和中丸加厚朴主之。

食積者。脹痛拒按也。保和丸主之。  
痰飲者。咳則痛。轉側有聲。小半夏加茯苓湯主之。外臺茯苓飲尤效。

水腫者。先腫後喘。或腫而不喘。胃經蓄水也。五皮飲主之。甚則金匱腎氣丸。  
胸脹悶者。積滯也。保和丸主之。

胸脹痛者。蓄血也。澤蘭湯主之。  
胸痛嘔膿者。胃脫癰也。不必治而自愈。

不得臥者。胃不和。則臥不安也。二陳湯加砂仁主之。  
便閉謔語發狂者。胃有燥失也。大承氣湯主之。

胃之寒。唇舌必白。脘右關必沉遲。其症為胃脘痛。為嘔吐。為霍亂。為吞酸。噯腐。  
胃脘痛者。肢冷氣冷。絲絲不休。薑附湯加肉桂主之。如吐蛔。加川椒。烏梅。川連。焦木。川棟。

嘔吐者。食入復出也。平胃散加煨薑砂仁主之。  
霍亂者。寒濕傷胃也。和胃飲主之。

吞酸噯腐者。寒不消食也。香砂二陳湯主之。  
胃之熱。唇舌紅。口臭。脘右關必洪數。其症為三消。為嘈雜。為吐血。為齒痛。為黃胖。面腫。為自汗。為舌黑。燥渴。

為癍疹。為便閉。為呃逆。為頭痛。

三消者。燥熱結聚也。口渴消水。為上消。二冬湯主之。消穀易飢。為中消。生地八物湯主之。口渴小便如膏。為下消。六味地黃湯。加生脉散主之。

嘈雜者。煩擾不寧。口燥唇焦。痰火為患也。二陳湯。加山梔黃連主之。

吐血者。胃火迫血妄行也。白虎湯主之。

齒痛者。陽明有餘。少陰不足也。玉女煎主之。

黃胖面腫者。濕熱也。和中丸主之。

自汗者。熱而蒸溼也。抽薪飲主之。

舌黑燥渴者。胃火熾甚也。白虎湯主之。

發癍疹者。火鬱而化也。初用葛根湯。加牛蒡子以散之。次用犀角大青湯。加石膏。或三黃解毒湯。甚則白

虎湯。調胃承氣湯。

呃逆不止者。胃火上衝也。安胃飲主之。

頭痛者。頭筋扛起。胃火上衝也。加味芩麻湯主之。

胃部藥隊

補胃猛將 白朮 黃耆 大棗

補胃次將 扁豆 山藥 炙甘草 龍圓 紅棗

瀉胃猛將 石菖蒲 枳實 雷丸 白芥子 萊菔子 神曲

瀉胃次將 蘇梗 枳壳 蔓荊子 麥芽

涼胃猛將 石膏 犀角

涼胃次將 花粉 葛根 香薷 石斛 草薢 知母 蘆根 竹葉

溫胃次將 藿香 砂仁 白蔻仁 半夏 烏藥 煨薑 厚朴 川椒

胃部列方

枳木丸 除脹消食 炒枳實一兩 炒白朮二兩

大陷胸湯 服小陷胸湯不效以此治之 大黃錢六 芒硝錢四 甘遂二錢五分

小陷胸湯 治結胸小腹痛滿手不可近 半夏錢二 黃連錢一 瓜蒌仁個大者一

和胃飲 治霍亂 厚朴 陳皮錢二 干姜錢一 炙艸六分

二冬湯 治上消 天冬錢二 麥冬錢三 花粉 黃芩 知母 各一錢 人參 甘草 各五分

生地八物湯 治中消 生地 麥冬錢三 山藥 知母 丹皮錢一 黃連 黃芩 黃柏 各一錢

荷葉二錢水煎服

玉女煎 治陽明有餘少陰不足 熟地錢四 石膏 麥冬錢三 知母錢一 牛膝益水錢五分

抽薪飲 治一切火盛 黃芩 石斛 木通 梔子 黃柏錢二 枳殼 澤瀉各錢半 甘草三分

庫角大青湯 治胃火發癍大渴大熱或咽痛不利 犀角尖 大青 元參 甘艸 升麻 黃芩 黃柏

人中黃 黑山梔錢一 或加石膏一兩同煎

三黃解毒湯 治火毒內盛 黃連錢二 黃芩 黃柏 黑山梔各錢半

安胃飲 治胃火呃逆 石斛 麥芽各三錢 黃芩 澤瀉 山查各一錢 陳皮 木通各一錢

如味升麻湯 治胃火上衝頭痛甚熾 升麻 葛根 赤芍 甘艸錢一 石膏錢三 薄荷五分 燈芯十二

葛根湯 香砂六君子湯 四君子湯 逍遙散 異功散 六君子湯 和中丸 小半夏加茯苓湯

五皮飲 金匱腎氣湯 澤蘭湯 六味地黃丸 大承氣湯 平胃散 白虎湯 調胃承氣湯以上方見

脾脾湯 姜附湯二方見心部 二陳湯肝部 保和丸 香砂二陳湯脾部 外臺茯苓飲即異功散加枳

筆化書鏡 卷三 日一文益書莊石印

片用真  
人參

膀胱部 足太陽屬腑

膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化而能出矣。然腎氣不足。則不化。腎氣足則化。入氣不化。則水踈大腸而為泄。濕出氣不化。則閉塞下焦而為癃腫。小便之利。膀胱主之。寔腎氣主之也。傷寒傳經之邪。每自膀胱入。一見太陽頭痛等症。即宜發散。不使邪氣入。為諸經害。則膀胱為第一關隘矣。

膀胱為太陽。腑有表症。左尺脈必浮。其症為頭痛。為項脊強。為身痛四肢拘急。為發熱。為惡寒無汗。為喘嗽。頭痛者。頭腦痛而連項脊也。加味香蘇散主之。甚者加羌活葱白。

項脊強者。太陽所經過之地也。香蘇散主之。

身痛四肢拘急者。風傷衛。寒傷營。寒主收引也。桂枝湯主之。

發熱者。腠理閉塞也。香蘇散主之。

惡寒無汗者。寒乘表也。麻黃湯主之。

喘嗽者。寒邪客於皮毛。肺氣不得升降也。麻黃湯主之。輕者止嗽散。

膀胱之虛。腎氣不化也。脉左尺必細沉。其症為小便不禁。為勞淋。為老淋。

小便不禁者。虛氣不能統攝也。十補湯主之。

勞淋者。勞力辛苦。氣虛不化。補中益氣湯主之。

老淋者。老人思色。精不出而敗內。大小便牽痛如淋。宜葶藶分清飲。去黃柏加兔絲。遠志。以去其精。再服

六味地黃丸。

膀胱之寔。脉左尺必洪大。其症為氣淋。為血淋。為關格。為膀胱氣。

氣淋者。氣滯水道。阻塞臍下脹痛也。假蘇散主之。

膀胱氣者。一名胞痺氣。結膀胱。少腹熱。瀆於小便也。橘核丸主之。

膀胱之寒。左尺必沉遲。其症為冷淋。

冷淋者。寒氣堅閉水道。肢冷喜熱也。金匱氣丸主之。

膀胱之熱。左尺必數。其症為小便不通。為膏淋。為石淋。為便膿血。為發狂。

小便不通者。渴則熱在上焦。四苓散加山梔黃芩。不渴則熱在下焦。滋腎丸主之。

膏淋者。滴液如膏也。萹薢分清飲主之。

石淋者。下如沙石也。益元散加琥珀主之。

便膿血者。心氣遺熱於膀胱也。阿膠散主之。

發狂者。傷寒熱結膀胱。下焦蓄血。少腹硬滿也。調胃承氣湯主之。

膀胱部藥隊

補膀胱藥。即補腎之藥。腎氣化。則小便自行。

瀉膀胱猛將 羌活 麻黃 防己 木通 葶藶 猪苓

瀉膀胱次將 獨活 防風 蒲黃 川棟子 前胡 藜蘆 澤瀉 葱

涼膀胱猛將 甘遂 龍胆草

涼膀胱次將 車前子 茵陳 海金沙 川黃柏

溫膀胱猛將 吳茱萸

溫膀胱次將 烏藥 茴香

膀胱部列方

假蘇散 治氣淋 荊芥 陳皮 香附 炒麥芽 瞿麥 木通 赤苓 各二錢

生地四物湯 治血淋 生地 銛三 躑躅 赤芍 枳殼 川芎 一錢

香蘇散 桂枝湯 麻黃湯 止嗽散 益元散 補中益氣湯 六味地黃丸 金匱腎氣丸

調胃承氣湯 已見首卷 十補丸 草薢分清飲 阿膠散 心部 橘核丸 視肝 四苓散 視脾 滋腎丸 視腎

膽部 足少陽屬膽

膽者清虛之府居。半表半裡之交。與肝為表裡。氣血足則胆氣壯。氣血虛則胆氣怯。胆受邪。即陰陽交戰。而寒熱往來。故瘧症之來不一。而總不離乎陽也。然其胆事之力。猶中正之官。不偏不倚。決斷出焉。

胆有表症。左關脉必浮而弦。其症為頭汗。為寒熱往來。

頭汗者。寒邪將化火也。小柴胡湯加丹皮主之。

寒熱往來者。陰陽相爭者。小柴胡湯主之。

胆之虛。左關脉必細軟。其症為驚悸。為太息。

驚悸者。心血不足以壯之也。安神定志丸主之。

太息者。氣虛也。四君子湯主之。

胆之寔。左關脉必洪。其症為胸滿。為脇痛。為耳聾。

胃滿者。邪氣結聚也。小柴胡湯加枳殼桔梗主之。

脇痛者。邪入胆經布之脇下也。小柴胡湯加山桅枳殼主之。

耳聾者。氣火上衝而閉也。逍遙散加曼荆石菖蒲香附主之。或小柴胡湯。

胆之寒。脉左關必遲。其症為精滑。為嘔吐。為舌苔滑。

精滑者。肢腫食少。心虛煩悶。坐卧不安。温胆湯主之。

嘔吐者。邪正相爭也。小柴胡湯加藿香湯主之。

胆之熱者。服汁泄也。小柴胡湯主之。

嘔吐者。胆移熱於胃也。小柴胡湯加姜炒竹茹主之。

盜汗者。熱開腠理也。小柴胡湯加丹皮主之。

目眩者。胆附於肝。肝竅在目。熱故眩也。小柴胡湯加山桅主之。

膽部藥隊

補胆猛將 烏梅

補胆次將 棗仁

瀉胆猛將 桔梗 青皮

瀉胆次將 柴胡 香附 秦艽 川芎

涼胆猛將 龍胆艸

涼胆次將 青蒿 槐實

溫胆猛將 肉桂 細辛

溫胆次將 山茱萸

膽部列方

溫胆湯 治胆氣虛寒。夢遺精滑等症。製半夏錢 枳實八分 陳皮 茯苓各錢 人參錢一

款地 炒棗仁各三錢 遠志錢一 五味子錢 甘艸伍分 生薑三片 大棗一枚

小柴胡湯 四君子湯 逍遙散三方見首卷 安神定志丸觀心 二陳湯觀肝

大腸部 手陽明屬肺

大腸者。腎陰之竅。傳道之官。受事於脾胃。而與肺金相表裡。故肺氣虛則腸若墜。而氣為之陷。腸液少。則肺



亦燥。而鼻為之乾。其呼吸甚密通也。然腸口上接小腸。下通穀道。為諸臟泄氣之門。故開一失職。而諸臟因矣。大腸無表症。皆屬於裏。

大腸虛者。氣虛也。脉右尺必沉弱。其症為久痢。為脫肛。

久痢者。氣血不足也。黠脾湯十全大補湯。補中益氣湯。加烏梅均可。

脫肛者。氣虛下陷也。補中益氣湯。加荷葉主之。

大腸寔者。胃寔移熱也。脉右尺必洪寔。其症為便閉。為臟毒。為燥渴。謔語發狂。為腸癰。

便閉者。寔火閉也。小承氣湯主之。

臟毒者。腸胃不清。下如魚腸。如豆汁也。芍藥甘氣湯主之。

燥渴謔語發狂者。燥屎不出也。小承氣湯主之。

臟癰者。當臍而痛。溺數如淋。千金牡丹皮散主之。

大腸寒者。積冷也。脉右尺必沉遲。其症為久痢。為便血。

久痢者。腹餘絛痛。寒積在臟也。鴉胆子包粉團吞之。

便血者。肢冷喜熱。寒在腸也。附子理中湯。加黠芍主之。

大腸熱者。肺經移熱居多。脉右尺必數。其症為便血。為腸風。為脫肛。

便血者。口燥唇焦。熱在腸也。芍藥甘草湯。加黃芩丹皮生地。

腸風者。臟腑有熱。風邪乘之。故下血而腹不痛。清魂散主之。

脫肛者。腸有火則脫。生難收。腫而痛也。三黃解毒湯。加知母荷葉主之。

### 大腸部藥隊

補大腸猛將 淫羊藿 粟壳

瀉大腸次將 秦光 旋覆花 郁李仁 杏仁 大腹皮 白芷 梨汁  
涼大腸猛將 黃芩 黃柏  
涼大腸次將 地榆 槐寔 知母  
温大腸猛將 胡椒 破故紙 枸杞  
温大腸次將 當歸

大腸部列方

千金牡丹皮散 治腸癰 丹皮 苡仁各五錢 瓜蒌仁 半錢 桃仁十二粒研 水煎服 如大便閉加大黃半錢

當歸三錢

鴉胆子方 治久痢寒積在腸 用鴉胆子一個蒸透將米粉包作團子蒸熟以開水團團吞下空心服

清魂散 治腸風下鮮血而腹不痛者 荊芥炒黑三錢 當歸錢五

十全大補湯 補中益氣湯 附子理中湯 小承氣湯以上諸方見首卷 躑躅脾湯觀心部 芍藥甘草湯 見肝部

三黃解毒湯 見胃部

小腸部 手太陽屬腑

小腸者。受盛之官。化物出焉。其上口即胃口。水穀由此而入。其下口即大腸。上口此處。沁別清濁。俾水液注入膀胱。滓穢流入大腸。是腑中之有鑒別者。故與心相表裡。脉附於膀胱。而在左尺。

小腸無表症。皆屬於裡。

小腸虛。左尺脉必細軟。其症為溺赤短。為腰痛。

溺短者。赤水不勝火也。生地黃湯主之。

腰痛者。水不足也。六味地黃丸主之。

小腸寔者。左尺脉必洪弦。其症為小腸氣。為交腸。

小腸氣者。氣滯下焦。臍下轉痛。失氣則快也。橘核丸主之。

交腸者。陰陽拂逆。大小腸交也。五苓散主之。

小腸寒。左尺脉必遲。其症為咳嗽失氣。

咳嗽失氣者。小腸嗽也。止嗽散。加芍藥主之。

小腸熱。左尺脉必數。其症為瀉瀉瀉短。

瀉瀉瀉短者。濕熱壅滯也。導赤散主之。

小腸部藥隊

補小腸猛將 生地

瀉小腸猛將 木通

瀉小腸次將 瞿麥 海金沙 川棟子 苡仁 赤芍 赤茯苓 燈艸

小腸部列方

生地黃湯 六味地黃丸 五苓散 止嗽散俱見首卷 導赤散見心部 橘核丸

三焦部 手少陰屬腑

三焦者。人生三元之氣。腸腑空處是也。上焦心肺居之。中焦脾胃居之。下焦肝腎膀胱。大小腸居之。其氣總領

臟腑。營衛經絡。內外左右。上下之氣。三焦通。則竟體調和。斯其職矣。

三焦之病。屬於臟腑。並無另立病名。

三焦部藥隊

補三焦猛將 淫羊藿 黃芪

溫三焦次將 烏藥 白豆蔻 胡椒

涼三焦次將 山旆 麥冬 黃柏 地骨皮 青蒿 連翹

心包絡部 手厥陰屬腑

心包絡者。即膻中與心相附。居膈上。代君行事。臣使之官。喜樂出焉。其見證有手中熱。心中大熱。面黃目赤。心中動諸端。而要之包絡之病。即心部之病也。言心不必更言包絡矣。

浙江蘇安江涵暎筆花著

男 彤勳校字

兒科論治

小兒之病，百倍難於方脈。其疾病痾瘵，不能自言。旁人又不能代言。全恃醫以意揣之。揣之不合，殺人易於反掌。即揣得其當，而小兒純陽之體，易虛易寔。藥一過分，變幻百端。此非絕頂聰明，好學深思，心知其意者，未可勝任也。至於護惜之深，姑惜之至，則炮煖失宜，果物恣食，畏苦廢藥，或求速雜投，則又非醫家之咎矣。然揣之法，不過辨其表裡虛寔，寒熱。其法與方法無異。其症亦與方脈同。方脈中之病，小兒亦無不有也。故不能兒科者，或能治方脈，不能方脈者，必不能治兒科。

初生保治

初生三朝，即用三黃湯解其胎毒。服三四日後，每日投金銀花湯至彌月而止。可保其痘稀而少瘡疹之患。若遇寒冬之月，或小兒體寒質薄，而專用金銀花湯亦可。弭月間，聲直發搐，撮口臍風，是胎風也。俗名腹裡驚。因其母肝氣數鬱，兒稟受之。再浴時斷臍時，或有進風，得外風則內風動。此症發之太早，泣不出聲，泣而無淚者，皆難治。治法痰甚者，先治痰，火盛者，先清火，或用益黃散治之。視其牙齦有泡，急以棉裹指擦破之。用青代冰片略塗口內為妙。至三歲以前，形質微弱，無脈可憑，但診其脈之強弱緩急而已。須更察其食指。寅卯長三關，男左女右。食指近手第一節為寅關，次節為卯關，上節為辰關。凡兒有病，必有脈紋外見。如現紋在寅關，不過卯關者，易治。過卯關者，難治。過辰關者，更難治。若一條紋從寅關直透卯透辰者，必死。其紋青色為風，紫為瀉，利，青紫為肝木，乘脾紅，則為熱。合之唇舌面色，亦可得其大概也。三歲後，六七至為平脈，四五至為寒，九十至為困脈。弦急為氣不和，沉緩為傷食，促急為虛驚，浮為風死。四為寒，六為熱，八為驚，九為驚，十為驚。

之症也。不可用涼藥。宜荊防散表之。得汗自愈。內熱者。如夜熱潮熱。晝輕夜重。病最纏綿。或口渴。或腹脹。或盜汗。其症有因傷食停痞。伏燥伏火。陰虛陽虛等異。宜分別而治。此內解之症也。不可用表藥。傷食者保和丸。加地骨皮消之。停痞者。和中丸。加驚甲牡蠣消之。伏燥者。貝母瓜蒌散潤之。伏火者。黃芩芍藥湯。加山梔丹皮等清之。陰虛者。高皮四物湯退之。陽虛者。四君子湯養之。此等熱久必傷陰。口漸削瘦。成為瘡癘。慎之。

### 非驚論

方脈中。有中寒中暑諸症。時醫混以為中風。東垣景岳。以非風別之善矣。兒科有急驚風。慢驚風二症。不惟驚字全無干涉。即風字亦未可混稱。乃自有驚風之名。而濫以九子相投。從此小兒之遭其劫者。不知萬萬矣。試思驚字何解。凡受嚇者。謂之驚。嚇者神魂失守。心神恍惚。惕惕悸動。惟心虛者易犯。此左方脈中亦有之。兒科中大驚猝恐一症。即此候也。是真驚也。故用藥。以人參五味棗仁丹參等。安魂定魄為主。斷無有攻痰散風。而能治驚症者。且風字亦有二義。在外感則為風邪。宜用表散。在內病。則為肝風。宜用鎮息。今混言之曰風。究竟外風乎。內風乎。治外風之藥。不可以治肝。治肝風之藥。不可以解表。甚矣哉其混也。蓋時俗所謂驚風者。痰火閉也。小兒受暑熱。則生火。乳積則生痰。痰火相搏。則血虛而肝失所養。肝主筋。筋肝脈熱。則抽搐。故外作拘攣。面現青色。是肝燥而風內動。非外風也。是痰火閉其竅。而目窻牙緊發厥。非嚇驚也。但利其竅。清其火。降其痰。則神醒矣。此症即不醫。亦能自醒。而漫以驚風名之。可乎。世俗所謂慢驚風者。脾虛生風也。小兒或吐或瀉。久則脾虛。肝木乘之。手足微搐。是內風侮土。非外風也。陽衰神息。氣息短促。是中氣脫之。非嚇驚也。宜補其脾。回其陽。則土振而木靜矣。此症不補必死。而謬以驚風名之。可乎。且急驚為是火症。慢驚為虛寒症。如水火然。治急驚藥。不可以治慢驚風。治慢驚藥。不可以治急。而世俗竟有以一粒丹丸。名之曰治急慢驚風。欺人乎。欺天乎。茲特並揭之曰。非驚。而分為痰火閉症。木侮土症。則為寔。為虛。各當求其病源而治之。而小兒庶不至於枉死。

痰火閉症

痰火之症。即俗所謂急驚風也。小兒或感風寒。或積乳食。皆生痰。痰積則化火。或受暑熱。亦生火。失於清解。則火升而痰亦生。痰火上壅。閉其肺竅。則諸數皆閉。其症目直氣喘。昏悶不醒。且火甚則肝燥。筋急為抽搐掣顛。反引竄視。而入候生焉。緣因痰火鬱結。肝風內動而成。當其拘攣弓仰之時。但以手扶。不可用力抱緊。傷其經絡。致成廢疾。初起以通關散。開其噎。得噎則醒。輕者利火降痰湯。重者清膈煎。加石膏。菖蒲。竹茹。或抱龍丸。醒後清熱養血湯。

木侮土症

木侮土症。即俗所謂慢驚風也。小兒受暑受寒。或傷乳食。皆能作吐作瀉。或吐瀉交作。久則脾土虛弱。肝木乘之。其瀉漸見青色。面部痿白帶青。手足微搐無力。神氣懶懶不振。而慢驚成矣。初起即宜異功散。吐則加藿香。煨姜。若病已數日。糞見青色。即加木香。或肉桂。若手足皆冷。脈息微細。唇舌痿白。此將脫之症。宜急用附子理中湯。以溫中回陽。尚有可救諸臟之症。皆緩獨脾病之變。甚速。儘有吐瀉一晝夜。而即脫者。甚勿緩視也。

大驚猝恐

大驚猝恐者。真驚也。小兒氣血未充。心神怯弱。一遇驚嚇。則神魂震布。舉動失常。夜則跳醒。晝則驚惕。治宜安神。斂心氣。七福飲。秘旨安神安。安神定志湯。皆可。心有蘊熱。而驚悸者。七味安神丸。神定後。氣虛者。四君子湯。以補其陽。血虛者。六味地黃丸。以補其陰。若妄投以硃砂鎮驚丸。子耗其心血。則愈發愈甚。肝風乘虛而亢。其勢不可復制矣。慎之。

夜啼

夜啼之症有二。一曰脾寒。一曰心熱。若僅胃停乳食。則不能安寐而已。不啼也。脾寒者。溫其脾。而啼止。藿香和中湯主之。心熱者。清其心。而啼亦止。導赤散。加川連主之。或花火膏亦可。切勿亂投。消痰破氣之藥。致損其元。

伏暑而吐瀉者。小水必不利。必兼煩渴。吐則香需飲。瀉則四苓散。加益元散。或導赤散。加川連清之。因受寒而吐瀉者。唇舌面色必痿白。口不渴。四肢或冷。此症易成慢脾。始則平胃散。二陳湯。加煨姜以溫其中。繼則六君子湯以補其脾。若虛寒甚。則附子理中湯。不可稍緩。其因伏火而吐瀉者。身必熱。唇舌必赤。消中飲導之。火退後。仍以四君子湯。以養其脾。蓋火吐則乳飲不得入。一入則出。寒吐則乳飲受而後出。此其辨也。然吐瀉久。則脾胃必虛。肝木必侮。無論因何而起。凡大吐大瀉之後。即有火亦清。有食亦出。速宜培補脾湯。勿使氣脫。

### 傷暑

小兒性稟純陽。不受火迫。一染邪暑。熱焰沸張。其症肌熱。燥煩口渴。唇紅溺濇。急宜香薷飲調服。益元散以解之。且暑中有濕。濕易傷脾。故每作瀉痢。甚者兼吐。治法詳吐瀉門。若受暑風而清涕頭痛者。用香薷飲。加秦艽。荆芥主之。若熱動肝風。而發搐厥。宜用清熱湯。利其暑濕。而風自息。昏悶者。通關散啟其嚏。切勿輕用治驚化痰之品。戕其正氣。變生他症。

### 食積痞積蟲積痰積水積

諸積皆屬於脾。脾土果旺。則何物不化。至於成積。脾力之弱可知。然積既已成。勢不能不用藥以消。夫欲消困脾之積。必更腸受困之脾。願治積者。必時時顧念脾土。而後可。食積者。肚腹必硬。膨脹拒按。吞酸噯腐。不思飲食。保和丸大和中飲等消之。脾虛者。六君子湯參用。痞積者。或痞後痰結。或血裏肝氣。伏於脇下。時痛時止。和中丸消之。外貼消痞膏。氣虛者。六君子湯參用。蟲積者。濕熱所化也。虫有九。而血蟄最狠。蝨蟲最馴。寸白蟲上能食肺。柳葉虫下能蝕肝。凡患虫症。則唇口起白點。若虫長一尺。貫胃則危。冲心則死。其人則日漸消瘦。虫則吸血自肥。當以化虫丸下之。腹痛則服花焦湯。虫間椒則伏也。下後仍以異功散養脾。痰積者。飲食所積。脾不能化。則釀而為痰。其症初起時。兩目皆弦。腹漸脹大而軟。急以六君子湯。加厚朴。麥芽。萊菔子等以消之。若遷延日久。則痰積愈多。一旦上湧發為厥逆。則吐之不能。下之不得。無藥可治也。水積者。即水腫之症。治法俱



瘡症

瘡者乾也。久熱傷陰。津液乾涸之症。俗名童子癩。其症總因飲食不節。積滯所化。漸或生痞生虫。致成骨蒸內熱。銷灼其陰。其症腹大青筋。髮直毛焦。肌胃枯燥。唇舌絳紅。而瘡症成矣。此症陰血既槁。勢已難回。况又有熱未清。積未去乎。善治者。必乘其陰血未槁之時。清其火。消其積。育其陰。調其脾胃。尚克有濟。初治宜清熱導滯湯。有虫者。唇內起白點。以化虫丸間服。若陰分既虛。則用理陰和中煎。胃口不開。則並用異功散。調其胃。俾得陽生陰長。庶得有救。大約此症腹軟者。雖虛可治。為其能補也。腹硬者難治。為其不可消也。

盜汗自汗

盜汗為陰虛。自汗為陽虛。然亦有秉質如此。終歲習以為常。此不必治也。若平日並無此症。又非夏秋暑月。而無端盜汗者。宜四物湯加龍骨牡蠣。浮小麥北五味之屬。以養其陰。無端自汗者。宜四君子湯加北五味牡蠣。以養其陽。或加玉屏風散亦可。

咳嗽

小兒咳嗽。半由於風寒。初起以杏蘇散散之。痰薄者。加半夏生薑。痰膿者。加川貝花粉瓜萸仁之屬。肺有火邪。則瀉白散。此一定之治法也。若秋冬燥令。肺受火刑。則咳而無痰。甚者咳血。宜以貝母瓜萸散潤其肺。清肅之氣下行。則咳自止。

解顛魚胸龜背

解顛者。腦蓋未滿。頭顛不合。中陷而角四起。如古錢之形。此先天不足所致。暑月服六味地黃丸。冬春之月補天大造丸。俟氣血漸充。則自合矣。龜胸者。肺熱作脹。胸骨高起。須白虎湯加瀉白散以涼肺氣。若喘急者。難治。

益黃散 陳皮錢 青皮 訶子肉 炙艸各五分 丁香分

荆防散 荆芥錢 防風 蘇梗 川芎 陳皮各八分 杏仁錢 甘艸 薑皮各三分

保和丸 山楂皮 茯苓 萊菔子 神曲 半夏 陳皮 連翹各錢

和中丸 白朮二兩 扁豆 茯苓 砂仁 半夏各一兩 枳寔 神曲 炒麥芽 查炭 香附 丹參

貝母瓜蒌散 川貝錢 瓜蒌仁錢 山柘 黃芩 橘紅各錢 甘草伍 熱甚加川連八分 痰多加胆星

黃芩芍藥湯 黃芩 芍藥各二錢 生甘草錢

黃皮四物湯 生地錢 北沙參 炙鱉甲各二錢 蘇身 白芍 青蒿各錢 地骨皮半錢 丹皮八分

甘草伍

四君子湯 人參 茯苓各錢 白朮半錢 炙甘草五分 大棗三枚

通關散 細辛 皂角各二錢 生半夏錢 共研末吹入鼻孔取嚏

利火降痰湯 黃連各錢 連翹錢 山柘 滑石各錢 木通 黃芩 枳寔 瓜蒌霜 車前子各一錢

勾藤錢 柴胡分 甘草分

清膈煎 製胆星 木通各錢 白芥子 川貝各二錢 海石錢 陳皮錢半

抱龍丸 胆星錢 天竺黃錢 雄黃 辰砂各錢 元寸分 共為末糊丸燈心湯下

清熱養血湯 細生地錢 丹參錢 黑山柘 青蒿 丹皮各錢 赤芍分 生甘草伍

異功散 即前四君子湯加陳皮一錢

附子理中湯 人參 白朮各二錢 附子 干姜 炙草各一錢

七福飲 小兒純陽用參尚須詳譽與三謹誌 人參 熟地各三錢 蘇參 棗仁各一錢 炙甘一

白朮錢 遠志五

秘旨安神丸 人參 棗仁 茯神 半夏各一錢 歸身 白芍 橘紅各錢 北五味 炙草各五分

加生薑三片

安身定志丸 茯苓 茯神 人參 龍齒錢一 遠志五分

七味安神丸 黃連 當歸 麥冬 茯苓 甘草各二錢 硃砂錢三 冰片分 共研末為丸燈心湯下一錢

六味地黃湯 熟地錢四 山藥 黃肉各二錢 丹皮 澤瀉 茯苓各錢半

藿香和中丸 藿香分 厚朴 砂仁 陳皮 炙草各五錢 生姜片 此方加蒼朮白芷蘇梗川芎香附查

炭麥芽治感寒停食

導赤散 生地錢 木通 麥冬 車前 竹葉錢一 甘草三錢 加燈心三寸虛者加人參五分

花火膏 燈花三顆 煎湯

香薷飲 香薷 扁豆 厚朴各錢半 炙草五錢

四苓散 白朮錢一 赤苓錢三 木通 猪苓錢一 車前 澤瀉各錢

益元散 滑石粉六錢 生甘草一錢

平胃散 藿香 厚朴各錢半 蒼朮分 陳皮一錢

二陳湯 製半夏 陳皮 茯苓各錢 炙甘草五分 生姜二片

六君子湯 即前四君子湯加半夏錢半陳皮一錢

清中飲 川連五錢 釵石斛 生穀芽各三錢 赤苓 車前各二錢 酒苓 藿香各八分

加姜汁炒竹茹一錢五分

清中湯 肉蓯蓉四錢 山萸錢 蓮肉錢 青房各錢

化蟲丸

蕪美

雷丸各五錢

栝柳 木香

白朮 陳皮

神曲各三錢

雄黃各一錢

共為末糊丸史君

子肉三錢煎湯送下三錢

清熱導滯湯

胡黃連各五分

地骨皮

查炭各二錢

青蒿

山梔

大腹皮各錢半

炒麥芽三錢

栝柳

厚朴

丹皮

生甘草各一錢

加紅棗五枚

理陰和中湯

生地

北沙參

生穀芽各三錢

地骨皮

首烏

青蒿子

炒麥芽

穉豆皮

牡蠣各二錢

白芍

查炭各錢半

厚朴

丹皮各一錢

四物湯

熟地各四錢

歸身

白芍各錢半

川芎一錢

玉屏風散

生黃芪各二錢

防風八分

杏蘇煎

杏仁二錢

蘇梗

前胡

赤芍

荆芥各一錢

陳皮各五分

桔梗

甘草各五分

瀉白散

桑白皮各錢半

地骨皮二錢

白虎湯

生石膏四錢

知母各錢半

糯米一握

甘草五分

補天大造丸

人參二兩

黃芪

白朮各三兩

當歸

棗仁

山藥

茯苓各錢半

熟地

枸杞各四兩

河車具

用鹿角一觔魚板半觔熬膏同為丸

浙江蘇安江涵暎筆花著

男形勲校字

婦女證證

婦女之症不肯對人言。與小兒之不能自言。其難治一也。醫家又未便逐細詢問。則便暗中摸索矣。然大要不難。呼中情鬱結者。近是。蓋婦女本坤陰吞瀆之心。性地淺窄。識見拘墟。亦有逆意。即牢結胸中。又不能散悶於外。則鬱久而成病矣。主治之法。審無外感內傷別症。惟有養血疎肝四字。用四物湯道遙散之類。可以得其八九。其一切雜症。與方脉同治。茲不贅叙。若胎前產後。此乃生死交關處。詳叙於後。慎勿忽諸。

室女

室女天癸未至。有病從幼科論。天癸既行。則與婦人同治矣。然其神完氣足。經水應無愆期。其有時經閉者。若非血海乾枯。必其經脉逆轉。血枯則內熱咳嗽。漸成怯症。經逆則為吐為衄。血必妄行。皆非經候也。須速治之。如或經水適來。偶阻溺竅。則小便不通。腹脹欲死。急宜通其經。而便自利。用調經飲。更有心熱煩悶。如餽如飢。懨懨倦怠。此其情實久閉。慾火內熾所致。為父母者。警知其意。速宜擇配定期。以安其心。欲溺愛久留。或不愛。冰閣勢必相火刑金。咳嗽發勢。吐血而成癆瘵。慎勿選壻過備。而俾令飲恨以終也。

月經

經者常也。月行有常度。經水有常期。其愆乎常者。皆病也。方書以趨前為熱。退後為寒。此說亦難盡信。要之察其色。總以紅為正。其變為紫黑者熱也。黃如米泔者濕也。淺淡紅白者虛也。或成塊而紫黑色明者。熱積也。成塊而紫黑色暗者。寒凝也。將行而腹痛拒按者。氣滯血凝也。既行而腹痛喜按者。氣虛血少也。經前發熱者為血熱。經後發熱者為血虛。腹長者為氣滯。腹高者為血滯。世屬者是與虛。吾屬者是寒熱。凡逆行上益而止。必

血枯與經逆者。並用益母勝金丹。加牛膝主之。

經阻逆竅者。調經飲。並澤蘭湯主之。

經水紫黑者。生地四物湯。加丹參丹皮益母草。

淡紅者。八珍湯主之。

黃如米泔者。六君子湯。加苡仁扁豆。

寒凝成塊者。四物湯加桂心牛膝。

熱結成塊者。生地四物湯。加丹參丹皮益母草。

氣血凝滯而作痛脹者。調經飲。或四物湯。加延胡香附木香。

氣虛血少。而或痛或熱者。四物湯加人參白朮。

泄瀉澹利者。六君子湯主之。

血熱而上下妄行者。四物湯。加丹皮膠阿黃芩黑山梔。

絡脈傷而妄行者。或喜怒。或過勞。八珍湯主之。

瘀血積。則血不歸經。獨聖丸主之。

肝火旺而不能藏血者。逍遙散主之。

其兼赤白帶者。五苓散加減治之。

### 肝氣

肝氣者。婦女之本病。婦女以血為主。血足則盈。而水氣盛。血虧則熱。而木氣充。木盛木亢。皆易生怒。故肝氣惟

婦女為易動焉。然怒氣泄。則肝血必大傷。怒氣鬱。則肝血又暗損。怒者血之賊也。其結氣在本位者。為左脇痛。

移邪於肺者。右脇亦痛。氣上逆者。頭痛目痛。胃脘痛。氣旁散而下注者。手足筋脈拘攣。腹痛瘰癧。乳岩陰腫。陰

癢陰挺諸症其變病也不一隨症而治之。

左脇痛。肝氣不和。柴胡疎肝散。若七情鬱結。用逍遙散解恨煎。

右脇痛。用推氣散。如肝燥而皮泡脹痛者。瓜蒌散。

頭痛者。痛或連眉稜骨。眼眶。逍遙散主之。

目痛者。蒺藜湯。加柴胡山柘。

胃脘痛者。沉香降氣散。柴胡疎肝散並主之。

手足筋脉拘攣者。肝氣熱也。五癘湯加黃芩丹皮。

腹痛者。木乘土也。芍藥甘草主之。

小腹痛者。疝瘕之氣。橘核丸主之。

癰瘕者。血燥有火也。消癰丸散之。兼服逍遙散。

乳岩者。逍遙散。歸脾湯。二方兼服。

陰腫陰癢陰挺諸症。逍遙散主之。甚則龍胆瀉肝湯。

帶下

帶症有青黃赤白黑之分。亦不必分屬五臟。總之不外乎脾虛有濕而已。用五味異功散。加扁豆苡仁山藥澤瀉等。無不愈者。倘扶五色。則本臟約一二味。亦可。若有熱。加黃柏蓮心為得。

青色屬肝。異功散加柴胡山柘。

黃色屬脾。加石斛荷葉陳米。

赤色屬心。加丹參當歸。

白色屬肺。倍加苡仁。

黑色屬腎。加杜仲續斷。

求嗣之法。別無他術。只有寔心待人。廣行善事而已。男子葆精。女子調經。詩曰。婦人和平。則樂有子。男女有病。或氣血不足。因症調理。無不得子者。至有孕之脉。左寸以脉動甚。為孕子之兆。心主血。心脉旺。則血旺。故知有子。若兩尺脉旺。與兩寸迥別。亦為有子。若流利雀啄。亦為孕脉。蓋經脉閉塞不行。故脉疾而歇。至此數月之胎也。或謂兩寸皆浮。大主生二男。兩手皆沉。寔主生二女。若經斷三月。以川芎末煎艾湯。空心服之。腹內微動者。即胎也。

保精之道。首宜寡慾。次宜服藥。

真水虛而左尺無力者。六味丸合五子丸。或左歸丸。

真火衰而右尺無力者。六味丸合五子丸。或右歸丸。

兩尺俱無力者。十補丸合五子丸。

精薄不凝者。六味丸合五子丸。加魚鱉鹿角膠之屬。

氣虛不能射遠者。贊育丹主之。

調經之法。見於月經篇。

血熱者。益母勝金丹。加生地丹皮。

血寒者。益母勝金丹。加肉桂。

氣滯腹痛者。四物湯加延胡香附木香。或調金飲。

氣虛者。四物湯加人參白朮黃芪。

氣血並虛者。毓麟珠主之。

胎前諸症

妊娠之月。宜節慾。食淡勿過勞。亦勿過佚。日常走動。以活其胎。屏絕嗔怒。以靜其性。自然易生易育。兒亦聰明。



多壽矣。然兒在腹中為時又久。一切皆能致病。備舉其症以示治之。

惡阻者。濁氣閉塞中脘。停痰眩昏。嘔吐滿悶。宜二陳湯加枳壳主之。脾虛者。六君子湯加蘇梗砂仁香附。

胎動不安者。起居不慎也。安胎飲主之。

胎漏者。經水忽下。血瀝盡則胎不保。四物湯加防風黃芩主之。如血虛加茯苓阿膠艾葉。氣虛下陷者。宜補

中益氣湯。

子懸者。胎上逼也。紫蘇飲加減主之。更有氣逆而厥暈者。名曰子眩。其症甚危。亦用前約。如脾虛挾痰。則六

君子湯。

胎不長者。產母宿疾所致。五味異功散。或八珍湯主之。

子煩者。煩心悶亂也。四六兩月居多。火盛而煩。淡竹葉湯。若氣滯而悶。宜二陳湯加白朮黃芩蘇梗枳壳。

子癩者。血虛受風。忽然口喎。反張。其症最暴。受風者。羚羊角散定之。若怒動肝火者。佐以逍遙散。胎氣上逆

者。佐以子蘇散。

子鳴者。小兒口中脫出胞乳。腹內哭聲也。須曲肘就地。如拾物狀。一二刻疔瘡。仍入兒口。即正用四物湯加

白朮茯苓以安胎氣。

子瘡者。繫脉繫舌。本為胎氣壅閉。故不能言。不須服藥。分娩後自能言矣。

小便不通者。小腸有熱也。四物湯加黃芩澤瀉主之。然有胎飽墜壓。胞系繚亂。點滴不通者。名曰轉胞。其禍

最速。茯苓升麻湯主之。或服補中益氣湯隨服。而探吐之。

胎水腫滿者。名曰子腫。由胞胎壅遏。水飲不流所致。五皮飲加白朮茯苓主之。脾虛不能制水者。六君子湯。

乳自出者。名曰乳泣。生子多不育。八珍湯補之。

熱病損胎者。病熱而胎損。腹中者。古方用黑神散下之。或平胃散加朴硝五錢下之。更穩。產母面赤舌青。其

子已... 亦母亦難全... 亦難全... 亦難全...

小產後血不止。或煩渴面赤。脉虛微者。氣血大虛也。八珍湯加炮姜補之。若腹痛嘔瀉。脾胃虛也。香砂六君

子湯加姜桂

臨產將護法

臨產之月。一宜善養。勿呆坐。勿多睡。勿飽食。常食米粥以解飢渴。天熱則擇涼處。天涼則擇煖室。二宜選穩。須預請老練穩婆。備辦需用之物。臨產時。但用老婦二人。挽扶。不許多人喧鬧。三宜服藥。懷孕八月。宜服保產無憂湯。二三劑。臨產時再服此劑。撐開道路。則兒易生。如或連日不產。用力太早。宜服加味八珠湯。以助其力。人生人。係天生人。有自然之造化。不暇人力強為。其有調護失宜。而為逆產者。則命在呼吸。備列方法。以保其兩全。

凍產者。天寒氣血凝滯。難以速生。須煖其室。厚其衣服。

熱產者。暑月過熱。恐頭目昏眩。而生血暈。宜就涼處。若水閣風雨。更宜謹避。

橫生者。兒方轉身。用力太急也。產母宜安然仰睡。令老練穩婆。先推兒身順直。以中指探兒肩。不令臍帶扳

羈。然後用脫花煎推之。產母努力。兒即順生。

倒生者。兒未轉身。努力太早。手足先出也。令穩婆輕手推入。若良久不生。穩婆手入產戶。就一邊撥轉兒頭。

服脫花煎

偏產者。兒已轉身。母努力太早。逼兒頭偏一邊。雖露頂非也。乃額角耳。令穩婆輕手扶正其頭。兒即下。若兒

頂後骨。偏注穀道露額。穩婆輕手於穀道外旁托正。產母努力即生。

礙產者。兒轉身時。臍帶絆其肩。以致不生。穩婆輕手推兒向上。以中指按兒肩。脫去臍帶即生。

盤腸產者。臨產子腸先出。然後生子。腸出時。以潔淨漆器盛之。用草蓆子四十九粒。研爛塗產母頂。腸即收。

急洗去其約。其腸若痛。以磨刀水少許溫潤之。又有用麻油指然點燈。吹熄以烟薰其鼻。腸即上。

交骨不開。有鎖骨者。有血虛不能運達者。令穩婆以麻油調滑石。塗入產門。或用兩指緩緩撐開。服加味歸  
芎湯脫花煎。

產門不開。氣血虛也。八珍湯補之。如不應。十全大補湯。

胞衣不下者。因力乏不能努力。宜用物繫定。再服歸芎湯。即下。或血入胞衣。脹大不下。心腹脹痛。喘急。急用  
清酒送失笑丸三錢。其衣自下。如不應。花蕊石散牛膝散亦得。

產後諸症

產後最宜保護。一日倚坐上牀。以被辱靠之。暑月以橈靠之。不可遽然睡倒。須至十日後。方可平睡。常以手從  
心摩至臍下。俾瘀血下行。二曰捧食。初生後宜專食粥。半月後。方可食打雞蛋。滿月後。可食羊肉猪蹄等物。三  
曰避風養神。少言語。大忌梳頭濯足。恐招風濕。四曰服藥。初產畢。即用生化湯。或歸姜湯。以驅瘀血。自然安吉。  
其有變生他症者。隨症治之。

產後血暈者。瘀血上攻。胸腹脹痛。拒按。宜歸芎湯下失笑丸。若去血過多。心慌自汗。用姜歸飲。加人參。甚則  
加熟附子。

產後不語者。由心腎不交。氣血虛弱所致。七珍散歸脾湯並主之。若虛火上炎。六味地黃丸。

產後發熱者。若無風寒表邪之象。則血虛也。四物湯加黑姜補之。或加童便為飲更妙。如有脾虛傷食。用異

功散。加神曲麥芽。大凡風寒發熱。晝夜不退。若血虛與傷食發熱。則晡熱晨退。然傷食更必吞酸噯腐。滿

悶。以此為別。更有氣血大虛。陰燥作渴者。乃陽隨陰散之危候。十全大補湯救之。

狂言如見鬼神者。有敗血上衝。心腹脹痛。宜澤蘭湯。並失笑丸。若血虛神不守舍。則心慌自汗。宜安神定志

丸。加人參歸芎治之。歸脾湯亦得。

心神驚悸者。心血空虛也。七福飲。秘旨安神丸之類。

汗多變腫者。湯風太虛也。十全大補湯主之。

物湯加黑姜參朮補之。若兼風寒。必頭痛鼻塞。惡寒。宜古拜散。加當歸川芎。秦艽黑姜散之。

產後腰痛。若上連脊背。下連腿膝者。風也。獨活寄生湯主之。若專腰痛者。虛也。八珍湯加杜仲斷續肉桂。若

惡露不盡。痛如錐刺者。速用桃仁湯化之。免作癰腫。

產後心腹諸痛。受風寒者。口鼻氣冷。停食者。吞酸噎腐。俱用二香散。惟於血作痛。若刀錐之刺。失笑丸主之。

其中氣虛寒。腹中冷痛。得熱則止者。理中湯加桂心。若小腹痛處有塊。不可手按者。此名兜枕痛。瘀滯也。

失笑丸主之。

惡露不絕者。因肝氣不和。用逍遙散。因脾不統血。用歸脾湯。因若瘀滯。而新血不得歸經。必腹痛拒按。歸芎

湯下失笑丸。

暮勞者。寒熱食少。頭痛肢痛。最難調治。八珍湯主之。

喘促者。營血暴竭。衛氣無依。最為難治。六味地黃湯。加人參。若脾肺兩虛。四君子湯。加黑姜當歸。若瘀血入

肺。口鼻起黑。起及鼻衄者。此肺胃將絕之候。急服參蘇飲。如厥冷自汗。更加附子。間有得生者。

產後乳少。由元氣虛弱。八珍湯主之。若乳房掀脹。是未通也。速宜吮通。服王不流行湯。若為兒口吹氣。壅腫

不痛。不急治。即成乳癰。速服瓜蒌乳香散。數香附餅。若兒飲不盡。留乳作腫者。亦如前法。亦有鬱怒而乳

腫者。於瓜蒌乳香散內。加柴胡赤芍橘葉甘草。

乳癰初起。由胆胃熱毒。服瓜蒌乳香散。數香附餅。即消。如已成膿。則以神仙太乙膏貼之。吸盡膿愈矣。

乳岩初起。內枯小核。不赤不痛。漸大而潰。形如熟榴。內潰深洞。此脾鬱結。氣血虧損。最為難治。初起用加

味逍遙散。加味歸脾湯。二方間服。亦可內消。及其病勢既成。雖有虛扁。亦難為力。

乳卸者。乳頭拖下一二尺。此肝經風熱發泄。用小柴胡湯。加羌防主之。葶麻子四十九粒。射香一分。研塗頂

心。俟乳頭收上再去藥。

本草卷之四 文益書生印

婦人科列方

益母勝金丹 調經行血 砂仁拌熟地 酒蒸當歸 酒蒸芫蔚子 土炒上白朮 酒炒香附各四兩

酒炒白芍 酒蒸丹參各四兩 酒蒸川芎二兩 以益母草伴酒水各半熬膏蜜丸開水下

獨勝丸 去菸積 五靈脂 為末醋丸酒送下

蒺藜湯 治目赤腫痛 白蒺藜錢 荆芥 赤芍錢 羌活 防風各七 甘草五 加鬚葱白二段

龍胆瀉肝湯 治肝經濕熱 龍胆草 澤瀉各一 車前子 木通 生地 山梔 酒炒當歸

黃芩 甘草各五分

解恨煎 治暴怒傷肝氣逆脹滿 陳皮 半夏 厚朴 茯苓各錢 蘇葉 芍藥各一錢 砂仁七分

如脇肋脹痛加白芥子一錢如胸膈氣滯加枳壳香附各錢

調經飲 治經阻氣滯而作痛者 當歸錢二 牛膝 山查 香附各二 青皮 茯苓各一錢

五子丸 此方同六味丸八味丸合成為種子之方 枸杞子 兔絲子各四兩 五味子 車前子二兩

覆盆子二兩 石斛六兩熬膏蜜丸開水下四錢

贊育丹 治男子精衰陽痿而艱子息 熟地 白朮各半 當歸 枸杞各六 杜仲 山茅韭巴戟肉

山茱萸 淫羊藿 肉苁蓉各四兩 蛇灰 附子 肉桂各一兩

毓麟珠 治婦人氣血虛而經不調不孕者 人參 白朮 茯苓各二兩 芍藥 川芎 炙草 杜仲 鹿角霜

川椒各二兩 熟地 當歸 兔絲子各四兩 蜜丸空心服

安胎飲 當歸 川芎 白芍 熟地 茯苓 阿膠各錢 白朮三錢 炙草 艾葉各三分

紫蘇散 當歸 川芎 紫蘇各錢 炙草 人參 白芍各五錢 大腹皮八 加姜一片葱白一寸

淡竹葉湯 淡竹葉七 黃芩 知母 麥冬各一錢 茯苓二錢

茯苓升麻湯 治娠姙小便不通 茯苓赤白各五錢 升麻半錢 當歸二錢 川芎一錢 苧根三錢 或琥珀末二錢 服便  
黑神散 隆冬寒月及氣體虛寒者用此 桂心 當歸 芍藥 炙草 干姜 生地各一兩 黑豆二兩

附子炮去皮五錢

當歸澤蘭湯 當歸 澤蘭 酒芍 川芎 熟地各錢 延胡索 紅花 香附 丹皮各五錢 桃仁七粒

保產無憂湯 臨產日先服一二劑 酒洗當歸半錢 川貝一錢 黃芪八分 艾葉八分 酒芍一錢二分 兔絲子一錢

細 姜汁炒厚朴八分 荆芥八分 枳殼六分 川芎三分 羌活五分 甘草五分 姜三片

加味八珍湯 人參 白朮各一錢 茯苓八分 當歸五錢 炙草三分 川芎半錢 酒芍二錢 熟地一錢半 乳香五分

酒炒丹參二錢 益母草二錢

加味蘇芍湯 當歸五錢 川芎三錢 龜板童便炙三錢 婦人頭髮一握 燒灰存性 肉桂一錢 川芎 牛膝各二錢

脫胎煎 凡將產先服此藥催生最佳胎死腹中加朴硝三錢 即下 當歸八錢 肉桂一錢 川芎 牛膝各二錢

車前子半錢 紅花一錢

失笑丸 治瘀血脹胞並治兒枕痛 五靈脂去土炒 蒲黃炒 等分為末醋丸每日三錢酒下

花蕊石丸 服此瘀血化水其人即甦 花蕊仁一斤 土色硫黃四兩 為末和勻入瓦罐封固用炭煨二炷香

取研童便酒下

牛膝散 治胎衣脹急緩則不救 牛膝 川芎 炒蒲黃 丹皮各一錢 桂心四錢 當歸半錢

共為末每服五錢水煎

生化湯 產後去瘀要藥 當歸三錢 黑姜五錢 川芎半錢 益母草一錢 桃仁七粒 研

蘇薑湯 產後心慌自汗 當歸三錢 黑姜八分 炒棗仁半錢

七珍散 人參 石菖蒲 生地 川芎各一兩 防風 辰砂各五錢 細辛一錢 為末薄荷湯調下

古拜散 產後受風諸症以芥穗為末每服三錢生姜湯調下

獨活寄生湯 獨活 桑寄生 防風 秦艽 威靈仙 牛膝 茯苓各一 桂心 五分 細辛 三分

炙草分三 當歸錢三 牛膝錢二 澤蘭錢三 蘇木三錢

桃仁湯 桃仁炒十粒 當歸三錢 牛膝二錢 澤蘭三錢 蘇木三錢

二香散 散寒消食 砂仁 木香 黑姜 陳皮 炙甘草各一 香附二 共為末

參蘇飲 人參一兩 蘇木二錢

王不留行煎 王不留行錢半 通草一錢 赤芍錢半 葱白頭個五 炒黍芽三錢

瓜萸乳香散 瓜萸一個 明乳香錢二 酒煎服

香附餅 香附兩 射香仁 共研勻以蒲公英二兩調酒蒸敷之

神仙太乙膏 治一切癰疽 元參 白芷 當歸 肉桂 生地 赤芍 大黃各一 黃丹炒十三兩

四物湯 逍遙散 澤蘭湯 八珍湯 六君子湯 生地四物湯 即四物湯用生地去熟地 五苓散

異功散 六味丸 即六味地黃湯 二陳湯 補中益氣湯 五皮飲 平胃散 香砂六君子湯

十全大補湯 理中湯 即附子理中湯 小柴胡湯 以上諸方見首卷 柴胡蘇肝散 瓜萸散

五癆湯 芍藥甘草湯 橘核丸 消癰丸 以上諸方見肝部 推氣散 見肺部 沉香降氣丸 蘇脾湯

十補丸 安神定志丸 七福飲 秘旨安神丸 以上見心部 左歸丸 八味丸 右歸丸 以上見腎部