

集 蕪

小兒科

急驚 慢驚 疳瘵
 痺疾 諸熱 感冒
 傷食 腹脹 嘔吐
 世瀉 吐瀉 痢疾
 癩疾 咳嗽 喘急
 小兒初生雜病且緣見後
 痘疹 麻疹

特 別
 49
 613
 7



門 武 9
第 618
卷 夕

新刊增補萬病回春卷之七

大醫院醫官金谿雲林龔廷賢子

門人 醫官同邑胡印訓

慈谿羅國望

弟 醫官廷器姪慈官

書林 後學 余一貫增補

書林萃慶堂 余泗泉刊行

小兒科

小兒神色總斷

凡小兒病宜先觀形症神色然後察脉假如肝之為病則面青
心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之為病則面白腎之



為病則面黑先要分別五臟形症次看稟受盈虧胎氣虛實
明其標本而治之無不可者

入門審候歌

現形察色辨因由 陰弱陽強髮硬柔 若是傷寒雙足冷

要知有熱肚皮求 鼻冷便知是瘡疹 耳冷應知風熱症

渾身皆熱是傷寒 上熱下冷傷食病

五指稍頭冷 驚來不可當 若逢中指熱

必定是傷寒 中指獨自冷 麻痘症相傳

女右男分左 分明仔細看

觀面部五色

面赤為風熱 面青驚可詳

脈澄辨溫涼 脾怯黃疳積 心肝形此見 虛寒眈白光

若逢生黑氣

腎敗命須七

面部觀形察色圖



下頰屬腎水北

左腮屬肝木東

額上屬心火南

鼻準屬脾土中

右腮屬肺金西

頤腎

小兒三歲以下有病須看男左女右手虎口三關從第二指側

看第一節名風關第二節名氣關第三節名命關辨其紋色

紫者屬熱紅者屬寒青者驚風白者疳積黑者中惡黃者脾

之困也若現於風關為輕氣關為重過於命關則難治矣

三關脉紋主病歌

紫熱紅傷寒 青驚白是疳 黑時因中惡 黃即困脾端

又

青色大小曲 人驚併四足 赤色大小曲 水火飛禽撲

紫色大小曲 傷米麵魚肉 黑色大小曲 脾風微作搐

手指脉紋八段錦

Y 魚刺形主驚風痰熱 懸針形主傷風泄瀉積熱

《 水字形主食積驚癇 乙 乙字形主肝病驚風

⊖ 蟲形主疳蟲太腸穢積 環形主疳積吐逆

〰 亂紋主虫 珠形主死

虎口三關脉紋圖



風關第一節寅位

氣關第二節卯位

命關第三節辰位

虎口又手處是也

小兒至五歲以上乃用一指按寸關尺三部常以六七至為率

添則為熱減則為寒浮洪風盛數則多驚沉遲為虛沉實為

積

小兒脉法總歌

小兒有病須憑脉 一指三關定息數 遲冷較熱古今傳

浮風沉積當先識 左手人迎主外証 右手氣口主內疾

外候風寒暑濕侵 內候乳食痰積致 洪緊無汗是傷寒

浮緩傷風有汗液 浮洪多是風熱盛 沉細元因乳食積

沉緊腹中痛不舒 弦緊喉間作氣急 緊促之時疹痘生
緊數之際驚風至 虛軟慢驚作痲癩 緊實風癩發搐搦
軟而粗者為疳蟲 牢而實者因便閉 脈孔大小便中血
虛濡有氣蒸驚悸 滑生露濕冷所傷 弦急客忤君須記
大小不勻為惡候 二至為脫三至卒 五至為虛四至損
六至平和曰無疾 七至八至病尤輕 九至十至病勢極
十一二至死無疑 此訣萬中無一失

小兒死候歌

眼生赤脈黃瞳人 顛門腫起又作坑 指甲黑色鼻乾燥
鴉聲忽作吐青筋 虛舌出口咬牙齒 目多直視不轉睛
魚口氣急喘不得 蛇蟲既出死形真 手足攣搖驚過節
靈丹十救一無生

魚目定睛夜死 面青唇黑晝亡 啼而不哭是痛
哭而不啼是驚 咳前不安是煩 咳唾不定是燥

心驚

急驚風症牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顛動唇紅目
熱尚作仍微法救此內有寒熱宜調脾胃氣此大法也

急驚屬肝風和痰熱有餘之症也 急驚者陽症也治宜解表散
重砂丸乃億兆之類

○敗毒散 治急驚風初起發熱手足搐搦上驚天兩耳反張
瘡疹欲出發搐並宜服之

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡

中風 青龍散 以合香

茯苓 去皮桔梗 去芦川芎 枳殼 去穢天麻

全蝎 去毒 薑蠶 炒 白附子 煨 地骨皮 各一分 甘草 炙 半

右劉生薑三片水煎服

○靈砂丸 治小兒風癱驚風至危篤者如神

南星 泡 半夏 泡 巴豆 去殼酒煮乾 全蝎

朱砂 一分 入藥一分 薑蠶 炒七分 輕粉 少許

右為末水和丸如黍米天每次三丸如驚風金銀湯下其

餘美湯下

○龍腦安神丸 治大人小兒驚風癲癇男婦骨蒸勞熱咳嗽

者大人服一丸并花水調服四五分送下或細嚼或研下

小兒一歲已下者一之四二歲三之一四五六歲已上者二

之一神效 牛黃 五分 片腦 五分 烏犀角 二錢 朱砂 飛過 人參 去五二錢

白茯苓 去皮三錢 地骨皮 錢二 麥門冬 去心二錢

桑白皮 錢二 麝香 三分 馬牙硝 分二 甘草 二錢

右各為末分兩秤停合為一處煉密為丸每兩作十九金箔

四大張為衣陰乾磁器內放用黃蠟作蓋恐泄腦麝之氣此

百發百中其功不能盡述

○千金散 治小兒一切痰喘急慢驚風雖至死但能開口灌下

全蝎 炙 姜蠶 各三分 朱砂 四分 牛黃 六厘 冰片 黃連

天麻 各四分 膽星 甘草 各二分

右為末每用五七厘薄荷燈心金銀煎湯不拘時調下

○保生錠 治小兒急慢驚風痰涎壅盛胎驚中風多啼夜間驚

服鎮驚安神寧心 牛黃 三錢 天竺黃 辰砂 各一 雄黃 三錢 麝香 五分

片腦五分 琥珀一兩 珍珠五錢 大赭石三錢 煨七次

蛇含石三錢煨七次 金銀箔各四帖 天麻 防風

甘草 茯苓去皮 人參各三錢 姜蚕 血竭各五錢

遠志三錢 陳皮 牛膽南星各一兩

右為細末用米粉糊為錠辰砂為衣用薄荷湯化下

○大聖奪命金丹治小兒急慢驚風癲癩天吊客忤物件忤中惡

驚風痰壅搐搦掣顛反視口著禁胎驚胎癩牙關緊急
應緊急之症並皆治之其效如神其他驚藥俱不及此真起
死回生之良劑也揚繩兩傳

天麻炮 全蝎去毒 姜蚕炒 膽星 防風去芦 羌活

白附子炮 茯神去皮 川芎 遠志炮去 桔梗去芦

石菖蒲 半夏姜製 人參去芦 白木去芦 茯苓去皮

酸棗仁炒 荆穗 細辛各五錢 川烏炮去皮 附片一箇

烏蛇尾酒浸炙 大赤足蜈蚣一條薄荷汁浸焙

甘草炙 沉香 犀角 羚羊角 辰砂水飛 珍珠

琥珀各三錢 天竺黃一兩 牛黃一錢 雄黃 射香各一錢

金箔三十片 銀箔四十片

右為末姜汁打糊為丸如芡實大朱砂為衣每服一九用金

銀同薄荷煎研化不拘時服

一 小兒潮熱發搐痰涎上壅手足指冷申酉時左腮青色隱白

用補中益氣湯調補脾肺六味丸滋養肝腎而痊二方見補

一 小兒三歲因驚搐搦發熱痰盛久服抱龍丸等藥面色或赤

或青此心肝二經血虛風熱生痰也用六味丸滋腎生血用

六君柴胡并麻調補脾胃而安

二方俱見補益血

慢驚

慢驚症因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃肢體逆冷口臭氣微手足瘳瘳昏瞶露睛此脾虛生風無陽之症也

慢驚屬脾中氣虛損不足之病也慢驚者陰虛也治宜固裏醒脾醒脾散治小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沉不食

人參去芦 白朮去芦 白茯苓去皮 木香 全蝎去毒 天麻 白附子 煨姜各分 甘草炙 咸半

右剉生姜三片棗一枚水煎溫服○一方去天麻姜蚕加南星泡半夏泡陳倉米二百粒煎服果效

○黃芪湯治小兒慢驚風之神藥也 黃芪 二錢 木炒 人參 一錢 炙甘草 五分 加白芍 一錢 炒

右剉一劑水煎食後服

○治小兒吐瀉脾驚 二歲可服 朱砂五厘 二歲已上 一分 三歲 全蝎 一個 去足翹毒 二歲 二個

右為細末乳汁調服

凡慢驚元氣虛損而至昏憤者急矣一會六若待下痰不愈矣此乃膽腑傳變已極總燥虛風惟脾受之元氣散而不收可療此因脾虛不能攝涎而致也紫金錠子治急慢驚風 延潮發搐或吐或瀉不思飲食神昏

人參去芦 白朮去芦 白茯苓去皮 白茯神去皮 山藥炒 乳香 赤石脂煅 辰砂各三錢

射香一錢 右為末以糕一兩為丸如彈子大金箔為衣每一粒瀉荷湯

研化服

小兒傷食發丹服發表之劑手足搐搦服抱龍丸目暈痰盛
 余謂脾胃虧損而變慢驚也無風可祛無痰可逐只宜溫補
 胃氣遂用六君加附子一劑而愈方見補益
 一 小兒抽搦痰涎自流或用驚風之藥益其視其面色黃白余
 用六君補中益氣二湯補脾肺而愈二方俱見補益
 混元丹 治小兒急慢驚風痰嗽喘逆吐瀉腹脹小兒百病大有
 功效方見通治

驚後調理

○ 牛黃鎮驚丸 治驚退後調理安心神養氣血和平預防之劑
 天竺黃 研麥門冬心法當歸身洗酒 生地黃 酒洗 赤芍藥 煨薄荷
 木通 去皮 黃連 煨 山梔仁 炒 辰砂 另研 牛黃 另研
 龍骨 煨 各二錢 青黛 另研 一錢

右為細末煉蜜為丸如菽豆大每服二三十丸淡姜湯送下
 一 小兒五歲因看會見粧鬼臉被驚嚇兩眼黑睛 當今 齒向裏白睛
 番向外視物微覺一線諸醫不能治求治於余余曰此子曾
 出痘疹否對曰未俟出痘疹可治逾月痘疹盛行其子發熱
 似有將出之象其家果召余治以綿胭脂將水泡出汁慢火
 熬成膏塗兒兩眼胞上下一日塗二次直至痘疹收靨後其
 眼復舊

痘疾

夫小兒痘疾由乳母寒熱失理動止乖違飲食無節其肥過度
 喜怒氣亂醉飽傷勞便乳兒者故成痘病又因久吐之後久
 瀉之後久痢之後以致久渴久汗久熱久瘧久嗽下血久瘡

之後皆能亡失津液並成痲瘋錢氏云痲皆脾胃傷亡津液之所作也

凡養小兒宜戒飲酒肉油膩偏生病生冷硬物凉水漿

不與自無痲癖病痲者肥其厚味所致而壯大青筋也（渴）或澄之如米泔此痲（便）

○消痲湯治小兒大便色青白（便）山查肉 白芍 黃連 澤瀉 各一青皮 四分 甘草 三分

右剉一劑姜棗水煎服消痲丸治五疳皮黃肌瘦髮有白積塊諸疳作痛

○消痲丸 蒼木 浸炒 陳皮 厚朴 炒 枳殼 炒 檳榔 神麴 炒 山查 去子 麥芽 炒 三棱 煨 莪木 煨 砂仁

茯苓 去皮 黃連 炒 胡黃連 蕪荑仁 史君子 去殼 蘆薈 右各等分為末史君子殼煎湯泡蒸餅為丸如彈子大每服

一丸清水湯化下肥兒丸消痲化積磨癥清熱伐肝補脾進食殺蟲潤肌膚養

人參 半錢 白朮 去芦 茯苓 去皮 各三錢 黃連 姜炒 三錢 半 胡黃連 錢五 史君子 去殼 四錢 神麴 炒 麥芽 炒

山查肉 各三錢 半 其草 各三錢 蘆薈 二錢 半 碗盛泥封固置坑中四面敲糠火煨透用

右為末黃米糊為餅米湯化下或作丸黍米大每服二三十丸米湯下看見大小加減

○快活丸 治小兒丁癩疥症皮膚膏瘦削骨露如此柴壯大青筋小其効如神

蒸餅麵一斤作餅十六個每一兩重一兩兩開一飯取出餅
煨透乾取出候冷用之

右為細末別以肥小棗用米泔水浸經一宿飯上蒸熟去核
皮爛杵如糊同前餅末杵勻為丸如黍子大每服三五丸
不拘時米湯送下或研化米湯調服亦可

本綱曰○蘆薈消疳丸治小兒五疳痞塊發熱肚脹壯脾胃消飲食平

黃連之各 蘆薈 胡黃連 宣黃連 白朮 米泔製焙

王連夫連領 白茯苓去皮當歸全身用酒洗各 白芍酒炒 人參

湖別 神麩各六錢 史君子去殼晒乾 山查肉各七錢

堅重相擊 蕪荑炒 檳榔各五錢 大甘草節去粗皮生用四兩

右為細末湯泡蒸餅打糊為丸菉豆大每服五六十九丸臨晚
米湯送下或煨蜜為丸如龍眼大每晚食化一丸或米湯下

或酒亦可

一 小兒肝疳白膜遮睛筋疳瀉血腎疳身瘦瘡疥骨疳喜臥冷
地又治胃怯不言鮮顛併年長不能行者用六味丸各等分
煉蜜丸久服神效方見補益

一 小兒四肢消瘦肚腹脹大行步不能頗能飲食作渴發熱去
後臭穢此脾臟傷也用異功散方見補益肥兒丸調理而愈

一 小兒面色痿黃眼胞微腫作渴腹脹飲食少思腹中一塊或
移動小便澄白大便不實此脾疳之患用四君子方見補益

一 小兒尿濁如米泔余以江南做酒小麩炒為末酒調下三服
而愈

癖疾

錢仲陽云癖疾者僻於兩脇痞結者否於中脘此因乳哺失調
 飲食停滯邪氣相搏而成或乳母六淫七情所致古人多用
 村伐痞癖既久飲食減少脾氣必虛久而不愈必先以固胃
 氣為主使養正則積自除若欲直攻其結不惟不能善消抑
 亦損其脾工凡脾土虧損必變症百出矣當參各類及隨見
 症而主治之若癖塊日久元氣脾胃俱虛宜朝服補中益氣
 湯夕服千金消癖丸間與混元丹兼服之獲効者多矣
 癖者生於皮裏膜外也

○淨府湯 治小兒一切癖塊發熱口乾小便赤或溇瀉

柴胡 白茯苓 猪苓 澤瀉 三稜 醋炒

莪木 醋炒 山查 去核各 黃芩 白木 去芦半夏 姜制

人參 絡八 胡黃連 甘草 各三分

右剉一劑姜棗煎服

○肥兒丸 治癖如神方見癖疾

○千金消癖丸 治小兒癖疾積塊有殊効

蘆薈 阿魏 醋丸 青黛 木香 枳櫛

厚朴 姜炒 陳皮 去白各 麥芽 炒 四史君子 去殼

胡黃連 山查肉 香附 水浸 三稜 醋炒 莪木 煨醋炒 各二錢

水紅花子 炒 神麩 炒 各人參 去芦 茯苓 去皮

白木 去各 甘草 炙一錢

右為末將阿魏一錢研水和麵打糊為丸菴豆大每服四五
 十九米飲白湯任下

○益兒餅治小兒疳疾

水紅花子 史君子去殼 山查肉各五錢 白朮去土四錢

檳榔半錢 木香一錢 神麴炒二錢半

右為末入黃蠟麴水和作煎餅吃

○至寶丸

真阿魏二錢 盧薈 天竺黃 胡黃連 雄黃

沒藥 川山甲炒 沉香 白草烏泡 硃砂各

右為極細末用好酒和成一塊入銅鍋內再入酒半茶鍾熬成膏勿令火大恐傷藥力量可丸取出丸如豆大每丸黃酒化下十歲已上服二丸臨臥時服待其自然汗出三日服一次重者五七服輕者二三丸熱即退塊亦消須要忌口如服後熱不止可服金花丸如羸弱不進飲食者可先服平胃散

豎豆

後

此方極驗、此四字至異

○辟疾方

全蝎去毒 斑蝥去足翅 紅娘子去頭尾足翅 阿魏

蟻蟲去足翅 血竭 雄黃 硃砂

盧薈 木香 當歸尾酒浸 三稜醋煮 殺木醋煮

香附米炒 白豆蔻去殼 蘿蔔子各一錢炒 麝香一分

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服三五丸或酒或溫水下壯盛者可服

○辟疾方

盧薈五分 阿魏五分 急性子即小桃紅 水紅花子一錢

黑白牽牛共一錢 猴燒灰一錢

右為細末每服二分黃酒送下三帖全好

○癬疾方

牛黃 四分 雄膽 四分 血竭 一錢 蘆薈 四分 麝香 五分
天竺黃 鈺黃 蠟 四錢 淨皮硝 兩 蜂蜜 四兩

右將蠟化開與蜂蜜一處滾熟住火傾入細磁碗內晾冷後將群藥為細末方入蜜蠟內攪勻每日常服先服用筋頭蘸吃後多服不怕十日全消忌酸冷油膩之物

○癬疾方

核桃仁 一升 棋柳 個 十 硃砂 一錢 大黃 一兩

右三味為細末入桃仁水煮一炷香滾時陸續入皮硝半斤香盡硝亦盡止食桃仁亦好

○清香散 治癬疾生牙疳潰爛臭穢

乳香 沒藥 孩兒茶 輕心 炒 象皮 燒灰

象牙 焙黃 紅褐 燒灰 珍珠 碎黃 海巴 焙乾各

右為細末搽患處立時痛止生肌如神

○桃花散 治癬氣上攻牙疔腐爛

用桃花信一塊桑柴火內燒紅淬入細茶濃滴內如此七次去信將茶滴入雄黃一塊研末入酒內用鷄翎頻掃患處止痛生肌立時見效

○尅堅膏 專貼小兒癬塊發熱癰瘦者

木鱉子 穿山甲 川烏 其遂 其草

當歸

右各八錢先用真香油一斤入鍋內將前藥熬成灰濾去渣再慢火熬滴水不散方下黃丹八兩熬滴水成珠方下細藥入內再不見火

蘆薈 阿魏 硼砂 皮硝 水紅花子各五
礞砂 三牙麝香 一牙

右為細末入內攪勻不熬攤為膏藥貼時先用皮硝水洗皮膚以膏貼癬二三日後竟肚內疾作疼四五日發痒糞後有膿血之物是其驗也

○抓癬膏 李滄溪傳

香油 半斤 桐油 半斤 生豬腦子 半斤 男子血餘取水洗淨不拘多少
桃仁 四兩 白蠟 四錢

右俱下鍋內文武火熬的腦子盡用布絹濾去渣次下飛過黃丹十四兩熬成膏待溫下 胡黃連 香白芷 蘇木

紅花 三錢 我木各三當歸尾 礞砂各五麝香一半 各為細末照分兩重羅入前項膏內攪勻收貯勿令泄氣如

有積塊先用皮硝煎水洗患處令淨次用生姜擦之方用絹帛攤藥貼上貼後用熱鞋底炙熱熨之五七十遍竟內熱方可如貼後癬即消縮如神

○灸法

穴在小兒背脊中自尾骶骨將手揣摸脊骨兩傍有血筋發動處兩穴每一穴用銅錢三文壓在穴上用艾炷安孔中各灸七壯此是癬之根貫血之所灸之瘡即發即可見效灸不着血筋則瘡不發而不效矣

○化癬如神散 治瘡塊積聚

蟾酥 黃蠟各二 羚羊角 牛黃各五 麝香三分
巴豆肉一 礞砂 冰片各一分

右為末丸如菜子大每用一九用扁頭針或患處刺破皮入

之用膏藥貼上一伏時揭起其痞化膿血出盡服調理脾胃藥

一 小兒患痞服枳榔蓬朮枳實黃連之類痞益甚余曰此脾經血虛痞也不可尅伐遂用六君子加當歸數劑胃氣漸復諸症漸愈乃朝用五味異功散加升麻柴胡夕用異功散加當歸為藥而愈方見補益

諸熱

小兒諸熱證例

傷寒執手足稍冷發熱惡寒而無汗面色青慘而不寄左額有青紋

傷風執手足稍微溫自汗面赤而光

傷食執目胞腫右額有青紋身熱而頭額腹肚尤甚夜執青涼面黃或吐利腹疼

驚風執面色青紅額正中有青紋手心有汗時作驚惕手脈絡微動而發熱

風熱身熱倍能食唇紅頰赤大小便秘

潮熱如水之潮依時而至

變蒸熱身熱上下而蒸熱上氣虛驚耳冷微汗唇上下有白泡狀如珠子重者身熱脈亂腹痛啼叫不能乳食或吐或瀉週歲以後死此症也

渴
潮熱發歇有時驚熱顛叫恍惚夜熱夕發旦止餘熱寒邪未盡食熱壯背先熱疳熱骨蒸盜汗皆熱一向不止煩熱心躁不安積熱頰赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱來去

不定癰熱涎嗽飲水寒熱發如瘡狀血熱辰巳時發疹熱耳
鼻尖冷諸熱得之各有所歸其間有三兩症交互者宜隨其
輕重而治之

諸熱為病者宜清熱也

○大連翹飲治小兒傷風感冒發熱痰壅風熱丹毒腫痛頭項
便淋瀝胎毒痘疹餘毒一切熱毒並治

連翹

瞿麥

滑石

車前子

牛旁子

赤芍各八 梔子

木通

當歸

防風各四分

柴胡

黃芩

荊芥各一分

蟬退五分

甘草一分

右劉竹葉十個燈草十莖水煎不拘時溫服○風痰熱變蒸
加麥門冬○實熱丹熱加大黃○胎熱瘡疹餘毒加薄荷葉

○瘡癰熱毒加大黃芒硝

○五福化毒丹治小兒驚風積熱毒唇口腫破生瘡牙疳出
鼻頰赤咽腫煩燥并痘疹餘毒未解或頭目
赤交生瘡癰

犀角

桔梗去芦 生地黃酒洗 赤茯苓去皮

牛旁子微炒各

五錢

朴硝

連翹

玄參黑者

粉草各六錢

青黛二錢

研極細

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服一九薄荷湯化下並有驚
加朱砂為衣

感冒

感冒者宜發散也

○惺惺散治外感風寒鼻塞痰嗽發熱

人參

白朮

白茯苓

桔梗

瓜蒌根

細辛 甘草 薄荷

右剉水煎服

○羌活膏治小兒風寒外感驚風內積發熱而促咳嗽涎痰潮

人參 羌活 獨活 前胡 川芎 桔梗

天麻 絡五薄荷 地骨皮 各三錢 甘草二錢

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一九姜湯研化下

一 小兒八歲患傷寒頭痛身疼發熱口乾面赤无汗諸醫以傷寒治之百藥枉効已經旬日袖手待斃余以龍腦安神丸一服其汗如雨即瘥

一 小兒外感風邪服表散之劑汗出作喘此邪氣去而脾肺虛也用異功散而汗喘止再劑而乳食進方見補益

一 小兒沉默昏倦肢冷驚悸其紋如弓之向裏此屬胃氣虛而

外感寒邪也先用惺惺散以解外邪調胃氣諸症頓愈則手足冷又用六君子湯調補元氣而安異功散六君子湯俱見補益

傷食

傷食者宜消導也

○ 萬億丸 治小兒乳食生冷所傷發熱肚脹諸症方見通治

○ 消食丸 又名消乳丸治宿食不消

砂仁 陳皮 三稜炒 麥芽炒 神麴炒各五錢

香附炒一兩加白木炒五錢

右為細末麴糊為丸如麻子大食後白湯送下大小加減

○ 消食餅治小兒時常傷食皮黃肌瘦肚大腹脹用此焦餅令

蓮肉去皮山藥炒 白茯苓去皮神麴炒 麥芽炒

扁豆

右各等分為末每四兩入麪一斤水同和烙焦餅用
 一 小兒傷食嘔吐發熱面赤服消導清熱之劑飲食已消熱亦未退余以為胃經虛熱用六君升麻柴胡四劑而痊
 一 小兒十四歲傷食發熱服消食丸胸腹膨脹發熱作渴此脾氣復傷也先用四君升麻柴胡飲食漸進用補中益氣湯而愈後因勞心發熱少食用六君升麻柴胡而愈
 一 小兒傷食發熱抽搐嘔吐喘嗽屬脾肺虛氣虛有熱用六君炒黑黃連梔子而愈右方俱見神益

腹脹

腹脹者脾胃氣虛也

○消脹散

治小兒腹脹

蘿蔔子炒

蘇梗

乾薑

陳皮

枳殼各等分

甘草少許

右剉水煎服食少者加白朮

小兒傷食腹脹胸滿有痰余用異功散而痊後復傷食腹脹作痛或用藥下之痛即止而脹益甚更加喘粗此脾氣傷而及於肺也用六君加桔梗調補而痊
 小兒停食服通利之劑作嘔腹脹此脾胃復傷也用補中益氣湯而愈右方俱見神益

嘔吐

吐者乳食傷胃也

○定吐飲 治吐逆投諸藥不止服此神效

半夏湯包透切片 生薑洗淨和皮一兩 薄桂去粗皮到三錢

右姜切作小方塊如棗豆大同前半夏和勻入小罐內慢火順手炒令香熟黃乾方下桂再炒勻微有香氣以紙攤開地上去火毒候冷畧搗去黑焦末每服二錢水一盞姜二片煎七分空心少與緩服

○定吐紫金核 治嘔吐

丁香 木香 藿香 半夏姜湯泡七次 人參去芦

白朮去芦各二錢

右為末姜汁打糊為丸如棗核大用沉香朱砂各一錢為衣陰乾每用一九用棗一枚去核內藥丸在內姜片夾濕帛裹灰火內煨熟去姜帛嚼米飲厭之

一 小兒傷食發熱面赤抽搐嘔吐氣喘唾痰此飲食傷脾肺氣

虛弱所致用六君子湯炒黑黃連山梔各三分一劑頓愈方見補益

泄瀉

泄瀉者乳食傷脾也

○參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞噎心神醒脾悅色順正碎邪

人參 白朮 茯苓 山藥炒 甘草炙各二錢

白扁豆一錢 煨姜 蓮肉去心 薏苡仁 砂仁

桔梗去芦

右為細末每服二錢棗湯調下量見效加減

○啓脾丸 消食止瀉止吐消痲消黃消脹定腹痛益脾健胃

萬病回春

○厚瀉曰
止夜瀉
若格眼丸

人參

白朮

去土炒

白茯苓

去皮

山藥炒

蓮肉

各一兩

山查肉

陳皮

澤瀉

其草

各五錢

右為禾煉蜜為丸梧桐子大每服二三十丸空心米湯下或
米湯研化服亦可小兒常患傷食服之立愈

○一方益元散加白朮末一兩每服一二錢米湯調下止小兒
泄瀉殊効

○一方治瘧泄用柿餅燒熟吞之即止

○治小兒水泄不止

五倍子為細末陳醋調稀熬成膏貼臍上即止

○水瀉痢疾方

生姜四兩

真香油

黃丹二兩

熬成膏藥貼臍立効

一水兒飲食後即瀉先用六君升麻神麩山查而止又用五味

異功散加升麻而痊後吐瀉腹痛用保和丸二服又用異功
散調補脾氣而安

一 小兒傷食作瀉腹脹四肢浮腫小便不利先用五苓散方觀
加木香白餘諸症漸退又用五味異功散為主佐以加減腎
氣丸又旬日二便調和飲食漸進浮腫旋消乃以異功散調
理而安

一 小兒因驚久瀉面色青黃余謂肝木勝脾土也朝用補中益
氣湯夕用五味異功散加木香子母俱服而愈

一 小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃時或蒸青
諸藥到口即嘔吐審乳母憂鬱傷脾大便不實先用補中益
氣湯五味異功散及四神丸調治其母不兩月子母並愈
右方俱見補丸

吐瀉

吐下瀉者，脾胃俱傷也。

○白朮散 治吐瀉或病後津液不足，心熱作渴，和胃生津，止瀉利。

人參 去芦 白朮 去芦 茯苓 去皮 藿香 木香 乾葛

甘草 炙各等分

右到劑，水煎服。○若小兒頻瀉，將成慢驚，加山藥、扁豆、

肉豆蔻、煨各一錢，姜一片，水煎服。○若慢驚已作，加細辛、天

麻、磁石、全蝎三個，白附子八分，煨。○若冬月小兒吐蛇，多是

胃寒，胃虛所致，加丁香三粒。○如胃虛不能食而大渴不止，

者，不可用淡滲之藥，乃胃中元氣少故也。以此湯補之，加天

花粉。○若能食而渴者，白虎湯加人參。○如中氣虛熱，口舌

生瘡，不喜飲冷，服之即效。

○燒針丸 治小兒吐瀉。

黃丹 朱砂 白礬 枯過

右為末，棗肉為丸。如黃豆大，每服三四丸，戳針尖上，燈焰上

燒過，涼米泔研爛調服。瀉者食前吐者，無拘時外用菜豆粉

以鷄子清作膏，如吐塗兩脚心，如瀉塗額門上，止則去之。

○又方 治吐瀉。

四君子湯加藿香、陳皮一劑而愈。

○助胃膏 治元氣脾胃虛弱，吐瀉不止，不思飲食，及久瀉虛寒。

人參 白朮 去芦 茯苓 去皮 甘草 炙各二錢 白豆蔻 去壳

木香 山藥 炒五錢 肉豆蔻 麵包煨二錢 砂仁 炒二十

丁香 官桂 藿香 各三錢 陳皮 五錢

右為細末煉蜜為丸彈子大每服一丸米湯化下

○秘方治小兒水瀉

白礬黃丹各五錢用葱白同搗爛塗臍上即止

○治小兒吐瀉

小丁香 陳皮各等分 水煎溫服

一 小兒數歲間每停食輒服峻利之藥後肚腹脹嘔吐泄瀉

先用六君子湯諸症漸愈又用補中益氣湯而安

一 小兒腹脹食後即瀉手足逆冷此脾氣虛寒也先用人參理

中丸後用六君子湯而愈

一 小兒吐瀉乳食色白不化露睛氣喘此脾肺不足形病俱虛

也先用異功散加桔梗柴胡頓愈再用補中益湯而安

一 小兒因驚吐瀉腹脹先用六君木香柴胡治之稍可又以五

味異功散而愈後因驚搐痰甚或用鎮驚化痰之藥倦怠不

食而泄益甚先用異功散加水香釣藤鈎四劑而愈方俱見補元益

一 小兒面黃肌瘦泄瀉無度腹脹如鼓不思飲食百藥不效予

教用好生白木酒磨濃汁以溫酒調空心服二三日即愈

痢疾

東垣云白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱

傷也

痢者腹中食積也

○萬億丸 治小兒下痢赤白腹痛初起者一服即愈

○一方治小兒痢用鷄子一個冷水下鍋煮一二沸取出去白

用黃研碎以生姜汁半小鐘和勻與兒食之已心茶

○姜茶煎 治痢疾腹痛不問赤白冷熱皆可用之

老生姜 切片三錢 細茶 三錢 用新汲水煎服

○一方用生姜細茶連根韭菜三味同搗汁酒調服立止

○仙梅丸 治痢疾發熱發渴者

細茶 烏梅水洗剝去核晒乾 為末用生蜜搗作丸彈子大每

一丸水冷熱隨意化下

○鐵門栓 治赤白痢疾五種泄瀉

文蛤炒黃色一兩 白礬半生半煨共三錢 黃丹 二錢

右為細末黃蠟一兩溶化為丸如菘豆大每服大人十五丸

小兒五七丸茶一錢姜二錢煎湯下

瀉痢方

五倍子炒黃色為末烏梅肉水浸為丸如彈子大每服一丸

白冷米湯下赤痢姜湯下水瀉冷水下

○水瀉痢疾方

飛白礬錢一丁 香分五 共為細末水瀉白水瀉痢疾黃酒下

○石蓮散 治小兒噤口痢嘔逆不食神效

石蓮肉炒去心 右為末每服一二錢陳倉米飲調下如嘔

加生姜汁二匙同服一方山藥末半生半炒米飲調下

○香連丸

黃連十兩用吳茱萸湯中半日炒焦黑 木香 二兩

右為末醋糊丸如赤豆大每服二三丸白湯下

○固腸丸 治紅白痢日久不止

黃蠟 一兩 黃丹 一兩飛 共化一處為丸如黃豆大每服三丸

如紅痢甘草白痢乾姜紅白痢甘草乾姜湯下空心服

○治水瀉痢疾用鳳眼草、蚤水炒為細末，每一錢水煎空心服立止。

一 小兒患痢，脫肛色赤，或痛用補中益氣湯送香連丸而愈。後傷食作瀉，復脫肛不入，仍用前湯更以草麻仁研全頂門而愈。

一 小兒患痢，口乾發熱，用白朮散煎與恣飲，時與白朮散送下香連丸而安。

一 小兒久痢，裏急後重，欲去不去，手足並冷，此胃氣虛寒下陷也。用補中益氣湯加木香補骨脂倍升麻柴胡而愈。

瘧疾

瘧者，膈上痰結也。

萬億丸 方見通治

○芫花散 治小兒瘧疾

一 芫花根為末，每用一二分，三歲兒用三分，以鷄子一個去頂入末攪勻，昏糊頂口，外用濕布裹，炭火煨熟嚼吃。

○天靈散

天靈蓋燒存性為細末，每服五厘，黃酒調下立止。

○消癖丸 治瘧母，停水結癖，腹脇堅痛。

芫花 炒 未砂 各等分

右為細末，煉蜜為丸，小豆大，每十九丸，棗湯送下。

祝由科 治瘧疾不愈

呪曰 吾從東南來 路逢一池水 水裏一條龍
九頭十八尾 問伊食甚的 只喫瘧疾鬼

右念一遍吹在果子上念七遍在上令病人於五更鷄犬不聞時面東而立食訖於靜室中安困忌食瓜果暈肉熱物此法十治八九無藥處可以救人果者謂桃杏棗栗之類

一 小兒先因停食腹痛服峻厲之劑後患瘰日晡而作余以為元氣下陷故治以補中益氣湯不信泛行清熱消導前症益甚食少作瀉余朝用前湯夕用異攻散加當歸月餘而愈

一 小兒每午前寒後熱久不愈用六君子加炮姜丸芡實大每服一丸旬餘而愈 方見補益

咳嗽

咳嗽者肺傷風也

○參蘇飲 治小兒四時感冒發熱頭痛咳嗽喘急痰涎壅盛與寒聲重涕唾稠粘及內傷外感一切發熱喘急

紫蘇 陳皮 前胡 桔梗 半夏 姜汁炒

白茯苓 去皮 乾葛 枳殼 炒各等分

甘草 人參 減半 木香 少許

右剉生姜三片水煎食後服○若肺實有邪去人參加黃芩

桑白皮杏仁 去皮

○參花散 治咳嗽痰熱氣喘吐紅

人參 天花粉 各等分 為末 每服五分 蜜水調下

○蜜梨噙 治咳嗽哮喘

甜梨一個刀切勿斷入蜜於內麵裹灰火煨熟去麵吃梨

○一方治小兒喉中痰壅喘急

用巴豆一枚去殼搗爛作一丸以綿花包裹男左女右塞鼻

中痰即墜下

○一方治傷寒潮熱痰咳男婦小兒皆可用

醫金 三錢 石膏 一兩 煨過

右共為末每服一二匙清茶送下

一 小兒傷風咳嗽發熱服解表之劑加喘促出汗余謂脾肺氣虛欲用補中益氣湯加五味子補之不信乃自服二陳桑皮枳殼而發搐痰湧仍用前藥加鈎藤鈎而痊

喘急

喘急者痰氣盛也

○一檢金治小兒風疹吐沫氣喘咳嗽肚腹膨脹不思飲食

小兒肺脹喘嗽 多人看作風候

五味研成細末

大黃 槐 柳 二產 牛 蜜水調呈稀稠

每將一字下咽喉 不用神針法矣

搖

右其症肺脹喘滿胸高氣急兩脇抽動陰下作坑兩鼻竅張闕亂嗽渴聲啞不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不急治死干旦夕也

○治小兒喉中痰壅喘甚

用巴豆一粒搗爛作一丸以綿花包裹男左女右塞鼻疾即

墜下効

一 小兒患喘服發汗之劑汗出而喘益甚用異攻散頓愈又用

六君子湯而全愈方見補益

一 小兒有哮喘其母遇勞即發兒飲其乳亦嗽用天君桔梗桑皮杏仁治之母子並愈方見補益

小兒初生雜病

一 小兒初生宜先濃煎黃連甘草湯急用軟絹或絲綿包指蘸藥搵出口中惡血倘或不及即以藥湯灌之待吐出惡沫方與乳吃令出痘亦稀少

一 初生三五月宜綳縛令臥勿豎頭抱出免致發癩

一 乳與食宜相遠不宜一時混吃令兒生疳癆疔積

一 宜用七八十歲老人舊裙襖改作小兒衣衫真氣相滋令兒有壽富貴之家不宜新製紵絲綾羅縐絨之類與小兒穿不惟生病抑且折福

一 小兒生四五個月止與乳吃六個月以後方與稀粥哺之周歲以前切不可吃暈暈并生冷之物令兒多疾若待二三歲

後臍腑稍壯纔與暈暈方好

延生第一方 小兒初生臍帶脫落取置新瓦上用炭火四圍

燒至烟將盡放土地上用瓦盞之類蓋之存性研為細末預將朱砂透明者為極細末水飛過脂帶若有五分重朱砂用

二分五厘生地黄當歸身煎濃汁一二規故調和前兩味抹

兒上臍間及乳母乳頭上一日之內晚至盡次日大便通下

穢汚濁垢之物終身永无瘡疹及諸疾生一子則得一子十分妙法也

分妙法也

滌穢免痘湯

用練樹子一升至正月初一日子時父母只令一人知將練

子煎湯待温洗兒全身頭面上下以去胎毒洗後不出痘疹

如出亦輕或只三五顆而已

○一方用五六月間收絲瓜小小蔓藤陰乾約二兩半重收起

○一方用葫蘆上藤蔓如前法亦可

○稀痘乃金丹治嬰兒未出痘時胎毒在臟腑因時氣而發也
少如遇出痘時氣身一發即起即磨服一丸使毒漸消出時稀
有黑點出痘時化下一丸即起即磨服一丸毒從大便而出
泄元氣修合者不可加減以取不効

麻黃根 升麻兩各一 羌活 樺皮 茜草根

括麥根 鼠粘子此 天麻 連翹各一 當歸

芍藥 川芎各七子

右剉作片用水五升煎至半升去渣入銀器內以湯頓成膏
入煉蜜少許調勻入後藥

朱砂五錢 冰片 雄黃各五 蝦蟆灰半 玉射香七分
全蝎十四個 炙

右為末入前藥和勻調作十丸以蠟封之如彈子大臨服時
猪心血或兔血調勻熱酒調下溫服

凡初生小兒口腭并牙根生白點各馬牙不能食乳此與鵝口
不同少緩即不能救多致夭傷急用針縛筋頭上將白點挑
破出血用好京墨磨薄荷湯以手指擦母油頭髮蘸墨遍口
時擦之勿令乳食待睡一時醒方與乳食再擦之

小兒不時變蒸變者異常也蒸者發熱也所以變換五臟蒸養
大腑須要變蒸多變氣血方榮骨脈始長情性有異則後來
出痘輕可凡變蒸不宜服藥或因傷食因傷風因驚嚇等項
夾雜相值而發令人疑惑亦須守候一二日俟病勢真的是
食則消食是風則行咳是驚則安神若變蒸而妄投藥餌則
為藥引入各經症遂難識而且纏綿不脫反為藥所悞也

一 小兒月內發搐鼻塞乃風邪所傷以六君子湯加桔梗細辛子母俱服更以葱頭七莖生姜一片細搗攤帛上合置掌中令熱急貼額門少頃鼻利搐止

一 小兒未滿月發搐嘔乳腹脹作瀉此乳傷脾胃用五味異功散如漏蘆令母服之子亦服是許遂愈

小兒雜病

胎熱胎寒者稟受有病也

○ 胎熱 小兒生下身熱面赤眼閉口中氣熱喘喘燥熱

甘草一錢黑豆二升淡竹葉五個

右剉一劑燈草七根水煎頓上少進令乳母多服

○ 胎寒 母孕時受寒兒生下面色青白四肢厥冷大便青黑

當歸炒 黃芪 蜜炒 桂心 黃芩 炒 細辛

龍骨細研 白芍煨各 右為細末每服一字以乳汁調下

愈

○ 臍風撮口者胎元有毒也

○ 臍風 多因斷臍之時被風濕所乘或者胎元稟有熱毒則兒青筋行臍却生兩公行至心者必死於青筋初發急用燈心蘸油燃於燈上自青筋頭并公行盡處燎之以截住不致攻心更以艾灸中臍三壯內服萬應丸一二粒以泄其胎毒也

○ 五通膏 治小兒臍風撮口

生地黃 生姜 葱白 蘿蔔子 田螺肉 分

右件共搗爛搭臍四圍一指厚抱住一時許有死下泄而愈

○ 治小兒斷臍不如法七日內有風出用直姜蚕二三條炒去絲為末蜜調敷口或乳頭上帶下亦可

○ 香螺膏 治臍風腫硬如盤

田螺三個入射少許搗爛搭臍上須臾再易腫痛立消

○宣風散 治初生兒臍風撮口多啼不乳口出白沫

全蝎二十個頭尾全者去毒用酒炙為末射香一字另研

右同和勻細末每用半字金銀煎湯調服

○撮口由胎氣挾熱風邪入臍毒流心脾之經故令舌強唇青

急以溫水蘸青綿布裹指輕上擦破即開口便安甚者用牛黃一分將竹瀝調滴入口即愈

胎驚夜啼者邪熱乘心也

○胎驚宜

○鎮驚散 治小兒在胎中受驚故生下未滿月而驚者神效

朱砂研細入牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入射少許

○夜啼宜

○花火膏 治和熱相乘焦燥夜啼

燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹母乳上令兒吮之

一方用燈心燒灰傳乳上令兒吮之

一方加朱砂一字共研末用白蜜調待兒睡抹兒口內

○蟬花散 治小兒夜啼不止狀若鬼祟

蟬退七個下半截為細末用薄荷湯調入好酒少許食後服

或者不信將上半截為末依前法服復啼如初古人立法莫

知其妙小兒觸犯禁忌而夜啼者宜醋炭薰服蘇合香丸

○一方用火柴頭一個長四五寸削平面用朱砂寫云撥火杖

撥火杖將來捉神將捉着夜啼鬼打殺不要放急急如律令

○小兒夜啼不止將朱砂書甲寅二字貼床頭即止

中惡天吊者冒犯邪氣也

○中惡宜

○辟邪膏 治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死等症

降真香 白膠香 沉香 虎頭骨 鬼臼

龍膽草 人參 白茯苓 各五錢

右為細末入雄黃半兩射香一錢煉蜜為丸乳香湯下

○天吊宜

○鈎藤散 治小兒天吊潮熱

鈎藤 人參 犀角 鏽屑 全蝎

天麻 錢半 甘草 錢半 右剉一劑水煎服

○鵝口 口瘡者胃中濕熱也

○牛黃散 治小兒口中百病驚口口瘡重腫不能吮乳及咽喉

牛黃 冰片 硼砂 辰砂 雄黃

青黛 各二分 牙硝 一分 黃連 末八分 黃栢末 八分

○板曰小兒初右共入乳鉢內研勻每用少許敷入口內

○瀉心湯 治小兒口瘡

淨黃連為極細末蜜水調服

○一方治小兒白口瘡用黃丹巴豆仁同炒焦去豆用丹搽口

瘡上立愈

○重舌木舌者脾經實火也 附弄舌

○重舌 乃舌下生舌也宜

○當歸連翹湯 治小兒心脾有熱舌下有形如舌而小者名曰

歸尾 連翹 白芷 鎔 三大黃 煨 甘草 炙 各一錢

右剉劑水煎食後頻服

○千金方 治重舌

黃栢末 和勻無時點舌上即退

○竹瀝膏 治小兒口瘡

竹瀝 黃栢末

和勻無時點舌上即退

附之 千金方 治重舌

心脾熱 歸尾 連翹 白芷 鎔 三大黃 煨 甘草 炙 各一錢

血氣便 附之 千金方 治重舌

根而生 竹瀝膏 治小兒口瘡

知古 竹瀝膏 治小兒口瘡

○又方用蒲黃塗之即瘥
○又方用百草霜芒硝滑石共為末酒調敷之
○又方用膽礬研細敷之
○木舌乃腫硬不柔和也宜
○雪積散治木舌

紫雪方見

朴硝五錢真紫雪二分鹽半分

局方未

右為末入竹瀝二三點用白湯調敷燕津無妨

○瀉黃散治小兒木舌弄舌

藿香葉七分山梔一錢軟石膏五分防風四分甘草七分

右剉一劑水煎不拘時服

走馬牙疳者氣虛濕熱也

○立効散治走馬牙疳

青黛 黃柏 枯礬 五倍子 末各一錢

右研細末用米泔先緞口內疹貼患處

○清胃升麻湯治小兒齒腫流涎腮腫馬牙疳主陽明之熱

升麻 川芎 白芍 半夏湯泡各乾薑

防風 黃連酒炒 生甘草各五分 軟石膏一錢

白水七分白芷三分

右剉一劑水煎食後熱服能漱即含漱而吐之漱藥不用白

木半夏

愛吃泥土者脾臟生疳也

○清胃養脾湯治小兒愛吃泥土乃脾虛胃熱所致此藥主之

黃芩 軟石膏 陳皮 白朮去芦茯苓去皮

甘草 右剉等分水煎服

○砂糖丸

膩粉一錢和砂糖為丸如麻子大米飲送下瀉出其土立愈

○黃金餅 治小兒好吃泥土

乾黄土為末濃煎黃連汁和為餅服之

丹毒者火行于外也

赤腫者游行通躰也

○犀角消毒飲 治風毒赤紫丹瘤吐衄狂燥睡卧不安胸膈滿
已出未出不能快透或已出熱不解急宜服此

牛旁子 四錢 荆芥穗

甘草各五分

防風

黃芩 一犀角 鎊

右剉一劑水煎不拘時服如無犀角以升麻代之

○水黃散 治赤遊丹毒

土硝

大黃末各五錢

右合一處新汲水調勻用鷄翎蘸藥類類塗掃

又方用伏龍肝不拘多少用鷄子清調敷患處專治赤腫赤

毒火毒走注

○泥金膏 治一切無名腫硬焮赤但是諸般丹瘤批癩濕爛大

陰地上蚯蚓糞熟皮硝蚯蚓糞三分之二共一處研細新汲

井水濃調厚敷患處乾則再上

喉痺者批毒也 會厭兩傍腫者為雙乳鷺是易治○一傍腫者

走馬喉風 且痺腫遠於外各纏喉風○喉痺暴發暴死者各

○甘桔湯 治小兒咽喉腫痛風批等毒

桔梗三錢 防風

荆芥

薄荷

黃芩

甘草鎊 一右剉一劑水煎食後頻頻溫服

竹葉燒存
性新汲水
調勻待患

惠濟公坊
服紅腫熱

如火灸
各赤遊

以用鐵
鋪水塗

詳之

重舌木舌並治
○碧雪治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或生瘡瘡

碧雪真青黛 礪砂與焰硝 蒲黃甘草末俱等分搽咽喉

○按毒膏 治嬰兒患眼腫痛

用熟地黄一兩以新汲水浸透搗爛貼脚心布裹住有效

○通天散 治赤眼暴發腫苦痛
芒硝五錢 雄黃三錢 共為細末吹入兩鼻內流水雙目流

淚即効
膿耳者腎氣熱衝也

○羽澤散 治耳中出膿或夜痛或出水

一方向抱出鷄卵皮炒黃色為細末香油調灌耳內即時疼止

一方向用五倍子燒存性為末吹入耳亦効

○黃龍散 治停耳小兒因沐浴水入耳中水濕停留搏於血氣

枯礬 龍骨煨 黃丹 水飛胭脂燒灰射香少許
海蝶蛸煨 右為細末先將帛條拭乾濃水後以藥摻入日

日用之勿令入風
○治停耳膿耳不問新久痛不止用黃蠟如皂角子大搓成條

外用好綿艾揲熟裹蠟條火燒着烟薰患處痛止住薰

鼻瘡者風濕氣攻也
○鼻瘡熱傷肺主氣通於鼻風濕之氣乘虛客於皮毛入

所流膿即又成瘡澤瀉散主之

○澤瀉散 治鼻瘡
澤瀉 山梔仁 甘草炙各一錢

高丙回春 鬱金 山梔仁 甘草炙各一錢

右為細末用甘草煎湯調食後服
頭瘡者熱毒也

○一掃光治小兒頭上肥瘡或多生虱子搔痒成瘡膿水出不

止細茶一錢爛口水銀入茶內一錢牙皂 花椒各二錢

右為細末香油調搽

○臘油膏治小兒頭瘡

臘猪油半生半熟雄黃 水銀各等分

右研三味和勻先將水洗淨濃汁後敷藥

疥瘡者風濕也

○枯礬散治小兒因剪臍外傷於風邪以致疥瘡不乾

枯礬 龍骨煨各五分共為細末每用少許乾搽臍上

小兒臍中汁出并痛用枯礬末乾敷或黃柏末傳之又

空燒灰存性糝之亦可

諸蟲痛者胃氣傷也

○追蟲散治小兒蟲積痛九腹疼口中出清水者蟲積也

史君子用肉二錢五分檳榔 一錢 右剉為一劑水煎食遠服

○一方用史君子一錢 檳榔一錢 雄黃五分俱為細末每服一

錢苦練根煎湯調下

○靈礬散治小兒蟲咬心痛散絕

五靈芝末二錢 枯礬五分 共為末每服二錢水煎不拘時服

當吐出蟲即愈

○練陳湯治小兒 蚘蟲

歌曰

蚘蟲出口有三般 口鼻中來大不堪
如或白蟲兼黑色 靈丹縱服病難安

若練根皮 二錢 陳皮 半夏 茯苓 甘草五分

右剉一劑生薑煎服

○錢氏白朮散 治小兒冬月吐蛇多是胃寒胃虛所致

人參 去芦 白朮 去芦 茯苓 去皮 藿香 木香

甘草 各一錢 乾葛 二錢 丁香 二粒

右剉每服一二錢水煎溫服

尾骨痛者陰虛病也 小兒尾骨痛乃是陰虛痰火所致若陰虛而痛者宜神陰降火湯主治之接火作痛者宜化疾降火湯主之

○補陰降火湯 治陰虛尾骨疼痛

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 熟地黃 酒蒸 黃柏 酒炒

知母 酒炒 各等分 右剉少用官桂為引或以前胡木香

為引如痛不止加乳香沒藥

○甘露飲 治小兒胃中客熱牙宣口臭齒齲腫爛時出膿血腫痛及身面黃肌體微腫大便不調小便赤澀並治

熟地黃 酒洗 天門冬 去心 麥門冬 去心

枳殼 麩炒 茵陳 黃芩 酒炒 枇杷葉 石斛

甘草 各等分 右剉水煎食後臨臥服

○一方用生蒲黃油頭髮燒灰各一錢為末生地黃汁或米飲

乳汁調同服

下淋者膀胱鬱熱也

○五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或如

赤茯苓 六錢 赤芍藥 山梔仁 各二錢 條黃芩 三錢 當歸

甘草 各五錢 右剉劑每服三錢燈心一團水煎服

○一方有生地澤瀉木通滑石車前各二錢

吐血者榮衛氣逆也

○黃金丸 治小兒吐血、衄血、下血

黃芩不拘多少為末，煉蜜為丸。如鷄頭實大。三歲兒每一丸，鹽湯化下。

○栢枝散 治小兒衄血、吐血

栢枝、晒乾、藕節、晒乾，各等分為末。三歲者服半錢，藕汁和蜜一匙，調白湯下。

○一方用山梔子炒黑，每用三錢，生姜煎服。

○又方 治咯血、吐血、衄血，用白芍藥為末，磨犀角汁調服。

○秘方 治小兒吐血不止，用黃連末一錢，豆豉二十粒，水煎溫服。

小便不通者，膀胱火也。

○神通散 治小便繫急不通，或去血

小便閉澀不堪言，為用兒茶末一錢

扁蓄煎湯來送下，霎時溲便湧如泉

○五苓散

猪苓 澤瀉 茯苓 白木名芎 官桂 茯苓減半

右剉一劑，水煎，食前服，加車前子、燈草尤效。

大便不通者，臟腑熱也。

○萬億丸 治大便不通如神

○沒藥散 治小兒風熱滯留，蓄上焦，胸膈高起，大便不通

沒藥 大黃 枳殼炒 桔梗 絡二 木香

甘草炙各一匙 右剉每服一錢，姜三片，水煎服。

○治新生小兒二三日不大小便，用葱汁人乳各半調勻，抹在

口中同乳帶下即通

○掩脐法 治小兒大小便不通

取連根葱白一莖 生姜一塊 淡豆豉二十粒 鹽一小匙 同研爛 捏作餅子 貼脐中 烘熱貼之 用絹帛扎定 良久氣透自通 不通再易一餅

○二妙散 治小兒大小便不通

六七月間 尋牛糞 有蟻螂 不拘多少 用線串起 陰乾 收貯 用時取一個 要全 灰淨磚上 四面以灰火烘乾 以刀從腰切斷 如大便閉 用上半截 小便閉 用下半截 二便俱閉 全用 為細末 新汲水調服

水腫者 土虧水旺也 ○加味五皮散 治小兒四肢腫滿 陽水陰水 皆可服

腹皮 桑皮

五加皮

地骨皮

生姜皮

大腹皮

橘皮 各等

茯苓皮 各一

加姜黃

木瓜 各一

二方去桑橘 右剉一劑 水煎服 ○一方去五加皮 加陳皮 桑白皮 牽牛散 治小兒諸般腫脹

黑牽牛 半生 炒取頭細末 每服一二匙 桑白皮煎湯 磨木香汁 調服

黃疸者 脾胃濕熱也

○茯苓 滲濕湯 治小兒黃疸 寒熱嘔吐 而渴 飲飲冷水 身體面

茯苓

茵陳

山梔

黃連

黃芩

防已

白朮

蒼朮

陳皮

青皮

枳殼

朱苓 各一 澤瀉 三分 右剉 水煎 徐徐溫服 ○如小便不通

加木通 ○如食傷 不思食 加砂仁 神麩 炒 麥芽 炒

汗者陰陽偏勝也

○團參湯治小兒虛汗或心血液盛亦發為汗此藥收斂心氣

新羅人參 川當歸各三升

右細剉用雄猪心一個切三片每服二錢猪心一片井水一

盞半煎食前作兩次服

○止汗散治小兒睡而自汗

故蒲扇灰如無扇只將舊蒲燒灰為末温酒調服

○牡蛎散治小兒盜汗因傷則不能制其津液或挑水淘飯大能

牡蛎煨二升黃芪蜜炙生地黃各一兩右剉劑水煎服

斑者陰陽毒氣也

○治小兒身常發熱風斑及脚指常紅腫此脾經風熱也丹方

風通聖散去硝黃加鼠粘子酒炒黃連為末亦有防風白芷

薄荷黃連黃芩黃芪黃柏煎湯浴之宜避風

解顛鶴節者胎元不全也

○解顛宜

○八物湯 有莖加酒炒黃連黃芩甘草水煎服外須烏髮束

及以白芨末敷之

○人參地黃丸 治小兒顛顛則解頭縫不合此乃腎氣不成腎

不能合

人參二錢 懷熟地 四錢 嫩鹿茸 乾山藥

白茯苓 去核各三錢 牡丹皮 山茱萸 去核各三錢

右為細末煉蜜為丸芡實大用人參煎湯研化食遠服

○鶴節宜

○當歸地黃丸 治小兒血氣不充故肌瘦薄骨節呈露如鶴之

馬病回春

黃集卷之二

三十九

懷熟地酒蒸 山茱萸酒蒸 山藥蒸 澤瀉去毛 牡丹彼梗

白茯苓去皮 當歸酒洗各三錢 一方加鹿茸酥炙

牛膝酒洗各二錢 去芦

右為末煉蜜丸芡實大每用熟水研化食前服仍以天南星炮去皮臍研細末入米醋調敷辨帛上煖熱貼之亦良法也行遲髮遲者氣血不充也

○行遲宜

○調元散治小兒稟受元氣不足顛顛開解肌肉消瘦腹大而

乾山藥五錢 人參去芦 茯苓去皮 茯神各二錢 白木二錢

石菖蒲一錢 白芍炒 熟黃當歸 川芎

黃芪蜜炙各二錢半 甘草各一錢半

右剉生姜三片棗一枚同煎不拘時服嬰乳母同服

錢氏地黄丸治肝腎虛弱骨脆不充不能行依本方加酒炙鹿茸牛膝五加皮同服自然隨生而骨強即能漸漸行也

語遲者邪乘心也

○菖蒲丸治小兒語遲

石菖蒲 人參 麥門冬炮去 川芎 遠志甘草水

當歸 乳香 硃砂另研各一錢

右為末煉蜜丸黍米大每服十九食遠粳米飲送下

齒遲者腎不足也

○芎藭散治小兒齒遲

川芎 乾山藥 當歸 白芍炒 甘草炙各三錢半

右為細末每服二錢白湯調下食後服將此乾藥末擦牙齦即生

龜胸者肺熱脹滿也

○龜胸丸 治小兒龜胸高如覆掌

川大黃煨六分

天門冬去心 百合

杏仁去皮尖

木通去皮

枳殼麩炒

桑白皮蜜炙

甜葶藶

隔布

軟石膏各一錢

右為細末煉蜜為丸如菉豆大每服五丸溫水化下食後臨

卧服仍宜灸兩乳前各一寸半上兩行三骨間六處各灸三

壯春夏從下灸起秋冬從上灸起依法灸之

龜背者風邪入脊也

○龜背丸 治小兒龜背

枳殼麩炒

防風去芦 獨活

大黃煨

前胡去芦

當歸

麻黃去節各三錢

右為細末麵糊丸黍米大每服十五六丸看兒大小以米飲

下食後服仍灸肺俞穴在椎下兩傍各一寸半心俞穴在五

椎下各一寸半膈俞穴在七椎下兩傍各一寸各灸三壯以

小兒中指節為一寸艾炷以小麥大但灸三壯而已

小兒行遲齒遲解顛顛填五軟鶴膝腎疳齒豁睛白多愁凡此

皆因稟受腎氣不足當以六味丸加鹿茸補之若因精氣未

滿而御女以通多致頭目眩暈作渴吐痰或發熱足熱腰腿

酸軟或自汗盜汗二便瀉痛變生諸疾難以各狀余常用六

味八味二丸及補中益氣之劑加減用之無不奏效方見補

一小兒五歲不能言咸以為廢人矣但其形色悉屬肺腎不足

遂用六味丸加五味鹿茸及補中益氣湯加五味兩月餘形

氣漸健將半載能發一二言至年許始發聲音如常方見補益

痘瘡

小兒痘疹何以知腮赤眼胞亦赤時呵欠噴嚏及驚怖耳尖手指冰如之證作三日瘡不見升發之藥不可遲敗毒葛根堪選用解熱表汗最為宜寒涼之劑慎勿用臟腑一動致災危

小兒患痘瘡臟腑虛寒者見證忌服寒涼藥

惡寒	寒熱往來	自汗惡風	手足厥冷
面青	面色皖白	目睛青色	莖色青白
躄淨	急墮嗜卧	二便清利	吐瀉不渴
昏睡	口臭氣冷	飲食不進	乳食不化
腹脹	聲音微弱	足脛冰冷	精神慢弱
懶言	吐乳瀉清	脉浮細而虛	脉沉細而遲

小兒患痘瘡臟腑實熱者見證忌服溫熱藥

面赤	大便閉	身躄壯熱	毛焦膚燥
辰紫	小便赤	手足極熱	驚悸譫語
眼黃	口氣熱	吐利而渴	狂亂叫哭
鼻塞	流清涕	大便焦黃	腹脹不食
頭痛	身背痛	煩燥痰壅	胸膈痞悶
嗆喉	咽乾燥	咳嗽喘促	上下失血
脉浮數而實	大表	脉沉實而數	裏
痘有十候	發熱初出	出齊起泛	行漿漿足
回水	收靨結痂	還元	

○初發熱宜

○加味敗毒散 初起發熱即服此藥神效

萬病回春

魚鱗集

卷之二

柴胡

前胡

羌活

獨活

防風

荆芥

薄荷

枳殼

桔梗

川芎

天麻

地骨皮

右具方除參苓恐補早助火也宜加紫草蟬蛻蘇葉麻黃姜
蚕葱白帶根解熱表汗泄瀉加猪苓澤瀉去紫草水煎熱服
出汗為佳

○升麻葛根湯發熱之初未分麻痘傷寒傷食等証宜此解散

升麻

葛根

白芍絡三甘草一錢

右劑一劑生薑三片水煎熱服○寒月加蘇葉八分○四肢
逆冷加桂枝一錢半○腰痛當知是痘加桂枝錢半○時氣
酷烈發熱太甚乃是毒氣盛加牛旁子一錢半只服前散毒
散尤妙

○痘初出宜

神功散

治痘出毒氣太盛血紅一片不分地界如蚕子種或
諸失血或吐瀉七日以前諸証可服解毒

黃芪

人參

白芍

紫草

生芩

紅花

牛旁子各等分

前胡

甘草減半

右劑水煎不拘時服○熱甚加黃連黃芩各一錢未退者再
加大黃研之○有驚者加蟬蛻一個去翹足○看頭粒淡黑入
者有寒乘之加官桂一錢

○胡荽酒

痘初出時宜用此酒遍噴面而床壁及處患若服後
人皆飲能辟穢毒又以淨胭脂點兩眼角防痘入眼

胡荽一束銅錢大細切用好酒熱和與服須臾渾身通暢過

一二時以昏醺麻油點照於無痘處又出如珍珠光亮數十

顆矣如無胡荽即用胡荽子研亦可

○痘出齊宜

○保元湯

萬病回春

集卷之七

四三

○痘疹心印曰
紅花湯治
痘作渴紅
花或王漿
意煎湯飲
其渴即止
飲口中如渴
飲之即

人參二錢 黃芪三錢 甘草一錢 右剉一劑 生姜一片 水煎服
四日以前有寒症其色黑慘宜保元湯加官桂
五日以後有寒中于裏者用附子理中湯不甚只宜保元湯
加官桂

腹痛者毒盛也神功散主之

面紅不退地界不分者神功散倍前胡

吐者毒盛乘火炎而宣也神功散主之

泄瀉者火盛而奔越也服神功散即止却用升麻以升提之
藥不可用止瀉之藥惟解其毒則自止矣

渴者紅花子湯加牛旁子雖口中如烟起即解癸渴者或用

人參麥門冬湯飲之亦可切不可用棗湯大渴者取真黃
土百沸湯碗蓋泡取水少加沙糖調飲立止

止和中童子
七散也

汗不止者而身已涼乃血隨氣溢也用當歸五錢黃芪三錢

酸棗一錢共剉一劑水煎溫服立止

痰用白附子水磨服切不可用二陳湯使燥陽明經使孤陽
無陰不能施化也

嗽用杏仁煎湯磨白附子服

三日內頂陷者非虛也乃火盛陽極反為陰降如樹幹樹枝
向下宜用九味神功散退其火

三四日色慘不明宜用神功散活血退火使其瑩滿光明
或有失治不知解毒五六日間以燈照之生氣未滅其毒太

盛作熱地界紅燥宜用神功散治之隨觀其變而施治猶
或可救一二過此則不能施其神功矣

認痘法 故曰氣尊血分者生謂火靖而後出氣得其令頭粒

神

尖而白根顆紅而不散譬如一顆珍珠放在胭脂上也頭粒白于上見氣升而草根紅于下見血附而安其分也故生故曰毒參陽位者死謂帶火而出氣不得冷頭粒紅紫地界不分譬如血猪肝勢極而不返故死若朱砂胭脂色者生息之氣由存可治者也

痘不治法

初出勇壯者不治 出如蚕種者不治 隨出隨沒者不治 如蚊蟲咬者不治 氣血相失者不治 倒出者不治 飲水如促鼻者不治 與肺氣不能疏理也 大九七日以前為裏實不可投溫燥之劑能助毒也 八日以後為裏虛不可投寒涼之劑能伐生氣也 起泛宜

起

托裏散

人參

甘草

川芎

肉桂

白芍

連翹

山查

木香

桔梗

當起泛而不起用川山甲炒成珠研二錢溫酒調服

血弱不起根底淡薄用保元湯加丁香三粒肉桂一錢

常歸二錢川芎一錢水煎服

凡痘不起脹灰白色頂陷者氣血不足虛寒症也宜托裏散加

丁香

凡痘紫紅不起脹者火盛血熱宜服內托散去桂加紫草紅花

熱盛加黃芩若紫黑陷伏用此藥調川山甲炒成珠為末五

分同服

○內托散治血氣虛損或風邪雜毒中觸使毒內陷伏而不出或出而不勻快此藥活血勻氣調胃補虛內托瘡

黃芪 蜜炙 人參 當歸 各二錢 川芎 防風 桔梗

厚朴 姜汁 白芷 甘草 各二錢 木香 官桂 各三錢

右方於紅紫黑陷屬熱毒者去桂如紫草紅花黃芩○若淡
白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香救裏官桂救表○當貫膿而
不貫膿者倍參芪當歸煎熟臨服入人乳汁好酒同參溫服
此貫膿之巧法也○泄瀉加丁香乾姜肉桂

行漿宜

八日漿不行其根虛薄血少故耳蓋以苟起時毒載血妄行
未免躡進其血虧矣至此不能成漿急以歸茸湯益之

○歸茸湯

鹿茸木 鹿角木 炙一兩 當歸 五錢 剉酒煎服

凡痘屬虛寒八九日色光白如水泡頂陷根白痒塌寒戰等症

○回陽酒

鹿茸木 鹿角木 炙 大附子去膽皮 煨黃芪 當歸酒洗

右剉好酒煎服○兼有痰嗽加牛膽南星

灰陷黑陷嘔吐白沫為表虛用木香散

寒戰咬牙痒塌泄瀉為裏虛用異攻散

嘔甚用木香散加白豆蔻

泄瀉甚異攻散加肉豆蔻此正治也若朱曾解毒另有法

乾嘔屬胃虛裏熱用異攻散

○木香散

木香磨 前胡 黃芪 白茯苓去皮 白木

厚朴煨 汁訶子煨 取陳皮各一錢 肉桂八分 人參

丁香雄者五粒 右剉一劑水一鐘煎八分溫服

○異攻散

當歸 川芎 人參咸半 黃芪 白木去芦

白茯苓去 訶子煨 取大附子去 半夏各一錢

厚朴煨 肉桂各八分 丁香七粒

右剉一劑水一鍾煎至八分溫服

漿行而作痒此內熱而痒為風寒所束用荆芥穗帶 罌粟擦

糊粘帛 頭令不散燈上燒過却于桌上春去灰快放手指定

痒痘頭用荆芥穗火點痒處一下即灰退患者自以為妙每

痒痘悉點之立止

行漿行足而發疥認定是黑疔痘或黑而硬或有紅絲或為

大紫泡未曾解毒者仍以神功散加雄黃七苓黃連大黃 煎

服却用點法雄黃一錢研胭脂重浸水令濃調雄黃末點疔

痘頂上立時即出紅活亦神法也蓋雄黃能拔毒胭脂能活

漿足宜

此時有效逆胃氣上越欲絕也以真黃土真邊聞之立止

九日而寒者異功散甚者宜軍 姜

九日寒戰大附子半個麵 煨熟七錢乾姜炒黑五錢白木

五錢人參三錢水煎溫服

此時漿滿或為寒所薄一時痒俱紫黑即如紫葡萄樣不必

驚恐急以肉桂磨湯服之立見如舊

回水宜

九日十日回水之時元氣重蒸真陽運化其水自然消燦此

循環之妙理也其有未曾解毒至此時水不能化反歸于胃

與所伏之毒伏于陽明則脾胃受戕 宜以定中湯治之

○定中湯用真黃土能鎮安胃氣收斂中土取真正黃色不雜

者用一塊在碗內百沸湯泡即以碗蓋少傾出用如冷傾入
盞內外以熱水頓熱用兩酒盞和藥朱砂研細五分能鎮心
胞絡使小腸不奔也雄黃明細一錢能解毒使胃氣寧也二
味用和勻以黃土湯少加砂糖溫服二服立止
煩燥悶亂發渴定中湯加片腦半分牛旁子湯二盞和服
有寒戰咬牙等症宜用附子理中湯
有擦破周身不能回水急以新瓦搥作粉摻在破處立收此
妙法也

收靨宜

若解毒不盡或未經解毒到當靨而不靨發熱蒸者用其
露回天飲沙糖半酒盞百沸湯調一大碗溫服立時熱退
痘靨萬發萬中回天之力也

若痘靨時溫靨乃外潰之痘淋漓粘淖者宜以甄陶散傳之
新瓦不拘多少為細末篩過絹袋包撲患處若乾茄堆積
不落內又膏膿即以瓦粉用鴨蛋清調敷立收而落
當靨時腹痛不靨其痛着在中脘乃熱毒凝滯瘀血作痛也

○手捻散

牛旁子 白芍 桃仁 大黃 銛一紅花 八分
桂枝五分 右剉一劑水煎溫服一服立愈

若將靨時其痘一時盡黑非靨也乃火極攻裏即凶矣
結痂宜

外潰不結痂者甄陶散傳之

結痂而悞犯風寒惡寒發熱者以補中益氣湯

○補中益氣湯

當歸 黃芪各一錢 人參 五分 白朮 八分 柴胡 升麻

乾葛各一錢 甘草 五分 右判一劑 生姜 一片 水煎服

○加味保元湯

黃芪 二錢 人參 一錢 麥門冬錢半 知母半錢 梔子錢半 甘草 五分 右判一劑 水煎服

結痂後有餘熱者以前藥加牛旁子一錢半 白附子一錢

還元宜

痂落血氣尚虛無力者宜調理八物湯主之或十全大補湯

○還元痂落有餘毒覺其聚于臟腑時復作熱腹內疼痛宜牛旁子飲主之

○牛旁子飲

牛旁子 前胡 黃連 黃芩 連翹

白附子 玄參 赤芍各一錢 羌活 防風

甘草各五 右判一劑 水煎服

○五福化毒丹 治痘疹後餘毒神效方見前諸熱

○祖傳經驗秘方 凡痘後不問癰毒發於何經初起紅腫時用

黑棗赤三豆以酸醋浸研漿時時以鵝翎刷之隨手退去效

增補痘門方旨

增補參蘇飲

紫蘇 陳皮 半夏 茯苓 乾葛

前胡 桔梗各一錢 甘草 五分 人參 七分

風寒壯熱體重頭痛痰嗽壅盛者此方主之○風寒客于外故用紫蘇乾葛以發表痰嗽壅于內故用半夏前胡桔梗陳

皮茯苓以安裏和去之後中外必虛人參甘草急固其虛此則表和而痘易出裏和而氣不虛表裏無失斯良劑矣

增補麻黃湯
麻黃 杏仁 甘草 桂枝

天寒腠理表熱壯盛者此方主之。○解表之藥有三品辛涼辛溫辛熱也。夏月表氣易泄宜用辛涼。春秋表氣平調宜用辛溫。若天寒之時表氣閉塞辛涼辛溫不能解散故以麻黃桂枝之辛熱者以主之亦各當其可而已佐以杏仁利其氣也佐以甘草和其氣也

增補惺惺散
人參 白朮 甘草 細辛 白茯苓
天花粉 白芍 桔梗各七分

發熱之初未明是痘形體怯弱者此方主之。○人參白朮茯苓甘草防其虛也乃細辛桔梗所以疏其陽天花粉白芍藥

所以和其氣也
增補加味全蝎散

天麻 麻黃 荆芥穗 全蝎 薄荷
紫草 蝉退各等分

風執驚搐者以此藥調抱龍丸。○痘之出也自內達外心熱則驚肝熱則搐所以搐者風也所以驚者熱也是方也麻黃荆芥薄荷天麻全蝎蝉退所以消風解熱乃紫草者所以解毒發痘而活血也

增補羌活透肌湯
羌活 陳皮 柴胡 前胡 半夏 茯苓

甘草

桔梗

川芎

當歸

山查

痘出見點未盡者此方主之。○表氣未疏則出有未盡故用羌活柴胡前胡川芎以疏表裏氣未利則出有不速故用半夏茯苓陳皮甘草桔梗以調裏當歸活表裏之血山查消表裏之滯血活滯消則痘之出也易之矣。

增補其桔湯

甘草二錢 桔梗三錢

咽喉腫痛者此方主之。○甘草之甘瀉實火而補虛火桔梗之苦清喉熱而瀉氣熱。

增補再造丸

生玳瑁半兩 片腦三錢 水蛭錢 炒黃一 蜈蚣炒 三錢

麻黃去節 一兩

猪尾血為丸龍眼大每服一九日二得微汗吉。

痘中有赤黑斑獨言煩燥者此方主之。○原是實熱之證失于清熱化毒則令痘中夾斑治之失道則熱益血盛而斑赤黑矣若以手按之血散者可治是方也。生玳瑁能解毒而化斑蜈蚣能從毒而化毒水蛭能散瘀而破血片腦能化氣而利竅麻黃能透肌而達表和之以猪尾血取其動而不滯爾。

增補黃連解毒湯

黃連炒 黃柏炒 黃芩炒 梔子炒 黑芥分

裏熱壅盛者此方主之。○無熱固不化毒熱壅則毒亦不化故用黃連瀉心火黃芩瀉肺肝之火黃柏瀉腎火梔子瀉上下之火無他證而惟熱壅故用藥亦精專焉。

增補人參白虎湯

黃連

黃連

五十一

石膏三錢 人參

甘草

桔梗各一錢 知母二錢

裏執渴甚者此方主之。○石膏清胃執胃清則不渴。人參知母甘草桔梗化氣而生津液液生則渴自除。

增補四順清涼飲

大黃

當歸

芍藥

甘草

實熱內壅腹脹秘結痘不能出者此方主之。○痘以執而出固不能以無執若實熱內壅腹脹便秘則三焦之氣不化而痘不能以出矣故用大黃通其滯當歸活其血芍藥養其陰甘草調其胃通利之後表裏氣血皆承順矣故曰四順。

增補活血散

木香二錢

當歸尾

酒浸焙乾

赤芍藥

酒浸炒

川芎

紫草

酒紅花各五錢

血竭一錢

每服三錢

痘中氣血凝滯者此方主之。○氣貴利而不貴泄血貴活而不貴凝木香川芎調其氣滯芍藥歸尾紫草紅花血竭理其血凝。

增補退火回生散

滑石

水飛辰砂

水飛各一錢

冰片三厘

每用冷水調服一錢

痘證血熱枯澁者此方主之。○火炎則水乾是故枯澁用滑石辰砂導去其熱此龜底抽薪之意入冰片者欲其速達而無壅滯也。

增補補中益氣湯

人參

黃耆

白朮

當歸

柴胡

升麻

陳皮

甘草

中氣虛弱、痘不起脹者、此方主之。○難經曰：氣主响之，故氣者，噓長萬物者也。痘不起脹，氣之弱也，可知矣。故用人參、白朮、黃耆、甘草，以補氣；用柴胡、升麻，以升陽；有當歸可以活其榮，陳皮可以利其氣。

增補當歸活血湯

當歸

川芎

赤芍

紅花

紫草各一錢

生地黄 一錢五分 取汁更良

血熱雍滯者，用此方活血涼血。○色紫為血熱，色枯為血滯，熱者涼之，枯者澤之，調血之道也。是方也。生地黄、涼血之品也。當歸、川芎、赤芍、藥紅、花紫、草滑、血之品也。涼者性寒，滑者質潤，氣利而已。

增補內托散

人參

黃耆

甘草

當歸

川芎

白芍

厚朴

防風

白芷

肉桂

木香

桔梗

表虛裏實、氣血皆弱者，此方主之。○在表者，痘頂灰陷為氣虛，痘根色淡為血虛。若息重氣粗，則為醫裏實，氣虛故用人參、黃耆、甘草、血虛故用當歸、芍藥、川芎。然防風、白芷、肉桂能引諸藥自內而托之於外，木香、桔梗、厚朴能調壅實以歸于和。○加減法：紅紫黑陷屬熱毒者，去桂，加紫草、紅花、黃芩、淡白灰、陷屬虛寒者，加丁香、溫裏、肉桂、溫表、當貫、膿而不貫、服者，倍參耆、當歸、糯米煎熟，入人乳好酒。

增補八珍湯

人參

白朮

茯苓

甘草

當歸

川芎

芍藥

地黄

氣體虛弱痘證雖順此方主之○醫貴未然之防痘證雖順若氣體虛弱不補恐有後失故用人參白朮茯苓甘草以補氣當歸川芎芍藥地黄以養血

增補內解散

人參

黃耆

甘草

白芍藥

川山甲

當歸

川芎

木香

金銀花

皂角刺

山查

乾姜

七八日間痘色枯淡不起無漿者此方主之○痘至七八日灌膿起脹之時也若根窩色淡者責其血虛不起無漿者責其氣虛故用人參黃耆甘草大補其氣又用當歸川芎白芍大補其血川山甲皂角刺金銀花長於化毒乾姜木香山查

長於化滯

增補托裏散

人參

黃芪

甘草

肉桂

白芍

當歸

川芎

連翹

貝母

山查

陳皮

桔梗

木香

補虛托裏此方主之○人參黃耆甘草補氣藥也佐之以山查木香則氣不滯當歸川芎芍藥補血藥也佐之以肉桂則血不滯桔梗連翹流氣清熱陳皮貝母利氣開痰

增補附子理中湯

附子

人參

甘草

白朮

胃中虛寒或又誤服涼藥瀉而手足厥冷者此方主之○人參甘草白朮之甘溫所以補虛乾姜附子之辛熱所以回陽

猪猪尾血 臘月取以新瓦甌盛掛于當風陰乾為末

牛黃 水片 射香 臙粉各一朱砂研

馬牙硝各一錢

右為末一歲者服一字大者五分溫水和乳少許調服
痘陷色黑危困惡候此方主之○痘之為物外感穢氣則陷
而入內食穢物則凸而出故猪血牛黃射香原皆穢物可以
起痘乃馬牙硝者所以攻結毒硃砂臙粉者所以攻結熱水
片則神於行滯而已是方也為熱毒倒入臟腑不得已而用
之以少卧時許下惡物如魚腦為吉然非平劑也
增補十全大補湯

人參 黃耆 白朮 茯苓 白芍

當歸 川芎 肉桂 熟地黃

痘證十日以上血氣虛弱者此方主之○參耆苓朮其真大
補氣也芎歸芍地肉桂大補血也氣血平補故曰十全

增補人牙散
人牙一枚燒存性射香少許 共為末酒調下

痘證黑陷者此方主之○痘之為物外感穢氣則陷入內食
穢物則凸出牙灰射香亦穢物耳故用之以起陷下之痘錢
氏云寔黑歸腎而用骨餘以治之非通論也

增補蟬退散
蟬退 地骨皮 白芷等分

每服三五分酒調下
表有風熱而痘色滯者此方主之○蟬退白芷消風熱于表

取

地骨皮退風熱于裏

增補瀉肝散

當歸

川芎

防風

荊芥

白芍藥

甘草

黃連

木賊

蔓荊子

白蒺藜

甘菊花

痘後肝經蘊熱目痛者此方主之。○目者肝之竅肝木臟也喜散而惡鬱故散之則條達鬱之則熱痛此方用防風蒺藜荊芥木賊蔓荊菊花雖所以清肝經之風熱而實所以散之使其條達也和肝部之血有當歸芍藥和肝部之氣有甘草川芎復有黃連瀉心火也實則瀉其子以故用之。

增補復明散

當歸

川芎

白芍

防風

生地黃

荊芥

柴胡

蔓荊子

白芷

痘後目痛紅絲翳膜者此方主之。○日月中天光明者也一為雲物蔽之明者晦矣風行天上則蔽障去而日月復明此方用防風荊芥柴胡白芷蔓荊子諸風藥以治目翳亦是道也復用當歸川芎芍藥地黃養血之品者經曰目得血而能視是故用之。

增補犀角黃連湯

生犀角水磨臨飲時入一錢烏梅一枚木香二分

黃連一錢

痘後牙疳此方互用。○諸痛瘍瘡皆屬心火故用黃連瀉心生犀角心乃烏梅者取其味酸可以收斂虛邪而木香者取其辛香可以輯和榮氣。

補遺秘方

○治小兒痘疹不起發

用李樹上津膠每用些須熬水飲之即起

○復生丸 治小兒痘疹不起發紫黑陷伏并痘疹初作已發未發服之其毒即解五日以前可服其効如神太梁鍾雲山傳

當歸

白芍

川芎

升麻

葛根

甘草

各五錢

嫩紫草茸一兩

辰砂

一兩二錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服一丸米雪兩三水送下如無河水亦可或糯米湯入酒一匙送下亦可

○桃紅痘疔方

雄黃一錢紫草三錢

右為細末胭脂汁調將銀簪挑破黑疔將藥點入內即効

○發痘方

穿山甲

用前背炒焦黃色射香少許

右為細末六七歲者熱酒調下三分不可多用蓋被片時通身汗出

○牛黃散

治痘黑陷虛癩而不起發

朱砂

一分牛黃二厘

右為細末蜂蜜打溫胭脂汁取蜜調藥用銀簪刺黑陷上塗之三次一日塗一次去黑

麻疹

麻疹乃六腑腸胃之熱蒸於肺外感內傷併發與痘症表似同

裏實異初熱三日出脹洪三日出而又沒沒而又出一暈時
許重者遍身網脹眼亦封閉有赤白微黃不同仍要紅活最
嫌黑陷及面目胸腹稠密咽喉噴膿者逆發不出而喘者即
死與大科癰疹相似又與發斑相似如錦紋有空缺處如雲
頭狀麻即如麻遍身無空但疎密不同耳仍有夾斑夾丹夾
瘡同出者

初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭眩宜升麻葛根湯加紫
蘇葱白以解肌切忌大汗斑不紅者亦宜乃麻症初起之神
方潮熱甚加參連地骨皮謔語調辰砂六一散咳嗽加麻黃
杏仁麥冬石羔咳甚另用涼膈散加桔梗地骨皮泄瀉宜四
苓散便血合犀角地黄湯吐衄血加炒山梔小便赤加水通
寒熱似瘧小柴胡湯

初起全類傷寒但面赤中指端為異耳

已出煩燥作渴者解毒湯合白虎湯喘便閉者前胡枳殼湯加
赤茯苓大黃甘草五味水煎服便閉三四日者小承氣湯防
風通聖散謔語溺閉者導赤散如淋者四苓散加車前木通
謔語如狂者解毒湯調辰砂六一散大便血小便亦見血者
犀角地黄湯合解毒湯吐血衄血解毒湯加炒山梔童便泄
瀉解毒湯合四苓散喘滿泄瀉瀉者柴苓湯煩渴作瀉者
白虎湯加蒼朮猪苓湯熱盛乾嘔解毒湯傷食嘔吐四君子
湯夏月因暑作嘔四苓散加人參忌用豆蔻木香姜桂熱藥
麻症初起已出已沒及一切雜症與痘毒大同但始終藥宜清
涼雖麻毒清涼痘愛溫暖不易常道虛則補實則瀉醫家活
法故治麻亦有血虛而用四物湯氣虛用四君子湯天寒傷

冷則溫中理中之藥一時之權也

麻症沒後餘熱內攻循衣摸床譫言妄語神昏喪志者死如熱
輕餘毒未除必先見諸氣色雖預防之始終以升麻為根湯
為主或消毒飲解毒湯隨症選用仍忌魚腥蔥蒜之物

即牛旁子何鳳新奇耳草水煎服

新刊增補萬病回春集七卷

文化十四丁丑歲末之

