


幼科準繩

卷二中



				漢書門
			一 二 三 四 五 六 七 八	
七 八	三 〇	二 〇	九	
冊	架	函	號	類

庫	文	閣	内
三 〇	一 二 三 四 五 六 七		漢書
函			
架	冊	號	類

内閣文庫			
番號	漢	12549	
冊數	78 (50)		
函號	301	62	



綴じ部(喉部分)の文字等が開きが不鮮明な場所あり

小兒急慢驚風

全蝎

肆拾玖箇
微炒黃

淺草文車

辰砂

半兩研極
細和勻

右取蚯蚓拾條洗淨入小瓶內以溫火煨蚯蚓化為水和丸如胡椒大每服三丸用順流水化下

小兒急慢驚風

殭蠶

叁條

辰砂

壹粒大

全蝎

壹箇

真珠末

壹撮

右末取蓬蒿中小蟲兒每壹箇研作壹丸如麻子大每一粒用乳汁下

保命丹本治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口噤涎

不止

虎睛

壹對安瓦上以瓦蓋之慢火逼乾

硃砂

半兩

全蝎

麝香

各半錢

天麻

壹分

蜈蚣 貳條去頭尾赤脚者

右為細末煉蜜丸如大豆大瓦罐貯之又入腦麝

膏定急驚薄荷蜜湯化下慢驚薄荷湯化下各三

丸

溫驚丸

一名粉

南星

為末入臘月牛膽中陰乾百日為末肆兩

硃砂

壹錢半

天竺黃

壹兩

坯子臘脂

半錢

龍腦

伍分

右用牛膽汁和丸如雞頭大每服一丸小者半丸

沙糖水下

抱龍丸

治傷風瘟疫身熱昏睡氣麤風熱痰實壅

嗽驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小

兒宜時與服之

丹溪云抱龍丸心肝藥也

南星

如無牛膽者只將生者剉炒熟用肆兩

天竺黃

壹兩

雄黃

水飛

辰砂

另研各半兩

麝香

另研壹錢

右為細末煮甘草膏和丸皂莢子大溫水化下百日小兒每丸分作三四服五歲兒一二丸大人三五丸亦治室女白帶伏暑用鹽少許嚼一二丸新

汲水送下。臘月雪水煮甘草和藥尤佳。一法用漿水或新水浸南星三日候透煮軟三五沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末搗兩以甘草貳兩半拍破用水二碗浸一宿慢火煮至半碗去渣漸漸傾入南星末內慢研令甘草水盡方入餘藥。

琥珀抱龍丸

抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木生火所謂生我者父母也肝為母心為子母安則子安心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰

抱龍丸理小兒諸驚四時感冒風寒溫疫邪熱致煩躁不寧痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐並宜可投其藥性溫平不僭不燥常服祛風化痰鎮心解熱和脾胃益精神

真琥珀

天竺黃

檀香

人參

去蘆

白茯苓

去皮各壹兩半

粉草

參兩去節

枳殼

水浸去穰麩炒微黃

枳實

水浸去穰麩炒微黃各壹兩

硃砂

伍兩先以磁石引去鐵屑次用水乳鉢內細杵取浮者飛過淨器內澄清去上餘水

如此法一般精製見硃砂盡曬乾用

山藥

去黑皮壹斤剉作小

塊慢火炒令熱透候冷用

南星

壹兩剉碎用臘月雄黃牛膽釀經一夏

金箔 百片去護紙取見成藥壹兩同在

右前拾貳味除硃砂金箔不入碾內餘拾味檀香

不過火外玖味或曬或焙同研為末和勻硃砂金

箔每壹兩重取新汲井水壹兩重入乳鉢內略杵

勻隨手丸如雞頭子大陰乾晴霽略曬日色燥甚

則拆裂宜頓放當風處取其自乾治法並用葱湯

無時化服或薄荷湯痰壅嗽甚淡薑湯下痘瘡見

形有驚溫淨湯下心悸不安燈草湯下暑天悶迷

麥門冬熟水下白日内嬰兒每丸作三次授一二歲

已上者止壹丸或貳丸其品劑修合之時但缺一

味不依製度必無効矣常用瓦瓶入麝香同收母

使散泄氣味入珍珠末壹兩合和名金珠散蓋珍

珠能鎮心寧肝墜痰尤効治法湯使同前

又琥珀抱龍丸 專治小兒急慢驚風發熱咳嗽作

搐痰喘驚悸生薑薄荷湯下 時行痘疹發熱嘔

吐驚跳白湯下 傷風發熱咳嗽鼻塞驚哭葱湯

下 因著驚發熱睡卧不寧燈心湯下 夏月發

熱嘔吐麥門冬湯下 因母發熱過乳溫熱不寧

甘草湯下 脾胃不和頭熱黃瘦懶食砂仁湯下

週歲小兒服一丸未及者半丸連進一二丸無

驚 幼科二 七十九
不効驗忌食魚腥生冷食乳者乳母同思

琥珀貳錢半包在精豬肉內
煨過取出研末貳錢

牛膽南星壹兩陸錢臘月用
牛膽作成者妙

僵蠶貳錢炒

雄黃 辰砂 人參

白茯苓各叁錢 天竺黃伍錢 鈞藤全用鈎子壹兩伍錢

真正牛黃伍分 真麝香壹錢

右各味不可短少分釐碾為極細末用粉甘草八兩剉碎以水四大碗熬膏二盞入藥末為丸每丸五分重金箔為衣外用黃蠟包之一料二百丸

又琥珀抱龍丸 治病法如前

琥珀壹兩伍錢研 牛黃壹錢研 人參

檀香 白茯苓各壹兩半 硃砂研

玳瑁各伍錢研 枳殼 枳實

牛膽南星 天竺黃各壹兩 山藥拾兩

甘草叁兩以上各為細末 金箔肆伯片 蜂蜜貳斤

黃蠟二十五斤

此藥一料五百丸每丸五分重專治嬰孩小兒諸驚四時感冒瘟疫邪熱煩躁不寧痰嗽氣急瘡疹欲出發搐並皆治之其藥性溫平不寒不燥驅風

化痰鎮心解熱安魂定驚和脾健胃添益精神蔥
白煎湯或薄荷湯下 痰壅咳甚生薑湯下 痘
疹見形有驚白湯下 心悸不安燈心湯下並不
拘時服初生數月者每丸作四次服或三分之一
或半丸數歲者每服一丸更量兒大小加減酌用
可也

世奪命散 治急慢驚風諸藥無效此藥隨手奏功

白附子 參錢

黑附子 炮去皮臍半兩 急驚不用

南星 炮壹兩

天麻 參錢

辰砂 另研貳錢半

防風

半夏 各半兩

全蝎 去毒每柒枚

蜈蚣 炙壹條

麝香 半錢

僵蠶 炒 慢驚不用

右為末三歲兒半錢薄荷生薑自然汁加好酒沸
湯各少許調服急驚加輕粉腦子各少許

太乙保生丹 見慢驚

湯治慢驚甚驗

赤脚蜈蚣 酒炙壹條

白僵蠶 炒柒條

辰砂 另研壹字

全蝎 用薄荷葉包炙柒枚

青州白丸子 參拾丸

右為末入麝香少許慢驚人參麥門冬湯調下急
驚加腦子牛黃各少許金銀薄荷湯調下

羅天麻散 治小兒急慢驚風及大人中風涎盛半

身不遂言語艱澀不省人事

半夏

朱錢

天麻

貳錢半

甘草

炙

茯苓

白朮

各叁錢

右用水一盞入磁罐內煮藥令水乾將老薑三錢同煮候乾為細末每服一錢五分薑棗湯調下

雄黃散 主暴中急慢驚風齁胎痰涎滿口及雨侵閉汗不通或涼或熱坐卧生煩

雄黃

紅亮者貳錢半

白藥

去黑皮

川烏頭

炮裂去皮臍

草烏頭

炮裂去皮

天麻

明亮者

川芎

伍味各半兩

右除雄黃外五味剉焙同雄黃為末驚風痰湧每服半錢或一錢用薑汁茶清調下發汗薑葱薄荷水煎併投三服取効

經治驚風墜涎天南星壹箇重壹兩者換酒浸七伏

時取出新瓦上炭火炙乾烈地上去火毒搗末入朱砂貳錢半研為細末每服五分荆芥湯空心及午時各調下一服

田天麻防風丸 治小兒驚風身熱喘促多睡驚悸

搐掣神昏痰涎不利等證

天麻

防風

人參

各壹兩

蝎尾

去毒半兩

甘草

硃砂

雄黃

牛黃

麝香

各壹錢

僵蠶

炒半兩

右為末煉蜜丸如櫻桃大硃砂為衣每服薄荷湯

下一二丸

雲七味羌活膏治急慢驚風壯熱

羌活

獨活

天麻

全蝎

去毒

人參

僵蠶

炒各半兩

烏蛇肉

酒浸壹宿焙乾壹兩

右為末煉蜜和丸如皂子大每兩作五十九丸每服

一丸荆芥湯下

經治小兒驚風全蝎二錢不去頭尾用薄荷葉裹炙

乾同研為末作四服白湯下

衍治小兒驚風僵蠶蝎稍等分天雄尖附子尖共一

錢炮過為末每調一字薑湯調下

羅小兒驚風釀乳方用白羊頭一箇丁香同熬至熟

乳母空心盡食之

丹孫女因胎中受濕熱日午發搐唇黑面青每日作

一次未半週難與藥且釀乳飲之

白朮

陳皮

半夏

芍藥

青皮

人參

各伍分

難與藥者
藥者
藥者

治急慢驚

力

人

川芎

木通 各叁錢

黃連 貳錢

甘草 多壹錢

右分八服薑五片與乳母煎服

痰積
痼者
攻積

小兒急慢驚風發熱口瘡手足伏熱痰熱痰喘痰嗽
並用涌法重劑以瓜蒂散輕劑苦參赤小豆末酒
酸薑汁調服之後用通神散蜜丸服之間以桑牛
陰乾研末調服以平其氣

本福銀丸 治小兒急慢驚風積痼

青黛 叁錢

水銀 一皂角子大同

寒食麵

黃明膠 炒焦為末 各貳錢 輕粉 炒豆

雄黃

粉霜

硃砂 各壹兩

巴豆 貳拾壹粒去油

腦麝 少許

右研細滴水為丸如麻子大捏匾曝乾瓷盒盛之
壹歲壹丸隨意加減煎棗子湯送下不得化破

博治急慢驚風乳香甘遂各半兩同研細每服半錢
用乳香湯調下或用童便調下尤妙

劫風膏 治急慢驚搐臍風撮口牙關緊閉痰涎壅

盛咽喉腫痛

葳靈仙 去蘆壹兩半細剉研為末

右用皂莢叁兩去皮弦槌損挪溫水壹盆絹濾過

慢火熬若稀糊入醇醋半兩再熬三五沸去火候
冷用前藥末亭分乳鉢內杵勻丸芡實大先用鹽
梅肉擦牙根次以此膏壹丸或貳丸溫白湯濃調
抹入左右牙關內即開續進別藥熬時得瓦噐為
上銀噐尤佳及解風痰壅盛淡薑湯調化無時少
與含嚥咽喉腫痛溫茶清調下或薄荷湯

以上諸方通治急慢驚風蓋謂虛實兩見急慢互
出故有通治之法合而言之急慢雖異皆本之於
痰故礞石星半之屬通能治之者也分而言之礞
石之屬瀉痰青黛之屬瀉木硃砂之屬瀉火皆治
氣實之劑參草之屬補土天麻全蝎之屬補木烏
附之屬補火又皆治氣虛之劑故補瀉兼施虛實
通治之法也

霹靂散 解急慢驚風不省人事

豬牙皂角 叁錢 細辛 川芎

白芷 叁味各 貳錢 躑躅花 壹錢半

右剉晒為末每以少許用大燈心叁寸長蘸點鼻
內得噴嚏為驗前藥不可焙焙則不應

相火肝藏血血不足則風火内生故目睛為之睜動

經曰曲直動搖風之象也宜用四物益其血柴胡山
梔清其肝陰血內榮則虛風自息矣若因肝經血燥
而自病者用六味丸以滋其源因肺金尅肝木者用
瀉白散以平金邪若眼眶瞤動者肝木乘脾土也用
抱龍丸若愈後驚悸不寐或寐中發搐咬牙目睛瞤
動者血虛不能榮筋脈也用補中益氣湯或歸脾湯
加茯苓五味蓋有餘者邪氣實也不足者真氣虛也
凡病氣有餘當認為不足此證兼屬肝脾多為慢驚
之漸

辰口蠕動脾辰為脾之華口乃脾之竅又陽明之脈

環唇口而交人中陽明胃也是以脾胃虛者多有此
證不獨病後而已夫脾主涎脾虛則不能收攝多兼
流涎或誤認為痰而用祛逐之藥則津液益枯不能
滋養筋脈遂致四肢抽搐病勢愈甚原其治法與慢
脾風相同當用大補脾胃之藥加升麻柴胡切勿用
青皮龍膽草之類兼察其色黃者脾弱也青者肝勝
也青黃不澤木來尅土也青赤相兼木火風熱也黑
為寒水反來侮土白為氣虛亡陽凡此宜用六君子
湯加小柴胡湯若四肢微搐或潮熱往來或泄瀉嘔
吐面色痿黃皆脾胃有傷也宜用白朮黃芪川芎當

歸人參陳皮肉豆蔻神麩乾葛白芍藥黃連炙甘草
白茯苓以補胃氣若脾胃虛弱者用五味異功散虛
寒加木香炮薑若脾氣下陷者用補中益氣湯以升
其陽作渴者用七味白朮散以生津液若肝木侮脾
者用補中益氣湯加茯苓半夏芍藥以制肝補脾

目直視 小兒忽然驚搐目直者皆肝之風熱也若
肝虛生風則目連劄而不搐及多欠咬牙若肝經風
實則目直大叫呵欠項急頓悶若肝經有熱則目直
視不搐得心熱則搐氣熱則外生氣溫則内生其證
手尋衣領及亂捻物宜用瀉青丸壯熱飲水喘悶宜

用瀉白散凡病之新久皆能引肝風風內動則上入
於目故目爲之連劄若熱入於目牽其筋脉兩眦俱
緊不能轉視故目直也亦有飲食停滯中焦致清陽
不升濁陰不降肝木生發之氣不得升致生虛風者
須詳審之若胸滿腹痛嘔吐惡食輕則消導化痰重
則探吐滯積更須審其所傷寒物熱物亦有因感冒
吐瀉致使土敗木侮而生虛風者不可遽服驚藥宜
用六君子加芍藥木香柴胡制肝補脾若因脾土虛
而自病者用五味異功散凡飲食停滯痰涎壅滿而
見驚證者實因脾土虛弱不能生金金虛不能平木

故木邪妄動也宜健脾消食其證自愈若輒用驚風之藥反成其風而益其病也况臟腑脆嫩不可投以峻厲之劑治者慎之

驚動 小兒睡中驚動由心腎不足所致蓋心主血與神肝藏血與魂肺主氣與魄腎主精與恐小兒臟腑脆弱易為驚恐恐則氣下驚則心無所依神無所歸且夫人之神氣寤則行於目寐則棲於腎今心腎既虛則不能寧攝精神故睡中驚動也治宜清心安神用茯苓補心湯加酸棗仁茯神五味子亦有驚赫而作者因擊動其肝故魂不安也治宜鎮驚定

魂用安神鎮驚丸若飲食間因驚而停滯者用六君子加神麩厚朴食既消而驚未定用茯苓補心湯若木火太過而心神不寧者用導赤散風熱相搏者用柴胡梔子散食鬱生痰驚動不安者用四君以健脾神麩半夏以化痰山梔芍藥以清熱

目動咬牙 小兒驚後目微動咬牙者皆病後亡津液不能榮其筋脉也亦有肝經虛熱而生風者當審其氣血有餘不足而治之其日中發熱飲冷而動者氣有餘也用瀉青丸夜間盜汗及睡不寧而動者血不足也用地黃丸或因肝經風邪傳於脾腎者亦令

咬牙先用柴胡清肝散次用五味異功散六味地黃丸若因脾胃虛熱用補中益氣湯加芍藥山梔實熱用瀉黃散蓋牙牀屬手足陽明故也若肝腎熱用六味地黃丸

泄瀉 小兒驚瀉者肝主驚肝木也盛則必傳尅於脾脾土既衰則乳食不化水道不調故泄瀉色青或

兼發搐者蓋青乃肝之色搐乃肝之證也亦有因乳母脾虛受驚及怒動肝火而致者經曰怒則氣逆甚

則嘔血及飧泄法當平肝補脾慎勿用峻攻之藥脾氣益虛肝邪彌甚甚至抽搐反張者亦肝火熾盛中

州虧損之變證也凡見驚證即宜用四君六君異功散等方加白附子定風柴胡平肝引經以杜漸則必

不至瀉搐而自安矣今已見瀉吐驚搐尚不知補脾平肝以保命抱龍鎮驚等藥治之其亦去生遠矣

腹痛 蟬蛻釣藤飲 治肚疼驚啼

釣藤鈎

天麻

茯苓

川芎

白芍藥

甘草

蟬蛻 各壹兩

右入燈心水煎服

煩渴 閻氏云驚風或泄瀉等證煩渴者皆津液內耗

也不問陰陽宜煎錢氏白朮散使滿意取足飲之彌多彌好

清心丸 治驚熱煩躁

人參

茯神

防風

朱砂

柴胡

金箔

各叁錢

叁拾片

右為末煉蜜丸如桐子大每服一二丸竹瀝調下

神芩丸

治風熱壅滯頭目昏眩口舌生瘡牙齒疳

蝕或遍身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁作渴或大便

澀滯或積熱腹滿驚風潮搐等證

大黃

黃芩

生牽牛末

生

各貳

壹兩

滑石

肆兩

黃連

薄荷葉

川芎

各半兩

右為末水糊丸桐子大每服三四丸溫熟水下

潮熱似瘧

曾又有急驚天釣之後變作潮熱手足逆

冷有似瘧疾蓋因病瘡之時不善將護外感風邪乘

虛而入於經絡再未解散以致如此經曰重陽必陰

又曰亢則害承乃制此其義也宜服柴胡加桂湯及

當歸散氣實者則以烏犀丸水晶丹略與通利勻氣

散止補後以參苓白朮散調理自然平瘡此證所用

藥品間使苦寒之味務在消陽盛之火肺金得勝肝

木自平而風邪亦散斯為良法

柴胡加桂湯 見傷寒

當歸散 見痢

烏犀丸 八百八二

水晶丹 並見癖積

勻氣散 見腹痛

參苓白朮散 見泄瀉

雜論 驚風 海藏云心神不安四君子加辰砂半分棗

湯調下 又有一證欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐

搦此非驚風當用發散藥 前暑風一證因夏月感

冒風熱太甚致面垢唇紅脉沉細數忽發驚搐不省

人事治用消暑清心飲辰砂五苓散及琥珀抱龍丸

自安切勿以溫劑調補

消暑清心飲 解伏熱中暑煩躁作渴神氣不清及

有驚搐名暑風證投之即效

香薷 去老梗

澤瀉 去麤皮 各壹兩

扁豆 炒熟去殼研

淨黃連

羌活

猪苓 去皮

厚朴 去粗皮薑汁浸透炒

白朮

乾葛

赤茯苓 去皮

升麻

川芎 各半兩

甘草 叁錢

右剉每服二錢水一盞煎七分無時帶涼服治暑

風證先投此劑得效次服却暑丹其搐不發矣

薛氏於急慢驚癇之外又出驚風一證其候虛惕怔

神氣怯神散痰涎來去泄瀉色青蓋驚之輕而虛者也若驚入心則面赤夜啼用梔子清肝散加黃連入肝則面青眼竄用柴胡清肝散入脾則面黃嘔吐虛汗嗜卧用木香加柴胡山梔入肺則面白喘急用異功散加柴胡桔梗入腎則面黑齧牙用六味地黃丸若因乳母恚怒肝火或膏梁積熱遺兒為患或兒吐瀉傷脾清氣不升風木陷入太陰傳變等因皆能致此當隨主治否則必成慢脾也須預慎防為善

灸法 小兒急驚灸前頂二穴三壯取法在百會前二寸若不愈灸兩眉心及鼻下人中一穴炷如小麥夫

小兒慢驚灸尺澤穴各三壯在肘中橫紋約止動脈中炷如小麥大 若睡中驚掣灸足大指次指之端去爪甲如韭葉許各一壯 若角弓反張身強灸鼻上入髮際三分三壯次灸大椎下節間三壯 若睡中驚不合眼目灸屈肘後橫紋中三分各一壯

診錢 咬牙甚者發驚 目直面青身反折者生驚 呵欠面青者驚風 呵欠面黃者脾虛驚 目赤兼青者發搐

驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更有發時證生二云男

為木故左視木位無聲右視金位相擊則有聲女一
金故右視金位無聲左視木位亦相擊有聲

李時丞子三歲發搐自卯至巳目右視大叫哭錢見

曰此逆也男為陽本發左視無聲則順右視有聲則

逆所以然者左肝木也右肺金也逆則二臟相戰金

木相擊而有聲也治宜瀉強補弱假令女發搐目左

視是肺來乘肝肝不能任故叫哭也當瀉其肺後治

其心續治其肝若病在秋時日西肺無旺位當大瀉其

肺若病在春時早晨此肝旺之時尚不能勝肺是肺強

而肝火弱也當補其肝腎大瀉其肺若男發搐目右

視是肝來勝肺而叫哭當瀉其肝心若病在春夏時早晨

日中肝心旺時當大瀉其肝若病在秋冬時日晡此肺

旺之時尚不能勝肝是肝強而肺極虛也當補其肺

大瀉其肝所以言目反視者乃肝主目也凡搐則是

風熱相搏於內風屬肝故外見於目也今此病男反

女證故稍易治於女也先瀉其肺以瀉肺湯主之二

日不悶亂知病退也後用地黃丸補腎三服後用瀉

青丸各二服以瀉心肝五日而愈又肺虛不瀉者

何也曰假令男目右視木克金肝旺勝肺而但瀉肝

若更病在春夏金氣極虛故當補其肺慎勿瀉也

湯凡搐男左女右為順易治男右女左為逆難治

脈訣啓蒙曰小兒脈促急為虛驚。直指云浮數洪

緊為急驚。沉遲散緩為慢驚。虎口脈紋青紫為

驚風。紅者風熱輕。赤者風熱盛。紫者驚熱。

青者驚積。青紫相半驚積風熱俱有。主急驚風。

青而淡紫伸縮來去主慢驚風。紫絲青絲或黑絲

隱隱相雜似出而不出主慢脾風。形勢灣入裏者

順。出外者逆。

不治者搖而不休休而再搖。驚叫發搐。汗出足

冷。痰滿胸喉。口開目直。

急驚眼睛翻轉。口中出血。兩足擺跳。肚腹搖動。或神

緩而摸體尋衣。或證篤而神昏氣促。噴藥不下。通

不嚏。心中熱痛。忽大叫者不治。慢驚四肢厥冷。吐

瀉咳嗽。面黯神慘。鴟聲胃痛。兩脇動氣。口生白瘡。髮

直搖頭。眼青不轉。涎鳴喘噎。頭軟大小二便不禁。手

足一邊牽引者皆為不治。慢脾身冷粘汗。直卧如

尸。喘嗽頭軟。背直口噤。搖頭痰如牽鋸之聲。面無潤

澤之色。縮唇氣粗者不治。

藥忌 治小兒急驚。方搖不用驚。擾此不足畏。慢驚雖

靜乃危病也。急驚方搖時。但扶持之。不可擒捉。蓋風

氣方盛。恐流入筋脈。或至手足成拘攣也。

珠母丸。夢寐不寧。肝魂失守也。用定志丸。恐畏不能獨處。膽氣虛冷也。用茯神湯。睡卧煩躁。膽氣實熱也。用酸棗仁丸。眩運驚悸。風痰內作也。用本事辰砂遠志丸。思慮鬱結。脾虛氣滯。用歸脾湯。前證雖曰屬心。與肝而血之所統。實主於脾。脾之志曰思。思慮多則血耗損而不能滋養於肝。心者脾使之也。思慮內動。未嘗有不役其心者。夫心為君火之藏。十二官之主也。夫君之德不怒而威。無為而治。故宜鎮之以靜謐。戒之以妄動。動則相火翕合。燼燦陰精。精血既虧。則火空獨發。是以驚悸怔忡之所由生。五志之火。心所不能制者矣。故治脾者不可不知養心。養心者不可不知鎮靜。而寡慾然人孰無思也。思之正則無妄動之慾矣。朱子曰。必使道心常為一身之主。而人心每聽命焉。此善養於心者也。

溫膽湯 治心膽虛怯。觸事易驚。或夢寐不祥。遂致

心驚膽懾。氣鬱生涎。涎與氣搏。變生諸證。或短氣

悸乏。或復自汗。膽虛不能制脾。則脾之水飲作矣。

半夏 湯洗

竹茹

枳實 炒

橘皮 去白 各 貳兩

甘草 炙 壹兩

白茯苓 壹兩

右每服四錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。煎七分。食

前服

寧志丸 治心虛多驚若有痰宜吐之

人參

白茯苓

茯神

栝子仁

琥珀

當歸

酸棗仁

溫酒浸半日去殼

遠志

炒各半兩

乳香

朱砂

石菖蒲

各參錢

右為末蜜丸桐子大每服三十九食後棗湯下

茯神散 治五藏氣血虛弱驚悸怔忡宜用此安神

定志

茯神 去木

人參

龍齒

另研

遠志 去心

桂心

防風

獨活

酸棗仁

細辛

白朮 炒各參錢

乾薑 炮參

右為末每服四五錢水煎服蜜丸亦可

治要茯苓補心湯 治心氣不足喜悲愁怒衄血面

黃五心煩熱或咽喉間痛舌本作強

茯苓 肆錢

桂心

甘草

炒各參分

紫石英 煨

人參

麥門冬

去心各壹錢

大棗 貳枚

右水煎服

茯神湯 治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏不能獨處胸中煩悶

茯神 去木

酸棗仁 炒

黃耆 炒

梔子仁 炒

白芍藥 炒

五味子 杵炒

桂心

熟地黃 自製

人參 各壹兩

甘草 伍錢

右每服五錢薑水煎

酸棗仁丸 治膽氣實熱不得睡卧神志不安驚悸怔忡

茯神 去木

酸棗仁 炒

遠志 去心

栝子仁 炒

防風 各壹兩

枳殼 炒

生地黄 杵膏各半兩

青竹茹 貳錢伍分

右爲末蜜丸梧子大每服七八十丸滾湯下

定志丸 治心神虛怯所患同前或語言鬼恠喜笑

驚悸

人參

茯苓 各壹兩伍錢

菖蒲

遠志 去心各壹兩

右爲末蜜丸如梧子大每服七八十丸滾湯下

治要茯苓散 治心經實熱口乾煩渴眠卧不得心

神恍惚

茯神

麥門冬

通草

升麻

紫苑

桂心

知母

大棗

淡竹茹

赤石脂

沉香

右每服壹兩水煎

朱雀丸

治心病怔忡不止

白茯苓

沉香

右為末蜜丸小豆大每服三十九人參煎湯下

世傳蜜陀僧散

治驚氣入心絡不能語者昔有人

為狼及犬蛇所驚皆以此而安

蜜陀僧

末如粉

右茶清調一錢匕

丹溪朱砂丸

治勞役心跳

朱砂

當歸身

白芍藥

側柏葉

川芎

陳皮

甘草

黃連

右用豬心血為丸粟米大每服百丸龍眼湯下

本事辰砂遠志丸

消風化痰鎮心安神

人參

石菖蒲

遠志

茯神

川芎

山藥

白附子

麥門冬

細辛

鐵粉

辰砂各伍錢

右為末用生薑汁入水糊丸菜豆大以朱砂為衣
每服一二十九臨睡生薑湯下

加味歸脾湯去丹皮山梔即歸脾湯 治脾虛弱損
健忘驚悸等證

人參

黃耆

茯神去木各壹錢

甘草伍分

白朮炒壹錢

木香伍分

遠志去心

酸棗仁炒研

龍眼肉

當歸

牡丹皮

山梔炒各壹錢

右水煎服

○愚按前方若乳母憂思傷脾血虛發熱食少體倦
或脾虛不能統攝以致陰血妄行或健忘怔忡驚
悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便
不調或婦人經候不調晡熱內熱或蠶唇流注等
證致兒為患者令子母俱服之

辰砂膽星膏 治小兒痰熱氣熱氣急喘嗽驚悸不
安

辰砂壹錢

牛膽南星壹兩

琥珀

青礞石末各壹錢

天竺黃貳錢

甘艸伍分

麝香 少許

右為細末煉蜜丸如芡實大每服半丸不拘時生薑湯化下

木通散 治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利驚熱

羌活

山梔子

各貳錢

大黃

煨

木通

赤茯苓

甘州

各壹錢

右劉每服二錢入紫蘇葉些少水一盞煎至五分不拘時服

癇

嬰驚癇即急慢之證但驚癇發時仆地作聲醒時吐沫急慢驚則不作聲不吐沫也。仁齋曰癇小兒之惡候也蓋小兒血脈不斂氣骨不聚為風邪所觸為乳哺失節停結癖積而得之其候神氣怫鬱瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚脹膨手足搐掣似死似生或聲或啞或項背反張或腰脊強直但四體柔弱發而時醒者為癇若一身強硬終日不醒則為瘖證矣

陽癇初作時病先身熱痰涎驚啼叫噉而後發脈浮者為陽癇乃急驚也內在六腑外在皮膚為易治。若病先身冷不驚痰不啼呼而作脈沉者為陰癇乃慢驚也此病內在五藏外在骨髓劇者難治。曾陽癇者因感驚風三次發搐不與去風下痰則再發然三次者非一日三次也或一月或一季一發驚搐必經三度故曰三次所謂驚風三發便為癇。即此義也其病主身熱自汗兩目上視嚼沫齧牙手足掣搦面色紅紫六脈浮數以百解散加荏和湯水煎疎解次下痰用水晶丹或半夏丸。陰癇者因憂

驚後去痰不盡痰入心包而得四肢逆冷吐舌搖頭口嚼白沫牙關緊閉但不甚驚搐作啼面色或白或青脈息沉微故嬰孩寶書云睡中吐舌更搖頭正此之謂治以固真湯加日生湯同煎調寬氣飲和解

千金云小兒之癇有三風癇驚癇食癇也風癇緣衣煖汗出風因入也初時先屈指如數物乃作驚癇起於驚怖大啼乃作食癇其先不哺乳吐而變熱後發然風癇驚癇時時有之十兒之中未有一二凡是先寒後發熱者皆食癇也驚癇皆按圖灸之風癇當以豬心湯食癇當下乃愈紫霜丸佳。按

此論三癇蓋有三因之分風癇屬外因驚癇屬內因食癇屬不內外因也又按全嬰方云風癇因將養失度血氣不和或厚衣汗出腠理開舒風邪而入之其病在肝肝主風驗其證目青面紅發搐宜驅風膏大膏膏琥珀散鎮驚藥有熱四順飲退後與利驚丸下其痰涎驚癇因血氣盛實臟腑生熱或驚怖大啼精神傷動外邪所入爲之其病在心心主驚驗其證忽然叫聲發搐宜琥珀散紅龍散鎮心丸有熱四順飲利驚丸下之不生別病也食癇其病在脾脾納食驗其證嘔吐酸氣卽發搐此病或大便酸臭紫丸子下之已上三證大同小異並屬陽也各目睛斜手足潮搐或作豬聲發過卽差皆十生一死也

五藏癇 三因云古方有五癇五藏癇六畜癇等名證不同難於備載別錄有五癇之證一曰馬癇作馬嘶鳴以馬屬在午手少陰君火主之故其病應於心二曰羊癇作羊叫聲以羊屬未足太陰濕土主之應乎脾三曰雞癇作雞叫聲以雞屬酉足陽明燥金主之應乎胃四曰豬癇作豬叫聲以豬屬亥手厥陰心包主之應乎右腎五曰牛癇作牛吼聲以牛屬丑手太陰濕土主之應乎肺此五癇應乎五畜應乎五藏者

也發則旋暈顛倒口眼相引目睛上搖手足搐搦背脊強直食頃乃甦各隨所感施以治法。錢凡治五癩皆隨臟治之每臟各一獸犬癩反折上竄犬叫肝也羊癩目瞪吐舌羊叫心也牛癩目直視腹滿牛叫脾也雞癩驚跳反折手縱雞叫肺也豬癩如尸吐沫豬叫腎也五癩重者死病後甚者亦死輕者五色丸主之。面赤目瞪吐舌齧舌心煩氣短其聲如羊者曰心癩。面青唇青兩眼上竄手足攣掣反折其聲如犬者曰肝癩。面黑目振吐涎沫形體如尸其聲如猪者曰腎癩。面如枯骨目白反視驚跳反折

搖頭吐沫其聲如雞者曰肺癩。面色痿黃目直腹滿自利四肢不收其聲如牛者曰脾癩。五癩通用五色丸為主仍參以各經之藥。心癩屬血虛者用養心湯發熱飲冷為實熱用虎睛丸發熱飲湯為虛熱用妙香散。肝癩者虛證用地黃丸抽搖有力為實邪用柴胡清肝散大便不通用瀉青丸。腎癩者用地黃丸紫河車丸之類腎無瀉法故徑從虛治之。肺癩者屬氣虛用補肺散面色痿黃者土不能生也。用五味異功散面色赤者陰火上衝於肺也。用地黃丸。脾癩者用五味異功散若面青瀉利飲食少

思用六君子加木香柴胡。按千金叙六畜癩無五藏之分屬錢氏始分之而無馬癩一證曾氏謂初發作羊犬聲者咽喉為風痰所梗聲自如此其理甚明言六畜者特強名耳故丹溪謂於經既無所據而治法亦未見有五者之分所以不必分五也。

治法 仁齋曰大槩血滯心竅邪氣在心積驚成癩通行心經調平血脉順氣豁痰乃其要也假令小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癩之漸卽以紫霜丸導之。方見變蒸熱時間量與紫霜丸減其盛氣則無驚風癩釣之患癩證方萌耳後高骨間必

有青紋紛紛如線見之則為爪破須令出血啼叫尤得氣通諸癩發不能言者蓋咽喉為氣之道路風傷其氣以掩聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致耳南星炮為末雄豬膽汁調和少許啖之輒效若夫錢氏五癩丸并南星散以菖蒲煎湯調下甘遂豬心湯和蘇合香丸一丸皆治癩之要藥也。劉小兒神尚弱驚則神不守舍舍空則痰涎歸之或飲食失節脾胃有傷積為痰飲以致痰迷心竅而作者治法當尋火尋痰而前人多用鎮墜清心之藥固可以治熱可以清痰若有頑痰膠固者此藥未易驅逐在

上者必用吐吐後方宜服此藥有痰實在裏者亦須下之隨病輕重而用之也。潔如有客痰發熱而有

聲煎大黃荆芥湯下五色丸。潮熱有時積熱也桃

枝丸主之。方見積熱壯熱不退當用地骨皮散。方見潮熱下五

色丸。風熱當用防風黃芩湯下大青膏。身温不

熱當用白虎湯加蒼朮下五色丸。醒此皆元氣不

足之證須以紫河車即小兒胞衣丸為主而以補藥佐之

設若泛行尅伐復傷元氣則必不時舉發久而變危

多至不救。一老人生子方週歲秋初暴冷忽發搐

似驚瀾過則氣息淹淹此元氣虛弱所致與補中益

氣湯而愈。一小兒十歲一小兒七歲各有瀾證歲

發二次後因出痘及飲食停滯舉發頻數用六君子

補中益氣二湯而愈。一小兒患前證每發吐痰困

倦半餉而甦諸藥不應年至十三而頻發用紫河車

生研爛入人參當歸末丸桐子大每服三五丸日

進三五服乳化下一月漸愈又佐以八珍湯全愈

一小兒七歲發驚瀾每作先君令其恣飲人乳後發

漸疎而輕至十四歲復發仍用人乳不應余令用肥

厚紫河車研爛入乳調如泥日服二三次至數具而

愈後常用加減人味丸而安至二十三歲發而手足

...

厥冷仍用前法佐以八味丸十全大補湯而痊

錢氏五色丸

硃砂研半兩

水銀壹分

雄黃熬壹兩

鉛叁兩熬

真珠末研壹兩

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

三因六珍丹

雄黃

雌黃

未鑽珍珠各壹兩

鉛貳兩熬

水銀壹兩

右研令極勻蜜丸桐子大每服三九至五九薑棗湯下須搗二三萬杵乃可丸

風癩口議云先用化痰寬利胸膈開通關竅安鎮心神然後與治風癩藥服之又云先用化風丹去其風

熱次服奪菟散定癩

散風丹 治小兒風癩先用此藥

牛膽南星貳錢羌活

獨活

防風

天麻

人參

川芎

荆芥穗

細辛各壹錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二丸用薄荷紫蘇湯不拘時送下

保安丸 治小兒諸風癩久後亦驗

五靈脂

半兩

川烏

生用去皮尖貳錢半

右爲末豬心血爲丸如梧桐子大每服一九用生

薑湯化下不拘時服

獨活湯

治小兒風癩解表通裏

獨活

麻黃

去節

川芎

各壹錢

大黃

甘草

炒各半錢

右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四分

不拘時溫服

細辛大黃湯

治小兒風癩內熱

天麻

防風

各半兩

細辛

大黃

焙

川芎

各貳錢半

甘草

炙壹錢半

右剉碎每服二錢入犀角少許用水一鍾煎至四

分不拘時服

牛黃丸

治小兒風癩迷悶抽掣涎潮

牛膽南星

全蝎

焙去毒

蟬殼

各貳錢半

防風

牛黃

白附子

注

直僵蠶

炒去絲嘴

天麻

各壹錢半

麝香

半錢

右爲末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細
次入藥末和丸如菉豆大每服三五丸用荆芥生

薑煎湯送下不拘時服

化風丹 涼風化痰退熱定搐

牛膽南星 貳錢 羌活

獨活

天麻 防風

甘草

荆芥穗 人參

川芎 各壹錢

右件為末煉蜜為丸如皂子大每服一丸薄荷湯

化開服 一方有全蝎壹枚一方有細辛無甘艸

溫化痰涎然後與治驚癇藥服之

比金丹

人參

白茯苓

遠志 去心

山藥

辰砂

天麻

石菖蒲

川芎

甘草 炙各壹分

天南星 炮貳錢生薑汁製

麝香 壹字

右為細末煉蜜為丸皂子大每服一粒煎金銀薄

荷湯化下 一方有琥珀 貳錢 青黛 壹錢 無山藥

錢氏蛇黃丸 治驚癇因震駭恐怖叫號恍惚是也

蛇黃 真者三箇火煨醋淬 鬱金 柒分一處為末 麝香 另入壹匙

右為末飯丸桐子大每服一二丸煎金銀磨刀水

化下

鎮驚丸 治小兒一切驚癇

鎮驚丸

刀斗二

百七

痲
幼科二

茯神 去木

鐵粉

遠志 去心薑製焙

紫石英 燒醋淬研

人參 去蘆

琥珀

滑石

蛇黃 煨醋淬

南星 炮各貳錢半

龍齒

熊膽 各半分

輕粉 參分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服

三五丸煎金銀湯磨化不拘時服

虎睛丸 治小兒驚癇邪氣入心

虎睛 細研

遠志 薑製焙去心

犀角 鎊

大黃 濕紙裹煨

石菖蒲

麥門冬 去心各貳錢半

蟻娘 參枚去足翅炒

右為細末粟米粉打糊為丸如梧桐子大每服五

七丸竹葉煎湯磨化或金銀煎湯亦可不拘時服

七寶鎮心丸 治小兒驚癇心熱

遠志 去心薑製焙

雄黃

鐵粉

琥珀 各貳錢

硃砂 壹錢

金銀箔 肆片

麝香 少許

右為細末煮棗取肉為丸如梧桐子大每服三五

丸煎去心麥門冬湯化下不拘時服

清神散 治小兒驚癇

犀角

白蘚皮

石菖蒲

痲食痛

刀下

草

癩

遠志去心薑製焙

半夏湯泡各貳錢半

茯神半兩

大黃焙

人參

甘草炙各壹錢半

右為末每服半錢煎去心麥門冬湯調不拘時服

食癩 妙聖丹 治小兒食癩通利

雄黃

蝎稍

硃砂

代赭石煨醋碎

輕粉

麝香各貳錢半

巴豆參箇去皮出油

杏仁去皮尖微炒貳錢

右為末蒸棗肉為丸如梧桐子大每服三五丸木

香煎湯磨化不拘時服

天麻丸 治小兒食癩有痰

南星炮錢貳

白附子炮

天麻

牙硝

川靈脂

全蝎焙各壹錢

輕粉半錢

巴豆霜去油貳錢半

右為末稀麩糊為丸如麻子大每服十九丸用薄荷

煎湯或薑湯送下亦可不拘時服

清鎮 蛇黃散 治小兒諸癩

蛇黃壹箇煨醋淬七次研細

鬱金

雄黃各貳錢

青礞石

硃砂各壹錢

鐵粉篩淨細研參分

右為末搗粳米飯為丸如梧桐子大每服三五丸

癩

癩

癩

人參煎湯磨化不拘時服

地龍散 治小兒諸癩發歇無時

乾地龍半兩 虎睛壹對

人參貳錢

金銀箔參拾 天竺黃

硃砂

代赭石煨醋 鐵粉各貳錢

雄黃壹錢

輕粉半錢

右為末每服半錢紫蘇湯調不拘時服

龍腦安神丸

茯苓參兩

人參

地骨皮

甘草

麥門冬

桑白皮各貳兩

馬牙硝貳錢

龍腦

麝香各參錢

牛黃半兩

硃砂貳錢

烏犀壹兩

金箔參拾伍片

右為細末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣如風癩

冬月溫水化下夏月涼水化下不以時二三歲者

日進二服小兒一丸分二服虛勞發熱咳嗽新汲

水下

奪菟散 定癩

白殭蠶去絲炒令黃色半兩

蛇含石燒紅用米醋淬

七八次 碾碎

白附子炮各貳分

生銀

生金

牛黃如無以膽製
倍加用之

烏梢蛇頭朱搗寸
許酒炙

白茯苓

天麻各貳
錢

天南星末壹分
生薑汁浸一宿焙

半夏末貳錢
薑汁浸一宿焙

赤脚蜈蚣壹條
酒浸

犀角

犀角鎊貳
錢

腦子少許

麝香少許

右件為末蒸棗肉為丸如麻子大每服十九至十

五九二十九煎金銀薄荷湯下硃砂為衣

本草古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡疾煮取

汁和諸藥煮服之彌古者尤佳

鎮心

雌黃丸

治小兒癩癇欲發眼暗瘕癧聲惡嚼

舌

雌黃

黃丹各壹
兩

麝香研壹
錢

右為末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前藥

末杵三五百下丸如菉豆大每服三丸溫熱水下

一日三服此方得自名醫之家極有神效

拔萃妙香丸 安神通關辟惡氣

辰砂研玖
兩

龍腦

膩粉

麝香研各柒
錢半

牛黃半兩

金箔玖拾
片研

右合研勻煉蜜去蠟淨入沙蜜白者柒錢半同煉

癩癩
幼科
勻為丸每兩作二十九丸米飲化下

鎮心丸

硃砂

龍齒

牛黃各壹錢

鐵粉

琥珀

人參

茯神

防風

全蝎米管炙

右為末燈心湯調下三歲一字

蜜陀僧散治心癩不語及諸驚失音用蜜陀僧為末
每服一匙米醋湯調下大人服一錢熱酒下

代赭石散

治陰陽癩

代赭石

煨醋淬研為末水飛過曬乾

右為末每服半錢以金銀煎湯和金箔銀箔調下

進二服脚脛上有赤斑乃邪氣發出可治無赤斑

則難治

神應丹

辰砂不以多少研

右以豬心血和之得所以蒸餅裏劑蒸熟取出就

丸如桐子大每服一丸後食臨卧煎人參湯下

牛黃清心丸

治小兒躁悶項背強直腰背反

張時發時醒

恍惚去末須目眩白月昏中煩胃疾涎壅心昏精神

牛黃壹兩貳錢研

麝香研

龍腦另研

昏憤又
心石不足
神志不
驚恐怕
怖

神應丹

神應丹

神應丹

悲憂
感歷煩
少時
思無時
或發狂
顛神情
昏亂

癩

幼科二

羶羊角

末錫各壹兩

當歸

去蘆頭

防風

去蘆 百又枝

黃芩

麥門冬

去心

白芍藥

去皮尖雙

白朮

各壹兩半

柴胡

去苗

杏仁

去皮尖雙 仁炒黃

研另

芎藭

各壹兩 貳錢半

阿膠

剉碎蛤粉炒

肉桂

去麩皮

大豆卷

碎炒各壹兩 柒錢半

神麩

炒各貳兩半

甘草

炒伍錢向

人參

去蘆

雄黃

研飛 另

白欬

乾薑

各柒錢半

金箔

壹千貳百片 另研 為衣餘入藥內

犀角

末貳兩

乾山藥

拾兩

大棗

壹百枚 蒸熟去皮 核爛研成膏入藥

右除棗杏仁及牛黃麝香雄黃龍腦四味另為細末入前藥和勻煉蜜與棗膏為丸每兩作十九用

金箔為衣每服一丸温白湯化下食後服小兒驚

癩即酌度多少以竹葉煎湯温温化服

比金丸

丹行前百

虎睛丸

二方俱見前頁

清神湯

治驚癩

犀角

錫

遠志

薑製製焙

白蘚皮

石菖蒲

人參

甘草

炒各壹錢半

右為末每服五七分麥門冬煎湯調下

酸棗仁丸

見驚悸

前九七

前養心

前十一

百五

養心定志丸 見驚悸前丸

養心湯 治心血虛怯驚癇或驚悸怔忡盜汗無寐

發熱煩躁

黃耆

白茯苓

茯神

半夏麴

當歸

川芎

辣桂

栝子仁

酸棗仁

五味子

人參 各叁錢

甘草 炒肆錢

右每服一二錢薑棗水煎

妙香散 治心氣不足驚癇或精神恍惚虛煩少寐

盜汗等證

辰砂 叁錢

麝香 壹錢

木香 煨貳錢

茯苓

山藥

茯神

遠志

黃耆 炒各壹兩

桔梗

甘草

人參 各伍錢

右各另為末每服一錢溫酒或白湯調服

治痰半夏丸 方見驚搖

星蘇散 治諸風口噤不語

天南星 略炮

右每服五七分薑四片紫蘇五葉水煎入雄豬膽

少許溫服

治癩方 治太陽陽明二經為病

荊芥穗 肆兩

白礬 為經末 貳兩

右棗肉為丸如桐子大每服二十九荊芥湯下
次三十九四十九又次五十九俱食前

礬丹

礬丹 各壹兩

右丹塼鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安礬
在上以炭五斤煨令炭盡取出細研以不經水豬
心血為丸如菉豆大每服十九至二十九橘皮湯
下

元戎二白丸

白礬 壹塊約 壹兩

右用生蒸餅劑裹蒸熟去皮可丸入輕粉壹字或
半錢量虛實加減丸桐子大每服二三十九生薑
湯下小兒丸小

硃砂滾涎散 治小兒五癩

硃砂 生用

赤石脂

硝石 各等分

右為細末研蒜膏為丸如菉豆大每服三十九食
後荊芥湯下

琥珀壽星丸

天南星 壹箇掘坑用火煨燒坑紅出炭淨入好酒壹升在火穴中放入南星蓋穴勿令

通氣過一宿取出焙末 琥珀 肆兩 硃砂 貳兩半

右以豬心血打乾糊丸如桐子大每服五十丸煎

人參湯送下

南星五生丸

南星 半夏 川烏

白附子 大豆 去皮各壹兩

右為細末滴水為丸每服二九至五九不過七九

薑湯下

斷癩丸 治小兒諸癩痰盛

皂角 盈尺者叁挺去皮搥碎水參升浸收汁濾過磁器內熬成膏

白礬 煨枯研細壹兩半 蝎稍 炒 直殭蠶 炒

雄黃 另研 硃砂 另研 白附子 各半兩

麝香 壹錢另研 烏蛇 酒浸取肉焙乾貳錢半

南星 濕紙裏炮熟壹兩 赤蜈蚣 壹條酒浸炙去頭足

右為末用水煮半夏糊和前項皂角膏為丸如梧

桐子大每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

定癩丸 治小兒五癩

赤脚蜈蚣 壹條去頭足酒浸炙 蝎稍 去毒

烏蛇肉

酒炙

白附子

生

大南星

末

圓白半夏

末用薑汁和一宿各貳錢半

熊膽

白礬

新瓦上煨枯各壹錢貳分半

右為末稀麩糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服二三丸用薄荷煎湯磨化不拘時服

治小兒驚癇

膽星

貳兩

全蝎

去毒炒半兩

白附子

僵蠶

炒

川芎

各壹兩

薄荷

半兩

右為末粥丸青黛為衣每服一二丸薑湯下

吐痰碧穹丹

石綠

研九度飛拾兩

附子尖

烏頭尖

蝎稍

各伍拾箇

右為末入石綠令勻麩糊丸如雞頭每服用薄荷汁半盞化下一丸更以酒半合溫服之須臾吐出痰涎然後隨證治之

下痰控涎丸

川烏

生

半夏

各半兩

僵蠶

生薑汁浸一宿半兩

全蝎

去尖柴箇

鐵粉

叁錢

甘遂

貳錢半

右為末生薑自然汁或薄糊丸如棗豆大朱砂為衣每服十五丸薑湯下忌甘草

治小兒癩用甘遂末壹錢豬心壹箇取三管頭血叁條和甘遂末將豬心批作兩片入藥在內以線縛定外濕紙包裹入文武火煨熟不可過度取藥細研入辰砂末壹錢和勻分作四丸每服一丸豬心湯化下再服另取豬心煎湯此方神效

下劑水晶丹方見癖積

合

四順飲

方見

五和湯二方並見熱

利驚丸

方見

紫霜丸方見變蒸熱

當歸大黃湯 治小兒諸癩作熱利下心中惡血

大黃濕紙裏

甘草炙

當歸

赤芍藥各叁錢

半夏製

川芎各貳錢

為末每服一錢或二錢水八分鍾煎四分無時服

表劑百解散

大青膏

並見驚搖

驅風膏馬青加辰砂全蝎

溫劑治陰癩宜之

固真湯

曰生湯並見驚搖

袂神湯

方見驚搖

元戎小靈寶丹

附子炮壹兩

天麻

全蝎

白僵蠶炒

藿香葉

南星炮

白附子炮各半兩

右爲末酒糊丸桐子大温酒下一十五丸

羅謙甫治魏敬甫之子四歲從長老摩頂授記衆僧念呪因而大恐遂發驚搐痰涎壅塞目多白睛項背強急喉中有聲一時許方醒後每見皂衣人輒發多服硃犀龍麝鎮墜之藥四十餘日前證猶在又添行步動作神思如癡予診其脉沉弦而急黃帝鍼經云心脉滿大癩瘕筋攣又云肝脉小急癩瘕筋攣蓋小兒血氣未定神氣尚弱因而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故癩瘕筋攣病久氣弱小兒易爲虛實多服鎮墜寒涼之劑復損其氣故添動作如癡內經云暴攣癩眩足不任身取天柱穴是也天柱穴乃足太陽之脉所發陽蹻附而行也又云靈癩瘕瘕不知所苦兩蹻主之男陽女陰潔古云晝發治陽蹻申脉夜發治陰蹻照海先各灸兩蹻各二七壯次處沉香天麻湯

沉香

益智

川烏

炮去皮臍各貳錢

天麻

防風

半夏

湯泡

附子

炮去皮臍各叁錢

羌活

伍錢

甘草

炙

當歸

薑屑

各壹錢半

獨活

肆錢

右咬咀每服五錢生薑三片水煎温服舉痛論云

恐則氣下精怯而上焦閉又云從下土者引而去之以蒸活獨活苦温味之薄者陰中之陽引氣上行又入太陽之經為引用故以為君天麻防風辛温以散之當歸甘草辛甘温以補氣血之不足又養胃氣故以為臣黑附子川烏頭益智仁大辛温行陽退陰又治寒客傷胃腎主五液入脾為涎以生薑半夏燥濕化痰十劑云重可去怯沉香辛温體重氣清去怯安神故以為使氣味相合升陽補胃恐怯之氣自得平矣

牛黃丸 治因驚中風五癰天釣客忤潮涎灌壅

白花蛇

酒浸取肉

白附子

全蠍

真川烏

壹枚半兩者生

天麻

薄荷葉

各半兩已上六

味先為細末次入

雄黃

伍兩

辰砂

叁錢

腦子

另研半兩

牛黃

叁錢

麝香

壹錢

右為一處和勻麻黃去根貳兩酒壹升煎麻黃至一盞去麻黃用酒熬藥得所勿至焦赤衆手疾丸如芡實大密器盛之一丸作五服煎金銀薄荷湯磨化大能發散驚邪

治五癰得効方

露蜂房

焙

石綠

各壹兩

桂心

遠志

去心

人參

各半

硃砂

壹錢

右為末，粥丸如桐子大，每服二三十九丸，白湯下。

斷癩丹

治癩瘡後復作，連綿不除，服之有驗。

黃耆

塗蜜炙

釣藤鈎

細辛

甘草

炙

蛇蛻皮

酒炙

蟬蛻

去土

牛黃

壹錢 另研

右為末，煮棗肉丸，麻子大，煎人參湯下，每服數丸，量兒加減。

紫河車丸

紫河車，即小兒胞衣，肥厚者壹箇，洗淨，重湯蒸爛。

研化，入人參、當歸末，和勻為丸，如芡實大，每服五

六丸，乳汁化下。

八味地黃丸

即六味地黃丸加附子、肉桂，各壹兩

治稟賦命門火衰，不

能生土，以致脾土虛寒，或飲食少思，或食而不化。

臍腹疼痛，夜多漩溺等證，經云益火之源，以消陰

翳，蓋謂此也。或乳母命門火衰，兒飲其乳，致前證

者，子母並宜服之。

加減八味丸，治稟賦腎陰不足，或吐瀉久病，津液虧

損，口乾作渴，或口舌生瘡，兩足發熱，或痰氣上湧。

或手足厥冷等證。

即地黃丸加肉桂壹兩，五味子肆兩。

地黃丸治小兒肝經虛熱血燥或風客淫氣而患癩
 癰結核或四肢發搐眼目抽動痰涎上湧又治腎
 疝腦熱肢體消瘦手足如冰寒熱往來滑泄肚脹
 口臭乾渴齒齲潰爛爪黑面黧遍身或兩耳生瘡
 或耳內出水或發熱自汗盜汗便血諸血失音等
 證其功不能盡述即六味地黃丸方見腎臟丸
 八珍湯治氣血俱虛陰火內熱或因尅伐之劑脾胃
 虧損肌肉消瘦等證即四君四物二湯方見虛勞
 十全大補湯治氣血虛弱或稟賦不足寒熱自汗食
 減體瘦發熱作渴頭痛眩暈最宜用之方見虛勞

灸法小兒癩癰驚風目眩灸神庭一穴七壯在鼻柱

直上入髮際五分小兒諸癰如噦吐清沫灸巨闕

穴三壯在鳩尾下一寸陷中是穴小兒雞癰善驚

及掣目搖頭灸少陰二壯取法在掌後去腕半寸陷

中是穴小兒驚癰者先驚叫乃發也灸頂上旋毛

中三壯及耳後青絡脉炷如小麥大小兒驚癰灸

鬼祿一穴三壯取法在上唇內中央絃上是穴小

兒食癰者先寒熱瀝浙乃發也灸鳩尾穴上五分三

壯小兒牛癰目視直腹脹乃發也灸鳩尾一穴三
 壯取法胸蔽骨下五分陷中是穴小兒馬癰張口

癰疽 又馬鳴也灸僕參穴各三壯取法在足跟

骨下白肉際陷中拱取之是穴 小兒羊癰目瞪吐

舌羊鳴也灸第九椎下節間三五壯 按靈樞經云

暴攣足不任身取天柱天柱穴足太陽也又云癩癰

瘕癢不知所苦兩躄之下男陽女陰潔古云晝發灸

陽躄夜發灸陰躄各二壯陽躄起於跟中循內踝上

行至咽喉交貫衝脉照海穴也

錢五癰重者死病後甚者亦死 小兒癰病

目直無聲目視不轉眼生白障眼慢唇黑瞳人瞬動

目間青黑面青指黑口出涎沫如白膿口禁肚脹不

乳喉如牽鋸之聲多睡不乳身熱下血不乳身體痿

軟不醒腹內虛鳴唇逆而痛吐利不止汗出壯熱不

止卧久不寢身體反張大人脊下容一手小兒脊下

容一指並不治 熱生風類中風證誤用之則為害不

淺故一切劑而不載薛氏云中風之證西北方有之

東南氣溫腠理疎泄人患之者皆為中風也况小兒

元氣未充皮毛不固易虛易實外邪乘之則壯熱抽

掣氣蘊涎涌甚至昏愒口噤即以中風候以續命散

湯投之多至不救大人且無真中况小兒乎凡有

此症者宜早治之勿引延誤是風邪所乘務保胸急者

宜早治之勿引延誤是風邪所乘務保胸急者

晉下白肉際中狀取之是穴 小兒羊癲目昏生
 行中焉也炎第九種下節問 五壯 按靈樞經云
 夏氣不足任身取天柱穴是太陽也又云顛癲
 及視不明所由皆腦髓下切陽女陰深云書發灸
 可也 此陽論也於脈中循內踝上
 容一許並不容 而脈脈在穴也

土相火不潔其聲又聾大人脊不容一手小兒脊不
 對不顯則肉盡謂昏聾而聾也此不出其類不
 得謂收率論之聲多聾不聾其類不血不聾其類不

中風

張漢等方有中風方論今見小兒絕無患者而用藥
 多犯香燥恐血熱生風類中風證誤用之則為害不
 淺故一切削而不載薛氏云中風之證西北方有之
 東南氣溫腠理疎泄人患之者皆類中風也况小兒
 元氣未充皮毛不固易虛易實外邪乘之則壯熱抽
 掣氣麤涎涌甚至昏憤口噤即似中風候以續命等
 湯投之多至不救大人且無真中况小兒乎凡有前
 證當辨其因若陽明經氣虛風邪所乘筋脉拘急者

為外因足厥陰肝火熾盛筋脉偏急者為內因脾肺
虛弱腠理不密外邪乘入或驚風過服金石之劑耗
損肝血或吐瀉後肉亡津液不能養肝致口眼喎斜
者皆肝血不足肝火生風之類中風之類證也

錢氏一說謂而不薄賴刃云中風之證西北方之
多於香熱惡血燥土風賊中風蓋謂用之誤為害不
乘與善之有中風之備今良小兒無患者而用藥

中風

角弓反張

錢肝有風甚則身反張強直不搐心不受熱當補腎
治肝補腎地黃丸治肝瀉毒丸丹溪云瘳比癇為
虛宜帶補多是氣虛有火兼痰用人參竹瀝治之不
用兼風藥此論實發前人所未發湯氏雖云瘳候十
無一生蓋未嘗有此法施於人也薛錢仲陽曰角
弓反張者由風邪客於太陽經也經曰風從上受足
太陽主周身之氣其脉起於目內眥而行於背肝屬
木主風所以風邪易侵也夫小兒肌膚未密外邪易

傷肝爲相火其怒易發若身反張強直發熱不搐者
風傷太陽也宜用人參羌活散小續命湯若因暴怒
而擊動其肝火者宜用瀉青丸若飲前劑其證益甚
者此邪氣已去而脾氣虧也宜用異功散加芎歸補
之若因肝經虛熱或因尅伐真氣虛熱生風者宜用
異功散地黃丸補之若因下而脾氣困憊腹肚膨脹
者此中氣損也宜用白朮散補之若氣血素弱或服
攻伐之劑而手尋衣領咬牙呵欠者肝經虛甚也急
用地黃丸以補之仍與肝藏參覽。一小兒忽腰背
反張目上視面青赤曰青屬肝主風赤屬心主火此
風火相搏用柴胡梔子散倍加鈞藤鈞頓安而痰如
舊又用抱龍丸而愈。一小兒忽腰背反張服治驚
之藥後不時舉發面色黃白肢體甚倦余用五味異
功散十餘劑而愈後因驚兼飲食不節不時舉發隨
用前藥卽愈遂日以參朮末每服五七分炮薑大棗
煎湯調下服至二兩而不發已上二證元氣虛而病
氣實也若用攻邪之藥皆誤矣。一小兒素患前證
痰盛面色素白而兼青余謂肺氣不能平肝肝氣乘
脾脾氣虛而生痰耳先用抱龍丸二服以平肝隨用
六君子湯以補脾肺月餘而痊半載之後復發謂非

逐痰不能全愈遂用下劑痰涎甚多而咽喉如鋸聲
余曰乃脾不能攝涎也咽間鳴乃肺氣虛甚也遂用
人參伍錢炮薑叁分水煎服而醒至第四劑後加棗
貳枚人參服數兩而愈後每發非獨參湯不應若執
常方鮮有不誤者

人參羌活散 方見驚搖

小續命湯 方見雜病中風

瀉青丸 方見肝藏

異功散 方見吐瀉

柴胡梔子散 方見積熱

抱龍丸 方見驚搖

六君子湯 方見吐瀉

灸角弓反張鼻上入髮際三分灸三壯 大椎下節

間灸三壯

湯氏曰身軟時醒者為癰身強直反張如弓不時醒者為瘳瘳候十無一生

血也服百餘方前後所服治搐頭者無非風藥止
面者或作刺或作揚風自藥無效予既視其病又知
其詳亦不明其標本返而思之乃肝血液盛外有風
熱乘之肝為木盛而肝土為木所剋脾與肺是子母
長為肝所勝而血遂流於大便故便血不止遂處一
方注會肝祛風而益初亦一時之見只數服而愈

余曰乃脾不能攝涎也咽間鳴乃肺氣虛甚也遂用
人參伍錢炮薑參分水煎服而醒至第四劑後加棗
貳枚人參服數兩而愈後每發非獨參湯不應若執
常方鮮有不誤者

人參老活散

小續命湯方見雜

獨活九

異功散方見

野苳為壘壘類十無一坐抱

醫方曰良神却野苳苳為臍良臍直又野咬巨不却

開灸三壯灸上入裏際三分灸三壯大椎下節

搖頭

湯肝風搖頭諸方不載鄭都丞子患七年搖頭三年
下血已服百餘方前後所服治搖頭者無非風藥止
血者或作痢或作腸風百藥無效予既視其病又知
其詳亦不明其標本退而思之乃肝血液盛外有風
熱乘之肝屬木盛而脾土為木所剋脾與肺是子母
俱為肝所勝而血遂漬於大便故便血不止遂處一
方但損肝祛風而益脾初亦一時之見只數服而愈
十餘日後血止而下白膿遂得以安

清肝益胃丸

犀角屑

甘草各壹分

瓜蒌根

黃耆蜜炙

羌活

白芍藥各半兩

蛇退皮炙赤

釣藤鈎

麻黃去節各壹錢

防風伍兩

右為末。棗肉丸。食後薄荷湯下。只二服作效。頭搖

即止。便血隨愈。次間服胃風湯數日。頓除沈舍入

子服之亦驗。

詳經曰。諸風掉眩皆屬肝木。木得風則搖動。乃肝經火盛而生虛風也。便血者風木搖動則土受凌虐而

不能統血也。或食酸味過多以益其脾。致令陰結。經

曰。結陰者便血一升。再結二升。三結三升。又邪在五

藏則陰脉不和。陰脉不和則血留之。結陰之病。陰氣

內結不得外行。滲入腸間。故便血也。血亦有乳母恚

怒。風熱熾盛。或肝木傷脾。使清氣不升。或風邪侵入

大腸者。治法。若因風熱用柴胡清肝散。若因怒火用

加味小柴胡湯。若清氣不升。脾氣下陷者。用補中益

氣湯。若風邪侵於大腸者。用清肝益胃丸。肝經血熱

妄行者。用六味地黃丸。脾土不能培肝木者。用六君

柴胡。釣藤鈎。肝木勝脾土者。用四君芍藥。釣藤鈎。結

陰者用平胃地榆湯。一小兒傷風咳嗽痰湧余謂脾虛肺弱腠理不密風邪外乘用六君子湯加桔梗桑皮杏仁而愈後飲食停滯作瀉腹脹仍用六君子加山查厚朴而安又停食作瀉服消導之藥更加咳嗽余謂當調補脾土不信自用發表尅滯前證益甚更加搖頭余以天麻散倍加釣藤鈎及異功散而愈。一小兒項間結核面色痿黃肌體消瘦咬牙抽搐頭搖目劄此肝木尅脾土也川六君子湯及九味蘆薈丸頓愈。一小兒病後遇驚即痰甚咬牙抽搐搖身作瀉俗服腦麝朱砂等藥以致慢驚而卒。

海食療云蛇蛻皮主去風邪明目治小兒一百二十

種驚癇寒熱痔蠱毒安胎熬用 治癇弄舌搖頭者

宜用全蛻 風者屬少陽厥陰肝膽二經證也藥者物

余猶憶少時聞友人孫彭山云嘗見姻家一小兒患驚搖延專科治之諸證悉退而搖頭不止後一老醫至於常服藥中加入紫河車即時愈按紫河車草名神農本經名蚤休唐本名金線重樓錢氏方名白甘遂主治驚癇搖頭弄舌乃本經正文古人謂遵白字療病多效不虛也 服金石之劑耗損肝血或吐瀉後

蘇頌多效不盡也
 滋生合黨歸附頭養古以本絲五文古入醋數白字
 幅豐本經各逐水專本各金絲重對益丸文各白甘
 至效常如藥中味人紫阿車噴却愈對紫阿車草各
 黨歸附專林各之精蠶悉出而歸取不吐絲一法醬
 余酢對心却聞文人糾道山云嘗具歐宋一小泉患
 宜甲全純
 蘇薰麻寒燥毒蟲毒安印燕甲 益離表古歸取者
 或食藥云拙製史主去風飛眼目益小泉一百二十

偏風口噤

薛小兒偏風者屬少陽厥陰肝膽二經證也噤者筋
 急由風木太甚而乘於脾以勝水濕則筋太燥然燥
 金主於收斂勁切故也又曰風之為病善行而數變
 或左或右其因一也治須審而藥之若足陽明胃經
 氣虛風邪所乘其筋脉偏急者屬外因若足厥陰肝
 經風熱乘脾筋脉偏急者屬內因若脾肺虛弱腠理
 不密外邪所乘或服金石之劑耗損肝血或吐瀉後
 內亡津液不能養肝致口眼歪斜或半身不遂諸證

皆屬肝血不足。肝火生風。宜滋腎水。養肝血。壯脾土。
 治法。脾胃虛而動風者。異功散。加柴胡。釣藤。鈎。脾肺
 虛而外邪所乘者。用釣藤。飲。肝火血燥者。用六味地
 黃丸。津液不足者。用白朮散。若兼目緊。上視。寒熱往
 來。小便淋漓。面色青。潔。兩脇脹痛之類。皆肝經之本
 病也。或唇口歪斜。腹痛。少食。目胞浮腫。面色青黃。肢
 體倦怠之類。皆肝木乘脾之證也。當審五藏相勝而
 主之。設執其見證。槩投風藥。反成壞證者。有矣。一
 小兒口眼喎斜。面色或青。或赤。此肝心風火乘脾也。
 朝用柴胡清肝散。夕用異功散。加釣藤。鈎。而愈。其時
 有患前證。服祛風導痰之藥者。皆不能起。一小兒
 痢後。患前證。發搐。面色痿黃。肢體倦怠。此元氣虛。尅
 伐多矣。余用補中益氣湯。加釣藤。鈎。子。服而漸愈。後
 因乳母七情飲食失宜。或兒乳食過多。前證仍作。服
 補中益氣湯。五味異功散。而愈。

錢全蝎散 治小兒驚風中風口眼喎斜言語不正
 手足偏廢不舉

全蝎去毒炒

僵蠶直者炒

川芎

黃芩去心

甘草

桂枝

赤芍藥

麻黃去節各壹兩

天麻陸錢

大南星

湯泡赤次去皮
臍切焙乾伍錢

右為麤末每服三錢水一鍾半薑七片煎七分温

服無時量大小與之一日三四服忌羊肉

胃風湯 治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注

下及腸胃濕毒下如豆汁或瘀血日夜無度

久參

白茯苓

芎藭

肉桂

當歸

白芍藥

白木

各等分

右為散每服二錢入粟米數粒同煎食前服

口喎失音

論見前中風條

硃砂丸 治小兒口眼喎斜筋脉牽引

硃砂

伍錢

全蝎

炒

天麻

白附子

炮

僵蠶

炒去絲嘴

乾薑

炮

牛黃

各伍分

麝香

壹分

右為末粳米糊丸如黍米大每服三十九用薄荷

湯不拘時化服

全蝎散 治小兒口眼喎斜語言不清

全蝎

炒

川芎

黃芩

殭蠶炒去絲嘴

赤芍藥

甘草

硃砂

南星

湯泡去皮臍焙

天麻

各錢

右為細末每服一錢用生薑湯不拘時調服

寬氣飲不洽小兒風痰壅滿風傷於氣不能言語

枳殼去穰壹兩

人參

去蘆伍錢

天麻

殭蠶炒去絲嘴

羌活

甘草

炙各叁錢

右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片煎五分不

拘時服

木通湯 治小兒血滯於心心竅不通語言不出

木通

石菖蒲

多用

防風

枳殼

全蝎

殭蠶

炒

甘草

木香

南星

炮各等分

右剉碎每服二錢用水一盞豬心三片生薑一片

紫蘇五葉煎至五分不拘時服

右為細末每服一錢用生薑湯不拘時調服

天麻

天麻

紫菀正葉煎至正合不味却服

古陸杯每服二錢用水一盞煎少三升半薑一分

水通甘草治小兒面木香心南星等

味娘

全融

獸體

天釣

內釣附

天釣亦驚風之證但天釣發時頭目仰視驚風則無

湯氏法

湯小兒瘈瘲不定翻眼擡睛狀若神祟頭目仰視名為天釣凡有此疾宜服蘇合香丸灸兩手大拇指兩

甲肉相半男先灸左女先灸右及兩足大姆指中間各三五壯又灸前後手心各五壯此皆得効之法

九龍控涎散 治天釣

赤脚蜈蚣

酒塗灸壹條

滴乳

天竺黃 二味另研 各壹錢

雄黃 另研

甘草 炙各 貳錢

荆芥穗 炒

白礬 枯各 壹錢

菉豆 半生半炒 壹百粒

右為末每服半錢人參薄荷湯調下

釣藤飲 治天釣潮熱

釣藤

人參

犀角屑 各半 兩

全蝎

天麻 各貳分

甘草 半

右為末每服一錢水煎服

張氏法

張小兒心膈壅滯邪熱痰涎蘊積不得宣通或乳母

飲酒食肉煩毒之氣流入乳中令兒宿滯不消邪熱

毒氣乘於心神致使驚悸眼目翻騰壯熱不休四肢

痙瘓其病名曰天釣甚者爪甲皆青狀如神祟今集

經効名方治之於後

一字散 醒風爽精神

天南星 半兩微 炮裂

蟬殼 微炒

乾蝎

白殭蠶 各壹分

右件搗羅為細末次入蕎麥麩壹分用醋石榴殼

壹枚將諸藥入在石榴殼內以鹽泥封裹於竈下

慢火上燒之泥乾燥為度取出再研勻每服壹字

溫酒調下

雙金散 治天釣驚風日久不下

蜈蚣壹箇去頭足尾用真酥塗慢火炙黃置砧

兩半箇左邊者入一貼子內寫左字右邊者亦入一貼子內寫右字不得交錯即大悞矣

麝香壹錢細研先將左邊者同於乳鉢內研作

右邊者入麝香同研極細却入右字貼內收不得相犯每有病者眼睛釣上止見白睛兼角

弓反張更不

能出聲者
右用細葦筒子取左字貼內藥少許吹在左邊鼻裏右亦如之用藥不可多若眼未全下更添些小以意量度其眼隨手使下即止

牛黃散 清心截風

牛黃半兩細研

硃砂細研水飛

麝香

天竺黃並細研

蝎稍

釣藤俱為末各壹分

右件一處研勻每服壹字新汲水調下

白銀丹 治驚風涎潮

天南星壹兩一半炮

白殭蠶半兩

全蝎各壹分

牛黃研

麝香研

粉霜各半分已上搗羅為細末

水銀半兩者煮青州棗肉貳拾箇同研水銀星盡成膏

右都和上件藥石臼內搗一二百下如黍米大每

服五粒至七粒薄荷湯下

抵聖丹

治驚風胸膈不利乳食不下

錫悞脂

壹兩細研水飛
淘去黑水令盡

牛黃

研

鉛霜

細研

熊膽

各壹分研

麝香

半分研

蟾酥

壹錢研

右件通研勻粳米飯和如黍米大每服五粒至七粒新汲水下

天鈞

天鈞者發時頭目仰視驚悸壯熱兩目反張淚出不流手足搐掣不時悲笑如鬼祟所附甚者爪甲皆青蓋因乳母厚味積毒在胃致兒心肺生熱痰鬱滯或外挾風邪為患法當解利其邪用釣藤飲上氣喘

麤者用烏蝎四君子湯內釣者腹痛多喘唇黑囊腫

傴僂反張眼尾赤此胎中受風及外驚所致若內藏

抽掣作痛狂叫或泄瀉縮脚內證一作外證亦然極

難調理內證服聚寶丹外證服釣藤飲進乳食者可

治若腹痛唇黑囊腫之類用聚寶丹若外驚內藏抽

搐之類用釣藤飲若因乳母醇酒厚味積毒在胃用

加味清胃散若因乳母鬱怒積熱在肝用加味逍遙

散加味歸脾湯俱加瀟蘆子母俱服凡母食膏粱厚

味飼兒之時先擠去宿乳然後吮之一小兒因乳

母受驚發搐時目赤壯熱腹痛哭而曲腰用四物加

天鈞

釣藤

四物

柴胡防風又用加味逍遙散加熟地黃以清肝熱生
肝血再用地黃丸滋腎水以生肝木母子俱安。一
小兒曲腰而啼面青唇黑此寒氣所乘內鈞腹痛也
用五味異功散加木香乾薑一劑與母服之頓愈後
因母感寒腹痛而啼用人參理中湯一劑與母服其
子亦安。一小兒曲腰乾啼手足並冷用六君加乾
薑木香服之未應又加肉桂母子俱服而愈。一小
兒忽乾啼作瀉睡中搐手足冷此脾土虛寒肝木侮
之而作發搐乃內鈞也川芎黃散一劑而安用四君
加柴胡升麻乳食漸進而安。一小兒乾啼面青或

赤手足並熱或用清熱之劑久不愈診其乳母有肝
火氣滯用加味逍遙散及越鞠丸以治其母時灌子
數滴不旬日子母並愈。一小兒患前證服魏香散
而愈後復作服祛風鎮驚之藥上氣喘巖此元氣虛
寒也余先用烏蝎四君子湯稍愈但倦怠殊甚用補
中益氣湯及五味異功散而痊。一小兒因母每感
寒腹痛飲燒酒發熱痰盛面赤手足並熱屬胃經實
熱之天鈞也用清胃散子母服之並愈後因傷乳吐
瀉面色或青或白手足並冷屬脾氣虛寒用六君木
香乾薑而愈三歲後傷食腹痛唇黑作瀉數去後而

無糞或糞少而青此氣虛寒下陷用補中益氣湯漸愈。一小兒啼哭陰囊腫大眼目上翻赤脉流淚此肝熱內釣用柴胡清肝散加釣藤鈎治之諸證漸愈又用釣藤飲而痊後復發或用祛病根之藥致乳食日少肚中脹痛手足浮腫余先用六君升麻柴胡數劑諸證稍愈又傷乳食吐瀉用平胃散一服即愈。一小兒因乳母懷抱鬱結腹痛發搐久而不愈用加味歸脾湯加漏蘆母子並服漸愈又母大怒發厥而甦兒遂食乳腹痛作瀉面青作嘔先用小柴胡湯三劑母子並服少愈其母又嘔酸腹脹用越鞠丸加味

歸脾湯佐以加味道遙散而痊

釣藤膏

方百三

魏香散

二方並見腹痛方百三

釣藤飲

治小兒臟寒夜啼陰極發躁此方主之

釣藤

茯神

茯苓

川芎

當歸

木香

甘草

芍藥 各壹錢

右為末每服一錢薑棗水煎若心經熱臉紅舌白小便赤澀用釣藤飲去木香加硃砂末壹錢木通

湯下

釣藤飲

治天釣風搐

鈎藤

犀角

天麻

各米分

金蝎

伍箇

木香

甘草

各伍分

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

鈎藤飲子

治驚風天鈎卒然驚悸眼目翻騰

鈎藤

炒伍分

麻黃

去節

甘草

炙各叁分

天麻

川芎

防風

人參

各柒分

全蝎

炒去毒伍箇

僵蠶

炒柒箇

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

乳香丸

治驚風內鈎腹痛驚啼

乳香

半錢

沒藥

沉香

各壹錢

蝎稍

拾肆箇

雞心檳榔

壹錢半

右爲末蜜丸桐子大每服二三錢菖蒲鈎藤鈎煎

湯下

木香丸 治全前

木香

全蝎

各伍分

沒藥

藁香

鈎藤鈎

各壹錢

右各別爲末以大蒜研爛和丸桐子大曬乾每服

二丸鈎藤煎湯下

牛黃丸 治小兒一切驚風五癇天鈎客忤痰涎四

肢抽掣

天金
白花蛇

酒浸取肉

白附子

全蝎

川烏

壹隻重半兩 生用去皮臍

天麻

薄荷葉

各半兩已上先為細末次入

雄黃

辰砂

叁錢

牛黃

壹錢

麝香

片腦

各半錢 另研

右件為細末一處和勻麻黃去節貳兩酒壹升煎麻黃至一盞去麻黃用酒入蜜少許熬成膏劑前藥末為丸如芡實大用金箔為衣每服一九用薄荷湯化下大能發散風邪

塗頂膏

治天釣風備急

烏頭

生用去皮臍

芸薹子

各貳錢

右為末每用壹錢新汲水調敷兒頂上

天漿子散

治小兒天釣驚風

天漿子

炙

蝎稍

犀角屑

丹砂

另研

雄黃

另研

附子

去皮臍

南星

炮去皮

白附子

半夏

水銀

另研

乳香

另研

白殭蠶

膩粉

另研

牛黃

另研各壹錢

麝香

壹字另研

銀箔

伍片另研

右為細末和勻每服壹字用薄荷湯調下量兒大

小加減服

青黛丸 治小兒天釣客忤五疳八痢十二種驚癇

青黛

燒赤去泥

天竺黃

乾蝦蟇 壹箇黃泥包裹

乾蝸牛殼

黃連

人參

地龍 去土

釣藤 炒

龍膽草 各貳錢半

蘆薈

熊膽 各半兩

牛黃

麝香

雄黃

丹砂 各壹錢

夜明沙 去土淨

胡黃連 各叁錢

右為細末蒸餅糊為丸如麻子大一歲三九空心

米飲湯送下

再生散 治小兒天釣驚風潮搐項筋緊強手足厥

冷

烏蛇 酒浸取肉

天麻

南星 炮去皮

全蝎 炒去毒各貳錢半

麝香

膩粉 各伍分

丹砂 貳錢另研

牛黃 另研

白附子 炮叁壹錢

右為細末和勻每服半錢煎金銀薄荷湯調下量

兒大小加減服

三白散 治小兒盤腸氣釣先服此藥後服釣藤膏

白牽牛 壹兩炒

白朮

桑白皮

陳皮

木通 各叁錢

天金

外科

百

右為細末每服半錢用生薑湯調不拘時服
廣利方治癩迷嚼舌仰視牛黃大豆許和蜜水調

元錄奉泰五卷九二日午前採朱了

文化乙丑



其書清異問不量

批心民兩

半黃民兩

白州壹錢

全融類錢半

藟香

湘餅各五

烏地取肉

天麻

南星取去

令

再主婿 命小良天陰薰風賦辭其嶺翠鏡手以瀾

