

萬有文庫
第一集一千種
王雲五主編

本草綱目

(四十)
張紹棠重訂

商務印書館發行

本草綱目

(四十)

張紹棠重訂

國學基本叢書

本草綱目

卷十七上

草之六

大黃本經

商陸本經

狼毒本經

防葵本經

狼牙本經

蕷茹本經

大戟本經

澤漆本

甘遂本經

續隨子開寶

狼毒本經

防葵本經

狼牙本經

蕷茹本經

大戟本經

澤漆本

經杜莖山

土紅山附

蘆本經

馬腸根附

雲實本經

蕷茹唐本

大戟落過附

澤漆博

經山慈石

參馬腸根附

木藜蘆拾遺

附子本經

雲實本經

蕷茹本經

大戟後卷下

澤漆以

絳漏籃子

烏頭本經

鬼臼射罔附

白附子別錄

虎掌天南星

蕷尾本經

蕷茹本經

大戟由跋

薩草附

半夏本經

蚤休本經

射干本經

蕷尾本經

蕷茹本經

大戟玉簪

蕷茹綱目

綱目坐擎草

不蘆附押

蔓陀羅花綱目

羊蹄躅本經

蕷尾山榔躅

蕷茹不喫草附

蕷茹本經

大戟蕷尾

綱目莽草

本經茵蕡

本經曼陀羅花

本經羊蹄躅

本經蕷尾

本經蕷尾

本經蕷尾

本經蕷尾

格注草唐本

海芋綱目

山根透

鉤吻本經

蕷茹本經

蕷茹本經

蕷茹本經

蕷茹本經

左附方舊一百三十四新四百九十五
草之六 毒草類四十七種

大黃本品

下品

【釋名】黃良。本經將軍之當火參。吳膚如。吳普曰。宏景曰。大黃其色也。將軍之號。當取其駿快也。

【集解】別錄曰。大黃生河西山谷及隴西。二月八月采根火乾。一普曰。生蜀郡北郡或隴西。月卷生黃赤。其葉四四相當莖高三尺許。三月花黃五月實黑。月采八根根有黃汁切片陰乾。

【正誤】宏景曰。今采益州北部汶山及西山者。雖非河西隴西好者。猶作紫地錦色味甚苦澀。色至澀。乾長二尺。其性溼潤而易蛀壞。火乾乃佳。作時燒石使熱橫寸截著石上燶之。一日微燥以繩穿眼乾出。宕州涼州西羌蜀地者皆佳。幽井以北者。當用當分別之。若取和厚深沈能攻病者漸細氣力不及易中者。陶言蜀地不及隴西誤矣。藏器今鑿曰黑。二月八月開黃花。亦有青紅花似麻者。蜀人以莊大麥者。謂之牛舌。亦有青紫色形如竹。二月采根去黑皮。開花切作橫片。火乾。時蜀人謂之熟器。今鑿曰黑。二月八月開黃花。亦有青紅花似麻者。蜀人以莊大麥者。謂之牛舌。亦有青紫色形如竹。二月采根去黑皮。開花切作橫片。火乾。時蜀人謂之熟器。今鑿曰黑。

【正誤】宋祁益州方物圖言蜀大山中多有之。赤莖葉根如芋。大郡者如鑿長一二尺。其細根如牛蒡。小者亦如芋。之羊蹄大黃治瘡甚效。初生苗葉累年長大。即葉似商陸而狹尖。四月抽條出穗。五七莖相合。花葉同色。結實如蕎麥而輕小。五月熟。卽黃色呼爲金蕎麥。三月采苗。五月采黃。故謂之羊蹄也。大黃。一時珍曰。蘇說卽老羊蹄也。因其似羊蹄也。俱見本條。

【脩治】雷曰。凡使細切。以文如水旋斑緊重者。剗片蒸之。從已至未。曬乾。又洒臘水蒸之。從未至亥。如此。凡七次曬乾。卻洒淡蜜水。再蒸一伏時。其大黃必如烏膏樣。乃曬乾用。一藏器曰。大黃采時。皆以火石燄乾。貨賣更無生者。用之不得。一承曰。大黃采時。

【氣味】苦寒無毒。『別錄曰』大寒。『普曰』神農雷公苦有毒屬鵝苦無毒。李當之大寒。『元素曰』酒洗入陽明經。餘經不用酒。『杲曰』一大黃苦峻下走用之于下必生用。若邪氣在上非酒不至必用目赤或喉瘡或頭腫或腸上熱疾生也。『時珍曰』凡病在氣分及胃寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元氣耗陰血故也。『之才曰』黃芩爲之使無所畏。『權曰』忌冷水惡乾漆。

【主治】下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟。本平胃下氣除痰實腸閒結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結別經通女子經候利水腫利大小腸貼熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱飢餓。『權曰』通宣一切氣調血脈利關節泄壅滯水氣溫瘡熱瘡。大瀉諸實熱不通除下焦溼熱消宿食瀉心下痞滿。『元下痢赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譜語黃疸諸火瘡。時珍。

【發明】『之才曰』得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓。療驚恚心下悸氣得消石紫石英桃仁。療女子血不用補心湯更用瀉心何也。答曰若心氣獨不足則當不吐衄也。此乃邪熱因不足而客之故令吐衄。以苦泄其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用之無不效惟在量其虛實而已。『靈亨曰』大大黃苦寒善瀉仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經之陽亢甚無輔以致陰血妄行飛越故大黃瀉去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而放用作故黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣。寇氏曰足厥陰五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉脾之溼熱非瀉心也病發于陰而反下之則作痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上腕在子腕脾之上。

則心知濁氣故曰瀉心實瀉脾也。素問云太陰所至爲痞滿又云濁氣在上則生腹脹是矣。病發於陽而反下之。必本草分高年不可輕用。帝弗從。無療理。帝從之遂愈。以此言之。今醫用一毒藥而攻衆病。其偶中便謂此脈洪神而大黃無濟。梁元帝常有心腹疾。諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通。僧坦曰。大黃乃是快藥。至尊病一不

藥奇失可戒哉。

附方舊十四新
三十七 吐血衄血治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之。大黃二兩黃連一錢半黃芩三升生地黃汁一升熱服取利。張仲景金匱玉函吐血刺痛黃芩散。

兩爲散每服一錢以生地黃汁煎三五沸無時服。簡要濟衆方傷寒痞滿病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此爲痞滿。仲景傷寒論大黃連瀉心湯主之。大黃二兩黃連一兩以麻黃五兩剝炒微赤爲散用臘雪水五分煎一升入腰脚風氣作痛大黃二兩切如碁子和少酥炒乾勿令焦搗傷寒類要。

一切壅滯經驗方治風熱積壅化痰涎治痞閼消食化氣導血用大黃丸。大黃每服十丸煎三片入薑三片研末。大黃研末入砂罐固濟研末水吞咽。惟大黃水白黃酒瀉湯四餘粒作後帶下右酒瀉湯四餘粒作後帶下右。

則胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃分之邪而降下之。必隨草人稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之。張仲景治傷寒用處尤多。古人用毒藥攻病至尊病一不

此有宿妨非用帝弗從。無療理。帝從之遂愈。以此言之。今醫用一毒藥而攻衆病。其偶中便謂此脈洪神而大黃無濟。梁元帝常有心腹疾。諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通。僧坦曰。大黃乃是快藥。至尊病一不

藥奇失可戒哉。

附方舊十四新
三十七 吐血衄血治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之。大黃二兩黃連一錢半黃芩三升生地黃汁一升熱服取利。張仲景金匱玉函吐血刺痛黃芩散。

兩爲散每服一錢以生地黃汁煎三五沸無時服。簡要濟衆方傷寒痞滿病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此爲痞滿。仲景傷寒論大黃連瀉心湯主之。大黃二兩黃連一兩以麻黃五兩剝炒微赤爲散用臘雪水五分煎一升入腰脚風氣作痛大黃二兩切如碁子和少酥炒乾勿令焦搗傷寒類要。

一切壅滯經驗方治風熱積壅化痰涎治痞閼消食化氣導血用大黃丸。大黃每服十丸煎三片入薑三片研末。大黃研末入砂罐固濟研末水吞咽。惟大黃水白黃酒瀉湯四餘粒作後帶下右酒瀉湯四餘粒作後帶下右。

則胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃分之邪而降下之。必隨草人稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之。張仲景治傷寒用處尤多。古人用毒藥攻病至尊病一不

此有宿妨非用帝弗從。無療理。帝從之遂愈。以此言之。今醫用一毒藥而攻衆病。其偶中便謂此脈洪神而大黃無濟。梁元帝常有心腹疾。諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通。僧坦曰。大黃乃是快藥。至尊病一不

藥奇失可戒哉。

附方舊十四新
三十七 吐血衄血治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之。大黃二兩黃連一錢半黃芩三升生地黃汁一升熱服取利。張仲景金匱玉函吐血刺痛黃芩散。

兩爲散每服一錢以生地黃汁煎三五沸無時服。簡要濟衆方傷寒痞滿病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此爲痞滿。仲景傷寒論大黃連瀉心湯主之。大黃二兩黃連一兩以麻黃五兩剝炒微赤爲散用臘雪水五分煎一升入腰脚風氣作痛大黃二兩切如碁子和少酥炒乾勿令焦搗傷寒類要。

一切壅滯經驗方治風熱積壅化痰涎治痞閼消食化氣導血用大黃丸。大黃每服十丸煎三片入薑三片研末。大黃研末入砂罐固濟研末水吞咽。惟大黃水白黃酒瀉湯四餘粒作後帶下右酒瀉湯四餘粒作後帶下右。

則胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃分之邪而降下之。必隨草人稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之。張仲景治傷寒用處尤多。古人用毒藥攻病至尊病一不

此有宿妨非用帝弗從。無療理。帝從之遂愈。以此言之。今醫用一毒藥而攻衆病。其偶中便謂此脈洪神而大黃無濟。梁元帝常有心腹疾。諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通。僧坦曰。大黃乃是快藥。至尊病一不

藥奇失可戒哉。

同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一盞浸一日切曬一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸醫林集要。心腹諸疾三物備急丸治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一兩搗篩蜜和搗者折齒灌之入喉卽癒此乃仲景方空裝秀改爲散用不及丸也。圓經本草腹中痞塊爲散醋三兩升蜜兩匙和煎丸梧子大每服三十丸腹中鳴轉當吐下便愈若口已噤停尸卒半升生薑湯下吐利爲度外臺祕要腹脇積塊熱入桂心末半兩略炒下米醋攪成膏攤布貼之○千金方大黃二兩朴消一兩爲末以大蒜同搗膏丹溪心法久患積聚二便不利上擔心腹脹滿害食大黃白芍各爲度脾癖疳積疋三日再研用舶上硫黃一兩形如琥珀者宮粉一兩同研勻十歲以下小兒半錢不愈半月之後再服若不忌口不如勿服聖濟總錄一小兒無辜乍瘥諸狀多者大黃煎主之此藥惟或下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳母亦禁之加木香一兩半崔知悌方小兒諸熱大黃煨兩爲末煉蜜丸麻子大每服五丸至十九錢氏小兒方骨蒸積熱合去津空腹分爲二服如人行五里再服廣濟方赤白濁淋好大黃爲末每服六分以雞子一個破頂入藥相火祕結大黃末一兩牽牛頭末牛兩升蜜湯服諸痢初起大黃煨熟當歸各二兩煎服取利或加檳榔集簡方熱痢裏急煎服取利集簡方忽喘冷利四一熱下湯大病下良久當下利可安危氏得效方食已卽吐胸中有火也大黃子一一

千金 乾血氣痛錦紋大黃酒浸曬乾四兩爲末好醋一升熬成膏丸茨子大臥時酒化一婦人嫁痛小
腫痛也大黃一兩酒一升男子偏墜作痛大黃末和醋塗不可當者酒炒大黃爲末茶清服
資一沸頓服千金方 男子偏墜之乾則易梅師方濕熱眩運二錢急則治其標也丹溪纂要
小兒腦熱常欲閉目大黃一分水三合浸一夜一歲兒服四物湯加大黃酒煎胃火牙痛含
冰水一口以紙燃薰大黃末隨風熱牙痛紫金散治風熱積壅初牙痛去口氣大有奇效好大黃瓶
左右啞鼻立止僵門專親風熱牙痛內燒存性爲末早晚揩牙漱去都下一家專貨此藥兩宮常
以數千賣之其門如風蟲牙痛眼常出血漸至崩落口臭極效大黃米泔浸軟生地黃各旋切一口瘡
市也千金家藏方風蟲牙痛片合定貼上一夜即愈未愈再貼忌說話恐引入風○本草方
糜爛大黃枯攀等分爲末鼻中生瘡連各一錢麝香少許爲末生油調搽聖惠方大黃黃仙茅毒發舌脹出
仙茅傷損瘀血三因方雞鳴散治從高墜下木石壓傷及一切傷損瘀滯積痛不忍並以此藥推陳
下新大黃酒煮一兩杏仁去皮三七粒細研酒一盞煎六分雞鳴時服至晚取下瘀血推陳
卽愈○和濟方治跌壓瘀血在內脹滿大黃當打撲傷痕夜黑者紫二夜紫者白也瀕湖集簡方
歸等分炒研每服四錢溫酒服取下惡物愈
杖瘡腫痛亦可調醫方摘玄金瘡煩痛先食水下十九日三服千金方凍瘡破爛調塗之
衛生湯火傷灼莊浪大黃生研蜜調塗之不惟止痛又且減
寶鑑瘡腫焮熱數易卽退甚驗神方也洪邁夷堅志灸瘡飛蝶因艾灸訖火痴便退瘡內鮮肉
火毒也大黃朴消各半兩爲末
水服取利卽愈張果醫說蠻蠻咬瘡之醫說火丹赤腫頻刷之急救方腫毒初起大黃五倍子黃蘿等
分爲末新汲水調塗此乃金山寺神人所傳方洪邁夷堅志灸瘡飛蝶片飛如蝶形而去痛不可忍是
膏收之以絹攤貼瘡上仰臥仍先以溫酒大風癰瘡大黃根一兩阜英刺一兩爲末每服方寸匕
日四五次簡便方瘡腫焮熱作痛大黃末醋調塗之燥卽易不過金黃散用川大黃粉成草
膏收之以絹攤貼瘡上仰臥乃服雄黃花蛇乃服良方
十便良方蛇經驗方大風癰瘡溫酒下取出黑毒物如魚膩狀未下再服卽取空心

葉【氣味】酸寒無毒。【主治】置薦下辟蟲蟲相感。

商陸本經

【釋名】遠蕩湯音逐當陸。開寶章柳圖經白昌開馬尾黃夜呼。本經訛爲商陸又訛爲當陸北音訛爲章柳或云枝

枝相值葉葉相當故曰當陸或云多當陸路而生也。

【集解】別錄曰一商陸生咸陽山谷如人形者有神。一恭曰一此有赤白二種白者入藥用赤者見采根日乾。一頌曰俗名章柳根多生於人家園圃中春生苗高三四尺青葉如牛舌而長莖青赤至柔肥夏秋開紅紫花作朵根如蘿菔而長八九月采之爾雅謂之遂蕩廣雅謂之馬尾易經謂之莧陸

一數曰一種赤萬苗葉絕相類不可服之有傷筋骨消腎之毒惟花白年多者仙人采之作脯可下酒也。一時珍曰商陸昔人亦種之爲蔬取白根及紫色者擘破作畦栽之亦可種子根苗莖並可洗蒸食或用灰煮汁過亦良服丹砂乳石人食之尤利其赤與黃色者有毒不可食。按周憲王教荒本草云章柳幹粗似雞冠花幹微有線楞色微紫赤極易生植。

根脩治一數曰一取花白者根銅刀刮去皮薄切以東流水浸兩宿瀉出架瓶蒸

葉一重商陸一重如此蒸之從午至亥取出豆葉暴乾剉用無豆葉以豆代之。

【氣味】辛平有毒。一別錄曰一酸一權曰一甘有大毒忌犬肉。一大明曰一白者苦冷得大蒜良赤者但可貼腫服之傷人癰血不已殺人。

令人見鬼神。

一張仲景曰一商陸以水服殺人。一果曰一商陸有鬼神之陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神。

【主治】水腫疝瘕瘻瘍除癰腫殺鬼精物。本經療胸中邪氣水腫痿瘻腹滿洪直疏五臟散水氣。別錄瀉十

種水病喉痺不通薄切醋炒塗喉外良。權通大小腸瀉蟲毒墮胎燭腫毒。傅惡瘡。大

【發明】一宏景曰一方家不甚用惟療水腫切生根雜鯉魚煮作湯服。道家乃散用之及煎臘服皆能去尸蟲見鬼神其實子亦入神藥花名葵花尤良。一頌曰古方術家多用之亦可單服五月

五日采根竹簷盛掛屋東北角陰乾百日搗篩井華水調服云神仙所祕法也。時珍曰：商陸苦寒沉也，降也，陰也。其性下行，專於行水，與大戟、甘遂、芫花異性而同功。胃氣虛弱者不可用。方家治腫滿小便不利者，以赤根搗爛入麝香三分，貼于臍心，以帛束之，得小便利卽腫消。又治溼水，以指畫肉上隨陰養汁服亦可。其莖葉作蔬食亦治腫疾。一嘉謨曰：「古讖云其味酸辛，其形類人，療水貼腫，其效如神。」斯言盡之矣。

附方 **舊九** 新六溼氣腳軟飯草柳根切小豆大煮熟更以綠豆同煮爲度。最效。

二升煮一升，更以糯米一大盞同煮成粥。每日空心服之，取微利不得雜食。○千金方用白商陸六兩取汁半合，和酒半升，看人與服。當利下水，取效。○梅師方用白商陸一升，羊肉六兩水一斗煮，取六升去滓，和葱豉，作糲食之。腹中暴癥，有物如石，痛刺啼呼，不治百日死。多取商陸根搗汁或蒸之，上安藥勿覆，冷即易晝夜勿息。孫真人千金方：痃癖如石，堅硬生商陸根汁一升，杏仁一兩浸去皮，搗如泥，以商陸煎如鴟每服棗許。空腹熱酒服以利下惡物爲度。聖惠方：杏泥火產後腹大，堅滿喘不能臥。白聖散用章炒一兩爲末，每服二三錢，熱湯調下。大便宣利爲度。此乃主水聖藥也。潔古保命集：小兒痘毒出不得出也。以商陸根和葱白搗傅，急作腹痛及膨脹，擣傅臍上，斑止。痘出方免無虞。摘玄方：後方：小兒痘毒出不得出也。以商陸根和葱白搗傅，急作腹痛及膨脹，擣傅臍上，斑止。痘出方免無虞。摘玄方：後方：小兒痘毒出不得出也。以商陸根和葱白搗傅，急作腹痛及膨脹，擣傅臍上，斑止。痘出方免無虞。摘玄方：後方：小兒痘毒出不得出也。以商陸根和葱白搗傅，急作腹痛及膨脹，擣傅臍上，斑止。痘出方免無虞。摘玄方：後方：小兒痘毒出不得出也。以商陸根和葱白搗傅，急作腹痛及膨脹，擣傅臍上，斑止。痘出方免無虞。摘玄方：後方：小兒痘毒出不得出也。以商陸根和葱白搗傅，急作腹痛及膨脹，擣傅臍上，斑止。痘出方免無虞。摘玄方：後方：小兒痘毒出不得出也。以商陸根和葱白搗傅，急作腹痛及膨脹，擣傅臍上，斑止。痘出方免無虞。摘玄方：

日再易，聖濟錄：喉卒攻痛，冷卽易立愈。圖經本草：瘰疬喉痹，攻痛，生商陸根搗作餅置瘡上，以艾灸之。布裹熨之。冷卽易之。千金方：石癰如石，堅硬不作膿者，生商陸根搗擦之，燥卽易。根搗灰，布裹熨之。冷卽易之。

葛花【主治】人心昏塞，多忘喜臥。取花陰乾百日搗末，日暮水服方寸匕，乃臥思念所欲事，卽於眠中醒悟也。蘇頌

【釋名】一時珍曰「其名知其毒矣。」觀

【集解】別錄曰「狼毒生秦亭山谷及奉高二月八月采根陰乾陳而沉水者良。」宏景曰「宕昌英同根但置水中沉者是狼毒浮者是防葵俗用亦稀。」爲療腹內要藥耳。恭曰「今出秦州成州秦亭原在二州之界秦隴地寒元無蝮蛇此物與防葵都不同類生處又別。」太山漢中亦不聞有陶說謬。西秦高是太山下縣陶云沉者是狼毒浮者是防葵此不足爲信假使防葵秋冬采者堅實得水皆沉。猶春夏采者輕虛得水皆浮且二物全別不可比類此與麻黃橘皮白以實重者爲良輕者爲力劣也。」頌曰「今陝西州郡及達州亦有之狀如馬志所說。」時吳茱萸爲六陳也。

根【氣味】辛平有大毒之使宜醋炒惡麥句薑畏占斯密陀僧也。

【主治】欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠癰疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸。本除胸下積癧別治

痰飲癥瘕亦殺鼠。大明合野葛納耳中治聾子抱朴子。

【附方】舊四心腹連痛作脹用狼毒二兩附子半兩搗篩蜜丸梧子大一日服一丸二日九種心痛。一
二蛀三風四悸五食六飲七冷八熱九氣也。久治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證。九
痛丸用狼毒炙香吳茱萸湯泡巴豆去心炒取霜乾臺炮入參各一兩附子泡去皮三兩爲末煉蜜丸
梧子大每空腹溫酒下。一丸和劑局方腹中冷痛一兩旋覆花三兩搗末蜜丸梧子大每服三丸食前白湯下日三服。○
下丸後急痛欲死。丸縮入腹急痛欲死狼毒四兩防風二兩附子三兩搗末同腹中一切蟲病。

方後陰疝欲死。丸縮入腹急痛欲死狼毒四兩防風二兩附子三兩搗末同腹中一切蟲病。

用狼毒杵末每服一錢用錫一阜子大沙糖少許以乾溼蟲疥。狼毒不拘多少搗爛以豬油馬油調搽水化開臥時空腹服之次早卽下蟲也。○集效方。維揚潘氏所傳方。積年疥癩。狼毒一兩一半生研一牛炒研輕粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液擦化爲末同以清油浸藥高一寸三日待藥沉油清遇夜不見藥燈火蘸油塗瘡上仍以口鼻於上吸氣取效。永類方。積年乾癩。生痴搔之黃水出每逢陰雨卽用狼毒末塗之。聖惠力卽惡疾風瘡末每服方寸七分爲溫。

酒下千金一方

防葵本品

【釋名】房苑錄梨蓋本利茹葉似葵又名爵離方蓋農果。恭曰「防葵莖

【集解】別錄曰「防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日采根暴乾。」普曰「莖葉如葵上稀有囊陽莖似葵每莖三葉一本十數莖中發一榦其端開花如葱花景天輩而色白六月開花卽結實根似防風香味亦如之。依時采者乃沉水今乃用枯朽狼毒當之。頌曰「今惟出襄陽地他郡極爲謬矣。」唐時隴西成州貢之蘇頌所說詳明可據。

正誤。陳久者亦不能沉矣。」駁曰「凡使防葵勿誤用狼毒。緣真相似而驗之有異效又不能切須審之恐誤人疾。其防葵在葵州沙土中生采得二十日便生艸用之惟輕爲妙。」恭曰「狼毒與別物不同形質又別陶氏以浮沉爲別後人因而用之都將以防葵破堅積爲下品之物與狼毒不同類生處亦別藏器曰二物中一生是上品善惡不同形質又別陶氏以浮沉爲別後人因而用之都同功。今古因循遂無甄別殊爲謬誤。」

根【脩治】別錄曰「凡使須揀去艸自然汁一升并末用甘草湯浸一宿流出暴乾用黃精自然汁去艸自然汁一升并末用甘苦。」普曰「神農辛苦無毒。」桐君曰「有小毒。」岐伯雷公黃帝辛苦無毒。」

【氣味】辛寒無毒。別錄曰「辛寒無毒。」

【主治】疝瘕腸洩。膀胱熱結。溺不下。欬逆溼瘡。癲癇驚邪狂走。久服堅骨髓。益氣輕身。本經療五臟虛氣。

小腹支滿。臚脹口乾。除腎邪強志中火者不可服。令人恍惚見鬼。別錄久服主邪氣驚狂。蘇恭主痃癖氣塊。

膀胱宿水。血氣瘤大如盃者悉能消散。治鬼瘡百邪鬼魅精怪通氣權。

【發明】一時珍曰「防葵乃神農上品藥。黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒。獨別錄言中火脫陽者見鬼是豈上品養性所宜乎。是豈寒而無毒者乎。不然則本經及蘇恭所列者是防葵功用而別錄所列者乃似防葵之狼毒功用非防葵也。狼毒之亂防葵其來亦遠矣。不可不辨。古方治蛇瘕鼈瘻皆是狼毒也。」

【附方】舊一腫滿洪大。防葵研末。溫酒服一刀圭至二三服。身瞶及小不仁爲效。○肘後方癲狂邪疾。方同傷寒動氣。傷寒汗下後脾左防葵一兩。木香黃芩柴胡各半兩。每服半兩。

水一盞。牛煎八分溫服。雲岐子保命集。

狼牙本經下品

【釋名】牙子。本狼齒。別狼子。別犬牙。抱牙。吳支蘭。李當之。宏景曰。其牙經。普。抱牙。普。支蘭似獸之齒牙。故有諸名。

【集解】別錄曰「狼牙生淮南川谷及寃句。八月采根。暴乾。中溼腐爛生衣者殺人。」普曰。葉青根黑。若獸之牙。三月八月采根。日乾。頌曰。今江東汴東州郡多有之。時珍曰。范子計然云。出建康及三輔色白者善。根氣味苦寒有毒。別錄曰「酸。」普曰。神農苦有毒。桐君辛。岐伯言公屬鵲苦無毒。之才曰。葉蕷爲之使。惡地榆棗肌。

【主治】邪氣熱氣疥瘡。惡瘍瘡痔去白蟲。本經治浮風瘡瘻。煎汁洗惡瘍。殺腹臟一切蟲。止赤白痢。煎

服大

【附方】舊六。金瘡出血。狼牙草莖葉熱搗貼之。肘後方。小便溺血。金粟狼牙草焙乾入蚌粉炒槐花百藥煎等分爲方。寸白諸蟲。狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不食明旦以淡水下一合服盡即瘥。外臺祕要蟲瘡癩瘻。六月以前采狼牙葉以後用根生啖之。冷即止。楊炎南行方。小兒陰瘡。洗之。狼牙草濃煮汁。千金方。婦人陰瘡。狼牙二兩。蛇牀子三兩。煎取牛升以筋纏綿浸湯瀝洗。外臺祕要婦人陰瘡。煎水熱洗。日四五遍。張仲景金匱玉函。聰耳出汁。狼牙研末綿裹日塞之。研末綿裹日聖惠方。毒蛇傷螫。獨莖狼子根或葉搗爛臘射工。

蘭茹下品

【釋名】離婬。別錄掘居。音結。白者名草蘭茹。時珍曰。蘭茹本作蘆葦。其根牽引之狀如繩。故曰離婬。別錄曰。蘭茹生代郡川谷。五月采根陰乾黑頭者良。普曰。草高四五尺葉圓黃色。初斷時生苗葉似大戟而花黃色。根如蘿蔔皮赤黃肉白。初斷時生惡肉有白蘭茹散傅之看肉盡便停止。但傳諸膏藥若不生肉又色白。古方中分二三枝莖葉如大戟而葉細長。花開細葉中生。山中春初生。和傳之觀此則亦處處有之。生白色。今亦處處有之。散半錢和白蘭茹出建康。白色破之有黃漿汁。莖葉皆可。傳黃古方。

根【氣味】辛寒。有小毒。李當之大寒。「別錄曰」一錢。「善曰」一神農辛岐伯酸鹹有毒。

李當之大寒。「之才曰」甘草爲之使。惡麥門冬。

主治創惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不寐本經去熱痹破癰痕除瘻肉。

別錄曰去熱痹破癰痕除瘻肉。

【發明】「宗奭曰」治馬疥尤善。服食方用至少。「時珍曰」素問治婦人血枯痛用烏鵲骨蘆茹二伯合蘆茹丸服之自消則蘆茹亦可服食但要斟酌。孟說必效方治甲疽生于脚趾邊腫爛用蘆茹三兩黃芪二兩苦酒浸一宿以猪脂五合合煎取膏三合日三塗之卽消又聖惠方治頭風旋眩頭蘆茹丸中亦用之。

【附方】舊二緩疽腫痛。蘭茹一兩爲散。溫水傷寒咽痛。毒攻作腫真蘭茹爪甲大納口噙汁。聖惠方。傷寒咽痛。嚙之當微覺爲佳。張文仲備急方。中焦熱痞。服一錢雞鳴時溫酒下。以知爲度。聖惠方。疥瘡癩瘡。蘭茹末入輕粉香油。研傅之。多能瘳事。

【釋名】邛鉅。下馬仙。綱目「時珍曰」其根辛苦載人咽喉故名。今俚人呼爲

大戟也。

【集解】似別錄曰「大戟生常山十二月采根陰乾」保昇曰「苗似甘遂而高大葉有白汁花黃根

近道多有之。春生納芽漸長叢生根似細苦參秋冬季採根

陰乾淮甸出者莖圓高三四尺葉黃莖至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥。時珍曰「大戟生平根

澤甚多直莖高二三尺中空折之有白漿葉長狹如柳葉而不圓其梢葉密攢而上杭州紫大戟爲

江
南
土
大
戟
次
之
北
方
繩
色
白
其
根
皮
柔
韌
如
綿
甚
峻
利
能
傷
人
弱
者
服
之
或
至
吐
血
不
可
不
知
上
平
根

根【脩治】一數曰「凡使勿用附生者誤服令人洩氣不禁卽煎蕪蕘湯解之。采得軟去骨曬乾用細海剉。不知上平根

字葉麻而有毒。不可用也。

【氣味】苦寒。有小毒。別錄曰：「甘大寒，性平，無毒。」苦辛陰中微陽，濕肺長葛蒲蘆葦風寒。大明曰：「赤小豆爲之使，惡薯蕷。」

【主治】蠱毒十二水。腹滿急痛積聚。中風皮膚疼痛。吐逆。本經頸腋癰腫頭痛。發汗利大小便。別錄曰：「瀉毒藥。」泄天行黃病溫瘡。破癥結。大明曰：「下惡血癰塊。腹內雷鳴。通月水。墮胎孕。」治隱鬱風及風毒脚腫並煮水日日熱淋取愈。

【發明】成無己曰：「大戟甘遂之苦以泄水者，腎所主也。」好古曰：「大戟與甘遂同爲泄水之藥。妄言妄見入于肺則塞竅而成欬唾稠粘喘急背冷入于肝則留伏蓄聚而成脇痛乾嘔寒熱往來入于經絡則麻痺疼痛入于筋骨則頸項胸背腰骨手足牽引隱痛陳無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇效。此乃治瘧之本。瘧之本水也。溼也得氣與火則凝滯而爲瘧爲飲爲涎爲涕爲溺爲癖。大戟能泄藏實愚按百祥惟用大戟一味。大戟能行水故曰瀉其腑則藏自不實。肺者膀胱也。瀉其腑則藏自不實。肺者膀胱也。正實則瀉其子也。腎邪實而瀉其肝也。大戟味苦澀浸水色青綠。肝膽之藥也。故百祥膏又治嗽。仲景亦云心下痞滿引脇下痛。乾嘔短氣者。十載湯主之。其能化膿而成青黑乾陷之證。瀉其陷伏之邪。瀉其風毒。兩火。丸治粟米下大紅。在胸腹大紅。利大便。度結控涎丹治。

用每大戟一

一二兩

新桑丸研赤水脂

一麻益湯同下

○暴潔古活去大法機以要

附方十一百祥膏

後嗽而吐青綠水

又治痘瘡歸腎紫黑乾陷不發

少陰乾陷去骨日乾復納原汁

以黑利大便

爲度結

控涎丹

留治粟米下大紅

在胸腹大紅

臘上不可誤作風氣風毒及瘡疽施治又治頭痛不可舉或睡中流涎或嗽唾喘息或瘧迷心竅並此藥數服大汗自失諸疾尋愈紫大戟白甘遂白芥子微炒各一兩爲末薑汁打麵水腫喘急水盛大戟當歸橘皮各一兩切以水二升煮後乃醉腰取心水酒後止藥子藥

澤漆下品

金方千

錢七

左一對

一水腫腹大

一水腫腹大

一水腫腹大

一水腫腹大

一水腫腹大

一水腫腹大

【釋名】漆莖經貓兒眼睛草目綠葉綠花草目五鳳草。一宏景曰一是大戟苗生時摘葉有
【集解】大戟花也川澤中有莖梗小花黃色葉似嫩菜五月采之頌曰今冀州鼎州明州及近道即
皆有之。時珍曰一別錄陶氏皆言澤漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食然大戟苗
不可爲菜。今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一名綠葉圓而黃緣花草一名
湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢柔莖如馬齒莧綠葉如苜蓿葉承之齊整如頗五
名貓兒眼莖頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠色復有小葉承之齊整如頗五
鳳乳草綠葉花梢據此則澤漆有白汁黏人眼睛草非白色有硬骨或以此方家用治水蠱脚氣有
合故諸家認之爾用者宜審視。大戟苗生時摘葉有
鐘乳草綠葉花梢據此則澤漆有白汁黏人眼睛草非白色有硬骨或以此方家用治水蠱脚氣有
苗故自漢人集別錄誤以爲大戟也。今方家用治水蠱脚氣有教尤與神農本草又貓兒眼睛草溴文
相伏五故江入

莖葉氣味苦微寒無毒。別錄曰一辛一冷有小毒一之才曰一小豆爲之使惡薯蕷。

主治皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足。本經利大小腸明日輕身錄主蠱毒。蘇止瘧疾。

消痰退熱大明。

【發明】時珍曰一澤漆利水功類大戟故人見其莖有白汁遂誤以爲大戟然大戟根苗皆有毒洩人而澤漆根硬不可用苗亦無毒可作菜食而利丈夫陰氣盛不相侔也。

【附方】舊二新六肺欬上氣脈沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗去滓入半夏半升紫參白前生薑各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩煎取五升每服五合日三服。張仲景心下伏瘕大如盆不得食者澤漆四兩大黃葶苈熬三兩搗葛洪肘後方十種水氣取嫩莖葉入水一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀餳入瓶內水氣蠱病生鮮貓眼睛草曬乾爲末棗肉丸彈子收每日空心溫酒調下一匙以愈爲度聖惠方暖小便利爲度乾坤祕蘿腳氣赤腫步行脚痛貓兒眼睛草驚蟄蜂窠等分每服水五碗煎三碗薰洗之衛生易簡方牙齒疼痛研爛湯泡取汁含漱吐涎衛男婦癰癧貓兒眼睛草一二絃井水二桶五月五日午時鍋內熬至一桶去滓澄清再熬生易簡方癰瘡有蟲油調擦之衛生易簡方

甘遂下品

【釋名】甘藷。別錄陵藷。吳陵澤錄甘澤。吳重澤錄苦澤。普白澤。吳主田錄鬼醜。吳普時珍曰「**集解**別錄曰一甘遂生中山川谷二月采根陰乾。」普曰「八月采。」宏景曰「中山在代郡第不同俗名重莖葉似鬼臼莖麻根皮白色。」大明白曰「西京者上汴滻吳者次之形似和皮甘草節亦

頃曰「今陝西江東亦有之。苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠大如指頭。

根【脩治】〔敷曰〕「凡采得去莖於槐砧上細剉用生甘草湯薺自然汁二味攬浸三日其水如黑汁乃濾出用東流水淘六七次令水清爲度濾出于土器中熬胞用之。」時珍曰「今人多以麵煨熟用以去其毒。」

【氣味】苦寒有毒。〔別錄曰〕「甘大寒。」〔普曰〕「神農桐君苦有毒。岐伯雷公甘有元素曰「純陽也。」之才曰「瓜蒂爲之使惡遠志反甘草。」

【主治】大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道經下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿能瀉十二種水疾去痰水權瀉腎經及隧道水溼脚氣陰囊腫墜痰迷癲癧噎膈痞寒。時〔發明〕宗奭曰「此藥專于行水攻決爲用。」元素曰「一味苦氣寒苦性泄寒勝熱直達水氣所結之處乃泄水之聖藥水結胸中非此不能除故仲景大陷胸湯用之但有毒不可輕用。」時珍曰「腎主水凝則爲痰飲溢則爲腫脹。甘遂能泄腎經溼氣治痰之本也。不可過服但中病則止可也。張仲景治心下留飲與甘草同用取其相反而立功也。劉河間保命集云「凡水腫服藥未全消者以甘遂末塗腹透臍令滿內服甘草水其腫便去。又王璆百一選方云脚氣上攻結成腫核及一切腫用甘遂末水調傅腫處卽瀉煎甘草汁服其腫卽散二物相反而感應如此清流韓詠病脚疾用此藥一服去七八再服而愈也。」

【附方】一十九水腫腹滿爲末水煎時時呷之。普濟方身面洪腫甘遂二錢生研爲末以續續腎一枚分爲七瓣入末在內溼紙包煨方加木香四錢每用二錢煨熟溫酒嚼下當利黃水爲驗。御藥院方傳正水脹急研勻每以一錢白麵四兩水和作碭子大水煮令浮漢附子每以二錢煎服。普濟方小兒疳水湯下以利爲度忌酸鹹三五日名水寶散總微論水盛

喘服甘遂大戟各一兩慢火炙研每服一字水水腫喘急爲末以棗肉和丸梧子大每服四十丸侵晨分則熱湯下利去黃水爲度否妊娠腫滿二兩搗篩白蜜和丸梧子大每服五十丸得微下仍服豬苓散不瘥者用太山赤皮甘遂不遂
取利蜜半升同煎八合頓服
○張仲景金匱玉函脚氣腫痛一箇去皮膜切片用柴五錢捲在內溼紙包煨熟空心食之米飲子半升十津二
白下服後便伸兩足大便行後吃二便不通甘遂末以生麵糊調傅臍中及丹田內仍艾三壯飲甘遂末一兩煉蜜和勻分作四服
粥三日爲妙本事方
一服取利小便轉脬甘遂末一錢豬苓湯調
聖惠方小便轉脬下立通筆峯雜興方痘氣偏肺服二錢
當門事親婦人血結如敷狀小便通
瘡證發熱未大人三錢小兒一錢冷蜜水臥時服忌油膩魚肉普濟方消渴引飲兩黃連
怪方病各難而不同此爲水與血俱結在血室大黃二兩甘遂阿膠湯治癰癩心風未以豬心取三管血和藥入豬心內縛定紙裹煨熟取甘遂末錢一炒
調辰砂丸忌甘草豆大每薄荷湯治風疾迷心顫搐及婦人心風血邪用甘遂二兩搗元粉糊方
上每服下砂去藥灌之名無價散一小全幼心驚麻木疼痛萬靈膏用甘遂二兩搗作餅貼之內飲甘草湯
少甘遂草半寸耳卒編自裏插入兩耳內口全幼心驚
沈氏家藏方馬脾風病小兒風熱喘促閑亂不安謂之馬脾風甘遂末錢一炒入爲兩半
大便下惡物爲效不下再服濟生方馬脾風病包責一錢牛辰砂水飛二錢牛膠粉糊方
少甘遂字藥水少許滴油一小全幼心驚
開少甘遂草去藥灌之名無價散一小全幼心驚
續隨子宋開

【釋名】千金子實·千兩金華·菩薩豆·華·括冬·開·聯步·生·故名·冬月始長故又名拒冬·而葉中出葉數數相續而

【集解】初生一莖，莖端生葉，葉中復出莖，花亦類大戟。自葉中抽絲而生實，實有殼。人家園亭中多種。

以爲飾。秋種冬長，春秀夏實。時珍曰：莖中亦有白汁，可結水銀。

【脩治】時珍曰：凡用去殼，取色白者，以紙包壓去油，取霜用。

【氣味】辛溫，有毒。

【主治】婦人血結月閉，瘀血癥瘕痃癖，除蠱毒，鬼疰心腹痛，冷氣脹滿，利大小腸下惡滯物。開積聚痰飲，不下食，嘔逆及腹內諸疾。研碎酒服，不過三顆，當下惡物。蜀宣一切宿滯，治肺氣水氣，日服十粒，瀉多以酸漿水或薄醋粥吃，即止。又塗疥癬瘡。

【發明】頌曰：「續隨子水最速，然有毒，損人不可過多。」時珍曰：「續隨與大戟澤漆甘遂莖葉相似，主療亦相似。其功皆長于利水，惟在用之得法，亦皆要藥也。」

【附方】新舊二小便不通，濟腹脹痛不可忍，諸藥不效者，不過再服用續隨子去皮一兩，鈸丹半兩，同木通少湯下化破，尤妙。病急，聖濟錄水氣腫脹，步一兩去殼研，歷去油，重研，分作七服，每治一人，用一眼工夫，生吃益善。忌鹽，一日乃不復作聯步，卽續隨子也。斗門方：陽水腫脹，豆大，每白湯下五十丸，以去陳薑，搗元方，綠涎積癥塊。隨續子三十枚，膩粉三錢，青黛炒一錢，研勻，糯米飯丸，芡子大，每服一丸，打破以大棗一枚燒熟去皮核，同嚼冷茶送下。半夜後，取至積聚惡物爲效。聖濟錄蛇咬腫悶，欲死，用重仁七粒，搗篩爲散，酒服方寸匕，兼睡和黑子疣贅，續隨子熟時塗之。少許，塗咬處立效。崔元亮海上方：

葉及莖中白汁，主治：剝人面皮去黷，增黃傅白癩癰瘍，明搗葉傅蠍蟄立止。

時珍曰：「時珍曰：凡用去殼，取色白者，以紙包壓去油，取霜用。」

蕡著音浪蕡○
本經下品

【釋名】天仙子。圖。橫唐。本經。行唐。子服之。令人狂浪放宕。故名。
【集解】核而極小。一保昇曰。所在皆有之。葉似菘藍。莖葉皆有細毛。花白色。子殼作瞿子狀。如小石榴房中子。至細青白色。若粟米大青黃色。六月七月采子日乾。一頌曰。處處有之。苗莖高二三尺。葉似地黃王不留下。五月結實有殼。作瞿子狀。如小石榴房中子。至細青白色。等而闊如三指。四月開花紫色。莖英有白毛。五月結實有殼。作瞿子狀。如小石榴房中子。至細青白色。如粟米粒。一數曰。凡使勿用蕡蕡子。其形相似。只是微赤。服之無效。時人多以雜之。一時珍曰。張仲景金匱要略言。菜中有水蕡蕡葉圓而光。有毒誤食。令人狂亂。狀如中風。或吐血。以甘草汁解之。

子脩治

一數曰。修事蕡蕡。十兩。以頭醋一盞。資乾爲度。卻用黃牛乳汁浸一宿。至明日。乳汁黑即是真的。曬乾搗篩用。

【氣味】苦寒。無毒。一別錄曰。甘。一權曰。苦辛微熱。有大毒。一藏器曰。性溫不寒。一大明曰。溫大煩悶眼。生還火。一頌曰。本經言性寒。後人多云大熱。而史記淳于意傳云。淄川王美人懷子不乳。飲以蕡蕡藥一撮。以酒飲旋乳。且不乳。豈熟藥所治。又古方主卒顛狂。亦多單用蕡蕡。豈果性寒耶。

【主治】齒痛出蟲肉。痙拘急。久服輕身。使人健行走及奔馬。強志益力。通神見鬼。多食令人狂走。本經療癲狂風癇。顛倒拘掣。別錄安心定志。聰明耳目。除邪逐風。變白。主痃癖。取子洗曬。隔日空腹水下一指捻。亦可小便浸令泣盡。暴乾如上服。勿令子破。則令人發狂。器炒焦研末。治下部脫肛。止冷痢。主蛀牙痛。咬之蟲出。燒熏蟲牙。及洗陰汗。大

【發明】權曰。一以石灰清煮。一伏時。掏出芽。暴乾。以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴爲丸服。去一切冷氣。積年氣病甚溫暖也。不可生服。傷人見鬼。拾蟻狂亂。一時珍曰。蕡蕡之功未見如所說。而其毒有甚焉。煮一二日而芽方生。其爲物可知矣。蕡蕡實防葵赤商陸。皆能令人狂惑。見鬼者。昔人未有發

其義者。蓋此類皆有毒能使瘡迷心竅。蔽其神明。以亂其視聽故耳。唐安祿山誘奚契丹飲以蕷若。皆其全家同坐。將紅散入飯內食之。少頃舉家昏迷。任其奸汚。復將颶法吹入柱耳中。柱發狂惑。見舉家皆是妖鬼。盡行殺死。凡十六人。並無血迹。官司執柱囚之。十餘日。柱吐痰二盞。許問其故。乃知所殺者。皆其父母兄嫂妻子姉妹也。柱與如香皆論死。世宗肅皇帝命榜示天下。觀

【附方】舊二新二十卒發顛狂。蕷若三升爲末。以酒一升漬數日。較去滓煎令可丸。如小豆三丸。日三服。當有膿血。蕷若子五錢。淘去浮者。煮令芽出。炒研真酥一雞子大。大棗七枚。同煎令酥盡。取年久呻歎。至三十日食三枚。○又方。蕷若子三錢。炒大草烏頭甘草牛兩。五靈脂一兩。爲末糊丸梧子大。久嗽不止。

延年之小品方。風癆厥痛。以螺青爲衣。每服十丸。男子菖蒲酒下。女子芫花湯下。聖濟錄。

上撒末于上卷作箇燒烟熏吸之。崔行功纂要方。水腫蠭脹。方見獸部。

核去浮者。大棗四十個。水三升。煮乾只取棗去皮。水瀉日久。青州乾棗十個。去核入蕷若子三分水淘者。每空心食一個。米飲下。覺熱即止。聖濟錄。

疳痢下。蕷若子爲末。臘豬脂和丸。綿裹棗許。孟旣必效方。導下部內。赤白下痢。腹痛腸滑。後重。大黃根半斤。取一撮爲末。每服一錢。米飲下。年久呻歎。至

疳止。若丸時黏手。則以菟絲粉度用。蕷若實一升。去皮核。脫肛。蕷若同煮。搗膏丸梧子大。每服二十丸。食前米飲一錢。聖惠方。

方善濟。久痢不止。變一種種病氣脫肛。蕷若丸用。蕷若子一升。淘去浮者。煮令芽出。嚼乾炒黃。黑色青州腸。

方普濟。久痢不止。變一種種病氣脫肛。蕷若丸用。蕷若子一升。淘去浮者。煮令芽出。嚼乾炒黃。黑色青州腸。

蟲牙。瑞竹堂方。用蕷若子入瓶用天仙子一撮。內以熱湯淋撮入。口含瓶口內。令內燒烟熏竹筒引烟入蟲孔。冷更作三合。乃止。有涎津可不發。○普濟方。外腫水服。蕷若乳。

中方。用蕷若子。亦數納孔。止若丸時黏手。則以菟絲粉度用。蕷若實一升。當利隔之。利亦止。絕有效。餒中大方。風毒咽腫。嘯聲有聲。○普濟方。急用。

癰堅硬。新蕡若子半匙。清水一盞服。石癰堅硬。不作膿者。蕡若子爲末。醋和。十年不愈者。蕡

之不得嚼破。○外臺祕要。石癰堅硬。傳瘡頭根卽拔出。千金方。惡瘡似癰。蕡若子燒研傳之。金方。打撲折傷。羊脂調蕡若子末。千金方。惡犬咬傷。蕡若子七枚吞之。

根。氣味苦寒有毒。

【主治】邪瘡疥癬殺蟲時珍。

【附方】新瘡疾不止。蕡若根燒灰水服一合。惡癬有蟲。蕡若根搗爛蜜和趾間肉刺。○雷公炮炙論序。云脚生肉刺。視繫蕡根謂繫于視帶上也。狂犬咬人。蕡若根和鹽搗傅。日外臺祕要。惡刺傷人。蕡若根水煮汁浸之。冷箭頭不出。神應丹。端午前一日不語。尋見蕡若科根本枝葉花實全好者。道云先生你卻在這裏道罷。用柴灰自東南起圓了。以木梯子攔取根下周迴土。次日日未出時。依前不語。用鑼頭取出洗淨。勿令雞犬婦人見于淨室中。以石臼搗如泥。丸彈子大。黃丹爲衣。以紙袋封懸高處陰乾。遇有箭頭不出者。先以象牙末貼瘡口。後用絲帛袋盛此藥放臍中。綿兜肚繫了。當便出也。張子和儒門事親方。

雲實上品。

【釋名】員實。別錄雲英。別天豆。吳馬豆。圖經羊石子。

圓。苗名草雲母。唐臭草。圖經櫧刺。綱目「時珍曰」員亦

形名羊石。當作羊矢。其子有之故也。

【集解】值六月花。八月九月實。十月采。宏景曰。處處有之。子細如華。子而小黑。其實亦類蕡若。葉如細槐。亦如苜蓿。枝閒微刺。俗謂苗爲草。雲母陶云。似華者非也。保昇曰。所在平澤有之。葉如麻。兩相似。細如槐花。黃白。其莢如豆。其實青黃。色大若麻子。五月六月采。實過時。卽枯落也。時珍曰。此草山有。

原甚多俗名櫟刺赤莖中空有刺高者如蔓其葉如槐三月開黃花叢然滿枝莖長三寸許狀如肥阜莖內有子五六粒正如鵝豆兩頭微尖有黃黑斑紋厚殼白仁咬之極堅重有腥氣狀

實脩治「穀曰」凡采得粗搗相對拌

氣味辛溫無毒農辛小溫黃帝賦雷公苦

主治泄痢腸澼殺蟲蠭毒去邪惡結氣止痛除寒熱本經消渴錄治瘧多用頤主下鹽膿血參

附方新靈下不止丸梧子大每服五丸水下日三服肘後方

花【主治】見鬼精多食令人狂走久服輕身通神明本經殺精物下水燒之致鬼別

發明「時珍曰」靈實花既能令人見鬼發狂豈有久服輕身之理此古書之訛也

根【主治】骨哽及咽喉痛研汁嚥之時珍

蕷麻蕷音卑草部○

【釋名】一頤曰「葉似大麻子形宛如牛蜱故名」時珍

【集解】一恭曰「此人間所種者葉似大麻葉而甚大結子如牛蜱今胡中來者莖赤高丈餘子大

餘秋生細花隨便結實殼上有刺狀頰巴豆青黃斑褐夏采莖葉秋采實冬采根日乾用」時珍

其莖有赤有白中空其葉大如瓠葉每葉凡五尖夏秋間煙裏抽出花穗纍纍黃色每枝結實數十顆

上又有刺攢簇如蠅毛而軟凡三四子合成一顆枯時劈開狀如巴豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛蜱再去斑殼中有仁嫩白如蠟隨子仁有油可作印色及油紙子無刺者良子有刺者毒

子【脩治】「穀曰」凡使勿用黑天赤利子緣在地蔓上是顆兩頭尖有毒其蕷麻仁升搗爛以水黑一斑

以水煎之。有沫撤起。待沫盡乃止。去水。

【氣味】甘辛平。有小毒。時珍曰一凡服蒼麻者。一生不得食。豆犯之必死。其油能伏丹砂粉霜。

【主治】水癥。以水研二十枚服之。吐惡沫。加至三十枚。三日一服。瘥則止。又主風虛寒熱。身體瘡癩浮腫。尸疰惡氣。榨取油塗之。唐研傅瘡瘻疥癩。塗手足心。催生。大明治療癰。取子炒熟去皮。每臥時嚼服二三枚。漸加至十數枚。有效。宗爽主偏風。不遂。口眼喎斜。失音。口噤。頭風耳聾。舌脹。喉痹。齁喘。腳氣。毒腫。丹瘤。湯火傷。鍼刺入肉。女人胎衣不下。子腸挺出。開通關竅經絡。能止諸痛。消腫追膿拔毒。時珍

【發明】震亨曰一蒼麻屬陰。其性善收。能道膿取毒。亦外科要藥。能出有形之滯物。故取胎產胞胎走能開通諸竅經絡。故能治偏風失音。口噤。口喎斜頤。頭風七竅諸病。不止于出有形之物而已。蓋鵝油能引藥氣入內。蒼麻油能拔病氣外出。故諸膏多用之一。一人病偏風。手足不舉。時珍用此油同羊脂麝香。駞鯉甲等藥煎作摩膏。日摩數次。一月餘漸復。兼服搜風化痰養血之劑。三月而愈。一人病手臂一塊腫痛。亦用蒼麻搗膏貼之。一夜而愈。一人病氣鬱偏頭痛。用此同乳香。食鹽搗焫。太陽穴。一夜痛止。一婦產後子腸不收。搗仁貼其丹田。一夜而上。此藥外用。累奏奇助。但內服不可輕率。或言搗膏以筋點于鵝馬六畜舌根下。卽不能食。或點肛內。卽下血死。其毒可知矣。

【附方】舊九。新半身不遂。失音不語。取蒼麻子油一升。酒一斗。銅鍋盛油。坐藥上冷。卽換五六次。卽正也。○人良方用蒼麻子仁七粒。研作餅。右噙安在左手心。左噙安在右手心。卽以銅盃盛熱水。逐左右貼太陽穴。解髮出氣。甚驗。○德生堂方用蒼麻油紙八種。頭風。將好末茶調成膏子。各四十九粒。去殼。塗盡內。後將灰燄火燒前藥。烟起如泥糊。捲丸彈子大。綿穿百沸。葱處陰乾。用時先

藥服之。後以綿被裹頭。汗出避風。袖珍方。鼻窒不通。塞之一日一易。三十日聞香臭也。
聖濟錄 天柱骨倒。小兒瘡疾。及
臥汗出。避風。袖珍方。鼻窒不通。塞之一日一易。三十日聞香臭也。
諸病後天柱
切一粒。去殼研勻。先包頭擦頂上令熱。以津調藥貼之。鄭氏小兒方。五種風癆。仁二兩。黃連一兩。石膏水一
錢。不問年月遠近用。蒼麻子六個去殼。蒼麻子四十粒去殼研油。塗紙上作擦燒。煙熏鼻。舌脹塞口。愈爲度。有
人舌脹出口外。一村人用此法而愈。經驗良方。急喉痹
中。自止。擒元方。牙調緊急不通。用此卽破。以蒼麻子仁研爛。同蘇合香。水氣脹滿。蒼麻子仁研水解得三合。清且一頓服。盡日中當
千金。水氣脹滿。下青黃水也。或云壯人止可服五粒。外臺祕要。腳氣作痛。
塞筒燒烟熏吸卽通。或只取油作擦尤妙。名聖烟筒。咽中瘡腫。杜仁方。用蒼麻子一枚。朴消一錢。
三因方。用蒼麻仁。荆芥穗等分。水氣脹滿。下青黃水也。或云壯人止可服五粒。外臺祕要。腳氣作痛。
麻子七粒去殼研爛。同蘇合香。小便不通。插入莖中卽通。摘元方。新汲水服之。連進二三服效。
外臺祕要。小便不通。插入莖中卽通。摘元方。新汲水服之。連進二三服效。
各取蒼麻子十四枚。每手各取七枚。須臾立下也。子宮脫下。蒼麻子仁枯蠅等分。研末安紙上。托入仍以
各取蒼麻子十四枚。研膏。塗項心卽入。○摘元盤腸生產塗項方。催生
下胎。不拘生胎死胎。蒼麻二個。巴豆二個。麝香一分。研貼臍。一切毒腫痛不可忍。蒼麻子仁搗
場。手指擊曲節。間痛不可忍。漸至斷落。用蒼麻子一枚。劈破面東。以浸藥水吞之。漸加至四五枚。微利不妨。瓶中同
各取蒼麻子十四枚。研膏。塗項心卽入。○摘元盤腸生產塗項方。催生
水盡更添兩日。秋冬五日後。取蒼麻子一枚。劈破面東。以浸藥水吞之。漸加至四五枚。微利不妨。瓶中同
青減不去皮。每睡時服二枚。取效。膿瘻惡瘻。及軟瘻。用白膠香一兩。瓦器溶化去滓。以蒼麻子六十
克。膠油炒豆。大毒。每睡時服二枚。取效。膿瘻惡瘻。及軟瘻。用白膠香一兩。瓦器溶化去滓。以蒼
麻子四十粒。洗面用之。良。膠油炒豆。大毒。每睡時服二枚。取效。膿瘻惡瘻。及軟瘻。用白膠香一
兩。瓦器溶化去滓。以蒼麻子六十粒。洗面用之。良。

扶蘇吳髮面上雀斑。曉麻子仁蜜陀僧研黃各一錢爲末。髮黃不黑。廣麻子仁香油煎焦去滓。耳卒聾閉。每以綿裹一枚塞之。燒耳中熱爲度。一日一易。二十日癒。千金方湯火灼傷膏。湯傷以油調火灼以水調塗之。○鍼刺入肉去恐藥聚每出好肉或加白梅肉同研尤好。衛生易簡方。竹木骨哽仁一兩。瓶麻油紅麴等分研細。沙糖丸。阜子大。綿裹含嚥自然不見。○又方。大良鷄魚骨哽。曉麻子仁研爛入百藥煎研丸。鹽水洗吹痛處乃貼此膏。花研膏先以淡出。大良。鷄魚骨哽。禪子大。井花水化下半丸卽下。

葉【氣味】有毒。

【主治】脚氣風腫不仁。蒸搗裹之。日二三易卽消。又油塗炙熱熨顫上止鼻衄。大驗。恭治痰喘欬嗽。時

【附方】一。齁喘痰嗽。儒門事親方用九尖曉麻葉三錢入飛過白礬二錢。以豬肉四兩薄批。摻藥在內年深日近用經霜曉麻葉。經霜桑葉御米殼蜜炒各一兩爲末。蜜丸。彈子大。每服一丸。白湯化下。日一服。名無憂丸。

【附錄】博落迴。拾遺。藏器曰。一。有大毒。主惡瘡根瘤癰。內白癰風疊毒精魅。溪毒瘡痍。和百丈作聲。如博落迴折之有黃汁。藥人立死。不可輕用。入口。

常山

本品蜀漆同

【釋名】恆山。普瓦草。本經鷄屎草。鴨屎草。日華。一時珍曰。恒亦常也。恒山乃北岳名。在今定州。常苗今併爲同一。

【集解】別錄曰：常山生益州川谷及漢中。二月八月采根陰乾。宏景曰：常山出宜都建平細實黃者呼爲雞骨常山用之最勝。蜀漆是常山苗而所出又異者。江林山即益州江陽山名。故是同處爾。彼人采得藥結作丸。得時蠶葉佳。恭曰：常山生山谷間。莖圓有節。高者不過三四尺。葉似者而狹長。兩相當。二月生白花青葉。八月九月采之。頌曰：今汁西淮浙湖南州郡亦有之。並如上說。而海州出者葉似柳葉。八月有花紅白色。子碧色似山棟子而小。今天台山出一種草。名土常山。苗葉極甘。人用爲飲。甘味如蜜。又名蜜香草。性涼益人。非此常山也。

【脩治】漆細剉。又拌甘草水勻。再蒸日乾。用其常山。凡用以酒浸一宿。流出日乾。熟搗用。時珍曰：近時有酒浸蒸熟或瓦炒熟者。亦不甚吐人。又有醋制者。吐人。

常山 **【氣味】**苦寒有毒。別錄曰：辛微寒。善曰：神農岐伯苦。桐君辛有毒。李當之大寒。樞菜苦有小毒。炳曰：得甘草吐罐。之才曰：畏玉札。大明曰：忌葱菜及菘菜。

【主治】瘡及欬逆寒熱。腹中癥堅痞。積聚邪氣。蠱毒鬼疰。經療胸中邪結氣。吐去之。別治鬼瘡多時。溫涎。治項下瘤癰。甄權曰：蜀漆

蜀漆 **【氣味】**辛平有毒。別錄曰：微溫。樞曰：苦有小毒。元素曰：辛純陽。

【主治】瘡及欬逆寒熱。腹中癥堅痞。積聚邪氣。蠱毒鬼疰。經療胸中邪結氣。吐去之。別治鬼瘡多時。溫瘡寒熱。下肥氣。破血。洗去腥。與苦酸同用。導膽邪。素本權曰：桔梗爲之使。之才曰：桔梗爲之使。惠貢采。

不愈者常山八兩酒浸蒸焙檳榔二兩生研末糊丸梧子大如上法服○集簡方二聖丸治諸瘧不愈服三五十九丸

太陰肺瘧

淡聚胸中病至令人寒甚乃熱熱閒善驚如有所見恒山三錢甘草少陰腎瘧手足寒腰寒方一

脊痛大便難目睭然

溫瘧又加蜀漆一錢○張仲景金匱要略下

半錢牛葱白三根秋米三十粒水二錢煎一錢發日早分三次服

千金方牡瘧獨寒不熱者蜀漆散用蜀漆一千金方牡瘧獨寒三日夜龍骨各二錢爲末每服

則至一錢未發前溫服得吐

溫瘧熱多恒山一錢小麥三錢淡竹葉二錢三十

文各一兩酒三升漬一宿以瓦盆盛取一升半發日早服五合

藥性論三十年瘧肘後方治三十年老瘧常山黃連丸梧子大未發時五張連瘧

將發時五丸白湯下支

瘧瘧寒熱劉長春經驗方常山一寸草果一枚熟酒一盞浸一夜五更各望

黑豆一百粒水煎服之乃彭司寇所傳○葛稚川肘後方用常山檳榔甘草各

水二錢生人釘已寅上水土生人釘亥上小兒驚忤

一百日兒瘧水鑑仙人歌曰瘧是邪風寒熱攻直須術治免成

各二錢黑豆一百粒水煎服之乃彭司寇所傳○葛稚川肘後方用常山黃連香豉石膏煅各

水一盞酒一盞浸一夜平旦溫服燒僵坦集驗方

附錄杜莖山圖經一頌曰一葉味苦寒主溫瘧寒熱作止不定煩渴頭痛心躁杵爛新酒浸綃汁服

土紅山一頌曰一葉味苦寒主溫瘧寒熱作止不定煩渴頭痛心躁杵爛新酒浸綃汁服

土而小無毛秋生白花如粟粒不實福州生者作細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭似枇杷

取根米泔浸一宿以清水再浸一宿炒黃爲末每服一錢水一盞生薑一片同煎服亦治勢癥甚效

時珍曰杜莖山卽土恒山土紅山又杜莖山之類故並附之

藜蘆本經下品

【釋名】山葱別錄·葱苗同上·葱莢音舊葱葵普豐蘆普·葱目鹿葱故名根際似葱俗名葱管藜蘆是矣北人謂之鹿葱

【集解】別錄曰藜蘆生太山山谷三月采根陰乾普曰大葉小根相連宏景曰近道處有之根下極似葱而多毛用之止剝取根微炙之保昇曰所在山谷皆有葉似鬱金秦州解州者尤佳三月生苗葉似初出機心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裏莖似機皮有花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月采根陰乾此有二種一種水藜蘆莖大同只是生在近水溪澗石上根鬚百餘莖不中藥用今用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者爲佳均州土俗亦呼爲鹿葱范子計然云出河東黃白者善

根脩治米泔汁煮之從已至未曬乾用

【氣味】辛寒有毒別錄曰苦微寒普曰神農雷公辛有毒岐伯鹹有毒李當之大寒大毒經之才曰黃連爲之使反細辛芍藥人參沙參紫參丹參苦參惡大黃

時珍曰畏葱白服之吐不止飲葱湯卽止

【主治】蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘡疥癬惡瘡殺諸蟲毒去死肌本療噦逆喉痹不通鼻中瘻肉馬刀瘻瘡不入湯用別錄主上氣去積年膿血泄痢權吐上膈風涎暗風癆病小兒齟齒瘻疾頌末治馬疥癬宗發明曰嚙逆用吐藥亦反胃用吐法去痰積之義吐藥不一常山吐瘻瘻瓜丁吐熱瘻烏附尖吐珍

煙燄。菜蘆子吐風痰一作。至五七年五七作三十歲至四十歲則日作或甚至一二年大饑采百草食於野中見草若葱狀采歸蒸熟飽食至五更忽覺心中不安吐涎如膠連日不止。約一二斗汗出如洗甚。醫困三日後遂輕健病去食進百脈皆和以所食葱訪人乃葱苗也卽本草閉單醫束手先考太醫吏自月池翁診視藥不能入自午至子不獲已打去一齒濃煎藜蘆湯灌之少頃噫氣一聲遂吐痰而甦調理而安藥弗瞑眩疾弗瘳誠然。

【附方】舊六新諸風痰飲。藜蘆十分。鬱金一分。爲末。每以一字中風不省。牙關緊急者。藜蘆一兩去苗灌炒微褐色爲末。每服半錢。小兒減半溫水調。○經驗方。中風不語。喉中如曳鋸口中涎沫取藜蘆一分。天南星一粒。去浮皮子臍上剝一坑。納入陳醋二樣。斗四面火逼黃色研爲末。生麵丸小豆。諸風頭痛。又方。通頂散。藜蘆半兩。黃連三分。嘴鼻。聖惠。久瘡痰多。大每服三丸。溫酒下。經驗方。不食欲吐不吐。藜蘆末半錢。巴豆二十五枚。熬黃研末。蜜丸小豆大。每溫鹽水調下。探吐。保命集。痰瘡積瘡。空心服一丸。未發時一丸。臨發時又服一丸。勿用飲食。肘後面火逼黃疸腫疾。藜蘆灰中炮爲末。水服半兩。胸中結聚。如駭駭不去者。巴豆半兩。去皮心炒。搗如泥。藜蘆一兩。蜜和搗丸。麻子大。每吞一二丸。○肘後身面黑瘡。藜蘆灰五兩。水一大碗。淋汁銅器電湯煮成。鼻中瘡肉。藜蘆三分。雄黃一分。爲末。蜜和點之。牙齒蟲痛。藜蘆末。神效。內入孔中。勿白禿蟲瘡塗之。千金翼。白禿蟲瘡塗之。肘後方。頭生蟻虱。藜蘆末。猪脂調。本事方。反花惡瘡。和傅日三五上。聖濟錄。疥癬蟲瘡油和塗。藜蘆末。生羊疽瘡瘻。爲末。傅之蟲自出也。陶隱居方。誤吞水蛭。藜蘆炒爲末。水服一錢。

【附錄】山慈石。「別錄有名未用曰」苦平無毒。主女子帶下。參果根。餘根根有衣囊莖。一名爰花。生山之陽。正月生葉如藜蘆莖有衣。三月三日采百

根一名百連。一名烏蕡。一名鹿蒲。馬腸根。宋圖經。頌曰。苦辛寒有毒。主疊除風葉。

一名鼠莖。一名鹿蒲。

馬腸根。瘡疥生。秦州葉似桑。三月采葉。五月六月采根。

木藜蘆

拾遺

【釋名】黃藜蘆。目鹿驪。

【集解】藏器曰。陶宏景注漏蘆云。一名鹿驪山。南人用苗。北人用根。按鹿驪乃木藜蘆。非漏蘆也。長多蠶文。四月開細黃花。五月結小長子。如小豆大。

【氣味】苦辛溫有毒。

【主治】疥癬殺蟲器。

附子

本經

下品

【釋名】其母名曰烏頭。時珍曰。初種爲烏頭。象烏之頭也。附烏頭而生者爲附子。如子附母也。烏頭以別之。諸家不分烏頭有川草兩種。皆混雜註解。今悉正之。

【集解】別錄曰。附子生鍛爲山谷及廣漢。冬月采爲附子。春月采爲烏頭。烏頭與附子同根附子八月采。八角者良。烏頭四月采。春時莖初生。有腦頭如烏鳥之頭。故俗呼此爲黑附子。川兩岐。其蒂狀如牛角者。名烏喙。取汁煎爲射罔。天雄似附子。細而長。乃至三四寸。側子即附子邊角之大者。並是同根而本經。附子出鍛爲天雄。出少室。烏頭出朝陵。分生三處。當各有所宜也。今則無別矣。大恭曰。天雄附子烏頭。並以蜀道綿州龍州者佳。俱以八月采造。餘處雖有造得者。力弱都不相似。江南來者全不堪用。大明曰。天雄大而長。少角刺而實。附子大而短。有角平穩而實。烏喙似天雄。江南來者。於附子側子小於烏頭。連生者。名爲虎掌。並是天雄。皮上蒼色。有尖頭。大者孕八九個周根。奧嫩者爾。數曰。烏頭少有莖苗。身長而烏黑。少有旁尖。烏喙一裔。子母之類。氣力乃有殊等。卽宿根。

南也鐵正子者附而種鄉辯射經烏子種各月者至方種芮四豪圃核者陷黑
 色二爲子小春產而罔所喙之之者爲成所及艾者爲烏頭後其種宗天蠶子是鐵
 三漏又蓋月附明之列側母便有異而廣志不其餘有大物以長二尺龍州五如芋
 即按鳥此次缺則籃左生子矣烏子今是謂五物毒附本草皆爲附三棱葉先將依大子
 乾保喙記之風稍子右長而苗其赤說途今是謂子之川豈大物以長二尺龍州五如芋
 又昇也所青鐵大皆附成而其亦入人生之物四四子也冬采附三棱葉先將依大子
 法曰天載緣者種脈而也雲致諸謂子烏今人種野多每故貳烏頭象命春之法未
 以錐漏者爲一絡偶九月采者采而歲以故貳烏頭象命春之法未用側子春八角天雄
 米附籃爲下連生者采而歲以故貳烏頭象命春之法未用側子春八角天雄
 粥子天即下本子貫爲者采而歲以故貳烏頭象命春之法未用側子春八角天雄
 雷及烏雄雷天草特如生者乃澤其上漢雲是名未生用力子二年采者爲割紫五七
 積頭之數雄言生子佳附其葉田地耕縣說故生子力倍二年采者爲割紫五七
 天類所烏附則附其葉田地耕縣說故生子力倍二年采者爲割紫五七
 等雄醫謂頭子特母附其葉田地耕縣說故生子力倍二年采者爲割紫五七
 淹側方木天八大而品類熟領之也若生子力倍二年采者爲割紫五七
 並烏無子皆者子者七麻作八尤曰子故至年爲烏頭博彰旁穗其糞之謂十一
 不喙此大以爲之以爲本而望惟不其少曰至年爲烏頭博彰旁穗其糞之謂十一
 及采名豐良形貴天同厚取彰近汁及春故采爾烏頭博彰旁穗其糞之謂十一
 前得功所實其雄而其種明理煎獨采爾烏頭博彰旁穗其糞之謂十一
 以故雄而其種明理煎獨采爾烏頭博彰旁穗其糞之謂十一
 功用謂盈角附末花於出宋爲繁烏頭博彰旁穗其糞之謂十一
 一坐虎握爲坐附而異紫龍附人射者烏頭乎年志言縣角爲附附子子正皮
 頤熟相掌者側正名尖其瓣安子楊罔卽烏頭乎年志言縣角爲附附子子正皮
 曰湯同者爲子節也者初黃龍彰天陶無冬一時時時時時時時時時時時時時
 一浸爾也勝之角凡爲種黎州明惠宏此則時時時時時時時時時時時時時時
 其漏說少種天之長齊領著景數生珍子子曰烏頭之惟附子子正皮
 籃甚者一錐小苞歸鄉附不物子曰烏頭之惟附子子正皮
 側謬附者而木二子知也已一烏頭爲天雄水之絕小鄉者最佳者亦
 子矣上子而爲圓門十記烏其故頭烏雄水之絕小鄉者最佳者亦
 則附有六上烏七青惟甚頭產曰有兩物也春秋年爲天雄水之絕小鄉者最佳者亦
 園子節七出頭月雄赤悉有江人之多以者附采小水今二左冬種出彰明然側子子正皮
 人之上爲烏頭謂諸水其要附子子等處者其者天雄水之絕小鄉者最佳者亦
 乞以乳則側頭謂諸水其要附子子等處者其者天雄水之絕小鄉者最佳者亦
 役花者皆子而早十明讀之烏頭乃天卽一采采元一月昌可附年之後一龍三如
 夫白次小附旁早十明讀之烏頭乃天卽一采采元一月昌可附年之後一龍三如
 不者之種而生水一會之烏頭乃天卽一采采元一月昌可附年之後一龍三如
 足爲形一散者攀月昌可附年之後一龍三如
 上不而生爲縮播四不註本雄附年之時植物後一龍三如

脩治

使乾保喙記之風稍子右長而苗其赤說途今是謂子之川豈大物以長二尺龍州五如芋

又昇也所青鐵大皆附成而其亦入人生之物四四子也冬采附三棱葉先將依大子

法曰天載緣者種脈而也雲致諸謂子烏今人種野多每故貳烏頭象命春之法未

用側子春八角天雄

米附籃爲下連生者采而歲以故貳烏頭象命春之法未用側子春八角天雄

粥子天即下本子貫爲者采而歲以故貳烏頭象命春之法未用側子春八角天雄

雷及烏雄雷天草特如生者乃澤其上漢雲是名未生用力子二年采者爲割紫五七

淹側方木天八大而品類熟領之也若生子力倍二年采者爲割紫五七

並烏無子皆者子者七麻作八尤曰子故至年爲烏頭博彰旁穗其糞之謂十一

不喙此大以爲之以爲本而望惟不其少曰至年爲烏頭博彰旁穗其糞之謂十一

及采名豐良形貴天同厚取彰近汁及春故采爾烏頭博彰旁穗其糞之謂十一

前得功所實其雄而其種明理煎獨采爾烏頭博彰旁穗其糞之謂十一

以故雄而其種明理煎獨采爾烏頭博彰旁穗其糞之謂十一

功用謂盈角附末花於出宋爲繁烏頭博彰旁穗其糞之謂十一

一坐虎握爲坐附而異紫龍附人射者烏頭乎年志言縣角爲附附子子正皮

頤熟相掌者側正名尖其瓣安子楊罔卽烏頭乎年志言縣角爲附附子子正皮

曰湯同者爲子節也者初黃龍彰天陶無冬一時時時時時時時時時時時時時

一浸爾也勝之角凡爲種黎州明惠宏此則時時時時時時時時時時時時時時

其漏說少種天之長齊領著景數生珍子子曰烏頭之惟附子子正皮

籃甚者一錐小苞歸鄉附不物子曰烏頭之惟附子子正皮

側謬附者而木二子知也已一烏頭爲天雄水之絕小鄉者最佳者亦

子矣上子而爲圓門十記烏其故頭烏雄水之絕小鄉者最佳者亦

則附有六上烏七青惟甚頭產曰有兩物也春秋年爲天雄水之絕小鄉者最佳者亦

園子節七出頭月雄赤悉有江人之多以者附采小水今二左冬種出彰明然側子子正皮

人之上爲烏頭謂諸水其要附子子等處者其者天雄水之絕小鄉者最佳者亦

乞以乳則側頭謂諸水其要附子子等處者其者天雄水之絕小鄉者最佳者亦

役花者皆子而早十明讀之烏頭乃天卽一采采元一月昌可附年之後一龍三如

夫白次小附旁早十明讀之烏頭乃天卽一采采元一月昌可附年之後一龍三如

不者之種而生水一會之烏頭乃天卽一采采元一月昌可附年之後一龍三如

足爲形一散者攀月昌可附年之後一龍三如

上不而生爲縮播四不註本雄附年之時植物後一龍三如

高也鐵正子者附而種鄉辯射經烏子種各月者至方種芮四豪圃核者陷黑
 子謹色二爲子小春產而罔所喙之之者爲成所及艾者爲烏頭後其種宗天蠶子是鐵
 三漏又蓋月附明之列側母便有異而廣志不其餘有大物以長二尺龍州五如芋
 即按鳥此次缺則籃左生子矣烏子今是謂五物毒附本草皆爲附三棱葉先將依大子
 乾保喙記之風稍子右長而苗其赤說途今是謂子之川豈大物以長二尺龍州五如芋
 又昇也所青鐵大皆附成而其亦入人生之物四四子也冬采附三棱葉先將依大子
 法曰天載緣者種脈而也雲致諸謂子烏今人種野多每故貳烏頭象命春之法未
 以錐漏者爲一絡偶九月采者采而歲以故貳烏頭象命春之法未用側子春八角天雄
 米附籃爲下連生者采而歲以故貳烏頭象命春之法未用側子春八角天雄

粥子天即下本子貫爲者采而歲以故貳烏頭象命春之法未用側子春八角天雄

雷及烏雄雷天草特如生者乃澤其上漢雲是名未生用力子二年采者爲割紫五七

淹側方木天八大而品類熟領之也若生子力倍二年采者爲割紫五七

並烏無子皆者子者七麻作八尤曰子故至年爲烏頭博彰旁穗其糞之謂十一

不喙此大以爲之以爲本而望惟不其少曰至年爲烏頭博彰旁穗其糞之謂十一

及采名豐良形貴天同厚取彰近汁及春故采爾烏頭博彰旁穗其糞之謂十一

前得功所實其雄而其種明理煎獨采爾烏頭博彰旁穗其糞之謂十一

功用謂盈角附末花於出宋爲繁烏頭博彰旁穗其糞之謂十一

一坐虎握爲坐附而異紫龍附人射者烏頭乎年志言縣角爲附附子子正皮

頤熟相掌者側正名尖其瓣安子楊罔卽烏頭乎年志言縣角爲附附子子正皮

曰湯同者爲子節也者初黃龍彰天陶無冬一時時時時時時時時時時時時時

一浸爾也勝之角凡爲種黎州明惠宏此則時時時時時時時時時時時時時時

其漏說少種天之長齊領著景數生珍子子曰烏頭之惟附子子正皮

籃甚者一錐小苞歸鄉附不物子曰烏頭之惟附子子正皮

側謬附者而木二子知也已一烏頭爲天雄水之絕小鄉者最佳者亦

子矣上子而爲圓門十記烏其故頭烏雄水之絕小鄉者最佳者亦

則附有六上烏七青惟甚頭產曰有兩物也春秋年爲天雄水之絕小鄉者最佳者亦

園子節七出頭月雄赤悉有江人之多以者附采小水今二左冬種出彰明然側子子正皮

人之上爲烏頭謂諸水其要附子子等處者其者天雄水之絕小鄉者最佳者亦

乞以乳則側頭謂諸水其要附子子等處者其者天雄水之絕小鄉者最佳者亦

役花者皆子而早十明讀之烏頭乃天卽一采采元一月昌可附年之後一龍三如

夫白次小附旁早十明讀之烏頭乃天卽一采采元一月昌可附年之後一龍三如

不者之種而生水一會之烏頭乃天卽一采采元一月昌可附年之後一龍三如

足爲形一散者攀月昌可附年之後一龍三如

上不而生爲縮播四不註本雄附年之時植物後一龍三如

之陽虛。元除臟腑沉寒。三陽厥逆。溼淫腹痛。胃寒蠕動。治經閉。補虛散壅。李杲督脈爲病。脊強而厥。古治三陰傷寒。陰毒寒疝。中寒中風。痰厥氣厥。柔痓癲癇。小兒慢驚。風溼麻痺。腫滿脚氣。頭風。腎厥頭痛。暴瀉脫陽。久痢脾泄。寒瘞瘴氣。久病嘔噦。反胃噎膈。癰疽不斂。久漏冷瘡。合葱涕塞耳治聾。時珍

烏頭卽附母

【主治】諸風風痹血痹。半身不遂。除寒冷溫養臟腑。去心下堅痞。感寒腹痛。元除寒溼行經。

散風邪。破諸積冷毒。李果補命門不足。肝風虛古助陽退陰。功同附子而稍緩。時珍

【發明】一宗奭曰一補虛寒須用附子。風家卽多用天雄。大略如此。其烏頭性輕疎溫。脾逐寒川。烏頭性重滯溫。脾去風。若是寒疾。卽用附子。風疾卽用川烏頭。一云凡人中風不可先用風藥及烏附。若先用氣藥。後用烏附。乃宜也。又凡用烏附藥。並宜冷服者。熱因寒用也。李東垣治馮翰林姪陰盛格陽傷寒。面赤目赤。煩渴引飲。脈來七八至。但之則散用薑附湯加人參投半斤服之。得汗而愈。此則神聖之妙也。吳綬曰一附子乃陰證要藥。凡按此反傷寒傳變。三陰及中寒夾陰。雖身大熱而脈沉者必用之。或厥冷腹痛。脈沉細甚。則昏憒囊縮者急用之。有退陰同陽之力。起死回生之功。近世陰證傷寒。往往疑似不敢用。附子直待陰極陽竭而用之。已遲矣。且夾陰傷寒。內外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。溫經散寒。捨此用已尙何以救之。劉完素曰俗方治麻痺多用烏附。其氣暴能衝開道路。故氣愈麻。及藥氣盡而急用。原氣行。則烏附子以白朮爲佐。乃除寒溼之聖藥。溼藥入血分。以滋養不足之氣。虛熱甚者。引發散藥開腠理。宜少加之。引經又益火。惟可爲下部藥誤矣。附子無人表。其害取人表。表而不守。人之多行之。正不之其行之。

黃藥附子丸相習用爲治風之藥及補藥殺人多矣。王履曰：「仲景八味丸兼陰火不足者設附子乃補陽之藥，非爲行滯也。」好古曰：「烏附非身涼而四肢厥者不可僭用，服藥也。又瑣碎錄言滑臺風土極寒民嘆附子如啖芋栗，此則地氣使然爾。」

【附方】舊新八十七少陰傷寒。初得二三日脈微細，但欲寐，小便色白者，麻黃去節二兩、甘草炙二兩，附子炮去皮一枚，水七升先煮麻黃去沫納二

微味汗取三升分作三服。取少陰發熱二兩附子炮去皮一枚，細辛二兩水一斗先煮麻黃去沫，乃納二

三服同上。少陰下利，少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆，脈微欲絕，身反不惡寒其人面赤色。

或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者，通脈四逆湯用大附子一個去皮。

或解反惡寒者虛也，芍藥甘草附子湯補之，芍藥三兩，甘草三兩，大附子一枚水五升煮取一升五合分服。

同上。傷寒發躁煩躁不得眠夜不安靜，日

陰盛格陽，傷寒論之乾薑一兩。

陰盛格陽，傷寒而不能飲水脈沉手足厥微發躁，其人必躁，每服沉手足厥微發躁不止者附

子湯溫之乾薑一兩。

陰盛格陽，傷寒而不能飲水脈沉手足厥微發躁，其人必躁，每服沉手足厥微發躁不止者附

子湯溫之乾薑一兩。

陰盛格陽，傷寒而不能飲水脈沉手足厥微發躁，其人必躁，每服沉手足厥微發躁不止者附

子湯溫之乾薑一兩。

煙酒或汗出或不出候心定則以水解散之類解之不得與冷水如渴更煎津服屢用多效。中風痰厥半兩生南星一兩生木香二錢五分每服五錢生薑十片水二盞煎一盞溫服。
 厥瘡瘍不知人口眼喫斜並體虛之人患瘡疾寒多者五生飲用生川烏頭生附子並去皮膚各七分服王氏簡易方半身不遂浸二七日隔日飲——合以無灰酒一升風病癱緩斜語音蹇澤步履中風偏廢臍羌活湯用生附子一個去皮生木香中風偏廢臍羌活烏藥各一兩每服四
 不正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮膚五靈脂各五兩爲末入龍腦麝香五分滴水爲丸如彈子每服一丸先以生薑汁研化暖酒調服一日二服至五七丸便覺手腳移得步十九丸可以梳頭也。
 師風寒溼痹麻木不仁或手足不遂生川烏頭末每以香白米煮粥一盞入末四錢慢熬得所下大匙蜜三匙空腹啜之或入薏苡末二錢左傳云風淫末病謂四末也脾主四肢風氣客肝則侵脾而四肢病也此湯極有體虛有風十片水一盞半慢火煎服予曾病此醫傳張子發授生天南星各二錢。大腸病亦可服。
 方二服本事方口眼喫斜生烏頭青藥各等分爲末每用一字噙入鼻內口卒喫瘡吹入喉中瘻千金子治度身如角弓反張口噤不語川烏頭五兩剉塊黑大豆半升同炒半黑以酒三升傾鍋內急炒納酒中服。
 產後中風以絹濾取酒微溫服一小盞取汗若口不開拗開灌之未效加烏雞糞一合炒納酒中服。
 痘瘍色爲度去皮膚五靈脂一丸治諸風症燒言語蹇偏身麻痛皮膚瘡痍及婦人血風頭痛目眩川烏頭痛面浮腫令裂麻此薑淫汁。
 小兒慢驚搐搦全幼心鑑小兒顫陷綿烏頭生去皮膚一盞薑七片煎服一兩全蠟十個去丸亦治丈夫風疾梧子大溫酒或熱水每服二十丸和劑方婦人血風虛冷月候不勻或手腳心煩熱或頭面浮腫令裂麻此薑淫汁。
 柱星各二錢爲末薑湯服小兒慢驚搐搦全幼心鑑小兒顫陷綿烏頭生去皮膚一盞薑七片煎服一兩全蠟十個去丸亦治丈夫風疾梧子大溫酒或熱水每服二十丸和劑方婦人血風虛冷月候不勻或手腳心煩熱或頭面浮腫令裂麻此薑淫汁。
 如染椹色爲度去皮膚五靈脂一丸治諸風症燒言語蹇偏身麻痛皮膚瘡痍及婦人血風頭痛目眩川烏頭痛面浮腫令裂麻此薑淫汁。
 子大空心溫酒鹽湯下二十丸亦治丈夫風疾梧子大溫酒或熱水每服二十丸和劑方婦人血風虛冷月候不勻或手腳心煩熱或頭面浮腫令裂麻此薑淫汁。
 薑湯服小兒慢驚搐搦全幼心鑑小兒顫陷綿烏頭生去皮膚一盞薑七片煎服一兩全蠟十個去丸亦治丈夫風疾梧子大溫酒或熱水每服二十丸和劑方婦人血風虛冷月候不勻或手腳心煩熱或頭面浮腫令裂麻此薑淫汁。
 柱骨內服瀉青丸全幼心鑑小兒顫陷綿烏頭生去皮膚一盞薑七片煎服一兩全蠟十個去丸亦治丈夫風疾梧子大溫酒或熱水每服二十丸和劑方婦人血風虛冷月候不勻或手腳心煩熱或頭面浮腫令裂麻此薑淫汁。
 星各二錢爲末薑湯服小兒慢驚搐搦全幼心鑑小兒顫陷綿烏頭生去皮膚一盞薑七片煎服一兩全蠟十個去丸亦治丈夫風疾梧子大溫酒或熱水每服二十丸和劑方婦人血風虛冷月候不勻或手腳心煩熱或頭面浮腫令裂麻此薑淫汁。

五癰癥或癰瘍疼痛腰膝痺痛或打撲傷損閃肭痛不可忍生川烏不去皮五靈脂各四兩威靈仙兩洗焙爲末酒糊丸梧子大每服七丸至十丸鹽湯下忌茶此藥常服其效如神普濟方 風癆
肢痛半錢焙爲末釀醋熬稠丸綠豆大每溫酒下七丸日一服聖惠方全蠍腰脚冷癆疼痛有風川烏頭散醋調塗帛上貼之大風諸癆淡滌脹滿大附子半兩者二枚炮拆酒漬之春冬腳氣腿腫久不癰者須臾痛止聖惠方大風諸癆五月夏秋三日每服一合以瘥爲度聖惠方黑附子一升
個生去皮膚爲散生薑汁調如膏塗十脂疼痛麻木不仁生附子去皮臍木香各等分搜風順氣丸用川烏頭二十個香附子半斤薑汁淹一宿炒焙爲末酒糊丸梧子大每溫酒下十丸肌體肥壯有風疾者宜常服之瀋寧方頭風頭痛炒令黃末之以絹袋盛浸三祕旨用附子一枚生去皮臍綠豆一合同入跳子內煮豆熟爲度去附子食綠豆立瘥每個可齧五次
服後爲末風毒頭痛聖惠方治風毒攻注頭目痛不可忍大附子一枚炮去皮爲末以生薑一兩大黑豆一合炒熟同酒一盞煎七分調附末一錢溫服○又方治二三十年頭風不愈者用大川烏頭溫服○朱氏集驗方治頭痛連睛者生烏頭一錢白芷四錢爲末茶服一字仍以末嚙鼻有人用
之得風寒頭痛十便良方治風寒客于頭中清涕項筋急硬胸中寒痰嘔吐清水用大附子或大川烏頭溫服隔三四日一眼或加防風一兩○三因方必效散治風寒流注偏正頭痛年久不愈最有神效用大附子一個生切四片以薑汁一盞浸炙再炙汁盡乃止高良薑等分爲末每服一錢臘茶清調下
忌熱物頭風摩散沐頭中風多汗惡風當先風一日則痛甚用大附子一個炮食鹽等分爲末以方寸七摩頸上令藥力行或以油調稀亦可一日三上張仲景方年久頭痛
愈服川烏頭天南星等分爲末腎厥頭痛指南方用大附子或大陽元根治水一升半煎分三服○經驗川烏頭水燒烟熏碗內溫茶泡服之虛頭炮熱去皮生薑半兩水一升半煎分三服○經驗川烏頭如破眼晴如錐刺大引烏頭去皮微炮全蠍頭痛不可忍者大附子一枚去皮微調丸綠豆大每服十九丸茶清一下○僧臘頭皮膚
緣以愈服豆櫻米大每薄荷茶下十分丸一日一服氣虛頭痛研氣末葱汁川烏頭天南星等分爲末腎厥頭痛良方韭根丸治水一升半煎分三服○經驗川烏頭水燒烟熏碗內溫茶泡服之虛頭炮熱去皮生薑半兩水一升半煎分三服○經驗川烏頭如破眼晴如錐刺大引烏頭去皮微炮全蠍頭痛不可忍者大附子一枚去皮微調丸綠豆大每服十九丸茶清一下○僧臘頭皮膚

辨證取其通氣湯。使以達下鹽以引用。使虛氣下歸。對證用之無不作效。大附子一枚。別心入全蠍包附。燒熟去皮研末。慈涎和丸。梧子大。每椒驪湯下五十丸。腎氣上攻。頭項不能轉移。椒附丸用二錢。以椒二十粒。用白麵填滿椒口。水一盞半。薑七片。煎七分。鼻淵腦泄。生附子未。慈涎和如灌耳中。去鹽空心點服。椒氣下達。以引逆氣歸經也。本事方。鼻淵腦泄泥。重涌泉穴。普濟耳鳴。不止。無晝夜者。烏頭燒作灰。菖蒲等分。爲末。耳卒聾閉。上炎二七壯。本草拾遺。或更於聰耳膿血。生附子爲末。慈涕和。附子去皮。炮令拆。以蜜塗上炙之。令蜜入舍勿久。患口瘡。生附子爲末。醋浸削尖插之。或更於聰耳膿血。生附子未。慈涕和。附子已成者。卽臘出未成者。卽消出。本草拾遺。換水日足。取焙出。不正削附子赤皮末。如蠶砂。一丸咬之。○刪繁方。用炮附子末。納孔中。乃止。眼暴赤腫。痛。砂。一切冷氣。去風痰。定遍身疼痛。益元氣。強力固精益髓。令大便浸七日。逐日添令溢出。揀去壞者。不用。餘以竹刀切作四片。新汲水淘七次。乃浸之。日升。降諸氣。不得開。淚出。不得度。張文仲備急方。不得着。皆中以定爲度。附子一大個。分作二服。水二中寒昏困。薑附湯。治體虛中寒。昏不知人。及脾胃冷痛。霍亂。煎一盞。入沈香汁溫服。和劑局方。兩每服三錢。水二鍾。煎心腹冷痛。冷熱氣不和。山巒子川烏頭等分。生研爲末。酒糊丸梧子大。每服鍾溫服。和劑局方。生薑湯下。小腸氣痛。加炒茴香。葱酒下。二十九丸。王氏博。及小腸。糊丸如酸棗大。朱砂爲衣。每服一丸。男子酒下。女人醋湯下。宣明方。生薑。各一兩。爲末。寒症腹痛。達臍。手足厥逆。桂枝湯主之。大烏頭。山巒子各一錢。爲末。順流水入薑汁一匙。調下。丹溪纂要。寒厥心痛。方濟一初不能眠。用大烏頭煎。主之。大烏頭五枚。去臍水三升。煮取一升。去滓。明日更服。又不知再服。又不知加至五合。不瘥。明日更煎。減半。入桂枝湯。主之。烏頭五合。去臍水三升。煮取一升。去滓。得吐。爲中枝金匱。病也。金匱之。得一合解之。玉函方。寒症引脇肋。皆心。

未別以熱蜜和丸梧子大每服二十丸冷鹽湯下永除。崔氏方。濟生方。小腸諸痛。有卒散治寒疝腹痛。附子去皮臍延胡索炒。盡薑七片煎七分溫服。每用二錢水二。腹腫痛加蒺藜子等分。○虛者加桂枝等分薑糊爲丸酒服五十丸。鹿茸去毛酥炙微黃。常步履輕捷。此方本治腰而效乃如此。元臟傷冷。錢驥葱薑棗同煎取一盡空心服去積冷暖下元。肥腸益氣酒食無礙。○梅師方。二虎丸。補元臟進飲食壯筋骨用烏頭附子合四兩。醣醋浸三宿切作片子掘一小坑炭火燒亦以醋三升同藥傾入坑內用盆合之一宿取出去砂土入青鹽四兩同炒赤黃色爲末。醋打麵糊丸如梧子大。胃冷有痰。脾弱嘔吐。生附子半夏各二錢薑十片水二盡煎七空心冷酒下十五丸婦人亦宜。或以豬腰子切片炙熟蘸食。○方便集用大附子一個切下頭子剝一瓣安丁香四十九個在內仍合。或漸逼以生薑自然汁淬之。依前再逼再淬約薑汁盡半碗乃止研末每服一錢粟米飲下。不過三服瘥。反胃。經驗方。用大附子一個生薑一兩剝細同煮研如麵糊每米飲化服一錢。○衛生家寶方用薑汁打糊和附子末爲丸。大黃爲衣。每溫水服十丸。○斗門方用長大附子一個坐于磚上。四面著火。每定線繫入砂铫內以薑汁浸過文火熬乾爲末。忌毒物生冷脾寒瘡疾多熱少或但寒不熱。宜七聚湯主之。用附子一枚炮七次許置掌心舐日十數次。○附子一錢半水一盞。薑七片棗一枚煎七分發日早溫服。○肘後方臨發時以醋和附子去皮草果仁各二錢。重五錢者。麵煨人參丹砂各一錢爲末。煉蜜丸梧子大每服二十丸。安常傷寒論。瘡瘍寒熱。往來頭痛熱。身分疼。未發前連進三服中病則吐。或身體麻木未中病來日再服。李待制云此方極妙。章傑云。嶺南以啞瘡爲危急。不過一二日而死。醫謂極熱感寒也。用生

寒勝邪乎。真起死回生之藥也。嶺南衛生方。小便虛閉。
入寒痞隔。故水凝而不通。惟服沉附湯。則小便自通。喘滿自愈。用生附子一錢。磨水同煎。食前冷飲。附子雖三十枚。亦無害。小兒每服三錢水煎服。朱氏集驗方。脾
虛溼腫。大附子五枚去皮四破。以赤小豆半升藏附子子中。慢火煮熟。去豆焙。朱氏集驗方。陰水腫滿。白皮五升水下。朱氏集驗方。陰水腫滿。白皮五升水
入沉香一錢。研末。以薏苡仁粉打糊丸。梧子大每服十九丸。蘿蔔湯下。朱氏集驗方。陰水腫滿。白皮五升水
○又方。大附子童便浸三日夜。逐日換尿。以布擦去皮。搗如泥酒糊和丸。小豆大每服三十丸。煎流氣子一錢。研末。以薏苡仁粉打糊丸。梧子大每服十九丸。蘿蔔湯下。朱氏集驗方。陰水腫滿。白皮五升水
普濟方。大腸冷祕。附子一枚炮去皮。取中心如棗大。爲老人虛泄。末醋糊丸。梧子大米飲下。五十丸。
楊氏家藏方。治氣洞泄。生川烏頭一兩。木香半兩。爲末。醋糊丸。取小便利爲佳。忌油膩酒麪魚肉。
梧子大每陳皮湯下二十丸。本草方。臟寒脾泄。蔻二兩。煨熟大附子去皮膚一兩。赤石脂一兩爲
五錢。爲末。粥丸。梧子大每服八十九丸。蓮肉煎湯下。○十便良方。治脾胃虛冷。大腸滑泄。米穀不化。乏力。
用大附子十兩。連皮同大棗二斤。於石器內以水煮一日。常令水過兩指。取出每個切作三片。再同黃
半日削去皮。切焙爲末。別以棗肉和小兒吐泄。注下小便少。白龍丸。用熟附子五錢。白石脂。煅龍骨。煅
丸梧子大每空心米飲服。三四十丸。小兒吐泄。注下小便少。白龍丸。用熟附子五錢。白石脂。煅龍骨。煅
丸全幼霍亂吐泄。不正附子重七錢者。炮去皮膚爲末。每服四錢水。水。水泄久痢。川烏頭二枚。一生用一
心鑑。黃連綠豆大每服五丸。久痢赤白。獨聖丸。用川烏頭一個。灰火燒烟盡。取出地上。蓋上。蓋良。研
下並空心服之。忌熱物。經驗良方。經驗良方。經驗良方。經驗良方。經驗良方。經驗良方。經驗良方。
痢欬逆脈沉陰寒者。退陰散主之。陳自明云。一人病下血虛寒。爲末。每服三錢米飲下。○又方。熟附子
一枚去皮。一生薑三錢。牛水煎服。陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁入酒少許。以熟附子一兩。研末。以膏和
並聖惠方。陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁入酒少許。以熟附子一兩。研末。以膏和丸。梧子大傾下。聖濟總錄下。
或加黑豆一百粒。並聖惠方。陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁入酒少許。以熟附子一兩。研末。以膏和丸。梧子大傾下。聖濟總錄下。
草黑豆煎湯冷吞。如瀉及肚痛。以水吞。久痢休息。熱附子半兩研末。雞子白二枚搗和。甘草二錢。研末。以
下並空心服之。忌熱物。經驗良方。經驗良方。經驗良方。經驗良方。經驗良方。經驗良方。經驗良方。
痢欬逆脈沉陰寒者。退陰散主之。陳自明云。一人病下血虛寒。爲末。每服三錢米飲下。○又方。熟附子
一枚去皮。一生薑三錢。牛水煎服。陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁入酒少許。以熟附子一兩。研末。以膏和丸。梧子大傾下。聖濟總錄下。
並聖惠方。陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁入酒少許。以熟附子一兩。研末。以膏和丸。梧子大傾下。聖濟總錄下。
或加黑豆一百粒。並聖惠方。陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁入酒少許。以熟附子一兩。研末。以膏和丸。梧子大傾下。聖濟總錄下。

搗丸梧子大每空心米飲下三十九昔葛察判妻苦此疾百藥皆試得此而愈屢發屢效余居士選奇方。渡數白濁熱附子爲末每服二錢薑三片普濟方虛火。背熱虛火上行背內熱如火炙者附子末津調塗涌泉穴。摘元方經水不調當歸等分每服三錢水煎服。普濟方斷產下胎生附未醉酒和塗右足心折腕損傷卓氏膏用大附子四枚生切以豬脂一斤三年苦醋。頭乾則以米泔潤之同上癰疽久漏分安瘡口冷膿水不絕內無惡肉大附子以水浸透切作大片厚三自然肌肉長滿研末作餅薛已外科心法癰疽弩肉如眼不斂諸藥不治此法極妙附子削如碩子大以唾黏貼上癰子亦可。痘已外瘡心法癰疽腫毒川烏頭疽肉突烏頭五枚濃醋三升漬三日洗疔瘡腫痛。醋和附子未塗之久生疥癬川烏頭生切以水煎洗甚驗聖惠手足。凍裂塗之良談塗之良古今錄驗。乾再上千金翼久生疥癬煎洗甚驗聖惠手足。附子去皮爲末以水麪調足釘怪疾寒顫惟思飲酒此是肝腎冷熱相呑用炮川烏頭末傳之內。

烏頭附子尖

【主治】爲末茶服半錢吐風痰癲癩。時珍

【發明】

厥逆用附子尖一個硫黃棗大一個蠍梢七個爲末薑汁糊丸黃米大每服十丸米飲下亦治久瀉冠羸凡用烏附不可執爲性熱審其手足冷者輕則用湯甚則用丸重則用膏候手足暖陽氣。回卽爲佳也按此方乃和劑局方碧霞丹變法也非真慢脾風不可輒用故初虞世有金虎碧霞之戒。

【附方】舊新七風厥癲癩。凡中風痰厥附子尖蠍梢各七十個石綠研九度飛過十兩爲末麪糊丸芡子大主之烏頭夏氏奇疾方。韭子湯效。

丸薄荷汁半盞化下更服。

小兒驚癇加白僵蠶等分。

分合須臾吐痰。

和劑局方臍風撮口。

香生川少許爲末以少許吹鼻得嚏。

丸薄荷半條酒浸乃以薄炙。

荷麝每用烏頭一頭。

湯瀨一字水類方木舌腫脹川烏尖巴豆研細末調塗刷集簡方牙痛難忍生研爲末點之永類方鈴丸用生川烏尖七個巴豆七枚去皮油爲末糕糊丸梧子大朱砂麝香爲衣每服二丸空心冷酒或冷鹽湯下三兩日一服不可多濬療方洗了貼之以愈爲度古今錄驗老幼口瘡塗烏頭尖一個天南星一個研末薑汁和

卷十七下

草之六

大雄下本品經

釋名白幕本經長而不生子故曰天雄乃種附子而生出或變出其形也。
集解別錄曰天雄生少室山谷二月采根陰乾宏景曰今采用八月中旬天雄似附子細建錢塘閒者謂爲東建氣力小弱不相似故曰西水猶勝東白也其用灰殺之時有水強者不佳恭曰天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有力弱不相似陶以三物俱出建平故名之恭備但始種而不生附子側子經年獨長大者是也蜀人種之尤忌生此以爲不利如養蠶而成白殼之形入藥形狀不一時珍曰天雄有二種一種是蜀人種附子而生出長者或種附子而盡變成者爲天雄是也入藥形狀不一時珍曰天雄乃種附子而生出或變出其形也。

二升沃之候乾乘熱入天雄在內小盆合一夜取出去臍用之。

【氣味】辛溫有大毒。○別錄曰：「甘大溫。」權曰：「大熱宜乾薑制之。才曰：「遠志爲之使。惡商婢忌政汁。」

【主治】大風寒溼痹。歷節痛拘攣緩急。破積聚邪氣。金瘡強筋骨輕身健行。本經療頭面風去來疼痛。心腹結聚關節重不能行步除骨間痛。長陰氣強志令人武勇力作不倦。別錄：「禹錫曰：『按淮南子云一枝納雄雞腸中。』治風痰冷痹軟脚毒風能止氣喘促急殺禽蟲毒。甄權治一切風一切氣助陽道暖水臟補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脈四肢不遂下胸膈水破痃癖癰結排膿止痛續骨消瘀血。」

背脊僵僂霍亂轉筋發汗止陰汗炮食治喉痹。大明。

【發明】宗奭曰：「補虛寒須用附子。風家多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取其數散也。」元素曰：「非天雄不能補上焦之陽虛。」震亨曰：「天雄烏頭氣壯形偉可爲下部之佐。」時珍曰：「烏附天雄皆是補下焦命門陽虛之藥。補下所以益上也。若是上焦陽虛卽屬心脾之分當用參芪不當用天雄也。且烏附天雄之尖皆是向下生者其氣下行其臍乃向上生苗之處。寇宗奭言其不肯就下張元素言其補上焦陽虛皆是誤認尖爲上爾。惟朱震亨以爲下部之佐者得之而未發出此義。雷敦炮炙論序云：「咳逆數數酒服熟雄謂以天雄炮研酒服一錢也。」

【附方】新三建湯治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷。大小便滑數小便白渾六脈沈微除潤冷扶元氣片煎八分溫。男子失精兩爲散每酒服半錢。張仲景金匱要略：「大風惡癩及根去土勿洗搗汁漬細苗。」

初粒黑豆摩去皮不落者一夜取出曬乾又浸如之卽死。七枚禁房室豬肉雞蒜犯之卽死七次。

【釋名】**側子**。時珍曰。生子附側故名。許慎說文作薦子。

【集解】宏景曰。此附子邊角之大者。剖取之。昔時不用。比來醫家以療脚氣多驗。恭曰。側子下旁出者。以小者爲側子。大者爲附子。今以附子角爲側子理不然。若當用。比來都下皆用細附子。有角如大豆。許夔州以上劍南所出者。附子之角但如黍粟。保昇曰。今附子邊果有角如大棗核及檳榔。以豈小者爾。故吳普陶宏景皆指爲附子。角旁出附子。附子旁出側子甚明。時珍曰。側子乃附子旁黏者。其又小者。卽漏籃子矣。故楊氏附子記言。側子連以豈漏籃園人皆不重之。以乞役夫。

【脩治】同附

【氣味】辛。大熱。有大毒。普曰。神農岐伯有大毒。八月采畏惡與附子同。

【主治】癰腫風癆。歷節腰脚疼。冷寒熱鼠瘻。又墮胎。別錄。療脚氣冷風溼癆。大風筋骨攣急。甄權。冷酒調服。
治遍身風癬。神妙。雷公教言。

【發明】機曰。烏頭乃原生之腦。得母之氣。守而不移。居乎中者也。側子散生旁側。體無定在其氣子則餘氣所結。其形摧殘。宜其不入湯服。令人喪目也。時珍曰。唐元希聲侍郎治癰瘍風。有側子湯。見外臺祕要藥多不錄。

漏籃子

綱目

【釋名】**木鼈子**。炮炙論。虎掌。日華。時珍曰。此乃附子之瑣細未成者。小而漏籃。故名。南星之最小者。子五十對。烏頭五十對。漏籃二十粒。不知何用。

【氣味】苦辛。有毒。一數曰一服。

【主治】惡痢冷漏瘡惡瘡癰風。

珍時

【發明】用而輕用之。又恐熱氣乘虛變移。結核而爲害尤甚也。又按類編云。一人兩足生瘡臭潰難近。夜宿五夫人祠下。夢神授方。用漏籃子一枚。生研爲末。入膩粉少許。并水調塗。依法治之。果愈。蓋此物不堪服餌。正宜入瘡科也。

【附方】新

一切惡痢。

雜下及休息痢。百歲丸。用漏籃子一箇。大者阿膠木香黃連。粟殼各半兩。俱炒少許爲末。糊丸梧子大。每一歲一丸。米飲下。

羅天益衛生寶鑑。

鳥頭

本經

校正

併入拾遺

獨白草

下品

校正

獨白草

本經

即草烏頭

綱目

土附子

日

奚毒

本

耿子

普

吳公名帝秋金鴉

綱

苗名蕡

音

董近獨

白草

拾鴻鶯菊

目

汁煎名射罔

卽烏之口也

恭曰

烏喙卽烏頭

異名也

此有三歧者

然兩歧者少

名曰烏喙

若烏頭兩歧名烏喙則天雄附子之兩歧者復何以名之

時珍曰

此卽烏頭之野生

于他處者俗

謂之草烏頭亦曰竹節烏頭出江北者

曰淮烏頭日華子所謂土附子者是也

烏喙卽偶生兩歧者今

俗呼爲兩頭尖因形而名其實乃一物也

附子天雄之偶生兩歧者亦謂之烏喙

功亦同于天雄非外

鳥頭

也蘇恭不知此義故反疑之草烏頭取汁嚙

爲毒藥射禽獸

陳藏器所引續漢五行志言西國生獨白草煎爲

藥敷箭射人卽死者告此烏頭非川烏頭也

荊譜云鴛鴦即烏喙苗也

秋收烏頭爲毒藥射禽獸故有射罔之稱

後魏書言遼東塞外

之稱

亦謂之烏喙

功亦同于天雄非外

集解

始生葉厚莖方中空葉四相當與蒿相似

宏景曰今采用四月亦以八月采搗莖汁

乾長三寸已上者爲天雄

普曰正月

日煎爲射罔獨人以傳箭射禽獸十步卽倒中人亦死

宜速解之朝陵屬汝南郡

大明曰土附子其根外黑內白隨走獸遇之僵

枯燥爲異爾然毒則甚焉段成式酉陽雜俎

言雀李狀但如此係野生又無釀蜜造地反乾飛鳥觸之隨走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言

言雀李同狀但如此係野生又無釀蜜造地反乾飛鳥觸之隨走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言

建甯郡烏勾山有牧鹿草。烏鵲誤食烏喙中。毒必急食此草以解之。牧鹿不知何藥也。

【脩治】用或以烏大豆同煮熟去其毒用。

烏頭【氣味】辛溫有大毒。別錄曰甘大熱中毒。普曰神農雷公桐君黃帝甘有毒。權曰之才曰莽草遠志爲之使反牛夏枯樓貝母白薇白芨惡藜蘆。時珍曰伏丹砂砒石忌豉汁畏鉛糖黑豆冷水能解其毒。

【主治】中風惡風洗洗出汗除寒溼痹。欬逆上氣破積聚寒熱其汁煎之名射罔殺禽獸。本經消胸上痰冷食不下心腹冷痰臍間痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎別錄主惡風憎寒冷痰包心腸腹污痛痃癖氣塊齒痛益陽事強志甄權治頭風喉痹癰腫疔毒時珍。

烏喙一名兩頭尖【氣味】辛微溫有大毒。普曰神農雷公桐君黃帝有毒。

權曰苦辛大熱○畏惡同烏頭。

【主治】風溼丈夫腎溼陰寒癢寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎別錄男子腎氣衰弱陰汗瘰癧歲月不消甄權主大風頑痹時珍。

射罔【氣味】苦有大毒。之才曰溫。大明曰一人中射罔毒以甘草藍汁小豆葉淨萍冷水薺芭皆可一味藥之。

【主治】戶疰癥堅及頭中風癆別錄瘻瘡瘡根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取塗肉四畔漸漸近瘡習習逐

病至骨瘡有熱膿及黃水塗之若無膿水有生血及新傷破即不可塗立殺人器藏

【發明】時珍曰草烏頭射罔乃至毒之藥非若川烏頭附子人所識種加以釀制殺其毒性之比

非風頑急疾不可輕投甄權藥性論言其益陽事治男子腎氣衰弱者未可遽然也此類止

能搜風勝溼。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒而已。豈有川烏頭附子補右腎命門之功哉。吾蘇郝知府自負是嘴乎。楊清叟曰：「一凡風寒溼痹骨內冷痛及捐傷入骨年久發痛或一切陰疽腫毒並宜草烏頭南去黑爛二藥性味辛烈能破惡塊逐寒熱遇冷即消遇熱即潰者能」

【附方】舊十四新

陰毒傷寒。生草烏頭爲末以葱頭蘸藥納穀道中名提盆散。

王海藏陰證略例二便不通。卽上方名中風癱瘓掉言語

塞濬左經丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去皮二兩乳香沒藥各一兩爲末生烏豆一升以斑蝥三七箇去頭翅同煮豆熟去殼取豆焙乾爲末和勻以醋麪糊丸梧子大每服三十丸溫酒下簡易

方癱瘓頑風骨節疼痛下元虛冷諸風痔漏下血一切風瘡草烏頭川烏頭兩頭尖各三錢硫黃麝香各一錢木鼈子五箇爲末以熱蕲艾採軟合處用草紙包裹燒薰痛處名雷丸

孫天仁諸風不遂。宋氏集驗方用生草烏頭炮去皮四兩梧子大每服三十丸溫酒下簡易

丸白湯下甚妙勿多服恐麻人名鄂渚小金丹○經驗濟世方用草烏頭兩頭尖各三錢硫黃麝香各一百杵作餅焙乾爲末酒糊丸梧子大每空心鹽湯下十丸名至寶丹白一切頑風神應丹用生草烏頭兩頭尖各三斤爲末葱三斤蓋之待出汗黃一日夜乃嚏之春爲末一二分溫酒和好酒熱服

集效方成膏作成小錠子每一小坑其下燒火將盆放坑上每日用竹片攢一次夜則露之

乾坤祕韞○儒門事親方用草烏頭爲末每以一二分溫酒和服之

搗頭分播爛絞汁傾盆中砌每小坑以沙瓶煮三伏時去豆將烏頭入木白一切頑風神應丹用生草烏頭兩頭尖各三斤爲末葱三斤蓋之待出汗黃一日夜乃嚏之春爲末一二分溫酒和服之

餅子以草鋪盤內加楮葉於上安餅於葉上又鋪草葉蓋之待出汗黃一日夜乃嚏之春爲末一二分溫酒和服之

取汁資麪糊和丸梧子大初服三十丸日二

破傷風病出汗○儒門事親方用草烏頭爲末每以一二分溫酒和服之

五將少服服後身癆汗出卽愈避風乾坤祕韞○儒門事親方用草烏頭爲末每以一二分溫酒和服之

每服少服服後身癆汗出卽愈避風乾坤祕韞○儒門事親方用草烏頭爲末每以一二分溫酒和服之

一六五月分豆腐冷風溼氣以乾入鍋中煮入鍋中冷酒一盞汗出卽愈活人之心爲未

風溼走痛香沒藥箭丸當歸各兩頭尖爲末靈脂各一錢研五靈脂等分皮爲未

再服每服少服服後身癆汗出卽愈活人之心爲未

風溼走痛香沒藥箭丸當歸各兩頭尖爲末靈脂各一錢研五靈脂等分皮爲未

九月六日滴水荷丸生化子湯湯入鍋中冷酒一盞汗出卽愈活人之心爲未

風溼走痛香沒藥箭丸當歸各兩頭尖爲末靈脂各一錢研五靈脂等分皮爲未

再服每服少服服後身癆汗出卽愈活人之心爲未

風溼走痛香沒藥箭丸當歸各兩頭尖爲末靈脂各一錢研五靈脂等分皮爲未

十九 薑十片 藜三枚 慈三根 煎湯清早服 以棗壓之 如人腹中癥結害妨 飲食羸瘦射罔二兩 檀
行十里許再一服絕勿飲湯便不發也 蘇東坡良方 搗末雞蛋白和丸麻子大粒 每服三粒
一丸漸至三丸以水泄寒痢 大草烏一兩以一半生研一半燒灰 醋糊和丸綠豆 泄痢注下三神丸每服
愈爲度 肘後方 水泄寒痢 大每服七丸非華水下忌生冷魚肉 十便良方 泄痢注下清濁不分治
灌瀉注下或赤或白腹臍刺痛裏急後重用草烏頭三箇去皮尖以一箇火炮一箇醋煮一箇燒灰爲分治
末醋糊丸綠豆大每服二十丸水瀉流水下赤痢甘草湯下白痢薑湯下忌魚腥生冷和劑局方
結陰下血 腹痛草烏頭蛤粉炒去皮臍切一兩茴香炒三兩每用三錢 不知出者草烏頭一
同鹽炒爲末酒糊丸綠豆大普濟內痔不出 草烏爲末津調點肛門內痔即反出 乃用枯痔藥點之
每服二十丸鹽湯下普濟內痔不出 外科集驗方 疝毒初起 草烏頭七箇川
九箇飛羅麪一兩爲末無根水調搽留口 疝毒惡腫 生烏頭切片醋熬成膏撲貼次日根出○又方兩
以紙蓋之乾則以水潤之 唐瑤經驗方 疝毒惡腫 頭尖一兩巴豆四箇搗貼疔自拔出 普濟方
疗瘡發背 草烏頭去皮爲末用慈白連髮和搗丸豌豆大以雄黃爲末每服一丸先將慈一根細嚼以
熱酒送下或有惡心嘔三四口用冷水一口止之卽舐以被厚蓋汗出爲度亦治頭風乾
坤祕惡毒諸瘡汁 及發背疔瘡便毒等證 二烏青用草烏頭川烏頭子瓦上以井華水磨
蠶塗之如有口卽塗四邊乾再上亦可單用草烏磨醋塗之 永類方 大風癬瘡黑色
肌體麻木 痛痛不常 草烏頭一斤刮洗去皮極淨搗乾以清油四兩鹽四兩同入銚內炒令深黃色傾
出剩油只留鹽并藥再炒令黑烟出爲度取一枚擘破心內如米一點白者始好白多再炒乘熟杵羅
毒難制五七日聞以黑豆煮粥食解其毒 溫酒下草烏性遍身生瘡 陰癰兩脚尤甚者草烏一
大每服三十丸空心鹽湯下灌察方 一切諸瘡 未破者草烏頭爲末入輕粉療癬初作
一箇去膜煨熟竹刀切搗醋糊丸綠豆 木罐子二箇以米醋磨細入搗爛葱頭蚯蚓糞少許
許調匀傳上以紙條貼令通氣孔妙醫林正宗馬汗入瘡腫口痛急療之遲則毒深以生靈苑末
人射罔傳之頻易血 中沙蟲毒射罔傳之 木罐子二箇以米醋磨細入搗爛葱頭蚯蚓糞少許
蠶蟄人出罔傳梅師方 一切諸瘡少許臘豬油和搽普濟方療癬初作草烏頭末破作
蛇兩熱子一傳半寒鹽腰子一傳半熱

【釋名】見後發

【集解】一別錄曰：「白附子生蜀郡三月采。」宏景曰：「此物久絕無復真者。」恭曰：「本出高麗。今相動曰：「徐表南州異物記云：生東海新羅國及遼東。苗與附子相似。」時珍曰：根正如草烏頭之小者，長寸許，乾者皺文有節。」

【氣味】辛甘大溫，有小毒。保昇曰：「甘辛溫。」大明曰：「無毒。」珣曰：「小毒入藥炮用。」果曰：「純陽引藥勢上行。」

【主治】心痛血癆，面上百病。行藥勢。別錄：中風失音，一切冷風氣面酐癩疵。明諸風冷氣，足弱無力，疥癬。

風瘡陰下溼癩，頭面痕，入面脂用。李珣補肝風虛，好風痰，靈古風痰，靈亨。

【發明】也。按楚國先賢傳云：孔休傷煩有癥，王莽賜玉屑白附子，香與之消癩。

【附方】新十中風口喝，半身不遂，正散用白附子白僵蠶全蠶並等分。小兒暑風，暑毒入心，淡塞心，危急之證，非此丸生料瞑眩，眇之則不能伐之。三生丸用白附子天南星半夏並去皮等分，研豬膽汁和丸，蒸米大量兒大，小以薄荷湯下。令兒側臥，嘔出淡水，即甦。全幼心鑑，風痰眩運。

生研豬膽汁和丸，蒸米飯丸，小豆大每服三十丸，食後茶酒任下。御藥院方：偏正頭風，白芷、白附子、天南星半夏等分，研爲末，食後茶清服，仰卧少頃，普濟本事方：痰厥頭痛，蒸餅丸，綠豆大每服四十丸，此後薑湯下。濟生方：自然汁浸，白附子爲末，臥時漿水洗面，以白蜜和，白蒂蘸擦，日數次。簡便方：面上酐，白附子爲末，臘上貼之，久久自落。衛生易簡方：耳出膿水，一兩爲末，豬羊活硫附膏各一筒，每筒入末半錢，溼紙包，喉痹腫痛，白附子末，枯礬等分，研末塗，五更食溫酒下。聖濟錄：偏墜疝氣，津調填臍上，以

火灸三壯，或五壯，即楊起簡便方：小兒吐逆，不定，虛風喘急，白附子薑香等分，爲慢脾驚風。白附子半兩，天南星半錢，並炮去皮，爲兩艾末，保幼大全方：分爲慢脾驚風。白附子半兩，天南星半錢，並炮去皮，爲兩艾末。

未每服二錢。生薑五片水煎服。亦治大人風虛止吐化痰。宣和間真州李博士用治吳內翰女孫甚效。康州陳侍郎病風虛極昏。吳內翰令服三四服即愈。楊氏家藏

虎掌本經下品。天南星宋開寶。

宋
記

釋名虎膏。綱目。鬼蒟蒻。日華。恭曰。其根四畔有圓牙。看如虎掌。故有此名。頌曰。一天南星。近出唐人中風痰毒方中用之。乃後人採用別立此名爾。時珍曰。虎掌因葉形似之。非根也。南星因根圓白。形如老人星狀。故名。南星卽虎掌也。蘇恭說甚明白。宋開寶不當重出南星條。今併入。

南星生研末臘月取黃牛膽汁和劑納入臍中繫懸風處乾之年久者彌佳

【氣味】苦溫有大毒。別錄曰：「微寒。」普曰：「虎掌神農言公苦有毒。岐伯桐君辛有毒。」大明曰：「欲其下行以黃蘗引之。」之才曰：「蜀漆爲之使惡莽草。」畏附子、乾薑。時珍曰：「得防風則不麻。得牛膽則不燥。得火炮則不毒。生能伏雄黃丹砂焰消。」

【主治】心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道經除陰下溼風眩主疝瘕腸痛傷寒時疾強陰權天南星主中風麻痺除痰下氣利腎膈攻堅積消癰腫散血墮胎金瘡折傷瘀血擣傅之器蛇蟲咬疥癬惡瘡明去上焦痰及眩運元素主破傷風口噤身強李補肝風虛治痰功同半夏好古治驚癇口眼喝斜喉痹口舌瘡糜結核解顱時

【發明】「時珍曰：虎掌、天南星乃手足太陰肺脾之藥。味辛而麻，故能治風散血。氣溫而燥，故能勝溼除涎。性緊而毒，故能攻積拔腫。楊士瀛直指方云：諸風口噤宜用南星，更能以人參石菖蒲佐之。」

【附方】舊十新二十九中風口噤之每用中指點末揩齒三二十遍揩大牙左右其口自開。又名破棺散。經驗諸風口噤天南星炮剉大人三錢小兒三字生薑五片蘇葉一錢水煎減半入雄豬膽汁少許溫服。仁齋直指方：小兒口噤牙關不開。天南星一枚透燈用生南星同薑汁擦之自開。一方：小兒驚風上週迴炭火炙裂合溼地出火毒爲末入硃砂一分每服半錢荆芥湯調下每日空心一服。經驗方：吐瀉慢驚天王散治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風濶慢驚天南星一箇安箇一服午時一服。經驗方：吐瀉慢驚重八九錢者去臍黃土坑深三寸炭火五斤煅赤入好酒半盞安箇。南星在內仍架炭三條在上候發娶取剉再炒熟爲末用五錢天麻根熟研末一錢麝乙小兒方風癩痰迷丸用半錢以生薑防風煎湯調下亦治久嗽惡心錢。

天南星九蒸九曬爲末。薑汁麪糊丸梧子大每服二
十九人參湯下石菖蒲麥靈冬湯亦可。衛生寶鑑。小兒癇瘡。癇後瘡不能言。以天南星溼紙包燒爲
灌下。一錢仍炙印堂。摘玄方調服二字。○全幼心鑑。治癇利痰丸梧子大每防風湯化下一丸。普濟方口眼喎斜。天南星生研末自然薑汁調
妙仍以溫酒調服一錢。已死心尙溫者熱童便調灌二錢。關殿破傷風瘡。生南星末水調塗瘡。四婦人
內傷墮壓者酒和童便連灌三服卽甦亦可煎服。三方。一方沃之蓋。二方。風痰頭痛。不可忍。天南星一兩
頭風。攻目作痛。天南星一箇掘地坑燒赤安藥於中以醋一盞。並出經效濟世方。風痰頭運。玉壺丸用生南星生牛夏
頭定勿令透氣候冷研末每服一字。以酒調下重者半錢。千金方。風痰頭痛。荆芥葉一兩爲末。薑
汁糊丸梧子大每食後薑湯下二十丸。○又上清丸用天南星苗。風痰頭運。目眩吐逆煩濁飲食不下。
香等分生研末鹽醋煮糊丸如上法服。並出經效濟世方。風痰頭運。玉壺丸用生南星生牛夏
各一兩。天麻一兩白麪一兩爲末。梧子大每服三十丸。以水腦風流涕。邪風入腦鼻內結硬。逢流
先煎沸入藥煮五七沸瀉出放溫以薑湯吞之。惠民和劑局方。風流涕。髓涕大白南星切片。沸湯
收泡二次焙乾每用二錢棗七箇甘草五分同煎服三四服。其硬物自出腦氣流轉隨涕。直指方。
以大蒜薑茅炭末作餅隔紗貼額前熨斗熨之或以香附薑茅未頻吹鼻中。
塞滯帶涼心壓驚抱龍丸用牛膽南星一兩入金錢薄荷十片丹砂一錢半龍壯人風痰起星香飲用南
胸麝香各一字研末煉蜜丸芡子大每服一丸竹葉湯化下全幼心鑑。壯人風痰起星香飲用南
星四錢木香一錢水二盞生薑十痰迷心竅。壽星丸治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘妄
片煎六木香一錢水王碩易簡方。痰迷心竅。音妄見天南星一斤先掘土坑一尺以炭火三十斤燒赤。
入酒五升滲乾乃安。南星在內益覆定以灰塞之勿令走氣次日取出爲末琥珀一兩硃砂二兩爲風
末生薑汁打麪糊丸梧子大每服三十丸至五十丸煎人參石菖蒲湯下一日三服。和劑局方。風
星四錢水二盞生薑十痰迷心竅。音妄見天南星一枚炮製研末每服一錢。
午晚各博濟方見羊蹄痛。右邊者天南星等分生風痰欬嗽。一天南星一枚炮製研末每服一錢。
竹節內以楮葉滯痰涎。待生黃成麴。每服四十丸。薑湯下。牛夏麴陳橘皮各一兩爲末。自然
全博濟氣痰欬嗽。玉粉大每服半夏去橘皮各一兩爲末。自然薑汁打糊丸如梧清氣化痰。
十全博濟中脘氣滯痰。每服二兩半。桂皮加官桂。東垣開室祕藏。四十丸食後大每服一兩。並湯炮
竹節內以楮葉滯痰涎。待生黃成麴。每服四十丸。薑湯下。牛夏麴陳橘皮各一兩爲末。自然
全博濟氣滯痰。每服四十丸。薑湯下。牛夏麴陳橘皮各一兩爲末。自然薑汁打糊丸如梧清氣化痰。
餅鋪竹節內以楮葉滯痰涎。待生黃成麴。每服四十丸。薑湯下。牛夏麴陳橘皮各一兩爲末。自然
全博濟氣滯痰。每服四十丸。薑湯下。牛夏麴陳橘皮各一兩爲末。自然薑汁打糊丸如梧清氣化痰。

王溫中散滯。爲未薑汁糊丸。梧子大。每五十薑湯下。
砂仁二錢半。酒積酒毒服此即解。天南星丸用正端。天南
星一斤。土坑燒赤沃酒一斗。入坑放南星盆覆泥。固濟一夜。取出酒和水洗淨。切片焙乾爲末。入吐
砂末一兩。薑汁糊丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。蔡丞相呂丞相當用有驗。楊氏家藏方。
泄不止。四肢厥逆。虛風不省。人事服此則陽回。名回陽散。天南星爲末。每服三錢。京棗腸風瀉血。諸藥
天南星石灰炒焦黃色爲末。酒糊丸。吐血不止。研末。每服一錢。以自然銅磨酒調下。勝金方。初生貼
梧子大。每酒下二十丸。普濟方。
頸頭熱鼻塞者。天南星炮爲末。水調貼。頸上炙手熨之。危氏得效方。小兒解頸。頸開不合。鼻塞不通。天南星去皮爲末。淡醋調
頤脫臼。不能收上。用南星未。薑汁調。小兒口瘡。白屑如鵝口。不須服藥。以生天南星去皮膚研。走馬疳
透骨穿腮。生南星一箇。當心剜空。入雄黃一塊。麪裹燒候。雄黃作汁。以風蟲牙痛。南星末塞孔。以霜
盡子合定。出火毒去麪爲末。入麝香少許。拂瘡數日。甚效。經驗方。瘻瘤結核。南星膏治人皮肌頭面上
方。喉風喉癆。汁調服者如粟。或軟或硬。不疼不癢。宜用此藥。不可輒用鍼灸。生天南星大者一枚。研
白。一時珍曰。一此卽天南星之小者。其氣未足。不堪服食。故醫方罕用。惟
重八九錢至一兩餘者。氣足乃佳。正如附子之側子。不如附子之義也。
子。醋調南星末。塗

由跋本經

【釋名】缺。

【集解】「恭曰」由跋是虎掌新根。大于半夏一二倍。四畔未有子牙。其宿根卽虎掌也。「藏器曰」一
由跋生林下。苗高一尺。似蒟蒻根如雞卵。一保昇曰。春抽一莖。莖端有八九葉。根圓扁而肉
白。一時珍曰。一此卽天南星之小者。其氣未足。不堪服食。故醫方罕用。惟
重八九錢至一兩餘者。氣足乃佳。正如附子之側子。不如附子之義也。
子。醋調南星末。塗

【正誤】「宏景曰」由跋本出始興今人亦種之狀如烏翫而布地花紫色根似附子苦酒磨塗臘亦夏非惟不識半夏亦不識蕷尾與由跋也今南人猶以由跋爲半夏
「時珍曰」陳延之小品方亦以東海蕷頭爲由跋則其亂誤久矣

【氣味】辛苦溫有毒

【主治】毒腫結熱本經

蕷頭開
宋開

【釋名】蕷頭開鬼芋圓鬼頭經

【集解】「志曰」蕷頭出吳蜀葉似由跋半夏根大如盤生陰地雨滴葉下生子又有斑杖苗相似至白蒟蒻亦曰鬼芋生平澤極多人采以爲天南星了不可辨市中所收往往是此但南星肌細膩而之宜樹陰下掘坑積糞春時生苗至五月移之長一二尺與南星苗相似但多斑點宿根亦白味亦麻人秋後采根須淨擦或搗或自生苗以其苗似牛夏楊慎丹鉛錄言蕷醬即灰汁煮十餘沸以水淘洗換水更煮五六遍卽成凍子切片以苦酒五味淹食不以灰汁者皆誤成段苗也也王禎農書云救荒之法山有粉葛蕷榔栗之利則此物亦有益于民者也其斑杖卽天南星之類有斑者此根性冷甚不益人冷
李廷飛曰人少食之生則較人喚出血

【主治】癰腫風毒摩傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調食主消渴

【發明】「機曰」按三元延壽書云有人患瘻百日不愈見隣家脩蕷藥求食之美遂多食而療愈又有病腳瘻者數人多食之亦皆愈

附錄】菩薩草宋圖經頌曰「生江浙州郡凌冬不凋。秋冬有花直出赤子如翦頭。冬月采根用。服之使惡羊血海藻飴。」之才曰「射干爲之使。惡阜英。畏黃芩。風痰佐以黃芩。寒痰佐以乾薑。秦皮龜甲反烏頭。」權曰「元素曰「熱淡佐以陳柴胡。白爲太苦。」

半夏下品

服

【釋名】守田水玉本經地文錄和姑本經一時珍曰「禮記月令五月半夏生。蓋當夏之半也。故名守田會意水玉因形。」
【集解】別錄曰「半夏生槐里川谷五月八月采根暴乾。」普曰「生徽鄖或以生野中。二月始生。三相偶。白花圓上。宏景曰「槐都屬扶風。今第不出青州。吳中亦有。以肉白者爲佳。不厭葉互用功狀殊異。其苗似是。由跋誤以爲半夏也。」頌曰「在處有之。以齊州者爲佳。二月生苗一莖。三葉淺綠色。頗似竹葉而生江南者似芍藥葉。根下相重。上大下小。皮黃肉白。五月八月采則虛小。八月采乃實大。其平澤生者甚小。名羊眼半夏。由跋絕類灰莖來。半夏洗暴乾歸園經云五月采則虛小。八月采乃實大。其平澤生者甚小。名羊眼半夏。由跋絕類灰莖來。真似半夏而苗不同。」敷曰「白傍蕷子。真似半夏。而苗只是咬着微酸。不入藥用。」

【脩治】宏景曰「凡用以湯洗十許過。令滑盡。不爾有毒。載人咽喉。方中有半夏。必須用生薑者。以治寒痰。謂之半夏。韓信雲。醫通。謂之半夏。分之病半夏。爲主。造而爲麪。妙法也。」其毒故也。敷事半夏四兩。用白芥子末二兩。醱醋六兩。攪濁。將半夏投中。洗三遍。以泡乾。切片。薑汁拌焙。入藥或研爲末。以薑汁入湯浸澄。三日瀝去涎水。曬乾。用謂之半夏粉。或研未。以薑汁和作餅子。曬乾。用謂之半夏餅。或研未。以薑汁白礬湯和作餅。尤佳。治溼痰。以薑汁包置籃中。待生黃衣曬乾。用謂之半夏粉。或研未。以薑汁白礬湯和之。治風痰。以乾薑、秦皮、龜甲、反烏頭。」權曰「元素曰「味辛平。有毒性。溫氣味俱薄。沈而降陰。中陽也。」好古曰「辛厚苦輕。陽中陰也。入足陽明。明太苦。」

尤多用則瀉脾胃諸血證及口渴者禁用爲其燥津液也。孕婦忌之。用生薑則無害。

主治傷寒寒熱心下堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗。本經消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫療瘻黃悅澤面目墮胎。別錄消痰下肺氣開胃健脾止嘔吐去胸中痰滿生者摩癰腫除瘤瘦氣。甄權治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘡。大明治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬消胸中痞膈上痰除胸寒和胃氣燥脾溼治痰厥頭痛消腫散結。元素治眉稜骨痛。靈臺補肝風虛古除腹脹目不得瞑白濁夢遺帶下時。

發明一権曰「牛夏使也。虛而有痰氣宜加用之。」一頌曰「胃冷嘔噦方藥之最要。」成無己曰「辛者散也。潤也。牛夏之辛以散逆氣結氣除煩嘔發音聲行水氣而潤腎燥。」好古曰「經云腎主五液化爲五溼自入爲唾入肝爲泣入心爲汗入脾爲痰入肺爲涕有痰曰嗽無痰曰欬。」淡者因軟而動脾之溼也。半夏能泄痰之標不能泄痰之本。泄本者泄腎也。欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以爲流溼潤燥也。俗以牛夏爲肺藥非也。止嘔吐爲足陽明除痰爲足太陰柴胡爲之使。故今柴胡湯中用之雖爲止嘔亦助柴胡黃芩主往來寒熱是又爲足少陽陽明也。一宗奭曰「今人惟知牛夏去痰不言益脾蓋能分水故也。脾惡溼溼則濡困困則不能治水經云水勝則瀉。」一男子夜數如廁或教以生薑一兩半夏大棗各三十枚水一升瓷瓶中慢火燒爲熱水時呷之便已也。一趙繼宗曰「一女子夜數如廁或以貝母代之。」一丹溪言二陳湯治一身之疾世醫執之。凡有痰者皆用。夫二陳內有牛夏其性燥烈若風痰寒痰溼痰則相宜。至于勞痰失血諸痰用之反能燥血液而加病不可不知。一機曰「俗以牛夏性燥有毒。」此皆貝母爲向導牛夏乃禁用之藥。若虛痰勞嗽首待驗矣。一時珍曰「牛夏乃太陰脾經之藥何可代也。」夫欬嗽吐痰乃禁用之藥。若虛痰勞嗽首待驗矣。一時珍曰「脾無偏廢僵氏能云調不審。」

行半夏南星治其瘧而嗽嗽自愈丹溪朱氏云二陳湯能使大便潤而小便長聊攝成氏云半夏辛而能去溼去則土燥痰涎不生非二物之性燥也古方治咽痛喉痹吐血下血多用二物非禁劑也二物虛也豈藥之咎哉甲乙經用治夜不眠是果性燥者乎岐伯云衛氣行于陽陽氣滿不得入于陰陰氣亦升者之炊以葦薪大沸入秋米一升半夏湯一劑陰陽既通其臥立至方用流水千里者八升揚之萬遍取清陰氣

【附方】舊五十五新法制半夏清痰化飲壯脾順氣用大半夏湯洗一日夜每一兩用白繭一兩半溫水化浸五日焙乾以鉛白霜一錢溫滑

之每嚼一二粒薑湯送化下○御藥院方紅半夏法消風熱清痰涎降氣利咽大半夏湯浸焙制收

打糊丸梧子大每薑湯下七十丸此周府方也袖珍化痰利氣見虎掌下消痰開胃門方用半夏丸用半夏

炮烙乾爲末自然薑汁和作餅溼紙裹煨香以然水二盞同餅二錢入鹽五分煎一盞服之大壓痰

及酒食傷極驗○經驗用半夏天南星各二兩爲末水五升入罐內浸一宿去清水焙乾重研每服

三錢水二盞中焦痰涎丸梧子大每薑湯下十五丸寒痰加丁香五錢熱痰加寒水石煅四兩名玉

及泡水煎服利咽清頭目進飲食半夏泡七次四兩枯礬一兩爲末薑汁打糊或煮棗肉湯斗

和老人風痰大腑熱不識人及肺熱痰實不利半夏泡七次焙消石各半兩膈壅風痰半夏半兩

劑局方和老人風痰爲末入白麪搗勻水和丸緣豆大每薑湯下五十丸普濟膏浸一兩

半兩安神利頭目辰砂化淡丸用半夏炮水搜作餅嚙乾爲末每五兩入生龍腦一錢以搜風化痰

十二兩防風四兩每服半兩薑方風痰頭運星寒水石煅各青黃天麻弦者水煮黃金花丸用生麥麪三兩爲末

二十六定志半兩爲末薑汁打糊丸梧子大每服三十丸食後薑湯送下○御藥院方搜風化痰

水和成餅。水煮浮起，濾出，搗丸梧子大，每服五十九。薑湯下，極效。亦治風痰嗽。二便不通，風痰頭痛，潔古活法機要方。各湯泡曬乾，爲末，薑汁和芩末二錢，打糊丸綠豆大，每服七十丸。薑湯下。

加檳榔。活法機要風痰喘逆，寸薑二片，水一盞，煎七分溫服。和劑局方。一上焦熱痰，嗽制過半。

薑湯食後服。此周憲王親制方也。袖珍方。大每服三十丸。白湯下，或以括樓丸梧仁各一兩，爲末，薑汁打糊丸梧子大，每服二三十丸。白湯和入膽內，懸風濕痰，嗽者。白黃芩，炒各一兩，黃牛膝一兩半，小兒痰熱處待乾，蒸餅丸綠豆大，每服三五丸。薑湯下。

摘元方。濕痰嗽者，白黃體重，嗜臥驚，兼食不消，脈緩。

朮一兩，牛膝一兩，爲末，薄糊丸梧子大，每服五七丸。薑湯下。

活法機要氣痰咳嗽，面白氣促，洒淅惡寒，愁憂不樂，脈滯者，玉粉丸用半夏南星各一兩，官桂半兩，爲末，糊丸梧子大，每服五十九。薑湯下。

下活法機要小結胸痛，正在心下，按之則痛，脈浮滑者，小陷胸湯主之。半夏半斤，黃連一兩，括樓實大者，濕服五十九。薑湯下。

活法機要喘急者，半夏油炒爲末，粥糊丸綠豆大，每服二十丸。薑湯下。

丹溪心法急傷寒病，煎服。

胡治居士百病方。結痰不出，語音不清，年久。

者亦宜玉粉丸。半夏半兩，桂心一錢，生薑七片，酒一盞。

汁浸蒸餅丸，芡子大，每服一丸。夜臥含嚥。

活法機要停痰冷飲，陳橘皮各一兩，每服四錢，生薑七片。

水二盞，煎一盞。

溫服。

和劑局方。停痰留飲，茯苓三兩，每服四錢，薑七片，水二錢，牛膝七分，甚捷徑。

死半夏生薑湯主。

痘瘡噦氣，上方同。

嘔噦眩悸，穀不得下，半夏加茯苓湯，半夏分溫服之。研末，生薑半斤，茯苓七分，水七升，煎一升。

半夏生上方也。

得眠，明下心下悸忪，半夏麻黃丸，半夏麻黃等分，爲末，蜜丸，金匱要略。

傷寒乾嘔，服半夏熟洗研末，生薑湯。

嘔逆厥，見發。

逆。內有寒淡半夏一升洗滑焙研小麥麪一升水和作彈丸水煮熟初吞四五枚日三服。
稍增至十五枚旋煮吞覺病減再作忌羊肉餡糖此乃許仁則方也。外臺祕要嘔吐反胃半
十遍煮取三升半夏三升人參三兩白蜜一升水一斗二升和搗之一百二十枚要略。
金匱要略。停滯留飲薑香半夏湯用一升日再服亦治腸閉支飲。金匱要略。
一葉一盞薑七片煎服每服四錢水和劑局方。小兒吐瀉脾胃虛寒齊州半夏泡七次陳粟米各一錢乙小兒小兒痰吐壅所風
教或款嗽發熱欲食卽吐半夏泡七次半兩丁香一錢以半夏末水和包丁香用麴重
包熗熟去麴爲末生薑自然汁和丸麻子大每服二三十丸陳皮湯下活幼口議。妊娠嘔吐半
人參乾薑各一兩爲末薑汁麴糊丸梧子仲景金匱要略霍亂腹脹半夏桂等分爲末水
大人每飲服十九日三服仲景金匱要略霍亂腹脹服方寸匕。肘後方。小兒腹脹丸粟米大每服二
張仲景方伏暑引飲脾胃不利消暑丸用半夏醋煮一斤茯苓半斤生甘草半斤和劑局方老人虛祕冷祕及痃癖冷
丸薑湯下不瘥加之或以火炮研末薑汁調貼臍亦佳子母祕錄黃疸喘滿合分再服有人氣結而死心下暖以此少許入口遂活
梧子大每空心溫酒下五十丸和劑局方失血喘急吐血下血崩中帶下喘急疾嘔中滿宿瘀川
大每服三十丸白白濁夢遺藥一兩以山藥糊丸梧子大每服三十丸茯苓湯送下腎氣閉而一身過牡
湯下直指方。老人虛祕氣半硫丸半夏
導氣無所管攝妄行而遣者宜用此方蓋半夏有利性。猪苓八般頭風。三次見效。牛夏未入百草霜少許
水有涎吐去再少陰咽痛去黃納苦酒令小滿入半夏在內以鐵子坐于炭火上煎三沸去滓置盆中含
時時○仲景傷寒論喉痹腫塞生半夏末。噎鼻內。喚出忘羊肉。外臺祕要重舌木舌。
更時○仲景傷寒論喉痹腫塞生半夏末。噎鼻內。喚出忘羊肉。外臺祕要重舌木舌。
調數不可見風不計遍數從早至晚如此。摘元方癩風眉落。生半夏羊屎燒焦等分爲末盤腸生產先出產時子腸膿過
再泡片時乘熱以酒醋含漱之○又方半夏二十枚水煮過。小兒顫陷。乃冷也水調半面上黑氣半夏
大塞口半夏煎醋含漱之密封良久熱漱冷吐之。小兒顫陷。乃冷也水調半面上黑氣半夏
本草綱目 十四 卷十七 草部

不收者名盤腸產以半夏末頻產後運絕半夏末冷水和丸大豆大納鼻中則上也婦人良方產後運絕中即愈此屬鵝法也肘後方小兒驚風生半錢爲末吹少許角入鼻中心溫者一日癰疽發背及乳瘡半夏末吹鼻中卽活南岳卽甦直指方卒死不寤夫人紫靈魏元君方也五絕急病魅五曰產乳並以半夏末納大豆一丸可活也子母祕錄癰疽發背白調塗之肘後方吹姍腫痛隨左右噏鼻效劉長春經驗方以末打撲療痕水調半夏末塗之一宿遠行足趼方同上太白飛蟲入耳生半夏末麻油調塗蠍蠻蟄人止金刀不出入骨脈中者半夏白蔵等分爲末酒服經耳門外本事方蠍蠻蟄人止錢相公箇中方蠍瘻五孔塗之日二聖惠方咽喉骨哽半夏白芷等分爲末水服方寸七當嘔出忌羊肉外塗祕要

莖涎【主治】煉取塗髮眉墮落者卽生數

蚤休本經下品

【釋名】蚤休別錄華紫河車圖重臺唐重樓金線本三層草綱七葉一枝花蒙草甘遂唐白甘遂時

珍曰蟲蛇之毒得此治之卽休故有蚤休蟄休諸名重臺三層因其葉狀也金線重樓因其花狀也甘遂因其根狀也紫河車因其功用也

【集解】甘遂一莖六七葉似王孫鬼白菝葜葉有二三層根如肥大菖蒲細肌膚白一名重臺南人一名葉草似鬼臼牡丹蒙久者二三重根如紫參皮黃肉白五月采根曬乾一大明曰一根如尺二蜈蚣又

六月開黃紫花蕊赤黃色上有金絲逐下秋結紅子根似肥葛皮赤肉白四月五月采之根如尺二蜈蚣又

每時珍曰一莖挺生高尺餘莖有四五葉葉有枝止一莖頭金線處處有之生於深山陰溼之地三寸四寸王獨上山莖當心葉又起莖亦如是生葉惟根入藥用一莖根如鬼臼藥凡二三層狀

外紫中白有黏屬二種外丹家采制三黃砂汞入藥洗切焙用俗
諺云七葉一枝花深山是我家癰疽如遇著一似手拈攀是也

根氣味苦微寒有毒雄黃丹砂蓬砂及鹽伏

【主治】驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中本經癲疾癱瘓陰蝕下三蟲去蛇毒錄生食一升利水本治胎風手足搐能吐泄瘰疬明去瘡疾寒熱時

【發明】恭曰一摩醋傳雞腫蛇毒甚有效時珍曰一紫河車足厥陰經藥也

【附方】新五服食法布袋中懸風處待乾每服三丸五更初面東念咒井水下速進三服卽能休根若要飲食先以黑豆煎湯飲之次以藥丸煮稀粥漸漸食之咒曰天朝氣清金雞鳴吾今服藥欲長生吾今不飢復渴賴得神仙草有靈小兒胎風河車爲末每服半錢冷水下○衛慢驚發搐帶有陽證者白甘遂末卽止一錢桔梗根末二錢同于慢火炒焦黃研勻每服一字煎麝香薄荷湯調下錢乙小兒方中鼠莽毒樓根鱉甲水服卽愈咽喉穀賊臘痛用重臺赤色者川大黃炒木鼈子仁馬牙消各集簡方咽喉穀賊牛兩半夏泡一分爲末蜜丸芡子大含之聖惠方

鬼臼本經下品

【校正】併入瑞田草經

【釋名】九白本經天臼別錄鬼藥目解毒別錄爵犀經解毒別錄爵犀經本馬目毒公本經害母草經差天花綱尤律草綱瑞田草綱獨脚蓮土宿獨荷草土宿山荷葉綱旱荷綱八角盤綱唐婆鏡宏景曰一鬼白根如射干白而味甘九有毒而白如馬眼故名馬目毒公殺蠱解毒故有犀名其葉如鏡如盤如荷而新苗生則舊苗死故有鏡盤荷蓮害母諸名蘇東坡詩集云瑞田草俗號唐婆鏡卽本草鬼白也歲生一白如黃精根而堅莖可辟穀宋祁劍南方物贊云羞天花蜀地處處有之依莖緣花蔽葉自隱俗名羞天予改爲羞寒草與花卽本草鬼白也贊云冒寒而莖條葉廣附莖作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀○別有羞天草與花

此不同卽
海芋也

【集解】

乾似別錄射干曰一鬼白生九真山有兩種出錢塘近道者月八月會稽吳興者八月最勝出會稽吳興者八月

苦那無叢

乾似別錄射干曰一鬼白生九真山有兩種出錢塘近道者月八月會稽吳興者八月最勝出會稽吳興者八月

復乖越力如劣

乾似別錄射干曰一鬼白生九真山有兩種出錢塘近道者月八月會稽吳興者八月最勝出會稽吳興者八月

毛江莖枯如劣

乾似別錄射干曰一鬼白生九真山有兩種出錢塘近道者月八月會稽吳興者八月最勝出會稽吳興者八月

年長則此今

乾似別錄射干曰一鬼白生九真山有兩種出錢塘近道者月八月會稽吳興者八月最勝出會稽吳興者八月

復乖越力如劣

乾似別錄射干曰一鬼白生九真山有兩種出錢塘近道者月八月會稽吳興者八月最勝出會稽吳興者八月

年紫鬼今而莖

乾似別錄射干曰一鬼白生九真山有兩種出錢塘近道者月八月會稽吳興者八月最勝出會稽吳興者八月

根氣味

辛溫有毒

別錄曰

苦微溫

之才

宏景曰

畏垣

甘溫

有

【主治】殺蟲毒鬼疰精物。辟惡氣不祥。逐邪解百毒。本經殺大毒。療欬嗽喉結。風邪煩惑。失魄妄見。去目。

中膚翳不入湯錄。主尸疰癰瘍。勞疾傳尸瘦疾。補下死胎。治邪瘡。癰疽。蛇毒射工毒時。

【發明】頌曰古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之。又曰今

福州人三月采瑞田草根葉焙乾搗末蜜丸服治風疾。

【附方】新三子死腹中。胞破不生。此方累效。救人歲萬數也。鬼臼不拘多少。黃色者去毛爲細末。不用篩。只燃之如粉爲度。每服一錢。無灰酒一盞同煎八分通口服立生。如神名一字。

人良方。婦神散。

射工中人。

寒熱發瘡。

鬼臼葉一把苦酒漬搗

升日二次千金方

黑黃急病。

黑黃面黑黃身如土色。

不妨食脈沈

會玉泉草門心俞用

生鬼臼搗汁一小

服

乾者爲末水服。

三十六黃方

射干下品本經

【釋名】烏扇。本經。烏翫錄。烏吹。別

烏蒲。本經。鳳翼。拾

鬼扇。宿扁竹。綱目。

仙人掌。宿紫金牛。宿野萱花。綱目。

草薑。錄

土黃。經。鳳翼。拾

鬼扇。仙人掌。諸名。

○翫音所甲切扇也。

黃遠。吳普。宏景曰。射干方。審多音夜。

頌曰。射干之形莖梗疎長。正如射之長竿之狀。得名由

俗呼扁竹。謂其葉扁生而根如竹也。根葉又如蠻薑。故曰烏扇。

鳥翫鳳翼鬼扇仙人掌諸名。

○翫音所甲切扇也。

【集解】

多種之人。音其葉是薑尾而復有薑頭。此若相似。恐非烏翫也。又別有射干相似而花白莖

長似射人之執竿者。故阮公詩云。射干臨層城。

此不入藥用。

恭曰。薑尾葉都似射干而花紫碧

根多鱗皮黃黑肉黃赤色。

庭薹

卉名鳳翫者。

葉如鳥翅秋生紅花赤點薑尾亦人閒所種

種苗高大而狹長黃張疎如翅羽狀

故名烏翫葉中抽莖似薑草莖而強人者爲

卉在皆有二月八月采根潤形似高良薑大類變薑而狹長黃張疎如翅羽狀故名烏翫葉中抽莖似薑草莖而強人者爲

是也。大明曰。射干根去皮日乾一二尺葉葉如鳥翅秋生紅花赤點薑尾亦人閒所種

種也。春生苗高一尺葉葉如鳥翅秋生紅花赤點薑尾亦人閒所種

種也。大明曰。射干根去皮日乾一二尺葉葉如鳥翅秋生紅花赤點薑尾亦人閒所種

種也。大明曰。射干根去皮日乾一二尺葉葉如鳥翅秋生紅花赤點薑尾亦人閒所種

種也。大明曰。射干根去皮日乾一二尺葉葉如鳥翅秋生紅花赤點薑尾亦人閒所種

種也。大明曰。射干根去皮日乾一二尺葉葉如鳥翅秋生紅花赤點薑尾亦人閒所種

種也。大明曰。射干根去皮日乾一二尺葉葉如鳥翅秋生紅花赤點薑尾亦人閒所種

種也。大明曰。射干根去皮日乾一二尺葉葉如鳥翅秋生紅花赤點薑尾亦人閒所種

種也。大明曰。射干根去皮日乾一二尺葉葉如鳥翅秋生紅花赤點薑尾亦人閒所種

種也。大明曰。射干根去皮日乾一二尺葉葉如鳥翅秋生紅花赤點薑尾亦人閒所種

根【脩治】一出。較曰。凡采根先以米泔水浸一宿。漉後以籃竹葉煮之。從午至亥日乾用。

氣味苦平。有毒。有小別錄曰：「元素微溫，久服令中人虛也。」保昇曰：「一微寒。」權寫曰：「入

[主治]歎逆上氣。喉痹咽痛。不得消息。散結氣。腹中邪逆。食飲大熱。本療老血在心脾間。歎垂言語氣。

臭散 胸中熱氣。別錄。苦酒摩塗毒痛。景宏。治疰氣。消瘀血。通女人月閉。權。消痰。破癥結。胸膈滿。腹脹氣喘。痃癖。開胃下食。鎮肝明目。大治肺氣喉痺爲佳。宗明。去胃中癰瘍。元亨。利積痰痘毒。消結核。震亨。降實火。利大腸。

治瘡母珍時

【發明】震亨曰：「射干屬金，有木與火行，太陰厥陰之積熱，使結核自消甚捷。又治便毒，此足厥陰溼氣因疲勞而發，取射干三寸，與生薑同煎食，前服利三兩行甚效。」時珍曰：「射干能降火。」

故古方治喉瘻。咽痛爲要藥。孫真人千金方治喉瘻。有烏頭膏。張仲景金匱玉函方治瘻。有射干麻黃湯。又治癰母。鼈甲煎丸。亦用烏頭燒過。皆取其降厥陰相火也。火降則血散腫消而瘻結自解矣。

【附方】舊二咽喉腫痛。射干花根。山豆根。陰乾爲傷寒咽喉。腫痛。用生射干。豬脂各四兩。合煎令焦。去滓。每噙嚥。許取瘥。龐安常傷寒論。喉痹不通。或醋研汁。噙引涎出。亦妙。○便民方。用紫蝴蝶根一錢。黃芩生甘草桔梗各五分。爲末。水調頓服。立愈。名二便不通。諸藥不效。紫花扁竹根。生水邊。動搖水聲。皮膚黑。用鬼扇根搗。刺。發時腫痛如刺。用生射干搗汁。一盡服。卽通。○普濟水蠱腹大。汁服一盃。水卽下。肘後方。陰疝腫痛。上煎二升。溫服。以滓傳。與服取利。亦可丸服。肘後方。乳癰初腫。扁竹根如殼蠱者。末蜜調傅之。神效。同萱草根爲永類方。中射工毒。生瘡者。烏頭升麻各二兩。水三升。

薦尾

本經

【釋名】烏園。本經。根名薦頭。時珍曰。並以形集解。別錄曰。烏薦生九嶷山谷。五月采。宏景曰。一方家言是射干苗。而主瘻亦異。當別是一種。方用薦頭。當是其根。療體相似。而本草不題。恭曰。此草所在有之家。亦種葉似射干。而闊短。不抽長莖。花紫碧色。根似高良薑。皮黃而有白。保昇曰。草名薦尾。根名薦頭。亦謂之薦根。葉似射干。布地生黑根。似高良薑。而節大。數長根。根瘦。其花自有數色。諸家皆是強分。陳延之小品方言。東海薦頭。卽由跋者。亦訛也。東海出之。故耳。

【氣味】苦。平。有毒。恭曰。一小毒。

【主治】蠱毒。邪氣。鬼疰。諸毒。破癰瘍積聚。去水。下三蟲。本經。殺鬼魅。療頭眩。別錄。

【附方】舊一。飛尸遊盪。着喉中。氣欲絕者。薦尾根削去皮。納喉中。末酒服。方寸七分。欲令病人見鬼。增防葵一分。欲令知鬼。又增一分。立驗。不可多服。陳廷之小品方。

玉簪綱目

【釋名】白鶴仙。時珍曰以花象命名。

【集解】〔時珍曰〕玉簪處處人家栽爲花草。二月生苗成叢。高尺許。柔莖如白菘。其葉大如掌。圓而本小末大。未開時正如白玉搔頭簪形。又如羊肚磨茹之狀。開時微綻。四出。中吐黃蕊。頗香。不結子。其根速生。如鬼白射干。生莖葉有鬚毛。舊莖死則根有一白。新根生則舊根腐。亦有紫花者。葉微狹。皆鬼白射干之屬。

根〔氣味〕甘辛。寒。有毒。

【主治】搗汁服。解一切毒。下骨哽。塗癰腫。

時珍

【附方】新一。乳癰初起。內消花。卽玉簪花。取根搗水服。以渣傅之。海上方。婦人斷產。白鶴仙根。白鳳仙子。各一錢半。紫葳二錢半。以酒半盞服之。不可着牙齒也。摘玄方解斑蝥毒。解趙真人濟急方。下魚骨哽。玉簪花根。山裏紅果根。同搗自然可着牙齒。○腰仙乾坤生意。刮骨取牙。烏頭一分半。爲末。以少許點疼處。卽自落也。余居士選奇方。

葉〔氣味〕同根。

【主治】蛇虺螫傷。搗汁和酒服。以渣傅之。中心留孔洩氣。

時珍

【釋名】急性子。荒珠。金鳳花。小桃紅。夾竹桃。荒海蘗。染指甲草。荒菊婢花。頭翅尾足俱翹然如鳳狀。故以名之。女人采其花及葉包染指甲。其質狀如小桃。老則迸裂。故有指甲急性小桃諸名。宋光宗李后譙鳳宮中呼爲好女兒花。張宛丘呼爲薑婢草。居呼爲羽客。亦自變易狀如飛禽。自夏初至秋盡開謝相續結實。聚然大如櫻桃。其形微長。色如毛桃。生青熟黃。犯食但此草不生蟲蠶蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也。

子【氣味】微苦溫有小毒。

【主治】產難積塊。噎膈下骨哽。透骨通竅。珍

【發明】一時珍曰。一鳳仙子其性急速。故能透骨軟堅。庖人烹魚肉硬者。投數粒即易軟爛。

【附方】新五。產難催生。鳳仙子二錢研末。水服勿近牙。外以庇麻子隨年數搗塗足心。○集簡方。噎食不下。丸綠豆大。每服八粒。溫酒下。不可酒多。用即急。子咽中骨哽。欲死者。白鳳仙子研水一大呷。以竹筒灌入咽。牙齒欲取。金鳳花子研末也。摘玄方。其物即軟。不可近牙。或爲末吹之。普濟方。普濟方。其物即軟。不可近牙。或爲末吹之。日西時疾軟。三日大便下血。病去矣。忌冷物。翻百調焙黃色。孫天冷定早晨食方之。

花【氣味】甘滑溫無毒。

【主治】蛇傷。擂酒服卽解。又治腰脇引痛不可忍者。研餅曬乾爲末。章心每酒服三錢。活血消積。時

【附方】新一。風濕臥牀。不起。用金鳳花柏子仁朴消木瓜煎湯洗浴。每日二三次。內服獨活寄生湯。吳曼扶壽精方。

根葉【氣味】苦甘辛有小毒。

【主治】雞魚骨哽。誤吞銅鐵杖。撲腫痛。散血通經。軟堅透骨。珍

【附方】新三。咽喉物哽。漱口免損齒也。亦治誤吞銅鐵。危氏得效方。打杖腫痛。鳳仙花葉搗如泥。塗夜血散卽愈。冬月收取乾者研末。馬患諸病。白鳳仙花連根葉熬膏。遇馬有病抹其葉廷器通變要法。遇馬有病抹其葉廷器通變要法。

坐擎草宋圖經

【集解】頌曰。生江西及滁州。六月開紫花。結實。采其苗入藥。甚易得。後因人用有效。今頗貴重。時珍曰。按一統志云。出吉安永豐縣。

【氣味】辛熱有毒。

【主治】風痹壯筋骨。兼治打撲傷損。頌

【發明】頌曰。神醫普救方。治風癆中已有用者。時珍曰。危氏得效方。麻藥煮酒方。中用之。聖濟錄治膈上虛熱咽喉噎塞。小便赤澁。神困多睡。有坐擎丸。用坐擎草大黃赤芍藥木香升麻。

麥蘋冬黃芪木通酸棗仁薏苡仁枳殼等分。爲末蜜丸梧子大每服二十丸。麥蘋冬湯下。

【附錄】押不蘆。時珍曰。按周密癸辛雜志云。漢北回回地方有草名押不蘆。土人以少許磨酒飲。官汚吏罪甚者。則服百日丹。皆用此等藥也。耶。陀龍割腸滌胃。豈不有此也。

曼陀羅花 綱目

【釋名】風茄兒綱目山茄子者。時珍曰。法華經言佛說法時。天雨曼陀羅花。又道家北斗有陀羅星。使花品呼爲惡客。

【集解】葉如茄葉。八月開白花。凡六瓣狀如牽牛花而大。擴花中坼。駢葉外包。而朝開夜合。結實圓而有丁拐。中有小子。八月采花。九月采實。

花子【氣味】辛溫有毒。

【主治】諸風及寒濕脚氣。煎湯洗之。及主驚癇及脫肛。并入麻藥。時珍。

【發明】人或笑或舞。引之乃驗也。八月采此花。七月采火麻子花。陰乾等分。爲末。熟酒調服三錢。少頃昏昏如醉。割瘡炙火。宜先服。此則不覺苦也。

【附方】新面上生瘡。曼陀羅花曬乾研末少許貼之。衛生易簡方。小兒慢驚。曼陀羅花七朵。重一字。天麻二錢半。全蠍炒十錢。沸荷湯調下。天南星炮丹砂乳香各二錢半。爲末。每服半錢。御藥院方。大腸脫肛。曼陀羅子連殼一對。樣斗十六個。同剉水煎。三五沸入朴消少許洗之。儒門事親。

羊躡躅本經下品。

【釋名】黃躡躅綱目黃杜鵑。蒙羊不食草。遺鬧羊花綱目驚羊花綱目老虎花綱目玉枝。別錄云。去景曰。羊食當作惱。亂也。

【集解】花黃似鹿葱不可近眼。恭曰：「花亦不似鹿葱，正似旋花色黃者也。」保昇曰：「小樹高二尺，葉似桃葉，花黃似瓜花，三月四月采花日乾。」頌曰：「所在有之，春生苗似鹿葱，葉似紅花莖高三丈，開花似凌霄花，山石榴輩正黃色，羊食之則死。今嶺南蜀道山谷遍生，皆深紅色，如錦繡，或紅色者卽山石榴名，紅躑躅者無毒，與此別類。張揖廣雅謂躑躅一名決光者誤矣，決光決明也。按唐李紳文集言，駢谷多山枇杷，毒能殺人，其花明麗與杜鵑花相似，樵者識之，其說似羊躑躅，未知是否，要亦其類耳。」

花（氣味）辛溫，有大毒。

使伏丹砂、硇砂、雌黃、畏卮子。

【主治】城風在皮膚中淫淫痛，溫瘡惡毒諸癆，經邪氣鬼疰蟲毒，別

【發明】頌曰：「古之大方多用躑躅，如胡洽治時行赤散及治五嗽，四滿丸之類，并治風諸酒方皆

飲，有躑躅花散云甚勝。時珍曰：「此物有大毒，曾有人以其根入酒，遂致死。」

方治中風癱瘓，伏虎丹中亦用之，不復服耳。」

【附方】新風痰注痛，蒸餅丸梧子大，每服三丸，溫酒下，腰脚骨痛，空心服，手臂痛，食後服，大良。續傳

信方：痛風走注，徐徐服大吐，大泄一服，便能動也。○醫學集成：風濕痹痛，手足身體收攏不遂，肢節疼痛，一炊久曬乾爲末，每以牛乳一合，調服五分，聖惠方：風蟲牙痛，豆大，綿包一丸，咬之追涎，海上仙方：海螺丸，酒二合。

【附錄】山躑躅，時珍曰：「處處山谷有之，高者四五尺，低者一二尺，春生苗葉淺綠色，枝少而花繁，其花味酸無毒，一名紅躑躅，一名山石榴，其黃色者卽有毒，羊躑躅一名映，羊不喫草，拾遺藏器曰：『生蜀川山谷，葉細長，主

一切風血補益，攻諸病，煮之亦浸酒服，此草似羊躑躅，而云無毒，蓋別有此也。時珍曰：『此草一味，酸無毒，一名杜鵑花，其黃色者卽有毒，羊躑躅一名映，羊不喫草，拾遺藏器曰：『生蜀川山谷，葉細長，主

芫花本經下品

校正自木部移入此

【釋名】杜莞別名赤莞。吳普去水。本經毒魚錄頭痛花。綱目兒草。吳普敗華。吳根名黃大戟。吳普蜀桑別錄。時珍曰義未詳。去水言其功。毒魚言其性。大戟言其似也。俗因其氣惡呼爲頭痛花。山海經云首山其草多莞是也。

【集解】厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生三月采花五月采葉八月九月采根陰乾。保昇曰近道處處有之。苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似染根正月二月花發紫碧色葉未生時收采日乾葉生花落卽不堪用也。頌曰在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開黃花謂之黃芫花。時珍曰顧野王玉篇云芫木出豫章煎汁藏果及卵不壞洪邁容齋隨筆云今饒州處處有之莖幹不純是木小人爭鬪者取葉擦皮膚輒作赤腫如被傷以誣人至和鹽擦卵則又染其外若赭色也。

【脩治】宏景曰用當微熬不可近眼。時珍曰芫花留數年陳久者良用時以好醋煮十數沸去醋以水浸一宿曬乾用則毒減也或以醋炒者次之。

【氣味】同辛溫有小毒苦。李當之有大毒多服令人洩。之才曰決明爲之使反甘草。

【主治】欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蟲毒鬼瘡痘瘻癰腫殺蟲魚本經消胸中痰水喜唾水腫五水在五

臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒根療疥瘡可用毒魚錄治心腹脹滿去水氣寒痰涕唾如膠通利血脈治

惡瘡風痹濕一切毒風四肢顫急不能步行權療欬嗽瘡瘻明治水飲痰澼脅下痛時

【發明】時珍曰張仲景治傷寒太陽證表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或喘或利者小青龍湯主之已解有時頭痛出汗惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者十棗湯主之。小青龍治未發散表邪使水氣自毛竅而出乃內經所謂潔淨府去陳莝法也。十棗湯驅逐裏邪使水氣自小便而洩乃內經所謂潔淨府去陳莝法也。夫欬有五皆由內暖水漿外受溼氣鬱滯而爲留飲流

而相激也。深而肌膚內花者，反與而甘筋草骨相脈，反有尺脉，而胡洽居殊士浮方沈之治瘍癬飲，不可輕以瀉甘遂大戟在芫花經大黃，可同用之。蓋欲誤其投大吐之，則害人。

古曰：水氣喘急者，肺腎脾三經所主，有五臟六腑十二經之部分上而頭中，四肢下而腰脚外，皮毛中，皆爲末和丸，或作泄瀉忽肥忽瘦流。

以治水者，肺熱而相激也。深而肌膚內花者，反與而甘筋草骨相脈，反有尺脉，而胡洽居殊士浮方沈之治瘍癬飲，不可輕以瀉甘遂大戟在芫花經大黃，可同用之。蓋欲誤其投大吐之，則害人。

伏肺則爲支飲，令人喘嗽寒熱，吐沫背寒，流于肝則爲懸飲，令人欬唾，痛引缺盆兩脇，流于心下，則爲之經絡，但爲溢飲，令人沈重，徐用之，取效甚捷，不可過劑，洩人真元也。陳言三因方以十棗湯藥爲末，用水飲，粟肉和丸，直達水滯溼能直達水滯，忽肥忽瘦，流。

而人胸脹支滿，或作泄瀉，忽肥忽瘦，流。

【正誤】十一人慎微時曰珍曰三國志花云乃魏初下品平毒物豈堪久服此方外迂怪之言不足信也

【附方】舊十五新一十九卒得欬嗽。芫花一升。水三升。煮汁一升。以棗十枚。必愈。肘後卒嗽有痰。去渣。白糖入半斤。每服棗許。

勿食酸鹹物○喘嗽失音暴傷寒冷喘嗽失音取芫花連根一虎口切暴乾令病人以薦自裏春令灰飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆辣待芫根盡乃止病即愈古今錄驗

乾嘔脅痛傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之。一錢煎水一升半煮取八合去渣納藥強人服一錢。羸弱各等分爲散以大棗十枚水一升半煮取八合去渣納藥強人服一錢。

人半錢平旦服之當下利病除如不除明日更服仲景傷寒論水腫支飲及辨飲用十棗湯加大黃甘草五物各一兩大棗十枚同煮如法服一方加芒消一兩胡治百病方天行

煩亂。凝雪湯治天行毒病。升半瀆故布薄胸上七八日熱積胸中煩亂欲死。用芫花一斤水三千升煮取。當溫四肢護厥逆也。再三薄熱則除。久瘡結癖在腹脇堅

炒大黃二兩，砂五錢爲末。蜜丸梧子大，每服三十丸。東陽湯下。水盛脹滿，芫花枳殼等分，以醋煮芫花至爛乃下。枳殼煮下。普濟方酒痘尿黃，發

心懊惱。痛足脛溼。芫花。花椒。目等分。燒末。水服半錢。日二服。肘後背腿間痛。不住。以帛束之。婦人產後有此。尤宜。袖珍。諸般氣痛。醋煮芫花根。米醋調傅之。如牛兩。延胡索炒一兩半。爲末。每服一錢。男子元鬱痛。葱酒下。瘧疾。烏梅湯。婦人血氣痛。當歸酒下。諸氣痛。香附湯下。小腸氣痛。茴香湯下。仁存鬼胎癥瘕。經候不通。芫花根三兩。鈔炒黃。爲末。

每服一錢桃仁煎湯調下。芫花根剝皮以綿裹點麝香，套入產後惡物，不下。芫花當歸等分，當利惡物而愈。聖惠方：催生去胎，陰穴三寸卽下。攝生妙用方：產後惡物炒爲末，調一錢服。保命心痛有蟲，芫花一兩，醋炒雄黃一錢爲末，每牙痛難忍，痛定以溫水漱之。永類方：白禿頭瘡，芫花末，豬脂和傅。之集效方：癰腫初起，塗之。千金癰癥已潰，生合令膿易竭也。集簡方：痔瘡乳核，芫根一握，洗淨少水，絞汁於石器中，慢火煎成膏，將絲線於膏內度過，以線繫痔，當微痛候，痔乾落。播水一盡服。大吐利卽平。黃州陳大用所傳瀕湖集簡方：便毒初起，芫根播水服以漬，傳之得下，卽消。贅瘤焦法，甘草煎膏，筆塗之四圍，上三炷。小次乃用芫花大戟甘遂等分，爲末，醋調別以筆塗其中，勿近甘草。次日縮。一切菌毒所致，用芫花生研。

蕘花

音饒○本經下品

【釋名】饒也。其花繁饒者。

【集解】別錄曰：「蕘花生咸陽川谷及河南中，六月采花，陰乾。」宏景曰：「中半者時從河上來也。」保昇曰：「所在有之，以雍州者爲好。生岡原上，苗高二尺許。」宗奭曰：「今京洛間甚多。」時珍曰：「按蘇頌圖經言，陝州所出芫花，黃色，謂之黃芫花。其圖小株，花成簇，生恐卽此蕘花也。生時色黃，無乾則如白。故陶氏言，細白也。或言蕘花以桃花代之，取其利耳。」

【氣味】苦，寒，有毒。別錄曰：

【主治】傷寒溫瘡，下十二水，破積聚，大堅癥瘕，蕩滌胸中留癖，飲食寒熱邪氣，利水道，本經療痰飲欬嗽。

別治欬逆上氣喉中腫滿。疰氣蠱毒。痃癖氣塊。

橫

【發明】宋夷曰「張仲景傷寒論以蕘花治利者取其行水也。水去則利止。其意如此。今用之當斟酌。不可過使。與不及也。須有是證乃用之。」好古曰「仲景小青龍湯云若微利去麻黃加蕘花如雞子大熬令赤色用之蓋利水也。」時珍曰「蕘花蓋亦芫花之類。氣味主治大略相近。」

醉魚草

【釋名】鬧魚花。目魚尾草。綑木。

【集解】荆有微稜外有薄黃皮枝易繁衍葉似水楊對節而生。經冬不凋七八月開花成穗紅紫色。微黃如芫花一樣結細子。漁人采花及葉以毒魚。藍圉圉而死呼爲醉魚兒。草池沼邊不可種之。此花色狀氣味並如芫花。毒魚亦同。但花開不同時爲異爾。按中山經云熊耳山有草焉其狀如蘇而赤華名曰蓼。可以毒魚。此草之類與。

花葉【氣味】辛苦溫有小毒。

【主治】痰飲成齁遇寒便發。取花研末和米粉作棵。炙熟食之即效。又治誤食石斑魚子中毒吐不止。及諸魚骨哽者。搗汁和冷水少許嚥之。吐即止。骨即化也。久瘡成癬者。以花填鯽魚腹中。濕紙裹煨熟。空心食之。仍以花和海粉搗貼便消。時珍參

莽草

本經下品

【校正】移入此木部

【釋名】蘭草。芒草。山海鼠莽。有毒食之令人迷惑故名。山人以毒鼠謂之鼠莽。

【正誤】郭璞注云。一名莽。一名春草。禹錫曰。按爾雅云。眞春草。孫炎注云。藥草也。俗呼爲蘭草。蓋因孫炎之誤也。今正之。

【集解】別錄曰。莽草生上谷山谷及冤句。五月采葉陰乾。宏景曰。今東聞處處皆有葉青辛及蜀川皆有之木。若石南而葉稀無花實。五月七月采葉陰乾。一說藤生繞木石間。既謂之草乃蔓生者是也。宗奭曰。莽草諸家皆謂之草。而本草居木部。今世所有皆木葉如石南葉枝梗乾則皺採之其臭如椒。駁曰。凡用葉勿用尖及蠻生者。一時珍曰。范子計然云。莽草出三輔。青色者善。

葉脩治。數曰。凡使取葉細剉以生甘草水蓼二味同。

【氣味】辛溫有毒。食害人。惟紫河車磨水服及黑豆煮汁服可解。豆汁澆其根卽爛性相制也。

【主治】風毒癰腫。乳癰痘瘍。除結氣疥瘡。殺蟲魚。本經療喉痹不通。乳難頭風癢可用沐。勿令人眼。別錄治風疽。痘氣腫墜凝血。治療癰瘍除濕風。不入湯服。主頭瘡白秃。殺蟲與白蘚赤小豆爲末。雞子白調如糊。傳毒腫乾更易上。權治皮膚麻癆。煎濃湯淋風蟲牙痛。大

【發明】喉痹甚效。宗奭曰。濃煎湯淋潔皮膚麻癆。周禮翦氏掌除蟲物。以莽草薰之則死。一時珍曰。古方治小兒傷寒。有莽草湯。又瑣碎錄云。思村王氏之子。生七日而兩腎縮入。二醫云此受寒氣而然也。以硫黃茱萸大蒜研塗其腹。以蘭草蛇牀子燒烟熏其下部而愈也。

【附方】舊四升。新五升。賊風腫癆。入五臟恍惚。宜莽草膏主之。莽草一斤。烏頭附子。腳蹻各二兩切。以水和醋漬一宿。豬脂一斤。煎三上三下。絞去滓。向火以手摩病上三百度。應手卽瘳。若耳鼻疾。可以綿裹塞之。肚後小兒風癆。製縱戴眼極者。日數十發。又治大人賊風。莽草蜜丸各一雞子。化豬脂一斤。煎七沸去滓。摩痛處勿近目。及陰日。凡三四子。

外頭風久痛。令入目。聖惠方。風蟲牙痛。獨活。○一加郁李仁。○一加芫花。○一加川椒皮。○一加漢椒七粒。爲末。棗肉丸。芥子大。每以一丸塞孔中。吐涎取效。瘰癧結核。上貼之。日二易取效止。○聖惠方。癰瘡未潰。方同上。得。乳腫不消。芫草小豆等分。爲末。苦酒和傅之。衛生易簡。狗咬昏悶。傅之。便民圖纂。

茵芋

本經下品

【釋名】莞草。別錄卑共。別錄時珍曰。茵芋本作因。

【集解】葉狀似莞草而細軟。連細莖采之。方用甚稀。惟合療風酒。○宏景曰。好者出彭城。今近道亦有莖生葉厚。五六七月采。○頌曰。今雍州絳州華州杭州亦有之。春生苗高三四尺。莖赤葉似石榴而短厚。又似石楠葉。四月開細白花。五月結實。三月四月七月采莖葉。日乾。

莖葉。氣味苦溫。有毒。○權曰。苦辛。有小毒。

【主治】五臟邪氣。心腹寒熱羸瘦。如瘡狀發作。有時諸關節風濕痹痛。本經療久風濕。走四肢。脚弱。別治男子女人軟脚毒風。拘急蠻痛。一切冷風筋骨怯弱。羸顫。入藥炙用。明。

【附方】新二。茵蕷酒。治風手足枯痺。拘蠻。用茵蕷附子。天雄。烏頭。秦艽。女萎。防風。防己。石南葉。腳陽成。每服一合。日二服。以微薄爲度。方出胡洽居士百病方。圖經本草。茵芋丸。治風氣積滯成脚氣。發則痛者。研末。右爲末。煉蜜丸。各半大。每服二十丸。五更服。利未利再服。取快。本事方。產後中風。斤。煎三上三下。膏成。每服熱摩千遍。一千宿。猪脂四

外頭風久痛。令入目。聖惠方。風蟲牙痛。獨活。○一加郁李仁。○一加芫花。○一加川椒皮。○一加漢椒七粒。爲末。棗肉丸。芥子大。每以一丸塞孔中。吐涎取效。瘰癧結核。上貼之。日二易取效止。○聖惠方。癰瘡未潰。方同上。得。乳腫不消。芫草小豆等分。爲末。苦酒和傅之。衛生易簡。狗咬昏悶。傅之。便民圖纂。

石龍芮 本經 中品

校正

併水薑

入菜

【釋名】地椹。本天豆。經石能錄。魯果能錄。水薑。又音序。

苦薑。爾雅。薑。璞。胡椒。菜。救彭根曰。別錄。宏景曰。今出

苦薑。雅。薑。璞。胡椒。菜。救彭根曰。別錄。宏景曰。今出

苦薑。雅。薑。璞。胡椒。菜。救彭根曰。別錄。宏景曰。今出

苦薑。雅。薑。璞。胡椒。菜。救彭根曰。別錄。宏景曰。今出

苦薑。雅。薑。璞。胡椒。菜。救彭根曰。別錄。宏景曰。今出

苦薑。雅。薑。璞。胡椒。菜。救彭根曰。別錄。宏景曰。今出

苦薑。雅。薑。璞。胡椒。菜。救彭根曰。別錄。宏景曰。今出

有椒葵之名。唐本草。菜部水薑。係禹出今依吳普。本草合併爲一。苦薑。雅。薑。璞。胡椒。菜。救彭根曰。別錄。宏景曰。今出上其葉芮芮短小。故名。恭曰。實如桑椹。故名地椹。禹錫曰。爾雅云。薑苦薑也。郭璞云。卽薑葵也。本草言味甘而此云苦者。古人語倒。猶甘草謂之大苦也。時珍曰。芮芮細兒。其椹之子細芮。故

子狀如蕓。歷黃色而味小辛。此乃是眞也。恭曰。今用者俗名水薑。苗似附子。實如桑椹。生下溼地五月熟。葉子皆味辛。山南者粒大。如葵子。關中河北者細如黍子。是薑菜也。東山石上所生者。其葉芮芮短小。其

爲通論。又曰。薑菜野生。非人所種。葉似蕓花紫色。藏器曰。爾雅云。薑。是烏頭苗。水薑定是石龍芮。更非別草也。蘇恭注天雄亦云。石龍芮葉似堇草。故名水薑。據此則薑草是烏頭苗。水薑定是石龍芮。非別草也。頌曰。是烏頭苗。水薑定是石龍芮。非別草也。蘇恭注

非石龍芮也。兗州所生者正與本草及陶氏說合。爲得其眞。宗奭曰。石龍芮有兩種。水中生者葉

非光而子圓。陸地生者葉毛而子銳。入藥須水生者。陸生者又謂之天炎。時珍曰。蘇恭言水薑。卽石龍芮。蘇頌非之。非矣。按漢吳普本草。石龍芮一名水薑。其說甚明。唐本草。菜部所出水薑。言其苗也。本草部所出水薑。言其苗也。

經石龍芮。育其子也。寇宗奭所言。陸生者乃是毛茛。有大毒。不可食。水薑卽俗稱胡椒菜者。處處有之。

多生近水下溼地高者尺許。其根如聲。三月生苗。叢生圓莖。分枝一枝三葉。葉青而光滑。有三尖。多細

色。搓散則子甚細。如蕓。歷子卽石龍芮也。宜半老時采之。范子計然云。石龍芮出三輔。色黃者善。

缺江淮人三四月采苗。渝過曬。黑色爲蔬。四五月開細黃花。結小實。大如豆。狀如初生桑椹。青綠。

子根皮。【氣味】苦平無毒。普曰。神農苦平。岐伯酸。扁鵲大寒。雷公鹹

【主治】風寒濕痹。心腹邪氣。利關節。止煩滿。久服輕身明目不老。本平腎胃氣。補陰氣不足。失精莖冷。令人皮膚光澤有子。別名。逐諸風除心熱燥大明。

【發明】時珍曰石龍芮乃平補之藥。古方多用之。
其功與枸杞覆盆子相埒。而世人不知用何哉。

水堇【氣味】甘寒無毒。微辛苦澁。

【主治】搗汁洗馬毒瘡。并服之。又塗蛇蠍毒及癰腫。唐本久食除心下煩熱。主寒熱鼠癆。瘰疬生瘡。結核聚氣。下瘀血。止霍亂。又生搗汁半升服。能殺鬼毒。卽吐出。孟诜曰

【發明】香薷同功。香薷卽香薷也。

【附方】舊二新一。結核氣。堇菜日乾爲末油煎成膏摩之。蛇咬傷瘡之。生堇杵汁塗血竈初起。胡椒菜葉接按日三五度便瘳。孟诜食療。

萬畢術。血竈初起。採之。集簡方。

毛堇

音艮

○拾遺。【校正】併入毛草

【釋名】毛建草。拾遺水堇。綱毛堇。音堇。

草。天炎。術。自炎。綱猴蒜。時珍曰堇乃草烏頭之苗。此草形狀及毒

字音訛也。俗名毛堇。似水堇而有毛也。山人載瘡采葉接貼寸口。一夜作泡如火燎。故呼爲天炎。白炎。采葉接貼寸口。一夜作泡如火燎。故呼爲天炎。白炎。

【集解】藏器曰一方云。菜中有水堇。葉圓而光。生水旁。有毒。蟹多食之。人誤食之。狂亂如中風狀。或吐血。以甘草汁解之。又曰毛建草。生江東地。田野澤畔。葉如芥而大。上有毛。花黃色。子如蒺藜。時珍曰毛建。毛堇。卽今毛堇也。下溼處。卽多春生苗。高者尺餘。一枝三葉。葉有三尖。及細缺。與石龍芮莖葉一樣。但有細毛。爲別。四五月開小黃花。五出甚光。結實狀如綻青桑椹。如有尖角。與石龍芮子不同。人以爲鵝不食草者。大誤也。方士取汁。煮砂。伏硫。沈存中筆談所謂石龍芮有兩種。水生者葉光而末圓。陸生者葉毛而末銳。此卽葉毛者。宜辨之。

【附錄】海薑陰命。又曰陰命。生海中。赤色。着木懸其子。有大毒。今無的識者。有大

葉及子【氣味】辛溫有毒。

【主治】惡瘡癰腫疼痛未潰搗葉傅之不得入瘡令肉爛又患瘡人以一握微碎縛於臂上男左女右勿令近肉卽便成瘡和薑搗塗腹破冷氣器。

牛扁本經下品

【釋名】扁特唐本扁毒唐本

【集解】「別錄曰」牛扁生桂陽川谷。宏景曰今人不復識此。恭曰此藥似堇草石龍芮。今出寧州葉似石龍芮附子等。二月八月采根日乾。頌曰今潞州一種便特六月有花八月結實采其根苗搗末油調殺蟻蟲主療大都相似疑卽扁特也但聲近而字訛耳。

【氣味】苦微寒無毒。

【主治】身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蟲小蟲又療牛病本經

【附錄】蠶建草拾遺藏器曰苦無毒主蟻蟲接汁沐頭蟲盡死人有誤吞蟲成病者搗汁服一小葉而短小可生食亦去蟻蟲○

葦麻音尋宋圖經○

【釋名】毛蘂時珍曰蕁字本作蘂杜子美有除蘂草詩是也。

【集解】「頌曰」葦麻生江寧府山野中。時珍曰川黔諸處甚多其莖有刺高二三尺葉似花桑或青或紫背紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂蠍螯蠅以人潤濯之卽解有花無實冒冬不

中能毒魚
潤滑投水

【氣味】辛苦寒有大毒吐利人不止。

【主治】蛇毒搗塗之蘇風癲初起以此點之一夜皆失時

格注草本

唐本

【集解】恭曰一出齊魯山澤間葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許二月八月采根五月六月采苗日乾用一

【氣味】辛苦溫有大毒

【主治】蠱疰諸毒疼痛等本

海芋

綱目

【釋名】觀音蓮天荷隔河仙

見下

【集解】時珍曰一海芋生蜀中今亦處處有之春生苗高四五尺大葉如芋葉而有鈎刺葉長作穗如觀音像在圓光之狀故俗呼爲觀音蓮方士號抽莖隔河仙云可變金其根似芋魁大者如升盤經六七寸蓋野芋之類也庚辛玉冊云羞天草陰草也宋祁海芋贊云木幹芋葉擁江廣深谷澗邊其葉極大可以禦雨葉背紫色花如蓮花根葉皆有大毒可煅粉霜硃砂小者名野芋生腫盤戾農經弗載可以治癆

【氣味】辛有大毒

【主治】瘡瘍毒腫風癩伏硇砂

珍時

附錄】透山根一時珍曰一按勾蟲神書云透山根生蜀中山谷草類藤葉可以點鐵成金昔有人采大毒人誤食之化爲紫水也又何遠春渚紀聞云劉均父吏部罷官歸成都有水銀一筐過峽篋漏急取渡旁叢人須臾爲紫水也又何遠春渚紀聞云劉均父吏部罷官歸成都有水銀一筐過峽篋漏急取渡旁叢人安僧法堅言有客過於潛山中見一蛇腹脹一草以腹磨之而消念此草必能消脹取置篋中夜化旅館聞隣房有人病腹脹呻吟以蓋煎藥成金矣益與服頃之不復聞聲念已安矣至旦視其釜則通體煎成金矣觀何服頃之不復聞聲卽是透山根乃金英草也至旦視之其人血肉俱化爲水獨骸骨在牀爾視其釜則通體煎成金矣益與服頃之不復聞聲念已安矣至旦視其釜則通體煎成金矣觀何服頃之不復聞聲卽是透山根乃金英草也至旦視之其人血肉俱

可不知故備載之耳

鉤吻下品

【釋名】野葛本經根吳胡蔓草。圖斷腸草目黃藤。綱火把花。一宏景曰一昔其入口則鉤吻當作牽字牽人腸而絕之也一時珍曰此草雖名野葛非葛根之野者也或作治葛王充論衡云治地名也在東南其說甚通廣人謂之火把花因其花紅謂之黃藤

【集解】鉤吻別錄曰一鉤吻生傳高山谷及會稽東野折之青烟出者名固活二月八月採一普曰一普生桂林以南村墟間巷皆有彼人通名鉤吻亦謂苗爲鉤吻根名野葛蔓生其葉如羅勒子而頗似其葉是也一時珍曰一穏含南方草木狀云野葛蔓生葉如羅勒光而厚一名胡蔓草生邕州容州之閒叢生花屬博物志云鉤吻起亦如其葉如羅勒子而頗似其葉是也一時珍又訪之南人云胡蔓草葉如茶其花黃而小一葉入口百數潰血甚秋無復生老也柔生名之

鴉精緩五六月開花似柳。柳花數十朵，生嶺南者花黃。生瀘南者花紅。呼火把花，此數說皆與吳普蘇恭說相合。

【正誤】毒飛鳥不得集。今人用合膏服之，無嫌鉤吻是野葛。駁車而言似是兩物。野葛是根，狀如牡丹。所生處亦有

勿種類黃精故人采多惑之，遂致死。生之反或云鉤子二個黃精葉似竹葉，又曰凡使黃精而莖紫當心抽花黃色初生柳治人身，上懸毒瘡其地，精殺人也。恭曰：「鉤吻蔓生葉如柿，龍芮與鉤吻何干？」頌曰：「江南人說黃精莖苗稍類鉤吻，但爲鉤吻復疑是毛蕡。」乃祖雷斅之說，諸家遂無定見。不辨其蔓生小草，相去遠也。然陶雷說亦是小名野蘇。恭所說正合本文。陶氏以藤生爲野葛，又指是一草。

【氣味】辛溫大有毒。

【發明】收之名藥，烈於野葛也。蘿菜搗汁解野葛毒，取汁滴野葛苗，卽萎死。南人先食蘿菜後食野葛，二物相伏，自然無苦。

魏武帝畋野葛至尺，先食此菜，後食野葛，毒死。急水吞死，急慢水死，或取毒蛇殺之，覆以

【主治】金瘡乳瘻中惡風，効逆上氣，水腫殺鬼疰蠭毒。經破癥積，除脚膝癆痛，四肢拘攣，惡瘡疥蟲殺鳥獸，搗汁入膏中，不入湯飲。別主喉癢咽塞，聲音變。普

【發明】藏器曰：「鉤吻食葉飲冷水，發其毒也。彼土毒死人，懸尸樹上，汁滴地上，生菌子，二廣廣人貢，價急，每食此草而死，以誣人以急水吞，死急慢水死，或取毒蛇殺之，覆以瀉水，生菌爲毒藥害人。葛洪肘後方云：凡中野葛毒，口開乃可下藥解之。惟不可開者，取大竹筒，洞節以頭拄其兩脇，及入膾，血及入膾者研爛和血灌之，灌之吐出，生方云：即時生，即時取，即時死，抱未死者，研甘草汁，人屎汁，白鵝斷頭瀝血，及入膾，中灌冷水中，入筒中，數易水，須臾口開，乃可下藥解之。惟不可開者，研

