

寿身小社

七

○○第百三六方○萬應丸

能下諸虫○此丸或加十倍合之濟人甚妙

五分

梔榔

生軍 八分

黑丑頭

四分

皂角

一條

苦棟根皮

一兩

右先將苦棟根皮皂角二味熬成膏和前三味爲丸如桐子大以沉香雷丸木香各一小爲衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三小用沙糖水送下俟泄出三次後每吃稀粥補之日午再服第百三七之方愈多愈妙

○○第百三七方○五君子煎加味法

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉或虫積下後以此調補愈多服愈妙此方於小兒及屬脾胃虛者可以常服如小兒肚大青筋專守此方服之必能全愈而大健也

人參

八分○高麗參則用  
二分炙鬱金用七分

焦朮

四分

雲茯苓

三分

炙草

二小

干羌

二小  
炒

淮藥

五小  
炒

白扁豆

三小

陳皮

小半

砂仁

八分

蓮肉二十粒煎服

○○第百三八方○七味肥兒丸

治小兒食積五疳頸項結核髮稀成穗發熱口渴消瘦等症服此丸必要與別之五君子煎加味法  
間服如將此丸方作煎服即減去九倍與前方隔日間服亦可

川連

一兩

神曲

一兩

木香

一兩

使君肉

四兩  
酒浸

枳榔

八分

麥牙

四兩

肉荳蔻

二兩  
去淨油

右研極細末以清水和灰麵爲丸如麻子大每服三五十丸如先天足者每服五七十丸亦可以米  
湯送下

○○第百三九方○加味調氣湯 治一切腹痛因氣者男婦老幼皆宜如小兒則減半用

半夏

二分

雲苓

三分

茯神

一小

川厚朴

小半  
姜汁炒

蘇葉

六分

陳皮

小半

甘草

五分

石菖蒲

八分

桔壳

八分

檀香

四分  
劈碎

生羌三片煎服

○○第百四十方○經驗加味沉香桂附丸

如小兒加麥芽二分。大人因飲食後而痛加焦楂肉三四分。○如因受風寒後而痛加炒神曲一小大杏仁去皮尖三分。○如不能與人言而痛者加川鬱金二分半桔梗二分利無度手足厥冷或脇肋作痛等症。

熟附片

一兩

川烏

一兩

熟地

五兩

沉香

一兩

吳子

八小開水泡三  
次後用鹽水炒

炮羌

一兩

茴香

一兩  
鹽水炒

當歸

二兩

上玉桂

一兩  
去皮

淮藥

四兩

杜仲

四兩  
羌汁炒

香附

一兩  
羌汁炒

○○第十四方○經驗青娥飲

共末以旱蓮草三錢熬膏和丸如桐子大每服五七粒均宜用鹽水送下○姪婦忌服陰虛者忌服

熟地

一兩

固脂

三兩

胡盧巴

四兩  
酒炒

杜仲

四兩  
羌汁炒

小茴

半  
鹽水炒

免絲

三兩

生淮藥

四兩  
酒炒

秋石

三分  
羌汁炒

川椒

三兩  
青盲炒

山甲

一兩  
醋炒

核桃肉

十枚

如氣虛而下陷者或加高麗參三兩或加酒炒黃芪三四錢亦可○如素來不投黃芪者即用炙

玉竹五兩亦可

○○第百四二方○經驗茹米湯

治一切感受濕氣或腰痛腿痺及酒溼諸症新久者均屬極效非數十劑不可總以小便內出後澄有渣滓其溼即由膀胱而出此王道之妙法極其穩妥而又見功

生意米

二兩

白朮

四小

雲苓

四小

細甘草

半

車前仁

二小

淮藥

五小

老米一撮煎服

不可  
間斷

○○第百四三方○經驗全真二氣法

治一切真陰虧損凡屬陽虛假火而爲瘡及口舌咽喉或爛或癟以及精神困倦並勞心過度或陰精不足者此方全用之大應誠確難敵不可忽視

熟地

一兩

生淮藥

五小

大麥冬

三小

炒燥

牛膝

二小

洋參

三示 酒炒

熟附片

八分○凡用附片及干差玉桂不熱取其通經達絡走而不守助藥之力

雲苓

三示

米汁水煎服○如上焦虛火太重或喉痛咽乾者加元參三四小○小便黃短者加赤苓二示酒炒丹皮小半以熟附片再用蜜水炙之○如大便閉結加生薏米五七刀當歸二三示○如飲食少思加炒谷芽四五斤霍楂五六分○如心虛懶言嗜卧加炙五竹七八斤或高麗參一二小蒸水兌服○第百四四方○經驗硝鹽散 治小兒或大人口內忽生重舌卽效

川朴硝

五分

雪白鹽

五分

用竹瀝調勻點重舌卽退然後以涼解之劑進之

此症忌用黃芩宜杏圓重舌證治內說明一切自知治法也

○○第百四五方○抽薪飲 治諸火熾甚而不宜補者皆以此方主之

黃芩

二示

石斛

三示

木通

二示

炒枝子

半

桔壳

小半

黃柏

二示

澤瀉

小半

細甘草

五分

知胃火甚加生石膏三小。○如熱在陰分津液不足者加天門冬生地各四小主之  
○○第百四六方○徒薪飲 治三焦諸火一切內熱漸覺而未甚者以此劑清之自愈老年尤宜

黃芩

二小 酒炒

麥冬

三小 志

白芍

一小

生地

三小

雲苓

二小

黃柏

一小

丹皮

半

陳皮

八分

元參

二小 煎服

薄荷

三小

明砂

四分

雄黃

三分

兒茶

三分

冰片

一分

○○第百四七方○玉屑散

治咽喉口舌頸項破爛諸瘡并治鎖喉風惟脾胃虛弱者不宜服

共藥末以少許置舌上噙含半刻咽下一日八九次如牙關緊閉者用無根水調灌下

○○第百四八方○加減荆防敗毒散

治喉痛口痛熱症鎖喉風脉在七八至者先用含藥次進此方

荆芥

一小

防風

一小

連翹

三小

膽星

八分

獨活

一分

前胡

二小

桔壳

八分

蘇子

八分

生地

四分

黃芩

一小

元參

二小

瓜摟仁

八分

枝子

半分  
炒

杏仁

二小  
去皮尖

燈心

或拾節煎服

○○第百四九方○加減柴胡雙解散

治喉痛及鎖喉風而脈在一二至或沉隱者

柴胡

一小

前胡

一小

羌活

八分

瓜摟仁

八分

桔梗

八分

川芎

二分

青皮

一分

川桔壳

八分  
炒

胆星

七分

蘇子

七分

杏仁

半分

水煎服

○○第百五十方○保命丹錠子

智有保命丹錠子全服更妙

真射香

二分

正辰砂

三分

冰片

一分

珍珠

一粒

血琥珀

一分

山茨菇

二小洗去  
皮毛淨焙

白千金子

一小分  
去皮淨焙

明雄黃

三分

紅毛大戟

一小分去蘆根洗淨焙干爲  
末浙江紫薺爲上北方煮不好

右藥乳極細末再用山豆根一錢濃煎汁以糯米粥爲丸重一升輕者一錠重者連服三錠節愈

○○第百五一方○韭子湯 治牙虫

韭菜子一撮以碗足盛之用火燒烟外用小竹梗將下截剪爲四開以紙糊如喇叭樣引煙薰口  
內虫蛀之微如下牙蛀者以韭子湯煎濃漱之虫自出矣

○○第百五二方○金水六君煎

治肺腎寒水泛爲痰或肺有虛火或年邁血氣不足外受風寒咳嗽清涕喘急等症

熟地 三兩 當歸 三兩 陳皮 二兩 半夏 二兩

雲苓 三兩 炙草 半兩 生羌五片煎服

如大便不寢者去當歸加淮絛三五錢。如痰甚胸膈不快者加白芥子七分。如寒甚不寢者加  
細辛四分。如兼表邪寒熱者加北柴胡一小錢。

○○第伯五三方○經驗清化飲

治婦人產後因大發熱及血熱妄行陰虧諸火不退等症又治鼻渊腦漏以此方主之

麥冬

二小

白芍

二小

丹皮

小半

大生地

四小

酒炒

茯苓

二小

黃芩

小半

石斛

三小

煎服

如骨蒸多汗者加地骨皮二小○如熱甚而頭痛發渴者加生石膏或三小○如小便熱赤加赤伏  
炒梔各小半○如賁腹脹滿加大熟地一二兩白蘿蔴一兩薑子五小數十剉全煎

○○第百五四方○化鉗散

治喉內悶吞鐵釘

朴硝

二小

磁石

一小

共爲細末以熟猪油全蜜和

納未食之必由大便內下出

○○第百五五方○倣王荆公妙香散

能安神秘精定心氣凡慾不遂而遺精者莫妙於此或作蕊熙散均可

人參

一小○党參

龍骨

小半

伏神

三小

伏苓

二小

則用六七小

益智仁

小半

遠志

五分

炙草

五分

硃砂

五分

生五味

四分

熟地

二兩

核桃肉五枚煎服

搗碎

○○第伍六方○補陰氣煎

如作丸藥或入五倍以蜜和丸臨到時以酒送三四粒可

卽補中益氣之靈方也治勞倦傷陰精不化氣或陰虛內乏以致外感不鮮及陰虛便祕兼熟核煩  
以及下血日久脫肛婦人產後血去過多而脫肛者凡屬陰虛無不神效

黨參

五分

熟地

一兩或  
三兩

淮藥

四分

當歸

三分

酒炒

酒炒

酒炒

土炒

升麻

五分○若虛火浮於上焦者必用○若脫肛者必須用之酒炒

柴胡

一錢加無  
外邪不用

陳皮

小半

炙草

小半

紅棗五枚煎服

○○第百五十七方○水中取火法

此陰中陽虛卽水中之火不足而屢應得意之方也治真陰虛弱素屬勞倦之人以及虛滿虛脹婦人經遲血滯皆陰中之氣不化所謂善補陽者必於陰中求陽非若大陰陽症而純用陽藥可比也此方不知者以爲補陰殊不知補陽之第一法所謂水中取火之義並無剛燥猛勇之虞爲近時對症之良法余屢試屢驗勿輕視之

熟地

一二兩

熟附片

二三小均宜

白歸身

三小

土炒焦

伏神

四小

生淮藥

五小

炙甘草

小半

再用蜜水炒

有好桂刮盡淨粗皮用八分研末分作兩次冲服如無好桂必不可用蓋桂不好而用之反燥火也○如胸膈脹滿加白蔻仁七分陳皮小半○如外感風邪加麻黃五分北杏仁三小去皮尖○如痰多加半夏曲三小

○○第百五十八方○倣殿胞煎

治產後兒枕骨痛並勢力太過而脫者均屬神效

當歸

二兩

伏神

三兩

伏苓

二兩

大川弓

小半

炙甘草

小半

上玉桂

五分研末冲○如血熱口渴多火者  
不用玉桂加酒炒杭白菊二小甚宜

熟地炭

七小

水煎服

如腰痛加酒炒杜仲三錢如惡露未淨用新絳七分○胞肛用酒炒升麻三分

○○第百五九方○熟炭易法

治脫肛神效

陳石灰

約四勑

用舊砂鍋炒極熱留一半在於鍋內以一半鋪在左邊綿褥上上蓋舊布一塊將小衣脫落坐於熱  
灰上徐徐搖而揉之如灰冷又將所留之熟炭鋪於右邊更換坐上再將冷灰炒熱如是坐撓數次  
必收入矣

○○第百六十方○苦參湯

治痔漏

苦參

四兩

煎湯日日洗之

又方用馬齒莧菜煎湯洗之○又方常食腳魚自愈

○○第百六一方○六物瀉陰丸 治五種腸風痔症

槐角

一兩  
炒

地榆

五分

當歸

五分

黃芩

五分

桔壳

五分  
炒

防風

五分

共研末以無灰酒爲丸如桐子大每服五十九

○○第百六二方○脫管丸 滌痔以成管

蟬

一個皮紙包  
以水溼存性

血 餘

一兩  
存性

苦 參

或兩

木耳

一兩

牛角腮

一隻  
存性

石菖蒲

一兩

枯凡

壹兩

槐子

地榆 防風

雷丸

胡麻仁

漏蘆

蕪荑

以上五味

射香

一小

舊棕

二兩  
存性

猪懸蹄

半隻  
存性

木香

一小

陳皮

小半

霍香

小半

香附

一小

青皮

一小

桔壳

小半  
炒

厚朴

小半

牛膝

小半

烏藥

三味  
酒炒

枳榔

小半

如食滯加瘦肉二小。如氣逆者加白芥子一二小。如嘔者加法夏一小。如兼疝氣加荔枝核七個存性研末沖服。如小腹痛加小茴香一小。

○○第百六四方○倣決津煎

治婦人血虛經滯不能流暢而極痛者如氣分又虛卽少用陳香之類

當歸

五七  
或二兩

牛膝

二  
示

澤瀉

一  
示

熟地

二  
兩

上玉桂

一小  
研沖

香附

二  
示

陳皮

二  
示

沙參

四  
示

木香

七分不  
必用多

丹參

三  
示

新絳

五分卽  
帽緹碎

煎服

四  
示

川牛膝

二  
示

當歸

七  
分

紅花

二  
示

香附

二  
示

桃仁泥

五  
分

丹參

四  
分

澤瀉

小半

烏藥

小半

大川弓

小半

煎服

○○第百六六方○經驗通瘀飲

治婦人氣滯血積經脈不利痛極拒按及產後瘀血作痛或男婦血逆血厥等症然必脉證兩實方可此倘非瘀痛及血中氣滯或氣中血滯而熟軍歸尾之類不可輕投慎之

歸尾

五分

牛膝

二分

紅花

二分

元胡索

三分

澤瀉

小半

青皮

小半

香附

二分

木香片

八分

丹皮

小半

熟軍

二分

酒一杯兌服

○○第百六七方○經驗三助濟生飲

此補血活血益血之屬確補藥也專治崩漏不止以及小產後惡露過多血虛骨萎等症無不極效  
余每用之無不應手經曰陽搏陰別謂之崩漏病始生故凡陽搏脈大必屬血虛而血爲婦人之基  
絡傷必致血溢舊血既出新血宜生所以崩漏產後審無堅痛之處均係血虛因三助其血而濟生  
之故三名於此

熟地

二兩

大生地

酒炒 四分

荆芥

小半 炒黑

淮藥

五分或  
七分

蒲黃

五分

閩黨參

四分

棗皮

小半 炒焦

當歸

四分

白芍

二分 炒

阿膠珠

五分

蓮米

四十枚 去心 炒焦

煎服

如頭暉甚者加茯神四分○如虛寒加蜜炙熟竹片三小分如口渴加麥芽小半○如汗多加酒炒北芪四五分○如胸腹脹脹加白蔻仁八分○如作泄加鴟梅三個

○○舊六八方○滑石散 治男婦熱淋

滑石

一小

通草

一分

車前子

八分

葵子

十分

共爲細末以米湯調服

○○第六九方○龜牌分清飲

治真元不足下焦虛寒或服涼藥過多小便白濁頻數無度如膏糊感似米湯等症

正川泰

三示

雲苓

八小

石菖蒲

八半

烏藥

二小  
酒炒

益智仁

二小

熟鹽

三分

水煎服

○○第七十方○大營煎

治真陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨疼痛或氣血虛寒心腹疼痛等症

當歸

三五

熟地

一兩

枸杞

二小

炙草

二小

杜仲

二示  
羌炒

牛膝

小半

玉桂

小半多至粗  
皮研末冲服

如寒滯氣血不得流通筋骨疼痛之甚者加熟附片三小方效○如帶濁腹痛加酒炒故紙二小

○如氣虛加人參隨宜○如嘔惡加干姜一二小

○○第七一方○二陰煎

治心經有熱火不勝火之病故曰二陰凡驚狂失志多言多哭或瘡瘍頗煩熱失血等症

大生地 三示

麥冬 三示

棗仁 一小

甘草 一示

眞川連 小半

元參 二示

茯苓 二小

木通 小半

燈心二十節竹葉十片煎服。如瘡多加陳胆星一小或天花粉二示亦可。

○○第百七二方。四陰煎

此保肺清金之劑。故曰四陰治陰虛勞損相火熾甚津枯煩躁咳嗽吐衄多驚等症。

生地 三示

麥冬 三示

白芍 三示

伯合 二小

沙參 五分

雲苓 二示

甘草 一小

如夜熱盜汗加地骨皮一二小。如瘡多加川貝二三示。如腎水虧加熟地七八小。如婦人血  
燥經遲入牛膝二示。如血熱吐衄加茜根二小。

○○第百七三方。五陰煎

凡真陰虧損脾虛失血等症。或貿消泄者所重在脾。故曰五陰急用潤滑宜。

此生之

熟地 一兩

淮藥 五錢

白扁豆 五錢 炒

閩黨 四五錢 炙

炙草 二兩

雲苓 二兩

北五味 二十粒 炒

白朮 三錢 炒

白芍 二兩 熬

蓮米二十粒去心煎服

○○第百七四方○休瘧散

此止瘧最妙之藥凡元氣不足或年老弱質而瘧不能止者此方極妙

人參 隨宜

焦白朮 四錢

當歸 四錢

首烏 一兩 熬

炙草 二兩

或再加熟地八錢更妙

用生熟水煎和百十五之方調服

○○第百七五方○經驗十全種子方

治婦人體瘦血枯血少血寒而無潤澤以及經遲退後來時血淡血少及白帶時多此難受孕必以此方常時多服不惟能生育更能免百病應驗極效

生淮藥

四小

白蔻仁

八小

歸身

四小

炙玉竹

七小

覆盆子

三小

熟地

一兩

阿膠珠

四五  
一小

蛇床子

三小

黃芪

二小酒炒

廣陳皮

一小

用紅棗五個煎服愈久服愈妙卽一二百服均可○如飲食減少去黃芪入炒谷芽四小砂仁八分○如溏泄去當歸入炒芡實五小○如白帶多入煅龍骨五小左牡蠣四小○如手足內熱去陳皮入地骨皮三小○如眩暈困倦入人參隨宜或炙鴟鴞六七小亦可○如大便閉小水短去黃芪入生津參三小○如畏寒喜暖或大腹小腹冷痛入熟附片三小如口乾微渴去白蔻入炒麥冬二小

○○第百七十六方○經驗定經抑陽法

治婦人血熱經水先期而至色見紫黑唇紅舌焦或皮膚生瘡並赤帶等症

熟地

二兩

丹皮

二兩

丹參

四兩  
酒炒

大生地

五兩

麥冬

三兩  
志

雲苓

二兩

赤芍

小半  
酒炒

全當歸

三兩

川貝

二兩  
志

茅根

二兩○新  
鮮者更好

用米汁水煎服

如惡熱口乾甚者入酒炒芩不半天花粉不半。如燥汗多者入石斛三四錢。如大便堅硬入火麻仁三錢。如小便短黃熱痛入赤苓三錢。不如頭暈耳鳴而火邪壅於上焦者去甘草入牛膝外半生石膏四錢。如錯經妄行而衄血不止者去甘草入澤瀉一錢。牛膝一錢知母不半。

○○第百七十七方○調元養育法 治男子陽痿精衰虛寒無子萬應之藥

熟地

一兩

枸杞

三兩

巴戟

四小甘

蛇床子

三兩

草水製

淮藥

五小

玉桂

八分

淫霍

四小用  
研末  
羊油炙

兔絲餅

二小

鎖陽

二小

杜仲

三小

熟片

二小

用桂元肉十枚蓮米三十粒去心煎服愈多服愈好。若合丸加十倍以蜜和之每日早吞七小晚

吞三小俱用鹽開水送下

○第伯七八方○倣毓麟珠加減

治婦人氣血兩虛體瘦神疲倦於房事腿軟身疼或漏帶過多飲食少思時多寒熱忽又易熱或偶多瘧瀉均屬陰陽兩虛難於受孕此種子萬應之神劑也

真閻黨

五小

熟地

一兩

鹿角霜

四小

淮藥

四小

覆盆子

三小

歸身

三小

兔絲子

三小

伏神

二小

熟附片 二小

炙草 小半

用桂元肉十粒煎服

如經遲而腹痛者加玉桂研末八分固脂酒炒一小。如經早而血熱內伏者去附片桂元加地骨皮三小酒炒冬青子五小倘內熱實重者卽先以第百七二之方暫清其熱然後以此法投之或加十倍以南棗一觔黃蠣去皮核和蜜丸之每早晚各服五小。

○○第百七九方○加減金匱腎氣湯

治脾腎陽虛不能行水肚腹腫脹或四肢浮腫或喘急痰盛已成臌症其效如神此症多因脾胃虛弱或酒溼過傷或治失其宜元氣大傷而變此症若非速救腎中之火則陽氣不充於下何以生土土虛何以制水此水腫之第一方也

熟地

一二兩  
均可

淮藥

五小

棗皮

半

川牛膝

二小

玉桂

一小  
研沖

車前

半

丹皮

一小  
酒炒

熟附片

三小

澤瀉

小半  
酒炒

雲苓

三升

煎服不拘劑

○○第百八十分○倣廓青飲

治三焦壅滯胸膈及滿氣道不清小水不利年力未衰通身腫脹或肚腹單脹氣壅非水等症

腹皮

一小

桔壳

二升  
炒

厚朴

小半

白芥子

小半

萊菔子

生搗一小如中不  
甚脹能食者不用

茯苓

五升  
浸度

生澤瀉

三升

陳皮

小半

煎服

如內多者入木通二小生枝子一小○如身黃小便不利者入茵陳二小○如大便不通小腹脹甚者入生軍五小○如兩脇脹痛者入青皮一小○如胸膈脹疼者入烏梅三小○如胃中食滯脹疼者入焦楂肉四五小炒麥牙三小

○○第百八二分○神香散

治諸氣不化以及氣腫諸病不效者此方主之又每因食後氣滯因腕胸脇疼痛者一服即安

白蔻仁 小半  
去壳 小半

共研極細末每服八分用開水調服若治氣數日服三次與煎藥相間服之  
○○第八二方○倣胎元飲

治娠婦體虛胎氣不安四肢困倦或時眩暈宜用此方加減常服愈多愈妙

紋黨 四小  
酒炒 熟地 八小  
熟地 八小

歸身 三小

白芍 一小  
炒

炙草 一小  
杜仲 三小  
酒炒 陳皮 小半  
淮藥 三小

老米一撮煎服○如嘔吐惡心入法半夏二小半姜八分○如帶濁過多入炒次寢四小淮藥停之  
○如有微火入大生地三小黃芩酒炒八分○如偶有所觸而動血者加炒阿膠五炒川續斷三小  
○如偶有氣逆者加砂仁八分青皮八分

○○第百八三方○涼胎飲加減法 治娠婦體寒血熱脹滿胎氣不安口乾內熱等症

大生地

酒炒 五小

黃芩 一小

麥冬 二小

志 七小

桔壳 小半

炒 小半

白歸身

三小

甘草 八分

三小

石斛 三小

陳皮 半

如遇有動血加炒阿膠四錢小半○如內熱甚加黃柏一小○如口渴喜冷加生石膏三钱竹葉五片○如歎濃痰加川貝二钱桑皮一小○如宿食滯加焦楂肉三钱炒麥芽三钱○如大便閉結加酒炒大黃小半麻仁三钱○如小便短滯加赤芍二钱生車前一小○第百八四方加減固陰煎

治陰虛滑瀉帶漏遺淋以及陰虛漏胎並經水因虛不固等症極爲神效經驗

北五味

十四 粒

沙參

一兩 炙

熟地

一兩

淮藥

五小 炒

阿膠珠

四小

炙草

一小 炙

升麻

七分 酒炒

棗皮

半

如虛滑遺甚者加烏梅二個炙醋炒小半○如小腹痛而兼瘧者加固脂酒炒三钱杜仲羌活

炒三小

○○第百八五方○經驗清胎飲

治孕婦血熱而脈洪大有力因火而漏胎者服此方卽安

大生地

一兩

柯膠珠

五小

枝子

一小

黃芩

一小

荆芥穗

二小

白茅根

八小

麥冬

四小

用紋銀一錢同煎血漏者一服多者兩服卽安

○○第百八六方○經驗安胎飲 治孕婦因跌蹣漏血偶有所觸而下血者此方主之

熟地

一兩

閨黨

五小

艾葉

一小

柯膠珠

四小

白芍

半

歸身

三小

川弓

小半

炙甘草

小半

地榆

二小

芥穗

二小

黃芪

小半

炒棗皮

小半

酒炒

醋炒

紅棗十枚紋銀二錠同煎重者日服二服數服即愈

○○第百八七方○加味固胎煎

熟地

八分

生地

五分

黃芩

小半

柯膠珠

四分

白朮

二分

白芍

一分

砂仁

八分

大歸身

一小

陳皮

一小

煎服

○○第百八八方○晚花煎

瀉盆脣產者先服此藥催告最佳並治產難經日或壞不下等症

當歸

二兩

玉桂

三分

川牛膝

三分

川弓

二分

車前

小半

紅花

二分○催生者不用此味若下壞胎必不可少體寒者放心倍用

用酒一杯兌服○如氣虛者入酒炒紋党參四五分○如血虛者加熟地二兩均可○如下壞胎再

加朴硝四小童便一杯兒服卽下

○○第百八十九方○加味滑胎散 凡胎將入臨月常服數劑以便易生

熟地

二兩

當歸

五分

川弓

八分

桔壳

一小

杜仲

三分  
酒炒

陳皮

八分

牛膝

一小

淮藥

四分

沙參

四分  
炙

意米

五分

空心煎服

如氣不舒者再用紫蘇兜子半個爲引

○○第百九十分○牛膝散 治胞衣不下腹中脹滿急服此藥化腐而出久則難救

川牛膝

川弓

樸硝

以上三兩  
切不可減

當歸

二兩  
五分

蒲黃

三兩

桂心

生地

以上  
五分

生羌三片

澧煎時時  
頻服卽下

○○第百九一方○黑神散

治產後惡露不盡胞衣不下血氣心腹痛不止並治脾腎虛血不全守吐血等症

黑小荳

一兩  
炒

當歸

五分

熟地

一兩

蒲黃

一分

生白芍

二分

炙草

一分

炮羌

二分

玉桂

一分

煎服以童便一杯酒一杯和勻服

○○第百九二方○經驗滑石散 治難產○凡水下胎子胎滯不生用此最效

滑石

一兩

白蜜

半盞

香油

半盞

右將蜜油慢火熬熟三四沸掠去沫調滑石末頓服外以油調敷產婦臍腹上摩之立效

○○第百九三方○薛氏加味逍遙散 治肝腎血虛小水不利及崩漏不閉而痛者

當歸

七分

白芍

二分

酒炒

白朮

三分

炒焦

伏神

三分

柴胡

一升

甘草

一升

丹皮

八分

炒枝

八分

○○第百九四方○加味弓歸湯

催生妙方並治產晉不開或五七日不生而垂危者此方不拘劑連服極爲應驗

當歸

七分或  
用二兩

川芎

七分

龜板

七分  
炙

○○第百九五方○歸脾飲  
用生男女之婦人髮一握以皂角水洗淨存性同煎服

古方云治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘怔忡驚悸盜汗卧視小便或大便不調心腹疼痛  
瘡創癰結妄服劫伐傷脾致生變症最宜用之○此方入柴胡山楂各一升卽名加味歸脾湯治脾  
經血虛熱並治婦人產門不開極應故特爲產門不閉而因憂思傷脾血熱者驗之若余治血症  
從未用此方以方內有當歸木香貞爲血中虧試忌用之藥故以此方不列入血症門者須體察之

人參

隨宜○或用  
我党參五分

炙芪

四分

焦朮

三分

伏苓

二分

棗仁

二分 炒

遠志

一小

當歸

三小

木香

五分

炙草

五分

桂元肉十粒煎服

加柴胡炒山枝各一小卽名加味歸脾湯治瘧門不閉之極應也

○○第百九十六方○良方龍胆瀉肝湯

○○治肝經溼熱有餘之症或暴怒傷肝動火而瘧門不閉者竇熟方可用之

龍胆草

小半  
酒炒

黨參

二分

天冬

小半

麥冬

小半

川黃連

八分

炒枝

八分

甘草

七分

知母

七分

淡黃芩

一小

柴胡

小半

五味

五分

煎服

○○第百九十七方○補中益氣湯

治勞倦傷脾中氣不足清陽不升外感不解體倦食少寒熱瘧痢氣虛不能攝血及脾虛作泄大陽  
下血日久一切下陷之症並治婦人子宮不收而外墮者均屬相宜此方與前第百五六之補陰益  
氣煎卽此方之變方也用者宜參閱之

人參

墮宜或用

炙芪

四分

焦尤

三分

炙草

八分

當歸

小半如鴻

陳皮

八分

升麻

三分

柴胡

五分

酒炒

差末煎午前空心服○如婦人子宮不收入醋炒白芍五分

○○第百九八方○生化湯

凡正產小產後均以此方投之連服三四服俟惡露盡去桃仁再服數服可免百病此方於產後子  
吉不易之方也生新血去瘀血故名之曰生化湯古方藥味甚輕今改重之以今人非古可比也

當歸

一兩

炙甘草

五分

川芎

五分

干羌

五分

炮

桃仁

五分  
去皮尖

益母草

四小

用紅糖五小童便一杯兌服。如血虛血暈入荆芥穗七八分。如氣虛氣脫而怠倦者甚入酒炒  
党參四五小。如陽虛厥逆四肢發冷入熟附片一小玉桂八分。如氣壅痰塞入陳皮去白三小  
竹沥少許兌服。若口噤如風反張極熱者入京芥防風各七分。如惡露未盡身發寒熱頭疼脹  
脹小腹必痛入紅花丹皮玉桂各四分元胡索小半。如內傷飲食吞酸飽脹入焦楂肉三小炒麥  
牙陳皮砂仁小半倘產後下血不止或如屋漏水者沉黑不紅或斷或來此氣血大虛不可妄用寒  
涼。宜大熱之藥如熟附片干姜可放心重用否則無救矣諸君隨時酌用倘無他症不可妄改。

○○第百九九方。當歸川芎湯

治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒等症。凡用此方必將痛處以手按之愈痛此是瘀血方以  
此方投之立效若投之反不痛者必是血虛此方卽萬萬不可用關係非小仍須以生化湯加減斟  
酌用之以方內有青皮澤蘭等藥非是瘀血作痛者不可輕用。

當歸

八小

熟地

七小

白芍

二小

元胡索

小半

川芎

二分

桃仁

五分

紅花

八分

香附

小半

青皮

一分

澤蘭

二分

丹皮

小半

童子便

分服

○○第二百方。人參黃芪湯

治少陰氣虛下血不止

人參

隨宜或用酒  
炒黨參五分

黃芪

二分

當歸

四分

焦述

四分

白芍

小半  
炒

艾葉

一小

阿膠

四分  
炒珠

米汁

煎服  
更好

○○第二百零一方。腰痛前

治產後兒枕疼痛等症

當歸

一兩

川芎

二分

炙草

一分

茯苓

三分

玉桂

研末  
一分

煎服

如脉細而寒或嘔者入干姜二三小炒。如血熱多火者去五桂入酒炒白芍盡小。如脈弱陰虛者入熟地七八小。如氣滯者入酒炒香附小半或用烏藥二小亦可。如腹痛加入炒杜仲二三錢均妙。

○○第二百零二方。扶羸小品方 虛弱孕婦欲下胎者。宜用此方主之。

四小

川芎

二小

甘草

八分

玉桂

八分

研沖

炒干羌

八分

黃芩

一小

蟹瓜

四個

桃仁

八分

煎六分空心服未動再服

○○第二百零三方。廣濟下胎方 下生胎死胎均效

天花粉

四兩

玉桂

一小

牛膝

壹錢

荳豉

以上  
四兩

用水七碗濃煎兩碗半分作服三次服後一時許又進一服卽下但藥味不可減少減輕則不應

○○第三百零四方。良方桂心散 治孕婦因病胎不能安可下之

桂心 二示

瓜蔓 一小

牛膝 三示

瞿麥 三示

當歸 二示

煎服 二劑卽下

桂心 三示

麝香 五分

右爲末作一次 調酒服  
之卽下

○○第二百零五方○桂香散 治胎死腹中不能下者

○○第二百零六方○斷產小品方 婦人生子過多氣血多虛而欲斷產者

故蠶退紙 尺

燒灰用酒調一杯 空心服之  
永不受娠

四物湯一服

用菜油一撮藥名芸苔子

○○第二百零七方○千金斷產方

治癆瘤前

紅花

三示

乘行經後空心服永不受娠

○○第三處方。雲雷鼓盪法。

治小便不通因虛火不足之症而凝結者。一服即通。又名七味地黃湯。

熟地

二兩

玉桂

一小

棗皮

三小

生車前

半升

伏苓

二示

澤瀉

一小  
鹽水炒

丹皮

一小

生淮藥

二示

陳皮

二示

法夏

二示

伏苓

三示

甘草

一小

杏仁

三示  
去皮尖

白芥子

八分。老年人  
及氣弱者不用

生羌三片

空心  
煎服

服之節通此方無不利小便而治腎水腎火鬱中有火則膀胱氣化自行此不通而自通也。  
○○第二處方。六安煎。治風寒咳嗽痰凝氣逆而因氣逆故小便不通者。以此方服之再行探吐。

如外感寒邪盛者入北細辛五六分○夏月嚴寒甚者入麻黃桂枝各七分○如頭疼鼻塞者入  
蔓京子二分○如肺胃有火而蒸濃痰者入酒炒黃芩一两熟石膏三两去生羌○如胸膈脹滿者  
入厚朴八半

○○第二百十方○生血潤腸湯 治男婦老少大便不通○凡非實熱者此方極爲穩妥屢試屢驗

二两

熟地

元参

七分

當歸

五分

桃仁

十粒

去皮尖

麻仁

二分

生軍

八分

紅花

三分

川芎

三分

煎服一二劑即通○此方以熟地元參當歸養陰血少加麻仁生軍以潤腸下行而不亟以通  
之補正氣有所養而邪自出矣用方之妙存乎其仁不徒以病治病也

○○第二百十一方○潤腸湯 治男婦老少大便燥結不通者

二两

熟地

五分

大生地

三分

歸尾

三分

桃仁

十枚

去皮尖

麻仁

二分

生甘草

二分

紅花

四分

水煎

空心服

○○第二百十二方○通幽湯

治大便燥結堅黑腹痛

熟地

二兩

小生地

四分

歸稍

三分

紅花

四分

生軍

一小

桃仁泥

一小

升麻

二分

水煎

空心服

○○第三百十三方○赤金丹

治諸積不行凡氣凝血滯寒痛腫脹癰結積疋此方主之此攻法之峻者必察其脉寔體弱者切不可用  
用之姪婦忌服小兒體虛者亦宜減半體弱者切不可用

巴霜

小半

生附子

二分

皂角

二分

輕粉

一小

丁香

三分

天竹黃

三分

木香

三分

硃砂

二分

右爲末醋浸蒸餅爲丸蘿蔔子大以硃砂爲衣欲緩者每服五七丸欲驟行者每服二十九角滾水或使君子煮湯送下○若利多不止可冷水一二口飲之卽止蓋此藥得熱則行得冷則止也○如治溼氣甚滯脹脹着紅棗煮爛取肉一小許隨用七八九甚者二十九全黃肉搗爛用以熱燒酒加白糖少許送下○如法虫痛亦用夷肉照前法用開水送

○○第三百十四方○太平丸

此攻伐之次者也治胸腹疼痛脹滿及食積氣積血積寒邪是秘癥痛劇等症○此方借些微巴豆以行群薦之力去滯最妙欲其峻者須用巴豆霜二小○此方血症亦宜孕婦忌服

厚樸 木香 陳皮 烏藥 草豆蔻 二陵  
干羌 茂尤 澤瀉 牙皂 上各三小  
炒斷烟以 巴豆霜一小

右爲細末以老米粥糊丸如桑豆大每服三分甚者或五分或一小隨症用湯引下○如傷食導滯以麥牙楂肉隨宜煎湯送下○如婦人血氣痛用紅花三分當歸二小煎湯送下○如氣痛用陳皮一小煎湯送下○如疝氣痛用茴香八分煎湯送下○如寒氣用生姜湯下○欲泄者用極熟姜湯

送下一不利再服○利多不止飲冷水二口卽止○此方欲作煎劑試之亦可卽以各三不改爲各八分○以巴霜紙用三分照症加引煎服

○○第二百十五方○勝紅丸

治脾積爲氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積婦人血積小兒食積均可治之○如作煎劑以十分之一用之再入生羌三大片爲引此攻法之次者也

三稜 芪朮 青皮 陳皮 干羌

良羌

以上一兩

香附

二兩 酒炒

共碾米陳醋和丸如桐子大每大人服四十九小兒服十五丸用羨湯下  
○○第二百十六方○助氣丸

治三焦痞塞胸膈飽悶氣不流通蘊結成積脹癧氣塊並皆治之此攻法之次者也

三稜

炮

莪朮

泡

青皮

橘紅

焦朮

以上五小

# 廣木香

# 花枳榔

# 桔梗

以上  
三不

右爲末以老米粥和丸如桐子大每大人服五十丸小兒服十五丸白開水送下。此方欲作煎藥即以三分之一用之。

○○第二百一七方○陳皮三稜丸 此方能消積聚並去麵米五穀等積均屬立應此攻法之次者也

# 南木香

一小

# 陳皮

二稜

# 砂仁

麥牙

以上  
三不

# 陳蒼米

一兩○用巴豆五枚去壳全米

慢火炒至焦色去巴豆不可用

右爲末醋糊丸如豆大如大人每服五十丸小兒二十丸空心羌湯下。此方欲作煎劑以生薑三大片爲引小兒減半用

○○第二百十八方○溫白丸

治心腹積聚癰癧痞塊大如杯碗胸脹滿嘔吐下心堅結一團兼傍攻兩脇如有所碍及一切諸風身體頑麻三十六種遺尸注忤十種水腫痞塞心腹痛中諸疾但此藥必愈此攻法之次者也

川烏

二兩  
製

皂角

炙去  
皮弦

吳子

開水泡  
一宿炒

石菖蒲

法閉口

柴胡

桔梗

炒黃

厚朴

羌汗  
炒

川椒

炒出汗

高麗參

伏苓

干羌

玉桂

去皮

巴豆霜

紫苑

以上  
五分

共爲末用蜜丸如桐子大每服三十九姜湯下○肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足用柴胡川弓各一小煎湯下○心之積名曰伏梁起膈上在心下加石膏滿八分桃仁去皮尖五分煎湯下○脾之積名曰痞氣胃脘覆大如盤者八千羌一小煎湯下○肺之積名曰息竇在膈下覆大如杯入人參三分紫苑一刃煎湯下○腎之積名曰奔豚發於少腹若豚狀或上或下入丁香五分茯苓一小遠志肉五分煎湯下

○○第二百十九方○秘方化滯湯

此攻法之峻利者○能理諸氣能治諸積尊造化有通塞之功調陰陽有補泄之妙久堅沉痼者磨之自消暴滯留積者導之自去但用此丸必察其元氣未衰體強脉寔者方可投之倘屬虛弱而輕用之恐更傷元氣而用之者相其體用之○孕婦勿用

南木香

丁香 青皮 橘紅 黃連

以上二  
小五分

莪朮

三陵

以上二  
五分

半夏曲 三分

八味共研細末候用

巴荳

一兩○用滾水泡去心膜以好醋浸少頃慢火熬至醋乾秤足六分

烏梅肉

一兩焙乾爲末五分以米醋調俟略清連前各藥即熬成膏矣

共和勻用灰面稠糊爲丸如蘿蔔子大每服壯者十九弱者七丸五更空心用陳皮少許煎湯送下○如停食飽悶用桔壳一小煎湯送下○因食吐不止以津嚥下卽止○婦人血氣痛入當歸二分煎湯下○如赤痢用甘草五分泡湯下○如白痢用干姜五分泡湯下○赤白痢相兼用紅白糖各一小泡滾水下○如心痛用石菖蒲五分煎湯下○如諸氣痛用生姜三大片陳皮一小煎湯下○如小腸氣痛用茴香五分泡湯下○如欲推蕩積滯用極滾羌湯下再加散丸未利再服○倘利多

○○第二百二十一方○百順丸  
不正飲冷水一二口卽止此藥得熱則行得冷卽止○小兒痘積量兒大小用米湯下○婦孺勿服

治一切陽邪積聚凡氣積血積虫積食積傷者及實熱秘癆等症各以引湯送下無往不利

## 錦紋川大黃

一錢

## 牙皂

一兩六分

炒微黃

右爲末用蜜爲丸如葵豆大每大人服三小小兒或四五分○如氣痛積滯用陳皮一小檀香三分煎湯送下○如血積用當歸二分元胡索二分煎湯下○如虫積用川椒三分去目炒出汗史君子五個煎湯下○如食積用蒼肉三分麥芽二分煎湯下○如小兒疳積用佛耳草煎湯下每服九次接服四君子湯一劑

○○第二百二十二方○阿魏膏

治一切痞積堅硬者

穿山甲 姜活 獨活 元參 桂枝 赤芍

兩頭尖 生地 生軍 白芷 天麻 紅花

以上五分

木鱉

十枚  
去壳

亂髮

一團

槐枝柳枝榆枝

各五  
爪

右角香麻油二觔四面煎藥至黑渣入鬚前髮化去渣入真正黃丹煎收再入後剝各藥

阿魏

芒硝

蘇合油

明乳香

沒藥

以上  
五分

麝香

三分

慢火熬之卽成膏矣

此膏用紅布攤貼患處先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋數層用熱熨斗熨良久如硝耗再熨之約熨兩時許方貼當瘡獨是疽積加蘆薈末熨之

○○第二百二方○琥珀膏

治頸項癰癧及腋下初結小核漸如連珠不消不潰或潰而膿水不絕經久不愈或成漏症

血珀

木鱉子

防風

當歸

白芷

木通

以上  
二兩

丁香 玉桂心 硃砂 松香 以上  
香油 二斤

有先將琥珀等六味爲末其餘薦同油煎黑瀝去渣徐入黃丹再煎軟硬得中入前六味藥末卽成膏藥量瘡之大小用布攤貼患處

○○第二百三方○貼瘡琥珀膏 治癰積瘡塊

大黃 朴硝 以上  
一兩 共爲末以大蒜全搗 前之琥珀膏貼患處

○○第一百二十四方○水紅花膏 貼瘡塊

水紅花連子每一碗以水三碗用桑枝作柴又火盛膏量瘡大小用紙攤貼膏用酒調服三小不飲酒者用白開水調服亦可

○○第一百二十五方○加減蠟蕊散

治產後寒凝露體分娩時寒邪入裏並治男婦脾胃虛寒氣滯不行攻刺心腹連胸脇作痛寒散氣病及婦人血氣刺痛等症無不立見奇功中病卽止不宜過服

蒼朮

八分  
炒

干羌

五分  
炒

三稜

七分

莪朮

七分

雲苓

二分

青皮

七分

砂仁

四分

丁香

四分  
研末

玉桂

三分  
研末

元胡

二分  
酒炒

炙草

五分

丹參

三分  
和酒炒

用連鬚悉三條煎七分空心熱服○如產後癓之甚者不妨再加熟附片一二分○如分娩受寒而用力勞神困倦者除加熟附片之外再放心入熟地一兩俗醫云產後禁用熟地不知出自何典所謂產後禁用補者非爲熟地補也

○○第二百二十六方○經驗解毒散

治慎服人參或熟芍忽然上攻頭面腫脹氣促痰壅目赤脣紅或嘔吐之象產後而妄投參剉或過食煎炒厚味而內熱熾甚者凡此等症無不立效

麥冬

五分  
志

銀花

三分

甘草

三分

元胡索

二分

牛膝 小半

澤瀉 四分

用菟蕡二兩全煎

如甚者再加生菟蕡二兩搗爛用滾水調開以快字不佳手挾冷澄清頓服或再兌入藥內亦可

○○第二百二十七方○紫蘇飲 治胎前胸脇俱痛氣上逼胸甚至不能卧者名之曰子懸症

當歸 四分

川弓 小半

陳皮 小半

白芍 一小

酒炒

甘草 八分

蘇兒 二分

香附 小半

酒炒

腹皮 一小

用生姜參片煎服凡粒米食及一切凝滯之物悉當忌之

○○第二百二十八方○芩朮湯

治子懸症

黃芩 二分

焦朮 二分

陳皮 三分

空心煎服

○○第二百二十九方○天仙藤散

治孕婦數月兩足浮腫或流黃水喘悶不食名之曰子氣

天仙藤

小半酒炒

蘇葉

八分

陳皮

一小

香附

一小

川木瓜

四小

烏藥

二分

甘草

七分

生姜

三片煎服

○○第三百三十方○竹葉麥冬湯  
治婦受胎月後心驚胆怯煩悶不安者目子煩

治婦受胎月後心驚胆怯煩悶不安者目子煩

五分

伏苓

三分

勾藤

小半

黃芩

一小

麥冬

五分

志

竹葉

二十

煎服

○○第三百三十一方○紫苑湯加味法  
治婦受胎月後心驚膽怯煩悶不安者目子煩

治婦受胎月後心驚膽怯煩悶不安者目子煩

紫苑

小半蜜  
蕊

天冬

二分

麥冬

二分

桑白皮

一小

炒

淮藥

三分

桔梗

一小

沙參

四分

太杏仁

三分

去皮

甘草

五分

竹茹

三分

煎服

○○第二百三二方○羚羊角散

治娠婦偶受風寒口流涎沫角弓反張醫不知人名曰子癇○癇者間陽之意內經大奇篇云凡心  
脈滿大癇損筋變益神氣不通於心包則癇神氣不行於骨節則搐癇則筋變於內搐則筋變於外  
且癇搐兩症因神氣之內虛有因肝血之不足凡孕婦感受此症其病多在肝經

羚羊角屑

三两

當歸

三两

川芎

三两

茯苓

二两

木香片

五分

杏仁

三两

棗仁

一小

鈎藤

三两

五加皮

三两

薏米

七两

獨活

五分

茯神

三两

用生姜三片煎服輕則兩服重則連進三四服愈

○○第二百三三方○理陰煎

治脾胃中虛等症宜剛燥者當用理中回陽等湯宜溫潤者當用理陰大營煎等湯○此方通治陰虛弱脈滿瘀飲吐泄腹痛婦人經遲血滯產後陰勝多寒並治素屬真陰不足者或忽感寒邪不能解散或發熱或頭身疼痛或面赤唇焦或渴不喜冷但凡脉無力者必是假熱之症若妄用苦寒之藥必致速死宜以此方照加減主之所謂邪從正解養正去邪之謂也大利近時之用

## 熟地

二三兩卽  
三兩亦可

## 當歸

二三兩  
或五七小

## 炙草

一小

## 玉桂

宜研末冲  
一二小隨

水煎熱服○此方加熟附片二三小卽名附子理陰煎加入參隨宜卽名六味回陽飲均治命門火衰陰中無陽等症○若風寒外邪尙未入深但見發熱身疼脉數不洪內無火症者加柴胡小半連服一二劑其效如神○如寒凝陰結而邪難解者加麻黃七分○如背惡瘡者加熟附片一二小再加柴胡小半○如陰虛火盛而熱不解者加吳茱萸五分丹皮小半不用五桂單用三味○如泄瀉不止去當歸加生淮藥四小杜仲羌活炒三小○如腹痛脹及胸脇脹滿者加陳皮小半砂仁八分如腰腹疼加枸杞二小杜仲羌活炒三小○如腹痛脹及胸脇脹滿者加陳皮小半砂仁八分

## ○○第二百三四方○做貞元飲

卽前理陰煎不用桂者○治氣短似喘呼吸急促提不能升咽不能降氣道噎塞勢劇要危者常人

但知氣急其病在上而不知元海無根肝腎虧損此心腎不交而爲脫氣症也尤治婦人血火多虧及產後虛喘其效如神若妄投痰凝氣滯妄投牛黃蘇合等丸而破耗是速其死矣

熟地 二二兩或 三小 炙草 三小 當歸 二小

淮藥 四小

橘紅 五分 煎服

如惡寒作嘔者加生薑三大片煎○如氣虛多汗者加米并炒防風五小或用高麗參五小更妙○  
如手足厥冷加玉桂一小研末沖服此二方可參用也

○○第三百三五方○七灰散 治血崩種痘及產後胎前均可用○又男子下血不止亦可

蓮蓬壳 一個 鴛粟壳 一個 鹹蟹壳 一個 藕節 七個

益母草 五小 旱蓮草 五小 舊棕 片

共燒灰存性爲細末分作兩次用醋點溫服

○○第二百三十六方○龍骨散 治血崩不止產後胎前極甚宜

龍骨 煅

當歸

香附 酒炒以 上二兩

舊棕 五分

共爲細末每服五分用米湯空心服忌喫油膩之物

○○第三百三十七方○倣人參當歸湯 治去血過多內熱少氣頭暈悶骨節作痛虛煩咽燥其效如神

洋參 三分

當歸 四分

大生地 五分

熟地 兩分

白芍

二分 酒炒

麥冬 三分 去心

淡竹葉 十皮

薏米 五分

用陳倉米一撮紅棗五枚煎服三四劑全愈

○○第三百三十八方○止血救急湯

蒲黃

二兩

水煎頓服或加當歸一兩亦可

○○第二百三十九方○經驗生乳湯 治產後乳少及乳不通極爲神效

熟地

一兩

箭芪

八分  
酒炒

當歸

四分

王不留行

三分

淮藥

三示  
酒炒

炙草

二示

陳皮

八分

大生地

五分  
酒炒

木通

一小

瞿麥

一小

用猪吹啼熬清湯煎好空心服之如不應再服即愈

○○第二百四十方○連翹青煎

治產後乳吹乳以致乳汁不通腫痛並治陽經癰毒在臟腑胸肺膈乳之間此方最佳

土川貝

三示

銀花

三示

紅鷺

七示

夏枯草

二示

蒲公英

三示

連翹

一兩

花粉

二示

水煎服

半時

○○第二百四十一方○南星散

治產後因兒吹乳以致乳汁不通腫痛甚者外敷即消

南星

二兩

爲細末以葱汁調敷

再服連翹  
金煎

○○第二百四二方○麥芽散

產後或無兒飲乳或餘乳蓄結或血氣充實致令腫脹作疼乳房疼痛一服即消

炒白麥芽

三兩

煎服立消輕則不應矣

○○第二百四三方○詩至方

治乳吹癟

婦人吹乳法如何

皂角燒灰蛤粉和

熱酒一杯調八字

管教時刻笑呵呵

○○第一伯四四方○溫帛熱熨法

治新產乳多脹滿外溢不止

用新白布以極滾水浸透乘熱熨之節不外溢

○○第二伯四五方○開門丹

治臨產發骨不開極應此方必要兒已轉身方可服倘胎中兒尚未轉身切不可用

杜木枝

壹兩

當歸

二兩

川芎

壹兩

生黨

壹兩

煎服卽開

○○第二伯四六方○倣秘元煎法

治陰虛遺精帶濁脫滑等症男婦大小皆可用之凡屬心脾虛損者宜

間黨

五錢  
酒炒

遠志

八分  
製

茨實

四錢  
炒

淮藥

四錢  
炒

棗仁

錢半

茯神

錢半

炙草

錢半

五味

十四  
粒

金匱子 去核 煎服

式錢

如有微火加苦參錢半○如氣虛者加北蓍三四錢每曰一劑以愈爲度服十劑後再加熟地壹兩

大生地酒炒五錢

○○第二陌四七方○做固陰煎加減法

治陰虛滑滯帶濁遺淋及經水不固並治婦人陰挺以及男婦肝腎不足等症

人參

隨宜○或用黨  
參酒炒五七錢

熟地

壹兩

淮藥

五錢

桑皮

錢錢

免絲子

壹錢  
炒香

五味

叁粒  
搗碎

炙草

錢半

用蓮肉四十枚去心煎服○如滑泄不禁者加金匱子肉叁錢文蛤醋炒壹錢烏梅貳個○如肝腎血虛而血不歸經者加土炒當歸叁四錢○如氣虛下陷者加酒炒升麻壹錢

○○第貳陌四八方○薰洗木湯湯

治陰中生物名曰陰挺每曰薰洗數次○婦科

水楊柳根

五焙子

魚腥草

枯凡

金毛狗脊

黃連

以上各  
用壹兩

右爲末分作四劑用有嘴瓦罐煎湯以小竹去節接於罐嘴上引熱氣蒸於陰中或透引挺上俟湯溫仍以湯沃洗之仍服治挺之藥

○第貳伯四九方○桔壳散

治婦人陰腫者

桔壳八兩切碎煎極熟以舊綢包裹納陰中並將一半用舊綢包裹於陰戶之外乘熱熨之冷又更易數次卽愈勿妄治之

○○第貳伯五十方○薰洗椒茱湯

治婦人陰痒手不能住者

花椒

吳朱子

蛇床子

以上

藜蘆

五錢

陳茶

壹兩

炒鹽

貳兩

煎水乘熱薰洗後以硯硃紙燒灰擦雞肝一片入陰中以制其虫更妙勿妄治

○○第貳百五一方○芍藥蒺藜煎

治男婦通身濕熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡症如神

○○第貳百五一方○芍藥蒺藜煎

治男婦通身濕熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡症如神

白蒺藜

壹兩連  
刺打碎

白芍

二錢

生地

四錢

山枝

錢半  
炒

龍膽草

錢半

黃芩

錢半

木通

二錢

澤瀉

二錢

金銀花

叁錢

薏米

七錢

茯苓

叁錢

空心服

○○第貳百五一方○蛇退散

治婦人陰中生瘡先用藥水薰後以此散塗之

蛇退

壹兩  
存性

枯凡

黃丹

麝香

藁本

以上  
壹兩

蛇床子

硫黃  
芥穗

以上  
五錢

共爲細末如瘡中乾用香麻油調搽如瘡溼卽將藥末乾滲之倘藥脫又搽日不拘次

〇〇第一百五三方○神應養真丹

治男婦肝腎虛損四時不正之氣所襲脚膝無力或右癱左癱半身不遂手足顚麻語言蹇澁氣血凝滯遍身疼痛等症○此方加十倍以蜜和丸每早晚各服五錢亦妙

熟地

壹兩

當歸

叁錢

川芎

式錢

免絲子

叁錢  
炒香

天麻

錢半

川牛膝

錢半

白芍

錢半

姜活

壹錢

木瓜

叁錢

煎服

〇〇第二貳伍五四方○虎骨酒

驅風補血益氣壯筋骨強腳力

真虎骨

壹對  
洋油酥

川泰

壹兩  
五錢

牛膝

貳兩孕  
婦勿用

薏米

四兩

五加皮

四兩

固脂

貳兩

熟地

十兩

杜仲

式兩  
姜汁炒

壽身小補

浸燒酒

十觔不  
要煮

○○第貳伯五五方○椒艾囊

治脚氣

艾葉

八兩

川椒

四兩

草烏

四兩

共爲粗米和勻用粗布包裹足底足脰外用微火烘之使椒艾之氣得行於內或夜卧取包之達旦

去之此法極效

○○第貳百五六方○敷脚氣方

治脚氣腫痛不能落地

芥菜子

五錢

白芷

四錢

研末用姜汁

調敷

痛處

熟地

參兩

當歸

七錢

白芍

六錢

酒炒

川芎

三錢

○○第三五七方○加味地黃湯

治穿心脚氣不能落地者

三柰

四錢

木瓜

參錢

蘇葉

八分

牛膝

錢半孕婦勿用

陳皮

錢半

杜仲

參錢  
羌汁炒

煎服

檳榔

七枝

橘紅

木瓜

以上

吳子

蘇葉

以上

桔梗

五錢

生姜

五錢

煎好五更時

三分作二  
次冷服

○○第二五八方○雞鳴散  
治腳氣第一品藥不問男女皆可服如感風溼流注痛不可忍筋脈浮腫者並宜服之其效如神  
如冬月嚴寒溫服亦可服後以乾點心壓下至天明後如大便內下黑糞水卽腎經所感之寒溼也  
早飯宜遲喫使藥力作效此藥並無所忌

○○第二五九方○立效散

治腳氣攻心○如消腫裏數○及治暴腫

檳榔

七枚

陳皮

八錢

蘇葉

七錢

吳子

參錢開水泡  
三次去苦汁

木瓜

壹兩

生姜

貳兩

煎好分作兩次服

○○第二六十方○當歸拈痛湯

治溼熱爲病肢節疼痛肩背沉重胸膈不利手足遍身流注疼痛溼熱等症男婦皆宜

羌活

貳錢

黃芩

貳錢

炙草

錢半

茵陳

參錢

酒炒

黨參

貳錢

升麻

八分

干葛

錢半

葛參

錢半

蒼朮

錢半

防風

錢半

歸身

錢半

焦朮

錢半

知母

壹錢

豬苓

壹錢

澤瀉

壹錢

空心煎服

○○第一伯六一方○防已飲

治溼熱脚氣

焦元

或錢

防已

錢半

木通

錢半

賓郎

壹錢

川弓

錢半

生地

五錢

黃柏

壹錢

甘草梢

錢半

薏米

四錢

犀角

壹錢

煎服

酒炒

生當參

叁錢

麻黃

壹錢

黃芩

八分

白芍

壹錢

炙甘草

八分

川弓

錢半

防已

或錢

杏仁

或錢

去皮尖

如大便實加桃仁八分○如小便虛加牛膝錢半○如發熱加川連八分○內熱甚者加生石膏三錢○有痰加竹瀝姜汁一酒杯兌服

○○第二伯六二方○小續命湯 通治八風五痺癆厥等症○又於六經分別臨症加減用之

# 熟附片

式錢

# 官桂

壹錢

# 防風

錢半

生差三斤紅棗五枚煎服○如春夏加生石膏二錢知母壹錢○如秋冬以官桂附片倍用○如精  
神恍惚加茯苓三錢遠志八分○如骨節煩痛有熱者去附片倍用白芍○如骨間冷痛亦倍用附  
桂○如小便短澀去附片倍用白芍加竹瀝二酒杯兌入○臟寒下利去防已黃芩加焦沉式錢○  
如熱利減去附片官桂○如足無力加牛膝式錢姪婦不用○如身痛加秦艽酒炒叁錢○如腰痛  
加杜仲羌活炒叁錢○如失音杏仁去皮尖叁錢○如自汗去麻黃加焦白朮叁錢  
○○第貳六三方○加減檳榔湯 治一切脚痛脚弱名曰雍病最宜疎通春夏尤爲最妙

# 賓郎

四錢

# 橘紅

叁錢

# 蘇葉

叁錢

# 炙草

式錢

生薑三斤煎服○如足痛不已者加木香八分五加皮三四錢○如婦人足痛加當歸叁錢○室女  
足痛係肝血實帶宜加赤芍貳錢○如中滿不食加桔實八分○如吐痰加半夏貳錢○如大便不  
通加生大黃錢半○如小便不通加木通式錢○如轉筋者加吳子錢半用開水泡去苦汁再用鹽  
水炒透○如足痛腫者入大腹皮錢半木瓜叁錢○如足痛而兼熱者入地骨皮叁錢

○○第貳伯六四方○羌活導滯湯 治風溼實滯脚氣若係素虛弱者不可用

羌活

叁錢

獨活

或錢

防己

或錢

當歸

或錢

桔實

錢半

生軍

或錢

前服微利即止

過服  
不宜

姜活

錢半

當歸

或錢

桔實

八分

大黃

叁錢  
酒炒

穴工 心煎服以利爲度

○○第貳伯六六方○初生開口法

春秋三季內以甘草壹錢泡水用綿帛裹指蘸汁滿拭其口使口中穢物流出然後用核桃肉去淨薄皮搗鎔取汁和紅糖少許徐徐喂之俟對時再行哺乳○或拭口之後用保赤散貳三分服之再以桃核汁續進亦可○冬季內以生姜湯拭口蓋姜去寒通神明可免鴟吐之患此法最妙人所少知也拭口後其法如前○如初生兒甚肥厚面色紅赤唇色紅紫者胎火甚重於拭口之後即

用川連壹錢甘草五分泡水徐徐喂之亦續進核桃汁兒口中流出白沫愈多愈好免一切之病

○○第貳百六七方○萬應保赤散

此治小兒寒食凝滯急慢驚風痰壅甚并撮口膽風及初生拭口後以此調服貳三分可能療諸病余製此散而濟人甚多無不應驗此分兩係一料之藥如小兒分作三次服初生小兒作五次服如施濟人昭原方分兩或十倍二十倍合之重則五分輕者三分

真牛黃

叁厘

川連

五厘

硃砂

叁厘

青黛

五厘

上冰片

叁厘

珍珠

叁厘

生軍

叁分

赤金

五分

人中白

叁厘

百草霜

五分

蟬腿

七隻用銀捲插入

共乳極細末用鈎藤薄荷各五分煎湯調服

○○第貳百六八方○龍膽湯

治胎驚壯熱膽風撮口

胆草

勾藤

柴胡

王琴

赤芍

雲苓

以上  
五分

大王

壹分紙裏  
浸溼炮熟

妨風

七分

桔壳

五分  
炒

橘紅

四分

伏神

奏

芥穗

三分

遠志

四分  
志

桔梗

奏

南星

五分  
姜汁製

甘草

三分

燈心五節煎服

○○第二伯七十方○抱龍丸

治風痰壅甚或發熱咳嗽或發驚搐等症

胆草

四兩  
九製

天竺黃

壹兩

雄王

硃砂

已上  
五錢

射香

五分  
另研

共爲細末用甘草壹錢極濃汁和勻搗丸每兩作二十丸陰晾乾用薄荷湯下此方加牛黃卽名

牛黃抱龍丸加琥珀卽名琥珀抱龍丸今粵東陳李濟之丸卽此方也  
○○第二七二方○牛黃散 治小兒溫熱壯熱或寒熱往來急驚

真牛黃

甘草

以上五錢

柴胡

枝子

酒炒

胆草

炒

黃芩

酒炒以上  
二錢五分

右爲末每服五七分以金銀全薄荷煎湯調服

○○第二七二方○利驚丸 治急驚

天竺黃

二錢

黑牽牛

五錢  
炒

輕粉

壹錢

青黛

壹錢

共爲末蜜爲丸如豌豆大每歲一丸用薄荷湯下

○○第一七三方○抑青丸

治肝熱急驚抽搐○此方加大黃壹兩梔仁八錢卽名瀉青丸

羌活

壹兩

川芎

七錢

當歸

壹兩

妙風

壹兩

胆草

三兩

共爲末蜜丸如茨實子大每服一錢竹葉五片煎湯入沙糖化下○此丸作煎劑亦可以十分之一用如用大黃梔仁亦以十分一用之○再加熟地五七錢淮藥三五錢作煎劑亦可

○○第一七四方○安神鎮驚丸

治小兒驚退後調理安神養氣或將驚而預防之此丸已驚將驚先後皆可用

竹黃

另研

洋參

南星

羌

伏苓

以上

棗仁

炒

當歸

麥冬

生地

白芍

炒以上各三錢

薄荷

木通

桔子

川連

羌汗

硃砂

另研

牛王

另研 烟龍骨 貳錢 以上

毒代

壹錢 另研

共爲末蜜丸如綠豆大每服三五丸量兒大小用之淡羨湯下

○○第二百七十五方○六和湯

治生冷傷脾或食後凝風食留不化以致霍亂吐泄或小兒吐泄間有酸臭氣味以及一切暑風癮氣及不正之氣寒熱等症男婦老幼皆可服之其效如神此方名加減六和湯

白扁豆

五錢 去壳 霍香

壹錢

赤苓

壹錢

法半夏

錢半 去壳

霍香

壹錢

生沙參

叁錢

陳皮

壹錢

法半夏

壹錢 去壳

霍香

壹錢

大砂仁

壹錢

陳皮

壹錢

大杏仁

式錢 去皮尖

生羌二片煎服

如寒甚者加熟附片壹錢。如食滯甚者加焦楂肉三四錢或桑白皮三錢。如因氣食相搏者加木香片八分亦加焦楂肉式三錢小兒減半用

○○第二百七十六方○加味沉香降氣飲

治陰陽不和中焦壅滯氣不升降吞酸嘔吐飽悶等症氣虛者斟酌用之

真沉香

磨用五  
分兌服

沙仁

錢半

陳皮

壹錢

桔殼

壹錢  
炒

川厚朴

壹錢

香附

錢半

炙草

五分

生姜三片

陳

倉米一撮煎服

○○第二百七十七方○加味橘皮乾姜湯  
治惡心嘔噦寒在上焦或泛欲吐之狀○小兒減半用○婦孺不用法半夏

乾姜

錢半

黨參

式錢

橘皮

錢半

玉桂

八分去皮  
研末另冲

通草

壹錢

甘草

八分

雲苓

錢半

蔻仁

七分去壳  
研末冲

法夏

錢半

煎服

如兼呃逆者加柿蒂五個

○○第二百七八方○二汁飲

治反胃嘔吐極效○再加梨汁一酒杯名三汁飲○並治欬嗽嘔吐甚佳

甘蔗汁

兩酒

薑汁

壹酒

以二汁和勻用開水燙熱  
作一次服一日服三次卽止

○○第二百七九方○做玉燭散法

古方係四物湯與調胃承氣湯合角名曰玉燭此法卽余用古方之變方也利於近時善治噎膈初起脈症尙未大虛者設之倘病久脈虛萬不可用並治血虛便閉及婦人經閉

元明粉

壹錢

熟地

壹兩

當歸

叁錢

川芎

錢半

甘草

八分

柏子仁

壹錢

大黃

或錢半酒炒半蜜炙

白芍

錢半酒炒

松子仁

壹錢

○○第二百八十八方○加味寬中五膈飲

治七情鬱結致傷脾胃以致陰陽不和初成噎膈及氣逆等症○氣虛者酌之

青皮

壹錢

陳皮

錢半

香附

壹錢

厚樸

壹錢

羌活炒

白蔻

八分

砂仁

壹錢

丁香

七分

沙參

四錢

茯苓

式錢

甘草

五分

薏米

七錢

煎服

○○第三百八一方○經驗既驗  
治久嗽不已及勞損乾嗽聲啞並老年人水虧虛嗽以及嘔膈乾嘔凡經勞心用力之人屢嗽不愈  
者製此膏投之實有回天之力無論男婦老幼並娠婦久嗽者均能治之

熟地

六兩

生地

四兩

天冬

式兩

杏仁

叁兩

麥冬

式兩

黑芝麻

去皮尖

伏神

壹兩

茯苓

壹兩

薏米

式兩

甘草

八錢

白沙糖

叁兩

炒香

冰糖

壹兩

白蜜

叁兩

薑汁梨汁蘿蔔汁

各壹茶盅

右將各藥武火濃熬以新布扭去渣滓次以三什同藥汁用文火再熬兩時許然後以三糖入之慢  
慢文火即成膏矣用潔淨磁罐收貯放地一夜退去火氣用時以滾水沖化一兩或二兩均可總須

早晚空心調服

○○第一百八二方○安胃飲 治胃火上衝呃逆不止

陳皮

式錢

查肉

式錢

麥芽

式錢

木通

錢半

澤瀉

壹錢

黃芩

壹錢

石斛

壹錢

食遠服

○○第一百八三方○三因小丁香散

治呃逆

如胃火甚而脈滑實者人生石膏貳錢枝子仁八分

丁香

壹錢

柿蒂

七個

良姜

八分

前胡

○○第一百八四方○丁香柿蒂散

治吐利後或病後胃中虛寒或爲涼藥所誤致令呃逆不止急用此方趕緊煎服不可大意倘七八聲相連不斷收氣不同者卽爲不治之症

丁香

五分

柿蒂

七個

良薑

八分

炙草

五分

半夏

錢半

陳皮

壹錢

伏苓

戈錢

生黨

壹錢

生姜三天片煎服○如寒甚者加熟附片一貳錢玉桂八分  
○○第二百八五方○橘皮竹茹湯 治胃虛兼熱而呃逆者

橘皮

貳錢

竹茹

錢半

生黨

貳錢

石斛

四錢

甘草

五分

紅棗五枚煎服

○○第二百八六方○鼻鷄法 治呃逆服藥不效者此法不止必不能治

硫黃

叁兩

乳香

叁兩

用酒煎極濃令病人以鼻覶之坐旁再燒松香烟使病人以此煙薰入鼻中

○○第二百八七方○做歸氣飲

治氣逆不順呃逆等症及嘔吐中寒於脾腎者煮之

熟地

八錢

伏苓

壹錢

炮羌

錢半

丁香

壹錢研  
末另研

柿蒂

五個

陳皮

錢半

炙草

八分

煎服

如呃清水而寒之甚者加熟附片一錢○如肝腎俱癰者再加五桂八分研末另沖  
○○第二百八八方○大和中飲 治飲食留滯積聚或因感寒嘔吐等症男婦大小皆宜

陳皮

壹錢

甘草

五分

杏肉

式錢

伏苓

式錢

扁荳

貳錢

厚樸

錢半

生姜三片煎服

如嘔吐者入法夏一式錢。如脹滿氣逆者入砂仁八分。如上焦火鬱入山楂壹錢。如婦人氣逆或胎氣入蘇葉八分香附酒炒壹錢。如中寒者入炮羌一式錢玉桂八分研末沖服。

○○第一百八十九方○小和中飲之方失存故及之

○○第二百九十分○芩朮二陳湯 治痰壅水氣停蓄心下吐嘔等症

式錢

淮藥

錢半

豬苓

錢半

澤瀉

錢半

雲苓

式錢

陳皮

錢半

法夏

式錢

炙草

八分

乾羌

錢半

煨蔻三片煎服。此方原有白朮因近時真於朮少而藥室中之江西朮其性橫中故以淮藥代之又有蒼朮多有胃氣虛者聞此氣味更爲助嘔故以乾羌代之凡用藥必相其病者之強弱胃氣之厚薄審藥之氣味宜圓融通也

○○第一百九一方○仲景烏梅湯

治冒寒吐咼咼厥等症大小皆宜。古方原係作九余以之作煎剉極妙

烏梅肉

壹錢

乾羌

或錢

真川椒

五分去閉  
口炒出汗

桂枝

八分

熟附片

壹錢

川連

壹錢

白歸身

或錢

細辛

或分

炙防黨

四錢

王柏

錢半

生羌三  
片煎服

成無己曰肺欲收急食酸以收之烏梅之酸以收肺氣脾欲緩食甘以緩之炙黨之甘以緩脾氣  
寒溼於內以辛潤之當歸細辛桂枝之辛之潤內寒寒溼所勝辛熱以羌附之辛熱以勝寒  
甘則動得苦則安黃連黃柏之苦以安蟲此方最爲得法余屢用之無不獲效此古方而不拘於古  
法者卽以丸藥作煎劑而酌分兩之輕重所謂不守陳方不拘陳法變通之用於此

○○第一百九二方○藿香正氣飲

治外感風寒內停飲食頭痛寒熱以及霍亂吐瀉瘧疾初證傷寒並四時不正之氣等症

藿香

或錢

蘇葉

八分

桔梗

錢半

白芷

壹錢

陳皮

八分

法夏

錢半

伏苓

錢

甘草

七分

焦丸

壹錢

厚模

八分

腹皮

壹錢

羌棗煎服

○○第一百九三方○霍亂救急法

并指方

一霍亂刺委中穴卽脚心出血或刺十指尖出血或用刮炒法均效。一霍亂轉筋男子以手挽其陽物女子以兩手揪兩乳。一霍亂吐泄不止用燈火在氣海上節小腹之上並中脘卽脅之上及竇俞穴卽腳後跟各一壯火卽止。一乾霍亂欲吐不吐欲泄不泄者卽以鹽湯探吐之或再以髮稍擦喉中必令其吐方保無虞。一霍亂吐不止危極者以鹽填滿臍心或用艾火於臍上灸之或用燈火搏燒七壯卽愈。又霍亂轉筋用藥以倣和胃飲入五桂二錢研末木瓜四錢方在於第三百三式方中或用理陰煎入五桂木瓜亦宜方在第二百卷三方中查用。

○○第一百九四方○加味保陰煎

治男婦帶濁遺淋色赤帶血脈滑多熱便血不止及血崩血淋或經期杳陰虛內熱

熟地

八錢

生地

五錢

白芍

錢半

生淮藥

參錢

斷續

或錢

王李

壹錢

黃柏

壹錢

生甘草

壹錢

如小便多熱或兼怒火動血者加山梔錢半○如夜熱甚加地骨三錢○如肺熱汗多加麥冬三  
錢炒東皮錢半○如皿虛血滯筋骨腫痛者加當歸或三錢○如氣滯而痛加青皮壹錢陳皮或錢  
去熟地○如血脫血滑及便血久不止者入炒黑地榆或錢烏梅各個或加醋炒文蛤壹錢亦可○  
如肢節肋骨疼痛或腫者加秦艽壹錢酒炒丹皮或錢

○○第二百九五方○局方七氣湯

治七情鬱結臟氣互相刑尅陰陽不和揮霍撩亂吐瀉交作等症

法夏

或錢

厚模

錢半

白芍

錢半

伏苓

壹錢

黨參

或錢

橘紅

壹錢

蘇葉

八分

玉桂

八分

生姜三片紅  
東或熬服

○○第三百九十六方○逐寒湯驚陽

此是陸莊在田福幼之方專治小兒體虛或久病不愈或痘後麻後慢服涼藥泄鳴嘔吐變成慢驚  
清熱散風愈危速卽服此能開寒痰寬胸膈止嘔吐驚驚邪所謂回元氣於無何有之鄉一貳  
劑後嘔吐暫止卽其驗也認明實係虛寒卽宜服之不必疑畏

胡椒

壹錢

炮羌

壹錢

丁香

十粒

玉桂

壹錢

共爲細末以灶心土參兩水澄清煎藥大半茶杯頻頻灌之接服後列之方定有奇效

○第二百九七方○加味理中地黃湯

此方助氣補血却病回春專治小兒精神已虧氣血大壞形狀狼狽瘦弱至極皆能挽回如法濃煎  
頻服不可減分毫此實爲萬應之劑

熟地

七錢

當歸

三錢

棗皮

壹錢

枸杞

三錢

雑丸

壹錢

炮羌

錢半

炙草

壹錢

桑葉

壹錢

棗仁

錢半

固脂

式錢  
炒

炙芪

式錢

玉柱

式錢去皮  
研末另冲

生姜三片紅棗三枚核桃肉式錢仍用灶心土參兩煮水澄清者藥取濃汁一茶杯再用熟附片五分另煎水一酒杯兌入藥內量兒大小數次灌之○如欬嗽不止者加桑壳一錢金匱子一錢○如大熱不堪加酒芍一錢○如泄瘧不止者加丁香六分祇可服一劑卽去附片祇用丁香七粒隔貯三日祇用熟附片三分蓋因附片太熱中病卽止且附片用之太多則小便閉塞不出不用附片則臟腑沉寒固結不開如不用丁香則泄瘧不止若小兒虛寒至極則附片又不妨用至貳三錢所謂神而明之存乎其人若小兒吐泄不至已甚或微晁驚搐胃中尙可受藥喫乳便利者不必服逐寒蕩驚湯祇服此藥一劑風定神清矣如小兒尙未成驚不過昏睡發熱不退或時熱時止或日間安靜夜間發熱以及午後發熱等證總屬陰虛均宜服之若新病壯實之小兒眼紅口渴乃實火者必大便結小便短滯聲洪氣壯喜飲冷茶涼水若吐泄交作則又非實火可知矣○此方均照原法極爲佩服先生深費苦心余不過稍增其分兩以近時之嬰兒先天不足者十眉其九屢試屢應卽如吾兒春齡甫經四歲時癓後發蟄面赤蒸屬假熱陰虛之證余用熟地每劑二兩參劑大效其他凡小兒真陰虛者亦無不用至兩餘亦無不立卽應効所謂達上者不嫌其輕納下者無不嫌其重

且愈重愈不滯愈輕愈能滯庸醫每不察其亥寅也又慢驚一切忌用之藥恐詳於第二百九八方中宜細玩之誠求保赤者萬勿泛視

○○第二百九八方○治慢驚忌用諸藥

信者福厚不信者福薄犯者必死忌者必生千萬勿爲庸俗之所惑也

浪瘻丸 抱龍丸 蘇合丸 內消丸 太平丸

百順丸 牛黃丸 利驚丸 涼驚丸

以及柴胡防風京芥白芷蘇葉薄荷桔梗羌活獨活膽草大黃朴硝石膏麥冬天冬生地木香青皮桔壳桔實厚樸檳榔郎麥芽杏肉神曲腹皮元參苦參黃連黃芩知母車前滑石黃柏木通射干青葙子天麻全蝎僵蠚白附子南星牙皂細辛麻黃枝桂澤瀉扁蓄防己括囊花粉連翹豬苓赤茯之類斷不可用犯之必致危殆不可救藥慎之慎之今時每爲庸俗幼科所誤者甚多卽受病之家余曾有苦心力阻者奈不信何無不後悔余特爲家庭中諄諄告誠萬勿泛視也

○○第二百九九方○秘要神法

治小兒心膽虛睡中驚悸或受大驚大嚇而作者○古方係丸藥不如煎劑應急也

伏神

二錢

棗仁

錢半

法夏

壹錢

生黨參

二錢

白芍

八分  
炒

當歸

八分

橘皮

八分

北五味

七枚

炙草

五分

生薑貳斤金銀全煎頻頻灌服

○○第三百方○伏神湯

生黨

錢半

炙芪

錢半

熟地

五錢

棗仁

八分  
炒

柏子仁

七分  
炒

白芍

八分

伏神

錢半

桂心

七分

柏子仁

七分  
炒

甘草

五分

五味

五分

用金銀全煎分數次灌服

○○○治小兒膽氣虛寒頭痛目眩心神恍惚或是驚癇

○○第三百一方○團參散

治小兒血熱心虛自汗盜汗

五錢酒炒○或用

煎服

或用雄豬心切分三斤煎

黨參 高麗參一錢亦可

當歸

四錢 治小兒變蒸於三月後每三日服一劑可免百病

○○第三百二方○平和湯

湯澄清以此湯煎藥亦可

防寒參

式錢 炒

雪苓

淮藥 炒

炙草 炒

升麻

壹分 不  
可多用

○○第三百三方○調元湯

治小兒變蒸脾弱不乳吐乳多啼

防寒參

錢半 炒

香附

壹錢

焦丸

壹錢

厚樸

八分 炒

陳皮

壹錢

霍香

五分

炙草

五分

差棗煎服

羣炒

黨參 磬

木香

五分

霍香

五分

陳皮

壹錢

香附 八分 酒炒

炙草 壱錢

茯神 壱錢

伏苓 壱錢

生姜貳片紅棗三枚煎服○古方無二藥以茯神補心以苓令補脾故也

○○第三百五方○柴胡清肝湯

治小兒見燈火愈啼不止仰身而啼兩手溫煖口中熱氣此心經有火以及肝膽不火相持發治風溼瘡節或瘡毒結於兩耳兩脇或胸乳小腹股足等處皆三焦之實熱也

沙參

壹錢

柴胡 八分

枝子 八分 炒

川弓 八分

桔梗

壹錢

連翹

壹錢

甘草 七分

黃芩 八分 酒炒

用淘米汁水煎服○若大人卽用加倍分兩服之

○○第三百六方○經驗理中湯

此方加入參節名人參理中湯○入附片名曰附片理中湯○入人參附片名參附理中湯入丁香名丁香理中湯○入胡椒名胡椒理中湯所謂理中者理中宮之脾胃也治脾胃陰寒腹痛白利不

渴大人與小兒食乳不化短氣咳嗽霍亂嘔吐胸膈噫寒及瘧疾日久並癰氣溫疫中氣虛損久不能愈以中氣虛生瘻等症均屬相宜極

### 炙黨

四錢

### 焦丸

參錢

### 乾毛

參錢

### 炙草

三錢

如虛寒腹痛甚者或入房後腹痛手足厥冷者或食寒冷腹痛者均宜入熟附式三錢○或中脘停寒食入卽吐卽噦者入丁香五分甚者可入至壹錢○如肺胃虛寒氣不宣通喘咳逆氣嘔吐痰水者入胡椒研末參錢單撥式錢陳皮錢半甚者入熟附片參四錢○如宿食不化而有酸臭味者入炒麥芽式錢神曲錢半○如冷泄不止以及泄清水者重用熟附片五七錢之外再入炒麥芽三四錢蜜丸錢小兒均減半用

### ○○第三百七方○燈花散

治小兒心燥夜啼

### 燈花

五顆

研細末用燈草五節泡水調塗乳上令兒吮之或塗兒口中以乳汁送下日服三次

### ○○第三百八方○清脾飲

治熱瘍或熱多寒少○此方分兩係兒科用之若大人則加倍用之甚效

青皮

五分

法夏

壹錢

黃芩

八分

甘草

四分

於朮

鑿

雲苓

鑿半

柴胡

八分

陳皮

八分

草菓

五分

厚樸

七分  
炒

薑棗煎服

○○第三百九方○六君子湯

治脾胃虛寒等症小兒減半用。此方去半夏陳皮名四君子湯治脾胃虛弱。不用半夏名五味  
異功散治脾胃虛弱嘔吐泄瀉氣逆。以四君加入附片木香橘紅名參附四君湯治脾胃虛寒吐  
泄。又以本方入炙耆砂仁厚朴肉蔻名加味六君湯治小兒脾虛泄痢。又以本方入砂仁藿香  
名香砂六君湯治過服涼藥以致食少作嘔或中氣虛滯此係脾胃之主方也。

炙防黨

五錢

焦述

四錢

雲苓

叁錢

炙草

二錢

# 法半夏

叁錢

# 陳皮

式錢

# 生薑

叁片

# 紅棗

五枚  
煎服

○○第三百十方○溫胃飲

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臟寒嘔惡胎氣不安等症

# 炙防黨

叁四錢

# 焦遂

貳三錢  
或五錢

# 陳皮

壹錢

# 乾羌

錢炒  
叁卷

# 白扁荳

叁錢  
炒去壳

# 當歸

貳錢泄  
者不用

# 炙草

壹錢

# 食遠服

錢炒

○○第三百壹一方○養中湯

治中氣虛寒爲嘔爲泄者

# 炙防黨

叁錢

# 乾羌

式錢  
炒

# 淮藥

式錢

# 炙草

壹錢

# 白扁荳

炒

# 茯苓

式錢

# 煎服

如胃中空虛覺餒者入熟地七八錢。如噯腐氣滯者入陳皮壹錢或砂仁壹錢。  
○○第三百壹方。參羌湯 治肺脾胃氣虛寒。嘔吐咳嗽氣喘。小兒吐乳等症。

# 防風參

叁五錢或加倍用

# 炙草

五分

# 炮羌

式錢或用煨生羌五片

○○第三百壹三方。東垣清胃飲

煎七分徐徐服之。此方或加陳皮或畢撥或茯苓皆可佐

# 生地

叁錢

# 升麻

五分

# 當歸

式錢

# 丹皮

錢半

治醇酒厚味過多或補胃熱藥太過以致牙痛不可忍。牽引頭腦滿面發熱或齒齦潰爛出膿口臭。喜食冷物惡飲熱湯石脈洪大此陽明胃府之火宜此方主之。

# 川連

壹錢

# 煎服

# 當歸

式錢

# 丹皮

錢半