伊藤篤太郎記

特 7
19
494

三冊

二

ガラス使用

特7-494

本草滙卷三目次

藏府虛實標本用藥式
引經報使藥　諸病忌藥
陰陽表裏虛實忌宜藥
陽虛　陰虛
表虛　裏虛
陽實　陰實
表實　裏實
陽厥　陰厥

ガラス使用

上盛下虛

藏府虛門忌宜藥

心虛八證　肝虛十證
脾虛十二證　肺虛七證
腎虛十七證　命門虛四證
膽虛二證　胃虛七證
膀胱虛三證　三焦虛二證

本草滙卷三

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯
男　樹畦馨阡　參閱
姪　維均梅在
紫藤陳陛坤白筆校訂

臟腑虛實標本用藥式

肝藏血屬木膽火寄于中主血主目主筋主呼主怒

本病諸風眩運僵仆強直驚癇兩脇腫痛胸肋滿痛嘔血小腹疝痛痃（音賢）瘕（音加）女人經病

標病寒熱瘧頭

ガラス使用

癇吐涎目赤面青多怒耳閉頰腫筋攣卵縮丈夫癩

疝女人少腹腫痛陰病

有餘瀉之

瀉子　甘草

行氣　香附　芎藭　瞿麥　牽牛　青皮

行血　紅花　鼈甲　桃仁　莪蒁　三稜　山甲

大黃　水蛭　虻虫　蘇木　丹皮

鎮驚　雄黃　金箔　代赭　真珠　夜明砂　胡粉

石决明　銀箔　鉛丹　龍骨　鐵落

搜風　羌活　荆芥　薄荷　槐子　蔓荆　白花蛇

白附子　烏頭　獨活　防風　皂莢　殭蠶

蟬蛻

不足補之

補母　枸杞　杜仲　熟地　苦參　萆薢　阿膠

狗脊　兎絲子

補血　當歸　牛膝　續斷　白芍　沒藥　川芎

補氣　天麻　白朮　栢仁　菊花　細辛　密蒙花

榖精草　决明　生姜

ガラス使用

本熱寒之

瀉木芍藥　烏梅　澤瀉

瀉火黃連　黃芩　苦茶　膽草　猪膽

攻裏大黃

標熱發之

和解柴胡　半夏

解肌桂枝　麻黃

心藏神爲君火包絡爲相火代君行令主血主言主汗主笑本病諸熱瞀（音茂目不明）瘛（音熾引縱曰瘈同）驚惑譫妄煩亂啼笑罵詈怔忡健忘自汗諸痛痒瘡瘍標病肌熱畏寒戰慄舌不能言面赤目黃手心煩熱胸脇滿痛引腰背肩胛肘臂

火實瀉之

瀉子黃連　大黃

氣甘草　人參　赤苓　木通　黃蘗

血丹參　丹皮　生地　玄參

鎮驚硃砂　牛黃　紫石英

神虛補之

ガラス使用

補母細辛　烏梅　棗仁　生姜　陳皮

氣桂心　澤瀉　茯苓　茯神　遠志　石菖蒲

血當歸　乳香　熟地　没藥

本熱寒之

瀉火黃芩　竹葉　麥冬　芒硝　炒鹽

凉血地黃　梔子　天竺黃

標熱發之

散火甘草　獨活　麻黃　柴胡　龍腦

脾藏智。屬土。爲萬物之母。主榮衛。主味。主肌肉。主四肢。本病。諸濕腫脹。痞滿。噫氣。大小便閉。黃疸。痰飲。吐瀉。霍亂。心腹痛。飲食不化。標病。身體胕腫。重困。嗜臥。四肢不舉。舌本強痛。足大指不用。九竅不通。諸痙項強。

土實瀉之

瀉子訶子　防風　桑皮　葶藶

吐豆豉　蘿蔔子　梔子　常山　瓜蒂　鬱金　韲汁　藜蘆　苦茶　苦參　鹽湯　赤小豆

下大黃　芒硝　大戟　甘遂　芫花　續隨子

ガラス使用

礞石

土虛補之

補母桂心　茯苓

氣人參　黃芪　升麻　葛根　甘草　陳皮　藿香　葳蕤　縮砂　木香　扁豆

血白术　蒼术　白芍　膠飴　大棗　乾姜　木瓜　烏梅　蜂蜜

本濕除之

燥中宮白术　蒼术　橘皮　半夏　南星　吳茱萸　草豆蔻　白芥子

潔淨府木通　赤茯苓　猪苓　藿香

標濕滲之

開鬼門葛根　蒼术　麻黃　獨活

肺藏魄。屬金。總攝一身元氣。主聞。主哭。主皮毛。本病諸氣膹鬱。諸痿喘嘔。氣短。欬嗽上逆。欬唾膿血。不得臥。小便數而欠。遺失不禁。標病洒淅惡寒。熱。傷風自汗。肩背痛冷。臑（音挠）臂前廉痛。

氣實瀉之

瀉子 澤瀉 葶藶 桑皮 地骨皮

除濕 半夏 茯苓 苡仁 木瓜 橘皮 白礬

瀉火 粳米 石膏 知母 訶子 寒水石

通滯 枳殼 薄荷 木香 厚朴 杏仁 皂莢

桔梗 乾生姜 蘇梗

氣虛 補之

補母 甘草 人參 升麻 黃芪 山藥

潤燥 蛤蚧 阿膠 門冬 貝母 百合 一天冬

天花粉

斂肺 烏梅 粟殼 芍藥 五味 五倍

本熱 清之

清金 黃芩 知母 麥冬 梔子 沙參 紫菀 一

天冬

本寒 溫之

溫肺 丁香 藿香 款冬 檀香 益智 一白蔻

縮砂 糯米 百部

標寒 散之

解表 麻黃 葱白 一紫蘇

ガラス使用

〔腎〕藏志屬水。爲天一之源。主聽。主骨。主二陰。〔本病〕諸寒厥逆。骨痿。腰痛。腰冷如冰。足胻（音杭）腫寒。少腹滿急疝瘕（音加）大便閉泄。吐利。腥穢。水液澄徹清冷不禁。消渴引飲。〔標病〕發熱不惡熱。頭眩。頭痛。咽痛。舌燥。脊股後廉痛。

〔水強瀉之〕

〔瀉子〕大戟　牽牛

〔瀉腑〕澤瀉　猪苓　車前　防己　茯苓

〔水弱補之〕

〔補母〕人參　山藥

〔氣〕知母　玄參　砂仁　苦參　補骨脂

〔血〕黃柏　枸杞　熟地　鎖陽　蓯蓉　五味子

山萸　阿膠

〔本熱攻之〕

〔下〕傷寒少陰證。口燥咽乾。大承氣湯

〔本寒溫之〕

〔溫裏〕附子　乾姜　官桂　蜀椒　白朮

〔標寒解之〕

ガラス使用

解表 麻黄 細辛 獨活 桂枝

標熱 凉之

清熱 玄參 連翹 甘草 豬膚

命門爲相火之原。天地之始。藏精生血。降則爲漏。升則爲鉛。主三焦元氣。本病 前後癃閉。氣逆裏急。疝痛奔豚。消渴。膏淋。精漏精寒。赤白濁。溺血。崩中。帶漏。

火强 瀉之

瀉相火 黄柏 知母 丹皮 生地 茯苓 玄參 地骨皮

火弱 補之

益陽 附子 肉桂 益智 沉香 烏藥 硫黄 胡桃 破故紙 巴戟 當歸 蛤蚧 覆盆 茴香 川烏 天雄 陽起石 丹砂

精脫 固之

澀滑 牡蠣 芡實 五味 遠志 山茰 蛤粉 金櫻子

三焦 爲相火之用。分布命門元氣。主升降出入。游行天地之間。總領五臟六腑營衛經絡。內外。上下。左右。

ガラス使用

之氣號中清之府上主納主化下主出（本病）諸熱瞀瘛暴病暴死暴瘖躁擾狂越譫妄驚駭諸血溢血泄諸氣逆衝上諸瘡瘍痘疹瘤核上熱則喘滿諸嘔吐酸胸痞脇痛食飲不消頭上出汗中熱則善饑而瘦解㑊（痠病尺脈緩濇）中滿諸脹腹大諸病有聲鼓之如鼓上下關格不通霍亂吐利下熱則暴注下迫水液渾濁下部腫滿小便淋瀝或不通大便閉結下痢上寒則吐飲食痰水胸痺前後引痛食已還出中寒則飲食不化寒脹反胃吐水濕瀉不渴下寒則二便不禁臍腹冷疝痛（標病）惡寒戰慄如喪神守耳鳴耳聾嗌腫喉痺諸病胕腫疼酸驚駭手小指次指不用

（實火瀉之）

（汗）麻黃　柴胡　葛根　荊芥　升麻　薄荷　羌活　石膏

（吐）瓜蒂　滄鹽　虀汁

（下）大黃　芒硝

（虛火補之）

（上）人參　天雄　桂心

ガラス使用

中人參　黃芪　丁香　木香　草果
下附子　桂心　硫黃　人參　烏藥　破故紙
沉香

本熱寒之

上黃芩　連翹　梔子　知母　玄參　生地　石膏
中黃連　連翹　生地　石膏
下黃蘗　知母　生地　石膏　丹皮　地骨皮

標熱散之

解表柴胡　細辛　荊芥　羌活　葛根　石膏

膽屬木。爲少陽相火。發生萬物。爲決斷之官。十一臟之主。（主同肝）本病口苦。嘔苦汁。善太息。澹澹如人將捕狀。目昏不眠。標病寒熱往來。痁瘧。胸脇痛。頭額痛。耳痛鳴。瘰癧結核。馬刀。足小指次指不用

實火瀉之

瀉膽龍膽　牛膝　猪膽　生棗仁　生蕤仁　黄連　苦茶

虛火補之

溫膽　人參　細辛　半夏　炒[illegible]仁　炒棗仁　當
歸　地黃
本熱平之
降火　黃芩　黃連　芍藥　連翹　甘草
鎮驚　黑鉛　水銀
標熱和之
和解　柴胡　芍藥　黃芩　半夏　甘草
胃屬土主容受爲水穀之海（主同脾）本病噎膈反胃中
滿腫脹嘔吐瀉利霍亂腹痛消中善飢不消食傷飲
食胃管當心痛支兩脇標病發熱蒸蒸身前熱身前
寒發狂譫語咽痺上齒痛口眼喎斜鼻痛鼽衄赤瘡
胃實瀉之
濕熱　大黃　芒硝
飲食　巴豆　神麯　山查　阿魏　三稜　硇砂
鬱金　輕
胃虛補
濕熱　蒼朮　白朮　半夏　茯苓　橘皮　生姜
寒濕　乾姜　附子　官桂　丁香　肉蔻　草菓

人參　黃芪

本熱寒之

降火　石膏　地黃　犀角　黃連

標熱解之

解肌　升麻　葛根　豆豉

大腸爲金主變化爲傳送之官　本病　大便閉結　泄痢

下血　裏急　後重　疽痔　脫肛　腸鳴而痛　標病　齒痛　喉痺

頸腫　口乾　咽中如核　鼽衄　目黃　手大指次指痛　宿食

發熱寒慄

腸實瀉之

熱　大黃　芒硝　桃花　牽牛　巴豆　郁李仁

石膏

氣　枳殼　木香　橘皮　檳榔

腸虛補之

氣　皂莢

燥　桃仁　麻仁　杏仁　地黃　松子　當歸　蓯

蓉

濕　白朮　蒼朮　半夏　硫黃

陷升麻　葛根

脫龍骨　甘草　訶子　粟殼　烏梅　白礬　赤石脂　石榴皮　禹餘糧

本熱寒之

清熱秦艽　槐角　地黃　黃芩

本寒溫之

溫裏乾姜　附子　肉豆蔲

標熱散之

解肌石膏　白芷　升麻　葛根

小腸主分泌水穀爲受盛之官〔本病〕大便水穀利小便短小便閉小便血小便自利大便後血小腸氣痛宿食夜熱旦止〔標病〕身熱惡寒嗌痛頷（音含）腫口糜耳聾

實熱瀉之

氣木通　猪苓　滑石　瞿麥　澤瀉　燈草

血地黃　蒲黃　赤苓　丹皮　梔子

虛寒補之

氣白术　楝實　茴香　砂仁　神曲　扁豆

国立国会図書館　　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494　　ガラス使用

〔血〕桂心　玄胡索

〔本熱寒之〕

〔降火〕黃柏　黃芩　黃連　連翹　梔子

〔標熱散之〕

〔解肌〕藁本　羌活　防風　蔓荆

〔膀胱〕主津液、爲胞之腑、氣化乃能出、號州都之官、諸病皆干之、〔本病〕小便淋瀝、或短數、或黃赤、或遺失、或氣痛、〔標病〕發熱惡寒、頭痛腰脊強鼻窒、足小指不用、

〔實熱瀉之〕

〔泄火〕滑石　猪苓　澤瀉　茯苓

〔下虛補之〕

〔熱〕黃蘗　知母

〔寒〕桔梗　升麻　益智　烏藥　山茱萸

〔本熱利之〕

〔降火〕地黃　梔子　茵陳　黃柏　牡丹皮　地骨皮

〔標寒、發之〕

〔發表〕麻黃　桂枝　羌活　蒼术　防巳　黃芪

参

木賊

引經報使

手少陰心 黃連 細辛
手太陽小腸 藁本 黃蘗
足少陰腎 獨活 桂 知母 細辛
足太陽膀胱 羌活 黃蘗（下）
手太陰肺 桔梗 升麻 葱白 白芷
手陽明大腸 白芷 升麻 石膏
足太陰脾 升麻 蒼术 葛根 白芍
足陽明胃 白芷 升麻 葛根 石膏（下）
手厥陰心主 柴胡 丹皮
足少陽膽 柴胡 青皮
足厥陰肝 青皮 川芎 柴胡 吳茱萸
手少陽三焦 連翹 柴胡 上地骨 中青皮 下附子（已上俱綱目）

〇諸病忌宜藥。每條備列。不勝其繁。今將應忌者。各分門類。總列于前。凡遇證所忌。一查瞭然。宜者。則不厭詳載云。

ガラス使用

補氣人參　黃耆　白术　人胞　紅鉛
溫補人胞　紅鉛　狗陰莖　鹿茸　兔絲子　蛇
牀子　巴戟天　人參　黃耆　白术　淫羊藿
肉蓯蓉　補骨脂　當歸
大熱附子　肉桂　仙茅　陽起石　烏頭　海狗
腎　羊肉　雀肉　天雄　葫蘆芭　硫黃
破氣青皮　枳實　枳殼　檳榔　厚朴　牽牛
閉氣銀杏　白术　黃耆　米麵食　豬脂油
降氣降眞香　蘇子　鬱金　枇杷葉　橘紅　沉
香　烏藥
破血桃仁　紅花　蘇木　延胡索　乾漆　五靈
脂　花蕊石　乳香　沒藥　薑黃　三稜　蓬茂
肉桂　桃梟　䗪虫　穿山甲　麒麟竭
升提發散升麻　柴胡　川芎　紫蘇　麻黃　乾
葛　羌活　獨活　防風　白芷　生姜　細辛
荆芥　前胡　藁本　葱白　薄荷
辛溫辛熱發散吳茱萸　乾姜　桂枝　麻黃　細
辛　羌活　獨活　防風　藁本　葱白　川芎

ガラス使用

白芷
吐瓜蔕　梔子　豉　皂莢　藜蘆　常山　蝦汁
人參蘆　鹽湯
下大黃　芒硝　巴豆　牽牛　玄明粉　厚朴
枳實
降泄山梔　知母　天門冬　玄參
利水猪苓　澤瀉　木通　瞿麥　車前子　烏桕
根皮　海金沙　商陸　茯苓　琥珀　芫花　甘
遂　大戟　續隨子　漢防己　郁李仁　葶藶

滑石
損精液郁李仁　白礬　半夏
歛攝白芍　五味　醋　烏梅　白梅　棗仁
固澁龍骨　牡蠣　粟殼　訶黎勒　益智子　山
茱萸　桑螵蛸　蛇牀子　肉果　蓮鬚　金櫻子
原蠶蛾
消導山查　麥芽　草果　檳榔　三稜　蓬茂
神曲　枳殼　枳實　綠礬　萊菔子　紅曲　橘
紅　砂仁

ガラス使用

（開竅）龍腦香 麝香 蘇合香 檀 安息香

（辛燥）火酒 蒜 半夏 南星 二朮

（香燥）沉香 麝香 龍腦 縮砂蔤 豆蔻 藿香
香附 丁香 烏藥 木香

（辛熱）乾姜 吳茱萸 胡椒 蒜 茴香 生姜
巴豆 龍腦

（濕潤）地黃 當歸 肉蓯蓉 天門冬 知母 猪
脂油 麻仁 栝樓仁

（滯膩）猪羊犬肉 鵞 地黃 南麪 油膩 炙煿

（滑利）冬葵子 榆皮 牛乳 椿根白皮 柿 瓜
李 桃 梨 蜜 青菜 蓴菜 酥 茄子

（發濕）鰻魚 南麪

（苦寒傷胃）山梔 黃栢 黃芩 黃連 大黃 苦
參 玄參 知母 蘆薈

（補命門相火）鹿茸 巴戟天 附子 人胞 肉桂
仙茅 陽起石 膃肭臍 淫羊藿 補骨脂
狗陰莖 兔絲子 晚蠶蛾

（補腎水苦寒）黃栢 天門冬 玄參 知母

酸寒　白芍　牛膝　烏梅

鹹寒　童便　芒硝　玄參　秋石

生冷　菱　梨　菜　李

甘　甘草　飴糖　大棗　蜜

鹹　食鹽　商陸　城水　鹿茸　蛤蜊　蠣黄　蟶

陰陽表裏虛實

陽虛　即眞氣虛。其證惡寒。或發熱自汗。汗多亡陽。陽虛不發熱。單惡寒者。居多。忌破氣降泄。利水苦寒。及辛熱發散之藥。宜補甘溫熱。人參　黄耆　二朮　炙草　當歸　淫羊藿　人胞　補骨脂、巴戟天　桂　附子　仙茅　鹿茸　大蘹香　羊肉　雀肉　陽起石

陰虛　即精血虛。其證爲欬嗽多痰。吐血。咯血。嗽血。鼻衂。齒衂。盜汗自汗。發熱。寒熱。潮熱。骨乏無力。不眠。氣急。腰背痛。　忌補氣。復忌破氣。燥熱。辛溫。及大寒。大苦。傷胃。并升提發散。利水之藥。一宜生精補血。兼清虛熱。斂攝。酸寒。甘寒。甘平。鹹寒。畧兼苦寒。　地黄　栢子仁、人乳　沙苑蒺藜　枸杞　牛膝　麋膠

ガラス使用

阿膠　沙參　棗仁　芍藥　五味　山萸　石斛　麥冬　山藥　丹皮　續斷　地骨皮　車前子　鼈甲　黃柏　知母　青蒿　溺白垽（音佞，滓垢也，）

表虛其證自汗，惡風，洒淅寒熱，或兼溫瘧，脉浮無力，忌破氣，升發，辛熱之藥，（表虛而中寒者，不忌辛熱，）宜補斂，益氣，實表，甘酸，　人參　黃芪　芍藥　甘草　桂枝（有熱者勿用）五味子

裏虛其證洞泄，或完穀不化，心腹痛，按之即止，或腹脹，或傷寒下後痞滿，　忌破氣，下，苦寒之藥，　宜溫補，甘佐以辛熱，　人參　朮　炙草　大棗　一糯米

肉桂　附子（有熱者勿用）　乾姜

陽實即表邪熱盛，其證頭痛，寒熱，遍身骨痛，無汗，一忌補斂，下，大熱之藥，　宜辛寒，發散，天寒略加辛熱辛溫，佐之　石膏　知母　葛根　麥冬　前胡

柴胡　黃芩　紫蘇　薄荷　升麻　防風　葱白

荊芥　羌活　麻黃（冬月可用，春夏忌之，）

陰實即裏實，外感證，屬邪熱內結者，其證胸腹鞕（同硬，）痛，手不可近，大便七八日不行，或挾熱下痢，　忌辛

溫。發散補斂之藥。宜下苦寒鹹寒甘辛。 大黃
厚朴　枳實　滑石　山梔　黃芩　黃連　茵蔯
芒硝　桃仁

陽厥即熱厥。其證四肢厥逆。身熱面赤。唇燥。大渴。口乾舌苦。目閉或不閉。小便赤澀短少。大便燥結。不省人事。忌升發補斂燥熱辛溫之藥。宜下清熱甘寒苦寒鹹寒。 大黃　芒硝　石膏　黃芩　黃連
山梔　知母　童便　如挾虛有痰。宜　麥冬
竹瀝　蘆根汁　梨汁　童便　如婦人熱入血室。

因而厥者。以童便爲君。加　赤芍　生地　牛膝
丹皮　桃仁　甚者大便結燥。加　芒硝　大黃
通即止。勿盡劑。

陰厥即寒厥。其證四肢厥逆。身冷。面青。踡卧。手指爪青黯。腹痛。大便溏。或完穀不化。小便自利。不渴。不省人事。忌下破氣苦寒鹹寒酸寒之藥。宜補氣溫中甘溫辛熱。 人參　乾姜　附子　桂　吳茱萸

上盛下虛屬陽盛陰虛。 忌升散下。助陽補氣。及破氣燥熱辛之藥。宜降益陰。甘寒酸寒。佐以鹹寒苦

ガラス使用

寒、蘇子　枇杷葉　麥冬　枸杞　生地　沙參
白芍　山萸　五味　牛膝　童便　玄參　黄
蘗　天冬

五臟六腑虛實

心虛（八證）忌升發破氣苦寒辛燥大熱之藥、宜補血甘溫酸歛佐以鹹寒鎮墜、生地　龍眼　人參
炙草　石斛　棗仁　五味　栢仁　丹參　茯
神　遠志　鹿茸　炒鹽　丹砂

驚邪屬心氣虛、忌升破氣之藥、宜降清熱豁痰

內經曰驚者平之、犀角　丹砂　琥珀　真珠
龍齒　金箔　牛黄　門冬　代赭石　石斛　桔
梗　膽星　射香　竹瀝　遠志　羚羊角　天竺
黄

癲癇屬心氣虛有熱、忌補歛升之藥、宜降清熱豁痰藥見驚邪條、加犀角　門冬　牛黄　竹瀝
桔梗　貝母　丹參　鬱金　鈎藤鈎

不得眠屬心血虛有熱、忌升辛燥熱之藥、宜歛養陰血、清熱　棗仁　五味　龍眼　丹參　芍藥

人參　石斛　竹葉　生地　茯神　遠志　黄
連　玄參　麥冬　竹茹　木通　生甘草　辰砂
六一散

心煩屬心家有熱　忌升破氣燥熱之藥　宜清熱
生津淡甘寒甘平辛酸叅用不得眼中諸藥　竹葉
麥冬　生甘草　石斛　丹參　龍眼　生地
玄參　沙參　茯神　遠志　知母　貝石

怔忡屬心血不足　忌宜藥俱同心虛

心澹澹動　忌宜藥俱同心虛

盜汗屬心血虛汗者心之液也　忌破氣辛散燥熱
之藥　宜補斂清虛熱甘酸甘平甘寒苦寒鹹寒
生地　當歸　茯神　龍眼　黄耆　五味　芍藥
棗仁　黄芩　黄蘗　黄連　牡蠣

伏梁屬心經氣血虛以致邪留不去　忌破血汗下
之藥　宜活血凉血散熱通結辛鹹　鬱金　乳香
沒藥　當歸　延胡　赤芍　遠志　菖蒲　五
靈脂　茯神　牡蠣　叅用東垣伏梁丸治之

肝虛　證十

忌收斂破氣升散苦寒下之藥　宜辛散

御

甘緩。當歸　陳皮　生姜　地黃　甘菊　甘草
胡麻　穀精草　決明子　刺蒺藜　兎羊肝
因鬱而虚者加　細辛　木香　縮砂密　沉香
川芎　香附

胸脇痛屬肝血虚。肝氣實因而上逆。　忌斂補氣破
血之藥。宜降氣養血。和肝。辛甘平緩。　蘇子　鬱
金　當歸　生地　陳皮　甘草　白芍　續斷
通草　鹿膠　番降香

轉筋屬血虚。忌下復忌升。燥熱閉氣苦寒破氣之
藥。宜酸辛甘平。　木瓜　牛膝　歸身　白芍
石斛　續斷　陳皮　炙甘草　縮砂密

目光短屬肝血虚及腎水眞陰不足。　忌破氣升燥
熱之藥。　宜補肝兼滋腎甘温益血甘寒除熱。一枸
杞　生地　甘菊　沙苑蒺藜　五味　決明　天
冬　穀精草　麥冬

目昏屬肝血虚有熱兼腎水眞陰不足。　忌藥同目
光短。　宜藥同目光短加。　黃檗　羚羊角

目翳屬肝熱兼腎水不足。　忌破氣升燥熱苦寒之

御歳

藥、宜補肝血・除熱退翳、 甘菊 生地 石決明 決明子 沙苑蒺藜 女貞 青羊膽 羚羊角 犀角 黃連 木賊 穀精草 蟬蛻 密蒙花 珊瑚 真珠 琥珀

「亡血過多角弓反張」屬肝血有熱、 忌風燥升破氣下之藥、 宜補血・清熱、甘寒甘溫酸寒鹹寒辛潤、 當歸 生地 芍藥 牛膝 麥冬 丹皮 甘菊 童便 炙甘草 有汗加 人參 黃耆 五味 棗仁

「少腹連陰作痛按之則止」屬足厥陰經血虛・ 忌宜藥俱同角弓反張・

「偏頭痛」屬血虛・肝家有熱、不急治、久之必損目・ 忌升燥熱苦寒之藥・ 宜養血・清虛熱、甘寒酸寒・辛寒 生地 天冬 甘菊 芍藥・ 當歸・ 川芎・ 烏梅 炙甘草 土茯苓 金銀藤・ 黑豆・ 有實火者加 黃芩・ 大黃・ 雨前茶 石膏

「目黑瞶眩暈」屬血虛・兼腎水真陰不足・ 忌破氣燥熱辛溫之藥・ 宜養血・補肝清熱、甘寒甘平酸寒苦

寒、生地　枸杞　甘菊　當歸　山藥　五味

蒺藜　甘草　山茱萸　芍藥　天冬　黃蘗

「肥氣」屬氣血兩虛、肝氣不和、逆氣與瘀血相併而成、忌破氣下、苦寒之藥、宜和肝散結氣、兼行氣血凝滯、甘溫、甘平、川芎　當歸　沉香　乾姜　肉桂　橘皮　紅花　欝金　延胡索　香附　山查　赤芍　紅麴　砂仁　參用東垣肥氣丸治之、

「脾虛」（十二證）忌下、降、泄、破氣、苦寒之藥、宜甘溫、佐以辛香酸平、人參　大棗　黃耆　山藥　炙甘草

蓮肉　茯苓　橘紅　白扁豆　縮砂、白豆蔲

藿香　木瓜　白芍　棗仁

「飲食勞倦」傷脾發熱、忌破氣發散、下、苦寒之藥、宜補中、益氣、甘溫、升、酸、人參　黃芪　朮、炙甘草　大棗　柴胡　升麻　石斛　麥冬、橘紅　芍藥　棗仁

「飲食不消化」屬脾氣虛、一忌破氣消導、尅伐、苦寒、復忌燥之藥、宜益真氣、甘溫、甘辛、同脾虛藥、加　穀蘖　肉豆蔻

ガラス使用

傷食必惡食。忌潤濕苦寒之藥。宜健脾消導。甘溫辛香。橘皮　蒼朮　蓮肉　扁豆　白芍　茯苓　草果　山查　麥芽　縮砂　穀蘗　草豆蔻

如腹痛大便不通宜下　枳實　檳榔　厚朴　大黃　虛人加　參　朮　如傷肉食輕者宜　山查　兼　黃連　重者宜　礬　蒜　紅棗肉　丸服二錢不可過傷麵食宜炒用萊菔子

停飲爲恣飲湯水或冷茶冷酒所致。忌下酸斂濕潤滯膩之藥。宜健脾利水淡滲與辛散。人參　白朮　半夏　茯苓　橘皮　澤瀉　豬苓　木通　桑皮　紫蘇　白蔻　旋覆花

水腫屬脾氣虛　忌破氣下泄濕潤鹹苦寒之藥。宜補脾益氣燥濕利水辛香甘溫佐以淡滲。人參　二朮　橘皮　山藥　木瓜　薏苡　桑皮　茯苓　赤小豆　香薷　車前　豬苓　澤瀉　姜皮　通草　縮砂

脾虛中滿屬脾氣虛兼脾陰虛。忌破氣下消導利水甘之藥。晝劇夜靜屬脾氣虛。宜補氣健脾。甘

ガラス使用

溫淡滲佐以辛香 人參 二朮 芍藥 桑皮 茯苓 車前 橘紅 姜皮 藿香 縮砂 無熱證者佐以 桂 夜劇晝靜屬脾陰虛 宜補脾陰兼制肝清熱甘平酸寒淡滲 棗仁 芍藥 石斛 蓮肉 橘皮 山藥 蘇子 五味 白扁豆 木瓜 桑皮 車前 茯苓

噎膈屬氣血兩虛由于血液衰少而非痰氣壅逆所成 忌破氣升復忌下消導燥苦寒辛熱 宜降清熱潤燥甘溫甘平以益血略佐辛香以順氣 蘇子 橘紅 人參 白芍 棗仁 龍眼 人乳 牛乳 枇杷葉 蔗漿 梨汁 韭汁 白蔻 姜汁 蘆根汁

脾泄屬氣虛 忌破氣下消導苦寒之藥 宜溫中補氣升清甘溫甘平佐以辛香 人參 朮 炙甘草 山藥 蓮肉 扁豆 茯苓 車前 芍藥 升麻 柴胡 肉蔻 縮砂 橘皮 木香 丁香 藿香 白萊菔 兼有濕及痰經年不愈糞色白者須服九製松脂

健忘屬氣血兩虛　忌升燥熱苦寒辛散之藥。宜益脾陰兼補氣酸斂甘溫甘寒辛平以通竅。棗仁　芍藥　五味　人參　炙甘草　黃耆　龍眼　麥冬　栢子仁　丹參　茯苓　茯神　遠志　石菖蒲

倦怠嗜臥屬脾氣不足　忌破氣消導苦寒之藥。宜補氣兼健脾甘溫辛香。人參　白朮　黃耆　茯苓　山藥　炙甘草　穀蘗　扁豆　白豆蔻　縮砂　橘皮　藿香

脾虛腹痛按之則止屬血虛。忌破氣破血香燥苦寒之藥。宜益氣補血甘溫酸平。人參　炙甘草　龍眼　大棗　棗仁　石斛　麥冬　芍藥

痞氣屬脾氣虛及氣鬱所致。忌破氣下濕潤苦寒之藥。宜健脾兼散結滯甘溫辛香。人參　白芍　橘紅　縮砂　藿香　吳茱萸　穀蘗　麥蘗　紅麴　香附　木香　叅東垣痞氣丸治之

肺虛（七證）　忌補氣升散辛燥溫熱之藥。宜清熱降氣酸斂潤燥。天冬　麥冬　蘇子　貝母　沙參

ガラス使用

百部　百合　桑皮　枇杷葉　五味　杏仁
五倍子　蜜　梨　柿　無熱加人參

〈齁（吼平聲）喘〉屬肺虛有熱因而痰壅．忌破氣升發散．收澀之藥．宜降氣消痰辛凉．甘寒苦平．　蘇子
貝母　桑皮　竹瀝　天冬　麥冬　百部　百合
枇杷葉　括樓根　馬兜鈴　欵冬花　沙參
前胡　射干

〈欬嗽吐血痰〉屬肺熱甚　忌升．破氣．復忌補氣．破血．辛燥．溫熱．收澀之藥．　宜降氣清熱．潤肺生精液凉血．益血．甘寒．甘平．鹹寒．佐以苦寒．　鬱金　生地
蒲黃　側栢葉　茅根　剪草　白芨　阿膠　童便　知母　餘藥．肺虛條內參用．

〈聲瘂〉屬肺熱甚　忌宜藥．俱同咳嗽．

〈咽喉燥痛〉屬水涸火炎．肺熱之極．此證法所難治
忌宜藥．俱同咳嗽．

〈肺痿〉屬肺氣虛有熱　忌宜藥．俱同肺虛

〈龜胸〉屬肺熱有痰　忌宜藥．俱同齁喘欬嗽

〈息賁〉屬肺氣虛痰熱壅結所致．忌破氣辛熱補斂

之藥。宜降氣淸熱開痰佐以散結。橘皮　白蔻　白芥子　射干　桔梗　旋覆花　桑皮　叅用

東垣息賁丸治之

腎虛即腎水眞陰不足（十八證）忌升破氣利水溫熱辛燥補命門相火之藥。宜滋陰潤生精補血除熱甘寒酸寒苦寒鹹寒。生地　枸杞　牛膝　人乳　蓯蓉　栢子仁　胡麻　杜仲　沙苑蒺藜　續斷　天冬　麥冬　五味　山萸　薯蕷　丹皮　車前　兎絲子　知母　黃檗　鼈甲　靑蒿　童便　地骨皮

腎虛腰屬精氣虛。忌破氣燥熱之藥。宜藥同腎虛。

骨乏無力屬陰精不足。腎主骨故也。忌宜藥俱同腎虛。

骨蒸潮熱屬精血虛極。以致陽無所附。火空上炎。忌宜藥。俱同腎虛。

傳尸勞　忌藥同腎虛。宜除熱益陰殺勞蟲。兼淸鎭諸藥　同腎虛。加　鬼臼　乾漆　漆葉　蘆薈

ガラス使用

象膽　獺肝　胡黃連　丹砂　磁石　安息香

五心煩熱屬眞陰不足。忌宜藥俱同腎虛。

夢遺精滑屬腎虛有火。忌藥同腎虛。宜滋陰生精補血除熱酸斂佐以澀精。蓮花蕊　生甘草　石斛　縮砂　龍骨　覆盆子　魚膠　蓮肉　牡蠣　遠志　韭子、桑螵蛸、餘藥同腎虛條。

小便短澀熱赤頻數屬腎虛有火。忌宜藥同腎虛。

溺有餘瀝屬氣虛、忌宜藥同腎虛以五味子黃蘗人參爲君加兔絲子覆盆子爲臣益智爲佐如覺平日肺家有熱或咳嗽有火者忌人參用沙參。

溺血血淋屬腎虛有火熱傷血分。忌宜藥同腎虛。加側栢葉　阿膠　茅根　韭白　地黃　蒲黃　戎鹽。

傷精白濁屬房勞過度以致精傷流出似白濁證。忌利小便燥辛熱之藥。宜藥同腎虛。

五淋屬腎虛兼有濕熱。忌宜藥同腎虛。加淸濕熱　茯苓　黃蘗　車前　石斛　萆薢　薏仁

精塞水竅不通屬房慾不竟或思慾不遂或懼泄忍

精或老人氣不足以遂精出竅。　忌破氣下利小便燥熱之藥。　宜行敗精壯實人宜兼泄火老人宜兼補氣血。外治用吮法　牛膝　生地　當歸　桃仁紅花　車前　鹿角霜

齒浮真牙搖動及下齦軟或齒衄屬腎虛有熱。　忌藥同腎虛。又忌當歸芎藭。　宜益陰凉血固腎諸藥畧同腎虛。應以地黄黄檗五味子爲君桑椹牛膝沙苑蒺藜鹿茸天冬爲臣龍骨牡蠣爲使。

〔下消〕屬腎陰虛火伏下焦。　忌藥同腎虛。　宜清熱及峻補眞氣潤。酸斂。諸藥同腎虛。宜以黄檗五味子生地天麥冬人參爲君石斛牛膝知母人乳童便爲臣地骨皮青蒿側栢葉爲佐。

〔善恐〕屬腎氣虛。腎藏志故也。　忌破氣苦寒之藥。宜補氣強志辛平甘濇。佐以辛香。　人參　遠志茯苓　鹿茸　酸棗仁　栢子仁　石斛　沉香

陰竅漏氣屬腎氣虛不固腎主納氣氣虛則不能納故走泄。　忌破氣降香燥辛熱之藥。　宜補眞氣。酸斂固濇。　人參　五味　山萸　沙苑蒺藜　覆盆

子　枸杞子　益智子　遠志　龍骨　牡蠣　金櫻子　蓮鬚　參用腎虛條內諸藥

疝屬腎虛寒濕邪乘虛客之所致丹溪謂與腎經絕無相干者誤也又有先因濕邪為病後成濕熱者藥宜分寒熱先後二途　忌升破氣苦寒濕潤之藥

宜補氣逼腎氣除濕又有陰虛有熱之人病此兼宜除熱　人參　黃耆　橘核　合歡子　荔枝核　川楝子　牛膝　木瓜　杜仲　萆薢　巴戟天　虛寒而痛加　桂　蘹香　補骨脂　仙茅　虛熱而痛加　黃柏　車前　濕潤者加　朮

奔豚屬腎虛脾家濕邪下傳客腎所致　忌藥同疝兼忌燥　宜補氣健脾辛溫散結　人參　山藥　桂　山萸　牛膝　蘹香　蛇牀子　參用東垣奔豚丸治之

命門虛　乃陽真火不足（四證）　忌下泄破氣發散辛寒苦[illegible]　[illegible]參[illegible]補腎水苦寒等藥　宜益真陽之氣甘溫[illegible]　[illegible]熱酸歛　人參　紅鉛　人胞　鹿茸　白膠　蓯蓉　免絲子　五味子　枸杞子　覆

盆子　巴戟天　山萸　附子　補骨脂　仙茅

陽起石

陰痿屬命門火衰下焦虛寒。忌宜藥同命門虛。加

海狗腎　蛇牀子　原蠶蛾　狗陰莖　雀卵

牛膝　白馬陰莖

精寒、精薄屬命門火衰陽氣不足。忌宜藥俱同陰

痿

腎泄即五更及黎明泄瀉者是也亦名大瘕泄屬命

門眞火不足。忌藥同命門虛。宜益氣甘溫酸斂。

人參　山藥　蓮肉　肉豆蔻　砂仁　補骨脂

木香　吳茱萸　五味子

畏寒、足冷　忌宜藥俱同命門虛。

小腸虛（一證）忌破氣辛散燥熱之藥。宜補氣甘溫、

酸溫、　人參　黃芪　麥冬　五味　山茱萸

遺尿屬小腸氣虛。兼腎氣虛。忌宜藥同小腸虛。兼

固澀　牡蠣　益智　龍骨　金櫻子

膽虛（二證）忌汗下吐。苦寒破氣燥之藥　宜甘溫。甘

平酸斂。佐以微辛。　人參　當歸　穀精草　決明

ガラス使用

子　木賊草　甘草　竹葉　竹茹　白芍藥　酸
棗仁

易驚　屬膽氣虛　忌破氣升發燥熱之藥　宜補膽
氣甘溫辛溫酸平　人參　棗仁　甘草　竹葉
當歸　白芍　竹茹　橘皮

病後不得眠　屬膽虛　忌宜藥俱同膽虛

胃虛（七證）　忌下破氣苦寒燥熱　宜益氣甘平甘淡
酸　人參　白朮　白藊豆　蓮肉　石斛　橘皮
白茯苓　木瓜　白芍藥　兼寒加　生姜　白
豆蔻　縮砂　兼熱加　竹茹　枇杷葉　麥冬
蘆根汁　蔗漿

胃弱不納食及不思飲食　忌宜藥同胃虛仍分寒
熱法

胃虛嘔吐　宜分寒熱　忌宜藥俱同胃虛

霍亂轉筋（八）　屬胃虛猝中邪惡氣及毒氣兼有停滯所
致（轉筋與肝經血虛不同）　忌閉氣滯膩收歛溫補大熱之藥
宜調氣和中辛散消導　由于暑必口渴或口乾
齒燥口苦小水短赤　白梅　扁豆併葉　絲瓜葉

滑石　石膏　甘草　橘皮　香薷　木瓜　石斛　童溺　食鹽　泥漿　縮砂　厚朴　由于寒。則小水清白。小渴不熱。　縮砂蜜　丁香　橘皮　藿香　甚者。加　吳茱萸　肉桂　外治。用　杉木楠材　煎湯浸洗

絞腸痧屬胃氣虛。猝中天地邪惡穢污之氣。鬱于胸腹間。上不得吐。下不得瀉。以致腸胃絞痛。胸腹驟脹遍體紫黑。頭頂心必有紅髮。急尋拔之。急以三稜鍼（音覓）針刺委中。擠出熱血。可立蘇。次用新汲涼水。投入鹽兩許。恣飲。得吐瀉即止。（委中穴。在兩膝下灣橫紋中間。兩筋之中。刺入一分。）忌溫補歛。切忌　火酒　生薑　蒜　及穀氣米飲　熱湯入口即死。　宜通竅。辟惡辛散。鹹寒。龍腦香　蘇合香　藿香　檀香　乳香　芒硝童便　煎藥冷服。

中惡腹中㽲（音校）痛。屬胃氣虛。惡氣客之所致　忌補酸歛之藥。　宜辟惡氣。通腸胃氣。辛散。　龍腦香檀香　麝香（孕婦忌用）　牛黃　乳香　蘇合香　丹砂雄黃　藿香　橘皮　木香　沉香　白豆蔻

ガラス使用

遠志　石菖蒲　乾姜　桂

反胃屬胃氣虛　忌破氣升苦寒香燥熱之藥　宜補氣降氣和胃清熱酸斂以制肝　人參　蘇子　橘皮　枇杷葉　木瓜　竹茹　麥冬　蘆根汁　石斛　白茯苓　白芍藥　梅醬　蔗漿　若因虛寒而得者加　生姜　朮　白豆蔻

中酒屬胃弱　忌閉氣升甘溫燥熱收澀之藥　宜養胃酸辛散淡滲　人參　麥冬　扁豆　葛花　五味　梅醬　橘皮　黃連　白豆蔻　白茯苓

縮砂　澤瀉

大腸虛四證　忌破氣下燥熱之藥　宜補氣潤燥升溫　人參　黃芪　麥冬　五味　白芍藥　炙甘草

虛熱便閉不通屬血虛津液不足　忌破氣下燥熱苦溫損津液之藥　宜生津液潤燥涼血益血　五味子　麥冬　芝蔴　麻仁　生蜜　天冬　肉蓯蓉　生地　當歸　蘆薈　炙甘草

虛寒滑泄不禁屬氣虛　忌破氣下濕潤苦寒之藥

ガラス使用

宜補氣、升、甘溫、酸斂　人參　黃芪　白朮　蓮肉　升麻　炙甘草　吳茱萸　肉豆蔻　補骨脂　五味子　木瓜　赤石脂

腸鳴屬氣虛　忌破氣、下、苦寒之藥　宜同大腸虛加　升麻　柴胡以佐之

脫肛屬氣虛、兼有濕熱　忌藥同大腸虛　宜補氣升提、除濕熱　人參　黃芪　炙甘草　白朮　蓮肉　扁豆　升麻　乾葛　柴胡　黃栢　防風　黃連　黃芩　白芍　樗根白皮　外用五倍子傅之

膀胱虛（三證）　忌破氣、燥利小便之藥　宜補氣、酸斂　人參　五味子　山茱萸　益智子　金櫻子

小便不禁屬氣血虛　忌降下、滲潤、燥熱之藥　宜同膀胱虛、加　牡蠣　龍骨　鹿茸　桑螵蛸　雞胜（皮上聲）胵（音鴟、雞內金也）　頻數不能少忍、加　麥冬　五味子　黃栢　山茱萸　天冬　龞甲　牛膝　栢子仁　枸杞

遺尿屬本經氣虛、見小腸條內、因膀胱虛亦能致遺

尿故復列此　忌宜藥俱見小腸虛

膀胱氣　忌宜藥俱同疝

三焦虛證二　忌破氣降升發苦寒之藥　宜補中益氣佐以辛溫　人參　黃芪　白术　益智　沉香　五味子

腹寒屬中氣虛　忌宜藥俱同三焦虛

短氣少氣屬氣虛　忌藥同三焦虛　宜補氣益精甘溫甘寒酸溫　人參　黃芪　麥冬　五味子

本草滙卷三終

急必

本草滙卷四目次

藏府實門忌宜藥

心實五證　肝實五證
脾實六證　腎實八證
命門實二證　小腸實一證
膽實二證　胃實六證
大腸實六證　膀胱實一證
三焦實三證

六淫門忌宜藥

風五條
寒六條
暑五條
濕二條
燥一條
火十四條
雜症門忌宜藥
瘧
雜論
滯下
五疸
痰
飲
諸氣
鬱
關格
噦

吐咯鼻齒耳舌等血
蓄血
頭痛
齒痛
胃脘痛
腹痛
痺
痿
交腸
鬼疰尸疰飛尸
客忤
婦人門忌宜藥
赤白帶淋
血枯
經先期後期
月事過多

ガラス使用

崩中　熱入血室
種子　妊娠惡阻
安胎　胎漏
難産　産後
下乳汁
小兒門忌宜藥
痘瘡　痧瘮
嘔吐　泄瀉
急驚　慢驚

疳積　諸蟲
胎毒
外科門忌宜藥
癘風　癰疽
外傅諸瘡藥　疔
瘰癧馬刀　瘿瘤
痔　通腸漏
乳巖　乳癰
内外吹　陰蝕

金瘡　破傷風

跌撲　折挫

火灼　漆瘡

本草滙卷四

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯

男　樹畮芬墀

姪　維均梅在　叅閱

紫藤陳陛坤白筆校訂

五臟六腑虛實

心實即實火實熱（[illegible]五）　忌補歛升熱澁燥之藥　宜降火清熱若寒以折之辛寒以散之甘寒以緩之鹹寒以潤之　黃連　犀角　石膏　丹砂　丹皮

里一郎

滑石　生甘草　麥冬　竹葉　童便　便結燥。加
芒硝　大黃　發狂。亦如之。

譫語屬心家邪熱　忌宜藥。俱同心實

舌破屬心火　忌宜藥。俱同心實

煩燥屬心家邪熱。及心火內炎（煩屬心燥屬腎）　忌宜藥俱
同心實

自笑屬心家有熱邪　忌宜藥。俱同心實

發狂屬心家有邪熱甚　忌宜藥。俱同心實

肝實（發力）　忌補氣。升。酸斂。辛熱。辛溫。燥之藥。　宜清
熱降氣。苦寒。辛寒。甘寒。酸寒。　橘皮　青皮　蘇子
黃連　黃芩　龍膽草　柴胡　生甘草　赤芍
藥　竹葉　青黛

善怒　怒則氣上逆。甚則嘔血。及飧泄。　忌補。升。熱燥
閉氣之藥。　宜降氣。清熱。甘寒。酸寒。鹹寒。佐以辛散。
蘇子　鬱金　番降香　生甘草　青黛、麥冬
生地　赤芍　橘皮、蒲黃、當歸　延胡索
砂仁　香附　童便

善太息　忽忽不樂　忌宜藥。俱同善怒

砂仁

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494　ガラス使用

脇痛嘔血　屬肝氣逆．肝火盛．肝血虛．忌宜藥俱同善怒

發搐　屬肝家邪熱．熱則生風．風主掉眩故也．忌藥同善怒　宜清熱降氣．利小便緩中．生地　白芍　黃連　丹砂　羚羊角　童便　蘇子　麥冬　生甘草　竹葉　甘菊　茯苓　木通

目赤腫痛　屬血熱　忌藥同肝實善怒　宜凉血清熱．甘寒苦寒酸寒．生地　赤芍　甘草　甘菊　穀精草　密蒙花　荊芥　黃檗　大黃　黃連　玄參　山梔　竹葉　龍膽草　木通　章

銅青　芒硝　石膽　雞核　急者宜以三刺破眼眶眶處．將出熱血．立解．遲則血貫瞳人．矣

脾實　屬濕熱蠱脹六證　忌濕潤收澀滯膩熱鹹甘之藥　宜除濕清熱．利小便．辛散．風燥．苦寒．木　山梔　猪苓　澤瀉　滑石　車前　茯苓　白蔻　防風　乾葛　黃連　枳實

ガラス使用

蠱脹 由于脾家濕熱積滯或內傷瘀血停積而成。忌補參耆溫燥熱之藥。宜除濕清熱利小便消積 木通 防已 車前 豬苓 澤瀉 茯苓 葶藶 桑皮 山查 紅麯 三稜 蓬朮

易饑 屬脾家邪火 忌升辛溫大熱香燥之藥 宜清火除熱生津液益脾陰甘寒苦寒酸寒。黃連 青黛 連翹 山梔 石膏 竹葉 麥冬 石斛 白芍 棗仁

口唇生瘡 忌溫燥熱之藥。宜甘寒酸寒苦寒辛寒 麥冬 生地 甘草 白芍 烏梅 黃連 黃蘗 玄參 連翹 括樓根 乾葛 石膏 龍膽 竹葉

口糜 忌甘藥。俱同口唇生瘡。

中焦屬脾家實火 忌破氣下濕燥熱之藥 宜藥。同口唇生瘡加人參

濕熱 腹痛按之愈甚 忌閉氣酸斂溫熱燥之藥 宜利小便兼升提苦寒 滑石 車前 木通 黃連 黃芩 升麻 柴胡 葛根 防風 不愈加

天子

ガラス使用

黄　即土鬱則奪之義也

入證　忌斂澀補氣、升燥熱酸鹹之藥　宜降氣

寒苦寒佐以辛散　蘇子　枇杷葉　桑皮

貝母　栝樓根　杏仁　白前　前胡　石

知母　車前　黄芩

屬肺有實熱及肺氣上逆　忌宜藥同肺實加

梗　甘草　栝樓仁　玄參　青黛

屬肺熱氣逆　忌宜藥俱同肺實

痰稠屬肺熱　忌宜藥同肺實加　薄荷　竹

瀝

肺癰屬肺極熱　忌藥同肺實　宜清熱消痰降火

解毒散結甘寒苦寒辛寒　桑皮　黄芩　貝母

栝樓根　薏仁　虎耳草　鼠粘子　連翹　甘草

敗醬草　百年醃芥菜汁

肺脹悶屬肺熱　忌宜藥同肺實并參用肺癰諸藥

吐膿血血痰欬嗽血屬肺家火實熱甚此正邪氣勝

則實之謂　忌藥同肺實　宜清熱降氣凉血豁痰

童便　蘇子　枇杷葉　桑白皮　麥冬　蒲黄

吐膿

ガラス使用

生地　天冬　百部　百合　薏仁　甘草　貝母　白芍　白芨　桔梗　款冬　紫菀

喉癬屬肺熱　忌宜藥同肺實加　鼠粘子　玄參　射干

上消屬肺家實火及上焦熱　忌藥同肺實　宜降氣清熱補肺生津甘寒苦寒酸寒辛寒　蘇子　麥冬　枇杷葉　桑皮　桔梗　百部　百合　黄芩　天冬　沙參　黄連　栝樓根　葛根　知母　玄參　石膏　甘草　五味　白芍　篁竹葉　蘆根　冬瓜　人乳

腎無實故無瀉法

命門實（二證）　忌補氣溫熱之藥　宜苦寒甘寒鹹寒　黄蘗　知母　玄參　天冬　麥冬　牡丹皮　車前　木通　澤瀉

強陽不倒屬命門火實孤陽無陰所致此證多不治　忌宜藥同命門實加　五味子　童便　生地

水竅澀痛屬命門實火　忌藥同命門實　宜清熱利竅甘寒苦寒鹹寒佐以淡滲　黄蘗　知母　車

ガラス使用

前 生地 天冬 生甘草 黄芩 牛膝 麥冬
童便 茯苓 木通

小腸實（證一） 忌斂澀補氣之藥 宜通利淡滲苦寒
甘寒鹹寒 車前 茯苓 木通 甘草 黄栢
知母 黄芩 黄連 牛膝 麥冬 生地 童便

小水不利及赤或澀痛尿血 忌宜藥俱同小腸實

膽實（證二） 忌汗吐下 宜和解辛寒甘寒苦寒辛溫
柴胡 黄芩 半夏 生姜 甘草 橘皮 龍
膽草

口苦耳聾脇痛往來寒熱 忌藥同膽實 宜用仲
景小柴胡湯隨所見兼證加減

鼻淵屬膽移熱于腦 忌辛溫燥熱之藥 宜清熱
補腦甘寒甘平佐以辛寒 天冬 甘菊 生地
沙苑蒺藜 山萸 沙參 薄荷 柴胡 辛夷 一
黄芩 玄參 知母

胃實（證六） 忌升補斂辛溫燥熱濕潤之藥 宜下 一
如邪未結宜清熱發散苦寒辛寒甘寒 大黄 枳
實 知母 石膏 葛根 竹葉 青黛 門冬

ガラス使用

甘草

譫語發狂發斑棄衣而走登高而歌屬胃家邪熱實

忌宜藥同胃實　如大便結者加芒硝亟下之發斑者鼠黏子玄參栝樓根多用石膏爲君便結亦加大黃下之

口臭數欲飲食屬胃火　忌藥同胃實　宜清熱降火苦寒甘寒辛寒　黃連　青黛　連翹　麥冬

石斛　竹葉　石膏　蘆根汁

嘈雜屬胃火　忌宜藥同口臭畧兼消導　山查

麥芽　橘紅　神曲

口淡屬胃熱　忌宜藥俱同口臭

嘔吐屬胃火者必面赤小便短赤或澀大便多燥口苦或乾渴　忌宜藥同胃實加　枇杷葉　竹茹

木瓜　蘆根　橘皮　通草　白茯苓

吞酸屬胃火　忌藥同胃實　宜藥同嘈雜

大腸實（四證）　忌補斂燥熱之藥　宜潤下苦寒辛寒

生地　麻仁　桃仁　黃連　黃芩　槐花　大黃　石膏　知母　枳殼

天子

ガラス使用

便鞕閉、忌宜藥同大腸實加　芒硝　豬膽　檳榔　郁李仁　石蜜

腸風下血、屬大腸濕熱。忌下燥熱之藥。宜清熱凉血、兼升甘寒苦寒。生地　槐花　地榆　黃連　黃芩　荊芥　防風　甘草　紅麴　白芍　側栢　蒲黃　雞子

臟毒、屬血熱。忌宜藥同腸風下血加　忍冬　倍加　地榆　蒲黃

腸癰、屬大腸實火。忌藥同腸風下血。宜下苦寒解毒。大黃　白芷　白芨　白歛　連翹　忍冬藤　天明精　甘草　黃芪　生地　明礬　黃蠟　生蜜（巳上三味作丸）

膀胱實（一證）忌燥熱收濇之藥。宜潤淡滲。知母　黃蘗　車前　木通　瞿麥　滑石　茯苓　豬苓　澤瀉

癃閉、屬膀胱實熱。忌破氣發散燥熱之藥。如屬水液不足、兼忌利小便。宜同膀胱實佐以升提。升麻　柴胡

三焦實（三證）　忌補斂升燥熱之藥。　宜降清熱調氣甘寒苦寒鹹寒。　蘇子　門冬　知母　黃蘗　玄參　山梔　黃芩　黃連　童便

喉痺　即纏喉風。屬少陽相火少陰君火並熾。經曰。一陰一陽結爲喉痺。一陰者。少陰君火也。一陽者。少陽相火也。　忌藥同三焦實。　宜辛散。佐以苦寒鹹寒。急則有鍼法。吹法。吐法。　鼠黏子　山豆根　黃連　黃蘗　知母　玄參　童便　麥門冬　射干　蘇子　貝母　甘草　犀角　山慈姑　苦桔梗

續隨子　急治。用　膽礬　朴硝　牛黃　爲末。和勻。吹入喉中。又法。用　明礬（三錢）　巴豆（七粒）　去殼。同礬煅。礬枯。去巴豆。即取礬爲細末。吹入喉中。流出熱痰即寛。

頭面赤熱　屬上焦火升。　忌藥同三焦實。　宜降清熱。甘緩。佐以酸斂。　蘇子　枇杷葉　天冬　麥冬　玄參　薄荷　栝樓根　梨　柿一蕨　童便　白芍　五味

赤白遊風　屬血熱。熱則生風。故善遊走。俗名火丹。小

兒多患此。大人亦時有之。忌藥同三焦實。宜清熱凉血。兼行血。辛寒。甘寒。苦寒。鹹寒。　生地　黃連　黃蘗　甘草　丹皮　蒲黃　紅藍花　連翹　玄參　鼠黏　牛膝　藍汁　苧根　童便　赤芍

宜兼外治。從出熱血。及用　漆姑草　愼火草　搗爛敷之。即易愈。

六淫門

風、諸暴强直。支痛。緛（音軟縮也）戾。裏急。筋縮。皆屬于風。

眞中風、倅僵仆。口噤不言。不省人事。如遺屎。直視。口開手撒汗出如珠。屬不治證。西北高寒之地有此。東南無之。　忌破氣。下。吐。苦寒。酸斂之藥。宜辛甘發散。峻補眞氣。　桂枝　附子　甘草　獨活　羌活　天麻　麻黃　防風　芎藭　細辛　藁本　蔓荊實　牛黃　辛夷　牡荊實　白芷　人參　黃耆　有痰加　竹瀝　南星　半夏　薑汁

類中風、口眼歪斜。語言蹇澀。半身不遂。口噤不言。四肢不舉。痰涎壅盛。昏昧不省人事。　忌汗。吐。下。大忌破氣。温熱。苦寒。及一切治風濕。辛燥發散。并開竅走

ガラス使用

眞氣。行血。諸藥。犯之必重必效。如麝。蘇合。檀。龍腦。安息等香之類。宜滋補。陽虛者補氣。陰虛者補血。陰陽兩虛則氣血雙補。兼宜清熱降氣。豁痰及保脾胃

天冬（脾胃薄弱者勿多用） 麥冬 荆瀝 蘇子 栝樓根 貝母 橘紅 枇杷葉 甘草 竹瀝 童便 霞天膏 梨汁 黃蘗 次益血。于前藥中加 胡麻仁 石斛 牛膝 生地 五味 甘菊 枸杞子 何首烏 薯蕷 兔絲子 白芍藥 丹參 山茱萸 白蒺藜 酸棗仁 栢子仁 車前子

竹葉 羚羊角 鼈甲 木瓜 青蒿 遠志 栝樓仁 沙參 巴戟天 茯苓 茯神 如便閉加 肉蓯蓉 當歸 倍麻仁 如兼氣虛加 人參 黃芪 有肺熱者勿入 人參

感冒風寒俗名傷風。其證或頭疼身熱。輕則否。鼻必塞。兼流清涕。必惡風寒。或聲重。或聲啞。甚者痰壅氣喘咳嗽。忌補氣酸斂閉氣之藥。宜發散辛甘溫。

川芎 細辛 藁本 防風 甘草 荆芥 白芷 前胡 桑白皮 桔梗 紫蘇 薄荷 杏仁

石膏

傷風熱、忌藥同感冒。宜辛散甘寒發散、石膏　知母　甘草　竹葉　麥冬　前胡　桔梗　薄荷　葛根　桑白皮　久而不愈者爲虛陽虛。加　人參　黃芪、陰虛。加　五味　地黃　倍麥冬　白芍

寒諸病上下所出水液澄澈清冷。癥瘕㿗疝。堅痞腹滿急痛。下利清白。食巳不飢。吐利腥穢。屈伸不便。厥逆禁固。皆屬于寒。凡中寒。必本于陽虛。　忌破氣苦寒下。甘寒辛寒之藥。　宜補氣散寒辛甘溫熱。輕者解表。重者溫補。　桂枝　乾姜　麻黃　人參　附子　黃芪

傷寒。冬月即病。宜從仲景法。

傷寒。古今時地不同。因之六經治法且異。夫傷寒。大病也。時者聖人不能違也。以關乎死生之大病。而藥不從時。顧不殆哉。仲景。醫聖也。其立法造論。如華陀孫思邈輩。莫不宗之。漢末去古未遠。風景猶厚。形多壯偉。氣尚敦龐。其藥大都爲北方感寒即病而設。況

ガラス使用

南北地殊、厚薄不侔、故其意可師也、法不可改也、循至今時千有餘年、風氣澆、而人物脆、况在荊揚交廣梁益之地、與北土全別、故其藥則有時而可改、非違仲景也、實師其意、變而通之、以從時也、如是、則法不終窮矣、故作斯議、條列其方、稍爲損益、以從時、俾醫師知所適從、庶患斯疾者、可免夭枉

辨驗外感眞僞法　凡外感必頭疼、其疼也、不間晝夜、探其舌本、必從喉嚨、内乾出于外、多兼煩躁、不煩躁者、卽輕證也、不頭疼而發熱、不發熱而頭疼、頭雖疼而有時暫止、口雖乾而舌本不燥、骨雖疼而頭不疼、雖渴而不欲引飲、至夜或偶得寐、遇食不好、亦不惡、居處雖若尫怯、而神氣安靜、凡若此者、皆非傷寒也、

三陽治法總要　太陽病、其證發熱惡寒惡風、頭痛項強、腰脊強、遍身骨痛、脉雖浮洪而不數、多不傳經、煩躁脉數急者、是欲傳經、宜先發汗以解表邪、其藥以羌活湯爲主、

羌活（三錢）　前胡（二錢）　甘草（八分）　葛根（二錢）　生姜（三片）　棗（二枚）　杏仁（九粒去皮尖研爛）　水煎服、秋深冬月、應用此方、亦可量加紫蘇葱白、如冬月天氣

ガラス使用

嚴寒、感邪即痛、服此藥不得汗、本方加　麻黃（一錢）　生姜（四片）　共前七片、得汗勿再服、如病人自覺煩躁、喜就清涼、不喜就熱、兼口渴、是（即）欲傳入陽明也、若外證頭疼遍身骨疼、不解、或帶、渴鼻乾、目疼、不得卧、即係太陽陽明症、羗活湯中加　石膏　知母　麥冬　大劑與之、得汗即解、如自汗煩躁、頭疼遍身骨疼不解者、羗活（一錢）　桂枝（七分）　石膏（一兩二錢）　麥冬（六錢）　知母（三錢）　竹葉（一百廿片）　白芍（二錢）　甘草（八分）　如冬月即病、太陽證、惡寒、畏風、頭疼、遍身骨疼、自汗不渴、宜用　桂枝（八分）　芍藥（二錢）　甘草（一錢）　大棗（二枚）　生姜（一片）　太陽病不解、熱結膀胱、其人如狂、血自下、下之愈、其外證不解者、不可下、當先解表、表證罷、少腹急結者、乃可下之、桃仁承氣湯、無畜血證、大承氣湯、〇正陽陽明病、正陽陽明者、胃氣實熱是也、其證不大便、自汗、潮熱、口渴、咽乾、鼻乾、嘔、或乾嘔、目眴眴不得眠、畏人聲、畏木聲、畏火、不惡寒、反惡熱、或先惡寒、不久旋發熱、甚則譫語狂亂、循衣摸牀、脉洪大而長、宜急解其表、用竹葉石膏湯、大劑與之、不

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494　ガラス使用

嘔無汗與葛根湯亦須大劑若表證已罷脉緩小便利是病解矣。若表證罷後邪結于裏大便閉小便短赤宜用調胃承氣湯或小承氣湯下之下後按其腹中不作痛而和病已解如作痛是燥糞未盡也再用前藥下之以腹中和二便通利爲度。陽明病不能食若其人本虛勿輕議下。陽明病頭眩欬而咽痛者用　葛根　甘草　桔梗　麥冬　四味濃煎數數與之。陽明病無汗小便不利心中懊憹者當發黃悉用　梔子　麥冬　淡豆豉　大劑濃煎與之。如已見身黃悉加茵陳爲君主之。　陽明病衄血此緣失于發汗宜用　荆芥（二錢）　葛根（二錢）　麥冬（五錢）　牡丹皮（一錢五分）　蒲黃（二錢）　茅根（二兩）　側栢葉（二錢）　生地（三錢）　濃煎與之兼飲童便。　陽明病心下硬滿者此邪未入于腹中愼勿下之用竹葉石膏湯加栝樓（一個搗碎）　桔梗（二錢）　黃連（一錢）　陽明病邪結于裏汗出身重短氣腹滿而喘潮熱手足濈然汗出者此大便已鞕也六七日已來宜下之用小承氣湯不行換大承氣湯勿大其劑若大便不鞕者愼勿輕下。　陽

ガラス使用

明病發汗不解、腹滿急者、亟下之、傷寒六七日、目中不了了、睛不和、無表證、大便難、宜承氣湯下之、　陽明病下之早、外有熱、手足溫、不結胸、心中懊憹、不能食、但頭汗出、梔子豉湯主之、　陽明病發潮熱、大便溏、胸滿不去者、與小柴胡湯去人參加　栝樓　黃連

陽明病自汗出、或發汗後、小便利、津液內竭、大便雖硬、不可攻之、須俟其自大便、或用蜜導膽導法通之、、　大下後、六七日不大便、煩不解、腹滿痛、本有宿食、宜再用承氣湯下之、　食穀欲嘔、屬陽明、非少陽也、胸中煩熱者、竹茹湯主之、　竹茹（三錢）　麥冬（五錢）　枇杷葉（三片）　大蘆根（三兩）　內無熱證者、小便利、口不渴、此爲陽明虛也、吳茱萸主之、　吳茱萸（二錢）　人參（三錢）　生姜（一錢五分）　大棗（三枚）　水煎日三服、　凡陽明病多汗、津液外出、胃中燥、大便必鞕、鞕則譫語、以小承氣湯下之、若一服譫語止者、勿再服、　一陽明病譫語、發潮熱、脉滑而數者、小承氣湯主之、服藥後、腹中轉氣者、更與一服、若不轉氣者、勿更與之、若服藥後、次日不大便、脉反微濇者、裏虛也、爲難治、勿復議

ガラス使用

下。陽明病。下血譫語者。此爲熱入血室。汗止在頭。用　荊芥（三錢）　葛根（三錢）　黄芩（一錢五分）　麥冬（五錢）　丹皮（一錢五分）　生蒲黄（一錢）　濃煎。以童便對飲之。　陽明病。脉浮緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱。汗出。惡熱。身重。若下之。則胃中空虚。客氣動鬲。心中懊憹。舌上有胎者。梔子豉湯主之。　若渴欲飲水舌燥者。白虎湯加人參主之。若脉浮發熱。口渴。小便不利者。猪苓湯主之。　陽明病。協熱下利者。宜六一散。心下痞者。以黄連栝樓湯調服之。　脉浮遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之　附子　乾姜　甘草　趺陽脉浮而濇。小便數。大便鞕。其脾爲約。麻子仁丸主之。　麻仁（十三兩）　芍藥（四兩）　枳實（四兩）　大黄（八兩）　厚朴（三兩）　杏仁（六兩）　蜜丸如梧子大。每用十九。日三服。　陽明實則譫語。虚則鄭聲。鄭聲者。重語也。直視譫語喘滿者死。下利者亦死。　發汗多。若重發其汗。譫語脉短者死。脉和者不死。　若吐若下後。不解。不大便五六日。或至十餘日。日晡時發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣妄撮。惕而不安。微喘直視。

脉弦者生、濇者死、（濇者陽證見陰脉也、）微者、但發熱譫語者、大承氣湯下之、利勿再服、　陽明病、發狂棄衣而走、登高而歌、此陽明實也、以承氣湯急下之、如便不結者、大劑白虎湯灌之、　石膏（四兩）　麥冬（二兩）　知母（一兩五錢）

加大青（兩）　甘草（七錢）　太陽陽明病、協熱下利者、宜六一散、以黃連煎湯調服之、　太陽陽明并病、六七日表證仍在、其人發狂者、以熱在下焦、少腹當硬滿、小便自利、下其血乃愈、當用桃仁承氣湯、　又二陽并病、太陽證罷、潮熱、汗出、大便難、譫語者、宜大承氣湯〇少陽病、其證口苦、咽乾、目眩、往來寒熱、胸脇痛、胸滿或痛、耳聾、脉法、弦細、頭痛發熱者、屬少陽、少陽不可發汗、發汗則譫語、胃和者當自愈、不和者、則煩而悸、　傷寒三日、少陽脉小者、欲已也、凡太陽病不解、傳入少陽者、脇下硬滿、乾嘔、不能食、往來寒熱、未經吐下、脉沉緊者、與小柴胡湯、　柴胡（二錢四分）　人參（九分）　黃芩（九分）　甘草（九分）　半夏（一錢五分）　生姜（九分）

大棗（二枚）　水煎溫服、日三、　若胸中煩而不嘔、去半夏人參、加　栝樓實（一枚）　若心下痞鞕、去大棗、加

牡蠣（二錢五分）　若渴者。去半夏。加人參　栝樓根　若腹中痛者。去黃芩。加芍藥（三錢）　若心下悸小便不利者。去黃芩。加茯苓（二錢）　若不渴。外有微熱者。去人參。加桂（一錢夏勿用）。溫覆取微汗愈。　若欬者。去人參大棗。加五味子（一錢）　少佐以乾姜　陽明少陽并病。必下利。脉滑而數。有宿食也。當承氣湯下之。

若吐下發汗溫針。譫語。柴胡湯證罷。此爲壞病。知犯何逆。以法治之。　三陽合病。脉大上關上。但欲睡眠。目合則汗。藥用　百合（一兩）　麥冬（五錢）　炙甘草（一錢）　知母（二錢）　竹葉（五十片）　栝樓根（二錢）　鱉甲（如法三錢）　白芍（二錢）　三陽合病。腹滿身重。譫語遺尿。白虎湯加百合主之。　傷寒六七日無大熱。其人煩躁者。此爲陽去入陰故也。　傷寒三日。三陽爲盡。三陰當受邪。其人反能食而不嘔。此爲三陰不受邪也。

三陰治法總要　三陰病。其證有二。一者病發于三陽不時解表。以致邪熱傳入于裏。雖云陰分。病屬于熱。糞結宜下。腹滿不可按宜下。有燥糞協熱下利宜下。腹痛下利。宜芍藥黃芩炙甘草以和之。如便膿血。即

ガラス使用

加滑石黃連。佐以升麻乾葛。如邪雖入裏。糞猶未結。宜清其熱。渴者用白虎湯。竹葉石膏湯。不渴。或心下痞者。宜黃連黃芩芍藥枳殻麥冬栝樓輩。以清之。或邪未結于下焦。少腹不堅痛。而誤用芒硝以伐其陰。洞泄不已。元氣將脫。宜用人參白朮炙甘草大棗乾姜芍藥大劑與之。不止。佐以升提。升麻葛根柴胡之類。　若從無陽邪表證。從不頭疼發熱。寒邪直中陰經。此必元氣素虛之人。或在極北高寒之地。始有是證。法宜溫補以接其陽。附子人參乾姜官桂。大劑與之。陽回寒退。即以平補之劑調之。勿過用桂附以防其毒。　三陰各經見證。悉從仲景傷寒論法治之。如少陰咽痛。咽中生瘡。聲不出。用苦酒湯。到咽即效。故知古人立法。非今人可及也。

（春溫夏熱病大法）冬傷于寒。至春變爲溫病。大都頭疼發熱。或渴或不渴。三陽證俱然。亦間有先微寒。後即發熱者。大抵發熱其常也。藥用辛溫。佐以辛寒。以解表邪。太陽宜羌活湯。陽明宜白虎湯。無汗不嘔者。間用葛根湯。少陽往來寒熱等證。不可汗吐下。宜和

ガラス使用

解小柴胡湯渴者去半夏加栝樓根耳聾熱甚去人參加麥冬知母栝樓根渴亦如之　至夏變爲熱病其表證大約與春溫同但熱比于溫則邪氣更烈耳解表用白虎湯竹葉石膏湯有太陽證則加羌活有少陽證則加柴胡黄芩如發斑白虎湯竹葉石膏湯加玄參梔子桔梗鼠黏子連翹大青小青青黛大劑與之二證若大便秘宜按之其邪已結于內便鞕宜察邪結中焦小承氣湯調胃承氣湯下之邪結下焦少腹堅痛始用大承氣湯下之　傷寒溫疫其不可治及難治者皆屬下元虛　傷寒溫疫三陽證中往往多帶陽明者以手陽明經屬大腸與肺爲表裏同開竅于鼻足陽明經屬胃與脾爲表裏同開竅于口凡邪氣之入必從口鼻故兼陽明證者獨多　邪在三陽法宜速逐遲則胃爛發斑或傳入于裏則屬三陰邪熱熾者令陰水枯竭於法不治矣此治之後時之過也　傷寒陰陽易之爲病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒裩灰主之取婦人中裩近陰處

剪燒灰、以水和服方寸匕、日三、小便即利、陰頭微腫則愈、婦人病、取男子裩襠燒灰、 大病差後勞復者枳實梔子湯主之、枳實三枚、梔子十四枚、豉一升、綿裹、以清漿水七升、空煮取四升、納枳實梔子、煮取二升、下豉、更煮五六沸、去滓、溫分再服、覆令微似汗、若有宿食者、加大黃如博棊子大五六枚、 傷寒差已後更發熱者、小柴胡湯主之、脉浮者、以汗解之、脉沈實者、以下解之、 百合病者、百脉一宗、悉致其病也、其爲證、神思嘗默然、飲食不美、亦不惡、如寒無寒、如熱無熱、口苦、小便赤、百合地黃湯主之、汗後者、百合知母湯、下後者、滑石代赭湯、吐後者、百合雞子湯、近代醫師鹵莽、既不明傷寒治法、又不識襍證類傷寒、往往妄投汗下之藥、以致虛人元氣、變證叢生、元氣本虛之人、未有不因之而斃者、矣戒之哉、汗下之藥、焉可嘗試也、 時氣傷寒、（除陰症不可服、）苦參（一兩）水酒各一碗、煎八分、重者、水醋各半、服之、一汗而愈、不論傷寒、久近、立效、本草云、天行尤良、

【暑】諸病喘嘔、暴注、下迫、霍亂轉筋、身熱瞀鬱、小便濁

家君

赤。皆屬於暑。　忌破氣升復忌下。濕潤。辛溫辛燥熱。發散閉氣之藥。　宜清暑益氣。健脾甘寒甘溫辛寒。酸寒苦寒。　黃連　香薷　葛根　石膏　知母　甘草　人参　黃茋　白术　白藊豆　神曲　橘皮　白茯苓　木瓜　麥冬　五味子　白芍　白梅　烏梅　大約用清暑益氣湯。香薷飲。生脉散。凡病暑之人。其氣必虛。暑傷氣。無氣以動。故當補氣爲本。惟肺熱多火者。忌人參术。

中暑　猝昏暈。急以童便灌入。即省。　忌宜藥俱同暑。

又方用絲瓜葉一片。白鹽梅肉一枚。并取核中仁共研如泥。新汲水調灌。立瘥。兼治中暑霍亂有効。

大陽病中暍　忌藥同暑。　宜人參白虎湯。有肺熱火病人。不能服參者。用竹葉石膏湯。脾胃作瀉者。水調六一散。

霍亂　見胃虛條內。　忌宜藥俱同。

痓夏　由于脾胃薄弱。胃家有濕熱及留飲所致。　忌藥同前。　宜益氣健脾酸寒苦寒淡滲。　人参　白术　半夏　陳皮　白茯苓　白扁豆　白芍　木

瓜　澤瀉　兼服生脉散。

【濕】諸痙强直。積飲痞膈。中滿霍亂吐下。體重胕腫。肉如泥按之不起皆屬于濕。經曰。地之濕氣感則害人皮肉筋脉。故其病筋骨疼痛。腰重痛。不可轉側身重。四肢不利。濕在上。病嘔吐。頭重胸滿。濕在中。病腹脹中滿泄瀉。濕在下。病足脛跗腫。脚氣臁瘡久不愈。忌濕潤甘鹹之藥。宜散滲泄燥辛苦。木瓜　薏苡仁　术　石斛　萆薢　石菖蒲　茯苓　佐以防風。葛根　寒濕加　半夏　五加皮　風濕加獨活。濕熱加　黄檗　車前子　木通。甚者加　漢防己

【脚氣由於濕熱】忌溫燥濕熱補氣復忌破氣升之藥。宜清熱除濕利小便甘平酸寒苦寒辛溫淡滲。黄栢　石斛　麥冬　木瓜　石菖蒲　薏苡仁　車前子　茯苓　木通　澤瀉　萆薢　防己

【燥】諸澀枯涸乾勁皴（音靖）揭皆屬于燥。角弓反張筋攣急不舒。舌强不能言。二便閉澀。口渴口乾舌苦。皮膚皴揭。毛髮脆折。津液不生。血枯胃稿。以致飲食不化。

ガラス使用

噎膈吐食　忌升散破氣下、辛燥大熱溫之藥　宜潤益血、辛甘寒、酸寒、鹹寒、有熱證者、宜兼清熱、　麥冬　當歸　地黃　肉從容　酥　人乳　牛乳　蜜　胡桃　甘菊花　麻仁　胡麻　栢子仁　人參　枳實　天冬　五味子　酸棗仁　白芍　蔗漿　蘆根汁　童便　梨汁　韭汁　佐以薑汁

〔火〕諸熱瞀瘛、（音茂記）暴瘖冒昧、躁擾狂越、罵詈驚駭、胕腫疼酸、氣逆上衝、禁慄如喪神守、嚏嘔瘡瘍、喉痺、耳鳴及聾、嘔涌溢、食不下、目眛不明、暴注、瞤（音純）瘛、暴病暴死、皆屬于火、　忌補斂、升發、閉氣、辛燥溫熱之藥　宜降折、下、鹹寒、苦寒、辛寒、甘寒、　大黃　童便　芒硝　黃芩　黃連　黃蘗　連翹　石膏　山梔　玄參　生甘草　知母　天冬　麥冬　生地　藍汁　虛者宜甘寒、鹹寒以滋水、不宜用苦寒傷胃、

〔猝眩仆〕九竅流血、多不治、　忌藥同火、　宜服童便　鹽湯　竹瀝　藍汁　梨　生犀角汁

〔猝心痛〕忌藥同火、　宜服山梔　白芍　延胡索　生甘草　鹽湯　蘇子

ガラス使用

目暴赤腫痛甚見肝實條內。忌宜藥俱同。

二便忽閉以利小便爲先。忌藥同火。宜降潤苦寒甘寒辛寒利竅。大黃　蘇子　生蜜　麻仁　桃仁　石膏　知母　天冬　麥冬　黃芩　山梔　滑石　澤瀉　猪苓　車前子　木通　海金沙

頭面赤腫　忌藥同火。宜清暑解毒發散苦寒辛寒甘寒鹹寒。甘菊花　鼠黏子　連翹　荊芥　薄荷　蟬蛻　大黃　玄參　石膏　知母　竹葉　生甘草　童溺

忽大渴忌氷水　忌藥同火。宜潤生津液辛寒苦寒鹹寒。石膏　知母　玄參　麥冬　竹葉　栝樓根　五味子　梨汁　蔗漿　童便　涼水　氷

口乾舌苦　忌宜藥俱同火。

暴瘖　忌藥同火。宜降氣發音聲苦甘寒辛涼鹹寒。蘇子　枇杷葉　貝母　桔梗　百部　竹瀝　梨汁　天冬　麥冬　甘草　薄荷　玄參　桑白皮　童便

暴注　忌藥同火。宜利水苦寒酸寒。茯苓　黃

ガラス使用

連　黄芩　白芍　生甘草　葛根　滑石　木通

虛者加人參　蓮肉　白扁豆

〔躁擾狂越罵詈驚駭〕　忌藥同火。宜清鎮苦寒辛寒鹹寒。丹砂　牛黄　黄連　黄芩　山梔　滑石　石膏　知母　童便　大便閉者加大黄下之。不行。加芒硝。

〔禁慄如喪神守〕　忌藥同火。宜藥同躁擾狂越。

〔氣逆衝上〕　忌藥同火。宜降氣酸斂甘寒苦寒鹹寒。蘇子　枇杷葉　[illegible]皮　五味子　番降香

山茱萸　白芍　麥冬、石斛　黄檗　牛膝　桑白皮　童尿

〔瞤瘈脊瘈〕　忌藥同火。宜清熱和肝酸寒苦寒辛寒甘寒。白芍　生甘草　竹葉　玄參　黄連　黄檗　生地　甘菊花　麥冬　知母　石膏

雜證門

〔瘧〕經曰夏傷於暑。秋必痎瘧。其證大都多熱多寒。或熱多寒少。或寒多熱少。或單熱不寒。或單寒不熱。或先寒後熱。或先熱後寒。或有汗無汗。或汗少汗多。或

ガラス使用

自汗盜汗。或頭疼骨痛。或大渴引飲。或口苦舌乾。或嘔吐不思食。或煩躁不得眠。或大便燥結。或瀉利。或連發。或間發。或三日發。或發于陽。或發于陰。要皆中氣不足。脾虛胃弱。暑邪乘虛客之而作。雖隨經隨證。投藥解散。必先清暑益氣。調理脾胃為主。有食者兼消導奪食。有風兼散風。有老痰伏飲者。兼豁痰逐飲。感瘴癘者。兼消瘴癘。汗多者。固表。無汗者。解表。泄利者。升發。兼利小便。便燥者。兼益陰潤燥。病有陰陽。藥分氣血。證有緩急。治因先後。人有虛實。法異攻補。久

而不解。必屬于虛。氣虛者補氣。血虛者補血。兩虛者氣血兼補。非大補真氣。大健脾胃。不得瘳也。忌破氣下之藥。　瘧必由于中氣虛。破氣則傷中氣。邪不得解。甚則中滿不思食。作泄。惡寒。口乾。惟傷食宜消不同此法。誤下。則邪氣陷于內。變為滯下。或腹滿膨脹嘔逆不思食。凡屬破氣下泄藥。切戒勿施。　宜清暑益氣。健脾開胃。兼消痰。宜分臟腑手足六經所見證施治。　先清暑熱多者。宜服白虎湯加減。　硬石膏（自一兩至四兩）　知母（自四兩至二兩四錢）　竹葉（自一百片至四百片）　麥冬（自八錢至

（三兩二錢）粳米（自一小撮至二大撮）病人素虛或作勞者。加人參。（自三錢至一兩）有痰。加橘紅（三錢）竹瀝（一盃）大渴者。加栝樓根。（二錢至六錢）不渴者。用清暑益氣湯。兼飲食停滯者。加枳實青皮草果一二劑。食消即止。多服則損中氣。其藥俱宜黃昏煎。以井水澄冷。須露一宿。五更時溫服。蓋瘧乃暑邪為病。暑得露則散也。

〔足太陽經〕屬膀胱。其證。令人腰痛頭痛。頭重寒從背起。先寒後熱。熇熇暍暍然。熱止汗出難已。或遍身骨痛。小便短赤。羌活（一錢至三四錢）陳皮（去白二錢五分）黃芩（一錢）前胡（二錢）甘草（炙五分）猪苓（一錢）知母（二錢五分）若口渴者。即兼陽明。宜加石膏麥冬。倍知母。渴而汗少。或無汗。再加葛根。若涉深秋。或入冬。無汗宜多加薑皮。因虛而無汗。或汗少者。加人參。（三五錢）麥冬（四五錢）佐以薑皮。（二三錢）露一宿。發日五更溫服。因虛汗多者。加黃耆。（三四錢）桂枝（七八分二）汗止即去桂枝。不可多服。若病人素有熱者。勿服桂枝。以芍藥五味子代之。若發于陰。并加當歸。小便短澁。或赤者。與六一散二三服。有濕者。以猪苓茯苓代滑石。下午服理脾健胃藥。橘紅（二錢五分）

ガラス使用

白荳蔻（五分）白茯苓（三錢）山查（三錢）麥芽（炒三錢）藿香（一錢）人參（三錢）白术（二錢）白芍（三錢）白扁豆（三錢）有肺火者。去人參白术。加麥冬（五錢）石斛（三錢）烏梅肉（一枚）停食者必惡食。加山查。傷肉食者。加黃連紅麴。傷穀食者。加枳實草果（各七分）。傷麪食者。加炒萊菔子。食消即已。不可多服。多則損中氣。胃家素有溼痰者。其證不渴寒多。方可用半夏橘紅二术。大劑與之。嘔甚者兼用薑皮。

足陽明經屬胃。其證發熱頭疼鼻乾。渴欲引飲。目眗不得眠。甚則煩躁。畏火光人聲木聲。宜服大劑竹葉石膏湯。無汗或汗少。不嘔者。可加乾葛（二三錢）。病人虛而作勞者。加人參。汗多加白术。痰多加貝母橘紅。得汗即解。寒熱俱甚。渴甚汗多。寒時指爪皆紫黯者。加桂枝（七八分）。久而不解。屬氣虛。用人參（一兩許）薑皮（兩許）煎成露一宿。五更溫服。下午服理脾健胃藥。如前方加減。

足少陽經屬膽。其證往來寒熱。口苦耳聾。胸脇痛。或嘔。宜服小柴胡湯。渴者去半夏。加石膏麥冬。肺家有

ガラス使用

熱者・去人參加知母倍麥冬。有痰不渴者・本方加貝母（三錢至八錢）朮茯苓（各二錢）薑皮（一錢至三四錢）病人陰虛而有熱者・雖嘔吐・忌用半夏生薑・誤投則損人津液・令人聲啞・宜用竹茹橘皮麥冬・白茯苓・烏梅以代之・○

以上三陽經瘧・邪客之者・其證多熱多渴・亦易得汗・藥宜大劑急逐暑邪・毋使遷留・則病易愈。繼以理脾開胃・大補眞氣・蔑不瘳矣・邪在三陽・藥宜辛寒・如石膏・知母・柴胡・甘寒・如葛根・麥冬・竹葉・粳米・苦寒・如黃芩之屬・爲君・乃可以散暑邪・除熱渴・墜頭疼・兼寒甚者・則間用辛溫・如薑皮・桂枝・以爲嚮導・以伏其邪・則渴易退・凡寒甚者・病因于虛・或作勞者・亦因于虛・皆宜甘溫・以人參黃耆朮爲君・佐以辛甘・如桂枝薑皮之屬・脾胃虛弱・飲食不消者・則補之以參朮・佐以消導・如白豆蔻麥芽砂仁草豆蔻枳實・橘皮・山查之屬・在陰分者・則以當歸牛膝爲君・佐以薑桂・如熱甚而渴者・去薑桂・加知母麥冬・竹葉牛膝鼈甲・

足厥陰經屬肝・其證先寒後熱・色蒼蒼然・善太息・甚者狀如欲死・或頭疼而渴・宜先服三黃石膏湯・加柴

ガラス使用

胡鼈甲、陳皮、以袪暑邪、後用當歸（兩許）橘皮（三四錢）鼈甲（四五錢）牛膝（兩許）柴胡（一二錢）濃煎露一宿、發日五更溫服、如熱甚而渴、加栝樓根（三四錢）麥冬（五六錢）竹葉（一百）片、知母（三四錢）鼈甲（五六錢）如脾胃薄弱、或溏泄、去當歸、加人參（三五錢）如有肺火不可服參者、祗照本方、多服自愈、寒多或寒甚、指爪青黯者、加桂枝薑皮、人參、

足太陰經、屬脾、其證先寒後熱、或寒多、若脾瘧、必寒從中起、善嘔、嘔已乃衰、然後發熱、熱過汗出乃已、熱甚者或渴、否則不渴、喜火、宜服桂枝湯、建中湯、病人虛者、以人參薑皮各兩許、濃煎露一宿、五更溫服、有痰者、宜加朮、橘皮、（各三四錢）

足少陰經、屬腎、其證寒熱俱甚、腰痛脊強、口渴、寒從下起、小便短赤、宜先服人參白虎湯、加桂枝、以袪暑邪、後用鼈甲（四五錢）牛膝（兩許）熱甚者、加知母麥冬（各四五錢）寒甚者、加桂枝（錢許）嘔、則兼加薑皮（三四錢）如熱甚而嘔者、去桂枝薑皮、加竹茹（三錢）人參橘皮（各三四錢）用牛膝桂枝者、肝腎同一治也、瘧病多挾痰、以故熱痰須用貝母爲君、自三錢至八錢、竹瀝、竹茹、栝樓根、

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494　ガラス使用



橘紅白茯苓稱是以佐之甚者可加霞天膏如寒痰發瘧寒不渴者用半夏白术橘皮爲君多加生薑皮瘧病多挾風有風者必用何首烏爲君白术橘皮爲臣葛根薑皮羌活以佐之不頭痛者除羌活　暑邪盛解散不早陷入于裏則變爲滯下急投芩連芍藥滑石紅麴甘草佐以葛根升麻柴胡以表裏分消之脾胃薄弱者加人參橘皮蓮肉大劑與之以愈爲度滯下若愈瘧亦隨止即不止其熱必輕仍隨經隨證以治之不煩多藥而自止也又暑熱濕之邪內伏



不效者用獨雄丸立愈　凡勞瘧病人陰不足或作勞或房勞病發于陰或間日一發或三日一發三日者爲病深須以鼈甲牛膝何首烏爲君橘皮爲佐發於夜而便燥者加當歸脾胃弱者勿加佐以薑皮熱甚勿入大劑與之日三乃差　附諸瘧主治

〔熱多宜〕　貝母　石膏　麥冬　橘紅　乾葛　滑石　竹葉　牛膝　知母　黄芩　柴胡　白茯苓　烏梅　何首烏　牡蠣　鼈甲

〔寒多宜〕　桂枝　薑皮　术　人參　黄耆　當歸　橘紅　半夏　草

豆蔻　炙甘草　（汗多宜）人參　白朮　黃耆
（秋冬）加　桂枝　（無汗宜）乾葛　柴胡　石膏
羌活　草果　人參　蒼朮　（瘧母宜）鱉甲　射干　牡蠣　桂　三稜　橘皮　縮砂蔤　青皮

凡瘧疾多熱久不解者其人必本陰虛法當益陰除熱非鱉甲牛膝不能除也多寒而久不解者其人必本陽虛非人參白朮黃耆不能除　按瘧有山嵐瘴氣停痰留飲而發者古方類用常山砒霜等吐之今人誤執其方見瘧輒用不知二藥有大毒損人眞氣犯之多致危殆愼之愼之

滯下俗呼痢疾其證腹痛便膿血或赤或白或赤白相雜或下純血或下紫黑血塊或如豆汁或如魚凍或如屋漏水或下純黃積類多裏急後重登廁而不得便小便短赤不利或發熱或口渴甚則嘔惡不思食此皆暑溼之邪與飲食積滯膠固腸胃而作必先袪暑滲溼安胃爲主傷氣分則調氣益氣傷血分則和血補血挾瘀血則宜行血藥雖因證而設要皆以補養胃氣爲急故其證以噤口痢爲最重胃氣一絕

ガラス使用

則不可治矣。故曰安穀則昌。絶穀則亡。俗治多藉口迎而奪之之説。遽用大黃朴消。及誤用巴豆牽牛。以致洞泄腸開而斃。又有妄投訶子粟殻亞芙蓉肉豆蔻收澁之劑。以致便閉腹脹。或溼熱上攻。肢節腫脹。拘攣痛不可忍。難以救療。慎之慎之。忌破氣閉氣。收澁燥溫熱鹹寒滑膩之藥。宜清熱消積開胃氣。升利小便。

黃連　黃芩　白芍　紅麴　山查

廣皮　升麻　葛根　甘草　滑石　蓮肉　烏梅

白扁豆。如胃傷弱。加人參（三四錢）蓮子（四十粒）橘紅（二錢）升麻（七分）如腹痛。以黃連（四錢）白芍（三錢）炙甘草（一錢五分）黃蘗（一錢）升麻（七分）煎服。如裏急。同上藥。加當歸（二錢）如後重甚。加檳榔（一錢五分）枳殼（一錢五分）木香汁（七匙）如口渴。去木香。倍滑石。如小便赤澁短少。或不利。亦倍之。赤多。倍烏梅山查。紅麴。白多。加吳茱萸（七分）惡心欲嘔。即噤口痢。多用人參蓮肉扁豆白芍。以綠色升麻（七分）佐之。久痢不止。加肉豆蔻（一錢）人參（三錢）砂仁（一錢五分）白茯苓（二錢）凡滯下。非元氣壯實。多噉能食之人。慎勿輕用大黃巴豆牽牛等藥。復有

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号 特7-494　ガラス使用

毒痢一證或疫毒內陷下膿血各藥不效者加忍冬藤為君地榆丹砂犀角汁次之凡產後滯下積滯雖多腹痛雖極不可用大黃等藥行之致傷胃氣遂不可救但用人參白芍當歸紅麴升麻益母草炙甘草滑石末足矣若惡露未盡兼用乳沒（各七分五厘）炒砂仁（一錢）久之自愈血虛可加阿膠（三錢）凡胎前滯下宜用黃芩黃連白芍炙甘草橘紅赤麴枳殼蓮肉暑月升麻未滿七月勿用滑石

〔瀉利〕俗呼泄瀉因于濕忌濕潤破氣下苦寒滑利之藥宜安胃補脾升利小便人參白茯苓蓮肉白藊豆白朮車前子升麻橘紅藿香木瓜乾葛炙甘草白萊菔虛寒者加肉豆蔻補骨脂吳茱萸虛熱者去白朮加黃連倍芍藥蓮肉暑濕為病則小水短赤或口渴倍用薑炒黃連為君佐以乾葛升麻由于感風寒者二朮吳茱萸砂仁陳皮乾薑紫蘇主之若由飲食停滯者兼消導山查麥芽神麴陳皮肉豆蔻

〔五疸〕方書所載五疸酒食大饑後過飽女勞失治而

ガラス使用

成然其證必由溼熱傷脾及飲食停滯又有瘀血發黃一證方所不載分別一誤則藥不對證多致不救愼之愼之　忌破氣閉氣下鹹滑利滯膩潤燥熱之藥有瘀血者兼忌酸寒　宜清熱利水除溼養胃氣有停滯者宜消積滯有瘀血者宜行血　茵陳蒿

黃連　苜蓿（酒疸非此不愈）梔子　紫草　枳椇根　秦艽

黃芩　滑石　車前子　白蘚皮　仙人對坐草

白茯苓　連錢草（一名蠏黶草一名九里香取汁入醋汁少許飲之良）虛者加人參停滯者加紅麴橘紅穀麥芽山查瘀血加琥珀牡丹皮紅麴紅花桃仁延胡索蒲黃五靈脂韭元

氣壯實者服前藥瘀血不行可加熟大黃虛者勿用

「痰」　由於熱　忌燥溫補斂升之藥　宜降潤清熱苦寒辛寒佐以鹹寒　蘇子　橘紅　天冬　枇杷葉　麥冬　黃芩　桑白皮　薄荷　百部　栝樓根及仁　桔梗　貝母　蛤粉　竹瀝　童便

膠固者加霞天膏并用貓兒刺　由於風寒　忌補斂濕潤酸鹹之藥　宜降氣辛散　橘紅　蘇子

杏仁　天麻　前胡　半夏　南星　葛根　桑白

ガラス使用

皮　薄荷　白前　生薑汁　由于**溼**　忌潤鹹酸滯膩發濕之藥。宜健脾燥溼辛散佐以淡滲。人參　二朮　橘紅　半夏　桑白皮　白茯苓　澤瀉

飲　如涎而薄者。或如涎而稠者。伏于胸中及脾胃間。或吐酸水。苦水。黃水。綠水。或伏而不吐。上支心胸胃脘作痛。不可忍按之不得下。或發寒熱。嘔吐不能飲食。　忌宜藥俱同脾虛證內停飲條。

諸氣　氣有餘。即是火。　升。閉氣。酸斂。滯膩之藥。

虛者宜降補斂調澀。酸辛甘。　蘇子　枇杷葉　麥門冬　橘紅　蘆根汁　甘蔗　番降香　沉香　鬱金　甘草　白豆蔻　童便　五味子　白芍　因虛極而氣不得行者加人參　**實**者宜破散。香燥。辛苦。辛寒。　枳殼　青皮　檳榔　厚朴　木香　沉香　香附　烏藥　降香　藿香　縮砂蔤

鬱　忌酸斂。滯膩。補氣。閉氣之藥。　屬情抱者宜開發志氣。調氣散結。和中健脾。　遠志　貝母　鬱金　石菖蒲　香附　蘇子　橘紅　白豆蔻　木香

蘇合香　縮砂蔤　麥冬　屬五藏者〔木鬱〕達之宜升吐　升麻　柴胡　川芎　瓜蒂　人參蘆

〔火鬱〕發之宜散　升麻　葛根　柴胡　防風　羌活

〔土鬱〕奪之宜下　檳榔　枳實　厚朴　大黃

〔金鬱〕泄之宜降　橘紅　蘇子　桑白皮　猪苓

澤瀉　木通　赤小豆　車前子　烏鱧魚

〔關格〕不得大小便爲關是熱在丹田也吐逆水漿不得下爲格是寒反在胸中也陰陽易位故上下俱病先投辛香通竅下降之藥以治其上次用下泄苦寒之藥以通二便此急證法難緩治總有裏虛通後再補　忌升補斂閉氣酸之藥　宜降下辛寒辛溫一

沉香　白豆蔻　丁香　蘇子　龍腦香　蘇合香

橘紅　生薑　藿香　次用大黃　黃蘗　知母

滑石　木通　車前子　牛膝

〔噦〕俗呼呃逆久病沉痼而發者屬眞氣虛多不治　忌破氣升散之藥　宜補斂甘溫甘寒　人參　黃耆　炙甘草　麥冬　五味子　益智子　白芍

石斛　〔傷寒失下而發者〕　忌補斂酸燥熱滯膩之

ガラス使用

藥、宜下、大小承氣之類、便不鞕閉、按之腹中和軟、未經汗出者、宜辛寒解表、白虎湯之類、〔氣逆衝上而發者〕忌升補之藥、宜降氣甘寒鹹寒、蘇子　橘紅　枇杷葉　竹茹　蘆根汁　麥冬　童便

〔因痰水停膈而發者〕忌升潤苦寒甘寒酸寒之藥、宜降氣開痰辛散、橘紅　蘇子　貝母　桑白皮　半夏　旋覆花　生薑　白豆蔻

〔吐血、咯血、鼻衄齒衄耳衄舌上出血〕忌升提發散下、破血補氣閉氣破氣溫熱辛燥、復忌極苦寒傷胃之藥、宜降氣、清熱、涼血、益陰、兼行血、鹹寒、酸寒、甘寒、蘇子　麥冬　橘皮　枇杷葉　降香　鬱金　天冬　沙參　牛膝　阿膠　生地　枸杞子　五味子　鼈甲　白芍　犀角汁　牡丹皮　青蒿　剪草　白藥子　童尿　側栢葉　小薊　茅根　椶灰　藕節　當歸　蒲黃

〔蓄血〕俗名內傷、或積勞、或多怒、或飽後行房、或負重努力、或登高墜下、或奔逐過急、皆致蓄血、其證多發熱、其熱類外感、而不頭疼、不作渴、天明少間、至午復

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494　ガラス使用

劑有汗、汗多劑頸而還、自汗無氣以息、目光短、不思飲食、不得眠、二便自利、小便或赤、大便或泄、　忌破氣・復忌補氣、下、苦寒辛燥之藥、　宜行血・辛溫佐以鹹寒、瘀血行後、宜補血益脾和肝、　桃仁　紅花
延胡索　桂（有火人勿用）　鬱金　歸尾　蘇木　番降香
乳香　沒藥　穿山甲　䗪蟲　赤芍　五靈脂
蒲黃　紅麯　騏驎竭　韭汁　童尿　桃梟

甚者、用大黃花蕋石、瘀行則止、勿過劑、如元氣虛・脾胃素弱者、慎勿輕用大黃、如瘀血行後宜生地　續斷　白膠　歸身　麥冬　牛膝　白芍　炙甘草
酸棗仁　大棗　龍眼肉　枸杞子　山茱萸

頭痛　挾風寒者、　忌補斂之藥、　宜辛溫・發散、
羌活　防風　細辛　荊芥　薄荷　川芎　藁本
升麻　白芷　蔓荊子　牛蒡　葱白

挾邪熱者、　忌藥、同挾風寒、　宜辛寒・苦寒・解散、　石膏
薄荷　黃芩（酒炒）　芽茶　黑豆　烏梅　甘菊花　土茯苓、　熱極・目昏便燥者、加酒蒸大黃、

挾痰者、忌升・補斂・酸・膏滯膩之藥、　宜豁痰・降氣・辛燥、　蘇

子　橘紅　貝母　半夏　前胡　竹瀝　术　天麻　〔陰虛〕者　忌辛熱、發散之藥、宜補血益陰甘寒、酸寒、　生地　甘菊花　當歸　天冬　麥冬　枸杞子　黃蘗　川芎　忍冬　五味子　烏梅

〔眉稜骨痛〕　忌宜俱同陰虛頭痛、

〔齒痛〕　忌升、補、斂、燥、熱、辛溫之藥、宜清熱涼血、苦寒、辛寒、甘寒、鹹寒、　麥冬　生地　赤芍　丹皮　竹葉　知母　黃連　黃芩　黃蘗　玄參　石膏　薄荷　蘇子　甘草　童便　〔上下齦〕屬胃與大腸火、宜石膏　熟大黃　麥冬　黃芩　黃連　赤芍　生地　生甘草　青黛　細辛　西瓜皮灰　薄荷　枇杷葉　蘇子　木通　〔齒牙浮動〕及黑爛、屬腎虛有火、已見腎虛條內、忌宜藥俱同、

〔胃脘痛〕　〔因火〕者、忌補、斂、燥、熱之藥、宜降、苦寒、甘寒、鹹寒、辛寒、　蘇子　橘紅　黃連　山梔　麥冬　炙甘草　石膏　知母　玄參　童溺　〔因寒〕者、忌破氣、滯膩、苦寒之藥、宜辛溫、發散、　橘皮　草豆蔻　益智子　丁香　桂　白术　藿香

ガラス使用

白豆蔻　縮砂蔤　吳茱萸　厚朴　香附　乾薑
因宿食者。忌升補斂苦寒之藥。宜消導兼降
氣。山查　橘皮　草果　紅麯　枳實　朮　檳
榔　草豆蔻　青皮　厚朴　穀麥芽　縮砂蔤
因脾胃虛弱。以致食停者。消導藥中。加人參。因瘀
血者。忌補氣酸斂之藥。宜辛溫苦溫。以行血。桃
仁　延胡索　紅麯　紅花　山查肉　牡丹皮
番降香　韭菜　通草　鬱金　肉桂　三稜　童
溺　琥珀　菴藺子　牛膝　赤芍　因血虛者。按
之則痛止。忌破氣。復忌補氣。燥熱辛溫之藥。宜
潤補斂。甘寒甘溫。麥冬　炙甘草　酸棗仁　石
斛　白芍　生地　當歸　因蟲者　忌補升發散
甘之藥。宜殺蟲苦酸。錫灰　苦楝根　檳榔
使君子　鶴虱　雷丸　蕪荑　薏苡仁根　大黃
烏梅　因惱怒者　虛弱人。忌破氣。壯實人。忌補
氣。總忌酸斂升之藥。宜降氣辛溫。蘇子　枇杷
葉　白豆蔻　番降香　縮砂蔤　木香　橘紅
延胡索　五靈脂　因痰飲者　忌宜藥俱見痰飲

ガラス使用

證下。

腹痛　因于寒者。忌苦寒。下利之藥。宜溫中。辛散

白朮　厚朴　乾薑　吳茱萸　桂　炙甘草

木香　縮砂蔤　橘皮　因于熱。火在少腹。則絞痛。

忌辛熱。香燥。補歛之藥。宜甘。苦寒。山梔仁

麥冬　石斛　白芍　甘草　桔梗　黃芩　黃連

滑石　木通　戎鹽　諸痛不可按。屬實。忌補

氣。大熱之藥。宜破散。疏利。苦寒。枳實　青皮

檳榔　三稜　滑石　蓬莪茂　木通　大黃（有積滯。宜。無者勿用。）諸痛可按。屬虛。忌破氣。破血。下利。發散之

藥。宜補氣血。甘溫。酸歛。人參　二朮　黃耆

生地　當歸　炙甘草　白芍　薯蕷　酸棗仁

五味子

痺　拘攣而痛也。因風寒濕三者合而成。風氣勝者爲

行痺。寒氣勝者爲痛痺。濕氣勝者爲着痺。忌下。收

歛。酸寒。苦寒。鹹寒之藥。宜辛散。行氣。燥濕。甘溫。淡

滲。漆葉　續斷　黃耆　甘草　甘菊花　車前

子　萆薢　防已　白朮　防風　羌活　獨活

ガラス使用

秦艽　牛膝　木瓜　天麻　茯苓　澤瀉　菖蒲
桑寄生　狗脊　蔓荊實　杜仲　白蘚皮　石
斛　細辛　松節　松葉　葈耳　原蠶沙　威靈
仙　海風藤

痿屬濕熱經曰治痿獨取陽明　忌破氣升辛熱發
散之藥　宜大補氣血清熱除濕甘寒自潤苦寒酸
寒　人參　黄耆　二术　炙甘草　生地　麥冬
白芍　木瓜　石斛　薏苡仁　黄蘗　茯苓
車前子　澤瀉　木通　黄芩

交腸其病大小便易位而出或因大怒或因醉飽遂
至臟氣乖亂不循常道法當宜吐以開提其氣使闌
門清利得司泌別之職則愈矣　忌破氣燥熱之藥
宜升清降濁兼補氣淡滲　升麻　柴胡　蘇子
降香　橘紅　人參　术　茯苓　澤瀉　猪苓
木通　滑石　車前子

鬼疰尸疰飛尸客忤此係天地陰邪殺厲之氣乘虛
中人或遍身青黯或忽消瘦聲啞面色青黄不定或
忽驚厥目直視手忽拳或遍身骨節疼痛非常　忌

破氣復思補氣升燥熱酸斂之藥宜辟惡氣安神鎮心辛香發散金石鎮墜　牛黃　丹砂　蘇合香

天竺黃　琥珀　沉水香　龍腦香　乳香　檀香　安息香　木香　麝香　真珠　雄黃　鬼臼

龍齒　犀角　金銀箔　虎骨　代赭　天靈蓋

獺肝　生地　菖蒲　遠志

婦人門

赤白帶下婦人多憂思鬱怒損傷心脾肝火時發血走不歸經所以多患赤白帶也白帶多是脾虛盖肝氣鬱則脾受傷脾傷則濕土之氣下陷是脾精不守不能輸爲榮血而下白滑之物矣皆由風木鬱于地中使然耳法當開提肝氣補助脾元宜以補中益氣湯加酸棗仁茯苓山藥黃蘗蒼朮麥冬之類濃煎不時飲之再用六味地黃丸中加牡蠣粉海螵蛸杜仲牛膝蜜丸光大如豆空心飢時吞下五六錢陰虛火熾加枸杞子五味子黃蘗白帶多屬氣虛補氣健脾治法之要領也

帶下如濃泔而臭穢特甚者濕熱甚也且多有濕痰

ガラス使用

下墜者。宜蒼朮、白朮、黃蘗、黃芩、茯苓、車前子爲主。佐以升提。一帶下如雞子清者。脾腎虛極也。面色必不華。足脛必浮。腰腿必酸。宜五味子八味丸。間用開脾養心之劑。如歸脾湯之類。陰虛有火。宜八味丸中加五味子、兔絲子、車前子、黃蘗。叔和云。崩中日久爲白帶。漏下多時骨髓枯。蓋言崩久氣血虛脫。而白滑之物下不止耳。此證雖有氣血寒熱之分。要歸總屬于虛。　赤淋多因于心火肝火。時熾不已。久而陰血漸虛。中氣漸損。遂下赤矣。治宜養心爲主。兼以和肝緩中。涼血清氣。　赤帶久不止。則血虛。宜膠艾四物湯加便煅牡蠣粉、酸棗仁、麥冬。　標急而元氣不甚憊者。先救其標。標急而元氣衰劇者。則當本而標之。可也。

忌破氣降溫熱之藥。　宜補斂清熱。辛甘。苦寒。佐以淡滲。

生地　人參　白芍　阿膠、山茱萸　黃蘗　五味子　麥冬　白膠、枸杞子　續斷　杜仲　牛膝、白茯苓　車前子、澤瀉　蛇牀子　香附　補骨脂　牡蠣　艾　二朮

血枯經閉

由于脾胃薄弱。氣血不生。　忌破氣。破血

燥熱臟腑滑腸升發苦寒之藥。宜補脾胃甘溫甘平。人參　蓮肉　酸棗仁　白扁豆　甘草　茯苓　薯蕷　橘紅　白芍　縮砂蔤　兔絲子　牛膝　牡丹皮　白膠　阿膠　芡實　麥冬

經行先期爲血熱。忌甘補氣辛溫燥熱之藥。如香附當歸烏藥艾類。宜涼血清熱補肝腎兼降氣。及甘寒苦寒酸寒。生地　牡丹皮　白芍藥　天冬　麥冬　枸杞子　杜仲　青蒿　枇杷葉　蘇子　鼈甲　阿膠　黃蘗　黃芩　知母

經行後期爲血虛。忌行血破氣燥熱苦寒之藥。宜補肝腎甘溫酸溫。熟地　薯蕷　人參　兔絲子　山茱萸　杜仲　續斷　阿膠　艾　五味子　當歸　枸杞子　白膠　牛膝

月事過多屬心火盛。脾氣弱。忌破氣降辛溫苦寒之藥。宜涼血斂攝酸平甘寒。麥冬　生地（瀉泄禁用）　青蒿　生甘草　牡丹皮　白芍　酸棗仁　五味

崩中屬氣血兩虛有熱。忌破氣行血降溫熱辛燥苦寒之藥。宜補氣血兼清熱甘溫甘寒酸歛。人

參　黃耆　生地　熟地　地榆　芍藥　白膠
阿膠　香附　續斷　甘草　麥冬　山茱萸　杜
仲　五味子　白茅根　蒲黃（炒）　桑耳灰　側栢葉
艾葉　木耳灰

熱入血室類傷寒。或經事適來忽住。或屆期不行。忽發大熱口渴。或厥。但不頭疼。爲異于傷寒耳。　忌補氣溫燥辛燥收斂下泄。大熱升發之藥。　宜行血清熱甘寒鹹寒苦寒。　生地　牡丹皮　蒲黃　蘇木
牛膝　延胡索　麥冬　犀角　白芍　黃芩

荊芥穗　童溺　如便閉。加大黃。

種子（內分男女氣虛。血虛。精寒。血熱。火熾。精滑。因證選用。）　忌破氣。破血燥過用辛熱之藥。　宜調氣。補血。男子宜固精。
桑螵蛸（溫平。治男子精滑。）　栢實（甘溫。治男子精滑精寒。）　海狗腎（鹹熱。治男精寒。）
魚膠（平。治男子精滑。）　陽起石（熱。治男子精寒。）　覆盆子（甘溫。治男精滑。）　車前子（鹹寒。治男女火熾。）　鹿茸（溫鹹。治男精寒。）　蓮鬚（甘溫。治男精滑。）　巴戟天（溫。治男精寒。）
何首烏（苦溫。益男子氣血。）　牛膝（苦平。治男子血虛陰痿。）　補骨脂（辛溫。治男子精寒。陰弱。）
沙苑蒺藜（甘平。男子固精益虛。）　白膠（溫平。治男女氣血兩虛。精寒。）　肉蓯蓉（溫酸鹹。治男女血虛精寒。）　黃蘗（苦寒。治男女火熾。）　人參（微溫。治男女氣虛脾胃薄弱。）

ガラス使用

麥冬（甘寒。男女血熱。）五味子（酸溫。治男精滑精寒。）山茱萸（酸溫。治男女精滑精寒。）天冬（苦寒。治男女火熾。）蓮肉（甘平。治男女胃弱精寒。）熟地（甘寒。男女益虛生精。）白薇（溫平。女。）當歸（辛溫。女。）白芍（酸寒。女。）紫石英（溫。女。）艾葉（辛溫。女。）

妊娠惡阻　忌破氣升散。燥熱苦寒滑腸膩膈之藥　宜順氣甘寒酸寒。　蘇子　橘紅　枇杷葉　白茯苓　麥冬　蘆根　竹茹　木瓜　白芍　竹葉　人參　縮砂蔤　白梅　烏梅

安胎　忌破氣破血升散辛熱辛燥之藥。　八月以後及胎前滯下者。方可用枳殼。氣虛者不用。　三月以前。宜養脾胃。四月以後宜壯腰腎。補血益陰順氣。總宜清熱。　茯苓　麥冬　蓍蕢　人參　芍藥　白朮　橘紅　炙甘草　縮砂蔤　艾葉　杜仲　生地　益母草　白膠　烏膠　續斷　黃芩　枸杞子　青蒿子　桑寄生　鯉魚　烏雌鷄　葱白

胎漏　屬氣血虛有熱。　忌宜藥。俱同安胎條。

難産　忌破氣。破血。收斂之藥。　宜補氣血。滑利。潤。　人參　柞樹皮　魚膠　冬葵子　千里馬　白

芷稍　牛膝　桂心　當歸　芎藭　益母草　百草霜　石燕　弓弩　麻油　猪脂　酒　生雞子　兔頭　滑石　麝香　預防血暈。一腹痛坐草時。即用蘇木菊花心者一兩。生地黃一兩。降香末二錢。水三盌。煎一盌。加童便半盌。兒墮地。即飲之。永無惡血衝心之患。房中常打醋炭。萬一血暈。亦須此藥。更以家寶丹一丸灌下。神效。　凡婦人氣弱者。無氣力送子出產門。須服人參。此藥能兼治橫生倒産。世醫不知也。　凡臨產交骨不開。惟濃煑柞木枝湯飲之。則自開。其木枝幹直上。每一葉下。必發一刺。　胞衣不下。用乳香沒藥末。各七分五釐。麝香一分。芒硝一錢五分。研細。以酒調服立下。飲熱童便以滋藥力更妙。

產後諸病

忌破氣。升汗。吐。下。燥苦寒。大熱之藥。宜行血。次宜補血。清熱。總宜補養肝脾腎。辛溫甘寒酸寒。　蘇木　黑豆　鹿角末　紅花　乳香　沒藥　牛膝　炮薑　當歸（脾胃弱者勿用）　桃仁（胃弱禁用亦不可過）　桂（天寒無火之人可用）　益母草　澤蘭　乾地黃　續斷　白膠

杜仲　山茱萸　人參　青蒿　麥冬　白芍藥

五味子

產後少腹痛。按之痛甚。有結塊。名〔兒枕痛〕。忌酸斂補氣。破氣。升下汗燥之藥。宜行血活血散結兼健脾。延胡索　紅藍花　牡丹皮　蘇木　山查肉

益母草　蓬莪茂　蒲黃　白膠　當歸　黑豆

生地　澤蘭　牛膝　五靈脂　縮砂蔤　橘紅

童便　桃仁　乾薑　痛極。加乳沒各六七分。天寒加桂。暑月勿用。肺熱有火勿用。

產後少腹痛。按之即止者屬〔血虛〕。忌行血破氣汗吐下燥苦寒大熱之藥。宜補血補脾和肝。乾地黃　白芍　當歸　續斷　白膠　阿膠　牛膝

人參　酸棗仁　麥冬　炙甘草　大棗　薯蕷

橘皮

產後〔泄瀉〕。忌消導滑腸膩膈發散生冷破氣苦寒之藥。宜溫中補氣健脾開胃。人參　甘草　薯蕷　蓮肉　稨豆　茯苓　白芍　橘皮　車前子

肉豆蔻（內熱津液不足者少用。）藿香　五味子　補骨脂（內熱）

ガラス使用

（大熱者勿用）縮砂蔤

産後發熱或自汗盜汗。忌苦寒發散升提破氣破血。下辛燥大熱寒滑傷脾之藥。宜補血涼血補肝補心生津液兼斂攝實表。乾地黃　炙甘草　白芍　五味子　麥冬　酸棗仁　牡丹皮　童便　青蒿　鼈甲　澤蘭　黑豆　黃耆　人參

産後頭痛由于血虛。忌發散破血升提辛燥大熱之藥。宜益血涼血降。甘溫甘寒佐以酸寒。生地　甘菊　烏梅　麥冬　蘇子　童尿　甘草　當歸　白芍　黑豆　五味子　鼈甲

産後發渴由于血虛有熱。忌藥同産後發熱。宜藥同産後發熱加蔗漿倍麥冬五味子。

産後氣喘由于氣血兩虛。忌藥同産後發熱。宜補氣血潤肺下降之藥　人參　橘紅　生地　天門冬　麥冬　蘇子　枇杷葉　栝樓仁及根　童便　五味子　竹茹

産後惡寒由于氣血兩虛。忌藥同産後發熱。宜補氣血溫中甘溫佐以辛溫。人參　黃耆　炙甘

ガラス使用

草　乾地黃　龍眼肉　當歸　炮薑

產後（小便不利）或短赤。由于腎水真陰不足。忌利小便餘忌藥同產後發熱。宜生津液。益陰補血。凉血清熱。甘溫。甘寒。酸寒。天冬　麥冬　生地　枸杞子　山茱萸　白芍　車前子　牛膝　五味　青蒿子　鼈甲　竹葉

產後（大便閉結）。由于血枯內熱。忌補氣。行血。辛熱燥下。升。苦寒之藥。宜益血。凉血。潤燥。滋肝腎。生津液。生地　熟地　天冬　麥冬　五味子　蔗漿

牡丹皮　肉蓯蓉　當歸　麻仁　人乳　蜜

產後（不得眠）忌藥同產後大便閉結。宜補心降心火。補肝。補脾陰。兼清內熱。生地　麥冬　茯神　丹參　沙參　酸棗仁　白芍　竹葉　遠志　蓮肉　龍眼肉

產後（腹脹）。由于陰血虛。脾陰虛。忌破氣寬中。升提發散。消導。吐下。甘苦寒。鹹寒。大熱溫燥滯膩之藥。宜益脾陰。補脾和肝。酸寒收斂。甘溫。白芍　酸棗仁　人參　茯苓　石斛　橘皮　著蕷　五味子

木瓜　蓮實　車前子　芡實

產後（惡心）欲嘔或吐、由于胃虛。忌升提發散濕潤滯膩苦寒、生冷燥熱之藥。宜降氣、補氣、安胃、酸寒佐以辛溫。蘇子　枇杷葉　竹茹　人參　橘紅　麥冬　白芍　藿香　石斛　木瓜　白豆蔻　生薑　由于寒、倍生薑、白豆蔻、藿香。由于熱、倍竹茹。去生薑、白豆蔻、藿香。

（下乳汁）漏蘆　狗四足　猪四足　麥冬　人參　栝樓仁　土瓜根　葵子　猪胰　木通

小兒門

（痘瘡）血熱證。忌溫補燥熱之藥、如天靈蓋、雞冠血、桑蠹、鯪鯉甲、人齒、官桂、附子、丁香、木香、氷片之類。餘忌藥俱見前。宜凉血、活血、解毒、甘寒、苦寒。生地黃　犀角　人中黃　紫草　黃連　麥門冬（去心）　牡丹皮　白芍　童溺　連翹　金銀花　玄參　貝母　蟬蛻　鼠黏子

虛寒證。忌汗、吐、下、苦寒、酸寒之藥。宜辛甘發散、補氣、溫。痘密者佐以解毒。人參　紅鉛　黃耆

ガラス使用

甘草　桂枝　丁香　當歸（胃弱大便不閉者禁用。）　蓮肉　糯米　大棗　龍眼肉　乾葛　木香　忍冬藤

痧瘮此證多有嘔吐者。勿治嘔吐。但治痧毒。則嘔自止。况嘔中便有發散之義。　忌破氣。溫補。酸斂。辛溫濇膩之藥　宜清熱透肌。辛寒。甘寒。苦寒。　石膏　鼠黏子　赤檉木（即西河柳。）　知母　甘草　玄參　麥冬　連翹　薄荷　竹葉　黃連　黃芩　葛根　黃檗　蟬蛻　栝樓根　青黛　蔗漿　貝母　如冬月。佐之以辛散。　荊芥　麻黃（去節沬。蜜酒炒。只可用一兩。）一

痧瘮者。手太陰肺足陽明胃。二經之火熱發而爲病者也。小兒居多。大人亦時有之。殆時氣瘟疫之類歟。其證類多咳嗽。多嚏。眼中如淚。多泄瀉。多痰。多熱。多渴。多煩悶。甚則躁亂。咽痛。脣焦。神昏。是其候也。治法當以清凉發散爲主。藥用辛寒。甘寒。苦寒。以升發之。惟忌酸收。最宜辛散。誤施溫補。禍不旋踵。辛散。如荊芥西河柳乾葛石膏鼠黏子麻黃。清凉。如玄參竹葉栝樓根青黛薄荷。甘寒。如麥冬生甘草蔗漿。苦寒。如黃芩黃連貝母連翹。隨證輕重。制劑大小。中病則已。

母太過焉　痧疹乃肺胃邪熱所致。初發時必欬嗽。宜清熱透毒。不得止嗽。疹後咳嗽。但用貝母苦梗甘草薄荷栝樓根玄參麥冬。以清餘熱。消痰壅。則自愈。慎勿用五味子等收斂之劑。多喘。喘者。邪熱壅于肺故也。慎勿用定喘藥。惟應大劑竹葉石膏湯。加西河柳兩許。玄參薄荷各二錢。如冬天寒甚。痧毒鬱于內不得透出者。加蜜酒炒麻黃。一劑立止。凡熱勢甚者。卽用白虎湯加西河柳。忌用升麻。服之必喘。多泄瀉。慎勿止瀉。惟用黃連乾葛升麻甘草。則瀉自止。疹家不忌瀉。瀉則陽明之邪熱得解。是亦表裏分消之義也。疹後泄瀉。及便血。皆由熱邪內陷故也。大忌止澁。惟宜升散。仍用升麻甘草乾葛黃連白芍白藊豆。便膿血。則加滑石末。必自愈。

疹後牙疳最危。外用牡黃牛糞尖。煅存性。研極細。加眞片腦一分研勻。吹之。內用連翹乾葛荊芥穗升麻玄參黃連甘草生地黃。水煎。加生犀角汁二三十匙調服。緩則不可救藥。

痧後元氣不復脾胃薄弱者。宜用白芍藥炙甘草爲

ガラス使用

君。蓮肉山藥白藊豆麥冬青黛龍眼肉爲臣。多服必漸瘥。愼勿輕用參术。

痧後生瘡不已。餘熱未盡故也。宜用金銀花荆芥穗連翹玄參甘草懷生地鼈甲胡麻黃連木通。濃煎飲之良。痧疹不宜依證施治。惟當治本。本者手太陰足陽明二經之邪熱也。解其邪熱。則諸證自退矣。

嘔吐因傷乳食者。忌升苦寒之藥。宜溫中消導。
橘皮　縮砂蔤　枳實　厚朴　穀麥芽　草果
山查　紅麯　半夏　人參

因寒者。忌破氣升苦寒之藥。宜辛熱溫中。
藿香　橘皮　丁香　人參　白术　生薑　半夏
白豆蔻

因暑者。忌升破氣溫熱之藥。宜清暑補氣安胃兼利小便。
黃連　香薷　人參　木瓜　茯苓
竹茹　石斛　橘皮　甘草　白藊豆　麥冬　白梅
滑石　木通　澤瀉

有蟲者。忌升甘之藥。宜酸歛佐以苦寒。
白芍藥　五味子　木瓜　黃連　楝根　烏梅　檳榔

ガラス使用

榧子肉　木香　使君子　總之數嘔吐宜安胃久則宜補氣

泄瀉　總忌破氣下滑利滞膩之藥

因食者　宜和胃消食　橘皮　草果　紅麯　穀麥芽　白豆蔻　白朮　山查　白茯苓　肉豆蔻　縮砂蔤

因溼者　宜燥脾利水　二朮　橘皮　木瓜　茯苓　澤瀉　車前子　石斛　黄連　薯蕷　猪苓　升麻　葛根

因暑者　前藥中加人參　蓮肉　白藊豆　總之當補脾胃兼升兼利小便

急驚　忌補斂升燥熱之藥　宜降清熱鎮墜豁痰和肝　丹砂　琥珀　牛黄　天竹黄　貝母　竹瀝　釣鉤藤　僵蠶　茯神　犀角　金箔　膽星　真珠　全蝎　龍腦　麝香　白檀香

慢驚　多因久吐瀉大病後陰陽兩虚而成　忌破氣下升苦寒及治急驚之藥　宜補脾健胃和肝益氣甘温酸平佐以辛熱　人參　黄耆　茯苓　白芍

ガラス使用

甘草　龍眼肉　酸棗仁　石菖蒲　遠志　麥冬　茯神　冬瓜仁　橘紅

【疳積】忌破氣酸斂燥熱之藥。宜除疳熱兼消導苦寒、甘寒、佐以辛寒辛溫。胡黃連　川黃連　肉豆蔻　穀麥芽　神麴　山查　木香　橘皮　白蕪荑　使君子　蘆薈　白朮、白芙蓉花　五穀蟲　雷丸　青黛　厚朴

【諸蟲】忌升、甘之藥。宜殺蟲、酸寒苦寒、佐以辛寒。梹榔　雷丸　使君子　苦楝根　錫灰　鶴虱　蘆薈　芍藥　烏梅　黃連　黃芩　牽牛

【胎毒】忌補斂燥熱辛溫之藥、宜涼血清熱解毒。兼發散于外。勿從外治以致熱毒內攻、生地　玄參　牡丹皮　黃蘗　黃連　忍冬藤　甘草　連翹　麥冬　貝母　犀角　荊芥　鼠黏子　牛黃

外科

【癘風】忌破氣酸斂燥熱辛、之藥。宜涼血殺蟲祛風苦寒、佐以辛寒辛平。豨薟　天冬　甘菊花　生地　青黛　漆葉　苦參　何首烏　鼈虱胡麻

仁　白芷　荆芥　天麻　續斷　羌活　獨活

半枝蓮　白花蛇　烏梢蛇　皂角刺

癰疽　先發後渴。忌升破氣辛溫燥熱吐下之藥。宜活血凉血解毒散結。　生地　連翹　忍冬藤　白芷　白及　白歛　茜草　紫花地丁　夏枯草　甘菊花　地楡　貝母　鼠黏子　黃蘗　栝樓根　乳香　沒藥　芍藥　生菉豆　半枝蓮　白藥子　紅藥子　黃蠟　明礬　已潰者加人參　黃耆　麥冬　五味子

腫瘍　忌宜藥。俱同癰疽先發後渴。更忌當歸。

癰疽毒氣攻心發譫語。宜以生綠豆粉丹砂乳香爲丸服之

潰瘍　忌閉氣苦寒破氣。又忌燥之藥。宜補氣血甘酸溫。佐以解毒。　人參　紅鉛　胎骨　黃耆　當歸　地黃　芍藥　甘草　白及　白歛　忍冬藤　甘菊花　貝母　薯蕷　大棗　五味子　麥門冬

散毒　外傳　雄黃　雌黃　粉錫　礬石　龍腦香

ガラス使用

松脂　地榆　水銀粉　鐵銹　白及　白歛　漏
蘆　檗木　青葙子　楝實　䕡茹　石灰　鐵漿
苦參　菖蒲　槲皮　葵根　柳華　五加皮
馬鞭草　梓葉　苧根　紫草　艾（灸）

【止痛排膿】外傳　白及　白歛　大黃　乳香　沒藥
丹砂　紅藥子　龍腦　金華　白藥子　麥飯
石　米醋　瓷

【去瘀肉】外傳　巴豆霜　輕粉　粉霜　烏梅肉灰

【蝕膿】外傳　蛀竹屑　䕡茹　雄黃　白芷　大黃
巴豆　地榆　枯礬

【長肉收口】外傳　仙人杖（燒灰）　人參　金華　白蠟　黃
蠟　血竭　蛀竹屑　枯礬（末）　黃芩（末）　珠（末）　象牙（末）
鉛丹　紅粉霜　胡粉　芝麻油　猪蹄湯

【疔瘡】忌補斂溫執之藥・宜凉血活血解毒祛風
汗下　生甘草　礔飑雷　茜草　生地　貝母
紫花地丁　白藥子　大黃　金銀花　蒼耳草
連翹　夏枯草　鼠黏子　礬石（已上內）　半枝蓮　牛
黃　蟾酥　紅藥子　白及　白歛（已上內外）　龍腦　鐵

ガラス使用

鏽　桼函　銅青　雄黃（已上外）

【瘰癧（馬刀瘡附）】同屬少陽膽經。治法亦同。忌補氣辛熱酸斂之藥。宜清熱散結。和肝涼膽。苦寒甘寒鹹寒佐以辛寒。連翹　玄參　忍冬藤　紫背天葵　乳香　麝香　夏枯草　鼠黏子　貝母　天明精　沒藥　薄荷　肥皂莢　皂角子　何首烏　柴胡　黃芩　甘草　昆布　牡蠣　鼈甲　栝樓根　惡實　漏蘆　守宮　（煆）猫頭　天荷葉　耿山紅　海藻　海蛤　蘇合油　雄黃　礬石　斑猫　蟾酥　鼈虱胡麻　岡燕窩泥

【瘿瘤】忌宜藥。俱同瘰癧。兼宜　薜荔　半夏　文蛤　南星　通草　生薑

【痔（內外二症）】忌破氣降燥熱辛溫之藥。宜涼血活血除大腸熱兼升。去血過多者宜補血。甘寒苦寒酸寒佐以辛寒。生地　五倍子　黃連　黃芩　白芍　地榆　蝟皮　大小薊　黃蘗　側柏葉　槐實　皂莢灰　熊膽　升麻　鼈甲　紅藍花　龍腦香　茜草　黃耆　赤石脂　豬懸蹄　蛇蛻

榧實　白礬　金銀花　青黛　象牙（末）　蛀竹屑

牛角䚡　白蠟

通腸漏　忌破氣下發散溫燥辛熱之藥。宜涼血清利濕熱解毒消漏管補氣血長肉。槐實　黃連黃芩　青黛　地榆　白芨　忍冬藤　半枝蓮生地（已上涼血解毒）猪懸蹄　黃牛角䚡　刺蝟皮　蛀竹屑　明礬　金頭蜈蚣（已上消漏管）黃耆　熟地黃當歸　人參　白芍　五味子　牛膝　山藥　枯礬　黃蠟　白蠟　麻皮灰　鉛華　月經布　没食子（已上補氣血長肉。）天明精　地骨皮（俱要鮮者。）皮硝　文蛤（並煎濃湯。熏洗。）

乳岩乳癰內外吹　忌補氣。升溫補辛熱燥酸斂之藥。宜散結氣和肝涼血活血。清熱解毒。貝母橘葉　連翹　栝樓根　山慈姑　山豆根　蒲公英　紫花地丁　黃連　甘草　柴胡　白芷　青皮　橘皮　牡鼠糞　王不留行　乳香　没藥漏蘆　夏枯草　忍冬藤　栝樓仁　頭垢　人爪鯪鯉甲　半枝蓮　茜根

【陰蝕】（即下部䘌瘡）忌藥同乳巖。宜凉血活血除熱散毒苦寒辛寒。青黛　茜草　苦參　鮮地骨皮　黃蘗　小薊　艾葉　馬鞭草　木瓜　牛膝　木通（以上內）金蝎　蛇牀子　橄欖核　蛀竹屑　猪脊髓　青葙子　膩粉　官粉　杏仁　珠末　皂角末　鉛丹　象牙末　龍腦香　白殭蠶　粉霜　煙膏　天靈蓋　滴乳石　白蠟（以上外）

【金瘡】忌破氣閉氣升散酸斂苦寒冷利燥酸寒之藥。宜止血和血凉血甘溫甘寒。佐以辛溫　地黃　䗪蟲　當歸　續斷　牛膝　甘草　麥冬　地榆　半夏　茜草　白膠　杜仲　川芎　乳香　沒藥　艾葉　水楊花　釣樟根　黃荊子（炒黑）主不留行　古錢　自然銅　狗頭骨　黃麻皮灰　蘆竹籜　韭　大小薊　劉寄奴　花蕊石　騏驎竭（內外）古石灰　白蠟　降香　海螵蛸　桑柴灰　人骨灰　紫檀末　三七（外）

【破傷風】、忌藥同金瘡。佐以祛風藥。如白芷荊芥防風柴胡之屬。

跌撲傷損　忌藥同金瘡。宜藥同金瘡。有瘀血停滯者。宜加行血藥。如桃仁紅花蘇木自然銅䗪蟲千年灰古文錢之屬。

踒折挫閃　忌宜藥俱同金瘡跌撲。

火灼　忌爆熱及寒物塗罨。如井泥氷凉水芭蕉根。醋等類。宜拔散火毒。辛散潤。甘寒。辛寒。苦寒。柴胡　葛根　甘草　升麻　黃連　麥冬　連翹　栝樓根　石膏　黃蘗　雞子油　柏白皮　生胡麻　食鹽　豆醬　黃芩　地榆　山梔　外用好酒滿浸傷處。溫即易之。如遍體被傷。用酒滿浸。時許易之。即不死。一方用蜜水潤之。一方。石灰水和生芝麻油敷治。已爛臭甚者。神驗。一方。用糯米炒黑為末。將萊汁調敷。神效。

漆瘡　宜藥川　蟹　茱萸皮　鷄子白　杉材　石蟹　漆姑草　韭萊（炒熱罨上）井中苔萍

右本經疏補入

本草滙卷四終

特 7
10
494