27393

察證辨治啓迪集卷之七目録　道三編

○婦人門

一婦情鬱結

○月經和違篇

一月信本源　一經候先後之説　一經候閉而不行因治
一經閉不通心血虧耗　一崩漏不止心火元甚　一經要諸証悉隨氣化　一紫黑色爲熱之説
一經候脉法　一調經方法

○帶下篇

一赤白帶下氣虚弁治　一帶下五色　一提氣燥濕之説
一肥瘦弁治　一帶下脉弁　一例難治之説

一帶下禁事　一帶下方法
○崩漏篇
一經漏不止因治一崩漏因証　一崩血脉法
一崩漏治法
○婦人雜証篇
一師尼寡婦　一血瘕証治　一筋痿因治
一婦人腰痛　一婦人中風輕重弁察　一角弓反張
一血分弁治　一夢與鬼交　一熱入血室
一白淫濁液　一陰腫因治　一陰痒因治
一陰瘡治方

○求嗣篇
一戒服熱求子之誤　一求嗣肥瘦弁劑　一求嗣交合例法
○胎前篇
一有胎諸察　一諸經養育　一胎產三禁
一妊婦攝養　一妊婦雜病因治九例　胎動
胎漏　心腹痛
浮腫　子淋
腰痛　子懸
胎兒哭　欬嗽　不語
墮胎因治　傷寒　一惡阻証治
一妊胎不長養　一斷產

一胎死因治　一妊娠禁忌　一臨產須知
一催生藥弁　一產難源論　一易產方法
一礙產証治　一盤腸產証治　一產難胎死方法
一難產惡証　一新產診切　一胞衣未下論法
○產後篇
一毋子呼吸同異　一新產三証　一產後血暈証治
一惡露不盡腹痛証治　一兒枕心腹刺痛証治　一餘血奔心煩悶証治
一產後內煩治方　一乍寒乍熱附癆　一產後蓐勞証治
一虛羸証治　一四肢浮腫証治　一產後乳汁弁治
一乳癰論治　一中風噤角弓反張　一欬嗽治方
一喘急弁治　一口鼻黑色及衄血証因　一吃逆証治
一產後雜証治方　補虛
惡血腹痛　血虛內熱自汗頭痛　虛汗不止
陰虛發熱朝明暮發　腰痛　惡露不止
惡露不下呕吐　脇脹氣痛　積癥
血虛煩渴不止　腹滿嘔吐　痢疾脚下痛
小便不通　尿數遺尿　小便不禁
陰脫腫痛　子腸不收
○整容篇
一熱毒面瘡　一粉刺　一面上黑風瘡

一染髮　一梳髮令不落　一面藥

一太真紅玉膏　一孫仙少女膏

卷之七目錄畢

察證辨治啓迪集卷之七　日本洛下雖知苦齋　道三編

○婦人門

○婦情鬱結

婦夫婦人嗜慾多於丈夫況又思悲愛憎嫉妬憂恚抑鬱不能自釋深固所以比之男子十倍難療由是婦人別立方能推其所由而調之可謂盡善盡美矣

傳大抵男子屬陽得氣易散女人屬陰遇氣多鬱故男子之氣病常少而多

○月經和違篇

○月信本源

林 岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下（天謂天真之氣降癸謂壬癸北方之水）也衝爲血海任主胞胎腎氣全盛二脉流通經血漸盈應時而下謂之月事者平和之氣常以三旬一見以像月盈則虧也

○月盈則虧

惠 女人經候謂之月信善於調理則應時而行疾病不生一有所乖則怫抑而逆諸病生焉

○經候先後之說

選 血性得熱則宜流得寒則凝滯陰氣陽氣乘於陰血熱流散故其來乍少陽氣陰血寒血滯故其來乍多

心 婦人經水過期血少不及期血熱也

○經閉不行諸曰並治法

選 經脉不行其候有三一則血氣盛實經絡遏閉其脉滑實法當通經疎利也

一則形体憔悴經絡涸竭其脉虛弱法當滋養血氣也

一則（風冷外傷七情內賊）以致經絡痺滯其脉浮濇法

當散風冷逐瘀血生新血也

㊄經曰陽之病發心脾不得隱曲女子不月其傳爲風消爲息賁者死

東垣曰婦人脾胃久虛或羸氣血俱衰而致經水斷絶不行

或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脉津液所化津液既絶爲熱所爍肌肉消瘦時見渴燥血海枯竭病名曰血枯經絶宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣

或心胞脉洪數大便秘澁小便雖清不利而經水閉絶不行此乃血海乾枯宜調潤血脉除胞中火而經自行矣

或曰勞心心火上行月事不來宜安心補血經自浮火

㊂

經閉不行（脾胃之損經血之凝）

婦人經脉不行多有脾胃損傷而致者不可便認作經閉血死輕用通經破血之藥

若曰飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻尅藥傷其中氣以致血少而不行者只宜補養脾胃脾旺則能生血而經自行

矣○又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾

若脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經

○經閉不通心血虧耗崩漏不止心火亢甚 傳

若夫經閉不通先因心事不足心血虧耗故乏血以歸肝經曰母能令子虛是以脾不磨而食亦少因食少故肺亦失養而氣滯不行則無以滋腎陰況月經全藉腎水施化腎水既乏則經血日以乾涸以致或前或後淋瀝無時○若不早治漸閉塞不通甚則爲癥瘕血臟勞極之証不易治也

又如崩漏不止先因心火亢甚於是血脉泛溢以致肝實而不納血經曰子能令母實是以肝腎之相火挾心火之勢亦從而相扇所以月水錯經妄行無時而泛溢也○若不早治漸崩中不止甚則爲白濁白淫血枯發熱勞極之証不可治矣

經曰正氣奪則虛邪氣盛則實所謂心血虧耗者正氣奪也心火亢甚者邪氣盛也邪氣者相火也

丹溪曰天非此火不能生物人非此火不能有生但貴乎適中

故或問曰可少而不可壯云云

大抵經閉不行經漏不止其初皆由心事不足早不調治直至危篤求醫雖妙手莫能爲矣

○經變諸証悉隨氣化
經水者陰血也陰必從陽故其色紅熹火色也

血爲氣之配氣



故名之曰經

上應於月其行有常

血因氣而行



也

今人但見紫色黑色作痛成塊者率爲風冷乘之行温熱之劑禍不旋踵矣



○以紫黑色爲熱之說

或曰黑者北方水之色紫者黑之漸也非冷而何

丹溪曰經云亢則害兼乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也○況婦人性執而鄙嗜欲加倍藏府陰陽之火無日不起非熱而何○且寒則凝既行而紫黑故非寒也

○經候脉法

〔玉〕尺脉滑血氣實婦人經脉不利○少陰脉弱而微微則少血○寸脉浮而弱（浮則爲虛 弱則無血）○肝脉沉主月水不利腰腹痛

〔傳〕少陰脉微而遲（微則無精 遲則陰中寒濇則血不來）此爲虛經三月一來○趺陽脉微而濇（微則胃氣虛 濇則短氣咽燥而呂苦）胃氣濇則失液○凡脉微血氣俱虛年少者亡血也三月一來○趺陽脉伏水穀不化（脾氣衰則鶩溏 胃氣衰則身体腫）

○調經方法

〔心〕經水過期血少也芎歸參朮及痰藥○經水不及期血熱也四物黃連○過期紫黑有塊亦血熱也必作痛四物加香附黃連○色淡過期痰多二陳加芎歸○過期而來血虛四物加芪橘升○未及期先來氣血俱熱柴芩歸芍生地香附○過期而作痛乃虛中有熱○將來作疼者血實也桃仁香附黃連○臨行時腰疼腹痛乃鬱滯有瘀血四物加桃紅莪玄胡香附發熱加芩柴○肥人飲食過度經水不調乃是濕痰宜半朮芩滑香附芎歸四物湯治衝任虛損月水不調臍腹疼痛

當歸　川芎　芍藥　熟地黃（各等分）

右剉散水煎服加減法于後

經候過多去熟地加生地芩朮○經行身熱脉數頭昏加柴胡○氣充經脉故月事頻併臍下痛倍芍藥○經水澁少加葵花紅花○經水適來適斷往來寒熱（先小柴胡後四物湯）○經候過而作痛血氣俱虛對加四君子湯服之

選 若婦人常服
- 春脉弦頭痛倍芎
- 夏脉洪飧泄倍芍
- 秋脉濇血虛倍地
- 冬脉沉寒而不食倍歸

傳 虛中有熱月事不來四物加芩

肥人軀脂滿經閉者導痰湯如芎歸連不可服地黃泥痰故也如用薑炒

夫經不通或曰
- 墮胎及多產傷血
- 久患潮熱銷血
- 久盜汗出耗血
- 脾胃不和飲食少進而不生血
- 久痢失血
- 七情傷心氣停結故血閉不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

治宜生血補血除熱調胃之劑隨証用之

調經散治經水或
- 前
- 後
- 多
- 少

或
- 踰月不至
- 一月兩來

皆可服

當歸一兩半　麥門冬二兩　吳茱萸（去閉目者沸湯泡七次焙乾半兩）

人參一兩　半夏湯泡七次一兩　白芍藥一兩　川芎一兩

牡丹皮一兩　桂枝半兩　阿膠炒珠　甘草各七分半

右㕮咀入生薑水煎空心溫服

和經湯治月經過期不行

當歸一錢　熟地黃一錢　芍藥一錢　桃仁二十个去皮研

紅花三分　香附子一錢　桂半錢　莪茂一錢

甘草五分　藁木一錢　木通八分

右剉散水煎空心溫服

安經湯治月經先期而來

當歸一錢　川芎半錢　生地黃一錢　芍藥八分

阿膠炒珠半錢　艾葉半錢　條芩一錢　甘草半錢

香附子一錢　黃栢半錢　知母半錢　黃連姜炒八分

右剉散水煎空心服之

獨聖丸治月經不通

馬鞭草燒存性爲丸紅花常歸煎湯送下

四物湯加荊芥條芩止血神效

婦人血病宜用常歸若肥白人與參芪同用瘦人與生地香附同用

經候不調以四物爲主治

如經候過而腹痛綿々無休血虛本方倍歸地兼

氣虛加參芪挾寒加干薑

如經候將來腹中陣疼作作止血氣實也本方

用生地黃加桃紅牡連香附玄胡

如經水常過期而來者

瘦人血少本方倍歸地加芪甘少佐以桃紅爲生血引用也

肥人氣虛挾痰阻升降本方去地加參芪甘苓半橘香附

如過期血淡者痰多血少本方用生地合二陳

如經候適來適斷往來寒熱如瘧本方合小柴胡或先服小柴後服四物

或肥盛三二月一行者痰盛而閉經脉導痰湯加二朮歸芎香附

經水過多本方加芩朮

經水澁少本方加葵花紅花

○帶下篇

○赤白帶下氣血辨治

傳 帶下是濕熱 白屬氣 赤屬血 二陳加蒼朮治濕爲主 氣虛入參朮 血虛入芎歸

葵花 白者治白帶 赤者治赤帶 用之早驗

玉 熱入 小腸爲赤帶 大腸爲白帶

其本實熱寃結于脉不散故爲赤白帶也熱去濕除病自愈也

○帶下五色

林 風邪中經脉流轉藏府而發下血名爲帶下

若傷
- 足厥陰肝經其色青如泥
- 手少陰心經其色赤如紅津
- 手太陰肺經其色白如涕
- 足太陰脾經其色黃如爛瓜
- 足少陰腎經其色黑如衃血

○提氣燥濕之說

傳 帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之無人知之二陳加二朮升柴

甚者上用吐法提其氣下用二陳加二朮仍用瓦壟子以燥濕痰

○肥瘦辨治 傳 心

肥人帶下多是濕痰用海石南星黃栢朮芎香附樗皮冬加干薑

傳婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治

瘦人少有此病有者是熱以黃栢滑石樗皮海石芎黛丸服

○帶下脉辨

玉 漏血下赤白脉
- 遲者小虛滑者生
- 急疾者大緊實數者死

尺脉急而弦大風邪入少陰之經女子漏白下赤

○一例難治之說 集

前人或
- 下之而復吐以提其氣
- 發中兼補
- 燥中兼升發
- 補中兼利
- 潤中益氣
- 溫而兼收澁

之例不同

蓋病梳有輕重淺深之異耳

○帶下禁事 傳

帶下必須斷厚味凡用藥寒月少加薑附臨機應變

○帶下方法

傳 東垣除濕湯治漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆因飲食不節勞倦所傷或素心氣不足心火乘脾必怠惰嗜卧困倦氣短脾主滋栄周身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不調也況脾胃爲血氣陰陽之根蔕也當除濕去熱

玉當歸煎丸治赤白帶下胸疼不食羸瘦 歸 赤芍炒 蛎煅 熟地膠炒 白芍炒 續斷 酒浸各一兩 地榆炒 右爲末 醋糊丸空心米飲下按此治血虛潤燥芽也

抑風清氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

當歸 酒洗 獨活 各半分 蔓荊 七分 防風 炙甘草

升麻 藁本 各一分 柴胡 羌活 黃耆

蒼朮 各一分半

右剉作一服水煎空心溫服少時以早飯壓之可一服而已止後服參芪甘歸之類以補之若遇夏月白帶脫漏不止此湯一服立止

補經固真湯治白帶下流不止其心胞尺脉微細蓋始血崩久則血少復亡其陽故白滑物下流不止所謂日久爲白帶也乃血海枯竭津液復

亡不能滋養筋骨

以
- 本部行經藥爲引用
- 大辛甘油膩之藥潤其枯而流津液
- 大辛熱之藥補其陽道生其血脉
- 苦寒之藥泄其肺火而救上熱
- 人參調補傷氣
- 微苦温之藥爲佐而益元氣

白葵花 研爛四分 陳皮 五分留白 生黃芩 郁李仁 去皮尖研

炙甘草 柴胡 各一錢 干薑 人參 各一錢

右剉水煎空心熱服少時以早飯壓之

心 血虛者加減四物湯

氣虛者參朮陳皮間與之

濕勝者固腸丸

相火動者諸藥中少加黃栢

滑者加龍骨赤石脂

滯者加葵花

性躁者加黃連

傳 一人 上有頭風鼻涕 下有湿爵白帶 酒芩川芎辛夷 炒黃栢滑石牡蛎 南星蒼朮半夏

右爲丸服之

○崩漏篇

○經漏不止之諸因并治法

玉 經曰陰虛陽搏謂之崩

東垣曰婦人脾胃虛損命門脉或 沉細而數疾 沉弦洪大有力 寸關脉亦

然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下

迫經漏不止其色紫黑加夏月腐肉之臭中

有 白帶 赤帶 者脉必 弦細寒作於中 洪數湿熱明矣

必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來兩脇急縮兼脾胃証出見四肢困熱心煩不得眠卧下急宜大補脾胃而升擧血氣可一服而愈或故貴今脫勢人事疎少先富後貧心氣不足其火大熾旺於血脉之中又致脾胃飲食失節火乘於其中形質肌肉容顏似不病者此心病者

○治法當先說惡死之言勸喻令拒死而心不動

或適下適斷暴下不止以大補氣血之藥擧養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣

○崩漏曰証

心崩中者由臟腑傷損衝任二脉血氣俱虛二陰爲經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若氣血調適經行依時若勞動過極臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中崩下治宜大補氣血之藥擧養脾胃微加鎮心藥治心陽陰抑陽崩漏自止也

憲崩漏帶下　丹溪曰有虛有熱（熱則流通虛則下溜）

○崩血脉法

玉漏下赤白日下血數斗脉（急疾者死遲者生）尺寸脉虛者漏血々脉浮不可治也

林 熱傷衝任血流散者至於昏悶其脉（數疾小爲順大甚者逆）

○崩漏治法

傳 治血崩不止蒼耳草燒存性好酒調服立止或四物湯調下亦効

老婦年五十三血崩久不止諸藥不効予以橡斗蒼耳根二物燒存性四物加白芷于薑茅花煎湯調服其經血自此而止再不行矣

心 急則治其標用白芷湯調百草霜末

纂 甚者用棕毛灰後用四物加干姜調理

惠 緩則四物加芩連參芪香附子干姜又云四物加荊芥止血妙或加髮灰

心 曰勞者用參耆帶補陰

曰（寒者用干姜　熱者用黃芩）

崩過多者先用五灵脂末一服當分寒熱

蓋五灵脂（能行　能止）

紫色成塊熱四物加黃連

氣血虛四物加參芪

崩中白帶用椒目末又用白芷末粥丸服

林 歌曰

婦人血崩每淋瀝　椒目蓮房燒研之

藕節亦堪乾作末　二方連服効無疑

玉 涼血地黃湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也

生地黃　黃連　羌活　柴胡　薑本

細辛　川芎各二分　甘草　荊芥　蔓荊子

黃芩各一分　當歸半錢　紅花少許

右㕮咀水煎按升劑也經漏不止氣血下陷非此不能治

傳 益母丸治婦人惡露時下不止赤白帶下亦可用

益母草五月採陰乾磨爲細末忌鐵煉蜜爲丸童便加酒化下或只以末每服二錢或酒或童便調下凡婦人之仙藥也

柴胡調經湯治經水不止其色鮮紅項筋急腦痛脊骨強痛

炙甘草　當歸身　葛根各三分　獨活　薑本

升麻各半錢　柴胡七分　羌活　蒼朮各一錢　紅花少許

右細切水二盞煎一盞空心溫服取微汗立止

○婦人雜証篇

○師尼寡婦 玉

師尼寡婦獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則爲勞史記曰韓女

林易曰天地絪縕万物化醇男女媾精万物化生寡居師尼孤陰独陽可乎若此偏者久々經閉為白淫痰逆頭風膈氣痞悶瘠黙之病其脉独肝脉弦出寸口而上魚際

病腰痛寒熱衆醫多以為寒熱倉公曰病得之欲丈夫不可得何以知其肝脉弦出寸口是以知之

蓋
- 男子以精為主男子精盛以思室
- 女子以血為主女人血盛以懷胎

今厥陰脉弦出寸口又上魚際則陰盛可知

○血瘕証治

惠 婦

婦人血瘕為病多因
- 産蓐失於保養
- 經候失於調適
- 七情内傷
- 六欲外縱

遂致氣凝血滯而成瘕

經曰小腸熱已滿移熱于大腸則為伏瘕結硬如塊小腹重疼支滿胷脇腰背相引四肢疼痛飲食不進月事或前或後恍惚多夢陰中生氣腫小便淋痛面色黄黒則不得妊宜用通經和血之劑

桃仁煎治血瘕血積經候不通

桃仁去皮尖炒　大黄　朴硝各一兩別研　䗪虫五錢去翅足炒

右為末先用米醋二升半熬一升半下大黄等攪稍冷下朴硝攪候凝丸如梧子大五更初温酒下五六丸下如赤豆汁或如雞肝未下再服鮮紅來則止服調血氣藥補養之

傳 增味四物湯治婦人血積血瘕

當歸　川芎　白芍藥　熟地黄　三稜
干漆炒烟尽別研　肉桂　廣茂各等分
右細切每服五錢水煎去粗空心温服

○筋痿因治

全 婦人思想無窮所願不得意淫於外不能入房甚發爲筋痿爲白淫男溺溲而下女陰中綿々而下粗工爲白帶多用辛熱病微者誤中有之蓋辛熱能開鬱結散氣流濕故取効或病甚者鬱結不能開通旧病轉加熱証新起以致死

開結
除濕

凡主辛劑佐苦寒

去熱
散氣

玉 或思慕爲筋痿

○婦人腰痛

婦 腎主腰婦人腎繫胞若腎虚（外感六氣内傷七情）皆致腰痛

風腰痛小續命湯加桃仁杜仲

脾胃氣蔽及寒濕腰痛五積散加桃仁

氣滯腰痛牽牛茴香橘核必有功

如神湯治男女腰痛真是如神故名之

延胡索　當歸　桂心

右等分爲細末酒下一方（無當歸有杜仲）

一方治腰脚疼痛

萆薢　牛膝　當歸　桂心

檳榔　芍藥　川芎　枳殼

右各等分細剉水煎食前熱服

○婦人中風輕重辨察　婦

風是四時八方之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之風從其鄉來者長養万物若不從其鄉來者名爲虛邪賊害万物其体虛則風入藏府俞俞皆在背隨所中之俞而乃發病婦人血氣虛損故中風當察口眼開闔以別輕重

如眼　開　閉　口　閉手足不開涎不作聲者可治

開聲如鼾睡遺尿者死

○角弓反張　婦

婦人角弓反張者体虛受風々入諸陽經腰背反折攣急如弓宜小續命湯

○血分辨治

惠　婦人經滯化爲水流走四肢悉皆腫滿名曰血分証與水腫相似醫不能審輙作水腫治之誤也

一方　人參　當歸　瞿麥　赤芍藥

大黃煨　白茯苓　桂心各五分　葶藶紙炒三分半

右細剉水煎温服

傳 婦人 ─ 經血先断後病水 ─ 先病水後經血断 ─ 名曰 ─ 血分難 ─ 水分易 ─ 治

○夢與鬼交 婦

夫人禀五行秀氣而生陰陽和則藏府盛邪氣不能傷之攝理失節血氣衰邪氣干其正得爲病其狀不欲見人如有對誤時獨言笑時悲泣是也脉息遲伏顔色不變可與蘓合香圓

一方

石菖 茯神一兩半 赤豆各半兩 茯苓 人參

右細剉水煎温服

○熱入血室 婦

婦人傷寒發熱經水適來晝則明了暮則譫妄如見鬼此爲熱入血室

加味柴胡湯

柴胡八分 黄芩 人參 生干地黄

甘草各三分 半夏二分

右細剉水煎温服

○白淫濁液 惠

濕熱屈滞於小腹氣血虚耗精氣累滞濁液下流

經曰思想無窮所願不得意遙於外白物遙積如精之狀不可爲白帶治宜開結除濕去熱散氣此謂白遙如米漿然至於湛濁頻下白水或黃水如葵汁

○陰腫因治 婦

胞絡虛風客之風氣乘於陰與血氣相搏氣痞理閉不泄越故腫也

菖蒲散治婦人月水澁陰腫痛

菖蒲 當歸 各一兩 秦艽 二分 吳茱萸 半兩 炒

右剉散入蒸白水煎空心温服

一方治陰腫痛不可忍

艾葉 五兩 防風 三兩 大戟 二兩

右細剉水煎熱洗日二宜避風冷

○陰痒因治 婦

婦人陰痒者是虫蝕所爲三虫在腸胃間因臟虛三虫動作蝕陰內熱則痒重者乃痛

一方蒜煮湯洗之

一方以蛇床子白礬煎水洗之

一方陰痒不可忍杏仁燒作灰乘熱綿裹內陰中

月二易之

○陰瘡治方 婦

一方治陰中生瘡

杏仁 焙　雄黄　礬石 各一分　麝 少許

右四種研細付陰中

全 陰中生瘡硫黄研抹付之

一方搗新桃葉綿裹内陰中日三易之

○未嗣篇

○戒服熱未子之誤

玉 丹溪曰無子之因多起於父氣之不足豈可獨歸罪於母血之虚寒乎況母之血病奚止虚與寒而已哉然古方治婦人無子執用熱劑率皆服之夫求子於陰血何至輕用熱劑耶

或曰（春氣温和則物生冬氣寒凛則物消）不假熱劑何由子臓得暖而成胎予曰詩言婦人和平則樂有子（和則氣血不爭平則陰陽不乖）今得熱劑經血不轉紫黒漸成衰少或先或後始則飲食驟進久則口苦舌乾陰陽不平氣血不和焉

能成胎縱使有成子亦多病以其能損真陰也

纂 無子由血少不攝精俗爲虛冷用熱藥煎臟腑血氣沸騰禍不旋踵或皆服艾不知艾性至熱

熟艾
- 入火灸則下行
- 入藥服則上行
- 多服則必致毒

傳 夫人欲求嗣必先視其婦人之經脉調否如未調必以藥調之

○求嗣肥瘦辨劑

纂 肥女軀脂滿溢閉塞子宮不得孕宜行濕燥痰

南星半夏川芎防風羌活 或有术無風活

瘦婦子宮乾澁不能受胎宜滋陰養血四物加香附子黃芩

○求嗣交合例法

婦 男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰陽完實然後交合則孕々而育々而爲子堅壯強壽○若未笄女天癸始至已近男色陰氣早洩未完而傷未實而動是以交而不孕々而不育々而子脆不壽

傳 月經方絶金水纔生此時子宮正開乃受精結胎之候妙合太和之時也過此佳期則子宮閉而不

受胎也

傳曰不孝有三無後爲大

古詩曰無官一身輕有子万事足

者宜深思之無忽

誠哉是言也無嗣

○胎前篇

○有胎諸察

經 少陰脉動甚者妊子也 手少陰心主血是少陰腎主精 血精交而成孕

傳 經曰陰搏陽別謂之有子 謂陰脉搏手其中別有陽脉也 是爲血氣和平陽弛而陰化也蓋人之夫婦猶天地然天地之道陰陽和而万物育夫婦之道陰陽和而男女生故欲求嗣者先調婦人經脉經脉既調則氣血和平氣血和平則百病不生而樂乎有子矣

脉經曰手少陰脉動甚者妊子也腎爲胞門子戸尺中腎脉按之不絶當妊子也

又曰妊娠四月脉左疾爲男右疾爲女

又曰妊娠左手沉實爲男右手浮大爲女

又曰妊娠左尺偏大爲男右尺偏大爲女

又曰妊娠六七月脉實大牢強弦緊者生沉細者死

又曰看上圊時夫從後呼左圊首是男右圊首是女也

惠

太陰洪而女孕太陰者肺部陽大而男娠太陽者膀胱脉也

婦

羸母生女必瘦補羸母則養血壯脾

衰父生男必弱補衰父則壯脾節色

○諸經養育

脉經曰婦人妊娠

一月足厥陰
二月足少陽
三月手厥陰
四月手少陽
五月足大陰
六月足陽明
七月手太陰
八月手陽明
九月足少陰
十月足太陽

養之諸陰陽各養三十日活兒

手大陽少陰不養者下主月水上爲乳汁活兒養母懷妊者不可灸刺其經必墮胎也

傳若至期當養之經虚實不調則胎孕爲之不安甚則下血而墮矣

婦妊一月肝脉養之不可針灸其經肝主筋不爲力

事舉重腰痛胞急卒有所下
膠炒甘 參 芍
妊二月膽脉養之不可針灸其經膽主精當謹驚
動有寒胎不成有熱胎即萎中風寒心滿膈急
腰背強痛卒有所下
婦 參 艾 膠
妊三月心主脉養之不可針灸其經莫悲哀思慮
驚動驚恐頻仆而動經脉膈腹滿痛卒有所下
芩 參 膠 芎 朮 芍 門 甘 棗 生姜
妊四月三焦脉養之不可針灸其經當靜形和心
志節飲食有寒膈滿嘔吐有熱小便難數如淋
膈急腰痛往來有時胎上迫卒有所下
菊花 門 膠 甘
婦 參 棗 生姜
妊五月脾脉養之不可針灸其經此月兒四肢成
無飢飽無食乾燥有熱頭眩心亂嘔吐有寒腹
痛尿數卒恐肢疼胎動腰痛頻仆卒有所下
膠炙 參 門 婦 芍 芩 甘 生姜
妊六月胃脉養之不可針灸其經此月兒口月成
莫靜處出遊野觀走獸莫飽卒動驚怖寒熱往
來腹滿躰腫卒有所下

門　參　地　芩　膠　甘　棗　生姜

妊七月肺脉養之不可針灸其經此月兒皮毛成莫大言號哭莫薄衣莫洗浴莫寒飲勞身搖肢莫定止動作屈伸以運血氣忽驚恐腹痛卒有所下

門　半　歸　芩　芪　參　膠　甘　葱白　生姜

妊八月大腸脉養之不可針灸其經此月兒九竅成無食燥物中風寒身痛寒熱胎動不安頭眩臍寒目視茫々

芍　參　歸　甘　朮　朴　薤白　生姜

妊九月腎脉養之不可針灸其經此月兒脉續縷皆成無處濕冷無著灸衣卒下痢腹急胎上腰痛不可轉側

半　門　歸　膠　棗　生姜

妊十月膀胱脉養之納天地氣於丹田五藏備六府通俟時而生

傳　夫手足十二經氣血多少不同



如
- 手足 厥陰 太陽 四經少氣多血
- 手足 太陰 少陰 少陽 六經多氣少血
- 手足 陽明 二經多氣多血

安胎之法宜各按月依經視其氣血虛實而調之
固無胎墮之患
其或感冒風寒別生異証又宜按法而調治之

○胎産三禁　傳

治胎産之病當從厥陰之經論之毋犯胃氣及上
二焦謂之三禁不可

汗
下
利小便

若
發汗者如傷寒下早之証
利大便者則脉數已動于脾
利小便者內亡津液胃中枯燥

制方之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣
皆醫人之繩墨也

○妊婦攝養

婦　一氣方凝始受胞胎毋須行坐端嚴性情和悅常
處靜室耳不聞非言目不見惡事則生男女福壽
敦厚忠孝賢明不然則男女既生則多鄙賤不壽
而愚此謂曰外象而內感也

傳　其妊婦早當絶去嗜慾安養胎元

性
宜靜而
不宜躁

躰
宜動而
不宜著

味
宜涼而
不宜熱

衣
宜温而
不宜寒

毋
久立
久坐
久行
久卧

忌一切肥甘煎煿油膩辛辣鹹酸水菓魚鼈狐兔

廣嗣要諸曰姙婦五忌
一勿睡熱坑南方火櫃亦同
一勿飲燒酒
一勿食煎炒炙煿之物
一勿食葱韭蒜薤胡椒茱萸
一勿於星月下仰卧當風洗浴坐卧

鴿雀之類即無胎漏胎痛胎動下血子腫子癇等
証及横産逆生胎死腹中之患矣

傳曰古者婦人妊子
- 寢不側
- 坐不邊
- 立不蹕
- 不食邪味
- 割不正不食
- 席不正不坐
- 目不視邪色
- 耳不聽淫聲
- 口不出傲言

夜則令瞽誦詩道正事則生子形容端正才過人矣古所謂胎教也

丹溪曰難産之婦皆是八九箇月内不能謹欲以致氣血虚故也

全

妊母
- 心氣驚則子必癲
- 腎氣不足則子解顱
- 脾氣不足則子羸瘦
- 心氣不足則子神怯

孕婦食
- 兎肉子唇缺
- 狗肉子無聲
- 雜魚子瘡癬

○妊婦雜病因治凡例

婦 凡妊婦有疾投以湯藥有傷胎破血之忌必醫人審疾勢輕重量藥性高下處以中庸不必多品疾勢衰藥便止

傳 安胎丸 白朮 條芩 神麯 洛等

丹溪活套　凡婦人胎前諸疾只須以四物湯為主治看証加減
如胸中煩悶口苦厭食不向月數加木條芩縮
五六ケ月胎動不安逆搶逼心加膠艾縮木芩殼芎根金銀
五六ケ月前無故下血或因夏下血加芩木耳芷茅根地榆桑寄
七八ケ月前後面目及肢浮腫加苓沢木芩炒梔朴耳門
感冒頭疼発熱体痛合小柴加細芷瓜羌
二三ケ月内呕吐悪不納飲食謂之悪阻去地加陳半縮木藿麥芽麯
或時白濁白帯加苓陳蛎竜骨半木
無故肢痛淳利清水或発熱胎動不安加木苓猪沢訶縮麴姜之類

右為細末粥丸毎服五十丸清水湯下蓋术芩乃安胎之聖藥也俗以芩為寒而不用反謂温熱能養胎殊不知胎孕宜清熱養血使血循經而不妄行乃能養胎芩必取細挺沉實者用之

傳　胎動者因火逼動胎逆上作喘急用條芩香附之類

婦　胎動不安由衝任經虚受胎不實○有飲酒過房損動不安○或登高厠風攻陰戸入子宮胎動不安○或勞力觸冷熱○或飲食不適○或居處失宜

輕者轉動不安重者傷墮以母形察之面赤舌青兒死母活唇口青兩邊沫出子母死面青舌赤口中沫出母死子活也

艾　膠　歸　芎　甘　芪　蔥白　粳米

生姜之類隨証用之

婦　胎漏者妊數月而經水時下此由衝任虚不能約制手太陽少陰經血故也衝任為經絡之海起胞内手（太陽小腸　少陰心）脉也二經為表裏（上為乳汁　下為月水）妊婦月經所以断者壅之養胎穡之為乳汁衝任虚胞内泄不能制其經血故月水時下亦名

胎漏血盡則斃

又 勞役喜怒 飲食生冷 感冒風寒 遂致胎動令下血

續斷 艾葉 竹茹 膠 歸 地

傳 胎漏者屬氣虛有熱四物加膠珠朮芩縮炒香附炒入糯米煎服

玉 内補丸治胎痛

當歸 熟地黄 各一兩

右爲末蜜丸用之或爲煎劑亦可

大率妊婦唯在抑陽助陰然胎前藥惡群隊若陰陽交錯別生他病

枳殼散所以抑陽 四物湯所以助陰

然枳殼散差寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以内補丸佐之則陽不至強 陰不至弱 陰陽調停愚詳陰陽調停不若不服爲愈

纂 胎痛血少四物加香附爲細末紫蘇湯下大妙

傳 妊娠二三个月忽心腹疞痛不安用歸三錢 膠二錢炒 甘炙一錢 蔻白右剉水煎温服

妊娠四五个月忽心腹疞痛大棗十四个炒黑 塩十錢炒令赤

右爲末一撮許酒調服

妊婦偶有所傷腹痛不安或（從高墜下重物所壓）觸動胎元痛不可忍及下血者縮砂仁略炒爲末溫酒調服不飲酒者米飲艾湯塩湯皆可覺胎中熱其胎即安

傳 胎腫謂有胎或（手足頭面通身）浮腫者是也屬濕多梔子一合炒末米湯調下丸服亦可

玉 白朮散治妊娠面目虛浮支躰重　白朮一兩　生姜皮　大腹皮　陳皮　白茯苓皮各半兩

右爲末米飲調服指迷方（有桑白皮無白述）

傳 安栄散治妊娠小便澁少遂成淋瀝謂之子淋

麥門冬　通草　當歸　灯心　甘草各五錢　人參　川芎各一兩

右爲細末麥門冬湯調下

玉 參朮飲治妊娠轉胞

四物湯加人參　白朮　半夏　陳皮　甘草

右㕮咀入生薑水煎溫服

按丹溪曰轉胞之病胎婦（稟受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者）庸或有之古方皆用滑利藥鮮有應効曰思胞不自轉爲胎所壓展在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起居

於其中胞系自疏水道自利

吳宅寵人患之其脉似濇重按似弦左手稍和予曰此得之憂患濇爲血少氣多則胎氣弱而不能舉弦爲有飲血少則胎弱氣多有飲中焦不清而隘則胞知所避而就下乃以上藥與服隨亦然至八貼安後治數人示效

婦血氣和平兒在胎則安產亦易非理兒在胎則亟動產亦難子上逼心則悶絕胎下乃甦甚死

紫蘇飲治妊胎不和近上滿痛謂之子懸連日不下用之

當歸 三分 甘草

川芎 陳皮

白芍藥 各半兩 紫蘇 一兩

右細剉入薑葱水煎温服

保安散治胎動心悶唇青口乾上衝下藥手足厥冷

當歸 人參 各一兩半 甘草 二錢

右細切水煎入膠珠一兩葱白一握再煎温服

一方治妊娠身痛或衝心欲死不能食

白朮 五兩 黄芩 二兩 芍藥 四兩

右細剉水煎服之

婦 腎主腰目勞損其經虚風冷乘之則腰痛甚則胎墮

當歸 三兩　甘草 一兩

右細切水煎入膠珠二兩葱白一升再煎温服

方治妊娠腰痛如折

大黒豆 二合炒熟　以酒煮熟去豆空心頓服

婦 肺主氣外合皮毛毛竅不密則風寒乘虚入肺爲嗽欬花散治心膈痰壅肺氣不順咳嗽頭痛

欵冬　麻黄　前胡　貝母 煨

桑白皮　紫苑 各半兩　旋覆花　白朮

甘草 各一分　石膏 一兩

右細切水煎温服

一方治妊娠咳嗽不止胎動不安

甘草　杏仁 各一分　紫苑 一兩　桑白皮 一分

桔梗 三分　天門冬 一兩　竹茹 一塊

右細切水煎入蜜半匙温服

婦 孕婦不語非病間有如此者不須服藥臨産月但服保生丸四物湯類産下便語

黄帝問人有重身九月而瘖治之柰何岐伯曰無

治也當十月復

婦 治妊婦腹中兒哭

用黃連濃煎母常呷之

傳 治兒在腹中哭叫用多年空屋下鼠穴中土一塊

令妊婦噙之即止

婦 凡妊娠傷寒仲景無治法藥宜有忌不可與尋常

婦人通治也

一方治妊婦傷寒憎寒發熱

葱白 十莖 生姜 二兩

右細切水煮連服取汗愈

一方治妊娠傷寒感風身熱眩暈頭痛心煩

紫蘇 川芎 白朮 白芍藥

麥門冬 陳皮 葛根 各一兩 甘草 二分

右細剉入薑葱水煎溫服發表即安

傳 妊娠傷寒百節疼痛熱甚不急治即落胎

柴 葛 知 梔 升 石膏 大青 葱白

右細切水煎溫服

一方治妊娠傷寒安胎

白朮 黃芩

右等分新瓦上炒令香加生姜水煎溫服

一方治妊娠傷寒
柴前　蜱　參　芍　生地　甘
右細切入薑葱水煎温服

○惡阻証治

婦惡阻顏色如故脉息和順肢躰沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食酸鹹甚寒熱心悶嘔吐痰水臍滿惚惚輕不及藥重用藥

一方治婦人經水不行身無病而似病脉六部滑大而勻是孕脉也精神如故惡食臭或大吐或吐清水名曰惡阻

人參一分　甘草一分　白朮　香附子
烏藥　橘紅各二
右細切水煎温服

傳惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治

一曰（肥人是痰瘦人是熱）

參橘散治妊娠三月内惡阻吐逆不能食或心虚煩悶

橘紅　茯苓各一　麥門冬　白朮
厚朴（姜制）甘草（炙各半）
右細切加生姜竹茹水煎温服

○墮胎因治

傳 墮胎乃血氣虛損不能養胎元而自墮耳

猶（枝枯則果落 幹萎則花墮）

又因怎怒傷情乃火便動亦能墮胎猶（風撼其木 人折其枝）

火能銷物造化自然病源風冷傷於子藏未得

病情者也

大抵（屬虛 屬熱）二者又當視其輕重而治之

一婦有胎即墮其脉左大無力重取則濇乃血少

也以其妙年與補中氣使血自榮濃煎白朮湯

調芩末一錢服未至三四兩得保全而生

婦 夫陽施陰化故有胎榮衛和則經養周足故胎安

若血氣虛損子藏被風冷血氣不足養胎所以

數墮妊而腰痛者喜墮胎也

千金治妊娠三月數墮胎

灸膝下一寸左右各七壯

固蔕散治妊胎數墮

甘　芪　參　芎　朮　地　吳茱

右等分爲末空心酒下忌菘桃李雀肉酸物

一法治數傷胎

鯉（二斤）　粳米（一斤）

右如法作臛加塩食之甚良一月中三遍効莫入葱豉醋

○妊胎不長養

婦人有宿痾而後有妊或妊後乖理而生疾　藏府衰氣力虚令胎不長故服藥去病益氣血以扶養胎也

鯉長一尺者去腸鱗内塩棗煮熟飲汁令胎長大平安

一方縮砂抹米飲調下

○断産

婦

欲断産者不易之事雖曰天地大德曰生然亦有臨産艱難或爲尸爲娼用汞蚩蛭之類難免受病故平和異驗方具之

括樓　桂心各二兩　豉一升

右細切水煎服之

一法附子二枝末之酒和塗右足太良

一方　括樓根四兩　肉桂五兩　牛膝三兩

瞿麥一兩

右細切水煎温服

○有事胎死因治

婦

夫妊娠謂之重身一命係之損胎不特病重所致或因頻仆或因驚恐或出入冒觸或素病癥積壞胎最多候舌青即知子死

一方治熱病胎死因兒死冷不能自出服藥朕胎自出

肉桂　當歸　白芍　甘草　各一兩　黑豆炒去皮二兩　附子炮去臍二分

干薑　生地黃

右爲末空心酒調下

一方下妊娠熱病胎死紅花一味酒水煎飲二三盞

一方朴硝細末童便調下

○妊娠禁忌

傳

自妊娠初得以至臨月藥石禁忌歌

烏頭附子與天雄　牛膝薏苡連蜈蚣　太戟蛇蛻黃雌雄　槐花牽牛皂角同　瞿麥干姜蟹甲爪　地膽茅根莫用好　硝砂干漆兼桃仁　飲食謹弁

雞肉合糯米食令子生寸白○鮎鯉同雞子食令子生疳蝕瘡○食羊肝令子多危難○食鱉肉令子項短縮頭○鴨子與桑椹同食令子倒生心寒○鮮魚同田雞食令子瘖瘂○雀肉同豆醬食令子而生雀卵斑點○食螃蟹横生○食薑牙令子多指○食氷漿令絶産○食雀肉飲酒令子多淫無耻○食茨菰消胎氣○豆醬合藿菜食墮胎○鰍鱔無鱗魚難産○食諸般菌生子驚風而夭○食雀腦令子患雀目勿妄服湯藥○勿妄鍼灸○勿過飲酒漿○勿舉重

登高陟險○心有大驚子必癲癇○勿多睡卧須時時少歩動和血脉○勿勞力過傷使腎氣不足子必解顱不合○衣母太温食母太飽若脾胃不和榮衛虚損子必羸瘦多病戒之戒之

○臨産須知　傳

臨月不可洗頭以免横生逆産

懷妊十月已滿陰陽氣足忽然臍腹陣痛胎孕偏陷腰間重腹穀道挺迸漿水淋下其兒遂生此乃正産若當生自有其時如瓜熟蒂懸栗熟自落之類

凡臨産宜擇年高有職穏婆及純謹婦人三四人扶持一應外來閑雜之人喪服穢濁之婦預宜杜絶勿令觸犯胎氣致産不利

凡臨産房中不得喧鬧宜緊閉門戸静以待生月數滿足方覺腹痛不可驚動太早早則舉家霍乱卜筮問神巫覡之流称説鬼神多方哄哧媒利産婦聞之恐怖夫恐則氣怯氣怯則上焦閉下焦脹氣乃不行以致難産如犯之急宜服柴蘓飲以寛其氣

臨月忽然腹痛或作或止或一日二三日胎水已來腹痛不密名曰弄痛

一月前忽然腹痛如欲便産却又不産者名曰試月

以上二証非當産也不問胎水來與不來俱不妨事但當寛心候時若果當産時腰腹痛極不已穀道挺迸眼中火出其時便産豈有或痛不痛欲産不産之候耶人多於此胡行乱做枉了性命可不慎哉

凡初覺腹痛而腰不甚痛者未産也且扶行熟忍若行不得則凭物而立行得又行

世人不識但見腹痛纔作便謂生産坐婆疎狂者不俟時至便言試水試水併胞漿先破風入産戸以致産門狹脹乾澁難産

將産之時産母甚痛不肯舒伸行動固執曲腰眠睡胎元轉動尋到生門已被遮閉又轉又尋再三胎元無力決至難産

産母初覺欲生便惜力調養不可妄用力兒方轉便用力一逼令兒錯路以致横逆必待到産門用力一逼即生此所當用力也譬如登廁時候未至用力何益

凡産母如覺心中憤悶白蜜一匙温水調服

産母如覺飢進軟白粥不令飢渇以致乏力亦不可食硬飯之類

未産之先或煩渇欲飲水只可與清米飲

凡不可服催生符水況血得寒即凝血一凝則胎滯而反致難産夫催生符法是野道士求食媒利之設有何益哉

凡産婦胞漿未下但當穩守無妨胞漿既破一二時後不生便當服催生藥要緊夫胞漿者本胞内養兒之水也兒既折胞其水既下胎隨水而

下則爲易生胎元無力轉頭遲慢漿下即血來閉塞道路令子無路可通故難産也如用蜀葵子等破血之劑逐去惡血兒得路而生故曰催生藥也

○催生藥弁

凡催生

一 多用滑利迅速之藥如兒腦筆頭灰弩牙蛇退之類是也

二 若見水先下子道乾涉不能下者如猪脂油蜜酒蓋白葵子牛乳榆皮滑石之類是也

三 若稽停労力之久風冷來虛入子宮氣血凝滯而難産如牛膝蓋桂五積散順元散之類

四 觸犯惡氣心煩躁悶難産者如麝香辰砂乳香青升茹之類

○産難源論 傳

夫産育之難者皆由産婦不曾預聞講說生育道理臨事倉惶用力失宜遂有難産之危

是故有

逆産
横生
坐産

者則先露其

足
手
臂

此皆用力太早之過

婦 産難六由

凡婦人以血爲主氣順則血順胎氣安生理和一富家保惜産母恐運動羞出入氣閉而不舒快血凝而不流暢胎不轉動臨産必難甚悶絶貧者生育日及勞苦血氣舒暢生理甚易何俟於藥然則

纂難産多見於尉岡安逸之人富貴奉養之家

孕婦當貴於運動明矣

二妊者六七个月胎形已具恣交合敗精瘀血聚胞中產必難何以知之生子頭上有白膩如膠名曰戴白生兒身有青有黑俗名宿痣此入月交合所致也不特母病子亦浸爛瘡瘍戒之

三坐草太早大小揮霍或信巫或說祟多誤產母心驚神恐臨產必難

四臨產初腹痛或作或止坐草太早頻試水流風乾產道產亦難也

五坐草稍久用力太過產母困睡抱腰之人又不穩坐立傾側胎死腹中產難

六盛暑居幽房日色遠處開窓戶貯清水以防血暈血悶血溢妄行冬末春初凝寒密閉產室內外生火暖氣如春衣下部免胎寒血結不如此則產難也

○易產方法

婦二神散治橫倒及瘦胎

百草霜　白芷

右等分末研二錢匕童便醋和粘沸湯調下

一方明乳香末一錢匕既腰痛甚時新汲水一盞入

醋調服

一方治横倒　滑石末一兩　葵子二合

右剉煎明膠炒末入合再沸二服

一法胞漿先破下多胎乾先與四物湯養血氣次濃煎葱湯放冷令坐婆洗産戸令氣上下通暢仍滑石末蜜調塗産戸裏次服催生藥乳香末蜜丸温湯下佳

一法治横倒諸治不効灸右脚小指尖頭三壯

一方蟬退一兩燒存性　大蛇蛻一条燒存性　滑石五分　葵子炒一兩

右細末温順流水調下

惠臨産時紅莧馬歯莧同煮食易産

傳治横逆不順子死腹中亦用　伏龍肝　細末一二錢匕温酒調下其兒頭戴土而出甚驗竈心之紅土也

若手足先露者用細鍼刺兒手足心一二分深三四刺之以塩塗其上輕々送入兒得痛驚轉一縮即順生之矣

或兒脚先下急以塩塗兒脚底又可急搔之併以塩摩母腹上則正生矣

灸法治難産及胞衣不下灸至陰二穴在足小指外

側去八甲角如韭葉宛々中三壯又灸大衝二穴在足大指本節後二寸肝經之俞骨罅間陷者中灸三壯

○礙産証治 傳

兒身已順門戸俱正兒已露頂而不能生此由兒身回轉肚帶攀住中兒肩不能下治法急令産母仰卧輕々推兒向上徐々引手以中指按兒肩下其臍帶須猴兒身正順産母用力一送兒即下生

凡兒身向未順生路未正産母用力一逼令兒偏生或左腿或右腿或臀或左右額角雖兒身已逼産門而不能下但云兒已露頂非頂也治法令産母仰卧看生人輕々推兒近上以手正其頭用力一逼即下

若丈頭之後脊偏扛穀道兒則露額看生人以綿衣灸令煖裹手急於穀道外傍輕々推兒頭令正然後用力一逼兒即下生

○盤腸産証治 傳

臨産則子腸先出甚可驚恐治法以盆盛温水温潤其腸令産母仰卧且以言語安慰其心却用米醋半盞和新汲水七分忽噀産母面或背打頻而收每一噀令一縮三噀三縮腸則盡收矣用參耆

歸芎等大劑加升柴風之類以升舉之未有不安者也

又法急以萆麻子去殼研細貼產母顖頂上即收

○產難胎死方法

傳 治產難數日子死腹中不出母氣欲絶

瞿麥 六兩　木通　肉桂 各三兩　牛膝 四兩　榆皮 四兩

右剉用水九升煎取三升分三服頓飲即下

一方無榆皮有天花粉四兩

一法治子死腹中而不出用黃牯牛屎不拘多少塗母腹上立出

又以牛屎炒令太熱入醋半盞裹青布於母腹上下慰之立下

婦 產難子死腹中者多因驚動太早穢露已盡胎燥故子死其候母舌青黑及胎上冷也

救生散下死胎　桂 末二錢

右溫童便調下

一方治死胎不出　朴硝末二錢溫童便調下

豐城救垂死胎死猫牛不可勝計

婦 妊婦下血過多子死腹中增寒手指甲青面色黃黑胎上搶心悶乱欲死冷汗自出喘滿不食或食

毒物或誤服草藥傷胎下血不止胎（尚未損可安若已損即下）極妙

牡丹皮　赤芍藥　桂心　桃仁　白茯苓

右各等分細末蜜丸如彈子大每服一丸細嚼淡醋湯送下連服數丸立驗

○難產惡証

身重躰熱乍寒面黑舌青及舌上冷子母俱死○面青舌赤口沫出者母死

永活○唇口俱青吐沫子母俱死○不可不審當先與其家言之

婦舌下脉青黑而反卷冰冷者子母俱死

○新產診切

婦新產脉緩滑吉實大弦急死○沉重小吉堅牢凶

○寸口澁疾大小不調死○沉細附骨不絕生○

產後諸疾脉大凶○分明記心察之

傳丹溪曰產（前脉細小後脉洪數）皆死

又曰產前脉當洪數既產而洪數如故豈得不死

此一本緊言之今見產後豈無脉洪數而生者

○胞衣未下論治

傳分兒之後胞衣未下者不可令粗率之婦摘取嘗見擗破尿脬致終身之害者有取下肝葉而殞命

者一方治胎胞衣未下

木通三分　滑石四分　葵子二分半　牛膝三分　歸尾二分

右細切水煎連進二三服即下（加瞿麥三分名牛膝湯）

〔婦〕由産時用力兒出体已疲不能更用力經停之間産胞受外冷血道澁故胞衣不出須急以藥治冷氣傷兒先依法截臍帶以少物繫墜而已（斷臍帶今用竹刀線先繫墜而後斷之）使其子血脉不潮入胞中則胞衣自萎縮而下縱及數日不害人只産母心懷安終自下

一說母生子訖流血入衣中爲血脹故不下治之

緩徐脹滿上衝心痛喘急但服奪命丹逐衣中血血散脹消衣自下

奪命丹　附子（炮半兩）　牡丹皮（一兩）　干漆（一分碎炒令煙盡）

右細末釅醋一升熬大黃末一兩成膏和藥丸温酒呑下衣爛下

或坐婆斷帶收兒衣失繫住帶縮入腹中便不得出（牛膝湯主之）

一方紅花一兩酒煮濃汁服之

一方皂角棘燒末每一錢温酒調下

〔心〕一方取皂屋黑塵研爲細末酒調方寸

纂 一方用童便調朴硝末一二錢飲之立下

林 一方燒鉄杵令赤投酒飲之

○産後篇

○母子呼吸同異

傳 若夫妊娠婦子在腹中母子一氣流通全賴漿水滋養十月數足血氣完全形神俱備忽如夢覺自能用手折胞求路而出既出胞外母子分躰呼吸殊息

○新産三証

玉 問曰新産婦人有三病一者病痓二者病鬱冒三者大便難何謂也

師曰新産
- 亡血虛多汗出喜中風故病痓
- 亡血復汗寒多故鬱冒
- 亡津液胃燥故大便難

傳 脉經曰産婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅者嘔不能食也小柴胡主之

又曰産後七八日無太陽証小腹堅痛此爲惡露不盡四五日不大便趺陽脉微實再倍其人發熱日晡煩躁譫言不食利之即愈宜美氣以熱在裏結在膀胱也

按丹溪曰産後宜大補氣血又曰不可汗下叔和以仲景治傷寒法用兼氣柴胡等藥欲退産後之熱恐非至當可法之語

○産後血暈証法

婦産後血暈由敗血入肝經眼見黒花頭目旋暈不能起坐甚致昏悶不省人事謂之血暈其目有三

一有用心使力過多而暈者

二有下血多而暈者

三有下血少而暈者

右暈雖同治異下血多而暈者但昏悶煩乱而已用補血清心○下血少而暈者悪露不下上搶心心下滿急口噤神昏不知人用破血行血

生子了燒硬炭或江中黄石令通赤置器於床前以醋沃之得醋氣除血暈産後一臈時々作妙

一法燒乾漆令烟濃熏母面

一方治産後血暈危困　當歸一分剉　赤芍藥二分剉

生地黄汁一盞

右水煎數沸温服如煩熱去歸入童便妙

清魂散治産後氣虚未安血隨氣上迷乱心神故眼前生花甚悶絶不知人口噤神昏氣冷

澤蘭 人參各一分 荊芥一兩 川芎半兩

右細末温酒熱湯調灌即醒 一方有甘草

神助散治血暈悶絶不知人乱語悪血不盡腹脇絞痛 紅花半兩 右細末童便和酒煮候冷服留滓再煎服

心 凡血暈皆熱乗虚逆上湊心或以好醋（塗口鼻 細々少飲之 於傍使聞其氣）

林 治産後血暈心悶氣絶

以丈夫小便濃研墨服一升

○産後悪露不盡腹痛証治

婦 産後雖悪血方盡或（感邪 喜怒）斬然而止餘血停滞故腹痛又妊時犯風凉則産時血少或産時取風凉則血壅不通悪露不盡故腹痛

一方治悪露不盡腹痛往來胸滿少氣

沢蘭熬 生干地黄 當歸各三分 芍藥 生姜各十分 甘草六分 棗十四个

右細切水煎温服欲死塗身得差

一方治産後下血不盡腹内堅痛不可忍

當歸 芍藥 肉桂各三兩 桃仁百二十个

右剉煎温服末差加大黄三兩

一方治産後悪物不盡腹内疞痛

生干地黄　當歸（並畧炒各一兩）　生薑（切如蠅頭大瓦炒令焦）

右細末薑酒調下

（纂）惡露不盡小腹疼痛用五靈脂香附爲末醋丸甚加留火桃仁○又方五靈脂爲末神麯糊丸陳皮白朮煎湯下

血刺痛用當歸乃是和血之法若曰積血而刺痛者宜桃仁紅花當歸頭（血在下焦當用歸尾）

（林）鯉鱗燒灰治産後腹痛酒調下

治産後腹中絞痛末桂温酒方寸匕日二服

治産後血不盡疼悶心痛荷葉熬令香爲末煎水下方寸匕

治産後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛以生藕汁二升飲之

（傳）養血丸治産後惡血不散發熱腹痛及惡露不盡臍腹堅脹兼治婦女經候不調赤白帶下腹脇疼痛

當歸　赤芍藥（各四兩）　牡丹皮　肉桂

延胡索（炒各二兩）

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸或（温酒米湯）任下

丹溪曰治腹痛非芍藥不可雖新産亦可用但酒炒

○産後兒枕心腹刺痛証治

婦産母胎中宿有血塊産時其血破散與兒俱下則無患若産婦藏府風冷血凝滯在小腹不通則結疼名曰兒枕也

一方治産後兒枕腹痛

延胡索 當歸 各一兩 琥珀 蒲黃 各一分炒

芍藥 半兩 桂心 二兩 紅花 二朱

右爲細末童便和酒調下食前

一方桃仁 半升 芍藥 當歸 川芎

干漆 碎煞 肉桂 甘草 各二兩

右細切水煎服之

一方治産後心腹內外痛

生地黃汁 藕汁 童便 各三合

右同煎數沸溫服

傳三聖散治兒枕心腹疼痛

當歸 肉桂 玄胡索 各等分

右細末每服二錢溫酒或童便調下

玉失笑散治産後心腹絞痛欲死及兒枕痛

蒲黃炒 五靈脂 各等分

右爲細末醋調二錢煞成膏湯化服之

○産後餘血奔心煩悶証治

婦

是由（分免了不與童便　心下不擀臥太早　飲食不宜）而所致也

一方治産後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛

川芎　生乾地黄　枳殻　芍藥

右等分爲細末酒服日二

一方生藕汁服之効　竹瀝亦得

一方治産後七日内宿血不散時々衝心迷悶

荷葉三分　延胡索八分　地黄汁二合

右細切水二升煮沸下延胡空心三服忌肉一日

○産後内煩治方

婦

一方治産後内虚煩熱短氣

甘竹茹一升　人參　茯苓　甘草各一兩

黄芩三兩

右細切水煎温服

一方治産後短氣欲絶心中煩悶

竹葉切　麥門冬　小麥各一升　甘草一兩

生薑二兩　大棗二十个

右細剉先水一斗竹葉小麥煮取八升内餘藥

煮取三升温服若虚悸如人參少氣力加粳米

五合

一方治産後煩悶不安

人參　當歸　麥門冬　桂心

地黄各一兩　棗二十个　粳米一升　淡竹葉三升

芍藥四兩

右細切先煮竹葉粳米去滓入藥煎服

一説尋常諸虚煩熱用竹葉石膏湯産後與常不同如石膏不輕用用之必死

惠知母湯治産後寒熱通身温壯心煩

知母四分八分　赤芍藥　黄芩三分二分　桂心一分六分

甘草炙一分

右細剉分二貼水煎温服

○産後乍寒乍熱附瘧

婦陰陽不和敗血不散令乍寒乍熱（陰勝則乍寒　陽勝則乍熱）敗血不散入（肺則熱　脾則寒）醫爲瘧治之則誤矣

陰陽不和加減四物湯（但寒熱而無他証也）

敗血不散奪命丹（時有刺痛者敗血也）

一説敗血不散豈止入脾肺耶凡一陰閉一陽閉即寒熱生（陰勝則寒　陽勝則熱）

知母湯治産後乍寒乍熱通身温壯心胷煩悶（方在

前條

一說治産後瘧疾熱多寒少清脾湯養胃湯佳也産前病瘧而産後未愈者最難用藥如常山砒石斷不用

○産後蓐勞証治

婦産理不順疲極筋力憂勞心慮令虚羸容悴食不消邪感肺咳嗽口乾痰逆喘乏頭昏節痛腹中絞刺榮衛受邪頻發時盜汗寒熱如瘧背膊煩悶肢重著床名曰蓐勞

一方治産後蓐勞

熟地黄　人參　白芍藥　白茯苓

白朮各一兩　續斷　黄耆　桂心　五味子

當歸　麥門冬　川芎各三分

右細剉入生薑水煎温服

一方治産後羸瘦煩熱自汗欲變蓐勞寒熱自汗羸瘦用之

白芍藥　當歸　地骨皮　人參各半兩　沒藥

肉桂各二分　牡丹皮三分

右細切水煎温服

傳當歸羊肉湯治産後發熱自汗肢躰疼痛日久不

愈名曰蓐勞

歸身　人參各分　黃耆一兩　生薑半兩

右細切用羯羊肉一斤煮取清汁五大盞去肉入藥慢火煮取四盞分六服徐々服之

○産後虛羸証治

婦曰産傷損藏府勞侵氣血輕者將息滿月即瘥重者日月雖滿氣血猶不調故患虛羸或飲食不節調適失宜風邪冒氣血注藏府則肌膚不榮容顏憔悴

一方治産後虛羸補益榮血

當歸　羌活各一兩　延胡索半兩

右細切水煎溫服

一方治血虛勞倦盜汗多困少力咳痰

當歸　黃耆　川芎各一兩　柴胡　前胡各一分

右細剉入桃柳枝三寸大棗烏梅各一枝生薑三片水煎溫服若有痰不用烏梅

一方治産後虛乏不食四肢倦怠心腹陣痛補虛治氣

人參　芍藥　肉桂　甘草　生薑各一兩

當歸一兩半　生地黃二兩

右細剉入大棗水前温服

○産後四肢浮腫証治

婦 敗血乗虚停五臓循經流入四肢日深不得腐如水故令面黄肢腫醫不知用導水藥凡産後皆虚又以藥虚之謂之重虚必致夭横但血行腫消則愈

調經散治産後浮腫

没藥　琥珀　肉桂　芍藥　當歸　各一兩

細辛　麝香　各二分

右爲細末酒調下

評曰産後浮腫多端有自妊腫至産後不退者又産後乖理外感四氣内傷七情血與氣搏滞經絡有滞氣分滞血分之異當目脉証治之如調經散治血分固効力淺難憑枳朮湯治氣分佳也

枳朮湯治心腹堅大如盤水飲所作

枳實　一兩半　白朮　三兩

右細切每服四錢水煎温服中軟即當散也

○産後乳汁辨治

婦 皆由氣血虚弱經絡不調所致也乳汁投地勿令食虫蟻令乳無汁若盈溢潑東壁

年少初經產乳雖脹汁不行有風熱耳服清利藥則乳行○累經產而無乳亡津液故也服滋溢之藥以動之○雖有乳不多者服通經之藥以動之仍以美膳引之○屢經產乳汁多者血氣不衰之候也○婦人素衝任之經有疾乳汁少而其色黃生子怯弱多疾也

婦人乳汁不行二治

氣血盛壅閉而不行疎之

通草漏芦土瓜根佳也

血少氣弱澁而不行補之

猪蹄鯽魚鍾乳佳也

產後乳汁自出身虛所致服補藥○亦未產前乳汁自出多者生子多不育書未曾論及矣

乳子忽瞋乳不時泄結痛亦有不痒不痛腫腫如石名曰吹奶不急治則癰腫急與括摟散以手摸之則散

括摟散　乳香一分研

右研和酒調下

括摟根末一兩

新產兒未能飲脹結揑其汁不盡皆蓄留與血氣相搏熱痛手不得近便以手揑去汁更傍人吮之不爾成癰（輕爲吹奶奶乳重爲癰）

一方治吹奶作癰

葵莖及子　右細末酒服方寸匕

惠　丹溪方治乳汁不通

桔梗二錢　通草七分　天花粉　瞿麥　柴胡各一錢

赤芍藥　白芷　水通　連翹　甘草

青皮各五分

右細剉水煎食後細飲更以手摩乳房

○乳癰論治

婦　足陽明之經澁不通血氣不散故結聚成癰四十歲以下治之愈五十歲以上宜速治之難瘥不治者多死○又妊娠乳癰無害謂起陽明陽明者胃脉也主肌肉不傷臟故無害也右開脉沉也

産後宜勒去乳汁不宜蓄積惡汁內結則硬腫痛渴

以赤小豆末水調塗之尚數担去乳汁與連翹湯即方

連翹　升麻　芒消各十分　玄參　芍藥

白歛　防已　射干各八分　大黃十二分　甘草六分

杏仁八十个製

右細剉水煎下芒消服之

○産後中風口噤角弓反張証治

婦 血虚風入額頰夾口之筋手三陽筋結入頷因産臓虚筋脉傷風乗之三陽之經偏搏之筋拘急故口噤躰虚受風邪乗虚入諸陽經則腰背反折如角弓也

血虚肉理不密故多汗風搏之則變痓口噤背強揺頭身反折幹口灌小續命湯稍緩若汗出兩手拭不及者不治

一方荊芥 畧焙末

右毎服三錢豆淋酒調下童便亦可 口噤者灌之噤甚吹鼻中

一方治産後中風不省人事吐涎搐搦

當帰 荊芥 等分

右細剉煎灌之牙關緊急幹開微々灌之

産後氣血不足月未滿起早勞動虚損風冷客皮膚經絡頑痺不仁攣急也

一方治産後中風四肢攣痛背項強急

防風 一兩 芍藥 桂心 各半兩 羚羊角 屑 川芎

羌活 當帰 酸棗仁 牛蒡子 炒各三分

右細切水煎温服

纂 産後中風口眼喎斜等証不可作風治 非真中風也

必大補氣血然後治痰

傳 産後中風口眼喎斜八物加附子荊芥少加防風羌活煎服

○産後咳嗽治方

婦 一方治産後肺虚感微邪咳嗽

甘草 桔梗 各六分 欵冬花 四分 生麥門冬 生地黄 各十二分

右細剉水煎食後温服

一方治産後咳嗽痰唾稠粘氣急

前胡 五味子 紫苑 貝母 各六分 桑白皮 茯苓 各八分 淡竹葉 二十片

右細剉水煎食後温服

或 風熱 寒濕 宜辨治之

若産後喫塩太早而欬者難治

○産後喘急辨治

婦 一方治産後血入肺面黒喘欲死

人參 二兩 細末 蘓木 二兩

右蘓木一味剉煎去滓隨時加減入參末服之

悪露不快敗血停上薫肺喘急但服奪命丹血去喘定 方在前

曰産所下過多榮暴竭衛無主獨聚肺故喘名曰孤

陽絶陰難治

評曰産後喘可畏敗血上薫肺奪命丹可効

若（感風寒　曰憂怒　食鹹冷）者奪命丹未可況孤陽絶陰者乎

○産後口鼻黒色及衄血証因

〔婦〕陽明者經脉之海起鼻頞出額交人中（左之右　右之左）産後氣消血散乱入諸經不能還故口鼻黒氣起變衄此証胃絶肺敗也不治故無方

○産後吃逆証治

〔婦〕産後氣血傷藏府損風冷搏氣則逆上肺虚聚冷

胃中伏寒曰食冷物冷熱相衝氣厥不順則吃逆

經曰吃逆者胃寒藥無効灸期門期門胃之太絡也

一方治産後吃逆三日不止欲死

肉桂　半兩　生薑汁　三合

右同煎以火灸手摩背熱時塗藥汁盡

一説治産後吃逆　橘皮半夏生薑干薑之類皆効也

○産後雜証治方

〔傳〕丹溪曰産後當大補氣血爲主雖有雜証以末治之

産後補虚用參朮耆橘歸芎炙甘

如發熱
- 輕則加苓滲之其熱自除
- 重則加乾薑
  - 入肺利肺氣
  - 入肝引衆藥生血

産後發熱惡寒或口眼喎斜等証皆是血氣虚甚當以大補氣血爲主治

左
右
- 手脉不足
  - 補血藥多於補氣藥
  - 補氣藥多於補血藥

産後惡寒發熱腹痛者當去惡血若腹不滿者非惡血也

參朮湯治産後去血過多血虚則陰虚陰虚生内熱令人心煩短氣自汗頭痛

熟地黄　當歸身　人參　肉桂　麥門冬
白芍藥 炒各一分

右細切作一服入竹葉生姜水煎温服

益肌湯治産後虚汗不止

黄耆 二分　白朮　防風　熟地黄　牡蛎 煅粉
白茯苓　麥門冬 各一分　甘草 炙半分

右細剉加大棗水煎温服

濟陰湯治産後陰虚發熱或日間明了暮發寒熱

當歸　川芎　生地黄　柴胡 各等分

右細切水煎濕服

婦人腎繫於胞產則勞腎損胞諸虛未復感風乘腰故腰痛

一方治產後風冷腰痛不可轉側

獨活　川芎　芍藥　桂心　續斷　生薑

桑寄生各六分　當歸　防風各八分

右細剉水煎空心溫服

一方治產後七八日惡露不止

當歸六分　芍藥　續斷各八分　川芎

生地黃炒乾十二分

右細剉水煎空心頓服

一方治產後三四日惡露不下嘔吐

芍藥十分　知母八分　生薑　當歸　蒲黃各四分

紅花二分　荷葉中心蒂七个　生地黃汁一合

右細切水煎去滓入蒲黃沸空心溫服

一方治証同前

牛膝　大黃各八分　牡丹皮　當歸各六分　芍藥

蒲黃　肉桂各四分

右爲細末生地黃汁調服血下愈

一方治產後脇脹氣痛

當歸一兩　芍藥　檳榔　桔梗　枳殼各三分
肉桂　木香　柴胡各二分
右細切水煎空心温服
一方治産後積癥（積陰氣痛有部位　聚陽氣痛無定處）
青皮　干漆炒各三分　沒藥　檳榔　當歸　桂心
芍藥　牡丹皮各半兩　大黄炒　桃仁　鱉甲
厚朴　三稜　延胡索各兩
右為細末煉蜜丸酒送下
門冬飲治産後血虚煩渴不止
芦根切一升　括樓根　人參　甘草　茯苓各三兩
大棗二十个　麥門冬生用四兩
右細切水煎頓服四劑而即瘥忌菘菜
一方治産後腹脹滿悶嘔吐
赤芍藥　半夏　澤蘭　人參　陳皮各一分
甘草一分
右細剉入生薑水煎温服
一方治産後赤白痢疾臍下氣痛
當歸八分　厚朴　黄連各十二分　肉豆蔻五枚
甘草六分
右細切水煎温服四君子湯亦能治此証

一法産後小便不通腹脹悶乱不醒用塩填臍中却用葱白剥去麁皮十餘根作一縛切作一指厚安塩上用艾滿葱上灸之熱氣覺入腹即小便通効難具述

一方治産後尿數并遺尿

益智仁爲細末米飲下

一方治産後小便不禁

雞尾毛燒末温酒調下

一法治産時勞力大過陰脫如脫肛狀逼迫腫痛以鉄精粉上推内之

又灸臍下横文二七壯

又用枳殻煎湯浸良久即入

又用五倍子白礬煎湯浸良也

又葷麻子十四枚去殻研塗頂心如入即去

傳一方治産後子腸不収

八物湯加升麻防風須以酒炒黄耆爲君

○整容篇

婦 一法治面上有熱毒悪瘡

胡粉 炒　大黄栢　黄連 各等分

右爲細末猪脂調傳

一法治粉刺

白礬末酒調塗之

一法治面上黒風瘡

黒牽牛 半斤　甘松　香附子 各四兩

右爲細末作面藥逐日洗之

染髪方

用黒桑椹一升科斗一升以瓶盛密封於土中東屋角百日化爲黒泥染髪如漆染男子白髪亦妙

傳 梳頭髪令不落方

側栢葉 如手大　榧子 三十去皮　胡桃 二ケ去皮

右和合用雪水浸三日取水用梳頭髪末不脱落

傳 面藥一方

益母草不拘多少燒灰煮糯米和如毬子大炭火燒通赤細研依常法用之滋潤顔色令光澤

本草曰治風刺

軍大真紅玉膏

杏仁去皮 滑石 輕粉各等分

右爲細末蒸過入腦麝少許以雞子清調勻午起洗面畢傳之旬日後色如紅玉

軍孫仙少女膏

黃栢皮三寸 土瓜根三寸 大棗七个

右同研細爲膏常早起化湯洗面用旬日容如少女以沉浴尤爲神妙

察證辨治啓迪集卷之七