

近世內科國藥處方集

西畑伊南言

葉橘泉著

第一集
傳染病篇

近世內科國藥處方集

虞奎岩



上海千頃堂書局印行

中華民國二十五年五月三出版



近世內科 **國藥處方集** 第一集
傳染病篇

精裝實價國幣二元五角

著者 吳興葉橘
鑒定者 北平施古今
校正者 南京葉古紅
印刷者 千頃堂書局
發行人 謝祖芳

經售處

上海三馬路

千頃堂書局

國內各大書局

存濟醫科

蘇州馬醫科

會文堂書局

香港大道中

千頃堂書局

上海漢口路二六九號

南京葉古紅

北平施古今

吳興葉橘

陳序

自前清光緒中葉吾杭拱埠開放以來日本渡邊氏設醫院于城中與西醫梅滕更氏各立一幟於是吾杭乃有兩派新醫而與所謂儒醫世醫者有不兩立之勢今則德法美派亦多各立門戶各自有其信徒門診出診之資視從前加十倍貧病求藥大都一劑千錢且猶不止實則東西洋之醫藥博士方以中國藥物視為奇貨例如糖尿之病用黃芪而不知宜合當歸積食症之用唐菖子而不知山查之宜焦用成炭使成碱性僅足以化果酸若夫麥芽谷芽鷄肫皮與飯煨灰則各因其物類而異其用此又非東西人士之所知也山道年以治虫積則已發明而知不如使君子規那之治瘡亦已發明而知不如常山諸如此類不勝枚舉逐年轉載於報章驚歎為新發明者

實皆中國本草中早有發明卽如蛋黃素之能解毒則在唐代已有傳信錄之記載特未加以推闡而已故吾嘗謂中國人之通病軌在舍己從人涉於迷信因病求醫中西雜進犬牛之性是否與人相同則置不問是直以身試藥而已以言試則自神農至今已經四千餘年之嘗試比之新藥流行未及一載已徧九州宜不可與同日語焉然以心理作用雖香灰淨水亦能療其心病誠可怪也西醫必用西藥知彼而不知此固亦無怪其然然而大黃甘草亦必用舶來之品是誠為可怪之尤今閱近世內科國藥處方集以舊方治新病且其重量容量亦從西例似頗可怪但切按之病名雖異而病狀則同病狀既同則醫理亦同醫理同則用藥亦同所不同者不過醫方集解之解說為新醫所不解而新醫之病解又為國醫所不解因而各執

一說此謂溫病彼稱炎症此用側柏彼用杜松實則二五等於一十特在三歲之兒兩手分執而不能併知其數是蓋由於知識之未充耳得此一編藉以溝通將使西醫得知中藥之效用而中醫得悉西醫之病名若與拙編西藥指南並閱則一旦豁然貫通是誠不啻暗室一燈足使摠埴冥途之輩相率而入光明之大道四通八達無復門戶之見從中間隔則塞者通而迂者達洵無異乎一劑消導藥也故樂為之序民國二十四年八月天虛我生

施序

學術無國界。而醫學與醫術。獨強分中西何也？生理解剖病理機轉。藥治效能。中西一轍。而中西醫學者。在治療原則上。乃彼此爭執。水深火熱。迄無已時。但聞相互攻詰。不聞相互研究。相互提攜。中西醫學醫術。遂永無溝通之一日。葉君橘泉。有鑒於此。纂近世內科國藥處方集。採取西醫學說。注釋中醫效方。在醫林著述中。是殆溝通中西之嚆矢歟。

施今墨

徐序

東方精神之學。西方物質之學。各臻絕詣。不必盡揉而一之。獨於人身也。其機構精妙。與夫疾病之變化微茫。固非精神界玄旨。所可囿。亦非物質界迹象所能窮。顧時代遞嬗。彼有形者之邁進。自較此土蹈空者為優越。然則中醫不盡適用於今日也。固宜。惟舉世所詡之科學醫術。缺陷猶多。舊醫之效用。幾將與之絜短而較長。新不掩舊之迹。視軍事政治諸學為甚。於茲以新理衡量舊說。所謂用科學方法改進中醫者。殆無二義矣。十年前蒙嘗著論。排除五行六經。十二經等贅說。欲納有效方法於新軌範中。別尋途轍。以求真理之所在。當時醫林達士。遽相推許。而筆之書者。則友聲闐然。乃冥心孤往。惟實施於治療。即脈之遲數。體溫高下。早參西法診測。自覺較有

標準人亦未聞議其非者。邇年風氣丕振。海內同調。以著述露頭角者。稍稍知名。如葉子橘。泉其一也。余與葉子向無一日之雅。僅從新冊籍中。偶覩鱗爪。知其識朗而致力勤。其宗旨尤不謀而合。蓋真理所在。東西南北。有智者起。此心同。此理自無不同也。頃葉子以所著內科國藥處方集。將竟揭其義例。走書乞序。葉子於藥學。孳練有年。茲編擷取西醫理論。適用中醫方藥。推闡分晰。俱本於翔實之藥理。堪為處方學津梁。一洗從前想當然之空論。非徒彙集古方者比。即東邦近來。本遠西醫學之基礎。返而求諸漢法醫學。其著作頗有趁譯。以視茲編。未之或先也。雖其書未覩全豹。旨歸既正。取用必宏。學術隨時會推。進古今甯有所謂空前絕後之作乎。比者斯道式微。枋政者幾視若卜筮星相一流。任其自為生滅。非必有意摧殘。亦由未

明真際。而人民之需求。且與世界從同之新醫術。一致信用。甚或徬
徨岐路。莫知適從。環球各國。無此畸形贅象。果民習錮蔽。不可與維
新乎。蓋必有大不得已者在。是則吾儕從實踐之途。堅苦圓澈。舉成
績。昭示於世。固不容自諉也。得葉子從而張之。當足以開拓懷疑者
之心胸。俾來學亦有準則可守。而吾向者以和寡自歎。今而後亦喜
其不孤矣。持此還質葉子。及世之讀是書者。中華民國二十四年。立
冬後十日。修水徐瀛芳謹題。

陸序

濁世凡夫不能無人我爭勝之執。業中醫者。解剖之精。試驗之巧。自知弗逮西醫。則曰吾氣化哲學之奧。非西醫所及知。此強辭厚顏。可弗論。其知見較高者。曰我識病探原。或不若西醫。至於依證投方。覆杯而愈。西醫亦不吾若也。此或然矣。中土開化較早。其醫藥導源於食餌。本草所載。自粟菽以至草根樹皮。五穀為上品。毒藥為下品。而伊尹以鼎俎割烹之才。著湯液經。為經方之祖。斯皆醫藥導源。食餌之證。夫惟推食餌為醫治。其性柔和。中病則效如響。不中病亦不致劇且死。又積四千年病體之直接試驗。加以材智之士。運其靈機。為之和合。故中土古方之流傳於今者。效驗確而流弊少。西國開化後。故其積驗少。至今猶恃動物試驗。以覘性效。夫動物與人固有

間矣。又多用金石峻烈之品。一藥之投。正效未見。而副作用不可堪者。往往有之。故謂中醫治效。勝西醫者。雖猶有人我爭勝之見存哉。亦異於遁形氣化以自蔽者矣。雖然。古方則多矣美矣。載之舊籍。其辭約。其旨微。又有夸辭傳說存乎其間。簡而用之。戛戛乎其難哉。抑古方之用法。視證候。又有依證投方。而竟不愈者。證雖同。而病則異。知證而不知病。有時不能十全也。知病之術。遠西實勝中土。是故今世大醫習業。不惟其能讀古書。亦須略曉遠西識病探原之術。嘗怪世之業中醫者。多守淡泊之方。以寡過。所遇之病。萬殊。所用之方。若一。然其交遊聲氣。足以左右視聽。儼然執中醫之牛耳。於是西醫之黠者。指以示人曰。中醫其可廢。夫不惟其術。而惟其人。中醫誠可廢矣。吾嘗以此憤其人。而惜其術。既而思之。人之欲善。誰不如我。彼若

不能而已。苟使其可幾及。彼將勉而進焉。於是忘其固陋。奮筆著傷。

寒今釋金匱今釋。示讀古書之程則。又奮筆著診斷治療內科諸篇。

示識病探原之術。依證簡方之要。黜玄奧之浮辭。采科學之實驗。授

徒四方。課其殿最。將使學者得此荃蹄而自求焉。以成不可廢之中

醫業。未及半而得葉君橘泉之近世內科國藥處方集。葉君治醫條

理從遠西。方藥從中土。蓋猶鄙人之志也。鄙人以科學闡證中土術

語。將先名論而後方術。葉君則先集丹方。繼成此編。逕從事於方術。

曩於雜誌中見其稿。以科學病名為綱。每病繫以方藥。臨床家得此。

可以按病簡方。方皆中病。庶幾一洗淡藥敷衍之習。鄙人縱不必因

此擱筆。使其書成。亦不能遠過葉君已。夫中醫誠欲爭勝。必自簡方

始。業中醫者。未必人人能讀古書。更未必人人能曉遠西識病探原。

之術。今得葉君書。亦可療儉腹。若并此而不能讀。則中醫誠可廢矣。
葉君將梓行其書。馳郵索序。書此以諭中醫之好爭勝者。乙亥孟冬
陸淵雷序。

葉序

近世西醫之研究中醫者。類致力於單味藥物化驗。意謂中醫優點。祇此一端。豈知中醫所長。不僅在單味之藥物。而兼在複合之方劑。且藥物之數量有限。縱能逐一化驗。而方劑之配合無窮無盡。又焉能和合化驗之。西醫藥理學中有所謂協同作用者。謂二種以上之藥物。一時並用。所發生之效力。遠在每個藥物獨用之上。此意義略同中醫方劑學。而此類藥品殊不多。餘則矯味賦形。強供佐使。名蒸一方。實僅一藥。以應村複雜萬變之病機。乃時有顧此失彼之慮。葉君橘泉纂「近世內科國藥處方集」。應用科學原理。說明古代效方。啓發中醫之新知。破除西醫之成見。胥在是矣。

葉古紅

近世內科國藥處方集郭序

醫療工具，首推藥物；藥物應用，當依法則；否則漫無歸納，臨床者必將荒亂無憑，於是處方學尚焉！處方學者，當醫師授藥病人，命藥劑師調製之際，記述藥品，及必要條件之謂也。

葉君橘泉，精通中西醫學，博學士也。近編內科國藥處方集一書，徵序於余。夫中醫處方，多屬複劑，視配合如何，有種種複雜的作，用，能超乎單純藥治學之範圍。例如四逆湯，附子乾薑並用，可使興奮作用增強。承氣湯，大黃芒硝並用，可使通下作用增強。所謂協同作用是也。半夏製以薑礬，能令刺戟性減殺。大黃製以酒蒸，能令通下性減殺。所謂拮抗作用是也。此種單純的協拮作用，徵之現代藥理學，其理原無二致。至如涼膈散，解熱劑與通下劑並用，治急性炎

症熱。藿香正氣散，發汗劑與調整胃腸劑並用，治冒寒之輕性下利。又如黃龍湯，於通下劑中加人參之強心，藉救急下於垂危。抵當湯，於攻血劑中加大黃之瀉下，能使病血之速去。諸如此類，不一而足。此乃複雜之藥理作用，能使醫療效力充分發揮，實為中醫學上獨特之巧思，足與西醫學以借鏡者也。

惜乎中醫治病，全憑經驗，無完備之基礎學科，實驗成績，反為玄說所累。此種精義，迄今能道之者益寡。葉君斯作，能本此目標，用科學分析參證之法，將國藥處方真義，一一詳為闡發，是其貢獻於世界醫學者至宏，余可無贅焉。

惟研究處方，先宜明瞭藥性。歷來本草，主治雖詳，藥理多晦。學者倘能取余所著漢藥新覺一書而熟玩之，再進而研究斯學，或能

更收事半功倍之效，質之葉君，以為然否耶？是為序。

中華民國二十四年民族掃墓節郭若定序於崧縣石飛邨之杏廬

王序

吳興葉橘泉先生醫學湛深，寫作豐富，醫林同道，靡不景仰。茲者鄙人與嵯縣郭若定先生創辦「明日醫藥」雜誌，葉君讀後，惠函贊許，謂該誌取材謹嚴，態度客觀，譽為國醫科學化刊物之嚆矢。並加入主編之列，以厚陣容。

最近葉君編著「近世內科國藥處方集」行將問世，囑序數言，以弁其端。此書優點在以現代新說解釋國醫治療方法及其藥效；而用藥分量，則以萬國公制（格蘭姆）為準。此書一出，不但國醫界可得一標準醫典，即科學家欲明中國醫藥學術之精義者亦有途徑可尋焉。

竊喜此書裨益實用，有功學術，故樂而為之序。

中華民國二十四年十月廿七日王藥雨序於天津南開大學經濟

研究所

李序

生活者。戰爭也。動物界之羽以飛。蹄以行。類皆有其順應環境。防護自衛之本能。蠶。螭。刺以却敵。螳螂臂以禦侮。其最著者。馬。人為萬物之靈。智力遠勝一切。衛生保健之方亦獨詳。醫藥其一也。考上古原人時代。穴居野處。茹毛飲血。榛榛狉狉。終日周旋於競爭生存之場所。其齒銳。其消化力強。可以齧堅革而啗生蔬。其皮膚密緻。沐風櫛雨而無虞傷寒。論者遂謂上古之人民。尻有尾。所以謀蟠據樹林。以避洪水猛獸。上古之人民。被長毛。所以代衣着以禦風寒。此後烹調興而齒日以弱。宮室具而皮膚耐寒力漸以退。此達爾文進化律所以有「世界動物之身體。一方面有進化。一方面定有退化」之說也。吾人於生活享受。既日臻進化。前此沐風櫛雨。茹毛飲血之

本能亦遂銷磨於宮室烹調之奉。而日益退化。於是內因飲食外傷風寒。凡一菌之微。一氣之偏。咸得以施其虐。而受其侮。全身生活機能乃時時處於備戰狀態中。其異乎生理所起之病理症狀。蓋即正氣與細菌及有害物戰爭之結果。前入所謂正氣。即今之所謂自然療能也。自然療能欲驅病於腸也。則瀉之。欲驅病於胃也。則吐之。欲驅病於表也。則汗之。第有時自然療能之力有所不及。汗之而不微。瀉之而不盡。吐之而不能。由是醫藥尚也。醫藥者所以輔助自然療能之力有所不及也。腹痛拒按而應用瀉下。身體無汗疼痛而應用表散。痛為自然療能不勝其力之感覺。用藥以汗之下之。即順其自然療能之要求。而增厚其作汗瀉下之力焉。何者宜下。若何宜表。其對象復須綜合觀察。其舌色脈象自覺他覺等整個病態表徵。寓科

學於經驗。憑證候以施治。為國醫學之特長。有非科學理想如冰囊退熱。麻醉止痛鎮痙。所能幾及也。葉君橘泉。於中西醫學極深研幾。鑒於歷來空洞理論。足為經驗方劑累。乃採集西醫之病理。病原定。症狀。以國醫使用有效之方劑論治療。振筆以著「近世內科國藥處方集」。斯書出。使向之游思騁辭於五行生剋。悠渺莫可究詰之域者。今則按圖以索。可以回到實際。而世之懷疑國醫學說者。亦可。以悟矣。泯除畦畛。張皇醫學。葉君之功大矣哉。

民國四年乙亥冬豐城李克蕙拜撰

張序

中國醫學創始於四千年以前。自神農氏嘗味草木。和僦貸季理色。脈而通神明。黃帝歧伯相問答。而作內經。雷公俞跗察明堂。究息脈。巫彭桐君處方餌。而人得以盡天年。周秦有醫和醫緩。長桑盧扁諸子。稟承絕學。神而明之。史籍所載。斑斑可考。迨漢季張仲景出。憫宗族之淪喪。傷天橫之莫救。乃勤求古訓。博采衆方。著傷寒雜病論十卷。承先啓後。集醫學之大成。晉唐以降。名賢輩出。代有發明。醫藥學術燦然大備。民族賴以繁衍。生民無慮天札。惜其間為方士所渲染。理學家之推行。致令性命致用之學。漸流入虛玄微茫之境。學者憧憬於陰陽五行。司天運氣之言。莫能自拔。由是學說紛歧。出奴入主。而清代時方派。又以纖巧見長。古法不講。醫道愈晦。政府不加扶。

植社會心懷。攜貳衰頹至此。岌岌乎不絕如縷。嗚呼。枉有悠久之歷史。坐是國粹淪亡。可不急起直追。一思所以挽救耶。

夫他山之石。可以攻玉。際茲西醫勃興。以科學相標榜。時代演進。日新不已。而我國猶墨守舊法。故步自封。詎能相抗。有識之士。倡言改革。博采新知。著書立說。闢謬誤而求真諦。然矯往過正。往往流於偏激。主觀所在。遂演成拔趙幟易漢幟之勢。所謂全盤西化。而國醫之精粹。反摧毀無餘。保存國粹云乎哉。科學整理云乎哉。頑固者流。因得藉口阻撓。醫學改進之航。於以擱淺。

雖然。事實勝於雄辯。西醫建築於科學之上。一事一物。信而可徵。理論之明晰完備。無可諱言。而中醫藥物方劑之精詳。亦未可抹煞。故欲言改進中醫。必於斯二點。宜加之意。今葉君之內科處方集。乃深

得此旨者也。

葉君著作等身。曩成藥學大辭典。以卷帙浩繁。尙未殺青。於藥物學
精研有素。抱革新中醫之旨。故於西醫學說有深刻之研究。嘗見其
臨床治病。解釋病理。一以西說為宗。立方用藥。必明其效能。而不囿
於舊說。寒熱配陰陽。五行配五藏之見。今本臨床所得。而成此書。庶
幾得改進中醫之道。而為迷惘歧途。新奮兩失之醫家。獲一指鍼焉。
心佩之餘。因不揣文陋。而為之序。

中華民國二十四年雙十節吳興張禹九謹識

宋序

醫學之效。實基於藥。章太炎氏所謂蛇荒之世。各有其治金創之藥。鈴醫用之十愈其九。大醫和齊數味以為大方。東洞吉益曰。夫秦張之治疾也。從其證而不取其因。故其能治疾也。在方中其證矣。斯不知其方意。則未能中其證也。其知其方意。在知藥能也。能知藥能。而後始可以言方矣。故醫藥之功。至張長沙而極。孫真人之千金。王持節之外台。巢太醫之病源。均能以質勝文。雖變之初極。猶為近古。宋元以來。徒崇虛玄空論。治效反少徵驗。清季溫熱盛行。畏麻桂柴葛如砒酖。奚能祛病。葉子橘泉。參閱中西醫籍。及臨床診治經驗。成近世內科國藥處方集。先以傳染病篇殺青。以自序例言索序。觀其以「中醫學之基礎。純粹建築於經驗之上。搜輯之處方。以經驗

上素著確效且合於藥理者，若清代蘇派時方如陳脩園氏所謂藥子藥等概不採入。等語。足徵用藥處方均取法乎上。與病相應。必捷於桴鼓。茲篇之刊。誠不容稍緩者矣。是為序。

歲次旃蒙大淵獻且月吳興宋鞠舫綴於賦梅花館

李序

方今國人高唱整理古醫學之聲。而整理之業績。未嘗能據實驗以言科學也。蓋夫我國醫學。亘古相傳。陰陽儒道之論。僉以虛玄競尚。宋以後。士大夫侈談性理。而其風益張。陳陳相因。迫科學維新之今日。載鬼一車。猶火尚熾。欲戰之弭之。誠戛難也。然賢者仍以握實為歸。渙汗大號。思有以倡革舊說者。蠡起。惜乎篤好舊學之士。迷於中西體用之說。徒見迷而不作。鈞元附會。固未嘗當於真理。補苴及于毫末。科學烏是云乎。良以實驗之難。非如空中樓閣。彈指即現也。葉子橘泉篤學士也。識卓理融。淹通新舊。灼知吾國古醫學之精華。不在玄渺之病理。而在功偉之藥物。孜孜所求。以鑽研國產藥物之理。學為志。今更出其餘緒集成「近世國藥處方集」數卷。余觀其成。

知其詔修謹嚴。選擇慎密。說尚確實。語不空妄。集國產藥物之處方。證以新醫學之理論。語覈精箴。鞭解入裏。闢舊醫科學化之新徑。非牽強附會之作所能阿比也。斯集既出。舊醫料學化之完成。其始兆斯朕歟。余樂為之序。

民國二十四年十二月二十日上海李蕪序於元元草堂

張序

近世醫學。最先是有解剖。有了解剖方有生理。有了生理方有病理。有了病理方有治療。用藥是治療中間的主要手段。尤其是內科。中國醫學就因為藥物的豐富。所以特別以治療內科著稱。故研究中國醫學。先須研究中國藥物。中國藥物向來只重經驗。其適應於病理之藥理的說明頗感缺乏。吾浙雙林葉橘泉先生研究中國藥物。久負盛名。新有「近世內科國藥處方集」之刊行。採用生理器管系統分篇。而以病理之對像。說明藥理及其配伍起的功能。這在學術上的貢獻是十分偉大的。二十五年一月八日。張忍庵客次都門。

近世內科國藥處方集

自序

日本和田啓十郎曰。一理論之完備莫若西醫。方劑之周到莫如中醫。故予視病常徵以西醫之理論。而用中醫之藥方。一旨哉斯言。著者平素研究醫學不分門戶。參閱中西醫書及臨床治療經驗。深知西醫長處在理論。短處在治療。中醫則適得其反。理論不合科學。而經驗的藥物和治法確有良效。故對中醫理論決拋棄一切舊說。而專從事斬棘披荆。搜求經驗效方。以國藥治病。而以科學說理。習之既久。信心愈堅。竊謂欲謀中國醫藥之發皇。舍此莫由。

中醫學之基楚。純粹建築於經驗之上。古時雖不明藥理和生理的作用。然已熟知藥物之功效。雖不知病理和病原的真相。然已

詳審其病勢之趨變。中醫之治療處方。全憑患者所顯徵狀。尤其是綜合的觀察整個病體之病變傾向。如神色、脈搏、熱度、呼吸、汗液、二便、胸腹、舌苔等。從種種自覺的他覺的症候之中。搜捕其主徵。而診斷定為表、裏、虛、實、寒、熱等病症。以處宜汗、宜下、宜吐、宜攻、宜補等治法。至對傳染病之處方。雖似無細菌學上的原因治療。然却能輔助體工自然抗病能力之發展。且國藥之具有滅菌抗毒作用者。當亦不在少數。第古時不知細菌為何物。故雖明明認識其功效。亦祇能以「辟鬼惡」「殺靈毒」「去三尸蟲」等想像名詞。以說藥性耳。

西方醫學之於生理、解剖、病理、細菌……等。誠然分析細密。說理明白。但是對於內科的治療方面。除僅有的幾種特效藥外。餘如對症處置之熱高則用冰。狂躁則給與麻醉鎮靜等。殊太違反生理。

自然即同是對症之治療。每拘執病竈而疎忽整個病體之病變趨向。即此一端。較之中醫療法似遜一籌。因為研究生理。允宜分析統系。劃清界限。迨人體病時。勢必比牽彼應。蓋生活機體。天然具有反射抗病之能。決不能與為生命之機件等觀。

我國特產種類繁富之有效良藥。因古時不明病理之原。故雖認識其功效。亦不得不傳會五行生剋。以五味五色……等荒謬玄說空論藥性。致不能得近世科學醫學上所能儘量利用。其中雖有立竿見影之癒病奇績。竟被一般人認為莫測神秘。不可思議。其實藥物所以能奏癒病的功效。自有學理可徵。若不徵之以科學學理的研究。則有效良方長此淹沒不彰。豈不可惜。

著者生平治醫的宗旨。理論則悉宗科學新說。治療則採用國

藥古方。於此從事研究。不但理無扞格。且覺事半功倍。深信依此目標。研精改進。則可使中西融合。新舊孕育。產生一種更完美的醫學。此則不僅中醫完全科學化。而國內西醫亦必因此而邁越歐美。將成為中國獨特的醫藥學術。本此理想。所以不辭粗淺。以平時研究所得。和臨床的經驗。搜羅我國古方。依據主徵治療。尋求近世理論。內科症狀之合拍者。更考徵處方中藥物的作用。如興奮、鎮靜、刺激、緩和、收斂、瀉下、發汗、利尿、清涼、強壯、滅菌、防腐、改血、變質等。是否與科學的病理相符。選擇其較明顯而合理者。收集編訂。名為「近世內科國藥處方集」。意在擷西醫理論之精華。而改革中醫之謬說。採中藥療法之特長。以彌補西藥治療不完備的缺憾。一以俾西醫知所利用。國藥處方。一以冀中醫知病原病理的真相。從此破除隔

閱。不僅中西醫界免去衝突。且可雙方攜手互相探究。惜著者為此
筆路藍縷之工作。限於個人的知識學力。自知十分簡陋。希望醫界
明達。不河漢斯旨。果能循是途徑而研幾精進。則中國醫藥學術上
或得放一異彩。為著者所馨香祝禱者也。

例言

一 本書論病原病理症狀等悉本近世新說根據內科全書節選其理論編訂而成治法之處方則均宗經驗古方如仲景傷寒金匱及孫民千金方王氏外臺秘要……等書選輯而來

一 本書對於病名先之以科學名詞審定名繼之以日本譯名再殿之以中醫舊稱之病名列成對照俾閱者一覽瞭然

一 國藥方劑的治療係注重整體的病變傾向作宜汗宜下宜攻宜補……等療法其目的在輔助體工自然抗病能之發揮而不在絕對的病原故病原雖不同而顯同樣的症狀時一方能並治之如麻杏石甘湯對於肺炎有效於室扶的列之相當時期亦有效如斯之例本書中屢見之讀者請注意

一 古方劑對於藥物有居臣佐使之別除君藥之外其他佐使之藥可以臨時更動故同是一病可據其症狀之進退而加減其藥物或增損其分量固不必拘執定方本書於每病之後收載處方多者十餘則少者四五則亦不過示其軌範讀者於臨床之際斟酌病情隨宜加減自成化裁可也

一 本書搜輯之處方以經驗上素著確效且合於病理及藥理者為條件若清代蘇派時方如陳修園氏所謂「果子藥」等因其無實效故概不採入

一 古方藥量有謂漢之一兩即今之二錢二分許者又有謂當今之一錢餘者或謂古之一升當今之二合半者又有謂當今之三合三勺者莫衷一是即今之分量又有舊制新制之相差故

本篇折衷其分量概用近世通行之公分制（格蘭母）簡稱「格」如一・〇者為一格一〇・〇者為十格〇・五〇者為半格依此推算一格等於今舊衡制約二分六厘八毫新制現行中國標準衡約三分一厘強

一 處方中作若干西西煎劑者概係用水一倍或二倍量煎至半量去渣濾清用之如作二百西西煎劑則用四百西西水煎蒸發至餘二百西西或至剩一百西西濾出藥液再加水二百西西煎至一百西西去渣合前共得二百西西即得「西西」為液量量器藥房有售名「量杯」係玻製杯狀外面刻定容量度數計算極便

一 本書為媾合中西醫學而作西醫欲研究中藥治療者中醫有

志改進而欲科求學學理解釋者以及關心醫藥欲較量新舊醫學之短長考求中西治療之得失者均應讀此篇

一 本書編輯為叢書性質先從傳染病篇着手茲篇（傳染病篇）收編在我國發病之傳染性疾病三十一種共搜輯處方一百八十一則共約八萬餘言先印單行本容俟再編消化器病篇呼吸器病篇……等陸續編訂如時間許我則務將內科各類諸病編齊而止

一 編者年才俱微學驗均淺謬誤之處在所不免況此草創體例在我國醫書中尚為嚆矢深望海內鴻博加以教政則感拜良殷如讀者在本書範圍以內欲與編者討論研究甚為歡迎

目錄

一	腸熱病	一——一六
二	丹毒	一六——二八
三	大葉肺炎	二九——三五
四	支氣管肺炎	三五——四〇
五	流行性腦脊髓膜炎	四一——五一
六	百日咳	五一——五七
七	淋病	五七——六四
八	桿菌痢疾	六四——六九
九	亞細亞霍亂	六九——七五
十	破傷風	七五——八三

十一 白喉病

八三—九一

十二 流行性感冒

九一—一〇〇

十三 釀膿性病

一〇一—一〇六

十四 倍斯忒

一〇六—一一五

十五 炭疽

一一五—一二五

十六 麻風

一二五—一三五

十七 肺結核

一三五—一五三

十八 淋巴系結核

一五三—一六九

十九 腸結核

一六九—一七八

二十 阿米巴痢

一七八—一九三

二十一 瘧疾

一九四—二一二

二十二 回歸熱

二一二—二二〇

二十三 梅毒

二二〇—二三五

二十四 線蟲病(蛔鏡)

二三五—二五一

二十五 痘瘡

二五一—二七〇

二十六 水痘

二七〇—二七五

二十七 猩紅熱

二七五—二九〇

二十八 麻疹

二九〇—三〇三

二十九 流行性腮腺炎

三〇三—三一

三十 瘰癧

三一—三一七

三十一 黑熱病

三一七—三三一

傳染病篇

(一) 腸熱病(腸室扶斯)日本譯作腸傷寒(中醫舊稱「溼溫」「伏暑」等病)

〔病原〕 於一八八〇年。德醫伊倍氏 *Tiberth* 查明致此病之細菌為一種略粗而短多細毛而甚活動之桿菌。特名傷寒桿菌。由接觸傳染。如手指食物或蒼蠅飲料水等為媒介。該菌在水中能生活數星期。在牛乳中能活至數月。在土壤上層能活至十一個月。故暴露於空氣之食物如被含有該菌之塵埃所染亦能傳染本病。本病大概由經口的傳染。分佈於胃腸尤其於小腸為該菌最易侵害之區。本病為菌血症。患者之血中亦含有本病之桿菌。

〔病理〕 腸部患卡他性炎。淋巴組織改變增生性過長。腸淋巴結或壞死而脫落。腸粘膜炎生瘡潰爛出血。或腸穿孔。腹膜充血發炎。脾臟增大。肝內生膿腫。胆囊發炎。膀胱發卡他性炎。肺及血循環神經系統等至末期往往顯發炎症狀。

〔症狀〕 潛伏期八日至十餘日。其時略覺疲倦厭食。熱度漸增。舌白而有苔。腸微膨脹。按之或痛。脾腫大。大便或秘結或稀薄。腹部發桃紅疹。在此星期或有咳嗽及枝氣管炎。第二星期熱度高而不降。脈搏速而細弱。精神遲鈍。唇乾舌亦乾。腹脹按之痛。或腹瀉則加重。第三星期病重者脈搏一百十至一百三十。熱度漸退。身體瘦弱。或從此始起水瀉及腹脹。倘此期併發肺炎及心臟衰弱。譫妄肌顫跳者為險狀。第四星期輕者至此期漸退。舌苔淨盡。諸患悉停止。病重

者身尤弱。脈搏尤速而弱。舌乾。迷睡呢喃。譫妄。肌顫跳。大小便失禁。心力耗竭。衰脫。或腸穿孔而死。

〔治法〕 處方一 小柴胡湯 柴胡一〇・〇 黃芩四・〇 太子

參四・〇 甘草四・〇 大棗四枚 生薑四・〇 姜半夏七・五

右七味。剉作二百西。煎劑去渣。一日分三次溫服。

適應症 腸熱病早期。寒熱往來（弛張熱）胸淋巴管炎。胸脅

苦悶。嘔吐或腹痛。熱入血室。煩悶譫語等症。

〔方解〕 柴胡為清涼性解熱藥。專治胸脅苦悶。寒熱往來。腹中痛。

脅下痞鞭等證。有疏導淋巴總幹消炎及輕瀉作用。對於時氣瘟疫。

潮熱煩悶。瘧瘧。頭疼目眩。血分熱毒瘡癤等有效。

黃芩為殺菌消炎藥。有清胃腸利胆道解熱排毒作用。對於心下痞。

胸脅滿。嘔吐下利。諸熱黃疸。天行時熱。疔瘡腫毒。上部積熱。急性充血。目赤腫。吐衄。熱喘煩悶。及急性胃腸炎之吐利等有特效。因本品有消退急性充血性炎症之功故也。

太子參（人參之秧參功效與人參相同）為營養性強心健胃藥。主治心下痞堅。胃機能衰弱之痞悶不欲食嘔吐噁心。口渴。衰弱性短氣。精神恍惚。夜寐不安等症。蓋本品有苦味健胃及鼓舞新陳代謝。振起血液循環之作用。故對於脈搏細弱。精力衰弱等症有特效。

甘草為粘滑性緩和藥。能滋潤內膜。故能緩解一切急迫腹痛腸絞痛。淋痛喉痛等症。其成分富含粘液澱粉樹膠等。能奏機械的包攝化學的中和作用。以緩解其他藥物及毒素的刺戟。所以古稱解百毒也。

大棗為滋養性緩和藥。能緩和酷厲液。療咳嗽聲啞。咽喉刺戟。及胸肺諸症。並滑利大便。及小便淋痛等。

生姜為健胃發汗止吐藥。兼有祛痰鎮咳之功。因其富含揮發油。能刺激消化器管之神經。以奏健胃之作用。

半夏為鎮嘔鎮咳祛痰藥。對於消化器及呼吸器內之水毒粘涎。有排除驅逐之能。治嘔吐痰飲。心胸逆滿。咳悸腹中雷鳴等。

處方二 大柴胡湯 柴胡一〇。〇。黃芩六。〇。大棗四枚

芍藥六。〇。生姜七。〇。枳實五。五。半夏七。五。大黃五。〇。

右八味剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 腸熱病胸脅滿。發熱嘔吐腹滿脹痛。心下急。舌黃苔。往來寒熱下利不爽。或便秘等症。

〔方解〕 芍藥為鎮痙鎮痛藥。能緩和攣急。治腹痛頭痛及上部充血下部貧血之少腹攣急足膝抽痛等。因本品內含安息香酸鞣酸等。具有鎮靜消炎作用故也。

枳實有健胃祛痰利尿作用。主治消化道結實之毒。並胸滿腹痛。逐腸胃痰飲。停水。治上氣喘咳。兩脅脹滿。嘔逆。傷寒結胸等證。

大黃用少量為苦味健胃藥。大量為瀉下藥。且具有誘導性消炎作用。用於蕩滌腸胃。排除瘀熱毒素。治傷寒時疫發熱譫語。黃疸水腫。目赤齧腫。溫毒斑疹。一切實熱。血中伏火。瘀血疼痛等。並能通經行水消腫。

柴胡 黃芩 大棗 生姜 半夏 均見前

處方三 猪苓湯 猪苓一二。○茯苓一四。○阿膠一○

○滑石一五。○澤瀉一四。○

右五味剉。作三百西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 腸熱病發熱身重。腹膨滿下利。小便不利。或使膿血。心煩不得眠等。

〔方解〕 猪苓為利尿藥。有清涼性發汗作用。用於傷寒瘟疫大熱煩渴。腫脹淋濁下利瘧疾等。有消炎解熱排毒之功。

茯苓為作用於心臟及腎臟之利尿藥。治心悸亢進。肉瞤筋惕。頭眩煩躁。小便不利。咳逆水腫等。有排除水毒鎮靜神經之功。

澤瀉為利尿藥。以利尿的減少或頻數。與胃內停水為目的。治眩冒消渴。腳氣溼熱。溫暑煩躁。浮腫喘咳等症。有鎮靜清腦健腎作用。

阿膠有止血作用。對於血液之凝固性減弱。與血管壁弛縱致滲透。

亢進而出血者有特效。又為粘滑藥。有緩和包攝作用。緩解組織之緊縮。或包攝創傷及糜爛面。且滋潤組織之枯燥。如由此原因而發之疼痛出血。排膿及尿利減少。或咳嗽等為本藥所主治。

滑石為粘滑藥。內服或外用均同奏其粘滑包攝之作用。如膀胱尿道或腸管之炎性粘膜面被以包攝覆護。故令利尿或止瀉且同時有消炎排毒鎮痛之功。

處方四 葛根黃芩黃連湯 葛根二〇。〇甘草五。〇黃

芩七。〇黃連四。〇

右四味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 腸熱病發熱下利痞悶。心中煩。氣喘汗出。項背強急

等症。

〔方解〕 葛根為清涼解熱發汗藥。有排毒及緩解神經肌肉之強直。及鎮靜鎮痛作用。因其含有多量澱粉。故有除煩生津止渴止瀉之功。

黃連為苦味健胃及消炎藥。主治心中煩悸。心下痞。吐下腹中痛。蓋胃及腦部充血或炎症機轉而致精神不安。心中煩悸等。用本品以消炎解熱能奏特效。又如胃炎腸炎。胆道炎。眼結膜炎等。一切充血性炎症均有良效。

甘草 黃芩見前

處方五 梔子厚朴湯 梔子一二。○厚朴八。○枳實六

右三味作一百五十西煎劑去渣。一日分二次溫服。

適應症 腸熱病心煩腹滿下利或便秘黃疸呼吸迫促臥起不安不得眠身重腹痛等症。

〔方解〕 厚朴為芳香性健胃藥。對於因瘀血水毒食毒充實腸管麻痺而瓦斯體充滿所發之腹脹胸滿等症有特效。並作用以腸神經系。故能治腹痛嘔吐等症。

梔子為消炎性利尿藥。治充血性及炎性機轉之劇性心煩發黃出血。血痢血淋。有殺菌解毒止血解熱之作用。

枳實 見前

處方六 梔子藥皮湯 梔子一五。○甘草六。○黃蘗一

二。○

右三味剉。作二百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 腸室扶斯併發黃疸鬱血發熱等。

〔方解〕 黃蘗為有力之消炎止血收斂藥。有殺菌解毒激膽利尿

解熱治瘡作用。對於腸熱病之小腸生瘡出血。膽道發炎等有特效。

梔子 甘草 均見前

處方七 生姜瀉心湯 半夏一〇。〇甘草五。〇太子參

六。〇黃芩七。〇大棗五枚黃連二。〇乾姜二。〇生姜七。

〇

右八味剉作二百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 腸熱病。心下痞。乾噎。食臭。腹中雷鳴。下利。發熱。嘔

逆。胃痛。鼓腸等。

〔方解〕 乾姜為興奮性健胃藥。有振起胃腸機能。驅逐水毒作用。

能止嘔吐下利。消食逐涎。用於胃腸機能衰弱而痞悶腹脹等症有特效。

半夏 甘草 人參 大棗 黃芩 生姜 黃連 均見前

處方八 白頭翁加甘草阿膠湯 白頭翁八。○黃連六。

○黃蘗一。○。○秦皮一。○。○甘草五。○阿膠八。○

右六味剉細。作二百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 腸室扶斯小腸生瘡。下利粘涎血便。胸中煩熱不眠。腹痛裏急後重等。

〔方解〕 白頭翁為消炎性收斂藥。治熱性下利。血利腹痛。溫瘧血痔。熱毒腫痛。有涼血殺菌鎮痛作用。本品特作用於大腸部分。可謂腸熱病之特效藥。

秦皮為清涼性消炎收斂藥。有利尿發汗作用。對於腸炎下痢瘧疾黃疸水腫等有效。

甘草 黃蘗 阿膠 黃連 均見前

處方九 厚朴七物湯 厚朴九。五甘草四。○大黃七。

○大棗五枚枳實五。○生姜六。○桂枝二。五

右七味剉細。作二百五十西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 腸傷寒腹滿發熱。嘔逆。大便不通。腹脹或痛。脈浮數。或下痢。肢痠。胸中不爽快。及頭疼等症。

〔方解〕 桂枝有融和溫壯神經活潑末梢血管作用。用於心臟衰弱精神虛疲之症。能振奮精神。又有健胃驅風之效。患者有虛憊之神經熱。腐敗性熱。尤兼腸胃諸症者有效。因本品有芳香性揮發油。

及樹脂護謨糖質單甯酸等。內服作健胃及防腐利尿之用。又可應用於神經性諸病。蓋揮發油於通常量雖不可謂有吸收作用。然其一部自肺排洩。容易咯痰。故應用於氣管枝疾患。又其一部與室素酸抱合而出於尿中。故呈利尿作用。

甘草 生姜 大棗 枳實 厚朴 大黃 均見前

處方十 黃土湯 灶心黄土二〇。〇甘草一〇。〇地黃一五。〇白朮一二。〇附子六。〇阿膠一〇。〇黃芩七。〇右七味剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 腸室扶斯之腸出血。裏虛腹軟弱無力。外表煩熱。

心臟衰弱。惡寒手足厥冷。或煩熱與厥冷交代。尿利減少。瀉下頗易。皮現貧血衰弱。脈搏沉微。羸瘦或微腫。發熱。精神恍惚等危篤症候。

〔方解〕 黃土一名伏龍肝。卽灶中久燒之焦黃色焦土。本品為溫性收斂藥。有鎮嘔止血之特能。用於心痛及反胃腹痛下血吐血尿血崩漏腸紅等有特效。外用醋調可塗癰瘡。

附子能振起全身代謝機能。強心通脈。治精神衰憊。體溫減少。貧血厥冷。脈搏微弱。四肢疲倦。脫力。腹壁軟弱無力。大便失禁。或鬱血浮腫。神經失養而疼痛或麻痺。一切藏器組織機能之沉衰。若機能不致於完全絕滅時。內服本品。則能振起復興是等機能也。

地黃有止血利尿強壯強心解熱鎮靜諸作用。用於血脫血虛貧血虛弱及臍下不仁為目的。其他如煩熱瘀血。婦人月水不通。鼻衄吐血傷中胞漏下血等證。能破惡血養陰。乃至五勞七傷。掌中及足下熱而痛等。

白朮為利尿藥。有健胃之功。兼主胃內停水。治心腹脹滿。下利止嘔。除溼。為胃腸卡他性炎症之效藥。

黃芩 甘草 阿膠均見前

(二)丹毒(血蛇)又名瘰癧(中醫舊稱大頭瘟或面遊風)
〔病原〕 由丹毒鏈球菌從輕微之傷口或鼻粘膜直穿過組織而至於皮膚因菌毒刺戟而皮顯發炎蔓延。

〔病理〕 患處皮膚發炎性水腫。其球菌常寄生於淋巴微隙。而在炎處蔓延之四圍尤多。至炎圍外尚未受累之組織其菌多寄於淋巴管。肺脾腎或致硬塞。甚或致全身顯膿毒血病之症狀。亦或顯惡性心內膜炎。膿性心包炎。胸膜炎。急性腎炎等。間或有顯腦炎及肺炎者。

〔症狀〕 本病潛伏期三至七日。內科範圍之丹毒。多為顏面及頭部症狀。侵入期多發寒戰。繼則溫度升高。旋發鼻旁及頰紅腫。皮膚緊張。光滑而色紅。捫之覺熱。間或表皮起皰。眼臉閉合。唇水腫。耳增厚。顱皮亦腫。面容變至不能認識。頸之淋巴腺腫大。腫勢蔓延展開。異常迅速。患部之紅腫邊緣與未患部界線劃然。體溫高至一百零三四度。至全身情況。關乎其生平之健否。老年體弱。尤其嗜酒者。自病起時元氣即已大虧。其狀譏妄。舌乾脈弱。或因血中毒而死。其炎腫的蔓延。有時由面至頸及胸。或至體之此處彼處。特稱為遷徙性丹毒。

併發症。心內膜潰瘍性炎。及膿毒血病頗多。肺炎腎炎間或遇之。

〔治法〕 處方一 普濟消毒飲 黃芩六。○黃連四。○玄參

一二。○甘草四。○桔梗五。○柴胡五。○橘紅四。○鼠粘子一。○板藍根一。○馬勃二。○連翹八。○薄荷四。○殭蠶八。○升麻七。○

右十四味。剉細作三百西西煎劑去渣一日分三次溫服。

適應症 顏面丹毒。頭顱及顏面紅腫。發熱無汗。氣悶嘔逆。口渴。脈浮數洪大。或咽喉腫痛。耳內痛。流水。目赤煩躁。咳嗽等症。

〔方解〕 黃芩用作清涼解熱消炎藥。

黃連為苦味健胃藥。有清涼解熱作用。對於上部充血性發炎諸症有效。

玄參為清涼解熱藥。有消炎解毒作用。並能潤內膜。鎮痛。治腫瘍瘰癧及祛痰鎮咳。

甘草為緩和解毒藥。

桔梗為排膿祛痰藥。能消腫毒。宣肺氣。治咽喉腫痛。解熱清頭目。柴胡為清涼性解熱藥。用為疎導淋巴管。消退淋巴系統之炎症。橘皮為芳香性健胃藥。有鎮嘔祛痰利尿作用。主治胸痺吐逆。上氣咳嗽。痰飲頭疼等症。

鼠粘子一名牛蒡子。本品為清涼性消腫解毒藥。治風毒諸腫。癰疽。痲癩。利咽喉。宣肺氣。利小便。

板藍根為清血解毒藥。有殺菌消炎清涼散腫作用。用於天行熱毒。疔腫風毒。痲癩等症。磨汁外敷。蟲蠍螫蛇蜂等傷。有解毒止痛之效。馬勃為消炎鎮痛殺菌解毒藥。用於咽喉腫痛。皮膚瘡腫。或喉痺聲音不出。積熱咳嗽吐血等症。因其有止血作用。兼有清肺散熱之功。

連翹為解凝性消炎利尿清血解毒變質藥。有時用為鎮吐藥。能消瘡毒。焮腫。如癰疽。瘰癧。疥癬。諸瘍等。內服以排除毒素。兼具有清涼性之解表殺菌作用。

薄荷為清涼藥。有解表健胃鎮靜作用。因其內含一種芳香性揮發油。能消焮腫。結腫。治頭疼發熱。無汗。咽喉腫痛。心腹滿。宿食不消。咳嗽等。

殭蠶為鎮痙祛風藥。有解毒散腫殺菌消炎收斂作用。用於喉痺諸瘡。癩症。風痺失音。丹毒搔癢。瘰癧結塊。一切瘡腫。時行溫毒。赤眼腫痛等症。

升麻為解熱解毒殺菌藥。專用於一切熱毒瘟疫。咽喉及口瘡諸症。寒熱風腫。瘴癘痘瘡。斑疹惡瘡。癰疽赤眼。疫痢頭痛等症。有清涼解

毒散熱鎮痛諸作用。

處方二 清震湯 升麻五。○蒼朮六。○荷葉七。○

右三味。作一百五十西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 丹毒。頭面腫痛。惡寒畏寒。皮膚成疙瘡。耳內雷鳴。舌苔白而熱度不高。嘔逆無汗。口不甚渴者。

〔方解〕 荷葉為清涼散血消腫藥。有發汗解表排毒殺菌鎮痛作用。用於痘瘡血熱。吐血下血。及瘀血水腫。赤遊丹毒等症。

蒼朮為利尿發汗祛痰藥。有健胃殺菌作用。用於瘟疫時毒。（急性傳染病）而熱度不高者有效。

升麻 見前

處方三 大柴胡加芒硝湯 柴胡九。五芍藥六。○黃芩

六。○大棗四枚。生姜六。五枳實五。○半夏七。○大黃四。

○芒硝七。○

右九味。剉作二百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 丹毒。往來寒熱。發嘔吐。頭疼。胸悶。脅痛。舌黃苔。口渴。

昏譫。大便秘結。而腹脹可下者。

〔方解〕 芍藥為鎮痙通經藥。用治上部充血性頭痛諸症。下部貧

血性拘攣腹痛等有效。

大棗為滋養性緩和藥。有鎮咳鎮痛作用。

生姜為健胃祛痰藥。有發汗作用。

枳實為健胃利尿藥。用治胸滿腹脹有特效。

半夏為祛痰鎮嘔藥。

大黃為瀉下藥。少量有健胃作用。用於熱病壯實而腹滿時。有蕩滌胃腸積毒之功。

芒硝為鹽類下劑。無刺激腸壁之性。對熱性病及他處有炎症者。使用本品有誘導消炎之功能。退水腫。治目赤煩熱。心下痞堅結。胸燥屎。大便難等。

柴胡 黃芩 均見前

處方四 黃連解毒湯 黃連四。○黃芩八。○黃藥七

○梔子一五。○

右四味。剉作二百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 丹毒發熱。煩躁口渴。胸中痞悶。瘟疫時毒。頭痛目赤。腫痛。或下利。神昏。脈數。舌黃等症。

〔方解〕 黃蘗為健胃收斂藥。有解熱利尿作用。對於熱病頭痛。下利煩渴等症有特效。

梔子為清涼解熱藥。有清血解毒作用。實用於熱病煩渴。上部充血性諸炎症有特效。

黃連 黃芩 均見前

處方五 大連麴湯 連麴六。○荊芥六。○通草三。○

防風六。○牛蒡子一。○甘草四。○蟬蛻三。○當歸八。○

○芍藥七。○柴胡六。○黃芩五。○山梔一。○滑石一。○

○車前子八。○

右十四味剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 風熱丹毒腫痛。頸項有核。顯腫。赤癩。眼目赤腫。口舌

生瘡咽喉痛。胎毒痘疹餘毒。及流行性感冒發熱。一切熱毒等。

〔方解〕 荊芥為清血消炎散熱解毒鎮痙鎮痛藥。用於風熱頭痛。

神經痛。血分熱病。流行性感冒發熱。煩躁咳嗽等。有清腦鎮靜作用。能治產後中風。破傷風丹毒。瘟疫等症。有特效。

防風為解熱散表疎風鎮痛藥。對於頭目風熱諸痛。風毒瘡腫。肢節疼痛。惡風發熱等症。有特效。

通草為利尿藥。其性清涼。有解熱消炎作用。治水腫癰閉。清頭目退熱。催乳。

蟬蛻為清涼性散熱鎮痙藥。治小兒驚癇痙攣。感冒發熱。咽喉痛。失音。皮膚瘡疹。疥癢。血分熱病。痘疹毒甚。煩悶透不出。眼目赤翳等。

當歸為和血通經藥。用於婦人月經胎產諸症。有鎮痛作用。治頭痛。

心腹諸痛。潤腸利筋骨。癰疽排膿。惡瘡金瘡。出血破惡血。養新血。蓋本品內含揮發油。有營養作用。而兼鎮痛和脈絡。患者身體衰弱。或血液有病時。用之有特效。

車前子為利尿藥。內服有排除毒素作用。以尿中毒時用之極效。滑石用為清涼性利尿藥。有緩和粘滑粘膜。消炎及收斂作用。

牛蒡子 連翹 甘草 柴胡 黃芩 芍藥 山梔 均見前

處方六 桃仁承氣湯 桃仁一〇。〇 大黃一二。〇 甘草

四。〇 桂枝五。〇 芒硝一〇。〇

右五味。剉細。作二百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 丹毒。或傷寒發熱。結在裏。譫語發狂。少腹硬滿。急

痛。大便不通。瘀血血熱。血中毒。鼻衄。熱毒上攻。頭痛。寒熱往來。煩渴。

或發黃目赤。齟腫。瘟疫熱毒。熱溶血症。痘瘡斑疹。癰疽。用此方快下。以排洩血中毒素為目的。

〔方解〕 桃仁為消炎性去瘀解凝藥。有殺菌殺蟲緩下作用。專用於血毒熱狂之病。能誘導以降低血壓。治血熱上衝。癰疽。斑疹。吐血。衄血。目赤。頭痛等症。兼有鎮痛鎮咳之功。

桂枝為健胃降衝藥。對於頭痛發熱。急性熱病而有心臟衰弱之趨向者。用之有預防心衰之功。

大黃 甘草 芒硝 均見前

處方七 犀角地黄湯 犀角三。○地黄二。○。○芍藥一

○。○牡丹皮一。○。○

右四味。剉作二百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症。丹毒。或傷寒瘟疫。發熱煩渴。神昏譫語。吐血衄血。舌色鮮紅。斑疹癰瘍。熱溶血發黃。一切熱病。血中毒等疾患。

〔方解〕 犀角為清涼解熱解毒藥。有殺菌及強壯強心作用。用於時疫發熱。發斑發黃。癰瘍痘疹。熱毒侵腦。侵心。神昏譫語。狂妄驚癇。瘧等症。

牡丹皮為消瘀清血通經鎮瘧藥。用於血熱煩疼。癰瘍腫痛。女人經閉。血滯腰痛。時氣客熱。頭痛。瘀凝腹痛。驚癇瘧。鬱血潮熱等。有通經脈。排毒素之作用。

地黃為清涼性解熱強壯藥。有清血生津作用。賞用於血分發熱諸症。

芍藥 見前

(三)大葉肺炎(中醫舊稱「冬溫」「春溫」「刺背痲症」等)

〔病原〕 於一八八四年勿倫克耳氏測定為一種肺炎雙球菌。侵入肺部。(此菌常居於健康人之口涎。百分中或有八九十含此)其傳染徑路。從鼻或喉頭而入。分佈於肺部。產生毒素。刺激肺細管發炎而起。

〔病理〕 肺部發炎。初期現充血樣。繼則顯紅色肝樣變。是時肺氣泡充滿血絲而成網。網中赤血球充盛。終期則變成灰白肝樣。肺組織色白。肺氣泡盛滿白血球。更進而變膿液浸潤期。肺泡中化膿腫。枝氣管淋巴腺增大。胸腹受累。或有滲出液。肝脾腎亦或增大。心包心內膜腦膜等炎。亦或見之。

〔症狀〕 潛伏期大約一二日。初起突發寒戰。即發熱頭痛。全身皆

痛悶數小時患側之胸刺痛。或甚艱苦。吸呼速促。咳嗽引痛。有時呼短呻吟。鼻翼扇動。痰極膠粘而略有血色。熱或至一百〇四五度。脈搏洪大而滑。本病熱升最速。或於十二小時內即升至百〇四五度。然自此至病極無甚增減。但小兒及初狀無寒戰者熱升不驟。老年及酖酒者熱度較低。亦偶有不發熱者。

〔治法〕 處方一 大青龍湯 麻黃四。〇桂枝五。〇甘草五

。〇杏仁一五。〇生姜七。〇大棗四枚石膏五〇。〇至一〇〇。

右八味。剉細作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 大葉肺炎。初期發熱惡寒。身體疼痛煩躁。脈浮緊。喘

逆咳嗽。無汗。或浮腫短氣而喘。肺炎肺脹之表症甚者。

〔方解〕 麻黃為發汗利尿藥。能治皮膚排洩機能障礙所致之喘咳。有排洩呼吸器及泌尿器間壅積之毒素。故對於肺炎喘咳。水氣浮腫。惡寒發熱無汗。身疼頭痛。一身黃腫。胸悶痰喘。肺氣膹鬱等症。有特效。本品不但發汗利尿。其成分中尚含定喘排毒逐水等作用。桂枝用作融和血脈。為精神疲憊及心臟衰弱之預防藥。甘草為緩和粘滑之鎮咳祛痰藥。

杏仁為鎮咳祛痰藥。用於氣管支加答兒。及喘息咳嗽。主治胸間停水。短氣。及結胸水逆。煩躁。浮腫等症。

生姜為祛痰健胃藥。

大棗為緩和性鎮咳祛痰藥。

石膏化學名為「含水硫酸鈣」。為清涼解熱藥。治發熱煩渴。溫熱。

時氣發斑發疹。解肌。清胃。清肺。消暑生津。因其具有鈣之作用。故能制止炎性滲出液。對於肺炎肋膜炎等一切滲出性炎症有特效。且能中和因熱病而起之酸性毒素。用於一切熱病及急性卡他性炎症。有制泌之功。

處方二 麻杏石甘湯 麻黃四。○杏仁二○。○石膏四

○。○生甘草四。○

右四味。剉。作二百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 肺炎發熱。喘咳。胸痛。煩渴。或面目浮腫。太息呻吟聲。

如拽鋸。及肺癰脈浮數。臭痰膿血。百日咳。咳嗽嘔吐等症。

〔方解〕 麻黃 杏仁 甘草 石膏 均見前

處方三 小青龍加石膏湯 麻黃三。○芍藥五。○乾姜

二。○甘草三。○桂枝四。○細辛三。○五味子二。○半夏七。○生石膏一五。○

右九味對作三百西西煎劑去渣一日分三次服。

適應症 急慢性氣管支炎及急慢性肺氣腫之肺脹咳而上氣煩躁而喘。脈浮。胸脅痛。悶咳逆倚息不得臥等症。

〔方解〕 芍藥用為鎮痙及收斂藥。對於上部充血性氣逆喘咳及腹部虛弱拘攣等症極效。

乾姜用作祛痰逐飲藥。對於慢性支氣管肺炎有特效。

細辛為鎮咳鎮痛藥。有逐水飲祛痰涎之作用。用於咳逆。胸滿脅痛。頭疼身痛。胸中痰水結滯。風溼痺痛。牙痛鼻病等症有效。

五味子為收斂性祛痰鎮咳藥。主治咳逆眩冒。定喘甯嗽。有滋養性。

解渴生津作用。用作退熱補虛。斂汗鎮靜等。功效頗著。

半夏為祛痰鎮咳鎮嘔藥。

麻黃 甘草 桂枝 石膏 均見前

處方四 厚朴麻黃湯 厚朴六。○麻黃四。○石膏五。○

○杏仁一五。○半夏七。○五味子三。○乾姜一。五細辛

一。五小麥三。○。○

右九味剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 急慢性肺炎。喘息。咳嗽。胸悶。腹脹。腹滿。熱高。脈浮。呼

吸器病而兼消化器病者。

〔方解〕 厚朴為芳香性健胃藥。有鎮咳平喘除脹等作用。

小麥含有多量之澱粉。有緩和包攝作用。其外皮有解熱消炎緩和

腦神經之特能。治心臟及神經病。歇斯的里亞等。止虛汗。煩渴。除客熱等症。

麻黃 石膏 杏仁 半夏 五味子 乾姜 細辛 均見前

(四)支氣管肺炎(小葉肺炎)又名毛細支氣管炎或卡他性肺炎(中醫舊稱溫邪上受首先犯肺等)

〔病原〕 有原發性及繼發性二種。而繼發性類較多。原發性之病原菌多為肺炎球菌。常侵多在二歲以下無恙之小兒。繼發性則每因麻疹。白喉。流感。猩紅熱。腸熱病。丹毒等急性傳染病而起者。亦有由飲食物偶然吸入於肺而起者。名吸入性肺炎。

〔病理〕 支氣管及細支氣管發炎。管中為滲出物所壅塞。管壁擴張。聽之有氣泡聲。受患之小葉有硬團。或至全葉實變而色較紅。

〔症狀〕 原發性者小兒突發寒戰。或驚厥。熱升極速。其肺症狀有時不甚顯明。被全身症狀或腦症所掩。繼發性者。初狀或為小支氣管炎。倘在患麻疹或天哮噎時。若病兒熱增。又兼咳嗽。脈搏與呼吸俱速。肺底或廣佈部顯溼鳴。發熱至一百〇二或四度間。升降靡定。皮極乾。咳嗽乾而艱難。或痛。呼吸困難。呼氣時頓到作齒輪聲。且甚速。每分鐘六十至八十次。甚則面色烏紅。指尖烏青。顯驚恐貌。繼則腦中樞中毒。咳亦停止。面愈發紺。而昏迷。枝氣管粘液加多。堵塞氣管而死。

〔治法〕

處方一 射干麻黃湯 射干四。〇麻黃四。〇生姜

八。〇細辛三。〇紫菀八。〇款冬花一。〇。〇五味子二。五

大棗四枚半夏七。〇

右九味。對細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 急性支氣管肺炎。熱度不甚高時。喘咳氣逆。喉中如水鷄聲。或支氣管性氣喘。慢性肺炎。支氣管卡他性炎。痰嗽氣逆。呼吸艱難等。

〔方解〕 射干為有力之消炎性解凝藥。兼有溶血及緩下作用。能消腫祛痰。治咳逆上氣。咽喉及氣管壅塞腫痺。消積痰。痰結。痰癖。疝癩。散胸中之熱。平喘息。咳嗽。有清肺而利大腸之功。

紫菀為鎮咳祛痰藥。治喘嗽氣逆。胸中寒熱結氣。喉痺。惡涎壅塞。能降氣散結邪。善治血痰。因其兼有和血作用故也。

款冬花為鎮咳祛痰藥。治咳逆上氣。氣喘喉痺。肺痿肺癰。咳吐膿血。為咳喘之要藥。

麻黃用為平喘發汗利尿藥。本品有擴張支氣管之作用。

生姜用為祛痰鎮咳健胃藥。

細辛為祛痰逐飲藥。有刷淨氣管分泌物之功。

五味子為鎮咳祛痰藥。賞用於衰弱性喘息咳嗽等症。

大棗用為緩和鎮咳藥。有祛痰作用。

半夏用為祛痰鎮咳藥。有鎮嘔逆平喘之功。

處方二 小青龍湯 麻黃三。○芍藥六。○乾姜二。○

甘草四。○桂枝三。○細辛二。○五味子一。○半夏七。○

右八味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 支氣管肺炎初起。兼有頭疼發熱脈浮等表症時。喘

息。欬嗽。咳逆。倚息不得。臥口渴。小便不利。吐涎沫等症。

〔方解〕 芍藥用作鎮靜藥。治頭疼喘咳等上部充血諸症。蓋本品有斂攝血液。鎮逆鎮痛作用。

乾姜為祛痰藥。有健胃鎮咳作用。

桂枝為融和血脈。平降衝逆之用。

麻黃 甘草 細辛 五味子 半夏 均見前

處方三 桂枝加厚朴杏仁湯 桂枝三。○芍藥六。○大

棗四枚。生姜八。○甘草四。○厚朴四。○杏仁一五。○

右七味。剉。作三百西。煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 支氣管肺炎。喘息咳嗽。胸滿腹脹。及慢性支氣管肺

炎。而兼消化不良者。或流行性感。冒而續發支氣管性肺炎。表不解。

氣衝喘逆者。

〔方解〕 厚朴為芳香性健胃藥。有鎮咳祛痰平喘除脹作用。杏仁為祛痰鎮咳藥。用治喘息咳嗽。呼吸器官諸炎症有特效。

桂枝 芍藥 生姜 大棗 甘草 均見前

處方四 越婢加半夏湯 麻黃三。〇石膏二〇。〇生姜

五。〇大棗四枚甘草四。〇半夏六。〇

右六味。剉作三百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 支氣管炎。喘息。氣急。咳而上氣。或胸脅下痛。不能側

臥。發熱。目胞如水腫狀。及百日咳。咳逆嘔吐痰水等症。

〔方解〕 石膏為清涼解熱藥。對於呼吸器官炎性分泌有制止之特能。

麻黃 生姜 大棗 甘草 半夏 均見前

(五)流行性腦脊髓熱(腦膜炎或脊髓膜炎)(中醫舊稱風溫疫癘或剛癘柔癘等)

〔病原〕 本病之病原體為腦膜炎雙球菌。在一八七七年危塞蒲氏 Fichselbann 始發見。此病原菌居於腦脊髓膜內。鼻液中或亦有之。此病往往由鼻液傳於他人。手帕。衣服。食具等。均可為傳染之媒介。幸此病抵抗乾燥之力極小。故一遇乾燥。即易致斃。小兒及少年最易患此。三十五歲之後則少患。其平均之死亡率。居百分之七十。

〔病理〕 病之屬惡性者。或無特殊變異。腦及脊僅顯劇烈充血。腦軟膜(血管衣)及蛛網膜(潤衣)充血甚重。其滲出物常屬血絲膿性(血纖維素膿性)而在腦底處尤顯。脊髓每與腦同受累。後面滲出較多。故腰背部每較頸項劇烈。病之較慢性者。腦膜普遍增厚。

滲出液有黃色斑點。此項滲物內有雙球菌。在病期中鼻泌液內有雙球菌甚多。蝶竇（穴）或滿貯膿。而四圍之骨發炎。病者之咽口鼻部及蝶竇等發卡他。及他種變異。據此而論。似乎傳染之達腦膜。實由此路。

〔症狀〕 此病約可分三類（一）惡性類。病起驟突。寒戰劇烈。頭痛

痙攣。倦眊思睡。心志鬱悶。溫度略高。脈搏弱。每分鐘或僅五六十至。皮常顯紫癍疹。致命甚速。（二）常類。則或有前驅症狀。如頭痛背痛。胃口不良等。或突然而起。而其較顯著者。即頭痛。嚴重之寒戰。嘔吐等狀。溫度升至百〇二。三度。頸肌痛而強硬。眼羞明。耳怕響。頭牽向後。臉上仰。身強直。或角弓反張。背及四肢均痛。眼斜。面肌痙攣。頭痛於後腦部為甚。或譫妄昏睡。熱度極不規則。皮常顯庖疹及瘀點性。

疹(三)異類。則有「頓挫性類」「間歇類」「慢性類」「頓挫類」即不成症類。病起之勢極惡劣。一二日後即退。輕者祇覺頭痛噁心。背及四肢不舒。熱不甚高。如在腦脊髓熱流行時方能認辨。否則每不認為症候也。間歇類則如瘧狀。間日或二日發熱一次是也。慢性類雖不常見。然甚重要。每發一次纏綿二三月。甚或五六月致極重之瘡。瘦。有時兼患腦積水。或腦膿腫等。

「特徵」尋常人仰臥時若將大腿豎起與腹部作直角式。其小腿亦可自由豎起。與大腿成一直線。惟患腦脊髓熱者。則因屈肌大縮。故小腿不能豎起。伸直與大腿作一直線。是為克匿格氏徵 Kernig'ssi 此乃診斷本病之要徵。

〔治法〕 處方一 葛根湯 葛根一〇・〇 麻黃四。〇 生姜八

○大棗五枚桂枝四○芍藥八○甘草五○
右七味剉作二百西西煎劑去渣一日分三次服

適應症 腦脊髓熱初起頭痛項背強急惡寒發熱無汗氣上

衝胸口噤牙關緊急頭熱目赤腰背頸項強痛筋肉強直性痙攣等症。

〔方解〕 葛根為清涼性發汗解熱解毒藥對於急性熱病頭疼項背強急等症有特效。

麻黃為發汗利尿藥用於急性傳染性熱病初起惡寒發熱頭疼體痛無汗時有驅除毒素隨汗液排洩之功。

生姜為發汗健胃藥用於氣逆嘔吐頭痛胸悶等症有抑止吐逆之功。

大棗為緩和粘滑藥。有鎮痙鎮痛作用。

甘草為緩和解毒藥。用以緩解急迫及毒素或藥物激刺等有效。

桂枝為有融和神經痙攣平降血液上衝之功。

芍藥用為斂攝血液上衝。取其鎮靜鎮痙之功。

處方二 葛根加桔梗湯 葛根一〇。〇麻黃四。〇生姜

八。〇大棗五枚桂枝四。〇芍藥八。〇甘草五。〇桔梗八。

〇

右八味剉作二百西西煎劑去渣一日分三次服。

適應症 腦脊髓熱頭痛背項強急惡寒發熱無汗氣上衝胸。

咳嗽喉痛蟬蟻化膿。或粘痰難以咯出者。

〔方解〕 桔梗為排膿祛痰藥對於咽鼻等處卡他性粘痰膿液等。

不能排出時有特效。

葛根 麻黃 生姜 大棗 甘草 桂枝 芍藥 均見前

處方三 括萋桂枝湯 括萋一五。○桂枝四。○芍藥八

○大棗五枚 生姜八。○甘草五。○

右六味。剉作二百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 腦脊髓膜炎頭痛發熱汗出惡風。身體強直。項背拘

攣。脈浮。衝逆嘔吐等症。

〔方解〕 括萋根一名天花粉。有解熱鎮靜鎮咳作用。能止渴生津。

通乳。消腫毒。乳癰瘡癤。排膿。除胃腸中痼熱之功。

桂枝 芍藥 大棗 生姜 甘草 均見前

處方四 大承氣湯 大黃一。○。○厚朴七。○枳實六。

○芒硝一○○○

右三味剉作二百西西煎劑。去渣入芒硝溶解之作一次頓服。取大便通下為度。不通再進一劑。

適應症 腦炎頭疼。發熱不大。便腹滿而痛。日晡發潮熱。直視不識人。譫語煩亂。咽乾口燥。癱攣齧齒。口噤。臥不着席。嘔不能食。目赤發狂。大渴煩躁。舌上黑苔等。急以本方攻下。以蕩滌熱毒。誘導而平降頭腦部充血發炎。

〔方解〕 大黃為瀉下藥。有健胃消炎作用。對於急性傳染性熱病發熱煩渴。便秘腹脹時用之。有蕩滌積熱。排除胃腸壅鬱諸熱毒之功。

厚朴為芳香健胃藥。用於神經性胃腸病。嘔吐腹脹。胸悶諸症有效。

枳實為健胃消食祛痰藥。用於胸腹脹滿而痛等症有特效。

芒硝為鹽類瀉下藥。用於熱病便秘。頭部充血。炎腫諸症有效。

處方五 活絡流氣飲 木通六。○羌活四。○柴胡六。

○升麻五。○白芷四。○桔梗六。○薄荷三。○當歸八。○

川芎四。○紅花四。○甘草三。○連翹八。○皂角刺七。○

威靈仙三。○

右十四味。剉作三百西。煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 腦脊髓熱。頭痛項背強。腰脊痛。四肢骨節強痛。或發

斑癍。或毒攻流注。乍寒乍熱。或毒流筋骨化膿。以及慢性腦脊髓膜

炎。腦膿腫等。

〔方解〕 木通為消炎性利尿通經藥。有排膿鎮痛作用。能通血脈。

利關節。散癰腫。及金瘡喉痺。咽痛。破積聚血塊。止渴除煩。導諸溼熱。毒從小便出。

羌活為鎮痛鎮瘧藥。對於頭疼脊項強痛。中風不語。頭旋目赤。剛瘧。柔瘧。癱瘓不仁。及破傷風。角弓反張。肢節疼痛等有特效。

柴胡為清涼性解熱消炎藥。特作用於淋巴系統。尤其於胸淋巴管。故對於痞悶脅痛。嘔吐等有特效。

升麻為解毒解熱藥。對於咽喉口腔諸炎腫。及斑疹瘡瘍等有特效。白芷之成分與西洋產之「安傑利加根」相同。為峻烈芳香之揮發油。樹脂。安傑利加酸。安傑利精。蠟分。苦味質。鞣酸。澱粉。糖分等。有顯著之鎮瘧作用。療結毒頭痛。頭面生塊壘痛。牙痛。鼻淵。腸風。痔瘡。癰疽等。又能清血排膿。

薄荷為清涼發汗藥。有鎮痛解熱作用。治頭痛。口鼻咽喉諸痛。當歸為清涼性活血通經藥。用於血液病。如體痛關節痛。瘀血瘡癰等症。

川芎為順血及清血通經藥。本品能降低血壓。行瘀血。破癥瘕。治金瘡。婦人血閉。療頭痛。緩急。癰疽排膿。一切梅毒結滯筋骨疼痛等。

紅花之成分為紅色素之「加卞蜜克酸」Carthaminic acid $C_{14}H_{16}$

○及黃色素。用為血症藥。有活血鎮痛作用。治婦人月經不調。產後諸血病。消腫。解毒。殺菌。破瘀血。通經絡。治瘡。跌打損傷等。

連翹為清血解毒變質藥。賞用於瘟疫時毒。頭疼癰瘍諸症。有特效。皂角刺為諸瘡之排膿殺菌托毒藥。治上焦結毒諸病。如流注。蛋核。結核等。

威靈仙為利尿通經藥。兼有殺菌鎮痛作用。通經絡。治中風。痛風血痺。手足不遂。瘡疾等。

桔梗 甘草 均見前

(六)百日咳(啼嗽)又名天哮噎(中醫名稱同)

〔病原〕 此病有時成流行性。其病原細菌與流行性感冒桿菌相似。往往流行於冬春。常侵一歲至六歲之小兒。

〔病理〕 患者之體。無甚特別之病理的改變。惟氣管受其損害。有時併發肺病。

〔症狀〕 潛伏期七日至十日不定。卡他期及發作性陣咳期二者。每可辨認。在卡他期內則顯尋常傷風之狀。或略發熱。鼻涕。眼紅。支氣管乾咳。早顯連續不止之咳嗽。發熱大抵不甚高。迨數日後則咳

嗽增重。其痙攣狀益顯明。至發作性咳期。又名陣咳性咳期。此期內每陣咳嗽十數聲至二十餘聲。連續不斷。咳聲短而苦。且不能吸氣。病兒咳時面色紺（青紫色）。但於咳陣止時。突然深吸而有空氣入肺。作喘聲甚響。此種發作性咳。或數陣繼續發作。迨膠粘之痰涎咳出為止。此涎之量甚少。如連發多陣。則每日或咳出甚多。在陣咳將終之際而嘔吐者常見。每日或嘔吐數次。至病兒食物停留不住而消瘦。大咳時不但嘔吐而且遺糞尿。且往往咳嘔鮮紅之血者。而舌下或因常被牙齒磨擦而潰爛。激發陣咳之情況。大概為情感（如哭）及咽部之激惹。如吞嚥亦能致咳。其病經過時間甚長。輕者三四星期。至六七星期內可癒。重者十數星期方癒。故有百日咳之稱。

〔治法〕

處方一

麻杏石甘湯

麻黃四。

○杏仁一五。

○甘

草四。○石膏四。○。

右四味剉作二百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 百日咳。陣發痰涎不鬆。身有微熱。喘息。脈浮數等。

〔方解〕 麻黃為平喘鎮咳藥。有發汗利尿作用。與石膏伴用。能防

止肺炎。

杏仁為鎮咳祛痰藥。實用於氣管枝氣管發炎諸症。

石膏為清涼性解熱藥。對於呼吸器管炎性分泌。有制止之特效。

甘草為緩和潤喉藥。有鎮咳祛痰作用。

處方二 人參敗毒散 太子參六。○茯苓一二。○甘草

四。○枳殼四。○桔梗六。○柴胡五。○前胡八。○羌活四

。○獨活四。○川芎三。○薄荷三。○生姜五。○

右十二味。剉。作二百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 一切傳染性。呼吸器。及消化器疾患。如咳嗽氣逆。胸悶。及百日咳。流行性感冒。畏寒發熱頭疼。四肢痠痛。嘔吐。脈浮滑等。

〔方解〕 太子參（人參）為強壯健胃藥。有振起精神疲勞及鼓動血液循環。振奮抵抗之力。

茯苓為利尿藥。有鎮靜作用。賞用於精神不安。心悸不寐。咳嗽煩熱等症有效。

枳殼為芳香性健胃藥。有祛痰鎮咳作用。用於胸悶嘔逆。咳嗽痞滿等症有效。

桔梗為祛痰鎮咳藥。有排膿利咽喉作用。

柴胡為清涼藥。對於胸悶脅痛。寒熱頭疼。淋巴系統有炎性機轉諸

症有特效。

前胡有祛痰鎮咳作用。治咳嗽喘逆。嘔吐痰逆。胸中痞悶。善治小兒感冒性發熱咳嗽等。

羌獨活二物功用相仿。均為神經藥。有鎮痛鎮痙鎮靜作用。治頭痛腰痛。身體骨節疼痛。流行性感冒。一切神經痛。發熱。痙攣性咳嗽等。川芎為行血降血藥。作用於神經血管。有降低血壓之功。治頭痛腦脹。經絡痺痛。且能破血消瘀通經。

薄荷為清涼性發汗健胃藥。有解熱作用。用於感冒性頭疼咳嗽等症有特效。

生姜為健胃祛痰鎮咳藥。

甘草 見前

處方三 越婢加半夏湯 麻黃三。○石膏二○。○生姜

五。○大棗四枚甘草四。○半夏六。○

右六味剉作二百西西煎劑去渣一日分三次服

適應症 百日咳。咳逆。嘔吐痰水。喘息氣急。胸脅下痛。不能側

臥。發熱。目胞有水腫狀。及支氣管肺炎。咳逆上氣。

大棗為緩和性鎮咳藥。有祛痰作用。

半夏為祛痰鎮咳藥。有鎮嘔平喘逆之功。

麻黃 石膏 生姜 甘草 均見前

處方四 外臺蘇子湯 蘇子八。○乾姜二。○茯苓一○

。○半夏六。○桂枝三。○太子參四。○甘草四。○

右七味剉細。作二百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 百日咳。喘咳上氣。嘔逆胸滿煩悶。痰涎多而身體無熱者。

〔方解〕 蘇子為祛痰鎮咳降氣藥。兼有解毒作用。治上氣咳逆。喘息嘔吐。反胃。寬胸利膈。止咳消痰。

乾姜為祛痰健胃藥。有鎮咳作用。對於喘咳痰涎稀薄而身體無熱者有效。

桂枝為健胃降衝藥。對於寒冒性頭疼嘔逆。氣上衝等症有效。

茯苓 半夏 太子參 甘草 均見前

(七)淋病(白濁) (中醫舊稱五淋及赤白濁等均是)

〔病原〕 為一種淋病雙球菌。形如豬腎。每成對排列。如雙腎對峙。凹面相對。而凸面向外。此菌常在白血球之內。且可在原發性及全

身性損害區察見。大多由不潔之性交而傳染。新生兒若由母陰道受染入眼。名淋病性結合膜炎。為目盲之一大原因。

〔病理〕 淋病球菌所致之病。可分三類。〔一〕原發性感。〔二〕尿

生殖器直接蔓延感染。〔三〕全身感染。其損害區常為尿道炎。前列腺炎。副睪丸炎。輸卵管炎。關節炎。滑膜炎等。本病為傳染病中流佈最廣而極惡烈者。雖不多致命。然其損害健康之魔力。實極偉大。

〔症狀〕 尿道發炎。時時流白濁。在男子則陰頭有膿性粘液封固。排尿作痛。或顯關節炎痛。有時在淋病退後發顯。更有伴慢性淋病而發者。在婦人患此。不易發見局部感染之證據。惟流多量之粘稠性帶濁。受累之關節常甚多。不僅一處。各關節處有游行之痛。不紅。不腫。纏綿甚久。

〔治法〕 處方一 茯苓琥珀湯 茯苓一六・○澤瀉一四・○
白朮一二・○猪苓一四・○桂枝五・○琥珀（研細）四・○滑
石（研細）六・○甘草三・○
右六味作二百西西煎劑。去渣。調入琥珀滑石二味。一日分三次服。
服時須振盪之。免其藥末沉澱。
適應症 急性淋病。尿道炎。排尿作痛。關節炎性水腫。淋病性
陰道炎等。

〔方解〕 茯苓為鎮靜利尿藥。賞用於神經不安。心悸少寐。尿液混
濁色赤等症。

澤瀉為利尿藥。有解熱作用。用於尿道炎。排尿困難等症有效。
白朮為健胃利尿藥。賞用於關節炎腫（溼瘰）痠痛。小便不利等症。

猪苓為利尿解毒藥。有消炎消腫作用。實用於白濁淋痛發熱。女子帶下等症有特效。

桂枝為芳香性健胃藥。對於腐敗性神經炎。關節炎肢節痠痛等症有特效。

琥珀為極有力之防腐利尿藥。富含樹脂。揮發油。琥珀酸。及硫等。故有鎮靜鎮痛解凝驅微諸作用。

滑石為緩和藥。有粘滑包攝尿道粘膜作用。能奏防腐利尿之功。生甘草為緩和粘滑藥。能滑潤內膜。制止淋痛。

處方二 八正散 木通四。○車前子一。○。○扁蓄八。

○大黃七。○滑石(研細)四。○生甘草稍四。○瞿麥八。○

山梔一二。○

右七味。剉。作三百西。煎劑。去渣。再入滑石。棒攪勻。一日分三次服。服時須振動。

適應症 急性淋病。尿道發炎。疼痛。排尿困難。發熱。口渴。煩悶。大便不通等。

〔方解〕 木通為清涼性消炎利尿藥。能消退膀胱及尿道一切炎症。利尿。治浮腫。且有苦味解熱清血作用。並治心煩。口渴。頭痛。目赤。諸症。

車前子為有力之利尿藥。兼具清涼及收斂性消炎防腐作用。故兼有止血之功。治血淋（小便出血）赤痢。婦人月經過多。帶下等。如口中潰瘍。咽喉焮腫。以根葉煎水作含漱劑。眼炎作洗眼藥。以其葉用水蒸溜之。名車前水。作洗眼藥。有清涼消炎刷淨污液之功。

扁蓄為殺菌利尿藥。有殺蟲排毒清涼消炎作用。對於淋病尿道炎。及小兒浸淫疥瘡。黃疸痔瘡等均效。

大黃用其大分劑則為瀉下藥。小量則為健胃消炎之用。因其內含鞣酸。故對粘膜炎及防腐作用。

瞿麥為利尿通經藥。有通淋排毒破血消腫作用。

梔子為清涼性消炎解毒藥。善解血中熱毒。及一切充血性炎症。

滑石 甘草稍與甘草同功 均見前

處方三 土茯苓湯 土茯苓二〇。〇忍冬藤一〇。〇大

黃五。〇荆芥六。〇防風六。〇川芎四。〇地骨皮一〇。〇

右七味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 淋濁性關節炎。或微毒性痛風。及淋病性膿毒血病。

身體疼痛微瘡等。

〔方解〕 土茯苓為解凝性清血變質排毒藥。內含粘液。能緩和酷屬毒。有發汗利尿作用。專用作微毒淋濁瘡溼風毒等之驅除劑。有清血排毒之功。治筋骨風溼痛。瘡毒水腫。肢節痛等有特效。忍冬藤為解毒治瘡藥。有消腫利關節。散熱消炎作用。並能解中菌毒。用於淋濁微瘡。一切癰疽腫毒。及關節疼痛等有良效。

荊芥為清血驅風治瘡藥。有鎮痙鎮痛發汗解熱作用。因其內含揮發油。故有解凝消痰。通血脈。搜風溼毒滯之功。用為一切血病瘡毒之要藥。

防風為芳香性驅風鎮痛藥。專治風溼留毒關節疼痛。且有發汗利尿作用。

川芎為清血順血藥。有通利血脈鎮痛作用。

地骨皮為清涼解熱藥。兼有鎮痛作用。

大黃 見前

(八) 桿菌痢疾(中醫舊稱時氣毒痢)

〔病原〕 係一種桿狀細菌。於一八九八年。為日醫志賀氏所發見。曾流行於其國。其傳染之途徑。由蒼蠅及塵埃食具等為傳佈該菌之媒介。

〔病理〕 解剖患急性痢疾而死者。其大腸粘膜腫而色深紅。且有瘀血點散漫。粘膜摺尤顯。腸孤立淋巴結紅腫。病劇時則結腸粘膜腫至甚厚而堅。色灰黑。有變成壞疽者。迴腸受累致充血及淺層死。病之次急性者。腸壁不顯增厚。腸孤立淋巴結較腫。少變死。雖不成

潰瘍。然有淺潰蝕。

〔症狀〕 潛伏期至多約四十八小時。其發突然。身熱腹痛。大便頻數。初下粘液。旋即下雜血。或純血。裏急後重。肛門外皮剝損。或脫肛。每半小時或一小時必下血粘液少許。且進飲食時腹瀉即隨之。熱至一百〇三四度。脈快而弱。病甚則微口渴。舌有白苔。急性者在四十八小時之間益甚。大便愈頻。痛極。譫妄。至第三四日則死。否則歷十日或半月則漸就愈。若病性不甚急。症狀稍減。大便略疎。熱降。二三星期可恢復。重者多死。

〔治法〕

處方一 白頭翁湯 白頭翁七。〇黃連四。〇黃柏

一〇。〇秦皮八。〇

右四味。剉作二百西西煎劑。去渣。候涼。一日分三次服。

適應症 急性赤痢發熱口渴腹痛大便下血傷寒腸出血等。
〔方解〕 白頭翁為消炎性收斂藥。有殺菌解毒鎮痛退熱作用。尤
其有作用於大腸之特能。故對於急性赤痢極有效。

黃連為苦味健胃消炎藥。主治胃腸及其他之充血性炎症。故能治
腹痛下血療瘡腫目赤。多作用於腸胃。其味極苦。亦有殺菌作用。
黃柏為有力之消炎止血收斂藥。具殺菌解熱激胆利尿治瘡等作
用。

秦皮為消炎性收斂藥。有清涼解熱利尿發汗之作用。能斂腸滅菌。
消眼炎退瘧熱及水腫黃疸等。

處方二 大黃牡丹皮湯 大黃八。○牡丹皮五。○桃仁

一二。○冬瓜子一二。○芒硝一〇。○

右四味。剉細。作一百五十西煎劑。去渣。入芒硝溶化。一日分三次服。

適應症 急性痢疾。初起腹痛。下利不爽。腸膜急性炎腫。下赤

色粘涎。或盲腸炎。大便不通。用此蕩滌。瘀滯排除。毒素作頓挫療法。

〔方解〕 大黃為苦味健胃瀉下藥。有消炎排毒蕩滌胃腸作用。

丹皮為鎮痛消炎止血驅瘀藥。有清涼性解熱治瘡排膿作用。

桃仁為消炎性去瘀解凝藥。兼有鎮靜鎮痛殺菌殺蟲及緩下作用。

冬瓜子為消炎性利尿藥。兼有緩下作用。治癰瘡有特效。

芒硝為鹽類瀉劑。若欲急速排除腸內容則用之。無刺戟腸壁之性。

故對於熱性病腸內有積熱病毒者。得使用之。且有消炎的作用也。

處方三 黃芩湯 黃芩一〇・〇 甘草七・〇 芍藥一二・〇

大棗五枚

右四味。剉。作一百五十西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 下利膿血粘稠。腹痛。裏急後重。發熱。口渴。脈數。赤痢。

腹痛甚者。本方加大黃一〇。〇更佳。

〔方解〕 黃芩為消炎殺菌藥。有清涼性解熱清血作用。治腸部因

炎性機轉之充血性腹痛。痞脹嘔吐等有特效。消瘡腫。排膿解毒。故

主腸澼洩利等症。

甘草為粘滑性緩和藥。能緩解一切急迫之痛。如腹痛腸絞痛。淋痛

喉痛。因其富含粘液質。樹膠。澱粉等。能奏機械的包攝一切毒素。細

菌刺戟。並有緩下作用。

芍藥內含安息香鞣酸。有鎮靜鎮痛收斂性消炎作用。用為緩和腹

部。寧。急。治。痢。疾。腹。痛。之。要。藥。

大。棗。為。滋。養。性。緩。和。藥。能。緩。和。酷。厲。毒。鎮。靜。鎮。痛。並。滑。利。大。便。

處。方。四。白。頭。翁。加。甘。草。阿。膠。湯。白。頭。翁。六。○。黃。連。四。○。

○。黃。柏。一。○。○。秦。皮。八。○。○。甘。草。四。○。○。阿。膠。八。○。○。

右。五。味。剉。作。二。百。西。煎。劑。去。渣。入。阿。膠。溶。化。一。日。分。三。次。服。

適。應。症。急。性。亞。急。性。赤。痢。後。重。肛。墜。時。日。經。久。體。力。衰。弱。者。

〔。方。解。〕。阿。膠。為。粘。滑。性。緩。和。藥。有。緩。解。組。織。之。緊。縮。及。包。攝。粘。膜。

糜。爛。面。奏。止。血。鎮。痛。之。功。並。能。排。膿。利。尿。

白。頭。翁。黃。連。黃。柏。秦。皮。甘。草。均。見。前。

（。九。）。亞。細。亞。霍。亂。〔。虎。列。刺。〕。〔。中。醫。舊。稱。之。寒。症。霍。亂。〕。

〔。病。原。〕。為。一。八。八。四。年。德。醫。科。什。氏。〔。Koch〕。所。發。見。一。種。微。曲。桿。

菌較結核菌粗而短。本病流行時。健者之糞或亦含之。患者之腸及糞中最初即可覓得。而所下稀糞中尤極多。惟吐物內則甚少。

〔病理〕本病係菌毒作用。全身症狀係由腸壁吸收該菌之毒素所致。此毒素與細菌血球「坡退印」密接聯合。死菌亦有毒性。雖種其微量亦作霍亂。腸壁吸收毒素後。血液濃厚而色深。其液及鹽類大減。腸曲充血。粘膜腫。惟病甚急者則充血輕。腸膜上皮層有時脫落。水液脫竭。腦力虛脫。心臟麻痺而死。

〔症狀〕突然洩瀉。嘔吐。胸悶。身體無熱。頻下糞水及米泔樣水。不數小時則眼球陷入。鼻端銳而頰凹。聲沙手足皮色青紫。皮皺。且出冷汗。體溫低降。不及常溫五至十度。脈極弱。神漸昏迷。腓部抽筋。（中醫名轉筋）往往於十二至二十四小時內因水分脫失心臟麻

痺腦力虛脫而死。

〔治法〕

處方一

霍亂急救水

樟腦二。

○丁香二。

○蟾酥

一。○茴香二。○阿片膏二。○

右四味。剉細。以上好膏梁燒酒二十西西。浸七日。去渣濾清。加入阿片膏溶解後。分四次。開水沖服。一日量。

適應症 霍亂初起吐瀉胸悶。手足厥冷脈微細。或腹痛等。

〔方解〕

樟腦為興奮回蘇藥。有強心作用。內服入胃腸更有殺菌

殺蟲之功。

丁香為芳香性興奮藥。有健胃作用。因其內含揮發油膠質樹脂。單甯。鞣酸。水楊酸等。故對於腹痛嘔吐下利等有特效。

蟾酥為興奮強心藥。其藥物作用完全與實艾他利斯相同。能振起

心力鼓動血循環。增進抗毒作用。並具殺菌鎮痛作用。

茴香為興奮性健胃鎮嘔藥。內服於胃腸。有鎮痛及防腐殺菌作用。故對於霍亂嘔吐腹痛等有特效。

阿片為麻醉藥。有安撫神經。及制止腸蠕動之功用。於霍亂嘔吐下利腹痛。或煩躁不適。苦悶諸症。有特效。

處方二 烏梅附子瀉心湯 烏梅肉五。○生附子一○。

○黃連五。○黃芩一○。○生甘草一○。○乾姜一○。○白

芍一五。○赤石脂（煨透研細粉）一○。○

右七味。剉作二百西西煎劑。去渣。乘熱調入赤石脂粉。分二次溫服。臨服時以棒攪拌。石脂不致沉澱。連粉服。

適應症 霍亂初步。吐利胸悶。水液未脫。失時為宜。

〔方解〕 烏梅為收斂性健胃制瀉藥。有殺蟲殺菌作用。對於霍亂嘔吐下利煩渴等症有特效。

生附子為極有力之強心藥。有興奮細胞。振起全身機能。強壯心肌。鼓起血運作用。大量內服。對於腸中細菌亦有殺滅之功。

黃連為健胃鎮嘔藥。有消炎殺菌作用。

黃芩有消炎殺菌作用。特作用於胃腸。有整腸止利之功。

甘草為緩和藥。以緩解急迫中和毒素。

乾姜為強力之健胃制瀉藥。能振起胃腸之機能。並制嘔止利。

白芍為收斂性鎮靜鎮痙藥。因其內含鞣酸安息香酸等。故有緩解

攣急及制瀉整腸作用。

赤石脂為有效之吸着劑。能中和毒素。整腸制瀉。

處方三 人參四逆湯 人參（貧者可以太子參代）一五

○生附子二○。○乾姜一五 ○甘草二○。○

右四味。剉細。作二百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 霍亂。嘔吐。下利。米泔樣水液。手足厥冷。脈沉伏。或脈

不出。冷汗出。目陷。頰凹。聲嘶。胸悶。口渴。行將脫水者。速以此方頓服

急救。

〔方解〕 人參為強壯性強心健胃藥。有振起脈搏。急救衰脫之功。

附子 乾姜 甘草 均見前

處方四 五苓散 白朮 澤瀉 猪苓 茯苓 桂皮 各

等分

右五味。為細末。每用三○。○。○。作泡浸劑。去渣。一次服。一日服用三

次。

適應症 霍亂吐利瘥後。尿閉發熱煩渴。尿中毒症等。

〔方解〕 白朮為利尿藥。有促進腸胃吸收。制止汗液分泌之作用。

澤瀉有利尿作用。能排除血分之尿酸毒素。

豬苓為止渴利尿藥。有解熱排毒作用。

茯苓雖有利尿作用。又兼含有營養成分。能鎮靜退熱。治心煩不寐等。

桂皮為芳香性健胃藥。有防腐制酵作用。

(十) 破傷風(瘧症) (舊稱角弓。產後風瘧。小兒臍風……

等)

〔病原〕 係一種破傷風桿菌。多居於沃土。馬房。農場。及食草獸類

之腸等處。曾用土接種於獸體。而獸竟患破傷風者。該菌細而能動。一端含芽胞。其芽胞之生活力極強。但多由破傷口染菌而發病。傷雖甚微亦可侵入。而本菌之毒素極兇烈。試諸獸體。雖僅毒素而無菌。破傷風之各症狀仍顯。

〔病理〕 腦脊髓無炎症損害可以察見。或見有數處充血。血管外有滲液。腦細胞內顯粒狀變異。傷口之狀態無定。神經常受害發紅而腫。在新生之兒臍處或發炎。本病為毒血症。破傷風桿菌居於傷口。其毒素則入血而發症狀。

〔症狀〕 潛伏期約一至二十日。初狀或顯寒戰。常顯之症狀為患者覺頸微硬。牙關緊而難咀嚼。面頸肌顯強直性痙攣。致牙關鎖閉。肩豎立。口角伸出。呈現苦笑狀。在小兒發痙或僅限於此等處。有時

面肌癱瘓而難嚥。因傷處近三叉神經故也。瘳學漸蔓延致累全部之肌。背腰更甚。發時通體反張如弓。名角（後）弓反張。有時瘳至軀幹及四肢強直。若腹肌瘳學則身前曲。名前弓反張。若發作重時胸受壓呼吸速喉門瘳閉致窒息。瘳時甚痛不能言語。常出汗。溫度如常。將死時或微升高。亦有自始即熱至一百〇五六度。臨終時或達一百〇九以上者。有時病期甚速。瘳熱文作三日即死。若頭部破傷風。其傷側之嚼肌瘳而面肌癱且難嚥物。此外無他狀。頗與瘳咬病相類。此名頭破傷風。慢性類不甚危險。死者僅四分之一。急性者死亡多至百分之九十。初生兒破傷風。俗名「臍風」及「七日風」係由臍帶傷口侵入。症狀則牙關鎖閉。啼哭不能食。瘳狀蔓延每因而致死。產婦子宮部流血。亦易染破傷風菌而致病。

〔治法〕 處方一 葛根湯 葛根一〇。〇麻黃四。〇桂枝五

。〇生姜四。〇生甘草四。〇芍藥八。〇大棗三枚

右七味剉細。作二百西西煎劑。去渣。分三次溫服。

適應症 產後柔中風（破傷風）及一切外感性項背強直

拘急頭痛背痛惡寒發熱耳鼻部化膿性病等。

〔方解〕 葛根為清涼性發汗藥。有解熱排毒作用。且專主瘀滯之

凝於肌肉皮裏。其部位自項背至腰背足膝。如化膿性毒腫之在皮

裏者。痘瘡麻疹癬疥之類皆葛根之所主也。

麻黃為發汗利尿藥。能助皮膚與肺臟排洩毒素。治頭疼腰痛身疼

骨節疼痛及喘嗽咳逆等。

桂枝為能融和溫壯神經。活潑健運血液。患者有虛憊之神經熱及

腐敗性之熱病頗效。因本品內含桂皮油。芳香性揮發油。為一般刺
激皮膚作用之外。有多少之防腐作用。且適量內服。有健胃之效。使
吸入之則防腐氣道。兼減分泌。故使用於肺壞疽。及化膿性氣管支
炎等。又於尿中排洩。增利尿及防腐其尿作用。又其二三物質應用
於神經性諸病。

生姜為健胃藥。治胃內停水。有鎮咳鎮嘔諸作用。

生甘草為緩和性粘滑藥。能緩和拘攣急迫。解百毒。潤內膜。

芍藥為鎮痙止痛藥。治神經筋之攣急。痙拘搐掣。具有收斂作用。因
其內含安息香酸及鞣酸故也。

大棗主治攣引強急。咳逆奔豚。煩躁身疼。背痛腹中痛等。

處方二 獨活葛根湯（外臺）獨活四。○鮮地黃一。○。○

葛根一〇。〇麻黃三。〇桂枝三。〇芍藥八。〇甘草五。〇
大棗四枚。生姜三。〇

右九味。剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 柔中風。項背強急。惡風發熱。汗出頭痛。臂痛。脈數。舌紅。口渴。煩悶。血虛。血熱。諸症。

〔方解〕 獨活為鎮痛鎮癱藥。對於神經性諸癱。急癱。痛。口角牽引。手足掣痛。筋肉拳攣等症。有特效。

鮮地黃為強壯強心。利尿解熱。鎮靜鎮痛藥。有止血清血。治虛熱除煩渴。活血。利筋骨等之功。

葛根 麻黃 桂枝 芍藥 甘草 大棗 生姜 均見前

處方三 犀角大黃湯 犀角三。〇茯苓一。〇。〇麥冬八

○人參四。○甘草三。○黃芩六。○地黃一。○大黃一

○。○。○
右八味剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 破傷風。熱高頭痛。頸項強直。痙攣與發熱並作。口渴
煩躁。大便閉結。小溲短赤等症。

〔方解〕 犀角為解熱解毒藥。兼有強心鎮痙作用。用於急性熱病
熱高昏譫痙攣等有特效。

茯苓為利尿鎮靜藥。有促進腎臟排除血液中廢料。及毒素。而奏利
尿作用。並有鎮靜神經之功。

麥門冬為滋養性緩和藥。有強壯心力。緩解急迫。濡潤組織。緩和肌
肉痙攣。及排除粘痰。鎮靜鎮咳作用。

人參為強壯性強心健胃利尿藥。用於急性病而現衰弱。脈搏無力時有特效。

黃芩為清涼性解熱藥。有健胃消炎利尿作用。

大黃為清涼性緩下藥。且有健胃作用。每用以蕩滌胃腸積熱。排除淤熱毒素。及一切急性熱病熱高昏譫等症。

甘草 地黄 均見前

處方四 羚羊角湯 羚羊角三。○桂枝三。○附子二。

○獨活四。○芍藥六。○防風八。○川芎四。○生姜四。○
右八味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 破傷風肌肉痙攣。項背強急。頭疼麻痺不能動。及一

切中毒性肌肉攣痺。脈搏細弱而身體無熱度者。

〔方解〕 羚羊角為鎮痙藥。有清涼性解毒強心作用。治一切筋肉
攣急。神經痛。惡瘡腫毒。頭疼。四肢強直。痙顫昏譫。子痙等症。

附子為興奮強心藥。能刺激肌肉神經。興奮全身細胞之生活力。並
有鎮痛鎮痙作用。用於心臟衰弱。脈搏微弱。肌肉麻痺。皮膚蒼白。頭
疼。肢節痛等症。而體無大熱者有特效。

防風為解表退熱鎮痛藥。用於感冒性頭痛風痛等症。

川芎為芳香性神經藥。有清血順血。活潑神經。血管之作用。治頭痛
筋肉攣急。麻痺。血瘀腹痛等症。能和血脈。及解凝滯之功。

桂枝 獨活 芍藥 生姜 均見前

(十一) 白喉病(狄扶的里亞)中醫稱白喉風

〔病原〕 致病之原因係由一種白喉桿菌。又名克勒忒司氏呂弗

琉氏桿菌。人體之粘膜為該菌生長最合宜之處。而尤於喉部粘膜為最相宜。菌之形態為桿形。無芽胞。不能動。可由直接接觸傳染。如痰涎。唾沫。涕點等。間接則如衣服食物用具。及帶菌患者等傳染。

〔病理〕 初起時咽中之菌毒素損害粘膜。致一薄層壞死。但白喉菌不孳生於活組織。而孳生於死組織。菌之作用蓋致粘膜發炎。滲出含多血纖維之液。凝結成假膜。其初緊貼於粘膜上。倘撕開則出血。迨後則鬆弛而易脫落。菌毒素入血而顯全身症狀。

〔症狀〕 潛伏期二至七日。然強半僅二日。初與尋常熱病相同。即惡寒發熱。腰與四肢痠痛。熱升至一百零三四度。小兒或顯驚厥。咽門發紅。嚥物困難。頸扁桃顯出假膜。先為白灰色。繼變污灰白色。二三日內此膜已掩咽。頸弓懸壅垂。及咽後壁等處。倘揭去則未幾復

生頸淋巴腺亦腫。或且痛。重者咽炎至極之際。組織壞死。甚臭惡者。常見之惡性者。或徑自鼻起。或由咽傳及。能蔓延至耳咽管。及中耳。致生膿。或至淚管及結合膜。或上額竇。頸淋巴腺亦大腫。其全身症狀重而甚險。

本病之併發病為鼻咽潰爛性出血。或皮下出血。乃瀰漫性紅斑。風疹塊。或紫癍致死。則都因支氣管肺炎。或因含膿菌之碎膜被吸入肺。致成肺壞疽而咳血殞命。

後患之最要者惟癱瘓。係由毒素被吸入血。而致毒性神經炎。局部癱瘓多在頸。每致語帶鼻音。而飲水由鼻反出。又或咽肌癱瘓而嚥下困難。然閱二三期即愈。或眼肌癱瘓。上下肢等亦然。

〔治法〕

處方一

麻杏石甘湯

麻黃四。

○杏仁二○。

○石

膏四〇。〇甘草六。〇

右四味。剉作二百西。煎劑去渣。一日分三次服。

適應症 白喉初起。惡寒發熱無汗。頭疼。骨節痠痛。脈浮緊。咽

痛。氣喘等症。

〔方解〕 麻黃為發汗利尿藥。有平喘作用。用於急性傳染性熱病。初起無汗時。有排除血中毒素由汗洩而出之功。

杏仁為鎮咳祛痰藥。有平喘作用。對於咽喉刺激性諸病有效。

石膏為清涼解熱藥。實用於急性熱病熱甚煩渴。尤其與麻黃並用。能消肺管支氣管喉頭等發炎。

甘草用作緩和解毒藥。

處方二 古今錄驗射干湯 射干四。〇犀角二。〇升麻

四。○白芷四。○當歸八。○杏仁一二。○甘草四。○
右七味剉作三百西煎劑去渣一日分三次服。

適應症 白喉。喉頭假膜蔓延。吞嚥不利而痛。發熱精神倦怠
大便秘等症。

〔方解〕 射干為清涼解毒藥。有瀉下作用。並用於喉痺咽痛。胸滿
氣逆等證。有散血消腫消炎之功。

犀角為清血解毒解熱藥。有強心作用。實用於瘟疫時毒及毒血病
熱高昏譫諸症。

升麻為解熱解毒藥。有清血殺菌作用。實用於膿毒血病。痘瘡麻疹
斑癍等。尤為白喉病之特效藥。

白芷為鎮痙藥。有消腫散血作用。因其內含芳香性揮發油。及鞣酸

等。故能殺菌防腐。對於咽喉腐敗性膿毒及假膜性炎腫有特效。當歸為清涼性通經藥。有排膿鎮痛作用。

杏仁 甘草 均見前

處方三 清咽抑火湯 黃連三。○大黃一○。○元明粉

一○。○黃柏五。○知母六。○連翹五。○梔子八。○桔梗

六。○薄荷四。○甘草四。○玄參六。○牛蒡子八。○黃芩

五。○防風五。○

右十四味。剉作三百西西煎劑去渣。一日分三次服。

適應症 白喉惡性重症。咽喉腫痛。身體壯實。大便秘結不解。

高熱煩悶。舌苔黃燥。脈搏洪大有力等症。

〔方解〕 黃連用作清胃解熱消炎藥。

大黃為消炎性瀉下藥。用為蕩滌胃腸積熱排除毒素。

玄明粉為鹽類瀉下藥。有誘導作用而使咽喉炎腫消退。以解除局部障礙。

黃柏為健胃解熱藥。有強力之消炎作用。用治口瘡喉痺有特效。知母用為解熱治咳。清潤肺氣管之藥。

連翹為改血變質藥。有解毒作用。能清解血中毒素。並有消炎退腫之功。

梔子為清涼解熱藥。善消上部充血性諸炎症等。

桔梗為排膿祛痰藥。對於咽喉痰涎粘膩及腫痛等症有特效。

薄荷為清涼性發汗藥。並有防腐及殺菌作用。煎汁含漱能刷淨喉。膠腐敗性假膜及粘涎舌苔等。

玄參用作清涼消炎藥。

牛蒡子用作解毒消炎退腫藥。

黃芩用作清涼解熱藥。

防風用作解熱鎮痛藥。並治因寒冒而起之頭痛發熱。骨節痠痛等

症

甘草 見前

處方四 牛蒡子湯 牛蒡子一二。○玄參一四。○犀角

三。○黃芩六。○升麻六。○桔梗六。○木通五。○甘草五。○

右八味。剉作三百西西煎劑。去渣一日分三次服。

適應症 白喉炎腫。嚥下困難。痰涎粘膩。或併發斑疹。發熱煩

悶。小便短赤等。

〔方解〕 木通為利尿藥。有消炎消腫作用。賞用於瘡毒喉痺咽痛。可濃煎含漱。因其味極苦澀。殆有收斂消炎及殺菌之功。

牛蒡子 玄參 犀角 黃芩 升麻 桔梗 甘草 均見前

（十二）流行性感冒（中醫舊稱傷風感冒等）

〔病原〕 係一種流行性感冒菌。於一八九二年發否氏由患者鼻及支氣管之液內檢出。小而不能動之桿菌。此菌有一種特別趨向。即致呼吸系統之粘膜受患。本病係大流行病。發顯雖無定期。傳佈極速而致病極眾。

〔病理〕 呼吸道之粘膜顯輕度發炎。分泌增多。甚者支氣管亦顯卡他性炎。或胸膜發炎。又有一類侵及神經系致腦膜發炎。名神經性類。或專侵消化系名胃腸性類。

〔症狀〕 潛伏期一至四日。病發起大概驟突。與急性氣管卡他相似。惟身體疲倦困頓較甚。惡寒發熱頭痛。氣管支發炎。熱重則譫妄。體弱疲憊。或與腸熱病相似。呼吸系統之危重情況。係支氣管炎。肺炎。胸膜炎三者。惟咳出之痰。係一要狀。有時極多。極薄。內含膿塊。發否氏以為色黃綠。而作錢樣之痰。為本病之特徵。以上為呼吸類流行性感冒。

神經系類。則顯頭痛。背及關節痛。兼極重之虛弱。至於沉重之併發病。則有腦膜炎。脊髓炎。並癱瘓者有之。

胃腸類。則初起發熱兼噁心嘔吐。或顯腹痛。大瀉。及腦力虛脫者。

〔治法〕

處方一 姜蕤湯 姜蕤八。○石膏一六。○甘草四。

○川芎五。○麻黃三。○杏仁一二。○木香四。○葛根六。

○白薇六。○獨活六。○

右十味。剉作三百西。煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 流行性感冒。頭疼發熱。惡寒。骨節痠痛。項背牽強。支氣管炎。喘咳等。

〔方解〕 姜蕤為清涼性滋養強壯藥。有解熱及滋潤氣管粘膜作用。賞用於衰弱體質之感冒。頭痛自汗發熱。咳嗽等症。

石膏為清涼解熱藥。用作制止氣管支炎性分泌物及煩渴發熱等。甘草用為祛痰鎮咳。緩和解毒藥。

川芎為順血鎮痛藥。用治頭疼骨節痠痛諸症。

麻黃用為平喘息。鎮咳發汗利尿解熱藥。

杏仁用為解熱鎮咳祛痰藥。

木香為健胃消化藥。用治嘔逆胸悶等症。

葛根為清涼解熱藥。用治頭痛項背強。及發熱口渴天行時毒等因。本品有解毒發汗作用故也。

白薇為清血利尿解熱藥。賞用於發熱精神困疲。喘息氣逆等症。獨活為鎮痛藥。善治頭痛腰痛背肢節痠痛等症有特效。

處方二 甘露消毒丹 滑石一二。○茵陳八。○黃芩六

○貝母七。○石菖蒲五。○木通四。○藿香八。○射干三

○連翹七。○薄荷六。○豆蔻三。○

右十一味。剉作三百西西煎劑去渣。一日分三次服。

適應症 流行性感冒發熱疲倦困頓。氣管卡他。肢節痠楚。或

咽頭炎痛。或胸悶腹脹。口渴便秘或洩利。小溲短赤等症。

〔方解〕 滑石為利尿藥。用於發熱口渴小便不利等症。因其有清解血液毒素。通水道。促進酸素之排除作用故也。

茵陳為利尿藥。有解熱作用。賞用於天行時疾頭痛眼疼。及黃疸小便不利等症。

黃芩為清涼解熱藥。用治天行熱疾。咳嗽頭痛嘔吐等症。

貝母為祛痰鎮咳藥。用治氣管卡他。咽喉炎腫等症。

石菖蒲為健胃祛痰藥。有壯神經作用。

木通為清涼解熱利尿藥。

藿香為健胃鎮痛藥。有發汗解熱作用。賞用於胸悶腹痛。嘔吐下利頭疼等症。

射干為咽喉炎痛及咳嗽氣逆等之特效藥。

連翹為清血變質藥。有發汗解熱解毒作用。兼有利尿之功。薄荷為芳香性清涼發汗藥。有健胃作用。

豆蔻即白豆蔻。用為芳香性健胃藥。能止嘔吐咳逆等症。

處方三

止嗽散

荊芥八。

桔梗五。

紫菀六。

百

部八。○白前六。○甘草四。○陳皮六。○

右七味。共剉細末。絹包煎作二百西西。去渣。一日分三次溫服。

適應症

呼吸類流行性感。冒。氣管支炎。咳嗽氣逆痰粘不鬆

等。

〔方解〕

荊芥為清涼性發汗解熱藥。有鎮痙鎮痛作用。用於感冒

性熱病頭痛最有效。

桔梗用作祛痰鎮咳藥。

紫菀有鎮靜鎮咳作用。

百部有鎮咳殺菌殺蟲作用。

白前對於咳嗽喘息咯痰咯血等有特效。

陳皮即橘皮。有健胃及祛痰鎮咳作用。

甘草 見前

處方四 越婢加半夏湯 麻黃三。○石膏一六。○甘草

四。○生姜八。○大棗四枚半夏六。○

右六味剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 流行性感冒。支氣管性肺炎。喘息咳嗽。嘔逆。目眇有

水腫形。咽喉有笛音。喘逆不能平臥者。

〔方解〕 生姜為鎮嘔祛痰藥。賞用於喘咳脹滿痰飲氣逆等症。

大棗為緩和強壯藥有粘滑性潤喉鎮咳祛痰作用。

半夏為鎮靜鎮嘔祛痰鎮咳藥。

麻黃 石膏 甘草 均見前

處方五 加減麻黃湯 麻黃三。○桂枝四。○杏仁一二

。○甘草四。○葛根七。○秦朮一。○龍胆草四。○

右七味。剉作二百五十西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 神經性流感。初起惡寒發熱頭痛如劈。連及項脊背

節遍身痠痛而無汗者。

〔方解〕 桂枝為芳香性神經藥。有融和血脈溫壯神經作用。對於

關節痛有特效。

秦朮為解熱鎮痛藥。實用於風痺。四肢關節痛等症。且有利尿作用。

龍胆草為健胃藥。有消炎退腫解熱作用。賞用於天行時疾。目黃睛赤。頭痛咽喉腫痛等症。

麻黃 杏仁 甘草 葛根 均見前

處方六 藿香正氣散 藿香六。○紫蘇葉五。○甘草四

。○白朮八。○茯苓一二。○陳皮六。○大腹皮七。○厚朴

六。○半夏六。○桔梗五。○生姜八。○大棗三枚

右十二味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 流感頭疼發熱。胸悶腹痛。咳嗽嘔吐。精神疲頓。食慾

全無。舌苔厚膩。小溲短赤等症。

〔方解〕 紫蘇葉為芳香性健胃發汗利尿藥。有解毒作用。賞用於

時氣感冒。喘息咳逆。痞悶嘔吐。頭疼腹痛等症。並治蛇犬傷。解魚蟹

毒

白朮用為利尿健胃藥。

茯苓用為鎮靜及利尿藥。

大腹皮為利尿藥。善治痞悶腹脹。有下氣行水之功。

厚朴用為神經性胃腸病之特效藥。有平喘鎮咳鎮嘔鎮痛作用。

藿香 甘草 陳皮 半夏 桔梗 生姜 大棗 均見前

處方七 十神湯 葛根六。○升麻四。○陳皮五。○甘

草四。○川芎三。○紫蘇葉八。○白芷五。○麻黃三。○芍

藥六。○香附五。○

右十味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 流行性感。冒神經痛。惡寒發熱。無汗。或咳嗽咽痛。或

嘔吐腹痛。脈浮數。舌白苔等。

〔方解〕 升麻為解熱解毒藥。用為發汗排毒利咽消腫等。

白芷用為鎮痙鎮痛藥。

芍藥用為鎮痙藥。治頭疼腹痛等。

香附為健胃鎮痛藥。賞用於痞滿腹痛頭疼骨節痠痛諸症。因其有芳香性揮發油。對神經性胃腸病有特效。

葛根 陳皮 甘草 川芎 紫蘇葉 麻黃 均見前

(十三) 釀膿性病(敗血病或膿毒血病) (中醫稱瘟毒爛斑及疔瘡走黃等)

〔病原〕 此病傳染不僅一端。病菌亦不僅一種。惟釀膿之球菌為其最常最要者。所謂敗血病者。係指人體血液及組織被膿菌毒素

所侵而言也。

〔病理〕 鏈球菌。或葡萄狀球菌。由局部傳染。如生膿之外傷。大葉肺炎。脾脫疽。淋濁……等。大約先為局部膿菌病。繼即侵入血循環及組織。而成菌血病。或膿菌毒素侵血而為毒血病。

〔症狀〕 原染處若係外傷。則其傷處或變重。倘流膿。膿亦變狀。全身症狀。初起為寒戰大作。熱升高至一百〇三四度。繼出多汗。其寒戰每日或間日復發。雖似瘧。然前後寒戰相距之間亦微熱。病者顯沉重之全身症狀。皮常發斑癩。若染處在肺則氣喘咳嗽。胸膜及心包亦或受累。現極度之貧血。皮白。或染胆色而微黃。脾增大。或發炎而極痛。敗血病之急性紫癍可於三十六小時內完全遍佈。尋常有暗紅斑為之前驅。膿泡。水皰。深膿皰等間或併發。患最急性者似重。

腸熱病之情況。病者昏迷而死。

〔治法〕 處方一 正宗湯 牛蒡子一二。○柴胡七。○連翹

九。○貝母一〇。○荊芥一〇。○

右五味。剉作二百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 膿毒血病。寒戰發熱。喘息咳嗽。全身發斑。癩或膿皰等。

〔方解〕 牛蒡子為清血解毒藥。賞用於瘡毒斑疹。癰疽惡瘡。喉痺咳嗽。熱中消渴等症。

柴胡為解熱藥。有疎導淋巴管消炎清血變質作用。賞用於痘疹斑癩發熱諸症。

連翹為改血變質藥。有殺菌抗毒作用。賞用於癰腫惡瘡。瘰癧結熱。

寒熱蠱毒小便不利等症。因有排膿止痛利尿散熱消腫之功故也。貝母為祛痰鎮咳藥。有排膿解毒散腫作用。

荊芥為解熱藥。有清血抗毒鎮痙驅風作用。實用於產褥熱。破傷風。痙攣頭痛。能消瘡腫斑疹。利咽喉止吐衄。

處方二 黃連解毒湯 黃連三。○黃柏六。○黃芩六。

○梔子一二。○連翹一二。○甘草四。○牛蒡子一二。○

右七味剉作三百西西煎劑去渣一日分三次服

適應症 膿毒血病之因於鏈球菌而起。發熱劇烈。煩渴胸悶。全身症狀重篤。脈搏有力者。

〔方解〕 黃連為健胃消炎藥。實用於發熱嘔吐煩渴。黃疸。天行熱疾。瘡毒惡血。炎腫諸症。

黃柏為健胃解熱藥。有清血殺菌抗毒消炎作用。

黃芩為清涼性解熱藥。對於疔瘡膿腫。天行熱疾。肺熱喘咳。瘀血赤腫。上部充血諸症有特效。

梔子為解熱解毒藥。賞用於敗血病。黃疸。吐血。衄血等有特效。

甘草用為緩和解毒藥。

連翹 牛蒡子 均見前

處方三 平血散 升麻一〇・〇 葛根一四・〇 甘草八

〇芍藥八・〇

右四味。剉細末。絹包煎。作二百西西。去渣。一日分三次服。

適應症 膿毒血病。遍身發斑。癰膿。膿血。焮腫。熱痛。且癢等。

〔方解〕 升麻為解熱解毒藥。有清血消炎消腫作用。對於熱毒症瘡咽喉腫痛。肺癰吐膿等症有特效。

葛根為清涼解熱藥。有解毒治瘡作用。

芍藥為鎮痙鎮痛藥。有和血通經作用。對於上部充血之頭疼目赤。鼻衄喘急。癰疽惡瘡。小兒痘瘡等有特效。

甘草 見前

(十四) 陪斯忒(黑死病)又名鼠疫(中醫書如金匱之陰毒陽毒等)

〔病原〕 陪斯忒之特殊微生物。為耶耳辛氏及北里氏所查明。係一種桿菌。與鷄霍亂桿菌略相同。其中間宿主為跳蚤及臭蟲。其特性最易侵害鼠體。凡見鼠紛紛而死。則疫病將流行。鼠患多為敗血

性倍斯忒。跳蚤噬之。即帶其菌傳染他鼠或人類。此病多流行於夏季。然亦可發於酷寒時。患者不拘年齡。惟貧苦人及居陋巷者尤易患。

〔病理〕 淋巴腺充血而腫。四周之組織滲有血或漿液。及無數疫菌。較深之腺亦腫大。如腹股溝之腺受患。必累盆腺。肝充血。脾大。色深。腎腫。內臟漿膜粘膜肌等。多有出血之癍。肺或水腫。胸膜腔或有滲液。患肺倍斯忒者。則肺變硬。在肺倍斯忒及敗血性倍斯忒二者。其全身淋巴腺皆微腫而紅。

〔症狀〕 「腺腫性倍斯忒」為疫類之最多者。約居百分之七十八。初起頭痛背痠。四肢僵硬。熱度恆升。及第三四日。傍晚熱降。二三度。旋復升至高度。精神遲鈍。淋巴腺腫。體發斑點。或甚闕名「倍斯忒」。

斑」粘膜有時出血（鼻衄）亦有咯血者。腺腫化膿者係佳兆。脾腫約於三五日後始顯。惟第四日無斑疹顯出。舌變棕色。力脫。容狀甚急者。即於此期死亡。

「敗血性陪斯忒」為最急之患。熱不甚高。常有出血病者不及腺腫而於三四日內即死。此類約居疫病中百分之十四。「肺炎性陪斯忒」初起即突然發熱。呼吸淺表。胸痛。咳嗽痰內含血。較尋常肺炎色污而稀。呼吸聲辛澀。肺底扣之有實響。其熱增高。精神朦朧。皮膚早變紺色。脈微而速。脾速增大。二至四日即致命。

〔治法〕 處方一 解毒活血湯 連翹一二。○葛根一二。○

柴胡一六。○當歸一二。○生地黃二〇。○赤芍一二。○桃

仁（研）三二。○紅花二〇。○厚朴六。○甘草八。○

右十味。剉作四百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 腺腫性。或敗血性。倍斯忒。淋巴腺腫。大發斑。或化膿。或出血。四肢強硬。或轉筋等。

〔方解〕 連翹為改血變質藥。有解毒作用。賞用於惡瘡癰腫結熱。鹽毒等症。有解熱消腫。散諸經血結。利尿治淋之功。

葛根為清涼性解熱解毒藥。有利尿發汗散血排膿之功。

柴胡為清涼解熱藥。賞用於淋巴腺炎。血液毒。如產褥熱。傷寒溫瘧等症。有特效。

當歸為通經藥。又為清涼藥。對於惡血血痺。瘡癰諸症。有排膿活血止痛之功。

生地黄為清涼性通經藥。有強壯作用。能解熱利尿。對於出血性諸

病有特效

赤芍即芍藥之赤者。能清血液病之發熱。對於頭痛目赤鼻衄血痺等有效。

桃仁為鎮瘰通經藥。有清血化瘀作用。賞用於血栓塞。血瘀蓄血。血等症有特效。

紅花為通經藥。有消瘀解毒作用。賞用於天行時毒痘瘡不出等。本品內含紅色素及黃色素。有抗毒滅菌之功。可知。

厚朴為芳香性健胃藥。用治吐瀉腹痛。喘嗽脹滿等症有效。甘草為緩和解毒藥。

處方二 升麻鱉甲湯 升麻一二。○甘草一六。○炙鱉

甲二〇。○當歸一〇。○蜀椒(炒去汗)四。○雄黃四。○

右六味。剉作二百西煎劑。去渣。一日分二次服。病重者可一日連服二三劑。

適應症 倍斯忒斑疹。咯血。衄血。面赤。皮膚發紺。色腺腫。肢體

痛強硬。中國古稱陽毒面赤斑。斑如錦紋。吐膿血。咽喉痛。及陰毒面
目青。身痛如被杖。脈絡青紫。手足指甲色青等。

〔方解〕 升麻為解熱解毒藥。有發汗治瘡作用。賞用於咽喉腫痛
吐膿血。麻疹痘瘡發熱。瘟疫等症有效。

鱉甲為強壯藥。賞用於血病。如惡核陰毒。瘀血瘡腫。癥瘕勞熱等症。
尤其於易出血者。因本品有止血和血化瘀攻毒作用。故孕婦忌用。
蜀椒為殺蟲解毒藥。有利尿及健胃作用。賞用於水腫喘急。嘔逆脹
滿等症。並治鬼疰。蠱毒。腹痛。齒痛。

雄黃為殺蟲滅菌解毒藥。本品化學上名為「三硫化砷」。近世用作腐蝕及脫毛藥。古時則用治鼠瘻惡瘡或毒蛇蟲傷疥瘡及中惡鬼疰等症。

甘草 當歸 均見前

處方三 增損消毒飲 白殭蠶(炒)一二。○蟬退三。○

大黃一二。○連翹一二。○梔子一二。○牛蒡子一○。○藍

根一○。○甘草八。○黃連四。○桔梗八。○

右十味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 腺腫性陪斯忒頭疼。大熱大煩渴。發斑疹。咽喉腫痛。

氣急等。

〔方解〕 白殭蠶為消腫抗毒藥。實用於喉痺諸瘡。丹毒瘟疫等。有

散結消炎之功。

蟬退為解熱鎮痙藥。有解毒散腫利咽喉作用。

大黃為健胃及瀉下藥。對於急性熱病有蕩滌胃腸排除毒素誘導而消上部充血性炎腫諸症。

梔子為清涼藥用於清解血分熱毒。

牛蒡子用作解毒藥。

藍根為解毒殺菌藥。療腫毒散經絡結熱。

黃連為健胃消炎藥。有解熱除煩作用。

桔梗為排膿祛痰藥。用治咽喉痛。

連翹 甘草 均見前

處方四 三黃石膏湯 黃芩七。○黃柏八。○黃連四。

○石膏三〇。○麻黃六。○豆豉一六。○梔子一四。○
右七味剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 倍斯忒熱高煩渴。面赤目紅。舌焦燥。煩躁不寐。瀉妄。
脈數大無汗。斑疹隱而不達。

〔方解〕 黃芩為清涼解熱藥。用治天行時疾。煩悶口渴。疔瘡腫膿。
目赤瘀血等症。

黃柏為收斂性解熱藥。有消炎作用。對於目赤腫痛。口渴。舌生瘡。鼻
衄。煩渴等有效。

石膏為清涼解熱藥。對於溫病時氣。頭痛身熱。三焦大熱。煩渴躁狂
等有特效。

麻黃為發汗利尿藥。對於急性熱病。煩悶氣喘。無汗頭疼等症。用之

有。換。散。解。熱。排。除。毒。素。消。退。肺。炎。之。功。

豆。豉。為。解。熱。解。毒。藥。有。營。養。作。用。因。本。品。內。含。酵。母。菌。最。有。益。於。熱。病。煩。渴。傷。寒。時。疫。等。症。並。治。懊。懣。煩。躁。等。

黃。連。 梔。子 均。見。前

(十五) 炭疽(獸疔症)又名脾脫疽(中醫舊稱疔瘡羊疔等)

〔病原〕 本病為急性傳染病。係由炭疽桿菌為患。該菌形似桿狀。而不動。且各菌桿多相連接。其菌易殺。惟芽胞對於熱及藥與胃液。消化之抵抗力較他芽胞更能耐久。且出體後亦不易毀滅。病分三類。即累皮。累肺。累腸是也。在獸類為急性敗血病。而脾增大。牛羊患之者尤多。

〔病理〕 獸類之患者多因直接受毒菌所種染。如為昆蟲所咬。或食患本病而死之獸肉。尤常者乃因牧場藏有是菌。蚯蚓亦能為致病媒介。以其能將已埋土內的死獸之菌。佈至地面。至地土之沾有該菌者。其傳染力存留甚久。

人類患之者亦因受染該菌。自皮或自腸而入。罕見自肺入者。患者多係與獸及獸產為伍者。如牧人製革匠屠夫毛工等。病分兩大類。〔外炭疽〕〔內炭疽〕。內炭疽又分腸與肺兩類。

〔症狀〕 〔外炭疽〕 甲。炭疽惡性膿皰。染處在手臂面等處。數小時之內癢而有丘疹。漸浮成皰。皰圍之組織發炎變硬。三十六小時內染處有深棕色之腐肉。近處亦有水腫。發炎能由淋巴管傳達。鄰近之淋巴腺腫痛。溫度速升。致人顯熱病之狀。有至三或五日即死。

若不即死。全身狀減。腐肉脫。瘡漸愈。乙。惡性炭疽水腫。顯於臉、頭、
手臂等處。無丘疹及皰。惟有極重之水腫。而致壞疽蔓延。全身狀繼
亦極重。而致命。炭疽之接染處。在頭或面者。致命最多。在下肢者。致
命較少。

「內炭疽」其受染由腸胃。因食病獸之肉及乳所致。間或有繼外染
沾菌至口而致者。症狀為大中毒。初畏寒。繼則吐瀉。發熱。腿及腰痛。
病急則喘。皮色發紺。驚慮不甯。終則驚厥。食該病獸之肉者。有時或
多人同受此毒。肺炭疽又名毛工病。多發於揀選獸毛之工人。由塵
埃同該菌吸入。罕有早狀。寒戰猝發。極弱。腰與腿痛。呼吸速。胸痛。咳
嗽。枝氣管發炎。有在二十四小時內大衰弱而死者。有時炭疽外傷
及內炭疽之全身重狀同時并顯。

〔治法〕 處方一 蟾酥丸 蟾酥（酒化）六。○輕粉三。○銅

綠三。○煨寒水石三。○膽礬三。○乳香三。○沒藥三。○

麝香三。○硃砂九。○雄黃六。○蝸牛十八個 以上各為細

末先將蝸牛研爛同蟾酥研和再入各藥末共搗勻丸如菜豆大每

服三丸用葱白五寸令患者嚼爛吐於手心內將藥丸裹入葱泥內

用無灰熱酒一茶鐘乘熱送下蓋被出汗為度一日服二次如外用

將丸搓成條插入瘡孔內（開刀）外以膏藥蓋之。

適應證 不論內外炭疽惡寒發熱腿及腰痛皮色紫暗周身

骨節痠痛氣悶喘急等症。

〔方解〕 蟾酥為刺戟性攻毒藥用於疔瘡發背惡性腫毒小兒疳

疾等證且有強心作用。

輕粉為解凝變質藥。有殺菌殺蟲攻毒瀉下作用。用於一切瘡毒之入於筋骨者。並為驅除微毒之要藥。

銅綠為殺菌殺蟲攻毒治瘡藥。兼具變質收斂作用。用於微毒金瘡。惡性腫毒等症。

寒水石為清涼性解熱利尿藥。因其內含結晶性碳酸鈣。有消炎清肺鎮靜作用。

膽礬化學上名為「硫酸銅」。有收斂性。腐蝕殺蟲作用。用於諸惡瘡。喉痺。醋調灌之能大吐膠痰。疔瘡發背。微毒瘡腫根脚不紅不腫不收束者。往往用本品之合劑。內服有效。

乳香為鎮痛藥。因其內含芳香性揮發油。有和氣血。排瘡毒。療腫瘍。用於一切癰疽瘡瘍。胸脅腰腿。心腹諸痛。

沒藥功用與乳香相同。

麝香為興奮性回蘇藥。有強心作用。其極大之竄透力。善透脈絡諸竅。搜逐全體肌肉及血脈組織中諸凝滯毒素。治諸風諸氣諸血諸痛。古謂辟惡邪殺鬼精去三蟲。蠱毒中惡尸瘥等。實因有強力之殺蟲殺菌功效故也。

硃砂即辰砂。本品內含「水銀」「硫黃」化學上謂之「硫化汞」。專為變質鎮瘥藥。有殺菌解毒作用。治小兒驚搐胎毒痘瘡中惡腹痛驅瘧逐微等有特效。

雄黃化學上稱為「三硫化砷」。因其內含硫與砷二質。具有強力之解毒殺菌作用。治惡瘡寒熱腫瘍癬疥中惡腹痛蛇虺諸毒。

蝸牛為腹足類之軟體動物。有解毒利尿鎮痛鎮瘥作用。消諸腫毒。

痔漏。疔瘡。解蜈蚣蠍毒。搗塗有效。

處方二 七星劍 蒼耳頭 野菊花 豨簽草 地丁草

半枝蓮 各一二。○蚤休八。○麻黃四。○

右剉細。用陳紹酒四百西西煎至二百西西。去渣乘熱分二次服。出汗為度。

適應證 外炭疽惡性水腫。甚而外疽蔓延。全身證狀顯發熱。煩渴。胸悶。腰痠腿疼。惡寒頭痛無汗者。

〔方解〕 蒼耳頭為發汗鎮痙藥。有解凝排毒作用。治一切癰疽發背。惡瘡腫毒。遍身發癢。四肢攣痺。除諸毒蝥及狂犬咬毒。疥癩等症。因其又有殺菌殺蟲功用故也。

野菊花為解毒治瘡藥。其味極苦。有健胃消炎退腫鎮痛作用。治疔

瘡腫痛不可忍。煩躁垂死者有效。

稀簽草為解毒鎮痛藥。專治神經肌肉毒凝諸痛。如肢體麻痺。腰腿痠痛。口眼喎斜。及癰疽發背。疔瘡腫毒。搗汁外敷。消浮腫及虎嘯狗咬蜘蛛咬傷等。其解毒鎮痛之效甚大也。

地丁草為解毒藥。專治一切癰疽發背疔毒惡瘡。因其有清涼性。排毒利尿作用。

半枝蓮為殺菌解毒藥。蛇虺毒傷可搗汁飲。以其餘渣塗患處甚效。蚤休為清涼性解熱鎮痙藥。有治瘡解毒殺菌殺蟲作用。專治癰疽疔毒。及小兒驚癇搖頭弄舌手足搐攣等症。

麻黃為發汗利尿藥。有解熱排毒作用。治發熱惡寒頭痛脈浮緊等。因外感性毒素壅積於皮膚所致之病。

紹酒為興奮性行血藥能輔助藥力。通暢血脈。強壯提神。逐惡毒氣。
處方三 五味消毒飲 金銀花一二。○野菊花八。○蒲
公英一○。○紫花地丁九。○紫背天葵子六。○
右剉細作二百西西煎劑去渣。乘熱分二次服。蓋被出汗為度。

適應症 疔瘡腫毒。內外症狀。初起皮色發紺。炎性水腫。局部
麻木而不疼痛。體溫大升。煩躁發熱。腰痠腿痛等症。

〔方解〕 金銀花為清涼性解毒藥。專用於癰疽疔毒。血痢腸癖。有
發汗利尿作用。為一切腫毒之內服藥。使毒從小便而出。搗絞汁外
敷。有消毒消炎之功。又能解食菌蕈中毒。

蒲公英為健胃變質解凝利尿藥。善消疔腫。化熱毒。通淋解毒。用於
癰疽疔瘡乳腫。蛇咬毒。又能解食毒。並有緩和瀉下作用。

紫背天葵子為清涼性緩和輕瀉藥兼有利尿解熱作用。

紫花地丁 野菊花 見前

處方四 立馬回疔丹 輕粉 蟾酥（酒化） 白丁香 硫

砂各四。○乳香二。五 雄黃 硃砂 麝香各一。五蜈蚣

（炙）一條 金頂砒（須照外科金鑑製金頂砒法精製）二。○

右共研細末。麵糊搓如麥粒大。凡遇疔瘡。以刀開孔用一—二粒插
入孔中。以膏藥蓋之。追出膿血疔根為效。

適應症 外炭疽獸疔症或鍊鎖狀球菌所致之病。不論顏面

手臂。紅腫麻木。水皰疼痛。或皮色紫黑無頭。根腳紅腫散漫堅硬。而
兼全身症狀重篤者。用此外治。以追吊膿毒拔其疔根。

〔方解〕 白丁香為強有力之解毒藥。內含窒素有機物尿酸安母

尼亞及磷酸鹽類等。作外治用之。有腐蝕作用。鎮痛攻毒有特效。礪砂為溶血祛痰解毒藥。因其含有鹽化安母尼亞。具有發汗通經鎮痛等作用。善破瘀血。去惡肉。敷惡瘡。療金瘡。去目翳。弩肉。消宿食。治癥瘕積痢。

蜈蚣為有力之鎮痙鎮痛藥。有攻作毒用。用於痙攣麻痺。惡血癥瘕。積聚癰瘕痔漏。蠱毒臍風丹毒鬼疰等症。

金頂砒為砒石用鉛煇化後置砒入煇化之鉛中固封罐口煅煉烟盡為度。冷後打開。金頂砒即結霜於鉛面上。掃下應用。本品有殺蟲攻毒之效。外用為腐蝕藥。有蝕敗肉。追吊瘡毒之功。

輕粉 蟾酥 乳香 雄黃 硃砂 麝香等均見前

(十六)麻風(癩)又名大麻風(中醫稱大風癩疾)

〔病原〕 此病之原係一種桿狀菌。曰麻風桿菌。 *Bacillus Leplae* 形似結核菌。難培養。除組織中所見之常形外。亦有異形者。其傳染係由接觸患者而沾染。因麻風之瘡及痰液鼻涕等均含有該菌。菌之染人。係由粘膜與皮而入身。衣服亦能傳毒而染人。

〔病理〕 麻風毒之攻入。無論男女老幼皆易受害。麻風結節。係肉芽組織所成。有大小各細胞。有結締組織作架。細胞內及細胞間有麻風桿菌甚多。此病組織漸累及皮。致成長結節。起於面部者名獅面。粘膜亦受累。眼結膜及咽喉舌口等受侵。則諸感覺器障礙。神經受累。則麻木不知痛楚。其先期為生斑。斑或含色素。或白色。皆廣闊。最常見者為環狀。皆由麻風桿菌毒素侵害而顯之證狀也。

〔症狀〕 初顯斑狀麻木。歷時既久。廣闊之斑邊紅而略凸。血管充

血此斑疹或時發時消有一微狀卽手足膝股後面等處之皮突發
大泡小若豆大若蛋多少不等數日皴破結痂痂脫則存微白且或
麻木之癢其邊含色素而有界限該處少成潰瘍神經大痛又若蟻
行感覺過敏或麻木淋巴腺腫大有時發熱不豫各狀以皮狀為最
顯皮初腫之時捫之痛繼顯麻木癢臂腿麻木處之皮歷久則萎
縮腺減毛脫皮膚薄而緊或至於裂指及趾之甲罕脫惟粗澀或薄
或成小勾手足生潰瘍甚至穿關節致指及趾斷面神經受累則面
肌萎縮上臉下垂下臉外翻眼不閉合或不能動初時多淚繼則結
合膜發炎潰瘍口唇癱瘓致流涎難語口粘膜萎縮齟縮骨露牙脫
舌與口之粘膜皆麻木嚼肌萎縮難言語及飲食但此病經過時日
頗長七八年至二十餘年不等終則慘狀畢呈可怖可憫幸患者多

未及後期末至力竭。患併發症而逝。

治法 處方一 蒼麻湯 蒼耳草三〇。〇麻黃一〇。〇

白芷一〇。〇蒼朮一〇。〇甘草八。〇生姜一〇。〇

右六味剉細作四百西西煎劑。去渣。一日分三次服。取微汗為度。

適應症 麻瘋。肌肉麻痺。神經攣痛。癱瘓等。

〔方解〕 蒼耳草為殺菌殺蟲攻毒藥。因其含有揮發油故兼有鎮
痙鎮痛作用。善治風毒風溼。周痺。四肢拘攣疼痛。除惡肉去死肌。殺
蟲疔溼。又療疔腫。狂犬咬毒等。據近人經驗。為治癩病之特效藥。
麻黃為發汗利尿藥。有驅逐風溼及一切細菌毒素從汗液及小便
排除之功用。

白芷為興奮性驅風解毒藥。兼有鎮痙鎮痛作用。祛風燥溼。發表破

痰排膿止痛。善治頭面風毒諸痛。

蒼朮為發汗利尿健胃藥。用於小便因藥水腫及感冒胃腸加答兒等並能興奮精神。制止頭痛。

甘草為緩和性解毒藥。有滋潤粘膜及組織等乾燥之作用。往往用於強烈性藥物處方中之配互劑。有緩解藥物刺戟之力。

生姜為發汗驅風健胃藥。有鎮嘔作用。處方中加入本品不但為矯味且能促進胃腸之消化及分解。使藥力奏效迅速。

處方二 浮萍湯 浮萍一六、○麻黃一〇、○川芎七。

○荊芥一四、○芍藥九、○甘草六、○當歸一三、○

右七味剉細。作三百西西煎劑去渣。一日分三次溫服。

適應症 皮膚癬疥。癩瘡。癢痛麻木。斑毒。骨節痠痛。頭痛等。

〔方解〕 浮萍為發汗利尿解熱藥。其發汗之力較麻黃尤勝。治一切風溼。癱瘓癩瘡惡疾。消諸毒屬瘋癩。瘡癢麻痺。口眼喎斜。兼主出血性諸病。如衄血吐血等。

川芎為順血清血藥。兼有鎮痛鎮癱作用。主治寒痺筋攣。頭痛腹痛。瘡毒諸症。因其有利血脈消瘀血之作用故也。

荊芥為祛風發汗解熱藥。乃風病血病皮膚瘡毒之主治劑。有鎮癱解毒作用。治療癰瘡腫。搜風散瘀破積通血脈清頭目。治頭痛項強。拘攣。口眼喎斜。全身麻痺諸症。

芍藥為鎮癱鎮痛通經藥。用於拘攣性疼痛及頭痛腹痛。癰疽惡瘡。血癭諸證。

當歸為清涼性行血通經藥。且有鎮痛作用。能破瘀血養新血。滋皮

膚治癰疽。排膿止痛。及濕痺腰痛。婦人胎產諸病。

麻黃 甘草 皆見前

處方三 蒼耳膏 蒼耳草不拘多少。於小暑節採取。連枝帶

葉洗去泥土。切細。晾乾。以水煎。去渣。再加水煎。再去渣。將前後兩次藥液濾淨。再煎濃如流膏。磁瓶密貯。每服一瓢。開水沖下。一日三次。

適應證 麻瘋。不論初起病重。眉毛脫落。皮顯紫斑。麻木。筋肉

痛痺諸症。

〔方解〕 蒼耳草為隨處多有之一年生草。高四五尺。葉卵形而尖。

有缺刻。花帶綠色。結子。子多刺。名蒼耳子。亦入藥用。該草除根不用。

外餘皆有用。據世界新聞社消息云。民國二十一年春間。鹽城知縣龐性存赴淮接辦春賑。見該處一警吏張永茂者。容色異常。詢知曾

患麻風已至不可救藥程度。遇一老人授一治法。照服不半月全瘳。年來且養育兒女。重享家庭幸福矣。其法即蒼耳草煎膏也。嗣由龐君轉輟介紹。有多人試驗。均有奇效。祇此一味熬膏。每飯後取一二小匙沖服。半月即愈。重者一二月亦愈。愈後一如常人。不致復發。又有淮安城內義生藥號主人章鑑虞君。大批熬膏施送。得到不少成績。 (見上海慕爾鳴路吉安里世界新聞社印送傳單有詳細治療例)

處方四 烏蛇酒 烏梢蛇一至二條。高粱燒酒一至二觔。以蛇帶活浸入燒酒中。密封瓶口。二十餘日。取酒飲。每飯後飲一小杯。日三次。

適應症 大風癩疾。疥癬。風毒頑痺。皮膚麻木不仁等。

〔方解〕 烏梢蛇一名黑花蛇。為祛風攻毒藥。相傳昔中國有一患癩者。家人厭之。棄之山中。患者平日嗜酒。置酒壺于側。日夜取飲。而其疾亦日就痊癒。一日視酒壺。見中有死烏蛇。因悟病之日瘥。必由烏蛇有治癩之功能。此亦偶然發明之事實也。至烏梢蛇能治麻風之藥理作用。尚待後人研究。

處方五 大楓子丸 大楓子 當歸 紅花 苦參 沉香

各五○。○白花蛇 烏梢蛇各七五。○

右分別剉細。磨成極細粉。麪糊為丸。如菘豆大。每服三十丸。日服三次。開水送下。

適應症 大風癩疾。身體麻木。或疼痛久而難愈者。

〔方解〕 大楓子富含脂肪油。為一種強壯藥。對於癩之分裂菌雖

無直接作用。但興奮身體之代謝機能。有增加抵抗素以抗菌毒之作用。故為治麻風之良劑。

苦參為健胃驅蟲藥。其有效成分為脂肪油及揮發性植物鹽基。有殺菌消炎解毒作用。治癰腫療熱毒。惡瘡溼蘊。血痢黃疸癩疥等。

紅花內含紅色素及黃色素。有體內消毒作用。用於一切血液病。為通經藥。能活血止痛散腫。又用為婦科之要藥。主惡血腹痛。多用破血少用養血。並主瘡疽不出。可搗塗外用。

沉香含有芳香性之膠樣脂。為香竄性衝動藥。有鎮痛鎮痙作用。治冷風麻痺。拘攣轉筋。風溼皮膚癢。心腹痛等。

白花蛇為蕘蛇之別名。其蛇龍頭虎口黑質。白花脊有二十四個方勝文。腹有念珠斑。口有四長牙。尾上有一佛指甲。長一二分。腸形如

連珠多在石楠藤上食其花葉。有攻毒祛風作用。用於中風溼痺筋脈拘急。麻風疥癩等。

當歸 烏蛇 均見前

(十七) 肺結核 肺癆 (中醫稱傳尸癆)

〔病原〕 為結核桿菌 *Bacillus Tuberculosis* 所致之傳染病。該菌略彎曲。染色後有時顯含珠形。此則究係芽胞抑或係空泡所致。尚為一問題。至其傳染之路徑。大抵皆由呼吸道而侵入於肺。則為肺結核。若由消化而受染者。則為腸結核。由腭扁桃直接受染。則成淋巴腺及全身性結核。

〔病理〕 「肺結核」係結核菌由呼吸道染入。乘肺臟因感冒咳嗽或其他疾病等之弱點。而侵入肺之淋巴管。遂蔓延於四圍之組

織。致生乾酪樣變。結核之中央菌或其毒素而細胞質凝死。或變透明質。因纖維質增加而成堅硬之組織。無論何種結核。必有此二種變。乾酪樣變者破壞可危。堅硬變者自限不佈。病最後之結果。全仗抵抗力如何而轉移。有一種組織。結核桿菌一入即死。另有一種組織。該菌能屯居。多少致害。然自限不佈。終則因抵抗力增加而菌死。最壞之組織。却宜於該菌之孳生。有乾酪樣變而無硬變之限制。於是病日益增。菌日益多。不可收拾矣。

〔症狀〕 肺結核大概可分急性與慢性兩種。

急性肺結核俗名跑馬癆。病起驟突。寒戰。體溫速升。脅旁作痛。咳嗽。痰中有鐵鏽色血。與急性肺炎相似。病起後八至十日之間。所期望之肺炎病極期。乃不顯。病勢更劇。溫度不規則。痰粘液膿性。而色綠。

此為要徵。至第二三星期時症狀頑梗。醫者或猶認係未退之肺炎。豈知症狀逐漸增重。而有肺軟化之理學徵狀。痰內有彈力性纖維及結核桿菌。本病之著明期最早者六日或十三日。大多數延至三月之久。更有病起驟突而且劇烈。後則症狀漸減而成慢性類者。慢性肺結核之症狀。大概可分作三期論。(一)為結核發生期。(二)為結核軟化期。(三)為成窩期。惟此等解剖而分之病期。於臨床時所顯之症狀每不相符。茲為易以明瞭計。且論局部症狀。胸痛或早顯。或僅在咳嗽時覺之。咳嗽乃一最早之症狀。且本病多始終患之。初起時咳聲乾而短。繼則鬆而頻。兼吐粘涎膿性痰。或咯血。及痰內間或帶血。呼吸困難。(氣促)發潮熱。下午或至九十九度半。甚至百度不定。更有起病時即發顯明之間歇熱者。熱降之時常兼出汗。

(盜汗) 身體消瘦。若病勢進行則體重逐漸減輕。故稱身體之重量。即可知病勢之進行。當病之早期消瘦最速。每一星期內可減五六磅。迨至病勢停止進行及溫度低降則病者之體重逐漸增加。每星期增重兩磅。即係佳兆。喉常受累。或為聲音嘶嘶。或疼痛嚙時尤然。咳嗽作哮聲。或失音。或難嚙。精神易興奮。性神經更然。精力逐漸耗失。死時大概平靜無劇烈狀。精神至死不昏昧。

〔治法〕 結核病之治療法。首在食物營養身體。以促進其抵抗力之增加。暨需要良好之空氣及環境。以怡悅其身心。其次則與以藥物作對症之施治。以減其痛苦而已。

處方一 千金補肺湯 五味子二。○桂枝三。○麥門冬

一○。○大麥一二。○粳米一四。○桑白皮一二。○款冬花

粉麥芽糖等。故用於一切衰弱患者及結核病之兼現消化不良者有效。

粳米功效與大麥相似。

桑白皮為祛痰解熱清涼利尿藥。治虛勞客熱喘息咳嗽。水腫腳氣等。

款冬花為鎮咳祛痰藥。對於咳嗽喘息。肺痿吐膿。肺癆久咳等症有特效。

乾姜為芳香性刺戟藥。有健胃逐水祛痰鎮咳止嘔作用。治喘咳脹滿。痰涎稀薄。肺痿肺寒。痰飲上氣。畏寒等症。

處方二 補肺阿膠湯 阿膠一二。○馬兜鈴一○。○鼠

粘子一○。○杏仁一二。○甘草四。○糯米一五。○

右對細。作三百西西煎劑。去渣。後加入阿膠溶化。一日分三次溫服。
適應症 肺癆咳嗽咯血。咽痛聲嘶等。

〔方解〕 阿膠為滋養性強壯藥。含有生膠組織之軟骨膠質等。用於出血性諸疾患。如咯血吐血下血。婦人子宮出血等。有增加血液之凝固及粘補血管之破裂等作用。對於肺癆咳血。不僅有止血之功。抑且有潤肺之力。為陰虛肺癆治本之良藥。

馬兜鈴為祛痰鎮咳藥。治肺熱咳嗽喘促。及欬逆連連不止等症。其性清涼。又能解毒除瘡。對於肺癆久咳。咽痛生瘡等有特效。

鼠粘子為清涼性解毒祛痰藥。專治氣管及咽喉諸病。如喉痺咽痛。生瘡痰嗽。肺熱喉痛。及一切腫毒斑疹等。

杏仁為鎮靜鎮咳藥。專治欬逆上氣。喘息煩滿。又能潤氣管利咽喉。

及消積化痰等作用。

甘草為粘滑性滋潤藥。能滋潤喉頭粘膜緩和鎮靜咳嗽。

糯米為粘和性滋養強壯藥。有滋潤呼吸氣管以奏緩和鎮靜及粘補血管之功。能止肺癆久咳出血及咽喉乾燥等症。

處方三 百合固金湯 百合一二。芍藥七。甘草五

。○麥冬一二。○當歸一○。○地黃一四。○桔梗八。○貝

母一○。○玄參一二。○

右九味剉細。作三百西西煎劑。去渣濾清。一日分三次溫服。

適應症 結核性咽痛。肺癆久咳。痰血。聲音嘶啞。喉頭乾燥。粘

痰不易咯出者等。

〔方解〕 百合為滋養性強壯藥。有鎮靜祛痰作用。

地黃為滋養強壯藥。善理血分。有清血補血。行血通經。利尿等作用。治婦人崩漏胎產。及男子五癆七傷。女子傷中胞漏。能逐血痺。增骨髓。長肌肉。利大小腸。解熱消痰。血惡血止。吐衄。

芍藥為鎮痙鎮痛藥。因其內含安息香鞣酸及葡萄糖等。能緩和攣急。斂攝神經。平降血壓。又有收斂消炎作用。

當歸為清涼性通經藥。富含揮發性當歸油。有行血補血鎮痛鎮靜諸作用。治欬逆上氣。諸瘡。婦人崩中。月閉。男子虛癆血痺等。

桔梗為排膿祛痰藥。利咽喉。療口瘡。止欬逆。治下痢。癰疽。肺癰。胸脅滯痛等症。

貝母為祛痰鎮欬藥。治煩熱咳嗽。喉痺咽痛。肺癰。肺痿。吐血。化痰消癭。瘰癧。瘰癧。

玄參為清涼性消炎藥。能利咽喉。清肺熱。消瘡腫。治骨蒸。傳屍。癆傷。寒溫瘧。心驚煩熱等。

甘草 麥冬 見前

處方四 人參 養榮湯 人參四。○白朮六。○茯苓一二

○甘草三。○乾姜二。○大棗四枚 當歸六。○芍藥五。○

地黃一二。○桂枝三。○黃耆四。○遠志三。○橘皮四。○

五味子一。五

右十四味。剉作三百西。煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 肺癆。身體消瘦。倏寒倏熱。睡中盜汗。咳嗆咯痰不鬆。

或吐血。貧血。萎黃。行動氣喘。食後痞脹。或大便泄瀉。四肢疲軟。衰弱

無力等。

〔方解〕 人參為興奮強壯藥。有強心健胃作用。用於肺癆衰弱盜汗等。

白朮為健胃利尿藥。用於消化不良。泄瀉水腫小便不利等。

茯苓為有營養性之利尿藥。且有鎮靜神經作用。治欬逆心悸水腫脚氣。消痰涎安睡眠。

乾姜為芳香性健胃藥。能止嘔祛痰。治喘欬腹痛腹冷泄瀉。大棗為緩和性滋養藥。有鎮欬作用。

黃耆為緩和性強壯藥。有生長肌肉細胞強壯皮膚之作用。故能止汗斂瘡排膿逐水。對於衰弱性喘息汗多浮腫洩利等有良效。遠志為祛痰藥。用於氣管支加答兒及喘息咳嗽咯痰不鬆等。橘皮為芳香性健胃祛痰藥。有鎮嘔止欬消痰涎寬中利氣之功。

五味子為祛痰鎮咳藥可專應用於肺癆喘息。又有強壯作用。可用於衰弱性自汗盜汗。並腸勞病之早晨下痢。因其有收斂性退熱止嘔止瀉止咳定喘等功效故也。

甘草 當歸 芍藥 地黃 桂枝 均見前

處方五 秦朮扶贏湯（八門）秦朮二。○鱉甲一。○人參五。○當歸八。○半夏四。○甘草三。○地骨皮一。○紫苑八。○烏梅三。○生姜四。○柴胡六。○大棗三枚。右十二味判細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應證 肺癆骨蒸潮熱喘嗽聲啞。自汗盜汗。或寒熱往來。肺痿。欬唾痰沫。肌肉消瘦。顴紅。精神困倦等症。

〔方解〕 秦朮為解熱藥。有鎮靜神經鎮痛作用。治肢節痠痛。骨蒸

潮熱等。

鱉甲為滋養性強壯藥。因其富含膠質與有機鈣及磷等。有退熱補骨補血等作用。治虛勞寒熱骨蒸潮熱。遺精盜汗及女子崩漏下血等症。

半夏為鎮嘔鎮欬祛痰藥。有健胃及鎮靜作用。治欬逆嘔吐痰涎。咽痛頭眩及失眠。胸中痞悶等症。

地骨皮為清涼性解熱藥。對於氣管支炎。口腔炎及咽頭喉頭神經炎等皆可服之。並治吐血虛癆潮熱等。

紫苑為祛痰鎮欬藥。治欬血及喘息久嗽。五勞虛熱等。

烏梅為收斂性解熱藥。有健胃生津殺蟲作用。止下痢。治久咳嘔吐。骨蒸癆熱等。

柴胡為解熱藥。善治寒熱往來。胸脅苦悶。虛癆潮熱。骨節煩疼。羸瘦。婦人胎產諸熱。

生姜為芳香性健胃藥。兼有鎮嘔作用。能消痰。主喘欬。脹滿。腹痛。冷利等證。

人參 當歸 甘草 大棗 均見前

處方六 炙甘草湯(仲景) 炙甘草六。○生姜三。○桂枝四。○人參六。○地黄八。○阿膠八。○麥冬一。○麻仁六。○大棗三枚。

右九味剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 肺癆吐血。貧血。痿黃。心悸亢進。顏面蒼白。身體瘠瘦。

脈搏細弱。或歇止。肺痿喘嗽。畏寒。易於感冒等。

〔方解〕 麻仁為緩和性潤滑藥。有潤腸鎮痛作用。內含植物性脂肪油。略有營養之功。

甘草 生姜 桂枝 人參 地黄 麥冬 阿膠 大棗 均見前

處方七 甯肺湯（楊氏）人參四。○白朮八。○當歸八。

○地黄一○。○川芎四。○芍藥六。○甘草四。○麥門冬八。

○五味子二。○生桑皮八。○阿膠六。○茯苓八。○

右十一味。剉。作三百西西煎劑。去渣濾清。入阿膠烱化。一日分三次

溫服。

適應症 肺癆發熱。自汗盜汗。心悸亢進。短氣喘促。咳嗽。或腹

痛失血。肺痿羸瘦等。

〔方解〕 川芎為清血順血藥。兼有鎮痙鎮痛作用。治吐血衄血。五勞虛羸。頭痛腳弱。女子經閉。乾血癆等。

人參 白朮 當歸 地黃 芍藥 甘草 麥冬 五味子 桑

皮 茯苓 阿膠 均見前

處方八 咳奇方(東郭) 麥冬八。○阿膠六。○地黃一。○

○百合八。○桔梗六。○乾姜三。○白朮八。○五味子二

○甘草三。○

右九味剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應證 肺癆肺痿。久咳不止。痰沫稀薄。或咳血。行動氣喘等

症。

〔方解〕 麥冬 阿膠 地黃 百合 桔梗 乾姜 甘草 白

朮 五味子 均見前

處方九 黃耆鱉甲湯（羅謙甫方）黃耆八。○鱉甲一五。

○地骨皮一○。○知母八。○茯苓一二。○秦艽八。○桑白皮一○。○半夏六。○甘草四。○芍藥六。○柴胡四。○天門冬一二。○地黃一四。○肉桂三。○人參四。○桔梗五。○紫苑八。○

右十七味剉作四百西西煎劑去渣一日分三次服。

適應證 肺癆骨蒸潮熱自汗盜汗或乍寒乍熱身軀羸瘦及欬嗽痰血等症。

〔方解〕 知母為清涼性解熱藥且有利尿作用治肺熱欬嗽虛煩燥渴消浮腫清瘧熱及骨蒸勞熱其性潤滑能利大便脾虛泄瀉者

忌之。

肉桂之功用與桂枝相似。此為桂之幹皮。富含揮發油單甯等。為強壯健胃藥。常用於腹部之冷痛。或由衰弱而發之寒感及貧血。天門冬為祛痰鎮咳藥。又可作為強壯藥。能清肺熱。定喘欬。去寒熱。利小便。治五勞七傷。吐血。有潤肌膚強筋骨。消痰止咳之功。

黃耆 鱉甲 地骨皮 甘草 茯苓 秦艽 桑白皮 半夏

芍藥 柴胡 地黃 人參 桔梗 紫苑等均見前

處方十 獺肝散（淺田）獺肝六。○桔梗一○。○犀角四

○牛黃二。○甘草三。○

右五味。各研極細末。混和再研。每服四。○淡鹽湯或童便沖服。日服三次。

適應證 結核性肺炎。及潰瘍性肺結核。致吐膿血腥臭。發熱煩悶。胸脅痛。肋膜炎。支氣管肺炎等。因於結核性者。

〔方解〕 獺肝為兩棲類鼬鼠科水獺之肝臟。有排除毒素清血而兼營養之功。且有殺蟲輕瀉作用。為虛勞效嗽。傳尸鬼疰之效藥。犀角為解熱解毒藥。有強心鎮靜作用。治癰疽熱毒及吐血衄血下血蓄血發狂發斑等症。又可作為強壯藥。能補虛癆。退熱消瘦。及小兒驚癇等。

牛黃為清涼性解毒藥。有強心清血鎮靜等作用。治小兒驚癇大人狂癲。天行時疫。化熱利痰。安魂定魄。用於因毒素而發高熱諸症。

桔梗 甘草 均見前

(十八) 淋巴系統結核病(瘰癧)(中醫稱癭癧)

〔病原〕 與肺結核同。

〔病理〕 因結核桿菌侵及淋巴腺。若腺之本體缺乏碘質而抵抗力不足。致此慢性之病。頸淋巴受患。特稱瘰癧。淋巴腺結核之特別預因。則為粘膜之卡他。亦能致鄰近之腺微發炎而減其抵抗。小兒如常患復發之咽鼻部卡他。則結核桿菌遂由粘膜侵入而達最近之腺。腭扁桃腺往往先受患。全身性結核。係染及全身各淋巴腺。腺體增大。最甚者為腹膜後腺。及腸系膜腺等處。

〔症狀〕 頸淋巴腺結核。為頷下淋巴腺腫較大於彼一側者。迨漸增大則成瘤狀。可捫覺。面滑而質堅。此瘤狀有時孤立。然聯結而成一大腫瘤者較常見。捫之皮每活動而不與瘤粘着。終則多數皮與瘤粘着而發炎成膿。倘割開或自破則成漏而收口不易。當腺腫大

正盛之際則發熱病者常顯貧血。此病進行緩而困苦。然不常致命。支氣管腺結核者。有時成一大瘤。小兒則每易生膿。氣管叉處之腺。每先受累。大概以右側為最甚。發不規則之熱。體現衰弱。消化不良。咳嗽屬陣性。多帶金音。故有誤為天哮嗆者。若喉顯蟬鳴（喉笛音）則多屬呼類。胸後部之靜脈膨脹。喉吸氣時不下降。

腸系膜腺結核者。係系膜腺及腹膜後腺等增大及變乾酪樣質。亦或有成膿及成石灰性變者。惟較少。腺受累於身體之滋養有大妨礙。患者每萎弱消瘦及貧血。腹增大作鼓狀。常有洩瀉。糞質薄而甚臭。發熱不甚高。增大之腺多不能捫着。因腸鼓脹故也。腹膜常受累。致腹大而硬。而有小結體可捫着。本病小兒患之者極多。成人則除全身症狀相同外。臍之右側往往現易移動之大塊。局部疼痛甚。或

腹瀉。致常疑為闌尾炎。

〔治法〕 處方一 柴胡連翹湯 柴胡五。○連翹八。○知母

六。○黃柏五。○生地黃一。○甘草四。○瞿麥一二。

牛蒡子六。○當歸尾五。○肉桂二。○

右十一味剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 頸淋巴腺結核。虛癆潮熱。寒熱往來。婦女兼月經閉

止等。

〔方解〕 柴胡為清涼性解熱藥。有疎導淋巴管及清血消炎作用。

治痰熱積結。胸脅苦悶。寒熱往來。及婦人胎產諸熱。

連翹為清涼性解毒變質藥。專治癰癤癰腫。結熱惡瘡。有殺菌殺蟲。

利尿通經排膿解熱諸作用。故又可用於疥癬水腫五淋鹽毒等病。

知母為清涼性解熱藥。專作用於結核性肺癆諸熱之清熱劑。兼有鎮欬除煩作用。

黃芩為清涼性解熱藥。兼有健胃消炎作用。治寒熱往來。腸卡他。急性下利。骨蒸潮熱。及疔毒癰膿。天行熱腫等。

黃柏為收斂性消炎解熱藥。有殺菌殺蟲健胃作用。治骨蒸癆熱。下利腸痔。熱瘡。口瘡。蟲疳。及小兒痘瘡等。

生地黃為營養性強壯藥。有解熱及通經作用。治療血吐衄。男子五勞七傷。女子傷中漏下。除寒熱積聚。逐血痺。補精髓。

甘草為緩和粘滑藥。兼有營養作用。能解百藥毒。及潤喉鎮咳。緩和諸筋脈絡攣急。

瞿麥為利尿通經藥。有排膿解毒治瘡作用。能通血脈。利水道。消癰。

腫○清頭目○治五淋癰閉○及痔瘻等○

牛蒡子為清涼性解毒治瘡藥○能散熱結○消腫毒○利咽喉○去風毒○治煩熱○欬嗽○斑疹○癰疽○惡核等○

當歸尾即當歸之梢根○為清涼性通經藥○有行血補血活血止痛之○功○

肉桂為強壯性健胃藥○有興奮血行○溫壯神經作用○常用於貧血寒○冷○腹痛○腰痛○筋脈拘攣等症○

處方二 防風羌活湯 防風五。○羌活四。○連翹八

○升麻四。○夏枯草八。○牛蒡子八。○川芎四。○黃芩六

○薄荷四。○昆布八。○海藻八。○殭蠶一。○甘草四

○

右十三味。剉細。作三百西。煎劑去渣。一日分三次服。

適應症 結核性頸淋巴腺增大。有時略覺掣痛。微有寒熱。頭痛。瘰癧初起。及中期。雖發炎而未潰裂者。

〔方解〕 防風為解熱藥。有鎮靜鎮痛作用。用於感冒性風痛頭痛。目赤。上部充血。心胸煩滿。諸症。

羌活為鎮痛藥。對於頭部諸痛尤有效。有發汗解肌。緩和神經攣急作用。用於感冒性頭痛。上部神經痛。口目喎斜。筋脈攣急。及五勞七傷。產後諸風等症。

升麻為解熱藥。有解毒治瘡作用。對於上部及咽喉諸症尤效。消咽喉瘡痛。療口瘡。及麻疹痘瘡。並寒熱風腫。肺痿吐膿等症。

夏枯草為解熱治瘡藥。專治瘰癧頭瘡。腳氣溼腫。有清熱散結。通絡。

利痺之功。並治諸瘡寒熱。鼠瘻結核等症。

川芎為鎮靜鎮痙藥。有活血順血通經作用。能通經絡。疎氣滯。行血排膿。治頭痛吐衄。五勞風溼。婦人經閉等。

昆布為變質藥。用於腺病水腫等症。有特效。因其內含沃度（碘）膠質等。故能治療癭惡核。並利水道。去浮腫。

海藻為解熱變質藥。其成分富含海碘。為治癭瘤瘰癧惡核癰腫之效藥。能通利水道。散熱結。消炎腫。排膿化痰。故兼治水腫腳氣。卯疝疼痛等症。

殭蠶為解毒驅風藥。民間多用於中風失音。喉痺癱症。諸瘡等。有散熱結。化痰涎。消腫毒。緩神經作用。故能治咽腫丹毒。中風驚癇等症。薄荷為清涼性興奮健胃藥。有發汗解熱及鎮痛作用。用於外感性。

頭痛。小分劑則能解勞乏。退勞熱。並治療瘕疥瘡。利咽喉。口齒諸病。大分劑有發汗興奮之功。

牛蒡子 連翹 黃芩 甘草 均見前

處方三 和營散堅丸 川芎四。○白芍六。○當歸一。

○茯苓一。○。○熟地黃一四。○陳皮七。○桔梗七。○香

附七 ○白朮九。○人參四。○甘草四。○海蛤粉一四。○

昆布一二。○貝母一。○。○升麻五。○紅花五。○夏枯草七

○。右十七味。共研細末。蜜為丸。如菉豆大。每服三錢。一日三次。食後用開水送下。

適應症 瘰癧堅硬如石。日久精力衰弱。肌肉瘦削。貧血。或穿

潰流膿等。

〔方解〕 芍藥為鎮痙鎮痛通經藥。略具收斂作用。能斂陰養血。散瘀清熱。治虛癆寒熱腹痛洩利及癰疽惡瘡等。

茯苓為利尿藥。有安神鎮靜作用。用於水腫腳氣。痰水恐悸等症。陳皮為芳香健胃藥。有制嘔消痰作用。且能作矯味藥。

桔梗為祛痰藥。有促進粘膜炎分泌作用。利腸胃。咽喉。排膿止咳。香附為鎮痛通經藥。應用於頭痛。發散氣鬱。消化食物。制止婦粘液性子宮分泌物為目的。

白朮為健胃利尿藥。應用於水腫及胃與腸卡他兒等。並能消化食物。消痰止毒。

人參為興奮性強壯藥。有祛痰利尿作用。實用於衰弱肺癆盜汗等。

海蛤粉為祛痰藥。兼有利尿作用。因其富含有機鈣。主治項下瘰癧。水氣浮腫。婦人崩中帶下。咳逆上氣。消渴煩滿胸痛等。

貝母為祛痰鎮咳藥。有排膿散鬱作用。賞用於肺結核。及咽卡他咳嗽吐血虛癆煩熱。肺癰肺痿等。

紅花為通經藥。有祛痰鎮痛作用。對於月經閉止及困難或歇斯的里咳嗽等。皆有效。並能活血散腫。主治瘀血作痛。

川芎 當歸 地黃 甘草 昆布 升麻 夏枯草 均見前

處方四 內消連翹丸 連翹 桃仁 白朮各三份 射干

夏枯草 土瓜根 澤蘭葉 沙參 漏蘆各二份

右丸味。共為細末。蜜丸。如菜豆大。每服二錢。一日三次。開水送下。

適應症 支氣管腺結核。咳嗽陣發。喉頭顯蟬鳴。或喉間癭瘤。

而未潰膿者。

〔方解〕 桃仁為通經藥。有鎮咳緩下作用。能治療血血閉。心腹痛。寒熱。乾血癆。熱止咳逆。殺蟲消堅。

白朮為止血藥。應用於瘡毒潰瘍。肺癰吐血。肺結核壞變等。有鎮痛解毒。及促進肉芽發生之效。

射干為瀉下藥。有解毒散血消腫鎮靜作用。賞用於氣管枝腺及扁桃腺炎之腫脹及疼痛。故主喉痺咽痛。欬嗽氣逆。胸滿積氣等。

土瓜根為通經利尿藥。有消炎排膿作用。散癰腫留血。熱積鼠瘻。

澤蘭葉為通經利尿藥。兼有排膿治瘡作用。治婦人產前產後血氣諸病。及貧血衰弱虛癆羸瘦等。

沙參為祛痰鎮咳藥。應用於氣管支卡他。肺結核肺膿瘍。並療惡瘡。

疥癬有排膿消毒之功。

漏蘆為解毒治瘡藥。應用於惡瘡癩癧。皮膚熱毒。有下乳汁。通經脈之功。

連翹 夏枯草 均見前

處方五 消疳飲（濟世）人參三。○黃連三。○神糶一。○茯苓一二。○白朮一。○青皮四。○縮砂仁三。○甘草三。○胡黃連五。○

右九味。剉細作二百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 小兒腸系膜腺結核。腹脹如鼓。身軀瘠瘦。貧血萎黃。發潮熱。腹部青筋暴露。大便或溏瀉。而甚臭穢。舊稱脾疳。初起用之。

有特效

〔方解〕 黃連為健胃止瀉藥。用於消化不良。腸卡他兒。及黃疸等。主治潮熱。嘔吐。煩渴。腹部膨滿。蛔蟲腹痛。洩瀉等。

神糲為消化藥。用於消化不良。洩瀉。腹部膨滿。胸腹作脹。肌瘦不欲食等症。

青皮為清涼解熱藥。有健胃止咳作用。消痰散痞。破滯疎肝。胆。用於胸膈氣逆。呃忒。久瘧。及小兒食積。成人腸疝等。

縮砂仁為刺戟性健胃止瀉藥。用於腹痛下利。宿食不消。虛癆冷瀉。脾胃之氣結滯不散。噎膈等症。

胡黃連為健胃殺蟲藥。有清涼解熱作用。實用於虛癆骨蒸。小兒疳積。潮熱。嘔吐。下利。咳嗽。婦人胎熱等。

人參 茯苓 白朮 甘草 均見前

處方六 消癰湯（枳實）柴胡四。○茯苓一。○猪苓九

○澤瀉八。○山查八。○蟬甲一二。○三稜四。○莪朮四

○黃芩五。○白朮八。○檳榔七。○半夏五。○人參三。

○甘草三。○胡黃連三。○

右十五味。剉作三百西西煎。去渣。一日分三次服。

適應症 小兒結核性疳癰發熱。口乾。小便不利。寒熱。胸滿。腹脹等。

〔方解〕 猪苓為利尿止渴藥。用於水腫淋疾及糖尿病口渴腳氣。痲瘰。蠱症發熱。心中懊懣。胎腫子淋等。

澤瀉為清涼性利尿藥。用於腹水淋疾。糖尿病等。略有強壯作用。能補虛固精。治眩暈耳鳴。止渴。逐溼痺。通乳。行痰水。止嘔吐。

山查為消化藥。有健胃作用。對於消化不良。脹滿腹痛。疝氣下利。及婦女分娩後子宮收縮陣痛等有效。

鱉甲為強壯藥。常用於女子虛癆。及血病。能除心腹癥瘕。堅積。消瘡。腫腸癰。瘀血瘡。母。治癆瘦骨蒸等。

三稜為鎮痙通經藥。用於癥瘕積聚。瘀血血閉。氣脹。心腹痛等。有破氣消瘀健胃化食之功。

莪朮為通經藥。兼有健胃鎮痛作用。治心腹滿痛。破癥瘕。冷氣。婦人血氣結積。男子奔豚。

檳榔為健胃殺蟲藥。能逐水除痰癖。破積聚。癥結。治腹脹。奔豚。腳氣。腹痛。下痢。瘡疾等。

半夏為鎮嘔祛痰藥。用治咳逆頭眩。胸脹咽痛。痰瘧。反胃吐食等。

柴胡 茯苓 黃芩 白朮 人參 甘草 胡黃連 均見前

(十九) 繼發性腸結核病(腸癆) (中醫書名脾癆或中損於脾等)

〔病原〕 見肺結核。

〔病理〕 本病都由慢性肺結核而來。因含結核菌之痰嚥入胃腸。損害區多半在小腸盲腸結腸等三處病之起也。多由腸淋巴結及粘膜初生結核。繼則變乾酪樣質而軟。遂潰爛成瘡。該瘍有時甚廣闊。致大小兩腸之粘膜多半受累。直腸結核每與肛門瘻有密切關係。損害區多數有結核菌。可由糞內或其瘻所出之物內查得。倘直腸組織內有結核菌。則肺大抵亦必受累。若將腸瘻割去。則肺病之進行必驟增重。

〔症狀〕 除肺結核之症狀外。必有大便祕結與腹瀉等輪迭發顯。局部症狀則盲腸部生慢性過長性結核。有時蔓延入闌尾。右髂凹成一有定界之瘤形塊。大小不定。常作長豎勢。堅硬。略可移動。或四圍粘着不動。按之則痛。

〔治法〕 處方一 鱉甲散（聖惠）鱉甲一〇。〇芍藥八。〇當歸一〇。〇茯苓九。〇川芎七。〇木香三。〇柴胡六。〇白朮九。〇黃耆一〇。〇甘草四。〇人參六。〇
右十一味。剉作三百西。煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 腸癆下利。或腹痛。骨蒸潮熱。羸瘦。不思飲食。四肢疼痛等。

〔方解〕 鱉甲為滋養性強壯藥。因其富含膠質及有機鈣燐等成

分故對於結核性諸症如潮熱骨蒸虛癆羸瘦癥瘕堅積痔瘻瘰癧等有特效。又能消瘡腫腸癰化瘡母。斂潰瘍陰瘡之功。

芍藥為收斂性鎮痛止瀉藥。賞用於瀉痢腹痛。虛癆寒熱。婦女月經不調等症。

當歸為清涼性通經鎮痛藥。有補血活血行瘀血排膿止痛作用。於血虛羸瘦。虛勞寒熱。腰疼腹痛。瘡癰及婦女月經不調等症常用之。茯苓為利尿藥。兼有鎮靜作用。對於心悸煩滿。咳逆口渴。水腫腳氣等症頗賞用之。

川芎為鎮痛活血藥。有促進血液循環。降低血壓之作用。賞用於衰弱性頭痛。經絡四肢諸神經痛。及胸腹堅痛。癥結。下利。腰腳軟弱。吐血。衄血等症。並療瘰癧痔瘻。婦人經閉。及中風半身不遂等。

木香為健胃藥。且有收斂性。特賞用於下利腹痛。痰壅氣結。癥塊腹脹等症。又可作殺蟲殺菌藥。為防腐辟蠱藥之原料。

柴胡為解熱藥。有促進淋巴液循環。及消退淋巴炎作用。對於虛癆潮熱。胸脅苦悶。及心腹腸胃結氣。痰熱積滯之症有特效。

白朮為健胃利尿藥。應用於腸卡他兒。水腫。小便不利。心腹脹滿。痰癖。吐下。口渴。自汗盜汗等症。

黃耆為緩和性強壯藥。有促進肌肉細胞生長之作用。故有特效於癰疽敗瘡。五痔鼠癭。虛癆羸瘦。盜汗自汗等症。並能排膿止痛。逐水利尿。

甘草為粘滑性緩和藥。因其富含樹脂膠質等。有緩解急迫諸痛。及粘着包攝粘膜創傷。防禦刺戟作用。用於下利腹痛。小便淋痛。及喉

痛效嗽等症。

人參為強壯強心藥。有祛痰利尿之功。實用於衰弱肺癆虛脫盜汗等症。

處方二 赤石脂湯（青州） 赤石脂（研細）三，○黃芪六

○人參四，○白朮八，○當歸六，○陳皮五，○升麻四

○柴胡四，○生姜四，○甘草四，○大棗三枚

右十味。剉細。作二百西西煎劑。去渣。入赤石脂。未用棒攪。和一日分三次溫服。服時須攪動。

適應症 腸癆下利。痔漏瘡癩。臟毒流膿血。或腹痛肛墜。身體

羸瘦潮熱等。

〔方解〕 赤石脂為吸着劑。內服有制止腸粘膜之分泌作用。一面

有吸着一切腸內毒物而排出之功。且能包攝腸內創傷保護粘膜。止瀉斂瘡。療癰治痔及婦人崩漏帶下等症。

陳皮為芳香性苦味健胃藥。能催進食慾。及消化。制止嘔吐及腹痛等。

升麻為清涼性解毒藥。消諸瘡之毒。治咽痛。麻疹痘瘡。解腸室扶斯之熱。及肺癰吐膿血等。

生姜為健胃藥。能促進消化。制止嘔吐。祛痰鎮咳。及腹痛冷利等。

大棗為緩和性滋養藥。富含粘液質。及砂糖等。既有營養之功。又有粘滑作用。能鎮咳祛痰。緩解急腹痛等。

黃芪 人參 白朮 當歸 柴胡 甘草 均見前

處方三 九味柴胡湯(樞要)柴胡五。○黃芩四。○人參

四。○梔子六。○龍胆草三。○當歸八。○芍藥四。○甘草三。○半夏三。○

右九味。剉細。作二百西。煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 瘰癧潮熱。肛癰。便毒。或小腹鼠蹊部分結核。或頸淋

巴腫潰。耳下耳內等處生瘡化膿。及瘡瘍之有寒熱往來。古稱為肝經溼熱諸病等。

〔方解〕 黃芩為清涼解熱藥。專用於腸溼洩利。寒熱往來。骨蒸潮熱。瘡癰膿腫。肺癰出血等。

梔子為解熱藥。有清血解毒消炎作用。治瘡瘍熱毒。吐血衄血下血等。能利小便解煩熱。

龍胆草為健胃解熱藥。內服於胃腸。有消炎作用。治下利潮熱。殺蟲。

消瘡腫。及小兒疳癆煩熱等。

半夏為祛痰鎮嘔藥。用於咽喉之腫脹。及散疼痛。出聲音。

柴胡 人參 當歸 芍藥 甘草 均見前

處方四 小金丹（外科全生集）白膠香 草烏頭 地龍

木香各六〇。〇乳香 當歸身各三〇。〇麝香一二。〇墨炭

五。〇

右九味共為細末。用糯米粉糊打和為丸。如豌豆大。每服一丸。一日最多服二次。食後開水下。普通一次。可連續服數十日。

適應症 結核性流注。癰毒。瘰癧。及關節炎。肛癰。鼠瘻。橫痃。或骨結核。皮膚結核等。化膿性諸結核病。

〔方解〕 白膠香亦名楓香脂。屬漆樹科「楓」之枝幹損傷處流出。

之一種樹脂。呈褐黃色。內含多量 *Mastic*。用以製為「拔爾撒謨藥」。一稱樹脂性收斂藥。具有限制分泌及凝固組織之作用。用於氣管支粘液漏諸症。並有解毒鎮痛生肌止血之功。為治癰疽金瘡外科諸症之效藥。

草烏頭之主要成分為「耶普阿哥尼丁」*Japconitine* $C_{66}H_{88}N_2O_{21}$ 。為有毒之鎮痛祛痰藥。用於風病、癩癧、癌腫等。能搜風勝溼、開頑痰、治頑瘡。有以毒攻毒之效。

五靈脂為寒號蟲 (*Pteropidae*) 之糞。該蟲為蝙蝠中之最大者。其糞色黑甚臊惡。用為收斂藥。有殺菌解毒鎮痛制泌作用。治血氣之痛。婦人月經過多。或產後一切腹痛、疝痛、療小兒疳積、殺蟲。並可外用於蛇蠍蜈蚣之咬傷。

地龍一名蚯蚓。為解熱利尿藥。能通經絡。療風痺。有弛緩肢節拘強神經。攣急之功。治中風腳氣。瘰癧喉痺。傷寒伏熱。黃疸溫瘧諸熱症。乳香為鎮痛藥。用於癰疽諸瘡。及心腹諸痛。

麝香為芳香性回蘇藥。有強心及鎮痛解毒作用。用以開經絡透肌骨。因其最有竄透性。故能治諸風。及骨節間毒。又能蝕一切癰疽膿水。主婦人難產。能墮胎。妊娠忌用。

墨炭為收斂藥。能制止分泌。吸着毒素。有止血止痛等作用。

木香 當歸 見前

(二十) 阿米巴痢疾 (中醫舊稱腸癖或滯下等)

〔病原〕 此病係一種動物原蟲名「阿米巴」又名「變形蟲」。多由未煮熟之飲料水及菜蔬或蒼蠅等為媒介而受傳染。該蟲之形狀。

與白血球略相似。其直徑較赤血球大三五倍。其原漿（或名原生質）可分內外兩層。中有核。受七十二度（二十四度）之熱則伸出假足。乾則自死。有一種「阿米巴」外生被膜以自包。內有四核。乾亦不死。能存活數月之久。名「包繞類阿米巴」。其致病能較前者更甚。

〔病理〕 患處多在大腸或迴腸（小腸下段）腸之損害區初腫。繼則粘膜死而脫。成潰瘍。或圓或橢圓或不規則形。邊緣凹陷。瘍淺成於粘膜下層。若瘍深則達肌層。或漿膜層。甚或穿破漿膜。有時密集許多潰瘍。致全腸幾皆受累。瘍底及其周圍組織間顯若干阿米巴。有時門靜脈毛細管內亦有之。由此而累及肝臟。致發肝膿腫。

〔症狀〕 有輕。急。慢性三類。輕性者初不覺為痢疾。惟有頭痛不爽。腹痛或下稀糞。驗以顯微鏡則見阿米巴。或變成急性痢疾。否則或

致肝生膿腫急性則多顯急狀腹痛裏急後重大便似血或雜血粘液病益急則大便帶血粘液或兼出死粘膜片甚大體溫不甚高患者速瘦心力衰竭不及一星期即死有時腸出血或潰瘍穿孔致腹膜發炎此病愈者雖多而成慢性者亦不少慢性者多由急性或亞急性漸次變成其表狀即大便瀉秘輪流或纏綿半年至年餘增劇時則腹痛頻下血粘液熱略升患者不甚瘦亦不甚苦病時愈時復胃口不開消化作用略減若誤食不應食之物即瀉舌紅滑作似牛肉狀疾久則瘦漸甚

〔治法〕

處方一

芍藥湯

芍藥一二

黃芩六

黃連四

○當歸一

○肉桂三

○甘草四

○檳榔九

○木香四

右八味對細作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 亞急性阿米巴痢疾。腹痛裏急後重。大便下粘液或

雜血。心力衰弱。體瘦。或急性阿米巴痢初起體溫不高者。

〔方解〕 芍藥為鎮痙鎮痛藥。因其內含安息香酸。及鞣酸。故具有收斂消炎作用。且能緩和拘攣。腹痛腸疝痛等。為治痢疾腹痛後重之特效藥。

黃芩為苦味健胃及解熱藥。又有作用於腸部消炎。及清涼性整腸止瀉。治洩痢癰瘡。黃疸腸潴腹痛。寒熱咳嗽失血等。

黃連為苦味健胃藥。用於消化不良。腸卡他兒。腹痛膨滿。虻蟲嘔吐。赤痢腹痛等。

當歸為清涼性通經藥。有順血鎮痛作用。治婦人月經困難。諸瘡瘍。

下利腹痛。能養血補血。排膿止痛。潤腸胃。滋皮膚。為婦人及男子一切血液病要藥。

肉桂為強壯性健胃藥。常用於腹部之冷痛。或衰弱而發之寒覺。及貧血脈弱。體溫低落等。

甘草有緩和急迫。及粘滑包攝作用。為痢疾腹痛之緩解藥。用於腸管之加答兒時。則被包腸壁以防刺戟。故有鎮痛鎮靜腸粘膜之功。且又用於腐蝕性或刺戟性物質之中毒。或為有刺戟味藥物之調味藥。或為防止瀉下及驅蟲藥之吸收而配入之。

檳榔用為健胃殺蟲藥。有殺蟲防腐及收斂作用。用於下利腹痛嘔吐。腹部膨脹。消化不良等有效。

處方二 烏梅丸（仲景）烏梅四 ○細辛三 ○乾姜三

○黃連四。○蜀椒二。○當歸一。○黃柏六。○桂枝四。

○人參五。○附子二。

右十味。剉細。蜂蜜為丸。每服一。○。○。一日三次。開水送下。或作二百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 慢性阿米巴痢疾。久而不愈。貧血。身體衰弱。嘔吐或厥冷。及蚊蟲腹痛等。

〔方解〕 烏梅為收斂性解熱藥。有健胃殺蟲作用。用治下利嘔吐。生津止咳。

細辛為鎮痛藥。治頭痛及骨節拘攣。風溼痺痛。去口臭。有健胃除脹作用。

乾姜有健胃驅風作用。用於冷痢腹痛。嘔吐痞脹。消化不良等。

附子為興奮強心藥。用於衰弱寒感。冷痢腹痛。貧血虛脫等症。

蜀椒為健胃殺蟲藥。有鎮痛鎮嘔作用。用於蚊蟲。嘔吐下利腹內冷痛等。

桂枝為健胃強壯藥。用於衰弱性寒感。頭痛腹痛。痞悶腹脹。消化不良。嘔吐下利等。

人參為強壯性健胃藥。用於胃腸機能衰弱。久下利。身體羸瘦。消化不良等。

黃柏為健胃解熱收斂藥。對於洩利腸癖。黃疸腸痔等有特效。並治小兒疳積。有殺蟲消炎之功。

黃連 當歸 見前

處方三 芍藥加芒硝湯 芍藥一二。○當歸一○。○大

黃一○。○木香三。○肉桂二。○黃連三。○檳榔九。○黃
芩六。○甘草四。○芒硝一○。○
右九味。剉細。作三百西西煎劑。去渣。濾過。再入芒硝。微火上溶化。一
日分三次溫服。

適應症 急性阿米巴痢疾。使下膿血。腹痛裏急後重。屢次如
廁。欲便不爽。

〔方解〕 大黃為健胃及緩瀉藥。有清涼性消炎及收斂腸粘膜作
用。用其小分劑頻服。能治消化不良。大分劑頓服。有下宿滯及腸胃
積熱之功。

芒硝為清涼性之瀉下藥。因其內含「硫酸那篤詔謨」及「食鹽」
等。有解凝消炎作用。有效於便秘積熱腸澀下利等症。

芍藥 當歸 木香 肉桂 黃連 檳榔 黃芩 甘草 均見

前

處方四 木香檳榔丸 木香四。○黃連三。○黑丑二。

○青皮五。○陳皮六。○枳殼六。○黃柏五。○三稜五。○
莪朮五。○香附六。○大黃一。○芒硝九。○檳榔八。○
右十二味。剉作三百西煎劑。去渣濾清。再入芒硝微火上熔化。一
日分三次溫服。

適應症 下痢腹痛。裏急後重。痞悶不欲食。急性阿米巴痢疾
初起。及急性消化不良。加答兒性胃炎腸炎等。

〔方解〕 青皮為清涼性解熱藥。兼有發汗及健胃作用。賞用於胸
膈痞悶。及腸疝痛等症。因內含芳香性揮發油。故有破滯鎮痛之功。

陳皮為芳香性健胃藥。有鎮嘔祛痰作用。不但用為健胃寬中且可作矯味之用。

枳殼為苦味健胃藥。有促進消化及寬舒胃腸排除積氣之作用。
三稜為通經藥。常用於心腹諸痛。癥瘕積聚等。有消瘀鎮痛等作用。
莪朮為健胃鎮痙通經藥。對於月經閉止及慢性胃腸加答兒。痙攣性疼痛諸症有效。

黑丑一名牽牛子。為瀉下藥。其主要成分為「昆護胡林」Convulin
 $C_{27}H_{45}O_{13}$ 與「藥刺巴根」相同。賞用於急性阿米巴痢。因其有殺蟲
攻積逐水作用。惟孕婦忌服。

香附為健胃通經藥。對於痞滿腹痛。月經不調。腸疝痛。下痢等有特
效。

木香 檳榔 黃連 黃柏 大黃 芒硝 均見前

處方五 真人養藏湯 訶黎勒六。○罌粟殼五。○煨肉

果八。○當歸九。○肉桂三。○木香五。○甘草四。○白朮

七。○白芍六。○人參五。○

右十味。剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 久痢脫肛。身體衰弱及慢性阿米巴痢疾。腸粘液膿

血。滑脫不禁等症。

〔方解〕 訶黎勒為收斂性止瀉止痢藥。因其富含沒食子酸及鞣

酸。故對於久泄下痢。腸澀滑脫。及脫肛等症。有特效。並能止欬定喘。

罌粟殼即阿片之果殼。為鎮痛止瀉藥。有鎮靜腸蠕動。收斂腸弛緩

之作用。故對於久下痢。脫肛等有特效。

煨肉果即肉豆蔻。用麩裹煨熟者。本品為健胃驅風藥。能促進消化。制止下痢。止腹痛。胸中脹滿等。其成分內含揮發性脂肪油及澱粉等。故有消食寬中止瀉之功。

白朮為健胃利尿藥。可應用於胃與腸加答兒。小便不利及水腫等症。

當歸 肉桂 甘草 白芍 人參 木香 均見前

處方六 溫脾湯（本事）大黃四。○甘草五。○乾姜三。

五附子三。○厚朴五。○桂枝四。○

右六味。剉細作二百西煎劑。去渣濾清。一日分三次溫服。

適應症 慢性下痢非常腹痛而身體不發熱。衰弱畏冷者。

〔方解〕 厚朴為芳香性健胃藥。有鎮靜鎮痛作用。適用於下痢腹

痛。吐瀉煩悶等一切神經性胃腸諸病。

大黃 甘草 附子 乾姜 桂枝 均見前

處方七 參連湯 人參四。○黃連三。○吳茱萸四。○

右三味。剉細。作一百五十西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 下痢赤白。心胸煩悶。嘔吐。胃脘部按之痞硬。絕對不

能食。水米入口即吐。名為噤口痢者。此病雖下痢。其主要證及病毒
重心在胃。本方乃注重治胃也。

〔方解〕 吳茱萸為健胃驅風藥。並有收斂及殺蟲作用。最賞用於
嘔吐胸腹諸痛。痞悶胃冷噎膈等症。

人參主用為健胃藥。有強心強壯作用。

黃連為苦味健胃藥。並能消退胃部之充血性發炎。

處方八 正觀湯(外臺)黃連三。○龍骨八。○白朮八。

○當歸八。○赤石脂(研細)六。○阿膠八。○附子二。○乾

姜三。○

右八味。剉細。作二百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應證 惡性下痢。腹中切痛。下黑色如瘀血。晝夜數百次。身

體衰竭無熱。而不口渴者。

〔方解〕 龍骨為收斂性強壯藥。賞用於下利膿血。腸癰內疽。遺精。崩漏。帶下。吐血衄血。盜汗等。因其有止血斂瘡固脫作用故也。

赤石脂為粘滑性之吸着藥。內服有吸着腸中一切毒素。及奏機械的被覆保護腸粘膜作用。故賞用於下痢腸癰痔瘡等症。

阿膠為滋養性強壯藥。有止血及潤滑內膜作用。對於吐血下血及

內臟創傷出血等有特效。

黃連 白朮 當歸 附子 乾姜 均見前

處方九 斷痢湯(外臺) 半夏五。○乾姜二。○人參六

○黃連三。○附子二。○茯苓一。○甘草五。○大棗

(去核)一二。○

右八味。剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 慢性痢疾纏綿不愈。腹痛痞滿不欲食。身體衰弱。心

囊水腫。精力大衰及小兒結核性痢等證。

〔方解〕 半夏為健胃祛痰藥。有鎮嘔作用。賞用於吐逆痞滿痰多。

及胃腸卡他性慢性炎症等。

茯苓為利尿鎮靜藥。對於心臟性水腫。及腳氣。心下悸煩。小便不利。

等症有特效。

大棗為緩和滋養藥。因其富含粘液質。有粘滑包攝作用。能緩解腹痛。以奏機械的包攝腸粘膜之功。

乾姜 人參 黃連 附子 甘草 均見前

處方十 美玉湯 茯苓八。○桂枝五。○白朮六。○甘

草四。○黃連二。○木香四。○橘皮（即陳皮）五。○

右七味。剉細。作二百西西煎劑。去渣濾清。一日分三次溫服。

適應症 慢性久痢腹痛痞脹不欲食。心悸亢進。萎黃體肌瘠

瘦。及結核性慢痢身衰弱者亦可通用。

〔方解〕 茯苓 桂枝 白朮 甘草 黃連 木香 橘皮 均

見前

(二十一) 瘧疾

〔病原〕 瘧疾之病原係一種原蟲(原生動物)屬芽胞原蟲綱。又名孢子蟲綱。Sporozoa 此原蟲循環寄生於人類及蚊類之間。現已考查確定者有三種。(一)致間日瘧者。(二)致三日瘧者。(三)致夏秋瘧(又名惡性瘧)者。第一種原蟲在四十八小時成熟而分裂增殖。第二種則至七十二小時成熟。第三種則無分裂性增殖。具雌雄性生殖蟲體較前二種小。作新月形。或橢圓形。特名為「夏秋瘧生殖性原蟲」。

〔病理〕 為瘧原蟲中間宿主之「蚊」(庫雷克司蚊 *Culex* 及安俄斐雷司蚊 *Anopheles* 兩種)傳佈接種於人身血液中。侵入赤血球內。按時分裂增殖。或生殖破壞赤血球。而出再侵入他赤血球。按

時再成熟繁殖破壞此球。遺從他球。因此體中變遷為赤血球之破壞。及壞血球之血紅素匯積。皆由瘧蟲之毒素所致。肝臟與脾臟往往受累發炎或腫大。

〔症狀〕 間日瘧與三日瘧為有規則的間時復發性瘧陣。分寒戰期發熱期出汗期三種。寒戰期將起。始作疲倦。欲張口打呵欠。頭痛欲嘔吐。繼則逐漸發戰。全身及牙齒均顫抖。甚則床榻為之振動。寒期將終熱期繼起。初覺一陣一陣之熱感。繼則外面寒狀退去。皮膚之熱度大增。面色發紅。手充血。皮亦發紅。脈搏洪大。心動強而有。力。頭痛甚或譫妄。口渴欲飲水。熱期將終則汗珠先由面上逐漸而。全身大汗淋漓。當此期內。發熱時所感之不愉快及頭痛等均漸退。一二小時之中。病者每安然睡去。汗期汗出之量多少不定。有極多。

者亦有極少者。瘧發作之輕重亦大有異同。或熱期長者。或寒期長者。或無汗期者。然又有不規則熱性。弛張熱性。或稽留熱性等。夏秋瘧則發作期限較長。平均每一瘧陣須二十小時之久。瘧陣起時多無寒期。甚或即寒覺亦無。熱度之升高多緩漸而不驟突。低降時亦然。間或有稽留熱而無明特之瘧陣。凡顯稽留熱及弛張性熱（間減熱）者。舌厚苔。脈搏洪大。其外容頗似腸熱病。因有急性脾增大。致更相似。初起時或顯枝氣管炎。大抵無腸症狀。早期或略顯血性黃疸。譫妄者亦有之。在診斷上有時除驗血外。每不能鑑別稽留熱性瘧及腸熱病之異同。

夏秋瘧有一種惡性類。其有三要狀如下

（一）昏迷類。病者顯劇烈之腦受擾狀。急性譫妄及昏迷病發之前

寒戰與否不定。發熱常甚高。皮熱而乾。昏迷情況或纏綿至二十小時之久。甚或因而致命。

(二)寒冷類病起常顯胃症狀。嘔吐。體極虛弱。雖無寒戰。然每覺冷。體溫低落。有時不昏迷。脈搏小而弱。呼吸增速。有時極烈。洩瀉如霍亂狀。尿少或閉止。此等情狀或纏綿數日。加以發熱增高。而病者因弱極而死。

(三)出血類。如黑尿熱病。血紅素尿熱病。瘧性血紅素尿等。瘧有兩類。尿含血紅素。第一類伴沉重之惡性瘧而起。尿中含被瘧蟲毀滅之赤血球極多。至第二類則伴真黑尿熱病而起。尿內之赤血球被一種尚未發明之溶赤血球素所消散。而與瘧蟲無直接關係。近經醫家之意見。以為黑尿病與瘧相關屬。蓋有三種原因。實由前患之

瘧而來（一）為回歸之瘧陣生一種毒素能毀滅無數之赤血球。（二）為瘧擾減去身體之抵抗力。（三）為治瘧之「奎甯」能生溶赤血球素故已拿馬地方之醫者對於真血球溶解性血紅素尿病不用此藥療治。將來或能設法解去此血球溶解性亦未可知。

〔治法〕

處方一 清脾飲 青皮五。○半夏五。○厚朴六。

○黃芩六。○甘草四。○草菓仁四。○柴胡五。○茯苓一。○白朮一。○生薑八。

右十味共剉細作三百西西煎劑去渣濾清一日分三次溫服。

適應證 間日瘧熱多寒少口渴小洩短少胸脅痞悶欲嘔脾

腫腹膨脹等。

〔方解〕

青皮為清涼性解熱藥有發汗及健胃作用賞用於瘧熱

病之胸悶痰滯及疝氣呃逆婦人乳腫等症。

半夏為健胃鎮嘔藥。有祛痰制瘧鎮靜作用。常用作咳逆吐逆及瘧疾而兼嘔吐胸悶等症之效藥。

厚朴為健胃祛痰藥。有芳香性快中利氣作用。能止吐瀉除脹滿。對於胃腸神經性諸症有效。於脾臟腫大亦有緩解之功。

黃芩為清涼性解熱藥。與柴胡同用對於瘧疾發熱有特效。

甘草為緩和藥。不但矯味。且有調和處方中各藥。使呈顯其各個作用而不致互相衝突。又有潤內膜。緩諸筋及經脈急迫之功。

草菓為健胃解毒藥。對於瘧疾有特效。其氣味芳香而辛辣。能促進消化。快中利氣。止嘔吐腹痛除脹滿。有撲滅瘧原蟲之功。

柴胡為清涼性發汗解熱藥。對於胸脅痞悶瘧疾寒熱有特效。本品

於淋巴系統有消炎作用。於間歇性發熱及血液病熱尤有清解之功。

茯苓為鎮靜利尿藥。對於水腫腳氣寒熱咳逆心悸小便不利等症有良效。

白朮為健胃利尿藥。實用於胃卡他兒。心腹脹滿。水腫溼痺體疼小便不利等症。

生姜為芳香性健胃驅風藥。有發汗鎮咳作用。常用於頭痛嘔吐胸悶痞脹寒熱無汗等症。

處方二 知母 鱉甲湯（外臺）知母一〇。常山一二。

竹葉八。石膏二。鱉甲一六。地骨皮一二。

右六味。剉細。作三百西煎劑。去渣。一日分三次涼服。

適應症 夏秋瘧熱多寒少。口大渴。熱高百〇三—六度。常汗多。精神疲怠。瘧作期限頗長。或單熱不寒等症。

〔方解〕 知母為解熱藥。賞用於瘧疾熱高。煩渴。欬等症。

常山為麻拉里亞（瘧疾）之特效藥。有殺蟲解熱作用。賞用於多熱性瘧疾。胸中痰結吐逆等證。本品內含有 Berberin 之成分。或有撲滅瘧原蟲之功。

竹葉（即淡竹葉）為清涼性利尿解熱藥。賞用於熱病煩渴。小便不利等症。

石膏為「含水硫酸鈣」。有清涼解熱作用。對於有汗之熱病。熱高。煩渴等症。有特效。

鱉甲為強壯藥。賞用於溫瘧。及身體衰弱之勞瘧。與瘧疾性脾臟腫。

大（瘧母）等。又可用於虛勞、骨蒸、潮熱及血病諸症。地骨皮為清涼解熱藥。有清血消炎作用。用於溫瘧、煩渴、虛勞、潮熱及氣管枝炎、神經炎、胸肋膜炎等症。

處方三 截瘧七寶飲 常山一二。○檳榔一〇。○青皮

五。○草葉六。○厚朴六。○陳皮六。○甘草四。○

右七味。剉細。作二百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 間日或三日瘧患者。身體壯實而瘧陣發作時間準。確寒、熱、汗、三期正規。久發不已等。

〔方解〕 檳榔為殺蟲健胃藥。對於瘧疾痞脹。消化不良。脾臟腫大。胸中痰滯等有特效。

陳皮為苦味健胃藥。用於處方中有矯味作用。令藥液減去不佳快。

之臭味。

常山 青皮 草薺 厚朴 甘草 均見前

處方四 柴胡桂姜湯 柴胡六。○桂枝四。○乾姜三。

○甘草三。○括萁根八。○黃芩七。○牡蠣一四。○

右七味剉。作二百西西煎劑。去渣一日分三次服。

適應症 瘧作寒期甚長。熱期短。或有寒期而無熱期者。及惡

性瘧疾之寒冷類瘧等。

〔方解〕 桂枝為健胃興奮藥。有溫壯神經作用。用於表層貧血畏

寒。關節痠痛。能助長血液循環。以抵抗病毒。

乾姜為芳香性刺激藥。有驅風健胃之功。用於風邪寒熱。傷寒頭痛。

脹滿喘欬等症。

括萋根為祛痰藥。用於因虛熱。臟器組織枯燥之結果而於外表發輕微強直性痙攣。於裏現口燥消渴等症狀。有潤澤作用。又能通乳汁。利淋巴。行津液。與柴胡桂枝同用。有治瘧之功。

牡蠣內含「碳酸鈣」及「磷酸鈣」等。為制酸性之健胃藥。對於胃酸過多之慢性胃炎。及胸腹動悸。驚狂煩躁等症。有特效。因其有鎮靜及利尿作用。能下水。使久畜之寒飲痰水下達於水道。而免吐水腹痛。悸動。驚狂煩躁等患也。

柴胡 甘草 黃芩 均見前

處方五 常山飲(局方) 常山一二。○檳榔一○。○知

母八。○草菓六。○貝母八。○烏梅肉三。○紅棗肉一○。

○生姜八。○

右八味。劉細作一百五十西西煎劑。去渣。加燒酒至二百西西。一日分三次服。

適應症 寒、熱、汗、三期正規之瘧疾。不論間日瘧。三日瘧。或夏秋瘧。瘧陣久發不止者。均有效。

〔方解〕 烏梅為殺蟲藥。有解熱及健胃作用。實用於久瘧久痢。及寄生蟲性嘔吐。癆熱骨蒸等病。

貝母為祛痰藥。對於宿痰久瘧。效嗽。肺癰肺痿等症有效。

大棗為緩和性粘滑藥。有營養強壯作用。常用作調味配合劑。其目的在調和諸藥。一方面又有緩和呼吸。及消化道諸急迫拘攣之功。

常山 檳榔 知母 草菓 均見前

處方六 何人飲(景岳) 何首烏一〇〇〇人參五〇〇當

歸一〇〇〇陳皮八〇〇煨生姜六〇〇

右五味。剉細。作二百五十西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 瘧疾發作瘧陣雖輕微而纏綿不愈。身體衰弱。胃虛

不欲食。脈搏細弱等。

(方解) 何首烏為強壯藥。有殺蟲驅瘧作用。對於身體衰弱之瘧疾。及蚊蟲瘰癧痔瘻等症有效。

人參為興奮性強壯藥。有健胃及利尿作用。賞用於衰弱性諸病。脈搏小弱。胃口不開。癆瘵盜汗驚悸等症。

當歸為清涼性通經藥。賞用於血分諸病。如女子月經不調。腰痛風痺等症。有行血補血作用。又用於瘧疾貧血。畏寒潮熱等。

陳皮 生姜 均見前

處方柒 達原飲 黃芩六。○厚朴六。○檳榔一。○

知母八。○芍藥七。○草菓五。○甘草三。○紅棗肉一。○

○生姜七。○

右九味。剉細。作二百五十西。煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 瘧疾初起。瘧陣發作不定期。或寒期短熱期長。汗出不多。骨節痠痛。頭疼胸悶等。

〔方解〕 芍藥為鎮痙鎮痛藥。用於頭疼腹痛。有清熱順血。緩和經脈拘攣作用。治下利寒熱血痺。疝痛諸症。

黃芩 厚朴 檳榔 甘草 艸菓 知母 生姜 紅棗

均見前

處方八 三瘧補正湯 常山一〇。〇茯苓一四。〇生潞

黨一二。〇生白朮一〇。〇，地黄一四 〇全當歸一二。〇

草菓六。〇川芎五。〇青皮五。〇甘草四 〇白芍六。〇知

母六。〇半夏六。〇生姜六。〇紅棗肉一二 〇

右共十五味。剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 三日瘧纏綿日久。患者體甚衰弱。現貧血。肢節痠痛

精神疲怠。或瘧止後稍勞動即復發。舊說稱為勞瘧等。

〔方解〕 生潞黨即上黨參。為桔梗科植物之地下莖。有緩和性滋

養強壯作用。其功用與桔梗沙參相似。能祛痰鎮咳。開胃健脾。賞用

於衰弱性瘧疾寒熱。咳嗽貧血諸症。

川芎為鎮瘧鎮痛藥。有行血通經作用。賞用於血痺痠痛。頭痛。腰脚

軟弱等症。

熟地即地黄之蒸熟者。為滋養藥。有補血通經作用。實用於血分諸病。逐血痺。除寒熱。男子傷中。女子崩漏胎動。又有利尿解熱作用。治陰虛勞熱等症。

常山 茯苓 白朮 當歸 草果 青皮 甘草 白芍 知母

半夏 生姜 紅棗 均見前

處方九 白虎加桂枝湯 知母八〇 石膏二〇〇 甘草

四〇 粳米一五〇 桂枝六〇

右五味。剉細。作二百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 夏秋瘧熱期發。甚長。或單熱而無寒期。骨節煩疼。

頭痛嘔吐。口渴欲飲水。脈搏洪大。或神識昏迷等。

雲母為「珪酸礬土」含有鉀、鈉、鎂、鈣、氫、水氣等。用於寒熱勞傷瘡、痢瘡腫等症有強壯及解毒作用。

龍骨為收斂性強壯藥。有鎮靜作用。適用於衰弱性神經病、驚癇、勞瘡、夢擾、遺精、遺尿及出血性諸病。

處方十一 外惹內效法斑描膏 斑描(去頭足)○。三雄

黃○。二硃砂○。二

右三味共研極細粉。放入中國膏藥內。或橡皮膏內。貼在項後第三脊椎骨間。但須在瘡陣發作前三四小時貼之。俟皮上起泡後揭去。瘡即愈。

適應症 間日瘡。三日瘡。或夏秋瘡之瘡期正規。寒熱汗三期

準確者。

〔方解〕 斑蝥之有效成分與「羯答利斯」相同。有刺戟性。為惹皮發泡藥。外用於皮膚。有引炎誘導作用。對於關節炎神經痛。漿液膜炎等有效。吊炎起泡。不但引炎外出。且能促進血清之產生。激起抗病原素之活力。即鼓動生理自然機能自行撲滅瘡原蟲。以奏制瘡之功。

雄黃含有「三硫化砷」為殺蟲殺菌解毒藥。外用於瘡疥及搔癢性皮膚疾患。燒烟並可作消毒劑。內服治瘧痢霍亂等。

硃砂化學上名為「硫化汞」。內科中用為改血藥。且有鎮痙作用。外用作治瘡藥。其功用與汞類相同。

(二十二) 回歸熱 (復發熱病) 又名饑熱病或七日熱病

(中醫書稱勞復等病)

〔病原〕 為一種螺旋形原蟲。名螺旋 *Spirochaeta* 者所致之傳染病。病原蟲體長為赤血球直徑之三—六倍。發熱時可於血中見其行動。傳染此蟲之媒介為衣蟲臭蟲等。然非由彼等所咬。乃因自抓其皮膚。偶將蟲在抓處或他皮傷處壓碎。以致受染者也。

〔病理〕 解剖上無特別損害之徵狀。

〔症狀〕 潛伏期十二小時至五日。或七日初起寒戰發熱。腰及四肢大痛。年少患之或吐。並驚厥。熱速升至一百〇四度。常出汗。脈數至百一十或百三十不等。熱高時或譫妄。脾早腫大。黃疸。胃病狀或甚重。或咳嗽。時或顯汗泡疹。瘰癧點。惟罕有腸病狀。高熱至五六日。達病終期後則數小時內退至常度。或常度以下。退時大汗或瀉。虛弱或年邁者。或顯腦力虛脫。恢復期甚短。數日即能起行。迨至第十四

日再發寒戰。熱又升高。至第二十或二十三日又現極期。然仍易恢復。病回歸之期較第一次病發者更速。回歸之次數常為二三次。或四五次。然不回歸者亦有之。若回歸多次。或人虛弱則恢復之期延緩。本病不甚危險。死亡者僅百分之四。併發病少。若有之則為腎炎。血尿。大葉肺炎。神經炎等。有脾大致裂者。孕婦則多致小產。

〔治法〕

處方一 桂枝二越婢一湯 桂枝四。○芍藥六。○

甘草五。

○生姜八。○大棗(去核)七。○麻黃五。○石膏二。○

右七味剉細。作二百五十西煎劑。去渣一日分三次服。

適應症

回歸熱初起。惡寒發熱甚高時有汗。身體骨節皆

痛。咳嗽頭疼。脈雖快速而搏動無力者。

〔方解〕

桂枝為芳香性興奮強壯藥。有溫壯神經。促進血運以抵

抗病毒作用。實用於有汗之發熱頭疼。四肢痠痛等症。

芍藥為鎮痙鎮痛藥。與桂枝伴用。治上部及外表充血性熱病。因本品含有安息香酸及鞣酸等。能斂攝神經。減退上部及表層之充血。治頭疼發熱汗出等症。

甘草為緩和藥。有鎮咳祛痰作用。不但用作滋潤內膜。緩解急迫。並可為調和諸藥之用。

麻黃為發汗利尿藥。與石膏伴用。則減退發汗而增加利尿之作用。有平喘鎮痛之功。

石膏為清涼性解熱藥。用於傷寒時氣頭疼身熱煩躁口渴等症。有特效。

生姜為健胃驅風藥。用於嘔吐喘咳痞悶頭疼等症。

大棗為緩和性粘滑藥。有營養強壯作用。用於咳嗽胸痛腹痛等症。能緩和及鎮靜其神經及組織之拘攣。急迫作用。又可用作調味及調和諸藥。與甘草之功相似。

處方二 梔子生姜豉湯 梔子一四。○豆豉一五。○生

姜一○。○

右三味剉細。作一百五十西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 回歸熱。熱期顯黃疸狀。嘔吐胸悶。懊懣。或頭痛不得寐。欲吐不吐。反覆跌倒。煩躁不安者。

〔方解〕 梔子為清涼性解熱藥。有清血消炎解毒利尿作用。用於充血性炎症。心煩發熱。黃疸鼻衄。頭痛目赤。小便不利等症。

豆豉為清涼消炎。解毒解熱藥。賞用於傷寒溫瘧斑疹黃疸等發熱。

諸病。

生姜 見前

處方三 桂枝加葛根湯 桂枝四。○芍藥六。○甘草五

。○生姜八。五大棗肉七。○葛根八。○

右六味。剉細。作二百西西煎劑。去渣。一日分二次服。

適應症 回歸熱頭痛發熱。汗出惡風。項背痠痛。拘攣。腰痛。四肢強痛。熱病初起。熱高有汗諸症。

〔方解〕 葛根為清涼性解熱藥。有生津液及解毒作用。用於熱病。口渴。頭項強痛。嘔吐下利等症。

桂枝 芍藥 甘草 生姜 大棗 均見前

處方四 小柴胡湯 柴胡六。○黃芩七。○半夏六。○

甘草四。○人參四。○生姜八。○大棗肉七。○
右七味剉細。作二百西煎劑。去渣。一日分二次服。

適應症 回歸熱形寒發熱。頭疼。胸脅苦悶。嘔吐。煩渴。或咳嗽。口渴。舌上有苔。或往來寒熱等。

〔方解〕 柴胡為解熱藥。賞用於胸脅苦悶。寒熱往來。頭痛發熱等症。

黃芩為清涼性解熱藥。有健胃整腸消炎作用。對於發熱口渴。嘔吐下利。腸胃炎性機轉之諸熱有特效。

半夏為健胃鎮嘔藥。有消痰作用。用於嘔吐胸悶。咽喉痰壅腫塞而痛等胃及咽喉症狀有效。

人參為苦味健胃及強壯藥。對於胃機能衰弱之瘧悶嘔吐及熱病

之脈搏細弱等症用之有強壯機能增加脈搏之功。

甘草 生姜 大棗 均見前

處方五 桂枝加芍藥生姜人參新加湯（仲景）桂枝四。

大棗肉一二。○人參五。○芍藥七。○生姜一。○甘草五。

右六味剉細作三百西西煎劑去渣一日分三次服。

適應症 熱病汗出身體疼痛脈搏遲弱及回歸熱身體衰弱

或回歸多次而顯虛弱症狀者。

〔方解〕 桂枝 大棗 人參 芍藥 生姜 甘草 均見前

處方六 白虎加人參湯 知母八。○石膏二。○甘草

五。○粳米一。○人參六。○

右五味剉細作二百西西煎劑去渣一日分三次涼服。

適應症 回歸熱極期高熱口渴。汗出譫妄。或嘔吐或咳嗽。或皮膚顯疤疹瘰點。及併發肺炎神經炎等。

〔方解〕 知母為清涼性解熱藥。有鎮咳及緩下作用。實用於熱病口渴。咳嗽頭疼。煩熱等症。

糯米為滋養藥。熱病口渴時用之。有生津止渴作用。尤其與知母石膏伴用作調和藥劑。滋陰養液之用。

(二十三)梅毒(微毒)(中醫書稱楊梅瘡)

〔病原〕 係一種徐漸進行之特殊傳染病。為梅毒密螺旋體寄生物所致。病之由接種而得者名後天梅毒。由遺傳而得者名胎生梅毒。或先天梅毒。後天梅毒感染之景況。大都由接觸而致。如與患者交媾。或接觸其內衣。及外科產科醫械消毒不清潔等。均能傳染。

〔病理〕 後天梅毒之第一期損害。名為初瘡。即發生硬性下疳。第二期損害處所較多。如溼疣。皮疹。眼患等皆是。第三期損害係有界限之樹膠樣腫。數種皮患及特種動脈炎等。樹膠樣腫或梅毒瘤生於骨。或骨衣者。名梅毒結。肌。皮。腦。肝。肺。腎。心。睪丸。腎上腺等處亦生之。先天梅毒除初瘡外（下疳）餘均同。

〔症狀〕 後天梅毒第一期必發初瘡（下疳）始顯為小紅粒。漸長大。中央成淺潰瘍。其周圍堅硬似軟骨。大小不定。小者多易忽視。如生於尿道口內者是也。此期全身狀況不惡。或不發熱。無碍健康。第二期為發熱。貧血。皮發斑點狀。或丘疹狀。或膿胞性。鱗屑性梅毒疹。會陰。腹股溝。腋窩。及頰內。唇。舌。咽喉等處。發粘膜炎。淋巴腺及關節。眼耳膜等發炎。至第三四期。則梅毒疹潰爛結痂。名為蠟壳瘡。（尖

痲瘡。因其痲積疊成蠟壳形故名。或發顯運動性共濟失調及全身麻痺。

先天梅毒除初瘡外。凡後天梅毒之諸狀皆為先天梅毒所同。有小兒於產生後大約在一二月之內始顯軟弱枯瘦。皮疹。手足等處有大皰。鼻竅略塞。唇爛。骨症狀甚昭著。眦或脫離。此等小兒罕能久存。其有遲顯徵狀者。皆因早顯症輕微。或痊癒後發育每不能如常。及至弱冠之年。每顯一種目病。間質性角膜炎。或骨膜炎。關節滑膜炎。脾及淋巴增大等徵狀。又有一種腦脊髓梅毒。發現慢性腦脊髓膜炎。或精神症狀。譫妄。驚厥。或似麻痺性癡呆等。

〔治法〕

處方一

大百中飲

土茯苓四〇。

〇牛膝一五。

〇

甘草六。

〇黃連四。

〇檳榔八。

〇太子參六。

〇大黃八。

〇

桂枝四。○黃芩六。○沉香四。○川芎六。○杜仲一二。○
右十二味。剉細。作四百西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 硬性下疳。梅毒。瘡疹已潰或未潰。關節痠痛。頭面腫痛。梅毒上攻。而甚於上部之症者。

〔方解〕 土茯苓為變質藥。有清血解毒作用。專用為梅毒驅除劑。並治拘攣骨痛。惡瘡等。兼解汞毒。

牛膝為鎮痛藥。可治癱瘓麻質斯性關節炎之疼痛。及淋濁性關節炎。痛風等。

甘草為緩和性粘滑藥。有解毒作用。治拘攣急迫諸痛。

黃連為消炎健胃藥。有退熱鎮嘔作用。用於胃腸性卡他兒。及瘡毒發熱諸症。

檳榔為驅蟲殺菌藥。有健胃攻滯作用。治腹脹大小便氣秘關節不利。腳氣等。

太子參（人參）為興奮性強壯藥。有強心健胃作用。用於一切久病衰弱等症。又正氣不足而病毒亢盛。宜用攻毒藥時。往往以本品為輔佐尤效。

大黃為瀉下藥。有蕩滌胃腸。排除積毒作用。對於一切瘡毒。實熱大便秘結時用之頗效。

桂枝為興奮性強壯健胃藥。有溫壯神經。融和血運。治痿麻質斯之功。

黃芩為清涼性解熱藥。有清血消炎解毒作用。用於寒熱瘡毒。天行熱疾等症。

沉香為鎮痛藥有芳香性溫和神經作用。用於心腹疼痛及關節麻痺。風溼拘攣轉筋。皮膚搔癢等症。

川芎為鎮痙鎮痛藥。有融和血運流通經絡作用。賞用於頭痛體痛。關節風溼痛。並癰疽疥瘡。瘰癧痔疾等症。

杜仲為強壯藥。賞用於腰膝痠痛。關節痿麻質斯等症有效。

處方二 紫根牡蠣湯 當歸一二。○芍藥六。○川芎四

○升麻八。○牡蠣一六。○黃芪六。○紫根一六。○大黃

六。○甘草四。○忍冬藤一二。○

右十味。剉細。作四百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 第二期梅毒。下疳潰爛。毒瘡膿皰。粘膜炎。關節炎。或

骨膜炎。淋巴炎。毒邪沉痼諸症。

〔方解〕 當歸為清涼性通經藥。有活血鎮痛作用。對於癰疽惡瘡。溼痺痛麻等症。有排膿止痛。行血蠲痺之功。

芍藥為鎮痙鎮痛藥。賞用於拘攣腹痛。頭痛。及癰疽痘瘡等症。因其有通經脈。清血液作用故也。

升麻為解熱治瘡藥。對於咽喉口瘡。斑毒膿皰。痘疹等諸瘡毒熱症。有特效。因其具有清血解毒作用。

牡蠣為有機鈣性消炎制泌藥。有止汗制酸作用。用於瘰癧癰瘡。關節痠痛。虛癆盜汗等症有效。

黃耆為緩和性強壯藥。有利尿排膿生肌止痛作用。最賞用於癰疽敗瘡。大瘋癩疾。五痔鼠瘻。梅毒疔瘡潰爛等症。

紫根為清涼性變質藥。有清血解毒作用。賞用於瘡毒斑疹。惡性癰

疽痘瘡等症有特效。

忍冬為清涼性解毒藥。用於癰疽疥癬。梅毒惡瘡。風溼腫毒。淋疾等。花專散熱解毒。滕蔓兼具通絡脈。搜風溼之功。對於關節痛。淋巴炎。腫等有效。

大黃 川芎 甘草 均見前

處方三 小解毒湯 土茯苓四〇。〇滑石一二。〇澤瀉

一二。〇阿膠七。〇木通五。〇忍冬一二。〇大黃六。〇

右七味。剉細作四百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 梅毒下疳。生殖器腐爛流膿。小便淋瀝痛不可忍者。

〔方解〕 滑石為粘滑性利尿藥。外用有清涼消炎作用。內服能奏

機械的包攝作用。治小便淋痛。止帶濁。及瀉利等。

澤瀉為清涼性利尿藥。用於淋病水腫。頭疼溼痺。小便不利等症。阿膠為粘滑性滋養強壯藥。因其富含膠質。虛人用之有滋養之功。出血用之有止血作用。小便不利淋痛及瘡家諸痛。用本藥內服。有滋潤組織及粘滑內膜之作用。故能利小便止痛也。

木通為清涼性消炎利尿藥。專用作小便不利淋痛水腫。疥癬諸瘡等症之要藥。有解毒散腫。通經絡。排膿。通乳。消癭瘤等之功。

土茯苓 忍冬 大黃 均見前

處方四 六物解毒湯 土茯苓五〇。〇金銀花一五。〇

川芎一〇。〇薏苡仁三〇。〇木瓜一五。〇大黃七。〇

右六味。剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 梅毒性關節炎。筋骨疼痛等。

〔方解〕 薏苡仁為滋養強壯藥具有利尿作用。對於風溼痺痛。腳氣溼毒。筋急拘攣。不可屈伸等症。用之有排除毒素由小便而出之功。

木瓜為鎮痙藥。賞用於溼痺脚氣。筋攣拘痛。霍亂。腓腸肌痙攣等症。有特效。

金銀花（忍冬）土茯苓 大黃 川芎 均見前

處方五 搜風解毒湯 防風一〇。〇土茯苓五〇。〇金

銀花二〇。〇木通八。〇薏苡仁一五。〇木瓜一〇。〇皂角

子八。〇白蘚皮八。〇

右八味。剉作三百西。煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 梅毒瘡。遍體癢痛。麻木。筋骨疼痛。下疳。溼毒等。兼解

汞毒。

〔方解〕 防風為解熱鎮痛藥。對於感冒性頭痛及皮膚風毒骨節風痛。四肢筋骨攣痛等症。能散內外諸風毒。疎通經絡。因其有芳香性殺菌解毒鎮痙作用故也。

皂角子為驅毒排膿解凝變質藥。有殺蟲殺菌作用。其性最竄透。善通經絡。能搜剔筋骨間沉潛之毒。對於頑固性之梅毒有特效。

白蘚皮為解熱驅風藥。用於關節痺痛。皮膚溼毒等症。有清涼性利尿消炎作用。並治婦人產後發熱。陰中腫痛。

土茯苓 金銀花 木通 薏苡仁 木瓜 均見前

處方六 解毒湯 土茯苓四〇。〇川芎一五。〇大黃六

。〇茯苓一五。〇木通一〇。〇忍冬一五。〇甘草一五。〇

右七味。剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 下疳潰爛。梅瘡溼癬。便毒膿淋。筋骨疼痛。及諸惡瘡。

毒。

〔方解〕 茯苓為利尿藥。用於小便淋瀝。水腫脚氣溼毒諸症。能排除毒素。從小便而出。兼有清涼性鎮靜作用。

土茯苓 川芎 大黃 木通 忍冬 甘草 均見前

處方七 土茯苓湯 土茯苓三五。○忍冬一五。○大黃

八。○荊芥一。○。○防風八。○川芎七。○土骨皮八。○

右七味。剉。細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 初期梅毒。硬性下疳。或梅毒性筋骨疼痛等。

〔方解〕 荊芥為發汗解熱藥。有解毒驅風鎮痙作用。實用於瘡毒。

風痺。頭疼。體痛。血液病。遍身麻痺。疥瘡等。有清血解毒之功。

土骨皮為收斂藥。有清血解毒作用。內服治赤痢。腸出血。外用煎汁洗惡瘡。

土茯苓 忍冬 大黃 防風 川芎 均見前

處方八 黑豆湯 桔梗八。○紅花四。○大黃四。○甘

草五。○黑豆(炒)百粒

右五味。剉。作二百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 梅瘡服汞性藥。口中腐爛。齒齦出血。咽喉疼痛。飲食

難下等症。

〔方解〕 桔梗為排膿祛痰藥。對於咽喉疼痛。口舌生瘡。膿毒痰涎

粘着。肺癰。腸癰。便毒。下疳等症。用之有特效。

紅花為通經祛瘀藥。因其內含紅色素。Catharin 及黃色素。Saff-
orange 有清血解毒作用。用於癰瘡腫痛。婦人產後惡血不下等一
切血液病。疼痛諸症。更有鎮痛之功。

黑豆為解毒藥。兼有滋養作用。外用生研塗癰腫。豉汁飲活血解毒。
稀痘瘡。然本品與甘草同用。則解毒之功愈著。

大黃 甘草 均見前

處方九 四仙湯 土茯苓四〇。〇牛膝二五。〇皂角刺

二五。〇五加皮二五。〇

右四味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 梅毒性關節炎。癱瘓質斯痛。四肢不能動。風癱不能

起床者。

〔方解〕 皂角刺為衝動藥。有祛痰排膿作用。賞用於癰腫惡瘡。屬風諸症。內服有直達病所。竄透經絡肌肉。且有搜剔風毒之功。

五加皮為鎮痛藥。又有強壯作用。用於疝痛及筋骨拘攣。腰腳痠痛。有驅風勝溼。強骨健筋之功。

土茯苓 牛膝 均見前

處方十 換肌消毒散 土茯苓二〇。白芷五。當歸

八。〇皂角刺七。〇薏苡仁一二。〇白蘚皮六。〇木瓜六。

〇木通五。〇金銀花一〇。〇甘草五。〇

右十味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 下疳潰爛。梅毒。不拘已潰未潰。筋骨疼痛等症。

〔方解〕 白芷為鎮痙藥。有排膿鎮痛作用。用於頭痛風毒瘡癩諸

症並治鼻塞流膿口臭等。

土茯苓 當歸 皂角刺 薏苡仁 白蘚皮 木瓜 木通 金

銀花 甘草 均見前

(二十四)寄生性線蟲病(蛔蟲及蟯蟲)(蟯蟲中醫名寸

白蟲)

〔病原〕 此兩種寄生蟲病。吾國人類患之者最多。尤於小兒更甚。蛔蟲體為圓柱形。大小與箸相似。兩端尖。色黃白或帶紅；雌者較長。約七至十二寸。雄者較短。約四至八寸。其卵黃紅色。橢圓形。壳甚厚。每隨糞便排出。卵之生活力約有一二月。往往由水或菜類食物為媒介。被豬或人吞入腹中。孵化而成幼蟲。此蟲無其他宿主。

蟯蟲之形態絕似一段最細之白線。雌蟲較長約半寸許。雄者更細。

而短。約為雌蟲之半。其尾禿而卷起。雌者尾尖銳。卵橢圓形。一端稍扁。卵壳分三層。卵下時所含幼蟲已略發育。此蟲亦無幼蟲宿主。苟誤吞該卵入腹。即能直接成蟲。

〔病理〕 蛔蟲蟲卵在胃腸孵成幼蟲。鑽入腸壁。由此直接或間接由淋巴管而入靜脈血循環。於是再離此而入肺中之氣胞。更上行至氣管。經過會厭而達食道。最後則達小腸。乃漸發育而為成蟲。自卵被吞入腹以至成蟲。經過約共須四五星期。此後則雌雄配偶而生「有胎卵」。如只有雌蟲則糞中僅含「無胎卵」。又成蟲多居於小腸之上段。

蟻蟲多居於結腸。而下及於直腸。每行至直腸外產卵。因是之故。糞中不常合卵。雌蟲在內受孕後。游行過大腸。出直腸外生卵於肛門。

外毛中。此蟲又能穿出腸壁而至腹腔。若至直腸子宮陷凹。或致生直腸週圍膿腫。

〔症狀〕 小兒患蛔蟲則腹脹有時痛。消化不良。貧血。大便或秘結或洩瀉。間有因蟲上行而塞輸胆管致發黃疸。此外尚有致驚厥。急性腹痛。或發熱。口臭。煩躁不甯。喜摳鼻。睡中磨牙。肌跳動。此皆因蛔蟲能生一種奇異之刺戟物所致。此刺戟物有時於糞便中可嗅得之。蟻蟲患者極煩躁。不能安睡。胃口不良。並貧血。當蟲出直腸外下。叩時。肛門部奇癢。每甚苦惱。此時大便中每見一種絲光樣白而細長之蟲蠕動其間。中國舊稱寸白蟲。

〔治法〕 處方一 椒梅湯(回春)蜀椒三。○烏梅肉四。○楝榔八。○枳實六。○木香四。○縮砂仁四。○香附五。○桂

枝四。○川楝子一二。○厚朴五。○甘草四。○乾姜三。○
右十二味。剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 蛔蟲腹痛。時作時止。消化不良。萎黃貧血。煩躁嘔吐等症。

〔方解〕 蜀椒為刺激性殺蟲藥。有健胃鎮嘔鎮痛作用。用於腹痛胸痛。嘔吐蛔蟲等。

烏梅為殺蟲藥。有健胃解熱作用。用於嘔吐反胃。蛔蟲腹痛。久下利。勞熱骨蒸等症。

檳榔為健胃驅蟲藥。治蟲積腹痛。宿食不消。及奔豚腳氣等症。有特效。

枳實為苦味健胃藥。有促進消化及催進食慾作用。對於蟲積食積。

胸腹痞脹等症有破積瀉下之功。

木香為健胃藥。有收斂性殺蟲防腐作用。治腹痛瀉利。嘔吐反胃諸症有特效。

縮砂仁為刺激性健胃止瀉藥。用於腹痛下利。消化不良。痞脹嘔吐諸症。

香附為芳香性通經藥。有鎮痛健胃作用。對於痞滿腹痛。心下痛。婦人月經不調等症有特效。

桂枝為芳香性強壯健胃藥。有興奮血運。溫壯神經作用。用於身體衰弱性貧血畏寒。心腹冷痛。四肢攣痛等症。

川棟子為驅蟲藥。有解熱鎮痛作用。善治疝痛。小兒蟲積發熱等症。能殺蛔蟲。通大便。

厚朴為芳香性神經藥。有健胃作用。對於神經性胃腸諸痛有特效。甘草為緩和藥。於處方中作矯味用。並有緩和藥物刺激之功。於驅蟲方中尤有發揮諸殺蟲藥之力。

乾姜為健胃藥。有鎮嘔作用。治脹滿腹痛。嘔吐冷利等症。

處方二 七味鷓鴣菜湯 鷓鴣菜八。○黃連三。○桂枝

五。○半夏六。○大黃三。○甘草四。○乾姜二。○

右七味。對細作二百五十西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 因蛔蟲而發急性腹痛。嘔吐。身體壯實者。

【方解】 鷓鴣菜為驅蟲藥。有解毒作用。因其內含粘液素。食鹽。苦鹽。及矽砂等。對於胃腸內一切寄生蟲。尤其如蛔蟲有特效。又有排

除胎毒之功。

黃連為苦味健胃藥。用於消化不良。腸加答兒。嘔吐。煩渴。腹痛。黃疸。及小兒蟲疳諸症。

半夏為鎮嘔藥。有祛痰健胃作用。用於胃加答兒。及頑固性嘔吐。欬逆。咽喉痛等症。

大黃為苦味健胃藥。用其小分劑有促進消化之功。大分劑有緩下作用。驅蟲方中用之能排除寄生蟲。及蟲卵。有清理胃腸之功效。

桂枝 甘草 乾姜 均見前

處方三 大蘆薈圓(直訣)蘆薈一。○木香五。○青皮七

○陳皮八。○胡黃連五。○黃連四。○蕪荑七。○雷丸八

○鶴虱八。○麝香○。五

右十味。剉細。用麵糊為丸。如菘豆大。每服一錢。一日三次。飯前開水

吞下。

適應症 蛔蟲腹脹。四肢瘦削。顏面萎黃。身體衰弱。骨蒸潮熱。嘔吐。舊稱蟲疳者。

〔方解〕 蘆薈為通經殺蟲藥。小分劑有健胃作用。用其大分劑為峻下藥。對於蛔蟲腹脹。發熱。小兒驚癇。煩熱。嘔吐等症有特效。青皮為解熱藥。有健胃作用。善治疝痛。並食積痞脹等症。

陳皮為芳香性健胃藥。有促進食慾及矯味作用。對於痞悶腹脹。嘔吐胸滿等有效。

胡黃連為健胃殺蟲藥。用於蟲疳發熱。骨蒸。下利。小兒驚癇等有效。蘆薈為驅蟲藥。無論蛔蟲。蟻蟲。一切寄生蟲。均奏特效。

雷丸為驅蟲解熱藥。對於小兒蟲疳。潮熱。腹脹等症。有殺蟲退熱之

功。

鶴虱為驅蟲藥。能殺蛔蟲。蟻並治心腹痛。麝香為強心回蘇藥。有解毒作用。用於中毒性心腹諸痛。小兒驚癇。疳積痞脹。衰弱神疲等症。有興奮提神作用。

木香 黃連 均見前

處方四 化蟲丸 鶴虱 檳榔 使君子肉各三份 苦楝根

皮蕪荑各二份 胡粉 枯礬各四份

右六味。共研極細末。麴糊為丸。如小豆大。每服一錢。一日二次。飯前空腹糖湯下。

適應症 蛔蟲腹痛。嘔吐清涎。肚腹常熱。有時膨脹。大便洩瀉。

或秘結等症。

〔方解〕 使君子肉為有效之驅蟲藥。對於蛔蟲或蟯蟲等一切寄生蟲。皆有殺滅之功能。又有健胃解熱作用。

苦楝根皮即川楝子之根皮。根皮之功用與子相同。詳見前。

胡粉即鉛粉。化學上名為「碳酸鉛」。賞用為賦形藥。專供保庇之目的。用於內服有殺蟲攻毒作用。

枯礬為明礬之失其結晶水分者。有收斂作用。能解熱殺蟲。止血。對於腹痛嘔吐下利等有效。

鶴虱 檳榔 蕪荑 均見前

處方五 甘草粉蜜湯（金匱）甘草八。○胡粉一二。○白

蜜二○○○

右三味。先煎甘草去渣。作三百西西。調入胡粉白蜜。攪拌。一日分三

次溫服。

適應症 蛔蟲心腹痛吐涎沫及蟻蟲心煩腹痛時發時止屢用殺蟲攻毒藥不效者此方主之。

〔方解〕 白蜜即蜂蜜為緩和性滋養藥有解毒防腐鎮痛鎮靜作用又有緩下之功外用塗蜂螫及火傷等有效內服能制鉛粉毒。

胡粉 甘草 均見前

處方六 追蟲取積丸（尊生）蕪荑四。○雷丸六。○使君

子肉八。○檳榔七。○牽牛子二。○大黃三。○鶴虱四。○

木香三。○

右八味剉極細末用蜂蜜為丸如小豆大每服錢半（小兒依年齡遞減）一日兩次飯前空腹糖湯下。

適應症 不論蛔蟲、蟻、腹脹、腹痛、膨脹、大便秘結、胸中煩滿、嘔吐、清涎、發熱、口臭、睡中磨牙等症。

〔方解〕 牽牛子為瀉下藥。有攻痰逐水。排除腸中積毒作用。對於

胸滿、腹痛、膨脹、大便不行等之因痰食蟲毒積滯者有迅效。

蕪荑 雷丸 使君子肉 檳榔 大黃 鶴虱 木香 均見前

處方七 追蟲丸 準繩（牽牛子二。○茵陳一二。○檳榔

一二。○雷丸一。○木香六。○皂角二。○川棟根皮一二。○

右七味。研極細粉。用蜂蜜為丸。如赤豆大。每次一錢。一日三次。空腹

服糖湯下。

適應症 蛔蟲腹脹。時痛時止。大便秘。小溲赤。皮膚發

蟲痞滿。煩躁。腹脹。痛等。

〔方解〕 皂角為衝動性殺蟲藥。有祛痰及驅除粘液作用。性善竄透。外用為惹激噴嚏藥。內服療腹脹滿。殺蟲破堅。墮胎。孕婦忌用。茵陳為利尿藥。善治黃疸。及小便不利。因其有苦味。激胆。清熱利尿。並排除胆汁色素。從小便而出之作用故也。

牽牛子 檳榔 雷丸 木香 川棟根皮 均見前

處方八 集效丸(局方) 蕪荑一二。○木香六。○鶴虱

一○。○檳榔一五。○訶黎勒一○。○附子三。○乾姜三。

○大黃八。○

右八味。研極細粉。麩粉糊為丸。如菘豆大。每服一錢。一日三次。飯前空腹糖湯下。

適應症 蛔蟲腹痛。嘔吐涎沫。大便溏洩。或秘結。身不熱。貧血。

畏寒等症。

〔方解〕 訶黎勒為收斂藥。有鎮嘔止瀉健胃整腸作用。對於心腹脹滿。虛冷喘咳。久下利等症有效。

附子為興奮性強心藥。有興奮全身細胞生活力。及振起衰弱之機能作用。用於衰弱患者。無熱而顯貧血。顏面蒼白。畏寒。四肢發冷等現象時有特效。

乾姜 蕪荑 木香 檳榔 鶴虱 大黃 均見前

處方九 使君子丸（準繩）使君子肉二〇。〇檳榔二〇。

〇石榴根皮三〇。〇大黃一〇。〇。

右四味為極細末。沙糖水煎。麩糊為丸。如小豆大。每

次空腹米飲下。

適應症 蛔蟲蟯蟲腹痛煩躁嘔吐清水大便結實者。

〔方解〕 石榴根皮為驅蟲藥。尤其對於蟯蟲有特效。

使君子肉 檳榔 大黃 均見前

處方十 加味肥兒丸 蕪荑三〇・〇黃連八・〇神麩四

〇・〇麥芽四〇・〇使君子肉三〇・〇黃精四〇・〇黃耆二

〇・〇人參一〇・〇甘草八・〇

右九味。研極細。煉蜜為丸。如菘豆大。每服一錢。一日三次。空服米飲

下。

適應症 蛔蟲腹脹不欲食。身體瘦弱。貧血。及患蟲病日久。衰

弱等。

〔方解〕 神麩為健胃消化藥。治消化不良。脹滿洩利等。

麥芽為滋養性健胃藥。有促進消化。及增進營養之作用。治消渴。解熱。及痞脹腹滿等症有特效。

黃精為滋養性強壯藥。有驅蟲作用。用於病後衰弱。貧血。筋骨痠痺無力等症有效。

黃芪為緩和性滋養強壯藥。有生長肌肉。及排除水毒作用。用於衰弱羸瘦。水腫風痺。腹痛冷利。盜汗。癰疽久不斂等有特效。

人參為興奮性強壯藥。有健胃作用。對於胸中痞滿。消化不良。久病衰弱。脈搏無力等有特效。

蕪荑 黃連 使君子肉 甘草 均見前

處方十一 化蟻蟲方(外臺) 榧子 檳榔 蕪荑 各等分 研極細粉 每用一。〇。溫紹酒調沖。日服兩次。服藥前先勿食。俟飢極用肉

哺含口中。嚙汁下。移時。棄肉舖。卽服此藥。蟯蟲當化水而下。

適應症 蟯蟲腹痛。煩躁。時發時止。肛傍奇癢。消化不良。大便不爽。或瀉下等。

〔方解〕 檳子為殺蟲藥。尤其對於蟯蟲有特效。因其內含多量植物之脂肪油。有潤滑大便。排除蟲毒。並防治痔疾之功。

蕪荑 檳榔 均見前

(二十五) 痘瘡 (天花)

〔病原〕 本病原由。至今尚未查出。或謂係一種原蟲。然未能公認。病為急性傳染病。病毒最烈。苟未接種牛痘。或人工痘。天然具免疫力者甚罕。既患一次。未必果能終身不再患。然患二次者少。三次者尤少。不論老幼。均能傳染。孕婦患痘。胎或同受染。迨胎兒產出。其體或

顯癩疹。且多夭折。若嬰體尚無患痘之症。立即接種牛痘。或可幸免。
〔病理〕 痘疹不獨發於外皮。且顯於粘膜等如口、舌、腭、咽、食管、胃、直腸等處。亦間或有之。更有集合淋巴結腫者。至於喉不惟發疹。或兼有血絲（纖維素）滲物。或粘膜水腫。喉之軟骨間或發炎。氣管及支氣管或爛蝕。然不似皮之生皰。心肌纖維或有脂肪性變。心內膜心胞等或發炎。脾甚增大。腎亦或發炎。在出血性痘症。其漿膜面或粘膜面均顯血滲出（瘀）器管之主質結締織。神經鞘。及肌中等亦然。骨髓或出血。脾及肝堅。而或未腫大。
〔症狀〕 本病分三類。甲「真痘」此類又分二種（一）稀疏痘（二）融合痘。乙「惡性痘」又名出血性痘。此類亦分二種（一）瘀點痘（俗名黑痘）（二）血膿胞痘。丙「變痘」是因已接種牛痘而變輕者。

本病潛伏期九至十五日。初狀為寒戰。小兒或驚厥。腰肢劇痛。嘔吐發熱。頭痛。熱升極速。首日或至一百〇三四度。脈搏速而洪。病重者或譫妄。面紅。目放光彩。皮常乾。然間或多汗。惟不能憑以上各狀之輕重。預判痘之稀疏或融合。經過三四日。為發疹期。或瀰漫如猩紅熱。或癍形似麻疹。所佔位置廣狹不等。或佈滿全身。或限於數處。繼則發正疹。稀疏類者。額或腕前發鮮紅色癍數枚。閱二十四小時則顏面軀幹上下肢粘膜等先後依次受惠。疹發出則熱退。全身狀變輕。繼則此斑成丘疹。捫之碍指。至第五六日。丘疹變成水疱。形凸而圓。內貯透明液。至第八日。透明液化膿。色變灰黃。膿胞周圍色紅。疱與疱之間皮腫。體溫復升。名繼發性熱。此熱約二十四至二十六小時即退。膿疱速變乾。結痂自面始。而後依次及他處。至第十四五日

面先脫痂。依次落盡。愈後皮有癢痕。病者之臭氣頗形特別。即在未發疹前。醫士亦可藉此以助診斷。至「融合類」初狀大概相同。而惟較重。倘至第三日發疹頗多。必成融合痘。然亦有丘疹先稀疏。迨成膿胞時始成融合者。最密之處為面及手足。至第十日。皰全化膿而融合。致頭面手足之皮盡成淺膿腫。成人在此期內多流涎。小兒則瀉口甚渴。頸之淋巴腺腫大。面與手之膿胞雖融合而軀幹則仍疎。故覘病之險否。須以面部之膿胞為標準。而不在軀幹。致命之病。在第十至十一日。由脈搏愈弱愈速。譫妄肌微震戰。間或腹瀉等而死。倘至第十一十二日間變乾。則能漸愈。

「出血性痘」其出血性之顯出最早二至六日以內即死。血膿皰則初似尋常痘。迨成水皰期。或化膿皰期。則有血滲出皰內。或由粘膜

流血。此病壯健之成人患者頗多。小兒較少。患此可畏之病者其形
狀醜惡。皮盡紫。面腫。結合膜血出而凸。致角膜似凹陷。使人視之悚
然。精神至死或不昏憤。出血之粘膜。最尋常者在腎為血尿。次則在
胃。更有大便下血。肺咯血。女子子宮出血而致血崩。
變痘為已種牛痘而所患減輕者。初起間或陡且重。其餘症狀多輕。
丘疹發出不多。或僅於面及手兩部。或水皰化膿甚速。無繼發熱。瘡
後無癍痕。

〔治法〕

處方一 升麻葛根湯 升麻六・○葛根一二・○赤

芍八・○甘草六・○

右四味。剉作二百西西煎劑。去渣。一日分二次溫服。小兒減半。

適應症 痘症發疹期。熱高。腰及四肢劇痛。頭項強痛。咽喉痛。

及煩躁不安等症。

〔方解〕 升麻為解熱藥。有解毒治瘡作用。能消除咽痛。對於麻疹

痘瘡。病毒壅鬱發洩不宣。煩悶熱渴等症。有排洩毒素。清血之功。

葛根為清涼性解熱藥。有發汗排毒。促進血清抗毒作用。實用於頭

項強痛。瘡毒內攻。煩悶無汗。麻疹斑疹發洩不暢等症。有特效。

赤芍即芍藥之色呈暗褐者。為鎮痙鎮痛藥。有通經活血作用。用於

血液中有熱。如癰疽惡瘡。痘瘡等症。有散瘀清血之功。

甘草為緩和藥。有解毒作用。能緩解急性傳染病急性之毒氣刺

激。能奏粘滑包攝之功。

處方二 涼血攻毒飲 大黃六。○ 荆芥穗八。○ 木通四。

○ 牛蒡子一。○ 赤芍六。○ 生地一二。○ 青皮四。○ 蟬蛻

二。○紅花四。○紫草八。○葛根八。○丹皮六。○
右十二味。剉作三百西。煎劑去渣。一日分三次溫服。小兒依年齡
遞減。

適應症 出血性痘症。疹現後高熱不退。肌膚灼熱如燔。目赤

口渴。顏面紅腫。大便秘結。小溲赤澀。或血尿。或咯血。鼻衄等。

〔方解〕 大黃為緩下藥。用於便秘。熱高。上部充血。目赤。鼻衄。吐血

等症。本品有清涼性消炎及收斂性止血作用。對壯實性熱症。出血
有誘導作用。能降低血壓。減退上部充血之功。

荊芥穗為解熱鎮痙藥。有清血解毒作用。適用於一切瘡毒發熱。瘰
癧。並血中熱毒刺激而引起之症。如婦人產褥熱。破傷風。痘瘡。皮膚
搔癢發洩。不宣。頭痛。筋骨煩疼。吐血。衄血等症。均有特效。

木通為消炎性清涼解熱利尿藥。有消腫清血作用。對於癰腫瘡毒及喉痺咽痛發熱煩渴。小便赤痛。或血尿等症有特效。

牛蒡子為解毒治瘡藥。賞用於喉痺咽痛。瘡毒發熱痘瘡不達。煩悶等症。並能消斑疹熱毒。

生地為緩和性強壯藥。又為通經藥。生用有清血解熱利尿作用。用於出血性諸症如吐血下血等。因本品有散瘀活血補血之功。

青皮為解熱藥。有健胃作用。用於大隊清涼藥中。作健胃以促進藥物之發揮為目的。

蟬蛻為解熱鎮痙藥。賞用於小兒急性熱病之痙攣。並有驅風解毒作用。對於痘疹不出。破傷風。驚厥。失音。疔腫毒瘡等有效。

紅花為通經藥。有鎮痛鎮靜清血解毒作用。因其內含紅色素及黃

色素等。故又有消炎殺菌之功。對於血液中有毒素刺激而起之腫痛瘡癰痘疹等有特效。

紫草為清血解毒變質藥。對於惡瘡斑疹痘毒熱甚。毒重血色紫暗者。用之有活血涼血及緩下作用。

丹皮為通經藥。有鎮痛消炎解熱作用。用於吐血衄血癰腫瘡毒等症。有排膿止痛止血解熱除煩之功。

赤芍 葛根 均見前

處方三 葛根解毒湯 葛根六。升麻四。天花粉一二。

○生甘草三。○麥門冬八。○生地一二。○茅根一二。○右七味。剉作二百五十西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 融合痘見疹期。熱甚口渴。煩悶舌燥。齒乾。津液大傷。

痘毒熾盛。透發不暢者。

〔方解〕 天花粉即括萋根。為解熱生津藥。有鎮欬祛痰作用。對於

煩熱口渴。唇乾舌燥等症有效。並能消腫毒瘡癤排膿散瘀。

麥門冬為滋養藥。有祛痰作用。能退熱止渴。清心肺煩熱。並促進液

體之滋生。故主乳汁不下。肺痿津枯諸症。

茅根為利尿發汗藥。有清血消瘀解毒作用。治吐血衄血。清瘀血。除

伏熱等。

葛根 升麻 甘草 生地 均見前

處方四 人參白朮散 藿香八。○白朮一二。○葛根八。

○煨木香四。○炙甘草四。○白茯苓一二。○人參六。○

右七味判為散。作二百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 痘症起水炮後。因體虛下利。不能變膿炮。或因衰弱下利。而水炮不凸。炮皮寬陷不起綻者。

〔方解〕 藿香為芳香性健胃藥。因其內含揮發油。能治心腹痛。胸悶吐瀉。有發散壅鬱諸毒作用。

白朮為健胃利尿藥。有促進腸吸收及制瀉作用。用於胃腸加答兒等有特效。

木香為健胃消化藥。有發汗及收斂作用。用於腹痛洩瀉。嘔逆胸悶等症有特效。

茯苓為利尿藥。有鎮靜制泌作用。賞用於洩瀉小便不利水腫等症。蓋小便利則洩瀉自止。且本品略具營養之功。

人參為興奮性強壯藥。有健胃利尿制泌作用。賞用於衰弱虛脫。盜

汗消化不良。下利滑脫。脈搏小弱等症。有鼓起機能。強心起脈之功。炙甘草係甘草之炙熟者。於緩和滋養之外。增加其強壯營養之功。葛根 見前

處方五 加味保元湯 人參六。○炙黃芪八。○浮小麥一二。○炙甘草四。○桂枝四。○芍藥六。○右六味。剉作二百西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 痘症將透。因體虛汗多。畏寒。不能灌漿。起皰化膿。有虛脫之險者。

〔方解〕 黃芪為緩和性強壯藥。有強壯全身肌肉細胞。排膿托毒作用。實用於自汗盜汗。癰疽敗瘡。不能化膿。及痘瘡塌陷。洩利等症。然充血性質。實症須忌用。

浮小麥為滋養強壯藥。有鎮靜及止汗作用。用於衰弱性自汗盜汗。睡眠不安等症。

桂枝為興奮性強壯健胃藥。有溫壯神經。融和血脈作用。能散寒止汗。健胃鎮痛。對於肌表疎鬆性汗多畏寒等有效。

人參 炙甘草 芍藥 均見前

處方六 當歸六黃湯 當歸一二。○黃芩四。○黃連二

○生地黃一二。○熟地黃一二。○生黃芪八。○

右七味。剉作三百西。煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 痘瘡發出。熱甚。汗多。煩躁不寐。口渴。舌紅。無津液。雖因衰弱。而機能興奮。舊稱陰虛汗多出者。

〔方解〕 黃芩為清涼性解熱藥。對於急性熱性腸炎洩利及發熱。

煩渴。癰瘡腫毒。目赤等充血性炎症有特效。

當歸為清涼性通經活血藥。有鎮痛作用。用於血液病如瘡腫瘀血等症。有營養血液排膿止痛之功。

黃柏為解熱健胃藥。有消炎及收斂作用。用於瘡腫發熱。口舌生瘡。下血。小便赤痛。陰虛勞熱盜汗等症有特效。

黃連為苦味健胃藥。有清涼消炎作用。用於發熱嘔吐煩渴。腸加答兒等。

熟地黃與生地黃功效相同。惟滋養強壯之功較生地黃為勝。而清血解熱作用則熟不如生也。

生地黃 黃耆 均見前

處方七 解毒內托湯 生黃芪六。○荊芥六。○防風六

○連喬去心六。○當歸八。○赤芍六。○銀花一。○
草四。○木通五。○

右九味。剉。作三百西。煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 痘瘡融合。毒邪熾盛。遍身骨節痠痛。漿胞不凸。或併
為瘡癤。潰爛臭穢。或毒壅關節。肢體不能動彈。瘡毒塌陷等。

〔方解〕 防風為解熱驅風藥。有鎮痛作用。對於骨節風痛。四肢攣
急。關節經絡為毒邪凝滯等有效。

連翹為變質解毒藥。有清涼發汗作用。用於瘡疥癰腫。熱結惡瘡等
症。有排膿止痛清血解毒之功。

銀花為清血解毒藥。專用於瘡毒癰腫。骨節疼痛等症。有散熱解毒
之功。

黃耆 荊芥 當歸 赤芍 甘草節 (甘草) 木通 均見前

處方八 加味犀角湯 荊芥六。○防風五。○牛蒡子一

○。○生甘草四。○桔梗六。○升麻五。○犀角三。○麥冬

一○。○梔子一二。○黃連三。○生石膏二○。○

右十一味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 惡性痘症。毒火熾甚。痘現紫黑色。高熱不退。昏譫。舌

赤腫。目紅齟。口腔粘膜均出血等。

〔方解〕 桔梗為排膿祛痰藥。療咽喉痛。口舌生瘡。祛痰涎。托膿腫。

犀角為解熱解毒藥。且有強心作用。賞用於急性熱病。熱高昏譫。瘡

毒心煩驚搐等症。並能解食物中毒。藥毒等。又主吐衄。發斑。發狂。鬱

血性黃疽。痘瘡稠密。內熱黑陷。不能結痂等。

梔子為清涼性解熱解毒藥。實用於熱病充血性炎症。出血。如鼻衄。吐血。血淋。鬱血黃疸。出血性痘瘡。心胃煩熱等症有特效。

石膏為清涼性解熱藥。因其內含「硫酸鈣」。一有消炎制泌作用。實用於急性熱病。大熱煩渴等症。

荊芥 防風 牛蒡子 生甘草 升麻 麥冬 黃連 均見前

處方九 利咽解毒湯 防風五。○山豆根六。○麥冬一

○。○牛蒡子九。○黑元參一二。○桔梗四。○甘草三。○

萊豆一五。○

右八味。剉作三百西。煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 痘毒不能發越於外。壅塞於咽喉。而致喉腫聲啞。噎

逆。呼吸不利。飲食不能下嚥等症。

〔方解〕 山豆根為清涼性消炎解毒藥。對於咽喉頭發炎腫脹疼痛有特效。能解諸毒。去熱止痛。消腫殺蟲。

黑元參為清涼性消炎藥。實用於癰腫瘡癤。結核等症。能利咽喉。通二便。治骨蒸。心驚煩熱。但脾虛洩瀉者忌用。

萊豆為清涼性解毒藥。能消腫解熱。治癰疽瘡腫。並解金石草藥諸毒。

防風 麥冬 牛蒡子 桔梗 生甘草 均見前

處方十 如聖散 當歸一二。○陳皮六。○白朮一二。

○大腹皮八。○黃芩六。○縮砂仁連壳五。○生甘草四。○

黑豆(酒洗)一五。○桑寄生一二。○

右丸味。剉作三百西煎劑。去渣一日分三次溫服。

適應症 妊婦患痘。胎動不安。胸悶氣逆。腰痠骨痛等。

〔方解〕 陳皮為健胃藥。有寬中利氣作用。用於嘔吐胸悶。氣逆咳嗽。胎動不安等症。

大腹皮為利尿藥。有治脹寬中利氣之功。善治孕婦胎動不安。痞滿腹脹等症。

縮砂仁為健胃止瀉藥。又為刺激藥。用於痞悶腹脹。消化不良。嘔吐腹痛等。能和中運氣。止痛安胎。

黑豆為解毒藥。兼有滋養之效。又有利尿作用。實用於癰腫瘡毒。水腫瘀血等。並解金石藥毒。驅風散熱。活血止痛。殺烏頭毒。生研塗一切癰腫。豆淋酒一名紫湯。即用黑豆炒三合。好酒一升。浸密封三四日。開出取飲。治妊娠腹痛極效。

桑寄生為強壯藥。多用於婦科。尤其於孕婦。有安胎作用。善治腰痛。筋骨痛。懷孕漏血不止。並治癰腫瘡毒和血脈。

當歸 白朮 黃苓 甘草 均見前

(二十六) 水痘 (或稱假痘)

〔病原〕 本病之病原體。亦至今尚未查悉。雖亦為急性傳染病。皮面發皰疹。然與真痘相殊異。患水痘者不能免真痘。患真痘者亦不能免水痘。患者恆係小兒。多在二至六歲之間。成人雖亦有之。然不多。

〔病理〕 本病之病毒侵入處。似與真痘相同。所發之疹。口之粘膜亦間或有之。惟發於喉者罕見。淋巴腺似不受患。

〔症狀〕 潛伏期十至十五日。初起微發熱。或寒戰。或嘔吐。腰及腿

痛驚厥則罕。發熱二十四小時。即顯發疹。再閱數小時則疹變球形。皰皰內之液或清或濁。大多數無臍形。較真痘之皰淺。圍包之皮不充血亦不腫。閱三十六至四十八小時皰內變膿。至第三四日結黑棕色之痂。痂脫後大概無癍。早期之三數日。每日有新疹羣發出。故至第四日可同時並見各期之疹如丘疹水皰膿皰結痂者皆有之。在未發之前或亦似真痘。成人患之病或頗烈。初熱甚高。全身狀重。致醫士誤認為真痘。然水痘之發熱普通均不高。疹發出時亦或不降。本病非險症。經過大概良好。

〔治法〕

處方一 荊防敗毒散 荊芥八。○防風六。○羌活

獨活各五。○柴胡三。○前胡六。○生甘草三。○川芎三。

○枳殼五。○桔梗五。○茯苓一。○。

右十一味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。小兒依年齡遞減。

適應症 水痘初期。熱高惡寒。頭痛。咳嗽。疹點雖現尚未起炮。

或起炮而皮癢。及成人患水痘。初狀劇烈。頭痛。腰痛。胸悶煩躁等症。

〔方解〕 荊芥用為發汗解熱排毒驅風藥。

防風為解熱透表藥。用治骨節痛。腰痛。頭痛。能疎通經絡。散寒驅風。羌活為驅風鎮痛藥。用於頭疼身痛。腰痠痛。遍身作癢等有發汗散寒之功。

獨活功用與羌活相同。

柴胡為清涼解熱藥。用為痘疹發熱。骨節煩疼。頭疼胸脅苦悶等症之解散劑。

前胡為祛痰藥。有鎮效解熱作用。治骨節煩熱胸悶氣喘等。

甘草為緩和藥。既有解毒作用。又有調和諸藥之功。

川芎為鎮痙鎮痛藥。能疎通血脈。治頭痛體痛等症。

枳殼為健胃藥。有寬中利氣之功。對於痞悶嘔吐效嗽氣逆等有效。
桔梗為祛痰藥。有排膿作用。能利咽喉。托達瘡毒。

茯苓為利尿藥。有營養及鎮靜作用。治煩熱驚悸。睡眠不安。小便不利。大便洩瀉等。

處方二 加味導赤散 生地八。○木通四。○生甘草四。

○連翹七。○黃連二。○滑石一○。○茯苓一○。○麥冬

八。○

右八味。剉作二百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 水痘發出後。身熱口渴。小溲短赤。煩躁不寐等症。

〔方解〕 生地為清涼性活血滋養藥。用於血分有熱。血液乾枯。潮熱口乾等症有效。

木通為清涼性消炎利尿藥。能治煩渴發熱。小便不利。骨節煩疼等症。

連翹為變質解毒藥。有清血消炎作用。退煩熱。消癰瘡。驅風。制皮膚之癢。療頭痛嘔吐等症。

黃連為健胃藥。有清胃消炎作用。用治煩熱嘔吐。並能消瘡解毒。滑石為緩和粘滑藥。內服有制瀉利尿作用。

麥冬為滋養強壯藥。有解熱生津作用。用治煩渴欬嗽。

甘草 茯苓 均見前

處方三 鯽魚筍尖湯 鮮鯽魚一尾 剖去腸雜洗淨。鮮筍尖三四枚

右二物。用水一碗。加鹽醬適宜。飯鍋上燉熟。頻頻飲其湯。或加入粥湯中服。

適應症 不論水痘真痘見點期。現狀平順。並無他病。以此湯開胃養正。托邪。最為妥善。

〔方解〕 鯽魚為健胃營養品。作羹湯治胃弱不欲食。能調中托痘。瘡。

筍尖為開胃消食除煩解熱品。能消痰利水。止渴下氣。其味頗鮮。與鯽魚同作羹飲服。能促進抗力。透托疫瘡。

(二十七) 猩紅熱(中醫稱時疫喉痧)

〔病原〕 此為一種急性傳染病。致病之微生物至今尚未查悉。或云係一種溶血鏈球菌。蓋患者血中及咽內常現有此菌。然迄今未能公認。病毒之傳染。多人以為含於鼻。咽喉。呼吸道等之液內。或以為含於表皮。因脫屑飛揚而傳佈。或又以為表皮之毒。仍由鼻咽之液沾着而致。此毒非若麻疹之逾時即滅。病雖痊癒。病毒留於鼻咽。歷久不去。他兒受染。即由於此。病與年齡很有關係。患者於二至十歲為最多。惟哺乳兒患之者少。本病多發生於學校。蓋小兒聚處校中。傳染極易。流行最盛之期在春季。

〔病理〕 皮面之疹。除出血類外。死後殆盡消滅無迹。身體無特別損害。內臟之改變。半由發熱。半由膿菌所染而致。咽或僅顯發炎之狀。腭扁桃發陷。富性炎。或假膜性炎。或生膿腫。或成壞疽。生膿之病。

灶及淋巴腺內含鏈球菌頗繁盛。而心內膜炎。心包炎。腎炎等。亦或有之。

〔症狀〕 本病潛伏期約二三日。初狀為寒戰者少。嘔吐或驚厥為最常。熱速升。當第一日即已升至一百零四五度。皮極乾。舌有苔。咽乾。面紅。疹大概在第一日發顯。亦有在二十四小時內發顯者。始現頸胸兩部。散佈甚速。其色異常鮮紅。此係皮充血之故。他病之疹無如此之紅者。按之則色退。釋之則色復顯。其疹間有成凸形者。惟不若麻疹之以凸形為常例。皮面初光滑。後變粗澀。疹發至極點。或生汗皰。皰中之液或變濁。又或兼發黃色微皰。是名「粟粒疹形猩紅熱」。或謂腭腋窩腹股溝處等發疹點係此病之實徵。面疹極盛而口周圍皮色白。亦此病之特狀。皮腫脹發癢。腭、頰、扁桃等粘膜皆極

紅且顯紅點。舌中部有苔。苔中顯紅刺。特稱楊梅舌。呼出氣臭而味甜。腭弓及腭扁桃紅腫。重者發陷窩性炎。尤重者咽粘膜發假膜性炎。該部之組織俱腫。頷下淋巴腺亦腫。最烈者頸項之組織亦腫且硬。

「惡性類」初狀甚重。熱升至一百〇七八度。輾轉不甯。頭痛譫妄。昏迷。呼吸困難。脈速且弱。於二十四或三十六小時中即死。有皮下發紫癰蔓延遍體。或血尿及鼻衄者。名「出血類」。多在二三日內致命。有咽狀早顯。進行迅速。腭弓及扁桃腫。成膜性滲物佈滿全咽。前至口上至鼻後孔。與白喉相似。頸淋巴速腫。咽組織壞死。口惡臭。全身狀況沉重。名「咽峽炎類」。倘不因中毒而速死。則頸生膿腫壞死。腭扁桃近處之死組織脫離時。或致頸動脈破而出血殞命。

「輕性類」則疹速佈。至第二日晚即已遍全身。閱二三日即漸消失。至第七八日即消失殆盡。表皮脫屑。大概在病後十數日間。本病之最輕者其疹不甚顯。如在流行時某家數小兒患之。另有一兒不爽。皮無疹祇顯咽痛及楊梅舌。謂之「無疹性猩紅熱」。瘡後表皮亦或脫屑。

〔治法〕 處方一 麻杏石甘湯 麻黃三。杏仁一二。石膏三。甘草五。

右四味。剉作二百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 猩紅熱初起發熱無汗。頭疼骨節痠痛。口渴煩悶。氣息喘促等。

〔方解〕 麻黃為發汗解熱藥。有平喘利尿作用。用於急性傳染病。

熱高無汗。頭疼骨節痛等症狀時。有排除毒素由汗液而出之功。尤其與石膏並用。能解熱平喘。

杏仁為鎮欬平喘藥。有祛痰作用。對於呼吸器病喘息欬嗽。頭痛發熱胸悶等症有效。

石膏為清涼性解熱藥。用於時氣溫疫（急性傳染病）發高熱。頭疼身痛口渴煩躁等症。有特效。與麻黃伴用。有發揮其利尿發汗作用。且能防止肺炎。

甘草為緩和藥。能緩解急迫性毒素刺激。潤咽喉鎮欬祛痰。並能中和藥物。用於處方中。不僅矯味。及調和他藥。且能助長發揮各藥之作用。

處方二 總方六味湯 荊芥穗八。○防風六。○桔梗五

○甘草四。○殭蠶八。○薄荷四。○

右六味。剉作二百五十西。煎劑去渣。一日分三次溫服。

適應症 猩紅熱疹點雖現。咽喉及腭扁桃紅腫發炎劇烈。或顯假膜炎。粘液滲物滿佈。高熱頭疼畏寒無汗等。

〔方解〕 荆芥穗為發汗解熱藥。有驅風排毒清血作用。常用於頭疼發熱。瘡疹風毒。痙攣等。尤其對於血液中毒素發熱。有驅除清解之功。

防風為解熱驅風藥。擅長於頭痛骨節痠痛。形寒心胸煩悶等症。因其有疎通經絡。及發散皮膚壅鬱毒素之功。

桔梗為祛痰藥。能清利咽喉。賞用於喉頭炎性滲出物粘膩不鬆等症。

殭蠶為驅風解毒藥。實用於喉痺失音。丹毒風疹。咽腫瘡癬等症。薄荷為清涼發汗藥。有健胃解熱作用。對於發熱頭疼。喉痺失音。痰涎粘膩。瘡疥風疹。口齒諸病有效。煎湯漱口。去舌苔。刷痰涎。令人口氣香潔。

甘草

見前

處方三 古今錄驗升麻湯 升麻六。○石膏三○。○牡

丹皮八。○甘草五。○

右四味。剉作二百西。煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 猩紅熱惡性類。熱高喉炎。皮顯紫癍。煩渴胸悶。輾轉不甯等。

〔方解〕 升麻為解熱解毒藥。有發汗清血治瘡作用。能消除咽痛。

麻疹痘瘡及諸瘡之毒。善治咽喉炎腫。解急性傳染病之熱毒。舊稱辟瘟疫。疑其有清血殺菌作用。

牡丹皮為清涼性通經鎮痛藥。有涼血清血作用。實用於頭痛腰痛。吐血衄血。口瘡喉炎諸症。

石膏 甘草 均見前

處方四 利膈湯 薄荷四。桔梗六。荊芥五。防

風五。○牛蒡子一。○甘草三。○元參一。○

右七味。剉作三百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 猩紅熱。汗少。咽喉腫痛。發熱胸悶。頭疼咳嗽。痰涎粘膩。不鬆等症。

〔方解〕 牛蒡子為清涼解毒藥。善治咽喉諸炎腫。並消斑疹癰腫。

頭面諸瘡毒

元參為清涼消炎藥。有利咽喉解熱毒作用。並治心驚煩熱。癰腫瘡毒。虛勞骨蒸等症。

薄荷 桔梗 荊芥 防風 甘草 均見前

處方五 玄參解毒湯 玄參一二。○甘草五。○梔子一

○。○黃芩六。○桔梗六。○葛根七。○生地一四。○荊芥

六。○淡竹葉六。○

右九味。剉作三百西。煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 猩紅熱初起。熱甚。頭疼。喉痛。欬嗽。口渴。顯楊梅色舌。

咽腫。吞嚥不利。小兒煩啼驚厥等。

〔方解〕 山梔子為清涼解熱解毒藥。對於內部充血性炎症發熱。

煩渴嘔吐。胸悶吐血衄血等症有特效。

黃芩為清涼解熱藥。用治寒熱往來。頭痛煩渴。胸悶嘔吐。欬嗽氣逆等症頗效。

葛根為清涼解熱藥。有發汗解毒作用。治頭痛項強。發熱無汗。煩悶斑疹透達不暢等有特效。

生地為清涼性滋養強壯藥。有清血涼血作用。用於吐血。牙齦出血。咽喉炎症出血等症。能解熱止血。生津除煩。

淡竹葉為清涼解熱利尿藥。能除煩熱口渴。小兒驚啼。有清心鎮靜作用。

元參 甘草 桔梗 荊芥 均見前

處方六 牛蒡子湯（濟生）牛蒡子一〇。〇玄參一二。

○犀二。○黃芩六。○升麻六。○桔梗六。○木通五。○甘草四。○

右八味剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 惡性猩紅熱初起熱高喉痛神昏譫妄煩渴胸悶欬嗽小便短赤等。

〔方解〕 犀角為解熱解毒藥有強心鎮靜作用對於急性熱病熱高神昏吐血發狂發斑發疹疔瘡癰腫等有特效。

木通為解熱利尿藥。有清涼消炎作用。能治煩熱。喉痺咽痛口瘡等。

牛蒡子 元參 黃芩 升麻 桔梗 甘草 均見前

處方七 犀角地黄湯 犀角（水磨沖）三。○牡丹皮一四

。○生地黄二。○芍藥一二。○

右三味剉。作二百西西煎劑。去渣。後沖入犀角。一日分三次服。臨服時須攪拌。

適應症 惡性出血性猩紅熱。熱高神昏。吐血鼻衄。皮下發紫癍。或血尿等。

〔方解〕 芍藥為鎮靜藥。有收斂作用。用治上部充血性頭痛吐血。驚狂目赤鼻衄等症。

犀角 牡丹皮 生地黄 均見前

處方八 利咽解毒湯 山豆根六。○玄參一二。○桔梗五。○甘草四。○牛蒡子一。○。○防風六。○麥門冬一二。○。○
右七味剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 咽喉腫痛。猩紅疹稠密。發熱口乾。咽喉及扁桃體發

陷窩性炎。痛甚不能吞物者。

〔方解〕 山豆根為解毒藥。有消炎殺菌殺蟲作用。對於咽喉頭發炎腫脹疼痛有特效。

麥門冬為祛痰藥。有粘滑緩和滋潤作用。治胃熱燥渴肺熱欬咽喉痛等有效。

玄參 桔梗 牛蒡子 甘草 防風 均見前

處方九 清胃湯(金鑑)石膏二五。○牡丹皮一二。○黃

芩八。○生地黃一五。○黃連三。○升麻八。○

右六味剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症

猩紅熱疹癍稠密。皮赤如錦。面紅目赤。齒。大熱煩

渴。嘔吐。舌如楊梅。乾燥無津等症。

〔方解〕 黃連為清涼性解熱消炎藥。有健胃作用。用於充血性炎症發熱嘔吐煩渴目赤頭疼等有特效。

石膏 牡丹皮 黃芩 升麻 生地黄 均見前

處方十 吹喉散 甘草(去外皮)一〇。〇元明粉四〇

右二味各研極細粉。再和研勻。磁瓶收貯。每用少許吹喉頭患處。一日數次。倘吞嚥亦不妨。

適應症 猩紅熱毒走咽喉。發炎腫痛。或發陷窩。或生假膜。或生膿腫。粘液性滲出物特別增多。致湯水不易下嚥者。用此藥吹喉。有止痛消腫。祛痰防腐之功。

〔方解〕 甘草為緩和粘滑藥。外用作粘膜包攝防護刺激之用。能

潤滑止痛。

元明粉即朴硝經風化而成。化學上名為「硫酸鈉」。性善溶解於水。為鹽類瀉下藥。對於水腫性炎症。有誘導作用。內服能奏迅速瀉下稀薄便之功。外用吹喉。能治急性咽喉炎。粘膜水腫。或炎腫脹痛。氣急迫促等危篤重症。於緊急之間吹入少許。或頻頻嚥下。有消腫消炎之效。

(二十八) 麻疹(瘡) (舊稱痧子)

〔病原〕 致本病之微生物或謂係一種微雙球菌。然今尚未查確。其接觸傳染則在血口鼻液皮膚等處。直接的接觸傳染為最常見者。病者呼出之氣。內大約無毒。但氣內之粘液滴微痰點。及口之泌液。鼻涕等則有毒。乾者入塵埃內而傳播。又本病於疹未發前僅顯

下他症狀期間。亦能傳染。除直接接觸傳染外。間接的如用品。衣服。小兒之玩具等。均為傳佈之媒介。

〔病理〕 支氣管發卡他炎。全身淋巴組織如膠扁桃。淋巴腺。腸孤立淋巴結及集合淋巴結等俱炎腫。脾腫大者少。此為小兒之急性傳染病。

〔症狀〕 潛伏期約七至十四日。初起顯發熱如傷風狀。頭痛。噁心。嘔吐等。為重病之前驅狀。尋常之加他症狀為噴嚏。鼻涕。目臉發紅。咳嗽等。舌有苔。口及咽之粘膜充血。疹先顯於額。及面。始如蚤咬狀。繼則蜜集成丘疹。略凸於皮。以手捫之可觸知。該疹由面起而順序下延至胸腹腿足。咽門充血。有時全口之粘膜顯疹點。效嗽聲。噁。惡性者色深紅或帶紫色。一般之全身症狀不因疹顯而退。每持續至

五六日而後漸減。疹退漸脫屑而愈。

本病之危險者往往繼發支氣管肺炎。

本病之診斷上有一特徵。即頰內斑點（科潑力克氏斑點）此係白色或青白色點。周圍有紅圈。生於兩頰裏面與上下白齒頸相對之處。亦即頷閉時與該上下齒連貼相對之處。此係一種早顯而恆有之狀（病之七分之六有之）故甚重要。

〔治法〕 處方一 荊芥湯 荊芥六。○防風六。○生甘草三。

○牛蒡子六。○連翹六。○前胡六。○桔梗四。○枳殼五。

○銀花六。○

右九味剉作三百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 麻疹初起頭痛發熱咳嗽。顏額見點而未暢發者。

〔方解〕 荆芥為發汗解熱藥。用於發散毛細血管鬱熱。治頭痛。筋骨煩疼。清頭目。利咽喉。透達麻疹之用。

防風為解熱驅風藥。能發散內外諸風。疎通經絡。治心胸煩悶。頭痛。目赤。肺氣壅實。上部充血性諸症。有透發麻疹之功。

生甘草用作緩和藥。治咳嗽咽喉痛等症。並有解毒之功。

牛蒡子為解毒藥。有發散解熱作用。能治瘡毒。消斑疹。去筋骨間煩熱。利咽喉。發洩麻疹毒素。

連翹為變質解毒藥。有清血解熱作用。用於斑疹疥癬等。為皮膚病要藥。

前胡為祛痰藥。能發散感冒清泄肺熱。用治咳嗽氣逆。骨節煩熱等症。

桔梗為祛痰藥。能利咽喉。用治咳嗽。咽痛。鼻塞。胸悶。諸症。

枳殼為健胃藥。有祛痰利尿作用。用於胸悶。咳逆。皮膚風溼等症。

銀花為清涼性解毒藥。有清血散熱作用。用於血液中之毒素發熱。斑疹瘡毒等有特效。

處方二 敗毒湯 荆芥六〇。生地一〇。黃連三。〇

銀花八。〇連翹六。〇防風五。〇黃芩四。〇桔梗五。〇甘

草三。〇梔子八。〇牛蒡子六。〇黃柏四。〇玄參七。〇淡

竹葉六。〇

右十四味。剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 麻疹熱甚。面紅。目赤。咽痛。疹點稠密。色帶紫暗。鼻衄。

煩躁。口渴。脈洪大。快速。舌尖紅等。

〔方解〕 生地為清涼滋養藥。有清血活血生津解熱作用。用於熱病動血傷津。血中缺羸。或瘀滯煩悶。吐血衄血等症有特效。

黃連為健胃消炎藥。用於上部充血性諸炎症如嘔吐煩悶發熱目赤口瘡等症。

黃芩為清涼解熱藥。有消炎利尿作用。能解熱毒除煩渴。清肺涼血。亦治上部充血。如頭痛目赤。失血嘔逆諸症。

梔子為清涼解熱藥。有清血消炎作用。用於充血性發熱頭痛。嘔吐胸悶。目赤。斑疹吐衄諸症有特效。

黃柏為健胃解熱藥。有收斂及消炎作用。用於煩熱口瘡。目赤腫痛。鼻衄咽痛等症。有清涼退熱之功。

玄參為清涼消炎藥。有清血解毒作用。能利咽喉。通二便。治心驚煩。

熱斑疹瘡癬等。

淡竹葉為清涼性利尿藥。用治心驚煩熱口渴。睡眠不安等症。

荊芥 銀花 連翹 防風 桔梗 甘草 牛蒡子 均見前。

處方三 麻黃梔子湯 麻黃三。○梔子八。○黃芩五。

○石膏一六。○連翹六。○蟬蛻二。○黃連三。○紅花四。

○牛蒡子六。○甘草四。○

右十味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 惡性麻疹。毒重表閉無汗。疹點不能透達。胸悶煩躁。

欲死等症。

〔方解〕 麻黃為發汗解熱利尿藥。用於熱病表閉無汗。胸悶喘逆。

等症。有排泄壅鬱之毒素由汗液而出之作用。

石膏為清涼解熱藥。賞用於性急傳染病。頭痛發熱。口渴煩躁等有特效。

蟬蛻為發汗解熱藥。有驅風解毒作用。賞用於小兒驚癇。痘疹不出。音嘎。煩熱。及皮膚作癢。瘡毒風疹等有特效。

紅花為清血解毒鎮痙鎮痛藥。有活血散腫作用。用於血中毒症有特效。

梔子 黃芩 連翹 黃連 牛蒡子 甘草 均見前

處方四 芫荽酒 芫荽子四〇。〇陳紹酒二百西西

右共煎濃。至一百五十西西。去渣。令患者閉目。乘溫噴顏面。胸項四肢。蓋被疹自快出。

適應症 麻疹發熱。胸悶。疹點不透。皮乾無汗。毒悶。心胸煩躁。

欲死者。

〔方解〕 芫荽即胡荽。內含芳香性揮發油。有健胃解毒作用。善透痘疹鬱遏之毒。並解食肉中毒。本品之根葉及子均作藥用。實用於痘瘡不出煎汁外擦。有引毒外出之功。

酒為興奮性行血藥。少用有通暢血脈溫壯神經作用。過量則反有麻醉之弊。

處方五 甘桔牛蒡湯 甘草三。○桔梗六。○牛蒡子八。

○連翹六。○玄參一。○黑山梔一。○山豆根六。○

黃芩五。○射干四。○黃連二。○

右十味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 麻疹熱高煩渴。咽喉炎腫。咳嗽喉痛。湯飲難以下嚥。

呼吸困難等。

〔方解〕 山豆根為清涼解毒藥。賞用於咽喉頭發炎腫脹疼痛。有退熱殺菌退腫消炎之功。

射干為解毒藥。有瀉下作用。治喉痺咽痛咳嗽氣逆肺熱胸悶。二便不通等。

甘草 桔梗 牛蒡子 玄參 山梔 連翹 黃芩 黃連 均

見前

處方六 大青湯 大青六。○玄參一○。○桔梗五。○

知母六。○石膏三○。○梔子一○。○木通四。○人中黃五

○

右八味。剉作三百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 惡性麻疹。疹出。渾身如錦紋。色赤帶紫黑。熱高。氣急。咽喉疼痛。目赤。鼻衄。便秘。溲赤等。

〔方解〕 大青為清涼解熱藥。有解毒清胃作用。實用於時疫溫毒。頭痛咽痛。大熱煩渴。喉痺口瘡等。

知母為清涼解熱藥。有滋潤緩下作用。實用於熱高煩渴。咳嗽喉痛等症。

木通為利尿解熱藥。有消炎退腫作用。用於熱病煩渴。喉痺咽痛。上部充血性炎腫。而小便不利等症。有特效。

人中黃為解熱解毒藥。實用於時氣熱毒。痘疹瘡癰。血熱煩悶。咳嗽喉痛等症。有特效。

玄參 桔梗 石膏 梔子 均見前

處方七 加味麻杏石甘湯 麻黃三。杏仁一二。石膏三。甘草四。瓜蒌仁一二。牛蒡子一。前胡八。貝母七。淡竹葉六。右九味。剉作三百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 麻疹發出後。高熱不退。繼發肺炎。喘息咳嗽。鼻翼扇張。煩渴。咽痛。痰粘不鬆等。

〔方解〕 杏仁為祛痰鎮咳藥。有平喘解熱作用。用於肺熱咳嗽。氣息喘逆等症。

瓜蒌仁為祛痰藥。有利咽喉。消腫毒。治咳嗽。利大腸之功。

前胡為祛痰鎮咳藥。賞用於喘息咳嗽。痰升氣逆。發熱煩渴等症。兼有疎散之功。

貝母為祛痰鎮咳藥。主治喉痺咳嗽。肺中鬱火。肺痿肺癰等症。有特效。

麻黃 石膏 甘草 牛蒡子 淡竹葉 均見前

處方八 預防麻疹紫草湯 紫草根一六。○

右一味。剉。作二百西西煎劑。去渣。一日分三次服。以上各方均係成人用量。小兒依年齡遞減。

適應症 麻疹流行時。作內服預防傳染藥。連服四五劑。可免疫。即使傳染。亦無生命之危。

[方解] 紫草根含有 Lithospermunroh ($C^{20}H^{30}O^{15}$) 及 Shikonin

($C_6H_{10}O_5$) 之成分。為清血解毒變質藥。兼有利尿緩下作用。賞用於癰疹痘毒惡瘡頑癬。面鼻。小兒瘡毒等症。有涼血活血。及改良血

液增進免疫力之功。又本品可以染色。含有紫紅色素。疑有殺菌免疫作用。容待研究。

(二十九) 流行性腮腺炎 (流行性耳下腺炎) (中醫舊

稱「發頤」 鱸魚瘟) (疝腮等)

〔病原〕 本病之病原微生物。迄今尚未確知。為一種特殊傳染病。當春秋兩季病勢流行廣佈。患者甚多。小童及青年男子尤多。女子較少。係由接觸傳染。

〔病理〕 本病之特殊病理。為各涎腺腫。男子每易致睪丸炎。耳下腺發炎不釀膿。為此病之特性。

〔症狀〕 潛伏期約二至三星期之久。此期無甚症狀。病初起為惡寒發熱。在百零二三度左右。患者覺頸一側耳下部作痛。漸顯腫脹。

不出四十八小時頸及頰之一側遂龐然腫大。彼一側之腮腺於一日後亦繼續受患。有時病者僅一側受患。更有一側受患後隔五六日他側方受患者。患者每不能自由張口。致飲食困難。有時兼患耳痛。甚者或顯中耳炎。輕者約六七日即愈。間或病勢甚重。熱高。謾妄。十分虛弱。甚或進至腸熱病樣情況。

〔治法〕

處方一 消風敗毒散 羌活四。獨活四。防風

四。荆芥五。川芎三。生甘草三。陳皮四。茯苓

七。厚朴三。人參四。殭蠶炒六。桔梗五。柴胡

五。前胡五。枳殼四。薄荷四。蟬蛻二。藿香五

右十八味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 流行性耳下腺炎腫。頭疼發熱。惡寒。骨節痠楚。頸項腫大。張口不利。飲食困難。舌苔厚膩。脈浮數無汗等症。

〔方解〕 羌活為驅風鎮痛藥。實用頭痛風痛。骨節痠痛諸症。有發汗之功。

獨活功效與羌活同

防風為疎風發汗解熱藥。對於感冒性頭疼惡風骨節痠痛等有效。荊芥為發汗解熱藥。有鎮痙鎮痛作用。能散腫驅風。清血解毒。對於頭疼體痛發熱惡寒等症有效。

川芎為鎮痛藥。善治頭痛風痛。能平降血壓。通順血運。有活血疎風作用。

生甘草為緩和藥。有解毒作用。和諸藥潤粘膜。故有鎮咳鎮痛之功。

陳皮為健胃藥。有祛痰鎮咳作用。

茯苓為利尿藥。有鎮靜作用。

厚朴為健胃藥。用於神經性胃腸諸病如痞悶噯逆嘔吐腹痛等。又有平喘利氣作用。

人參為健胃強壯藥。賞用於衰弱疲憊。脈細弱等症有特效。

殭蠶為驅風藥。賞用於喉痺咽腫。丹毒諸瘡。小兒驚癇等症有特效。桔梗為排膿祛痰藥。善利咽喉。治咳嗽喉痛等。

柴胡為清涼解熱藥。賞用於淋巴腺炎諸症有消炎作用。能疎導胸淋。對於胸膈苦悶。寒熱往來等症有特效。

前胡為祛痰藥。用治風熱痰嗽喘息咳逆等症。

枳殼為健胃消化藥。有散腫消痰作用。

薄荷為清涼發汗解熱藥。有健胃作用。用於頭疼發熱咽痛失音瘡
疥隱疹舌苔齟腫諸症。

蟬蛻為解熱藥。賞用於小兒一切急性熱病之痙攣。又治喉痛聲啞
瘡毒癰腫等。

藿香為芳香性健胃發汗藥。有鎮痛作用。治上焦壅熱嘔吐胸悶頭
疼發熱諸症有效。

處方二 牛蒡芩連湯 牛蒡子五。○黃芩五。○黃連二

。○桔梗五。○石膏二。○大黃五。○荊芥五。○防風四

。○羌活四。○連翹五。○玄參六。○甘草三。○

右十二味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 流行性腮腺炎。熱高煩渴。嘔吐。咽頭及頰腫。頭疼惡

寒脈浮數。大便秘結等症。

〔方解〕 牛蒡子為解毒藥。有清涼發汗作用。賞用於咽痛腮腫。丹毒斑疹。面腫齒痛。頭面風毒諸症。有特效。

黃芩為清涼解熱藥。有消炎解毒作用。治天行時熱。上部充血。耳腫頭疼等症。

黃連為苦味健胃藥。有消炎退腫作用。專治上部充血諸症。如煩躁噁心。目赤齧腫等。

石膏為清涼藥。有解熱作用。賞用於傷寒時氣。頭疼身熱。大熱煩渴等症。有特效。

大黃為健胃及緩下藥。用於時氣實熱。煩渴便秘等症。

連翹為清涼藥。有變質清血解毒作用。善消上部充血性炎腫。兼有

利尿之功。

玄參為清涼消炎藥。實用於咽痛喉痺煩熱癰腫。瘰癧骨蒸潮熱等症。

桔梗 荊芥 防風 羌活 甘草 均見前

處方三 柴葛解肌湯 柴胡六。○葛根八。○甘草三。

○芍藥四。○白芷四。○黃芩五。○羌活四。○桔梗四。○
右八味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 流行性腮腺炎。耳下腫脹。疼痛發熱。惡寒頭疼項強。
胸悶咽燥口渴。遍體痠痛等。

〔方解〕 葛根為清涼性解熱藥。有發表利腮腺作用。實用於頭疼
項強。時氣溫毒。胸悶煩熱等症。本品又有排膿解毒作用。對於瘡毒。

及蛇蟲嚙毒。獺犬傷毒等。並可搗敷。

芍藥為鎮瘧鎮痛藥。有行血通經作用。能治頭疼。目赤。鼻衄等。並清血熱。

白芷為鎮瘧鎮痛藥。賞用於頭風面腫。寒熱口臭。皮癢諸症。

柴胡 甘草 黃芩 羌活 桔梗 均見前

處方四 內府方 殭蠶四〇。〇姜黃一〇。〇蟬蛻五。

〇大黃一五〇。〇生甘草二〇。〇

右五味。研極細末。麵粉糊為丸。每丸重四格。闌姆。每服一丸。開水化服。一日服二至三丸。此係成人量。小兒遞減。

適應症 腮腺炎。或顏面丹毒發熱惡寒。頭痛體痛。咽喉痛。胸

悶煩渴。初起勢盛者。

〔方解〕 姜黃為行血通經藥。有消腫鎮痛作用。賞用於風痺風熱。癰腫諸痛。及臂痛心痛等。

殭蠶 蟬蛻 大黃 生甘草 均見前

(三十) 瘧咬病(瘋犬咬)又名恐水病(中醫稱癩狗咬)

〔病原〕 此係溫血動物之一種急性傳染病。最易患者為犬。次為狼、狐、貓、馬、牛等。病之傳染大抵由於狗。病毒之性質尚未確實查明。毒寓居之處以神經系統為主。有時或在各種分泌液內而以口涎為特別含毒之分泌液。蓋病毒由神經而入犬之涎腺。非由血管而至該處。病毒入人體後發顯症狀有遲速之不同。依年齡或傷口輕重傷區部位為異。傷在頭面者更危險。小兒亦然。

〔病理〕 重要之損害係中樞神經系統之血管及腦細胞之周圍

屯積白血球。而運動神經筋細胞尤然。肝脾腎等不顯病毒。脊髓腦及周圍神經等則受毒甚重。

〔症狀〕 潛伏期之久暫極無定。平均約六星期至二三月不等。前驅期則傷處顯刺戟。疼痛麻木。頭痛厭食。急躁不眠。恐懼。感覺過敏。燈光稍亮及聲音稍大即厭忌畏惡。或無論何種刺戟如聲光風等均能激發凶烈之反應。痙攣。口及喉肌痙攣更甚。病者一欲思飲。喉舌諸肌即發劇烈之痛。痙攣。因此病者怕見水。故有怨水病之名。此等痙攣之發顯或與狂狀相伴。在間歇期內精神亦不昏亂。此時體溫大概上升。然亦有不發熱者。病人對於看護者無加害之意。當痙攣發作劇烈。尤自懼而或偶然損害他人。間有狂狀凶惡者。喉咽肌收縮時發出怪聲。此期約經二三日而逐漸入於麻痺狀態。麻痺期病

者安靜。癱攣止歇。人事不省。心之動作漸弱。不過六至十八小時。心臟麻痺。動作停止而死。

〔治法〕 本病治法愈早愈妙。至症狀發顯期大概無辦法。在潛伏期間國藥治療處方頗有成效。茲選最有效者數則於後。

處方一 加減抵當湯 大黃一二。○桃仁一二。○麤蟲

七個（去足炒）白蜂蜜一二。○

右三味。研細。拌入蜂蜜。用陳紹酒合水共四百西西煎至二百五十西西。一日分三次。空腹服。小兒減量。孕婦忌。

〔實驗〕 服藥一劑後。別設糞桶以驗大小便。大便必有惡物如魚腸猪肝瘀血等。小便如蘇木汁。通下數次後藥力盡。二便如常。須再服一劑。再驗。大便仍有惡物。俟藥力盡。大小便如常。再服再驗。

服藥不拘劑數。直服至藥後大便毫無惡物。祇略使溘色正常為止。假令惡物未盡而中止服藥。則留餘毒。定貽後患。不可不慎。

〔方解〕

大黃為健胃緩下藥。能瀉瘀血。破癥瘕。化積聚。攻留毒。蕩滌胃腸。推陳致新。用以攻逐惡毒。安和胃腸。

桃仁為消炎性去瘀解凝藥。有清血殺菌及緩下作用。能改良血液。增進抗毒力。治癥瘕瘀血。蓄血血閉等症。

廬蟲為通經藥。有行血化瘀鎮痛作用。能消腫解毒。改血通脈。續筋。賞用於跌打損傷。瘀血血閉等症。有特效。

蜂蜜為緩下藥。有滋養作用。善能滋潤喉頭。緩和急迫拘攣。止咳止痛。和中解毒。

酒為興奮性行血藥。能通暢血脈。溫壯神經。用以助藥物發揮之功。

力。

處方二 敗毒紫竹湯 真潞黨參一二。○羌活六。○獨

活六。○柴胡五。○甘草五。○前胡六。○茯苓一二。○枳

壳六。○桔梗五。○生姜六。○生地榆四。○紫竹根四。

○川芎五。

右十三味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。須連服三五劑。被瘋犬咬後即服為佳。

〔實驗〕 服藥三五劑後。可試嚼生黃豆。如不覺生豆氣者。須再服

一二劑。過一星期後再試嚼生豆。必得覺生豆腥氣而噁心欲吐者。

方為毒盡。可不必服藥矣。

〔方解〕 黨參用作滋養強壯藥。

羌獨活二物均為鎮痛鎮痙藥。用治神經毒。

柴胡為清涼藥。主清導淋巴腺之鬱滯。而改血抗毒。

甘草為最有效之緩和性解毒藥。

前胡為清涼藥。主呼吸器之氣管疾患等。

茯苓為利尿藥。有鎮靜作用。為神經性之營養強壯劑。

枳殼用作健胃芳香藥。

桔梗用為呼吸器之排痰藥。

地榆為收斂性清血解毒藥。有改血變質作用。

川芎為神經藥。有活血行血鎮痛作用。

生姜為健胃發汗藥。

紫竹根為狂犬病毒特效藥。

〔附註〕本方為人參敗毒散原方。加地榆紫竹根二味。用於瘰癧咬病之早期。藥理雖未能明析。經驗上確實有效。而敗毒散原方。可活用於多數急性傳染病之初起者。方內雖無顯著之殺菌滅毒藥。而功效頗著。其抑各種藥物混合後。另具一種作用乎。還望學者注意而精密研究之。

（三一）黑熱病 又名痞塊病 中醫舊稱瘧勞

〔病原〕 本病之病原體。為一種動物性原蟲。係一九〇三年由利什曼氏及朶那凡氏所發見。在病者痞塊周圍血管之血液內。有此病原寄生物體存在。可以用人工培養基培養。頗易。大概由經口的傳染。中間宿主未明。或謂係白蛉子。

〔病理〕 脾腫大。肝亦增大。淋巴管及胆管顯發炎。血液中毒素。

刺激而顯瘀黑。粘膜充血。炎腫易出血。腸粘膜分泌增進。肺及枝氣管往往發炎。

〔症狀〕 潛伏期尚未查明。初起疲倦困頓。食思缺乏。微發熱。腹膨脹。逐漸增大。痞滿發熱不規則。漸顯貧血。萎黃。及劇烈之消瘦。四肢枯瘦如柴。而腹脹大如蜘蛛狀。皮膚黝黑。或蒼黃。顏面憂鬱。極易出血。如鼻衄。齒齦出血。甚則口頰壞死。或發下利。氣管及支管氣炎。膿毒血病致衰脫而死。

〔治法〕 處方一 集聖丸 蝦蟆灸焦一二。○ 蘆薈八。○ 五

靈脂八。○ 夜明砂八。○ 砂仁八。○ 陳皮八。○ 青皮八。○ 木香八。○ 黃連八。○ 使君子肉一。○ 川芎一二。○ 歸身

九。○

右十二味。共為細末。用豬胆汁和粟米粉為丸。如菜豆大。每服八。
○ 日服三次。米飲吞下。

適應證 黑熱病痞塊脹滿。發潮熱。皮膚顯黃疸狀。飽悶不欲食。體瘦衰弱。疲憊。肚痛。或便溏等。

〔方解〕 蝦蟆即蟾蜍。本品之表皮內有腺脂為白色乳脂樣。內含一種成分。名加瑪茵。有卓著之強心作用。並有刺激消化器。促進消化之功。用於循環系及消化系障礙所致之病。有特效。

蘆薈為健胃藥。有激胆汁之分泌。促進瀉下之作用。用於胆道炎。黃疸。便秘。潮熱。腹脹等症。有特效。又有殺蟲之功。

五靈脂乃寒號蟲之糞。為收斂性鎮痛藥。有殺菌解毒。改血作用。賞用於腹痛。瘀血。血拴塞。腫毒等證。

夜明砂為蝙蝠之糞。有清血消炎解熱作用。賞用於目赤翳障。血積腹脹痛。小兒疳積。潮熱瘧疾等證。

砂仁用為健胃消化藥。以治腹脹痞滿等。

陳皮用作健胃藥。

青皮有解熱及健胃作用。

木香有殺蟲防腐作用。且為健胃藥。賞用於腹脹痞滿下利等證。

黃連有健胃消炎及殺菌作用。用於心下痞腹脹消化不良。潮熱粘膜充血發炎等證有特效。

使君子肉為殺蟲藥。有健胃作用。賞用於腹痛痞脹等一切寄生蟲性消化器疾患有特效。

川芎為鎮痛通經藥。能使血液循環暢利。化瘀血。生新血。與當歸互

用有補血之功。

當歸為通經鎮痛藥。有益血氣之功。賞用於衰弱諸證。

豬胆汁賞用於胆石黃疸及消化道熱結便秘腹脹等疾患。有防腐殺菌消炎作用。

處方二 八神湯 柴胡八。○芍藥一○。○人參七。○

茯苓一二。○甘草六。○鱉甲二四。○大黃八。○乾姜六。○

○

右八味剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 黑熱病腹脹大。發熱忽高忽低。心胸苦悶。嘔逆。食慾

缺乏。疲怠衰弱等。

〔方解〕 柴胡為清涼藥。賞用於淋巴管炎有消炎作用。又有減退

弛張熱之功。

芍藥為鎮靜藥。有制止腹痛及下利之功。因其有收斂作用。以治血管神經拘攣。

人參為強壯藥。有健胃強心作用。賞用於胃之消化機能衰弱。心下痞鞭。食慾減退。以及病後體衰弱。四肢厥冷。脈搏細弱。虛脫等現象者。

茯苓為鎮靜藥。有利尿作用。用於心悸充進。虛熱浮腫。小便不利等證。

甘草為緩和性滋養藥。用以緩和藥物刺激。及中和病原毒素之功。鱉甲為滋養藥。有改血變質作用。賞用以出血性諸病及虛勞羸瘦。寒熱來往。瘧母（脾腫大）等證有特效。

大黃為苦味藥。少量有健胃作用。中分劑有緩下之功。對於血中鬱熱。血鬱栓塞。腹腔腫瘤。或鼻衄。牙齦出血。黃疸等證。有蕩滌清血之效。

乾姜為健胃藥。有芳香性刺激興奮腸胃神經作用。用於腸胃機能沉衰而致嘔吐下利腹痛冷感等證有效。與大黃同用。有互相監制整調胃腸。恢復消化之機能。

處方三 胡黃連丸 胡黃連三十份 白蕪荑三十份 蘆薈十

份 麝香二份 巴豆熬去油二份

右五味。共研細末。麩糊為丸。如赤豆大。每服一錢。一日兩次。米飲下。

適應症 黑熱病痞塊初起發熱。目赤。腹脹大。大便秘結。皮膚顯褐黃色。胸悶不能食等症。

〔方解〕 胡黃連為健胃殺蟲藥。有解熱清血作用。實用於小兒疳勞潮熱。骨蒸。煩驚下痢。目赤等症。

蕪荑仁為殺虫藥。有清血解毒作用。用於小兒疳利。五痔惡瘡。疥癬。心腹癢痛。冷積喘息等症。

麝香為強心興奮藥。有殺菌解毒作用。用於心腹中惡癢瘰癧脹。腹痛。心臟衰弱。顏面蒼白。手足厥冷等。有回蘇之功。

巴豆為峻瀉藥。有殺虫破積攻癥之功。專消痰瘕。對於積聚癥瘕痞塊。惡腫等有特效。第身體強壯者可用。然用量須注意。不可用其大分劑。過劑則損人。

處方四

解勞湯

柴胡八。

芍藥一。

枳實六。

甘草五。

甘草五。

蠶甲二。

茯苓一。

茯苓一。

茯苓一。

茯苓一。

茯苓一。

右六味。剉作三百西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 痞塊病。初起潮熱弛張。腹脹痞塊觸手。即得身體羸瘦。鼻衄或牙齦出血等症。

〔方解〕 枳實為健胃消化藥。有消痰利尿作用。賞用於腹脹痞滿。心腹氣結。胸脅痰癥。嘔吐水腫等證。有特效。

柴胡 芍藥 甘草 鱉甲 茯苓 均見前

處方五 淨府散 豬苓三〇。〇茯苓三〇。〇澤瀉二五。
〇白朮三〇。〇山查子三〇。〇三稜二〇。〇莪朮二〇。
〇半夏二〇。〇人參三〇。〇柴胡二〇。〇黃芩二〇。〇黃
連一〇。〇甘草一〇。〇

右十三味。剉細末。每服一〇。〇米飲沖。日二三服。

適應症 黑熱病初起腹脹痞塊腫大四肢瘦削膚黃身熱小便不利目赤不欲食寒熱往來等。

〔方解〕 豬苓為利尿解熱藥。賞用於發熱黃疸小便不利口渴頭疼目赤等證。

澤瀉為利尿藥。且有營養作用。用於身熱頭眩口渴小便不利水腫黃疸四肢瘦而衰弱疲憊等。

白朮為健胃利尿藥。有促進腸吸收及制瀉作用。用於腹脹不欲食。食則洩瀉小便短少等證。

山查子為健胃消化藥。有鎮痛解熱作用。用於腹脹痛痞塊腫脹（脾臟增大）下利消化不良等。

三稜為健胃通經藥。有消積破血攻癥作用。用於癥瘕腹脹血塊瘀

癖婦人月經閉止。惡血脹痛等證。

莪朮為健胃消化藥。有通經及鎮痙作用。賞用於月經閉止及慢性胃加答兒心腹脹滿等證。

半夏為健胃鎮嘔藥。有消痰鎮咳作用。用於痞滿嘔吐痰液積滯等證。

黃芩為清涼解熱藥。有健胃整腸消炎作用。賞用於寒熱往來口苦目赤嘔吐咳嗽下利等證。有特效。

茯苓 人參 柴胡 黃連 甘草 均見前

處方六 消疳飲 人參一〇。〇黃連六。〇神糶一四。

〇青皮八。〇茯苓一二。〇白朮一二。〇砂仁四。〇胡黃連

八。〇甘草五。〇

右九味。剉作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 黑熱病腹脹。大肢瘦削。身體衰弱。潮熱。脈搏細弱。痞滿。口渴。舌苔微黃。

〔方解〕 神麩為健胃消化藥。有解熱作用。本品含有酵母菌及酵素蛋白。故有解熱及營養作用。賞用於腹脹。消化不良。瀉下身熱等症。有特效。

人參 黃連 青皮 茯苓 白朮 砂仁 胡黃連 甘草 均見前

處方七 尸瘧癩肝散(千金方)水獺肝(三四具)

一味陰乾。乾燥研細末。每服三。○米飲沖下。日三服。

適應症 急性傳染性痞塊病。一經傳染。即發熱腹脹。痞塊滿。

悶不食。身體瘦削。姜黃等。

〔方解〕 獼肝為鼬鼠科水獺之肝臟。有卓著之殺虫排毒改血變質作用。其藥理作用。雖與近世臟器療法之肝臟製劑極相似。而有補血利胆通便等功效。然因其棲息及食物之特異。而肝臟之成分別有特種要素。故中國遠古以來。經驗上知其確有殺滅微生物而為傳染性疳（消化器病、癆（結核性病）之特效藥也。

處方八 五疰湯（千金） 大黃七。○甘草四。○當歸一

○。○芍藥八。○烏頭三。○桂心三。○生姜五。○蜂蜜一

二。○

右七味。剉作二百西。煎劑。去渣。加入蜜。微熱溶化。一日分三次服。

適應證 黑熱病初起。被傳染後。身體尚強壯。而腹脹痛。心胸

脹悶。寒熱發作無定。胸腹大脹急滿者。

〔方解〕 烏頭為衝動藥。有鎮痛作用。本品有麻辣之味。性毒不可

濫用。少用而配互相當。則有攻毒殺蟲。搜風勝濕之功。賞用於癩癧。癌腫。風痺溼毒。冷滯腹痛等證。有攻逐解凝。搜毒之效。

桂心為芳香性健胃強壯藥。有興奮消化機能及血液循環作用。賞用於心腹痛。腰膝痠軟。肢冷麻痺衰弱等證。

生姜為健胃藥。用於腹痛痞脹。消化不良等證。

蜂蜜為緩和藥。有緩下作用。本品與甘草同有監制烏頭峻烈之性。味以發揮其功效。

大黃 甘草 當歸 芍藥 均見前

橘泉按。古時論飛尸鬼症。確係近世之微生物性類傳染病。雖經余

雲岫先生證明。結核病即古之傳屍勞。而黑熱病似亦包括在內。千金方論云。凡諸心腹痛。服衆方熱藥入腹。寂然不動。但益氣息急者。此尸疰病也。宜服甘草汁一升。消息小時。服瞿麥湯盡一劑。得下。便覺稍寬。並暴癥堅結宿食。及女人血堅痛發作無定者。神良。又論五疰湯方云。治卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛大脹急。云云。何竟與痞塊病近似。且令服甘草湯者。甘草解百毒。其能中和細菌毒素也。瞿麥利尿作用頗著。有排除血液中毒素之功也。

6