


# 袖珍方

漢書門			
類	號	函	架
三	二	三	入
冊	冊	冊	冊

自卷五  
至卷六  
三

內閣文庫			
類	號	冊	架
三	二	三	入
冊	冊	冊	冊



王醫官集醫選袖珍方書卷之五

王醫官集醫選袖珍方書卷之五

分水

醫學訓科

王永輔

纂輯

醫士


吳嘉言

校錄

外科

瘡瘍

內經云膏粱之變足生大丁又云營氣不從逆於肉理乃生瘡腫又云諸痛痒瘡瘍皆屬心火又云熱勝血則為癰膿又云地之濕氣感則害人皮肉筋脉。精要云熱發於皮膚之間浮腫根小至大不過三二寸者為癰六腑積熱騰出于外肌內之間其發暴盛腫皮光軟侵喪廣大為癰五臟風毒積熱攻掀肉骨風毒猛暴初發如落蕾形自焦枯觸之應者乃疽也夫五善七惡五善見三則差七惡見四則危皮緊急雖惡而善皮緩虛善而惡也。丹溪云



外科

瘡瘍

醫士

吳嘉言

校錄

瘡疽因陰陽相滯而生又云因積毒在臟腑當先助胃推氣使根本堅固而以行經活血藥為佐參以經絡時令使毒氣外發施治之早可以內消此內托之意也

脈候 浮數之脈應發熱其不發熱而反惡寒者瘡疽之謂也

乳脈見於膿潰之後易治以脈病相應也 滑脈未潰宜內消既

潰宜托裏所謂始為熱而終為虛也 脈實宜急下之以邪氣與

與臟腑俱實故也 弦脈與洪脈相搏外緊內熱欲發瘡疽也

脈決大瘡疽之病進也未結膿者宜下之潰後洪見難治若自利

不可治 緊脈氣血沈瀯主切痛積癖也 脈微潰後見主自差

也 脈沉邪氣深也 暖脈瀯遲若潰後見之皆易愈是有胃氣

也 脈伏邪氣益深 脈濡弱皆宜補虛排膿托裏○脈長吉

脈短 虛宜托裏和氣養血 促急下之○盛也 結陰盛也

○代則死 牢則不可內消 動危 細者裏虛而欲變

○河澗云須明托裏疎通榮衛之三法

外之內者其脈浮數掀腫在外恐毒氣極而內攻宜先托裏

內之外者脈沉實發熱煩燥外無掀腫痛深於內其毒深矣故

疎通臟腑以絕其源

內外之中者外無惡掀之甚內則臟腑宜通知其在經當和榮

衛也 三法能用雖未即瘥必無變症毒氣減而易愈

丹溪治法云外科精要惟務紀錄舊方應酬輕小症候耳

瘡疽始發即以艾灸之可使輕淺此從治之意惟頭為諸陽所

聚艾炷宜小而少若身上必痛灸至不痛止 灸至痛有因灸

而死蓋虛甚孤陰將絕脈必浮數而大精神必短而昏無以抵

當火氣宜其危矣 騎竹馬灸法妙

○予按東垣灸法尤効初發赤熱腫痛以濕紙貼上立候之其紙先乾處即毒頭也取大蒜切片分厚安上大艾炷灸三壯一換灸至死務宜早灸三日內即痊四五日內半愈七日後不可灸若有十數頭如蜂窠大蒜研為餅鋪上文團燒之亦愈若背上初發赤腫一片中間有一片黃粟米頭子便用獨蒜切去兩頭約五分厚安上灸至四十九壯。護義云不惟初發宜灸至成一漏者膿水不絕內無反肉尤宜用獅子浸透切片三二分厚安上灸之服內托之藥滿三日再灸不五七次自然肌肉長滿矣凡灸須服應病之劑調理或宜內托散菉豆粉乳香為末冷水調下所以引火氣之入于心也。諸經惟少陽厥陰之生癰疽宜預防之以多氣少血也苟不知此處用驅逐利藥以陰分之血禍不旋踵

腫瘍內外皆腫宜托裏表散為主欲用大黃宜戒猛浪之劑潰瘍內外皆虛宜以補接為主欲用香散者宜戒虛上之矣精要排膿內補十宣散但可用之於小瘡癰與冬月若潰瘍與夏月不宜用河澗治腫掀于外脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵于肉急須內托宜復煎散除濕散鬱使胃氣和平如大便秘及煩熱少服黃連湯微利煩熱已退却再與復煎散蟻針之法可施於輕小症候若積毒在臟腑者徒竭其血無益腫瘍手按熱則有膿不熱則無癰疽已破未破皂角刺能鑽引至潰處膿出而反痛此虛也宜補之亦有穢氣觸者和解之風冷所逼者溫養之

疽發深而不疼者胃氣太虛則死肉多而不知疼也

腫瘍時嘔當作毒氣上攻治之潰後作陰虛補之 若年老潰

後發嘔不食又宜參芪白朮膏峻補隨症加佐藥河澗謂瘡

瘍嘔者濕氣侵於胃也宜倍白朮

瘡疽發渴氣血兩虛用參芪以補氣當歸地黃養血或忍冬丸

或黃芪六一湯

加味十全大補湯潰後補血氣進飲食實為切要

附骨疽皆因久得厚味及酒後涉水得寒故熱深入髀樞穴左

右積痰瘀血搏而成也

腎瘡此陰中之陰道遠位僻雖曰多血然氣運不到血亦罕來

中年後尤慮患此總有腫痛赤之跡症但見虛弱便與滋補

血氣可保終吉

內疽遠白肉飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰

七情者臟腑受之宜其發在腔子而向內非干腸胃有膜也

一云宜以四物湯為主

肺瘡千金方曰病咳嗽膿血其脉數實或口中咳胸俛隱痛脉

反滑數為肺瘡其脉緊數為膿未成緊去但數膿已成先以

小青龍湯貼以解表之風寒和氣後以葶藶大棗瀉肺湯枯

梗湯葶藶湯隨症用之以取膿終以常宙獨行方名黃昏湯

以補裏之陰氣 已破入風者不治或用太乙膏丸服以搜

風湯吐之 吐膿血如肺瘡狀口臭他方不應者宜消風散

入男子髮灰米飲下兩服可除

腸癰千金云安治必殺人其病小腹重強按則痛小便似淋時

時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫脉數微有膿也遲緊

未有膿甚者腹脹大轉側有水声或透脐生瘡或膿自脐出  
或大便膿出 丹溪作積熱濕治入風難治

胃脘瘰胃脉沉細人迎反盛則熱聚於胃口為瘰以疎利為先  
次以消毒托裏退胃熱

乳核失治必成瘰疽至瘡破潰陷名曰乳岩以凹似岩穴也雖  
飲食如舊洞見五內乃死初瘡只以青皮甘草煎湯服

瘰疽入囊者丹溪以濕熱入肝經施治而用補陰佐之雖膿潰  
皮脫畢丸懸掛皆不死 如畢丸懸掛水出以煇炭末付之

外以紫蘇葉包裹仰臥養之  
便毒足厥陰濕氣因勞倦而發丹溪方

予只用一味妙濟飲取効如已成膿者用丹溪方  
瘰癧河間機要云結核是也或在耳前耳後耳下連及頤頰或

在頸下連缺盆皆謂瘰癧或在胸及胸之側或在兩脇皆謂  
之馬刀手足少陽主之多氣少血其症大小無定發作寒熱

久則遺漏古方雖有狼鼠等丸漏之名其治一也  
丹溪云必起於少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食味之

厚鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此二端招引變換須分虛實  
實者易治虛者可慮以屬膽經主決斷有相火婦人患此若

月經不調便作寒熱稍久變為潮熱危矣自非斷慾食淡神  
仙不治也用立効散與瓜蒌散相間服効

疥瘡精義云以其瘡形如丁蓋之狀也又書云諸獸病死開剝  
之際不能謹避而其惡氣冲冒之者必生疥瘡及食諸獸自

死肉生疥瘡人汗入肉食之亦作養生之士宜識也又方論  
之凡十種華元化載之五色丁千金方說有十三種然皆不

高於氣客於經絡五臟內蘊熱毒而致也初起瘡心先痒後痛先寒而後熱七定則寒多四肢沉重心驚眼見火甚者嘔逆七者難治麻子疔一種始末皆痒不可犯觸七之而發者難治浮瀉疔牛狗疔二種無所禁忌縱不療亦不能殺人惟有二十六疔可畏其狀頭黑浮起形如黑豆四畔赤色今日生一明日生二及至十若滿三十六藥所不治未滿尚可治俗名黑炮忌嗔怒蓄積愁恨凡疔腫又看口中頰邊舌上有赤黑如珠子者是也瘡上按之疼痛應心者是又云初時穴起如疔蓋令人惡心憎寒四肢強痛一二月瘡變焦黑色腫火光起根硬刺之不竟痛皆其候也在手足頭面胸背骨節間最急其餘處則可毒入腹則煩悶恍惚似醉如此者三二日死宜速治之

內托復煎散 托裏健胃

- 白朮 茯苓 芍藥 黃芩 地骨皮
- 人參 黃芪 官桂 當歸 防己 各一兩

防風二兩 甘草八分

右剉先以蒼朮一斤水五升煎至三升去木入前藥再煎三四盞去粗分三次飲終日飲之又前蒼朮粗如煎煎散

托裏散 治一切惡瘡癰背疔瘡便毒始發腫甚欲作者三服消尽河澗云大便秘服黃連湯微利不若此方

- 當歸酒洗 金銀花 各一
- 黃芩 赤芍藥

- 天花粉 各五
- 牡蠣 皂角刺 連翹

大黃 朴硝 各三

右剉每服半兩水酒各半煎服 便不秘者去硝

一方 治瘡疽若內疽尤妙

川山甲 灰炒一糸 五灵脂 炒

僵蚕 炒去絲 各一糸 大黃 二糸

右為末酒煮一沸温服

黃芪六一湯 治瘡疽而渴

黃芪 六兩 蜜炙 甘草 一两 炙

右剉

黃昏湯 治胸中甲錯是為肺癰

合歡樹 治之 掌大 水三鍾 煮至半分 作二服

葶藶大棗瀉肺湯 治肺喘不得卧 葶藶 炒黃研末 丸如

彈子

先用大棗入水三盞 煎至二盞 去棗入葶藶 再煎至一盞

葦葉湯 治欬有微熱煩胸中甲錯

葦葉 二斤 切 薏苡仁 瓜蒌仁 各半斤 桃仁 五十个 去

右剉水煎

大黃牡丹湯 治腸癰脉遲緊末成膿可下之脉洪數成不可下

大黃 四兩 牡丹皮 三兩 芒硝 二兩 瓜子 一升

桃仁 五十个

右剉水煎

三生散 治漫腫光色附骨疽如神

露蜂房 頭髮 燒存性 蛇脫 各等分

一方治疔 蟻娘心腹下肉稍白者貼瘡上半日許未可再上之

血尽根出神効

蝙蝠散 治瘰癧多年不差

蝙蝠 一个 猫頭 一个 俱火燒作灰 加上黑豆 煨其骨

右為細末 湿即乾 搽乾則油調 付內服 五香連翹湯効



紫花地丁散

治諸惡毒瘡腫疔如神

當歸

黃芪

金銀花

赤芍藥

紫花地丁

大黃各五

甘草節二

右剉每服一兩水酒各半煎

一方治一切疔瘡腫毒

蒼耳草

一名羊負耒

取根紅嫩者搗爛用白酒調服仍用鹽梅

肉研爛猪膽汁調塗瘡上其毒即散又先用好京墨和姜汁

研爛用姜片蘸墨塗四圍腫熱處 千金翼方取根葉燒作

灰醋脚和如泥塗腫處乾即易十餘度拔出根或加藍靛和

或仍研汁服

惠濟瘡腫捷法

治一切癰疽疔腫瘰癧便毒等瘡

凡毒初起十日內掀赤腫痛宜發散先服羌活保生湯外用圍

藥鮮和散次服一味妙濟飲 或茱萸返魂湯如虛弱人

復煎散當自消退 如日久將膿者服妙濟飲不消服真人

活命湯入敗毒散和服追膿從大便出 如膿已成將潰者

用三稜針刺破入追毒藥線次日膿滿放出再換內入膿尺

洗去圍藥用干龍膏貼護風拔毒收口 如膿已潰日久臭

腐未肯收斂者用除舊布新之法俗人用刀割去腐肉傷人

只用追毒丹末藥津調付瘡口外用紙粘封自然腐化美宜

先用川椒湯或濃茶洗淨然後付末藥外用圍藥再洗如前

圍付待膿盡蠹去方用生肌散內服十全大補湯 此家傳

之惠濟妙法也故錄以示人

羌活保生湯

羌活

獨活

防風

荆芥

連翹

黃連 白芷 柴胡 木通 陳皮  
桔梗 甘草

右劉水酒各半煎隨病上下服

真人活命湯

當歸鬚四升 川山甲灰炒 金銀花 皂角刺

陳皮各五升 防風 貝母 白芷各三升

乳香另研 甘草各一升 沒藥二升另研

右劉分二貼水酒各半煎入乳沒和服厚蓋微汗為佳

敗毒散

川山甲灰炒淨一兩 白芷五升半生半炒 大黃五升半生

右為末每服三錢酒下重者隨活命湯調下竟腹中作疼則

膿從便出

一味如濟飲 如便毒等小瘡只服此將粗疊瘡上即消

一枝箭洗去土出貴州考本草不載

右用生白酒煎服得微汗為佳

圍藥解和散 如腫毒初起只此圍亦退

芙蓉葉 野菊根 蒲黃 黃連 黃芩

黃柏 連翹 白芨 白欬 白芷

乳香 沒藥 雄黃 孩兒茶 蛇含石煨醋淬

赤石脂 甘草 大黃 磁石煨醋淬

右為末雞子清調付瘡四圍腫處如乾雞子清常刷

如腫毒重大加葷蒜 水槿葉

接毒丹 先將白礬三錢用鉄銚火上鎔開如餅後入末藥於上

雄黃三分 雌黃五分 礞砂五分 朔砂三分 辰砂三分 牛黃二分

班蚕三个去翅足乳香二分没药二分巴豆三粒去油信一分

各研为细末入礬上候烟过取起安地上出火毒再研极细入

射香半分蟾酥一分脛粉半分再研用糯米饭杵成糜線如大

布针大焙乾竹筒貯如欲用旋用飯杵捻末用只留末藥包放

常焙如膿已成者無眼用三稜针刺破將藥線徐上內入深至

痛止外用烏金紙剪錢大津粘毒上封住如已潰爛臭腐眼大

者只用末藥津調付瘡內亦用紙粘封俱要用圍藥護住好肉

有血竭五分

干槌膏 如輕小癩毒只消此貼初起即散有膿即出不疼

草麻子肉一两 松香嫩黃者五末 乳香一分

右用鉄槌於石上杵干下成膏攤毒上外用紙蓋

生肌散

孩兒茶 赤石脂 黃連 黃柏 松香

右各為細末先將瘡口洗淨乾搽上

榮衛返魂湯一名通順散一名何首烏散此藥順氣勻血扶植

何首烏不犯當歸 木通 赤芍藥炒

白芷不見火茴香炒 烏藥炒 甘草

枳殼麸炒如惡心姜汁炒 各等分

右剉每服四錢水酒各半煎 流注加獨活

血氣盛者減當歸多則生血及發於他所

生痰有二症胃寒生痰加半夏 熱鬱成風痰加桔梗

毒在上去木通老人虛弱宜去之

有瀉者不用此方用臘礬丸米飲下三十九瀉止用此

神仙臘礬丸 治一切瘧毒腸癰內托神妙用黃臘七末溶入生

五卷

白礬一兩細研和丸梧子大每服二十九白湯下加至三十九  
丹溪方取久疽及痔漏中朽骨疽用烏骨雞脛骨以砒實之搗泥  
固濟火煨紅地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟米大以紙  
熬送入竅內以膏藥貼之

又云蒲公英花熱毒消惡腫結核有奇功田間路則皆有之似菊  
味甘解食毒散滯氣可入陽明太陰同忍冬藤即金銀花酒佐  
煎

又云白臘稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血定痛接骨續  
筋補虛嘗與合歡樹入長肉膏有神効

單麻子性善收能追膿取毒亦要藥也  
又方治老婦形實性急嗜酒胸生疽五日脈緊急且瀉用大黃  
細切酒炒為末以人參酒炒入姜煎湯調下一錢少時再服

嘔身汗出而愈

又方治便毒已結成膿

大黃

桃仁二十一

連翹各五

枳實三

厚朴

甘草節各二

右剉分三貼姜三片水煎

一方治發背垂死搗芭蕉根罨上出本草

一方治乳癰用頭垢米飲吞三四粒愈

又方用青茨生山中及籬邊生子俗名鷄頭又名金櫻子取葉搗

碎以酒碗許入絞汁服効仍用粗罨乳患處

一方治瘰癧用壁虎焙乾為末酒調下仍用山中俗名蘆葦此取

皮煎湯服須臾痒不可忍用手爬破出毒即愈

本草方治疔腫垂死用野菊花葉一握搗汁一升入口即活各用

其根神効 又方用花蜘蛛塗之出根非黑蜘蛛也

一方治瘰癧初起用野菊花根搗酒煎服仍用粗罨瘡上或自消  
或有膿瘡口自破

惠濟治虫方治癩瘡馬刀瘡潰爛年深有虫者先将濃茶洗淨用  
芝麻炒黑焦研和甘草末付上引虫出次用光粉輕粉同研付  
虫即死瘡易收口

一方 追毒不問瘰疽癩瘡皆治

蟾酥 射香 雄黃 血竭 輕粉 各一兩

石灰 風化者

右好灰一斗林汁煎至一碗入煎藥末調勻點患處核自爛  
以赤石脂一兩海螵蛸五分為末洗淨付上收口

○瘰癧醫經謂瘰有五種石肉筋血氣瘤有六症骨脂石肉膿血  
也此法瘰不可決破也則膿血崩潰多致夭枉瘰惟脂瘤可破去  
脂則愈餘五症不可輕易決潰也

昆布散 治一切癭瘤

昆布洗 海藻洗 小麦 醋煮乾各一兩

右為末煉蜜丸杏核大食後用一丸嚙嚙

外臺秘要 治癭氣用猪肺管上團肉一塊新瓦焙乾臨臥以酒  
嚙下妙

又方治癭丹毒用剪刀草冷水調敷

按丹溪云剪刀草汁調原蚕砂付赤瘰如霞片者愈  
丹溪治癭氣先頭斷厚味用海藻一兩黃柏二兩為末置掌中時  
時舐之以津嚙下消三分之一止藥

○結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿者多自是痰注耳

後頂門各有一塊用蠶蚕炒大黃酒炒青黛膽星蜜丸噙化膏  
核作痛一陳加連翹川芎皂角刺風黃芩酒炒蒼朮米泔浸  
一方治小腹連毛際結核痛不可忍由陽明受濕熱傳入太陽  
必惡寒發熱

山梔炒 桃仁炒 枳殼炒 山查各等分

右剉水煎入姜汁服

○惡瘡用霜凋芭蕉葉為末香油調付油紙掩先用忍冬藤葱椒  
金絲草煎洗 又方松上白蟻泥黃丹各炒黑香油調付外  
用油紙夾上日易後用龍骨沒藥於瘡口收肉

瘡痛不可忍者用苦寒藥若素弱人宜補中益氣加苦寒藥血  
熱人宜四物加黃芩鼠粘子連翹若渴加黃柏肥人血熱宜  
防風羌活荆芥白芷蓋取其風勝濕故也

身上惡痒四物加黃芩調淨萍末一升服 又遍身痒用密膏

花為末酒調下一錢

諸瘡濕熱燥痒憎寒壯熱皆血氣不和所致宜升麻和氣飲  
皮膚入風熱遍身癢疹痒不可忍入腹則殺人用晚蚕砂一升  
枳殼一兩煎湯用布帛擦洗更用牛膝末酒調服

金絲瘡其狀如繩線巨細不一上下行至心即死可於瘡頭截  
針刺之以出血後爵萍草根塗之立愈

瘡中弩肉生如蛇頭出數寸用硫黃末於肉上塗之即縮

天行時疫發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿  
隨決隨生不治數日必危遲則數年方減用川升麻水煮綿  
絮汁洗拭酒煮弥佳但燥痛難忍

天泡瘡用通聖散及蚯蚓泥畧炒蜜調付從肚上起者裏熱發

外还服通聖散 又方用野菊花木根煎湯洗黃柏滑石末付

一切惡瘡用治魂丹大有神効見後

頭瘡用猪油二錢半生半熟雄黃水銀各二錢五分和勻付

白禿瘡香油一盞頭髮一團煎至半盞搽効

一法只灸耳後或腦後有二核各灸五七壯斷根

蠹螻瘡如熱沸而大繞腰匝不可療用扁豆葉付瘡

名火帶如蛇盤用炉底泥水調付 或粉亦好

黃水瘡用蓼草燒灰付

人面瘡用貝母醋磨成糊塗之 蓋見母則喜笑而合也

燕窠瘡甘蕉燒灰和輕粉油調付

面上生無皮瘡棺材炭為末香油付

而黃水瘡流處即成銀珠鹽霜搽付

凍耳成瘡痒疼先湯洗用白蘆黃柏末香油付

脚上寒濕氣瘡用杉方木屑煎湯淋洗神効

諸瘡久不愈青箬葉卦在灶上烟熏三日油光樣貼瘡先用葱

椒湯洗 予患小腿外腫細黃水瘡痒即扒破須臾膿水出

疼後於內又發如粟米經年不差只用蓬上旧箬葉茶洗乾

貼用絹帛包日三次換後日一二次如痒用熱茶洗疼用冷

茶淋洗換箬用收斂不發

腫瘡年深者亦用此法効 卅溪用箬剪去兩頭以黃柏煮汁

令稠和白膠香草麻搗成膏攤箬糙面拆轉縛光面貼之先

以清水洗乾前同意亦須帛縛常換恐水漬好肉

頑癬疥瘡紫白癩用陽山六莖根搗爛加信少許蜜調浴起塗

之如大片每日只塗一處即好過數日復發再塗

遍身癬有虫遇晴明令會撥虫者用針尋發頭處挑出虫如疥  
虫細即愈強如藥末不發

兩腿騰牛皮癬名腎濕風用牛皮燒油付 又黃水流痒不可  
忍多年不愈用香油放碗底燒松脂油滴下入黃丹箬灰調  
勻付

疥瘡并馬疥瘡用馬鞭草不犯鉄搗汁半盞飲尽十日內愈  
漆瘡新蟹黃付或松毛烟熏或雞子黃塗或柳葉湯洗

并麻和氣飲

蒼木

川芎各八分

川芎各八分

川歸

芍藥

茯苓

白芷

各七分

并麻

陳皮

枳殼

桔梗

半夏

乾葛

甘草各五分

右生薑三片水煎

當歸飲子

治遍身瘡疥腫痒膿水浸漲或赤疹癩瘡

四物湯加白茯苓

沙荆芥

防風

各一分 何首烏

黃芪

甘草各九分

右剉分二貼姜三片水煎

一七散

治諸般疥癬痛痒或喜湯火烘洗者

茱萸

三升 蛇床子

炒 雄黃

另研 黑狗脊

寒水石

另研

白膠香

煎潤寸石上乾另研各一兩

白礬

黃連各五分

硫黃

二分半

班蝥 十四个去翅足頭

右為末香油桐油調先用蒼耳草湯洗去痂付之一次愈

丹溪治白癩風癬小麦攤石上以鉄燒紅壓出油搽立効  
又方治風癬疔瘡梓樹葉木綿子羯羊屎鼻屎晉瀝油付



又方治下疳瘡青黛海蛤粉蜜陀僧黃連末付又方以雞脫皮一名雞內金燒存性為末付

又方治腫瘡白膠香黃柏石膏各一两青黛五分龍骨五分為末油付

一方治陰蝕瘡用狗脊黃柏連冊水銀光粉赤石脂為末付

一方治陰飽瘡甘草濃煎候冷浸洗以海蝶蛸末付

治婦人陰瘡射杏仁研末以絹袋裝內陰內

治虫疥枯礬一两硫黃一分为末香油滴少許於鉢內沸投

雞子清煎取油調末藥付先洗去垢

治紫白癩風硫黃枯凡雄黃信為末用肥皂搥勻浴後擦之

或用

一方治疥瘡不問膿瘡瘡俱治

黃柏末

大風子

去殼

蛇床子炒

輕粉

白礬半生半枯

右為末臘猪油調漆或相燭油如有虫加信煨過

又方用煨銀硃礮子口為末入枯礬相油付妙

又方用水銀大風子硫黃枯礬為末燭油付妙

又方治癬川椴皮雄黃硫黃為末刮破付發即再付

一方治下疳瘡黃連末輕粉少先以欵冬花湯洗乾付之妙

治外腎生瘡綠豆粉

一分

蚯蚓糞煨二分

水調搽乾又刷之

一方治下疳瘡一名姪精一名姪幹瘡宜禁房事臨睡含水免陽

與脹痛用大田螺刀个煨存性研細入輕粉付服黃連敗毒

等藥

人牙散 治漏瘡惡瘡生肌

人牙

油髮

雄雞內金 各燒存性等分

右為末入射香輕粉少許香油調付濕則乾搽

太乙靈膏 諸般惡毒惡瘡並宜外貼內服隨後飲子

玄參

大黃

官桂

白芷

紅花

血竭

生地黄

芍藥

黃柏

地榆

乳香各半兩

防風

沒藥各三兩

羌活四兩

槐花

黃芩各二兩

猪牙皂角條三兩 歸尾一兩

杏仁二十粒 劉寄奴四兩

右剉碎以香油一斤浸春五夏三秋七冬十日文武火熬藥  
焦黑色住火候冷綿摠去粗慢火再熬先以黃丹水漂過去  
其鹽硝再漂定乾新瓦上微火炒紫色十兩研細用每油一  
沸入二兩五次入丹畢前後俱用柳條攪滴水中成珠不散  
軟便得所提起藥挑攪無烟出却入乳沒攪勻傾出磁器貯

淨水中一晝夜出火毒三日後方用如水過稍硬將黃藥  
熬香油入藥內既上蒸乘熱攪勻內服藥用丸如櫻桃大蛤  
粉為衣每服一九隨症飲子引用

如發背冷水吞下 血氣不通酒下 赤白帶當歸酒下  
咳嗽及喉閉並用綿裹禽化 風赤眼担餅貼太陽穴山施

湯下 打撲傷損外貼內服陳皮湯下 腰膝痛貼患處鹽  
湯送下 唾血桑白皮湯下 久遠瘰癧鹽湯洗貼酒下

婦人血脈不通甘草湯下 治杖瘡甚好

活絡內灸膏 治閃胸筋骨并無名腫毒疼痛

當歸

黃芪

白芷

芍藥

半夏

木鱉子

銅青各一兩

乳香另研

沒藥各半兩 另研

白膠香 一斤半研

右將六味剉碎入香油一斤內熬白並焦色汨去粗下白膠香油煎至黑色下銅青乳沒攪勻如前法成膏用

一方 貼腫毒并臭爛風塊惡瘡膏

川椒 四兩 粉 二兩 黃丹 二兩 桐油 一斤

右同熬成膏滴水中成珠不粘手為度出火毒油紙攤貼

癘風 俗名癘麻風近日綿花惡瘡同治

大風病是受得天地間殺物之風古人謂之癘風以酷烈暴悍可畏也。朱洞虛云大風有五黑色不治虫食肝眉落食肺鼻崩食脾声啞食心足底穿膝虛腫食腎耳鳴啞人耳沿生瘡或痺或痛如針刺食身則皮痒如虫行自頭面末為順風自足起者為逆風多因感寒熱與穢濁雜氣而成治法先以再造散下去惡物積虫

以... 半月勿妄動作勞後以醉仙散或吐或利不必畏法但... 咸... 於飲食只稀粥以管吸入或一旬半月一月面漸白而安又與換肌散丹溪云後以通聖散更用三棱針委中出血雖已全愈若不絕味斷慾皆不免於再發而終於不救也又云醉仙散須量人大小虛實與之須斷鹽醬醋諸魚椒果煨炙等物茄亦忌止可淡粥淡菜惟烏稍菜花蛇淡酒蒸熟食之可助藥力近見... 工佐以大風子油此藥性熱有燥痰之功而傷血 近年發揚... 醉仙散

胡麻子 牛蒡子 蔓荊子 柯杞子  
白蒺藜 苦參 瓜蒌根 防風 各五分  
四味同炒紫  
色各一兩

右為末每一兩五錢入輕粉一錢每服一錢茶調勻下晨午  
夕各一服後五七日於牙縫出臭黃涎渾身疼如醉利下膿  
血臭屎為度依前調理

再造散

鬱金五升 皂角刺 大黃炮各一升 白牽牛六分半生半炒

右為末每服五錢早晨無灰酒面東送下當日必利下惡物

虫膿如虫口黑色多年赤色近數日又進一服無虫止

換肌散 治大風年深不愈眉毛脫落鼻梁崩壞不論月取効

黑花蛇 白花蛇即斬補蛇並酒浸一宿地龍去土各

當歸 細辛 白芷 天麻 蔓荊子

威靈仙 荆芥 甘菊花 苦參 紫參

沙參 木賊 不灰木 甘草炙 藜蘆

天門冬 赤芍藥 定風草 何首烏 葛蒲九節菖蒲

草烏頭去皮臍 胡麻子 川芎 木鱉子

蒼木米泔浸去皮各一升

右為末每服五錢温酒調下酒多為妙

張子和治風疥癬及癩一名浮萍草 或加當歸芍藥

浮萍一升 荆芥 川芎 甘草 麻黃各半升

右剉每服一兩入葱白豆豉水煎服汗出為度

一法苦參五斤好酒三斗浸一月每服一合日三次常與不絕竟

痺既安細末服之亦良尤治癰疹 陶隱居以酒漬飲治惡瘡

日華子以為殺虫 本草除伏蟻養肝膽氣。丹溪云予曾

以蒼耳葉為君以此為佐酒者為蠱蝮蛇之或缺代之糊丸梧

桐子大每服五六十九加至七八十九茶清吞一二月而安若

八紫萍尤捷萍須寒月於山池取恐有蛭淨洗去泥畧蒸透乾用

本草治惡疾遍身生瘡膿腫萍湯浴浸半日大効此神方也

○湯梅瘡或名綿花蓋取瘡之形症相似耳先年淮南黃有此近  
年以來極多至今雖稍可尤未息世俗多用鴉風之藥治之但庸  
醫務速効大劑輕粉丹射等毒劑幸而氣血實盛者得愈无事其  
有怯弱之人因而變生瘰癧又等不知戒守變成癩風又有輕粉  
太多兼以射香透入骨髓遂成風塊經年痛痺膿爛豈非輕粉不  
能取効但不可多量人虛實用之可也  
括蒼人一方

當歸

芍藥

川芎

胡麻等醉仙散八味

羌活

何首烏

白芷

經蚕炒

荆芥

連翹

黃芩

山梔

皂角刺

玄參

甘草

芙蓉葉

威靈仙各一刃

右為末米糊丸梧子大每服七十九茶下 作煎服亦可有

實熱瘡盛者入輕粉二錢

過服輕粉成風痺疣瘡者用冷飯塊如葷餅而嫩白剉煎湯頓服

一法治大風瘡楓木子燒存性研細和輕粉麻油調付瘡上濕則

乾摻之極妙

黃精煎 治大風癩病及指節脫落者

黃精生者十五斤洗

白蜜五斤

生地黃肥者五斤洗淨

右二味剉搗爛入水三斗絞汁入鍋中和蜜煎攪成膏用磁

罐貯每用溫酒調服二錢或三錢久服癩瘡延年不老

丹溪方 治癩風

五六一

癩風

二

荆芥 山柘 麝香 地黃 杜仲  
防風 白蔞藜 羌活 獨活 大黃等分  
右為末以大風子油入熟蜜丸梧子大茶清下五十九次  
正骨兼金鏃科

損傷

墜墮折損閃胸其整頓手法并用藥法備載于醫林集要及奇効良方須口傳心授能至其妙不具述姑撮要者以備急用焉

仙授理傷續命秘方 一煎水洗 二用度損丸 三按伸 四

或用力收入膏 五捺正 六用黑龍散通 七用風流散填

瘡 八夾縛 九服藥 十再洗再用黑龍等液煎法凡打撲

墜墮刀刃傷損氣絕不語取藥不及切開口以熱小便灌之

凡腦骨損在頭上可治在太湯穴不可治

凡胯骨從臂上出可整從襠內出不可整

凡手脚骨只一脛斷可治刀股俱斷不可治傷甚者不可治

凡腫是血作用熱藥水泡洗用黑龍散付貼

凡損一月尚可整理久則不可

凡損用火灸則醫不得服藥不効

凡跌損腸肚中瘀血且服散血如四物湯之類

凡損大小便不通不可使服損藥用酒必熱宜承氣加水通甚

加朴硝通後却服損藥

凡服損藥不可吃冷物魚牛肉極冷若喫牛肉痛不可治

合藥斷不可無乳香沒藥血竭

丹溪云跌撲損傷用蘇木以活血黃連以降火白朮和中重便煎

尤妙如在下者可下瘀血但先須補托在上者宜飲韭汁或

和粥喫切不可飲冷水血見寒則凝一絲血入心死  
腹痛者有瘀血桃仁承氣加蘇木紅花下之

治損傷妙在補氣血俗工不知惟在速効多用自然銅接骨此

藥須煨出火毒方可用否則燥散之禍甚於刀劍戒之

骨損用古文錢五文醋浸乳沒一錢酒服或用接骨散

老人墜馬腰重不可轉側脉散大重取則弦小而長此有惡血

不可驅逐且補接為先用蘇木參芪芎歸陳皮甘草服半月

脉散漸收食進以前藥調下自然銅等藥一月愈

洗藥 九傷重者用此煎湯洗之然後再藥

土當歸 荆芥 生葱切斷一本用生姜

右三味煎湯乘熱淋洗

黑龍散 治跌撲傷損用此敷貼

川山甲 六月 薑存性 丁香皮 文升 土當歸 二升

批把葉 去毛半升 百草霜 散血半兩

右焙碾為細末姜汁調或地黃汁各和水調稀或皮紙量損

處大小薄攤於上貼之次以杉木皮夾縛之

風流散 但遇皮肉破損血出不止用此填塗

血竭 二升半 降真節 四升 龍骨 另研 紅花 頭收者各

蘇木 二升 同 灯心 一把 乳香 五升 同 沒藥 五升 另研

桔梗 少許 當歸 三升

右為末細乳鉢內研極細每用少許敷瘡口上乾如血止用

油塗之內有雞 一隻連毛屎醋煮切黃泥裹煨燥焙乾為末

同前藥和勻用

二十五味桑 治骨碎折筋斷刺痛不問輕重並治

五升 同 十二

白芷醋炒 金皮 劉寄奴 川歸 鹽炒 赤芍藥 米泔浸

黑牽牛 牛膝 茶浸 乳香 沒藥 先地黃 鹽水浸

川芎 破故布 醋炒 木通 草烏 醋炒 川烏 煨 歸 不用

藿香 骨碎補 木賊 官桂 羌活 杜牛膝 茶炒 自然銅 煨 鹽炒

獨活 絡 熟地黃 益水炒 骨碎不用

右為末 蜜丸 彈子大 黃丹為衣 每服一丸 溫酒磨化

陰紅湯 專治婦人傷損瘀血不散 腹膨便秘 攻心垂死

油髮 產婦者 燒鹿角膠 各一斗 沒藥 三斗

右為末 每服一錢 溫酒下 用此通下 瘀血

接骨良方

乳香 五斗 燒過 人骨 一斗 男用 女飛羅麵 三斗 端午收

右為末 無根水 瓦梧子 大每服三十九 酒下 如遇骨損 將骨

設法 整完 用炒米粉 醋調付 患處 夾住 三日後 洗去粉 止用

木皮 夾住 將藥初起 間一日 進一服 待接住 四五日 進一服

痊可 止藥 如神

當歸散 治損傷瘀血 壅滯 或作瘰癧 或因損後 中風 痿痺 痺

及勞後 損傷 四肢 疼痛 此方 續接 筋骨 有效

澤蘭 川芎 川牛膝 川續斷 各十斗

白芷 肉桂 去粗 芍藥 川芎 各五斗

川椒 去目 川烏 各三 細辛 五斗 桔梗

甘草 各四斗 白楊皮 不用亦可

右為末 每服二錢 熱酒下

復元活血散 治墮損 瘀血 流滯 脇不作疼 不可忍



當歸酒

柴胡各二升

紅花半升

大黃酒浸五升

天花粉

川山甲炒

甘草各一升

桃仁五十个研如泥

右剉水酒各半煎食前服

一方治內損有瘀血每遇陰雨則疼服益母草膏

惠濟方 治跌撲損瘀血疼痛久不差者

蘇木

紅花頭巖者

紅苜蓿連根焙乾

右各燒存性為末好酒下

一方治損傷腫痛小麦麵和醋蒸裹患處便定痛再蒸再裹

一方治損成風痛

牛膝

活血丹

茅根抽心開桂皮木樨

南風藤生風樹上三角葉

右採風藤只可葉共搗爛絞汁生白酒及量服至醉

○金... 過多者四物加參芪服之○集驗云凡兵器傷血出

者必... 甚不可以水飲之只食乾食肥膩之物不妨但鮮湯而已

若食薄粥則血沸而出必死所當忌者犯之多不救

一方急以石灰厚付裹之如瘡深不宜速合者加滑石末付

又方用老杉木皮為末付 又方用松香加琥珀為末付

惠濟方只用茅針花填瘡口或綿花即血止不作膿紙灰亦好或

用野苧葉搗碎付冬用乾者付或茄葉亦好冬於梗上尋

又方治刀刃傷磕破竹木簽刺等傷皮破血流此止血生肌

川歸

赤石脂

血竭

乳香

沒藥

滑石

炒甘石煨

或加何首烏補缺唇

右研極細搽傷處初傷者加龙骨許久者洗乾加米少許

一方救殺傷氣偶未絕葱白炒執遍傳傷處頃即再易痛自止

灰彈散治刀斧傷血不止及多年惡瘡陳石灰細研雞子清調和  
彈子大火煨透候冷再研搽傷處惡瘡姜汁調付

一方治金瘡內爛生蛆者皂礬飛過乾貼其虫即死

蓋汁飲治母箭所中搗蓋汁一升飲之祖付瘡上無蓋用青布漬

絞汁服并淋洗如齧不出搗鼠肝塗之鼠腦亦可即出

一方治諸傷瘀血不散五六月收野苧葉搗爛付瘡上如瘀血在

腹用順流水搗爛服即通血皆化水秋冬恐無宜早收

○杖瘡用猪膽汁塗之即不痛

一方治杖瘡并打傷皮不破內損者用蘿蔔搗爛罨之

一方用真菜豆粉微炒雞子清調劑之

凡杖瘡揪痛宜木香梅柳丸姜湯下一二百丸

○竹木箭刺入肉不出梅師方以頭垢塗之搗蟾蜍付之又云以

象筋研細之其刺頭出用指甲捏之 深師方以鼠腦

如膏厚塗即出

○湯火傷丹溪用桐油二分水一分攪令稠入黃丹石膏末付

神效當歸膏 治湯火傷與方飲瘡口生肌肉拔執至每止痛

當歸剉

黃蠟各一分 麻油四分

右先將歸入油煎焦黑色去粗入蠟攪放冷攤貼之

惠濟方 治湯火傷即愈不成癩痕

菜豆粉

輕粉少許

槐樹皮 去粗皮火焙乾研細末

右共研細香油調付膿水濕則乾付

經驗方用劉寄奴末先以糯米漿雞翎掃患處後搽末藥於上不

疼亦無痕 凡物傷必先用鹽罨護肉壞後付藥

○遠行脚腫細辛防風草烏等分為末草鞋畧濕搽鞋上用之可

行千里輕便甚妙 或用蚯蚓糞塗腫處脚閣起 一夕愈

破傷風

巢氏病源云金瘡瘖者由血脉虛竭飲食未復未滿月日榮衛傷  
穿風氣得入五臟受寒則瘖其狀口急背直搖頭馬鳴腰為反折  
須臾發氣息如絕汗出如雨不及時救者皆死凡金瘡卒無汗  
者中風也邊自出黃汁者中水也並欲作瘖急治之又痛不在瘡  
處者傷經絡亦死。瘖字即瘖字當作瘖強也。仲景云病瘖人  
瘡口未合風入之為破傷風濕入之為破傷濕與瘖但多頭強項  
急餘並相似。丹溪云破傷風即生熱也風襲於瘡傳諸經絡病  
如瘖狀治同傷寒脈浮無力太陽也汗之而愈長而有力陽明也  
下之浮而弦緊少陽也和解之大便秘小便赤汗不止脈沉在裏  
承氣下之背脊痛者羌活獨活防風甘草芍藥加滑石

地榆防風散

治破傷風半表半裏頭微汗身無汗不可發汗

地榆

防風

地丁草

馬齒莧各等分

右為末每服三升米湯調下

此表裏治之也

羌活防風湯 初傳在表

羌活

防風

川芎

藁本

地榆

當歸

芍藥

細辛

甘草

右剉水煎有熱加黃芩大便秘加大黃

一方 用魚膠一升先煮塗瘡口另取燒灰入射香酒調下

經驗方用黑豆四十粒朱砂二升同研酒調下神効予謂豆須炒

行義曰破傷風及沐髮中風以亂髮如鷄子大殼焦黑研以酒一

盞沃之何首烏末二錢同攪候濕漉過一二刻再灌

梅師方因瘡中風腰脊反張咬牙口禁四肢強直用鼠一頭和尾  
燒灰細研以臘月猪脂和付之

獸傷虫傷

犬咬凡犬咬蛇傷不可便貼膏藥乃生肌散之類謂毒不出也  
定風散 一名禁声飲子一名玉真散 治犬咬先用口嚼漿水洗淨  
貼之

天南星 生用洗

防風 去芦等分

右為末搽咬處再不發無膿神效風狗咬亦可用

用姜汁酒調服名玉真散亦治破傷風或用薑便酒調服

一法犬咬會卒無葉用葱搗爛貼之 一方牛屎塗之 一方白

草霜末油調付 或鼠屎末油付 或嚼杏仁付之 或用

頭垢內瘡中热牛糞罨之 或并逐蚯蚓糞付之

狗犬即風犬俗名顏狗春末夏初犬多發狂七者尾直下不搖起

口流涎舌黑色凡遇諸途次或人家須謹防之被其傷極毒宜

急治之若見痛定瘡合便為無事不治者必死七日當一發過

三七日不發可免百日可全免

丹溪法急於無風處吮出瘡孔血若是乾孔用針刺去血熱以便

洗淨以人糞填滿胡桃殼半邊覆瘡孔上用艾炷於殼上灸三

七壯以後日灸一日次百日止急用蝦蟆乾一箇班蚤二十一箇

去頭翅足同糯米炒黃去米為末酒調或水調分為四服瀉下

惡物為度未見惡物量輕重再服又宜常服韭汁一盞或生地

黃地榆取汁皆可常服敷藥用虎骨末石灰臘猪脂調付禁酒

猪肉魚生肥膩終身禁犬肉蠶蛹

一云凡風狗咬者頂上必有紅毛可拔了服煎藥又云利後肚

五卷  
痰急用冷水調膏服之或黃連水不可便食熱物水調益元散更妙 利下惡物如葡萄肉一般

一方用白芷蟬退各五兩為末酒調足量飲之宜有黃水從瘡口出如未再服以水出為度以白頭蝨搗碎傷火灸之即乾

一方治經久復發無藥可療用此極難雜黃五兩研射香少許研右同研酒調二錢如不服捏鼻灌必使得睡切勿驚起任自醒候利下惡物再進一服

一方治諸大咬瘡不瘥吐白沫者為毒入心叫喚似大聲以骨燒灰研用東流水調方寸七服

一方搽罨末肉瘡口中裹之止痛速愈 若寒熱欲發者刺入熱血飲之愈 或云食蝦蟇愈

聖惠方治虎傷先喫清油一碗次用油洗瘡口 或用罨付

○蛇傷一切虫傷凡初被傷用針略挑起咬處皮輕上剪去探出少血即愈仍先縛札勿令毒攻內慎勿妄用雄黃付瘡恐毒氣不泄反攻其內為害不淺

一方用細辛白芷各五兩雄黃二兩另研為末入射香小許酒調服二錢

解毒散治毒蛇射工等傷人毒氣入內眼黑口噤手足強直用白礬研 甘草各等分為末 每服二錢冷水調下

一方治毒蛇傷用牛耳垢付 一用大青小青牛膝汁飲

或用人屎厚付以帛裹之即消 或酒調貝母末服查付

雷經云虫牙傷咬雄黃射香入澱青點咬處甚者入靛青汁用前藥服神效要藥詳好汁治蜘蛛傷塗妙蜂螫妙或牙垢塗

本草治蛇傷白礬燒汁熱滴咬處立差

又方治蜈蚣蜘蛛咬桑樹汁和白鹽塗 或芋梗汁亦良

射後方治虹蚓咬其形似大風鬚眉此且落用灰水浸身良

一方虹蚓咬陰腫用鹽湯溫洗數次愈

一方治蝎螫用鷄口涎塗 或用半夏白礬醋調塗

一方治蜈蚣咬醋灰醋和塗

一方治蠟螻即入脚虫隱於壁間以尿射入遍身生瘡如湯火傷

用烏雞翎燒灰雞子清調敷或燕窠泥水調付

王氏傳濟治馱涎馬汗所傷枯礬黃丹炒研油調付

一方治馬咬用人糞塗或鼠屎燒為末和猪脂付服童便韭汁

一方猫咬薄荷汁塗 鼠咬射香津調付 猪咬粉松脂溶貼

○諸物骨鯁用馬尻勃為末砂糖丸彈子大含化

葛氏方以行密七抄稍七服之即下

一方治雞骨鯁以雞汁化下或食飴糖一塊即下子謂諸鯁皆可

一方治碎骨并猪毛鯁用苧麻拿住尾餘入口嚼爛嚥去漸下

之即出 稍麥芒用鵝涎灌之即下

驅蚊蝎壁虱臭虫蒼木 一斤雄黃木鱉子 各二兩半 為末蜜丸彈

大床下燒一炷或於蚊合時當門燒熏落如麩淨尽

一法治蚊虫以蠟炙乾於室燒之蚊化為水 出本草

一法衣服生虱水銀一斗入糲內研勻糲衣永不生虱

一法治頭虱以藜芦末擦髮中經宿虱皆乾死自落

予只用銀銖水塗草紙上焙乾燒烟磁碗下烟疑碗內冷茶洗

下塗髮根稍遍以怕包裹經宿虱皆死怕上除根極妙



血熱也必作痛四物加香附黃連

不及期而來者血熱也宜四物去地黃加苓連肥人兼痰治又云不及期者氣血俱熱宜柴胡黃芩當歸生地白芍藥香附之類

將行作疼血實也桃仁紅花黃連香附 又云臨行時腰腹痛

痛乃是鬱滯有瘀血四物加桃仁紅花莪朮玄胡索香附發

熱加柴胡黃芩 又云來時肚痛四物加陳皮玄胡索牡丹皮甘草

來後作疼氣血虛也八物湯 或云宜艾附丸

錯經妄行氣之亂也

紫色有塊者熱也黑則熱之甚四物黃連之類

或云紫者為風黑者多熱淋漓多寒

經不調而血水淡白者宜補氣血參芪芍歸香附白芍藥如腥

痛加阿膠艾葉玄胡索

一經水去多不能住者以三補丸加莎根龜板金毛狗脊

一肥人不及日數而多者痰多

一肥胖飲食過度之人不調者溫痰宜二木半夏茯苓滑石芍歸香附

經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因久發

盜汗耗血或因腸胃不和飲食不進而不生血宜生血補血

除熱調胃之劑隨症用之或因七情傷心七氣停結故血閉

而不行宜調心氣通心經使血生而自行

血枯經閉四物加桃仁紅花

一陰虛久不通小便流身軀疼痛四物加蒼朮陳皮牛膝甘草又



蒼莎丸加蒼耳草芍藥酒糊丸煎藥吞下

軀脂滿經閉者道痰湯加黃連川芎之類不可服地黃泥膈故也如用以姜汁炒

經不通用馬鞭草汁熬膏為丸紅花當歸煎湯送下

肥人痰多佔住血海因而不多者目必漸昏用南星蒼朮川芎香附作丸服若血虛有熱更加黃連白朮

經行之時或飲冷下水因而嘔吐發狂者此乃痰阻用二陳加姜汁一二服後用通經藥

經血逆行或血腥或吐血唾血用韭汁服之

四物湯 調元藥 衛滋養氣血經候胎產並皆主之隨症加減

當歸酒浸 川芎 白芍藥 熟地黃酒蒸各半

右剉每服七錢水煎 凡婦女患腹痛者去地黃不去反作

經丸 治經水過多不止

黃芩 龜板 芍藥各一兩 樗根皮 七分

黃柏三末炒 香附一名平童便浸

右為末酒糊丸

惠濟通經方 治經血不行腫腹痛極効

當歸 川牛膝 牡丹皮 凌霄花 桃仁去皮尖研

蘇木 滑石 芒硝 射香少許

右剉除射香桃仁硝先研放碗內餘水酒煎傾出攪勻服

丹溪方 治瘀血作痛

香附醋煮四 瓦龍子醋煮一晷 牡丹皮 大黃蒸

當歸各二兩 桃仁一兩 川芎 紅花各半兩

右為末蒸餅丸梧子大每五十九酒下

一法治室女月經不行腹大如厥其脉乍大乍小醫曰崇脉也面色乍赤乍白曰鬼纏也固語之曰是夕夢與男子交由是感疾然病因與脉色同無害乃以桃仁煎下血類諸肝六七塊俱有竅如魚其病乃愈

道進散 治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

芫胡二升 茯苓去皮 白木各一升 當歸

芍藥各二升 薄荷五分 甘草炙一升

右剉煨姜五片水煎

桃仁散 治月水不調前後淋滴不斷四躰虛倦腹疼思酸物

桃仁 半夏 川牛膝 桂心 人參

蒲黃 牡丹皮 澤蘭葉 粉草少 四物用生地

右剉姜三片水煎

對藥湯 治素虛又為風冷乘氣停凝腹脇刺痛

當歸二升 桔梗 乾姜炮 細辛

防風各一升 熟地黄二升半 甘草炙五分 茱萸湯洗三升

右剉水煎服

桑白皮散 脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急

桑白皮 郁李仁 木通 枳榔

青皮各一升 木香 大腹皮 赤茯苓

防已各二升 蘇子

右剉姜三片水煎

神秘湯 治水氣乘肺而喘及治支飲喘滿

陳皮去白 桑白皮 紫蘇各二升 人參一升

右剉姜五片水煎

旋覆花湯 心胸嘈雜中脘痰飲冷氣心下汪洋口中清水出腹  
脇脹痛不思飲食

旋覆花

白芍藥

人參

桔梗各一升

陳皮去白

赤茯苓

半夏各二升官桂

細辛

甘草各五分

右劉姜五片水煎

琥珀丸

治血瘀腹中有塊或刺腹背引痛漸致黃瘦羸乏

琥珀另研

白芍藥

牛膝酒浸

鱉甲醋炙

川烏炮去皮臍蓬朮

當歸酒浸

厚朴製各一兩

木香

澤蘭葉

官桂各五升射香半升另研

右為末酒糊丸梧子大合四七十九空心米飲下或酒

○婦人血瘀為病多因產後天於保養經候失於調適七情內傷

六熱外繼遂致氣凝血滯而成瘕也內經曰小腸熱已滿移熱于

大腸則積伏瘕結硬如塊面黃不月宜用通經和血之劑子和云

一婦如有孕半年發痛以為將產一二日復如故數次戴人診其

脉濡而小斷之曰塊病也治法宜下又針塊下愈矣

桃仁煎 治血瘀血積經候不通

桃仁去皮尖

大黃

朴硝各一兩

蜜虫五升去翅足

右為末先用米醋二升半慢火熬一升半下大黃等攪稍冷

下朴硝攪候凝丸如梧子大頭晚下要食五更初溫酒下五

六丸下如赤豆汁或如雞肝等狀未下再服鮮紅采則止服

調血氣藥補養之 有塊丹溪纂要積塊下備

○婦人經滯化為水流走四肢悉皆腫滿名曰血分症與水腫相

似醫不能審輒作水腫治之誤也宜服

一方

人參

當歸

瞿麥穗

赤芍藥

大黃

紙裹煨

白茯苓

桂心各五子

苦苧藤

紙炒三分半

紫蘇飲

治婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡脚膝虛腫

紫蘇

桑白皮

茴香根

木通各一兩

枳殼二兩

羌活

獨活

荆芥穗

木瓜

青皮各半兩

大腹皮十斤

甘草三分

右剉姜三片葱白一莖水煎

崩漏帶下

內經云陰虛陽搏謂之崩。東垣曰婦人脾胃虛損下陷於腎與相火相合溫熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭。亦有白帶者脉必弦細寒作於中。亦有赤帶者其脉洪數。或四肢困熱

腰痛或臍下痛臨經先見寒熱脇脹兼脾胃症出見或四肢困熱

心煩燥急宜大補脾胃升萃氣血可一服而愈。或先富後貧勢

脫事疎心氣不足其火旺於血脉又致脾胃飲食失節火乘其中

形容似不病者此心病也。治當先諭以惡死使心不動以大補氣

血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止

矣。又或悲哀太甚則胞絡絕而陽氣內動發則心下崩數澁血也

蓋腎水真陰既虧不能鎮守胞絡相火故血走而崩也。與東垣之

論丹溪以為東垣不言熱而主於寒不知何謂也。○脉經曰尺寸

脉虛者漏血。○脉浮不可治也。丹溪云有虛有熱。○則流通虛

則下溜

急則治其標。白芷湯調百草霜服甚者棕灰。或五灵脂半生

半炒酒下。蓋五灵脂能行能止。忌用人參同用。一云凌霄花

酒下 後以四物加乾姜調補之 予只用針兩手內關穴

先微瀉下後轉針升提之立止甚者有會穴  
緩則治其本以四物加參茸香附乾姜之類 又云四物

加荆芥穗止血神妙或加髮灰 一云蒲黃妙

崩漏多因氣所使而下丹溪方  
墮胎後血不止食少中滿倦怠煩燥脉沉大而數重取漸弦此  
作怒氣傷肝感動胃氣二陳加川芎白朮砂仁服多愈

○經云帶脉為病而得名白者屬氣赤者屬血東垣舉脉訣云崩  
中日久為白帶漏下多時骨木枯言始病血崩久則血少復亡  
其陽故白帶下可見未全拘於帶脉也亦有温痰流注於下焦  
或因驚恐濁液下流或思慕為筋痿或餘經温熱屈滯於小腹  
之下皆為氣血虛損精氣累滯而成其病標一也○戴人以兩

手脉滑大而有力乃止用先去痰飲下泄温熱繼以淡劑導之  
此瀉實也如諸脉微細或沉緊而澁按之空虛無力或澁大而  
澁正為元氣不足陰虛筋痿虛極中寒等症東垣有補陽調經  
固真等例乃蕪青虛也○又經曰少腹冤熱洩出白液言下部  
任脉温熱甚者津液湧溢而為帶下多不痛或有痛者則壅碍  
因塞成痛也又云思想無窮所願不得意淫於外入房太甚發  
為筋痿及白為淫謂白物淫積如精之狀男婦皆有之不可此  
為白帶治宜開結除温去熱散氣○此謂白淫如米漿然至於  
湛濁白濁又非白帶也帶者其狀若帶濁者類下白水如米泔  
或黃水如葵汁

丹溪云漏與帶俱是胃中痰積滲入膀胱無人知此只宜升甚  
者上必用吐以提其氣下用二陳加二朮升麻柴胡仍用瓦龍

子蚘殼也

帶下是濕熱為病治濕為主氣虛入參木血虛入芎歸

赤白帶下炒黃荊子為末米飲調下二錢又治心痛

濕勝者用固腸丸 滑者加龍骨赤石脂 滯者加葵花

相火動者於諸藥中少加黃柏 性燥者加黃連

肥人多是濕痰海石半夏南星黃柏蒼朮川芎檮皮香附冬加

乾姜 一方有青黛無膠皮

瘦人白帶少如有者是熱黃柏滑石檮皮川芎海石如無海石

以蛤粉代之丸服一方有青黛

結痰帶下以小胃丹津液嚥下數丸候積下後以補藥調治

治帶用藥寒月少加姜附臨机應變必須斷厚味

葵花治帶白者治白紅者治赤

羅漢用治帶用十東湯神佑丸玉燭散寒者可用虛者不宜

予治帶用灸法甚捷用竹杖立量平脐中墨記定轉背後量春

骨照墨記點穴灸七壯即愈

丹溪方 治崩漏因氣所使而下

香附黑 一各炒

當歸

熟地黄

芍藥各一各炒

川芎

黃芪

地榆

人參各五分

蒲黃

白朮

升麻三分

甚者加棕毛灰調

右劉水煎

如聖散 治婦人血山崩

棕毛灰

烏梅各一各

乾姜一各

五分並燒存性

右末每服二錢烏梅酒調下

涼血地黃湯 治血崩乃腎虛不能鎮守包絡相火故走而崩

生地黄

當歸各二升

黃連

黃柏

知母

藁本

川芎

升麻各一升

羌活

防風各一升

黃芩

荆芥

細辛

蔓荊子

甘草各一升

紅花 炒三分

右剉分二貼水煎

一方治室女血崩不分冷熱皆可服荆芥蓮房各燒存性等分

為末每服三錢米飲下

一方治帶下五色亦治嘔血令人黃瘦虛弱地榆三兩剉以醋煮

食前稍熱服一合 一方用藥水煎服代茶甚熱 本草註云

地榆主帶下十二病

升溪方 治白帶

龜板炙

枳子各二兩

黃柏炒一兩

乾姜炮

具母各二升

香附

山茱萸

樗白皮

苦參各五升

白芍藥

七升半

右為末酒糊丸梧子大每五十九米湯下

又方 治上有頭風鼻涕下有白帶

南星

蒼朮

黃芩酒炒

辛夷

黃柏炒焦

川芎

滑石

半夏

牡蠣粉

右為末姜汁糊丸

又方 治結痰帶下 法令小胃丹恐太狠 此調補之劑

白朮二兩

黃芩五升

紅白葵花二升半

白芍藥一升半

右為末蒸餅丸用四物湯送下五十九

固腸丸 治濕氣下痢白帶去腸胃陳積之痰不可單用看病

作湯使

樗根白皮性涼而燥須炒用俗名臭椿

右為末糊丸

固真丸 治白帶不止臍腹冷痛目中溜火眩暈然无所見齒惡熱飲喜乾食惡湯飲此皆寒濕為之也

白龍骨二斤細研水飛白石脂一斤燒紅水飛研細日乾

當歸酒洗二斤黃柏酒炒芍藥各五分乾姜炮四斤

此胡一斤

右為末麵糊丸芡子大空心多用白湯送下少時飯壓之

人參黃芪散 久患白帶羸瘦昏倦腰腿酸疼日脯潮熱飲食无

味辨疑錄云此方極效

黃芪 當歸 茯苓各一斤人參

白朮 地骨皮 芍藥 川芎各八分

熟地黃 甘草炙 車前子各五分 鹿角膠五茶匙

右劉東一枚水煎

一方 治白帶白濁

金櫻子三兩炒即山雞牡荊實二兩即黃荊子白扁豆花二兩炒

蓮肉二兩 糯米半合炒白麵二兩炒

右為末每服五七錢入蜜三茶匙白湯調下半月即除

補經固真湯 白帶不止諸藥不效尺脉極微崩中日久所致

人參二斤 陳皮五分 乾姜三斤 甘草炙

郁李仁去皮生黃芩另研柴胡各一斤 白葵花去蒂碎

右劉水煎黃芩裏後入空心服少時飯壓之

婦室雜病

搗搦之症有平生無病一旦手足搗搦痰涎壅塞精神昏憤不省



人事不可使作風癩多因肝血湮塞經候不調隨其虛實而生病  
焉婦人多由血虛七情所感而生風女子血實七情所感而生熱  
邪乘四末故手足卒然搖擗狀類風癩治法宜先快氣蘇合丸俟  
其醒亟調經或通或補婦宜白薇丸室女宜澤蘭丸多服以病  
退為期

白薇丸

白薇

琥珀另研

官桂

白芍藥

當歸酒洗

防風

山茱萸

柏子仁炒

川續斷酒浸

川烏炮去皮

牡丹皮各一兩

木香五分

射香研分另

紫石英

煨醋淬七次

右為末姜汁米糊丸梧子大每七十九空心酒或米飲下

澤蘭丸

當歸酒洗

澤蘭葉

琥珀另研

防風

羚羊角研另

牡丹皮各一兩

生地黄

赤芍藥各一兩半

射香研五分另

安息香酒洗

去磁石鉄粉

陳皮各五分

右為末煉蜜丸梧子大每七十九米飲下

一婦人閉目昏沉或用三生飲等劑治不愈人云此病乃鬱冒血

厥本事方白薇湯症也先用倉公散擗鼻後服白薇湯

白薇湯倉公散見血厥下

橘歸丸 治婦人肌膚手足俱有血線路怒氣傷肝血失常經

陳皮二兩

當歸一兩

右為末煉蜜丸梧子大每五十九酒送下

當歸木香湯 治血氣虛勞寒熱煩燥痿黃昏倦喘嗽声重盜汗

恍惚走注疼痛一切虛損

川歸

青皮

五加皮

海桐皮

桑白皮

丁皮

陳皮

地骨皮

牡丹皮

赤芍藥

木香

棕毛

燒存性各二兩

右為末每服一錢入香油一二點右錢一文洗同煎服

千金方治無故尿血龍骨酒調方寸七空心日三服

胎前

林中誠曰妊娠之脉两手三部脉必均平兩尺脉滑不絕息數調和脉賦云若問女子何因尺中不絕胎脉方真太陰洪而女孕太陽大是男娠或遇俱洪而多双產蓋太陰者肺部也太陽者膀胱脉也中衝者胃脉也少衝者小腸脉也太衝者大腸脉也中衝主三四月少衝五六月太衝主七八月動者脉之至滑痰也懷妊嗜物乃一臟之虛如愛酸物乃肝臟正能養胎而虛也

惡阻乃有孕而惡心阻其飲食也多從痰治用二陳之類或白

木丸服 一云肥人是痰瘦人是熱

胎痛乃血少四物加香附為末紫蘇湯下大妙

胎動腹痛皆因飲食冷熱動風毒物或因交合搖動關節傷犯

胞胎其候氣不調和或服熱藥太過氣血相干急服順氣藥

安胎不然變成漏胎則危矣當歸芍藥散

心痛因宿寒搏血凝其氣故痛五灵脂蒲黃炒末醋下

腰痛不可忍宜通氣散補骨脂瓦上炒香為末罌胡桃仁一箇

空心酒下一錢

胎損傷不安腰痛腹痛捨心短氣四物加艾葉阿膠黃芪甘草

姜枣水煎

胎動不安三月設若下血腹疼由于宮又虛致令胎墜危於正

產先曾得此宜預壯仲九以養胎杜仲姜汁炒去絲川續斷  
酒浸各一兩為末煮寒肉九梧子大米飲下每三五十九

胎動因火動胎逆上作喘者急用條芩香附之類

胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛為子懸宜紫蘇飲

喘急兩脇刺痛脹滿或癸寒熱唇青面白骨節痠疼或頻嘔吐

宜平安散

胎驚胎氣既成或因氣悶或為喧呼心忡脉乱致令胎驚心神

恍惚睡夢多驚氣急喘速宜大聖散

子淋酒色過度或飲食積熱致水道澀少名曰子淋安榮散

二便不利因臟腑積熱所致大腹皮散又與前雜症參首

小便不通有胎婦稟受弱憂悶多性急燥食味厚皆能致之古

方用滑利疎導鮮効因思脬為胎所墮展在一邊脬系了矣

不通胎若舉起脬系得疎水道自行用四物加參朮半夏

皮生姜甘草空心飲探吐通 又云孕婦小便不通疎

弱乃氣血虛弱胎壓膀胱下口用補藥升起恐遲反加急滿

令混婆以香油抹手入陰戶托起其胎溺出如注却以參芪

升麻大劑服之稍閉再托之又云將婦倒豎起胎自墜轉其

溺濺出勝於手探

子癰妊娠中風頭項強直筋脉挛急言語蹇澁痰涎不利或時

癢搐不省人事宜羚羊角散 亦有臨月癸風痙暈倒吐逆

如癰亦名子癰宜葛根湯

子瘡榮衛虛弱脾胃不足或風寒生令所致急服驅邪散莫待

吐逆惡食難治倘夏末秋初感風者而致宜審治不可專泥

溫脾之藥或清脾湯可

子煩心驚膽怯終日煩悶因二火為之病也竹葉湯

腹脹胎水通身腫滿或心胸急脹名曰胎水或胸肚不分急用

鯉魚湯加減蓋因娠婦腹大不自知竟也濟生方云一婦腹

脹小便不利吐逆藥物不納反加脹滿湊心驗之胎死用下

死胎藥不鮮後服鯉魚湯三五服胎下便通皆患小腫消脹

去止兩脚浮腫名曰皴脚亦用鯉魚湯

胎腫有孕而手足或頭面通身浮腫屬濕多或用山梔一合炒

米飲下丸服亦可 一云成胎之後自脚面漸腫并腿膝及

喘悶狀如水氣或脚指間有黃水出名曰子氣用天仙藤散

一云腹滿不得小便從腰以下腫如有水氣狀懷身七月此

心氣實宜刺瀉勞宮及關元小便微利即愈

胎漏妊娠成形胎氣未安或因房室驚搖勞力傷動胞胎或食

毒物致子宮虛滑經血淋漓不急治致敗血瘵心胎乾母于

難保宜桑寄生散或黃芩湯。丹溪云胎漏屬氣虛血虛有

熱陳氏云有娠月事每至未必血盈若榮衛有風則經血喜

動以其風勝也一云胎漏非止一端宜審所因

妊娠下痢赤白宜於痢疾下參究而治如黃芩湯最當 又云

有一婦孕已九箇月夏間患痢內熱甚胎下痢愈頻併腹痛

不可忍惡露漸少手足逆冷六脉沉數諸藥不効必須逐積

去血如黑神散燥熱之劑决不可用玉燭散服則嘔用米醋

七盞熬至一盞入大黃末一兩慢火熬成膏丸如彈子大每

用一丸童便溫煖服不三四服即愈

傷寒感冒之物宜發散用芎蘇散大熱悶乱恐傷胎藏宜單胎

散 小柴胡去半夏名黃龍湯治妊娠寒熱

風壅咳嗽宜百合散

喘急宜平安散或紫蘇飲

一云有胎死不下奔迫而上冲非

風寒也宜催生湯倍芎歸煮一二升下死胎蓋脉必氣口盛於人迎肝脉弦疾二尺短而離經知其胎死也

胎冷多食生冷及當風取涼所致脐腹冷痛小便數大便滑四肢拘急宜安胎和氣飲

胎熱多居火間衣着太煖或食熱物太過致令胎熱臨月忽暗不見灯火頭痛眩暈項腮腫滿不能轉頸急宜服消風散或分纜其眼吊起不辨人物只服四物加荆芥防風更服眼科天門冬飲子二藥相間服漸明大忌熱毒物房勞

胎肥口厭甘肥飽即睡卧致肥厚行動氣急臨產必難八月可服枳殼散或无憂散

失音不語無辜當十月足自復

安胎孕成之後竟胎氣不安或腹微痛或腰間作疼或飲食不美服安胎飲至五六月宜常服數貼或當歸散亦可

墮胎乃血氣虛損不足榮養而自落或因勞怒傷情內火便動亦能致墮大抵屬虛屬熱二者又當視其輕重而治之病源乃謂風冷傷於子藏未得病情者也又云一婦有胎即墮其脉左大無力重取則嚙乃血少也以妙年只補中氣使血自榮濃前白朮調黃芩末一錢服之至三四兩妙。雜著云半產多在三个月及五七个月下次如期復然蓋先於此時受傷故後至期必應乘其虛也下後須多服養氣血固胎元之劑四物加減下次有胎先於前墮或三五七之前半月服固胎藥十數貼以防之至九箇月來服達生散

又築磁類什四五月至七八月因而口禁欲絕用佛手散探之若不損則痛止子母俱安若胎已損立便下

又毒藥攻胎症有故服毒藥攻胎藥毒衝心外症牙關緊急手直握拳頭低自汗身微熱中風相似其脉浮數九死一生若不審知作中風治之必致殞絕宜白扁豆一味生為末新汲水調灌下

驗胎法經住三個月用川芎為末濃煎艾湯空心調一匙下齋腹中漸動是胎也

妊娠調理常服四物去地黃加黃芩白朮為末酒下又宜隨症加減用之可也

丹溪云荒蔚子活血行氣有補陰之妙命名益母以其行中有補也故曰胎前無滯產後無虛

黃芩白朮安胎之聖藥俗以黃芩寒而不用反謂溫熱藥能養胎殊不知胎孕宜清熱涼血使血循經而不妄行乃能養胎黃芩必取細挺沉實者用之

硝砂安胎治痛行氣故也一云硝砂非八九個月勿多用

當歸芍藥散 治妊婦心急腹痛及產後血運崩中又痢

當歸 茯苓 白朮各一分 川芎

澤瀉各二分 白芍藥 四分 八分

右剉分二貼水煎服 或為末酒調服

火龍散 治妊婦心氣痛

艾葉 五升半 鹽炒 川棟肉 炒 茴香 炒 各五升

右剉水煎分二貼用

紫蘇飲 治胎氣不和心腹急痛及治臨產驚氣連日不下

大腹皮 紫蘇葉 白芍藥 陳皮 川芎各二分  
當歸酒浸人參 甘草炙各一分

右剉分二貼姜五片葱一根水煎

臨生驚氣加枳殼白木砂仁

平安散 治姪娠喘急

厚朴製一分 乾姜炮 陳皮 川芎各一分

木香二分半 熟地黄一分 甘草炙半分

右剉姜三片鹽少許水煎

大聖散 安胎胎孕治胎驚悸

白茯苓 川芎 麥門冬 黃芪蜜炙當歸酒浸

人參 甘草炙 木香各等分

右剉每七錢姜三片水煎

麥門冬散

麥門冬 通草 滑石各一分 甘草炙

當歸酒浸 灯心各五分 細辛洗 人參各二分

右為末每三錢麥門冬湯煎下

大腹皮散 治姪娠大小便赤澀

枳殼麩炒 大腹皮 甘草炙各半 赤茯苓一两半

右為細末每服三錢葱白湯調服

羚羊角散 治姪娠中風或發搐

羚羊角銹 獨活 酸棗仁炒 五加皮各一分半

薏苡仁 防風 當歸酒浸 杏仁去皮尖

川芎 茯神各一分 木香 甘草各七分半

右剉姜三片水煎 分二貼

葛根湯

治妊娠臨月發風痙如癩名子癩

乾葛

貝母去心杜丹皮

防風

防己

川芎

當歸酒浸白茯苓

桂枝

澤瀉

人參

獨

石膏

甘草各等分

右剉每七錢水煎

貝母令人易產未臨月以升麻代之

驅邪散

治妊娠瘧疾

白朮

豆果

陳皮

藿香

良姜剉炒

砂仁

白茯苓各二分

甘草炙一分

竹葉湯

治妊娠子煩

防風

麥門冬

黃芩各三兩

白茯苓四兩

右剉每服四錢入竹葉五片水煎

鯉魚湯

治胎水

當歸酒浸

芍藥各三分白朮五分

白茯苓四分

右剉分二貼用鯉魚一尾剖去鱗腸洗水煮熟去魚每貼用

魚汁一匙辛姜七片陳皮少許煎空心服水未盡再服

天仙藤散

治子氣

烏藥

附米

陳皮

甘草

天仙藤洗炒

右剉每三錢姜三片木瓜三片紫蘇三葉水煎日三服腫消

止眼

桑寄生散

治妊娠胎動不安下血不止

茯神去木

白朮路一分桑寄生

當歸酒浸

川續斷酒浸阿膠蛤粉炒香附炒

川芎各一分半

甘草炙

人參各八分

右剉分二貼姜五片水煎



黃芩湯 治胎漏不安

白朮 黃芩

當歸酒洗 硝砂各等分

右剉每貼七錢水煎

黃芩湯 治孕婦痢疾

白朮 黃芩 芍藥各等分

右剉每七錢水煎 如小便不利加赤茯苓

香蘇散 治妊婦傷寒

紫蘇 川芎 白芍藥 白朮 麥門冬

陳皮 乾薑各二錢 甘草多一錢

右剉姜三片葱二莖水煎

真胎散 治孕傷寒大熱燥渴

蛤粉五錢 嫩荳蔻葉焙乾一兩

右為末每二錢入蜜少許調服

百合散 治妊婦風痰壅蔽

百合蒸 具母去心 白芍藥 赤茯苓

桔梗炒 紫苑 前胡各二錢 甘草多一錢

右剉分二貼姜三片水煎

又方 麥門冬 紫苑各四錢 桑白皮 杏仁去皮尖各炒

甘草多各一錢 桔梗炒三錢

右剉分二貼入蜜少許竹茹一塊水煎

桔梗湯

桔梗 紫蘇 桑白皮 人參 甘草各七分

天門冬 赤茯苓各一錢二分 麻黃一錢 具母五分

右剉姜三片水煎

卷一

六卷

桂芳

十七

安胎和氣飲治妊婦胎冷

訶子麩裏煨去核 白朮各二升 陳皮 良姜剉炒

白芍藥 陳粟米炒 甘草炙 木香各一升半

右判分二貼姜五片水煎

消風散 治胎熱毒上攻

石膏炒 甘菊花 荆芥 防風 羌活

羚羊角 大豆黃卷炒 川芎 當歸酒洗

白芷各半 甘草炙五分 好茶一升

右判分二貼水煎

天門冬飲子

天門冬 荒蔚子 知母各二升 防風一升二分

人參 五味子 茯苓 羌活各一升八分

右判分二貼姜三片水煎

無憂散 治胎肥八个月可服

當歸酒浸 芍藥 川芎各二升 甘草炙 木香各一升半

乳香另研 枳殼炒各一升 血餘即髮灰一升半 荷葉

右為末每三錢水煎服

枳殼散 瘦胎易產抑氣七个月來宜服

枳殼去穢四兩 熟地 粉草炙二兩

右為末沸湯調服 冷氣攻脇痛葱白湯下

下氣寬膈加香附姜湯下 大便秘加防風 二便不通加

白牽牛 躄弱加當歸木香 胎肥難產加乳香血餘

當歸散 金匱云婦人妊常宜服此

當歸 芍藥 川芎 黃芩各六兩 白朮三兩

六卷

性方

十

右為末每三錢酒調服日三次產後亦可  
安胎飲

白木 當歸 熟地黃 芍藥各一 川芎

黃芩 人參 陳皮各五 紫蘇 甘草各三分

一方 固胎

四物湯加白木 陳皮 甘草 人參

桑上羊藤兒七葉負者未詳今用桑絲即併蓋有效

右剉入糯米煎服加黃連黃柏 血虛加阿膠痛加砂仁

稟胎丸 至七八月服之

陳皮 三兩忌火 茯苓 七兩半 黃芩 炒夏一兩秋七兩半各

白木 二兩

右為末粥丸梧子每三四丸白湯

逐生散 八九月服數貼妙

白木 當歸 芍藥各一 紫蘇

人參各五分 陳皮 甘草各二 大腹皮 一 水煎酒

洗後黑豆汁洗方可用今人多忽殺人

右剉入黃楊腦葉七個葱五莖水煎服或加枳殼砂仁 春

加川芎防風 夏加五味子或芍或連 秋加澤瀉 胎動

加金銀草根 氣上或胎上逼加紫蘇地黃 性急加芫胡

多怒加黃芩 食少加砂仁神曲 渴加麥門冬 能多食

加黃楊腦 有痰加黃芩半夏

佛手散 探胎若被藥隘口噤欲絕用之

當歸酒浸 川芎各七兩半

右剉分二貼酒 盞煎將乾入水一盞再煎一二沸服如口

禁搶開灌少頃服不過三服如胎已損即下

冊溪方 臨月用服

當歸

川芎

陳皮

黃芩

香附

白朮

白芷五分 甘草三分

右剉水煎調益元散一錢服 虛加入參

安胎散 治妊娠自高墜下或被壓觸胎動氣脹下血用硝砂一

味炒熱透去皮 研為末熱酒調二錢或艾湯服如胃虛嘔

吐更宜服之服此後竟動極熱胎已安矣

立効散 治胎痛不安如重物所墜者如水當歸

川芎 各五

右剉水煎服

千金保孕方 辨疑錄以為藥品雖少其功甚大服此可以保全

旧方杜仲用姜汁炒續斷用酒浸又用棗肉丸今錄中杜中

用糯米湯拌炒續斷不用酒用藥末打糊丸米飲下旧方

仲斷各一兩此仲入斷三忌酒醋戒忿怒餘見前

立聖散 治妊娠下血不止雞肝二具好酒一升煮食連酒効

楊氏產乳方 治月數未足子死腹中母欲悶絕大豆三升醋煮

濃汁三升頓服立出

又方 月未足腹痛似欲產知母未煉蜜丸粥飲下二十九

子母秘錄方 八九月或傾墮驚傷得心痛青竹茹五兩酒煎

取五合頓服不瘥再服

產寶 妊婦腰痛鹿角燒令赤漬酒內冷再燒再浸七次細研空

心酒下方寸七

外臺秘要 孕婦得病欲去胎麥蘖一升為末水煮二升即下

又 孕婦不得小便滑石末水和塗臍下二寸効

黃連湯 治兒在腹帶黃連 二升甘草 一升濃煎令母呷之

又方以多年屋下鼠穴中上一塊令母噉之即止

千金方 臨產下痢山梔燒存性為末白湯調下一錢凡數服

又方 胎上逼心煩或六七月已後胎動困篤葱白二七莖濃

煎汁飲之即安若胎已死即出未効再服

傷寒類要 遭時疫熱病令子不墮灶下土水和塗臍乾又塗之

以酒調亦妙

又七个月傷寒壯熱赤斑變成黑斑瀉血以葱一把水二升煮

令熱服取汗食葱令尽

廣利方治熱病水調伏龍肝一雞子許服之

秘要治下血燒秤錘赤內酒中沸定飲脹滿亦可

秘錄治胎動不安銀者水入葱白作羹服

又臘月痛如折銀一兩水三升煎取二升飲之

楊氏產乳方 療母困篤恐不濟去胎方蜜虫十枚為末酒下

產蓐

脉經云欲產之婦脉離經謂一呼三至也雖離經而腰不痛者未

產也若腹中痛且令扶行或痛或止名曰弄痛不可便試水手探

亦不可屈腰眠卧如連引腰痛眼中如見火光此是兒轉又須令

扶策徐行診其尺脉轉急如切繩轉珠者即產之脉也須使物立

直至頻七陣痛難以行立然後坐草勿太早恐胎難轉側及胞水

先破子道乾澁皆致難產抱腰之人不得欹斜

臨產心中熱悶可用生雞子一枚吞服

產訖莫使睡且令閉目而坐頃之方可扶上床仰卧立膝勿令

伸足熟睡宜頻喚醒宜常淬醋烟以防暈悶少刻進少白粥

母令過飽

破水後經日不能產者却當隨症細辨。丹溪云多是氣血虛亦有氣血凝滯而不轉運者亦有因八九個月內不能謹慎者又云多見於鬱甚安逸之人富貴奉養之家古方瘦胎飲為其奉養過而氣實以此耗氣使和平非至論大全方中可選用又云紅見以馬齒莧下胎甚妙臨產時同煮食易產或催生散或如聖散甚者催生丹

難產惡症如身重熱作寒面黑舌青及舌上冷子母俱死面赤舌青母活子死面青舌赤口沫出者母死子活唇口俱青吐沫子母俱死不可不審當先與其家言之

胞衣不下停待稍久非難產母疲倦且血流入胞中為血所脹上冲心胸喘急痛悶以至危殆宜急斷脐帶以少物壓之尤宜用意拴縛然後割斷不然則胞上捲心而死須使其血不潮入胞中則自痿縮而縱延至二三日亦不害入惟欲婦心懷舒暢則自下不可妄以手法因而致殞

坐草驚然氣凌目翻口噤苦面黑唇青口沫出子母俱死若兩臉微紅子死母活用霹靂奪命丹急救之

橫生逆產多因坐草太早努力過多見轉未逮或以破水其血必乾若先露手謂之橫足先謂逆以致難產宜神應散養生方云此二味藥最固其血服之如魚得水自轉生

見枕因胎成之後見食母血有餘遂成結塊謂之見枕子欲生時血塊先破為敗血散聚其子致難產用勝金散

形肥氣虛難產集成云肥氣虛久坐懶於行走氣不運故胞胎亦不能自運如孕至五六月宜紫蘇飲加補氣藥服之則

易養尤宜順時令加減用之

盤腸產者臨產則子腸先出產後其腸不收用醋半盞冷水七

分調停噴面每噴一縮三變收又良法也 或用半夏末搐

鼻中即收

下死胎先以平胃散酒水各半煎至五分却投朴硝半兩再煎

數沸溫服胎化血水而下 丹溪以朴硝童便調一二錢熱

飲下胞衣亦不死胎

灸法治難產及橫逆者諸藥不効灸右足小指尖頭三壯下火

立產艾炷如小麦大

催產散

白芷燒灰存性或炒焦 滑石 百草霜即鍋底墨也

右為末勻歸煎湯調下

催生如聖散

臨產服則易產併治胎漏子藏乾澀難產清熱

連進三服良又氣寬胎滑即產打撲損胎死者亦下

用黃蜀葵花焙乾為末酒調下二三錢或子半合研亦良

催生丹

射香一字另 乳香一字另 母丁香末一字 臘月兔腦臍

去皮膜研

右研勻和丸如芡實子陰乾油帛密封每一丸溫水送下即

時產下驗其男左女右手中握藥丸而出

霹靂奪命丹

脩合之時勿令雞犬婦人見

蛇蛻一條入新瓦罐內煨 金銀箔各七片 蚕退紙燒灰一字

乳香半字 髮灰一字 黑鉛二字 半錢入米七字 半

急驚成砂子傾去研千里馬一隻洗燒灰一升即上左  
脚草鞋也

右為末用漬猪心血九如梧子大每服二九倒流水灌下如吞  
不下化開灌下効

神應散 治難產兼治月水過多崩中之疾

白芷 百草霜 等分為末童便醋調二三錢又用

蜀葵花四十九粒 滑石末三升 順流水煎湯調服

即生

勝金散 治見枕血塊先破難產

射香一多焙乾 兩用青布裹燒令紅研細

右為末順流煎湯調下一錢

勝金方 催產治難產用敗筆頭一枚燒灰研生藕汁一盞銀器

內煖溫調服

秘錄 治倒產難生原蚕子燒末飲服三錢

又治胎死并胞衣不出搶上心雀麥一朶五升水煮取二升汁

服本草云主產不出黃汁飲之

本草云 右廁木主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹

上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄以太歲所在日時取

之

又橫產用縫布大針二七枚燒令赤內酒中七遍服之

陳藏器餘云用搗藥鉄杵無則用斧燒赤投酒中飲之自然

順生 產室治胞衣不出燒鉄杵投酒飲之皆此意也

產後

丹溪云產後無得於虛當大補氣血為先雖有他症以末治之其



病多是血虛不可發表

古方二十一論并雜症列于後

一論熱病胎死腹中二論胞衣不下血流入胞脹治之稍緩脹  
滿腹中上冲心胸疼痛喘急者難治去法見產蓀下亦有初  
生後力乏不能更用氣力產胞經停遇風乘之血道閉澀者  
治各有方三論難產治法俱見產蓀下 具醫林集要

四論產後血暈因下血過多血氣虛極甚則氣息欲絕若作暗

風治誤矣宜芎藭湯 若係敗血冲心而致暈宜蒲黃散

二症須分別治韭菜薰法可通治又虛痰火作運

五口乾痞悶如果麵毒或傷飽所致宜見現丸若血氣虛乏宜

當歸芍藥散若勞傷或因事觸忤氣逆者宜人參白朮散若

少氣脚弱眼花頭暈飲食無味虛渴者宜熟地黃湯亦有血

熱心煩口乾者宜涼血飲

六乍寒乍熱有因勞傷血氣陰陽互相乘剋亦有惡露下少

滯經絡亦令寒熱必小腹急痛俱宜增損四物湯

亦有產前飢飽勞役致此虛羸喘乏如瘡狀四肢疼面痿黃

名蓀勞宜石子湯或腰子粥又表虛血熱而作宜知母湯或

增損四物加柴胡黃芩之類又惡露方下忽然斷絕寒熱往

來日輕夜重語言狂亂如見神鬼此熱入血室宜小逆胡加

生地黃治之

丹溪云發熱惡寒皆是血氣虛甚左手脈不足補血藥多右

手脈不足補氣藥多切不可發表 若兼腹痛者當去惡血

若腹滿者非惡血也

七面目四肢浮腫此由敗血乘虛停積五藏流入四肢致令浮

腫若作水氣投以甘遂大戟以導水殺人宜黑龙丹或四物

加減血行則腫消

八乍見鬼神言語顛倒此因血耗勞傷敗血奔冲和淫於心非風邪也宜黑龍卅亦有血虛心氣不足七情鬱抑而致宜辰砂妙香散當歸生地黃煎湯調服又有熱入血室而顛狂者小茈胡加生地黄主之服至百服方安

九產後不語因敗血停蓄上干於心心氣閉塞則舌強而不語宜八珍散

十腹痛又瀉痢因飲冷當風遂致腹脇疼痛腸鳴洞世宜治中湯或胃風湯切當若洞泄不已利下赤白宜木香黃連湯繼以白朮聖散子又食肉太早強食過多停積不化脘腹疼痛而成泄痢法當消化宜見現丸或治中湯加砂仁更好若因伏暑而得又當於痢內參用

又有止是腹痛而不泄痢者有因勞傷虛損吸七少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲食宜當歸建中湯月內常服令人健又敗血不散見枕塊硬疼痛發渴及新產乘風內搏惡露不快作疼宜當歸散或四神散又有氣壅血滯而疼者宜當歸烏藥二味為末豆淋酒下三錢丹溪云血刺痛用當歸乃和血之法若因積血而刺痛宜桃仁紅花當歸頭又惡露不尽小腹作疼用五靈脂香附為末醋丸甚者加搗尖桃仁

十一遍身疼痛甚則腰背強健手足拘挛或身熱頭痛乃血氣失度留滯關節宜趨痛散若餘血不尽流入腰脚疼痛宜如神湯

十二大便秘澁因津液暴竭宜搗杏丸潤滑之甚麻仁也通

利之 若秘而口門緊痛臨則艱苦股栗惠濟熏洗法

十三血崩因血氣暴虛未得平復或因勞後或因驚怒致血暴崩又有氣衰血弱亦變崩中若小腹痛甚此肝經已壞難治俱宜固經丸止之若小腹不滿急是內無瘀血可用若脹滿不宜用且服芎藭湯或黑龍丹惡血崩者十灰丸亦得

十四腹脹滿悶嘔吐因惡露下少敗血乘虛散於脾胃宜抵聖湯 亦有惡露過多氣無所主聚於脾胃而然者於抵聖湯中去澤蘭芍藥倍加生薑陳皮也

十五口鼻黑起鼻衄緣氣消血敗榮衛不理虛熱變生此症不可治名曰胃絕肺敗急取緋線二條并產婦頂心髮二條繫兩中指上節止無藥可療亦厭禳之一端也

若曰鼻無黑氣起止是鼻衄黑神丹犀角地黃湯皆可

十六喉中氣急而喘因所下過多榮血暴竭氣無所主獨聚於肺故令喘也此名孤陽絕陰症已不可藥救似難坐視其死經驗方二方姑與救之 至如敗血潮肺作喘經驗方血竭散用之尤的不可忽也

十七中風傷動血氣腠理空疎勞役太早風邪乘虛而入或身躄痺痺不仁口眼喎斜乃中風候宜小續命湯然其症手足搖擗者當去附子用清心辛涼之劑 又有五七日強力下床或月裏秀事或懷發怒動擾冲和得病之初眼澁口噤肌肉瞤動漸致腰背筋急強直者不可治此乃人作非的係風也 丹溪云中風及口眼喎斜等症不可作風治非真中風必大補氣血然後治痰切不可小續命湯服之當以左右手之脈分其氣血多少而治

十八心痛因產太虛寒搏於血氣遂上冲心之絡脉宜七岩蜜湯 若因七情傷感血與氣併而心痛宜玄胡索湯 若真心痛手足青冷且發夕死

十九熱悶氣上轉為脚氣產婦平日素感風寒蒸濕襲着足經因乘產虛而發其狀或卒起脚弱熱悶心煩兩足痛痺嘔吐氣上背其候也宜獨活寄生湯嘔者生地黃倍生姜

二十汗出多而變瘥因血虛腠理不密過汗風邪搏之故變瘥口禁腰背強直如癎狀搖頭馬鳴身反折須臾又發氣息如絕宜速指口灌舉卿古拜散并後方稍緩即汗出如兩手不及拭不可治

二十一所下過多虛極生風因血下太多氣無所主唇青肉冷汗出目瞑神昏命在須臾若以風藥治之誤矣宜服濟危上丹 若感於異症手足牽搐咬于唇鼻宜增損四物湯以秦光湯

○產後霍亂氣血俱傷或飲食不消冷熱不調上吐下利故曰霍亂也經云渴而飲食者五苓散寒多不飲水者理中丸白朮散亦可

○產後瘡疾寒熱相半或多熱者宜草果飲子多寒宜生熟飲子

○咳嗽痰喘若惡露上攻流入肺經宜二母散 若血風感冒宜旋覆散

○產後忽冒悶汗出不識人事者暴虛故也宜立効散若自汗壯熱身軀強氣短腰脚痛或重宮田歸黃芪湯

○婦面白心鬱半夜產侵晨運厥急於氣海穴灸十五壯而甦

後以參朮等藥服 白薇湯主之

○產後頭痛宜四物隨症加減

○惡露淋瀝不斷面黃肌瘦宜牡蠣散

○小便不通腹脹如鼓悶亂不醒用鹽填臍平葱白去苦皮檢

成餅安鹽上灸火灸覺熱氣透腹即通

○產後諸淋茅根湯 又因叔生不謹損破尿脬以致淋瀝

○小便數及遺尿桑螵蛸散

○產後吃噁心煩脾胃虛寒氣厥宜丁香散

○乳汁不行丹溪方 吹乳及乳癰梅師方

丹溪云產後不可用白芍藥以酸寒伐生發之氣 又云乳母

但竟小水短少即是病生便須調理 即佛手散具浴下 各各不同加減隨用 具通浴下

蒲黃散 治惡露不快冲心煩悶喘急昏迷狂女欲絕

乾荷葉少 玄胡索 牡丹皮 生地黃

甘草後各二錢 蒲黃生六分

右剉分二貼水煎入蜜少許服

丹溪法 治氣血俱虛痰火泛上作運

用二陳湯隨氣血加減 或硃砂安神丸臨臥以麥門冬煎

湯下

經驗方 治血運韭菜切入瓶中熱醋沃之急封瓶口以瓶嘴向

鼻熏之 又方用紅花五斤 為末酒煎服

一方 治血暈昏迷用五靈脂為末三錢半生半炒湯調或酒口

禁非開灌 加荆芥用童便酒調尤妙 又用鹿角燒灰出火毒研酒調灌即醒行血極快

黑龍丹 治難產或胞衣不下或產後血暈血崩血風血滯及胎前產後一切狼狽垂死之症並皆救療

當歸酒浸 生地黄 川芎 良姜各三兩 五灵脂

右剉入泥確內紙筋鹽泥固濟炭火燒通紅候火冷取出細研入百草霜五兩 生硫黃 乳香各一分半 琥珀 花藥

石各一分 右五味細研與前藥同再研和均醋糊丸彈子大每服一九燒紅投姜汁內浸碎之重便酒調服神効

見現丸 治飲食過飽因產脾胃弱致口乾痞悶

良姜炒 姜黃洗 萹澄茄 陳皮 人參 蓬莪木炮 三棱 炮各等分

石為末羅薑汁煮麵糊丸梧子大每二三十丸羅薑湯下

全山木散 產後勞傷因事忤怒上逆口乾煩悶

人參 白木 薄荷 砂仁 生地黄 茯苓 甘草炙 黃芩 滑石另研 藿香各等分

右剉每貼七錢水煎

熟乾地黄湯 產後虛渴

人參 四分半 麥門冬 三分 甘草炙 一分 括萎根 六分 熟地黄 酒浸焙乾一分半

右剉分二貼姜五片東二枚入糯米一撮水煎

涼血飲 治血熱口乾煩悶或經水不調遍身生瘡

黃芩 赤芍藥 川芎各二分 甘草一分 荆芥 生地黃 麥門冬 括萎根各二分

右剉分二貼灯心十莖竹葉十片水煎

有寒熱加羌胡秦艽

此濟陰第一方

黑神散 產後瘀血諸疾並皆治之

熟地黄

當歸並酒浸赤芍藥

肉桂去粗皮

乾姜炮

甘草炙

蒲黃各四兩黑豆半升炒去皮

右為末每服二錢童便酒煎沸溫服

石子湯 治羸勞虛之寒熱如瘧面色痿黃

當歸

白芍藥 葱白

糯米

香豉無以知母代

猪腰子

一雙去脂膜切四片一方用人參無芍藥

右剉分二劑每用水三升煮一升半作三次服

知母湯 產後寒熱通身溫壯心煩

知母

四分赤芍藥

黃芩三分桂心一分六分

甘草炙一分

内閣文庫  
番號 漢 13080  
冊數 3 ( 3 )  
函號 301 70