

本
草
權
度

上

中醫古籍善本叢書

本草權度

中醫古籍出版社

据明嘉靖十四年乙未
(一五三五)刻本影印
高一百九十六毫米
宽一百四十五毫米

内 容 提 要

《本草权度》三卷，明·黄济之撰。约成书于十五世纪末，刻版于明嘉靖乙未（一五三五年）。

黄济之，字世仁，号束斋。馀姚（今属浙江）人。生活于景泰、成化、弘治年间（一四五〇—一五〇五），生卒年不详。黄氏以医名于乡，又被荐于礼部，值尚医事。《本草权度》虽以「本草」为名，但并非专门的药书。该书「即荣卫以知脉，即脉以知病，即病以用药，而医道备矣。犹权之知轻重，度之知长短」，故知本书实即一部「临证诊治用药备要」之类的综合性医书。

全书三卷。卷首为「本草权度图」，用图、表的形式介绍了脉法、经穴等内容。作者的脉学思想有独到之处，他认为「高、下、大、小、体也；疾、迟、软、强。用也」，因而以此八字为纲领，统领其它十六脉。这种统脉法可谓独树一帜。

三卷中共列述病证七十二类，末为「杂论」、「杂治」及有关脉诊、望诊、五脏虚实用药法等内容。各类病证以「脉、因、证、治」四字为纲，列述有关内容。其中

「脉」为该病证主脉；「因」则分析病证产生原因，并列前贤精论以证；「证」为各种见症；「治」则先介绍治疗大法，次列所用方药。以上四项内容，又据病证实况，或并或缺，不拘泥于四项分立。各证述事论治条理清晰，简明实用，为明代同类著作中之佳品。

从作者所引的医家论说来看，比较推崇宋代的许叔微、陈无择，以及金元时的刘河间、张从正、李东垣、朱丹溪诸家。他在「杂论」中提出：「气常有余，血常不足」，较之朱丹溪「阳常有余，阴常不足」似更为具体。在审证求因方面，他有「诸病寻痰火，痰火生异证」之说。至于用药，该书集录了许多经验之谈，如「肺痈非吐不可」；「气血弱，远枳壳，以其损气；气血盛，忌丁香，以其益气」；「春夏不服麻黄，秋冬不服桂枝。夏不服青龙，冬不服白虎——为医者当谨之」。此外，作者认为「诊脉、观形、察证」三者殊途，不可执一，这一将多种诊法合参的思想是完全正确的。书末「五脏虚实用药法」（又名「脏腑应候属用药味」）分脏腑虚实罗列见症及常用药物，各药下又注明「君」、「臣」或主要功能，颇便于临床

选用。

今影印的明嘉靖本，字体遒劲，颇有宋刻之风。系明代初刻以来国内首次影印行世，必将为中医临床增添新的宝贵资料。

（郑金生）

本草權度目錄

上卷

五臟虛實

五臟絕死

脉法

經絡圖

大小遲疾軟強之圖

脉體升降之圖

中風

中暑附暑風

卒尸

附魔

厥

痿

痺

麻木

破傷風

厲風

肺風

冷丹

痛風

歷節風

疰

傷寒

大頭腫痛附喉

霍亂

瘟病

瘡

中卷

疸

勞附勞熱

勞瘵

熱附熱

吐血衄血下血

下痢

泄

自汗附頭

淋閉

附小便不禁腎臟風

頭痛

附腦痛眉骨痛

眩暈

心腹痛

附胃痺

腰痛

附腰膝重痛腰軟

肩背痛

附背痛

脇痛

附身體痛

欬逆痰嗽

喘

附孝

宿食留飲

附痰飲

噯氣吞酸嘈雜

附氣榮

積聚

附痰塊

消渴

痞

腫脹

嘔吐噦

噎膈

下卷

瘡瘍

癰疽

乳癰

瘰

發斑

丹疹

金瘡

傾仆

百藥中傷

癩狂

驚悸

疝附癩

脚氣

蟲

喉痺

口

舌

目

耳

鼻

齒

結燥

痔漏

婦人胎產

帶下

經候

崩漏

小兒

雜論

雜治

五臟證

七情證

雜脈

察視

汗

五臟虛實用藥法

本草綱目

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

五臟虛實

虛

實

肝

脇下堅脹寒熱腹滿
不食如人將捕日睛黑
花筋癭節痛爪枯青色
恐 脉沉細而滑

脇下痛寒熱心下堅滿
氣逆頭暈目直背強筋
急目赤腫耳聾
怒 脉浮大而數

膽

主嘔汗 主脹

心

心腹暴痛心膈脹滿時睡
清涎多熱惡恍惚少顏
色 舌木強 脉浮虛

心神煩亂面赤身熱舌
主瘡咽燥頭痛手心熱
衄 血喜笑 脉洪實

小腸

主宿食 脹

脾

四肢不舉飲食不化吞
酸或不下食食則嘔腹
痛 腸鳴溇泄 脉沉細微弱

心胸煩悶口乾身熱煩
腫體痛腹脹寒饑舌
根腫四肢急墮泄不利

胃

主癖 脹

中風本位浮遲
中寒本位沉緊
細脹水憂思

中風本位浮洪
中寒左關緊弦
脹水 惡血

肺

語斷用力掉顛少氣不足咽中乾無津液欬喘鼻清涕恐怖耳聾

胃膈痛上氣咳逆咽中不利鼻赤口張飲無度痰粘肩背背痛

脈沉緩
脈不上不下
舌燥咽乾腫心煩胃膈時痛喘嗽小腹滿腰強痛體重骨足下熱小便黃腫脛腫盜汗脹泄

腎

腰背切痛不得俛仰足脛酸手足冷呼吸少氣骨節痛腹結痛面黑耳鳴小便數脈浮細數

小便不通或澁尿血淋閉革中痛脈沉濡滑

中風本位浮滑
冷濕房勞
中寒本位沉陰而滑
脹水

膀

面色無光尿多寐中不

腕覺小腹氣痛攻衝腹脇

大

水穀不化腸鳴泄痢

致廁艱難
糞結皮膚瘙痒

吐逆手足冷

致廁艱難

五臟絕死

心絕有息回眄目直掌

心頭痛而欬不止關節

腫狂亂悶熱一日死

不通身重不巳三日死

肝絕汗出如水恐懼不安

頭痛目眩肢滿囊縮小

伏臥四肢之目直如盲

便不通又云身熱惡寒

面青舌捲蒼黑泣下

四肢不舉脉當弦長今

八日死

反短濇十日死

脾絕口冷足腫脹泄不覺

色黃體重失便目直視

面浮黃唇反十二日死

唇反張爪甲青四逆節

肺絕口如魚氣出不快唇

足滿泄利不覺鼻孔開而

反無紋皮毛焦三日死

黑枯喘而目直言音啞急

短氣

腎絕大便赤澀耳乾下血

舌腫是浮齒痛目盲膜

折汗如水髮無澤面黑

胃絕口禁唇黑四肢重

如山不能收持大小便自

利無休飲食不入七日死

腸絕髮直汗不止不得

屈伸

骨絕腰脊痛不可反

側腎中重足膝復平

五日死

脉法

腿筋痛小便閉兩脇脹

目盲又云陰縮小便不出

出而不快

舌強語澀轉筋卵縮牽

陰股痛不食鼓脹變水泄

不卧
又云齒落目黃七日死

大腸絕泄痢無度六日

死

肌絕口冷足腫脹泄

不知人十二日死

筋絕驚恐爪甲青呼

罵九日死

虛實氣血風寒濕熱喘滿欬

浮乳滑實弦緊洪遲緩濡弱瀋微沉伏細數虛

虛陽勞

下

盜汗

實虛虛虛少脹上虛

少敗虛

痺痺

暑傷

下 癩 水 腫 痰 癩 癩

痰

飲飲

飲

心

泄

疝

泄泄

痰亂霍

癩癩

大便不禁 虛臣 癩

鼻

自鼻汗鼻

浮乳

實弦緊洪

濡

濇微

動為恐為痛為驚為攣

痰飲血積氣

革代散 革為虛寒


經絡圖

血行用諸治 諸 治諸用行血

血病氣

剝下裏 耳搏血 血凝寒 血傷熱 血傷濕 痰飲雜血 勞傷血耗 七情血逆失 心不歸經 肝無血死 小腸血虛不和 胃血虛死 腎 膀胱血	沉浮 小大 滑濇	表上陽 風氣受 寒傷肺 熱傷肺 濕傷肺 痰飲 <small>氣不利</small> 勞傷 <small>損氣</small> 七情 <small>氣逆氣鬱</small> 肺 <small>氣不利</small> 脾 <small>虛氣滯</small> 大腸 <small>氣壅</small> 胃 <small>氣胃氣滯</small> 腎 <small>氣化</small> 膀胱 <small>虛則羸</small>
--	----------------	---

脉體升降之圖



浮在皮膚按之不足舉之有餘虛也

人迎風邪在表

氣口陰陽耗散

左寸應三頭痛目昏有熱

右寸宿食滯氣肺風逆喘左關應腸下滿

右關脾熱胃風

跌陽胃虛

左尺如經

右尺腰膝脚弱

芤與浮相似血虛也

人迎風熱血湧

氣口積滯在胸

左寸衄血

右寸吐血

關上

脾胃虛熱
腸癰便血

尺中血淋

滑浮中如有力濇濇如欲脫與數相似為實下陽氣衰

寸口伏痰外熱

左關畜血在肝

右關痰積

跌陽胃氣不行

左尺陰邪相干腰痛

右尺便精遺瀝滯

實

人迎風寒熱感

氣口喘嗽上道

左寸

氣壅咽喉胃中
痛血利尿不利

右寸

如經身熱
大便秘

右關

胃實脾虛為實
食不消大便下積

左關

肝實
腸下痛

尺

小腹痛
便不禁

弦

浮緊為弦為水氣

中虛

寒癖

拘急

飲瘕

左寸

風寒相侵頭痛

右寸

痰飲宿食

右關

胃腕寒痛

左關

筋急瘧疾
如經

右尺

腰痛小腹拘急

緊

數如切絕

為寒

人迎感寒

氣口頭痛拘急

左寸

心痛或虛

右寸

欬嗽喘急

左關

兩脇痛滿

右尺

寒濕在下焦

左尺

如經

洪

浮大與浮相似
為氣熱

人迎

寒壅諸陽氣口氣實
左寸實熱

右寸

心氣燥結傷食

左關

風熱在肝右關反胃胃熱

右尺

熱在下焦

微

極細而軟欲絕似有似無按之欲盡擊乃得
尺曰薄寸下決與滑似為虛

左寸亡汗 右寸吐血 左關肝虛少血 右關經

左尺如經 右尺失氣遺泄

沉為水實鬼疰

左寸血實 右寸氣實 人迎寒薄陰經 氣口血滯而凝

左關無辭左關 右尺腿膝疼 左尺如經

緩浮大而軟與遲相似 為虛

人迎風虛煩喘 氣口怒極傷筋 左寸血虛頭痛暈 右寸肺風乘張

左關筋脈弛張 右關風熱結縲 左尺如經腎虛 右尺遺瀝

瀉 細而遲往來難且散或止復來浮而短又短而甚為少血 寒濕

左寸短氣心忡 右寸如經 右關胃氣不足 右關如經

右尺大便難便數 左尺如經困憊

遲 三至按之牢舉不足按有餘 為寒

左寸 心寒痛 右寸 咽酸 右關 膈脇痛 右關 如經

右尺 大便難水穀不分 左尺 如經

伏 至骨得為實 水氣 痰飲

人迎 寒濕 氣口 積聚 右寸 肺痿痰 左寸 如經

左關 驚悸水泄 右關 如經 左尺 痲冷寒 右尺 水穀不化

濡 極軟而浮 細按之無舉 有餘輕手乃得 與遲弱相似 為虛

左寸 如經陽弱惡寒 腎邪干心 右寸 欬唾沫痰 中虛喘息 左關 筋弱緩

右關 脾濕虛冷 左尺 小便難虛 右尺 脚痺

弱 極軟而沉 細舉之無按之乃得 為虛 悸經

左寸 如經陽虛 右寸 氣虛短 人迎 風濕縱緩 氣口 筋骨弛

左關 風熱肝虛 右關 脾弱多泄 胃或客熱 右尺 大便溏泄 滯下 左尺 如經

細 畧大於微 常有但細耳 為血氣俱虛

人迎濕中諸經 氣口少氣逆疑 左寸心虛勞神右寸氣憂傷

左關驚悸脇痛 右關如經上耗 右尺遺泄小便利

數為虛熱

人迎風雅燥盛 氣口陰虛陽併 左關怒虛筋急右關脾熱食噉

右尺大便難熱葉 左尺如經

動見關上無頭尾大如豆動搖不進不退為瀉 虛驚

左寸心驚神恐 右寸寒極冷痛左關血虛

右關脾虛為痛泄兩尺真氣俱弱

虛遲大而軟按之不足豁然空

人迎胃暑氣泄 氣口血氣走越 左寸心虛神不安右寸肺虛邪易侵

左關 右關脾虛寒泄左尺失精漏血 右尺傷暑

促去來數而一止復來

皆以痰飲氣血留滯不行則促
結去痰藥而止復來

皆積

革代散全圖

瘖風腦強後百前頭上神

中行髮際至五分寸半寸半寸半寸半寸半寸半寸五分五分前際

門府戶門頂會頂會星庭

二行

天髮際

玉寸半絡寸半

通寸半

承寸半五處差五分

三行

五風池

腦寸半

承寸半

正寸半

目寸半

臨五分

耳後陷中



○頰耳下二韭夫

○會耳微前陷中

○下耳前起骨關開口有空

○聽耳中珠子大

○上耳前開口有空

○耳前起肉

○和耳前兌髮下

○孫耳郭中開口有空

附魄膏神意膈魂陽意育志胞秩

分門育堂喜關門罡舍門室育邊

大風肺厥心督鬲肝膽脾胃三腎氣大關小旁中白

杼門俞陰俞俞俞俞俞俞俞俞俞俞俞焦俞海腸元腸光旋環

大陶身神靈至筋中脊接懸命陽腰

椎道柱靈臺陽縮樞俞脊樞門關俞

大風肺厥心督鬲肝膽脾胃三腎氣大關小旁中白

杼門俞陰俞俞俞俞俞俞俞俞俞俞俞焦俞海腸元腸光旋環

附魄膏神意膈魂陽意育志胞秩

分門育堂喜關門罡舍門室育邊



缺刻 側腕上寸半

尺澤 孔最 腕上七寸 經渠 太淵

曲澤 郄門 去腕五寸 間使 三寸 內關 去腕二寸 太陵

少海 靈道 掌後寸半 通里 神門

曲池 三寸 三里 上廉 溫溜 腕後五寸半 偏歷 腕後三寸 陽溪

四瀆 肘前五寸 三陽絡 寸支 溝 後 寸支 關 陽 池

少海 支正 腕後 寸支 宗會 腕後 二寸 陽谷

大 天府 俠白 去肘五寸 肘

中 青靈 去肘三寸

小

活味下天下華紫五膳中中五五尾尾闕上中中建下寸分寸寸齊中

雲中周曾天食
期日腹
三半
大橫

門府榮鄉溪竇
門月哀
三半
大橫

氣庫屋肩乳乳
不承梁闕太滑
天橫

戶房翳窓中根
容滿門門乙肉
天橫

諭或神靈神步
幽通陰石商
育

腑中藏墟封郎
門谷都關曲
俞

諭或神靈神步
幽通陰石商
育

腑中藏墟封郎
門谷都關曲
俞

氣庫屋膺乳乳
不承梁關太滑
天

戶房翳窓中根
榮滿門門乙肉
樞

雲中周曾天食
期日腹
三半
大橫

門府榮鄉溪竇
門月哀
三半
大橫

門府榮鄉溪竇
門月哀
三半
大橫

京門寸八分帶三分到五

側脇邊

章門五寸三分到維三寸居

外大寸水二寸歸寸氣

中四寸氣寸大寸橫

臍寸陰五分氣五分石寸關寸中寸骨寸半寸橫

中四寸氣寸大寸橫

外大寸水二寸歸寸氣

章門五寸三分到維三寸居

京門寸八分帶三分到五

側脇邊

橫骨至內輔上廉一尺八寸

髀骨外跳環髀骨外膝上三寸

膝上伏兔膝上六寸膝上三寸

魚腹上筋間

股內廉陰膝上四寸股內

內踝至地三寸

太陽崑崙外踝後申脉外京骨大骨小下

少陽丘墟外踝如前去臨泣半地五會寸俠溪四

陽明解溪寸半衝陽三陷谷寸二內庭

厥陰中封內踝前寸太衝本二行間

太陰商丘內踝微前公孫本節太白大都

少陰呂細內踝後

太 陽 少 陽 陽 明 太 陰 厥 陰 少 陰 陰

委中

合陽 腓下
二寸

承筋 腓上
七寸 承山 腓下
分間 付陽 外踝
上三寸

陽關 積鼻外陽
陵上三寸

陽陵

陽輔 外踝上
四寸

懸鍾 外踝上
三寸

犢鼻

膝窩下解
大筋繖中

三里 三寸 上廉 寸

豐隆 外踝六寸
下廉 上廉下三寸

陰陵

地機 膝下
五寸 中都 內踝上
七寸

曲泉

膝內輔骨下
曲膝橫紋頭

膝門 積鼻
寸二

漏谷 內踝
六寸 三陰交 內踝上
三寸

陰谷

膝內輔骨後
大筋下小筋
上屈膝取之

築賓 內踝上
臍分間

復溜 踝上二寸

本草權度卷之上

中風

脉微而數中風頭痛脉滑者中風風脉虛弱也○寸口脉浮而緊○寸口脉緩而遲皆曰中風也○脉經云浮而大者風浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉又滑而浮散者癱瘓風○診人被風不仁痿蹙○其脉虛者生堅急疾者死

因熱甚生風血虛有痰涎壅口目喎邪語言蹇澀○内經曰風之

傷人也或為寒熱或為寒中或為熱中或為偏枯

風善行而數變至其變化乃為他病○要略云風之為病當身不遂經絡空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁在經即重不勝邪入腑則不識人入臟即難言口吐涎○千金云岐伯曰中風大法有四一曰偏枯半身不遂二曰風痲於身無痛四肢不收三曰風懿奄忽不知人四曰風痺諸痺類風狀

證治中腑者面加五色有表證著四肢脉浮惡風寒拘急不仁先以小續命湯加減發其表調以通聖

散辛涼之劑○中臟者唇吻不收舌不轉而失音
耳聾而目瞽鼻不聞香臭便秘二三化湯通其滯
調以十全四物○血虛有痰半身不遂涎潮昏塞
宜以四物四君子隨氣虛血虛加二陳湯用之調
以涼劑導痰行氣也或權宜吐之○中經者內無
便溺之阻外無留結之患宜以大秦芎調之○手
足拳攣筋脉抽掣中於風冷者脉應弦急治宜暖
風之藥手足躄曳四肢癱緩中於風熱者也脉應
浮緩宜涼風之劑○口目喎邪乃風賊陽明胃土
者也有寒則急引頰移口熱則筋緩不收偏於左

則左寒而右熱偏於右則右寒而左熱也

小續命湯治表

麻黃

桂枝

芍藥

甘草

人參

黃芩

防已

川芎

杏仁

一兩

防風

兩半

附子

半兩

無汗惡寒加麻黃杏仁防風

無汗身熱加白

虎 無汗身涼加薑附

有汗惡風加桂枝

仁芍藥

有汗身熱加葛芩桂

有汗無熱加

桂附

三化湯治裏

厚朴

大黃

枳實

大秦芎湯養血榮筋

四物湯

秦芎三兩

獨活

羌活

甘草

防風

白芷

白朮

茯苓

一兩

石膏

二兩

細辛

半兩

獨聖散吐涎潮

瓜蒂

一兩炒黃末

茶末

三錢

蠶汁調下則吐如風

癰加全蝎有虫加狗油雄黃芫花吐吐後須降

火安神

瀉青丸治風熱瀉木安脾

川芎

當歸

防風

羌活

梔子

龍膽

大黃

蜜丸竹葉湯下

通聖散

瀉青去羗活龍膽加麻黃薄荷荊芥芍藥芒硝

連翹白朮

各半兩

桔梗黃芩石膏

各一兩

甘草

二兩

滑石

三兩

薑煎

二陳湯加竹瀝薑汁治痰氣虛加四君子湯血虛

加四物湯

中風有急中不省口角流涎喉中作聲脉浮緩者

先去其痰後治風熱又次養血益陰其証有不

同者皆風熱涎潮隨其何臟有虛而襲之

如肝虛中風脉應左關面色青診在目右脇偏痛
筋急頭目瞶○心虛中風脉應左寸面色赤診在
舌不能言不可轉側呼怒叫○脾虛中風脉應右
關面色黃診在唇怠惰不能飲食嗜臥如醉○肺
虛中風脉應右寸面色白診在鼻喘逆面腫○腎
虛中風脉應左尺面色黑診在耳面龐然浮腫腰
脊痛○胃虛中風脉應人迎兩關並浮而大飲食
不下腹脹食寒則泄噎斜不隨邪中心肺涎潮逼
塞○四肢縱緩以風散涎注於關節氣不能行故

四肢不遂○舌強不能言以風入心脾涎中之口
禁不能言以風冷客滯心肺涎塞也○四肢拘攣
以風冷邪氣中肝臟使筋攣也○風柔以熱風中
肝臟使筋緩也

不治証脉急而大數者死鼻下赤黑相兼吐沫身
直者死汗出不流如珠與汗出不止呼吸有聲者
死口如魚口氣粗面紅者死口開目開手散聲如
鼾死髮直口吐沫膈滿咽如鋸喘息搖頭者死晝
惡寒夜煩躁者死

中風寒一如中風止牙車緊不動爲異○中風溼

一如中風証止兼脹滿身重便利不禁○中寒手足攣急疼痛四肢冷口禁失音吐沫挾風則暈眩兼溼則腫疼也○中溼腹脹四肢關節疼痛久則浮腫挾風眩暈嘔吐兼寒則攣拳掣痛脉沉而細微緩○中風暑一如中風止四肢緩弱○中寒溼溼寒二証相兼○中暑溼一如中風手足躡曳入浴暈倒骨解○中氣一如中風於七情中發宜順其氣脉沉伏大法風浮而氣沉也○中痰素有畜痰隨氣上厥○中尸口開目直手撒形脫者死脉紫而急者死堅而細者死強而數者死○中惡如

醉如狂乃心氣虛有恐治宜鎮神以降火唇青身冷脉小者死

筋急者肝中風肝中寒筋實熱筋虛○轉筋者筋虛○關節痛筋寒肝寒○脚心痛筋實熱傷血不能養筋故爲拘攣○溼傷筋不能束骨故爲痿弱○十指甲痛筋虛十指甲捲是血少不能養筋○曲踈不伸肝中風○瘖不言心中風中溼痺瘕○舌捲囊縮肝中寒筋虛○頭目瞶動肝中風○皮肉瞶動脾中風○四肢關節疼有中風中寒中溼肝虛有留飲歷節脚氣有虛○身體疼有溢飲虛

寒搏之有溼傷血也亦有血虛而痛也

中暑

暑風

脉虚则身热○或浮自汗

自汗者火動而散故也

因夏火大熱損傷肺金元氣其感有二動而得之乃辛苦之人動而火勝熱傷氣也脉洪而大靜而得之乃安樂之人靜而溼勝火勝金位脉沉而實

證治暑喜歸心入心則噎塞昏不知人入肝則眩暈

入肺則喘滿痿痺入脾則昏睡不覺入腎則消渴

○病則怠惰嗜臥精神不足兩脚痿弱頭痛惡熱

大渴引飲大汗

因動而中白虎加人參湯主之頭痛惡寒拘急肢
節疼大熱無汗○因靜而中大順散白虎加蒼朮
○有陰勝陽之極甚則傳腎肝爲痿厥清暑益氣
湯主之

凡中暈死切忌與冷水涼處須沃以湯宜黃龍圓
主之○心虛傷暑身熱頭痛煩悶而渴五苓散主
之○肺虛傷暑身熱煩悶而喘白虎主之○脾虛
傷暑則爲疫瘧常山飲主之○黃連香薷湯治暑
身熱挾痰加半夏虛加人參黃芪○清暑芩薷湯

治暑傷金虛甚者○玉龍丸曾用治暑○油炒半
夏生薑汁丸治暑傷生痰○補中益氣湯治注夏
○淡滲二苓湯治春夏之交病似傷寒自汗體重
痛難轉側此名中溼

澤瀉

一兩

滑石

二兩

茯苓

猪苓

白朮

各半兩

○不治証四日之外譫語口乾潮熱失視失溲者
死

○暑風 挾火挾痰實者可用吐法

玉龍丸治暑泄瀉或二便秘

焰硝

明礬

滑石

硫黃 各一兩

白麩

六兩

右為細末水丸水下

卒尸 附 魘

脉寸口脉沉大而滑

沉者實滑則氣實氣相搏入臟則死入腑則愈唇青身冷為入

臟死身温和汗自出為入腑愈

○緊而急者遁尸○厥呼之不應

脉絕者死脉當大反小者死

因心氣虛有恐精神不全有熱遂為邪鬼所擊其證

萬端如醉如狂世所謂衝惡是也○因風寒暑濕

不正之氣中人之虛而卒然暈倒自依風寒暑濕

中之治法治之又痰隨氣所使亦然難以中惡同
論病有似像宜消息之

證衝惡之病卒心腹脹滿吐利不行如乾霍亂或罵
詈妄談如醉如狂登高悲泣呻吟不欲見人

治宜鎮心神以降火○還魂丹治中惡已死

麻黃 三兩

桂 二兩

杏仁 一百二
十粒

煎服

桃奴丸治心氣有熱尸疰魘夢驚癇

桃奴

七箇

辰砂

半兩

桃仁

十四箇

玳瑁

一兩

牛黃

一錢

龍腦

一錢

麝

一錢

雄黃

桃葉

煮

琥珀

另研各

黑犀

石上水

安息香

一兩

酒

飛去

生

銀器中入桃仁
琥珀熬成膏

右末和入前膏丸如雞頭大

陰乾參湯下

蘇合香丸可服 李用參膏大補

○魘死 用半夏研極細末吹鼻中

厥

脉沉微而不數謂之寒厥沉伏而必數謂之熱厥

因因虛 因痰 因熱

證厥當分二種次分五臟寒厥為手足寒也陰氣勝

則寒其由乃恃壯縱慾於秋冬之時則陽奪於

精氣下溢邪氣上行陽衰精竭陰氣獨行故爲寒厥熱厥爲手足熱也陽氣勝則熱其由乃醉飽入房氣聚於脾胃陰氣虛陽氣入則胃不和胃不和則精竭精氣竭則四肢不榮酒氣與穀氣相搏則內熱而溺赤腎氣衰陽獨勝故爲熱厥○厥亦有腹暴滿不知人者或一二日稍知人者或卒然悶亂者皆因邪氣亂陽氣逆是少陰腎脉不至也腎氣衰少精血奔逸使氣促迫上入胸膈宗氣反結心下陽氣退下熱歸股腹與陰相助令身不仁又五絡皆會於耳五絡俱絕則令人身脉皆動而形

體皆無所知其狀如尸故曰尸厥或由穢氣相刑或與外邪相忤

則氣鬱不行閉於經絡諸脉伏匿昏不知人○厥有痰厥如拽鋸聲在

咽中為痰厥○手足搐搦為風厥○因醉而得為

酒厥○暴怒而得為氣厥○骨枯爪痛為骨厥○

身直如椽為肝厥○喘而狂走為陽明厥○此皆

氣逆之所為也

治李法痰用白朮竹瀝熱用承氣下之氣虛補氣四

君子血虛補血四物湯○張法降心火益腎水通

血和氣必先涌之

痿

脉浮而大

浮虛大熱

滑而大

滑痰大虛

洪而緩

洪熱緩虛

因腎水不能勝心火火上燠肺金六葉皆焦皮毛虛

弱急而薄着則生痿躄皆因貪慾好色之故○濕

痰亦能為之○經論有由悲哀太甚陽氣內動數

澀血大經空虛熱起於心病則樞紐如折不相提

挈名曰脉痿有思想無窮入房大甚宗筋弛縱熱

入於肝病則筋急而爪枯名曰筋痿有由溼地以

水為事熱生於脾病則胃乾而渴肌肉不仁名曰

肉痿有因遠行勞倦遇大熱而渴陽氣內乏熱舍於腎病則腰脊不舉骨枯而髓減名曰骨痿然此皆無熏於肺之爲也經曰若衰火之炎痿躄則愈

證

面黃身熱肌瘦往來寒熱涎嗽喘滿面浮力弱而不用者爲痿○外有痿

即嗽風也

柔風脚弱病同而証

各異

治治法獨取陽明陽明者胃脉也五臟六腑之海主

潤宗筋宗筋主束骨而利機關也故陽明虛而然

宜降火補虛○張以黃連解毒湯加當歸等劑治

○李以甘寒瀉火苦寒瀉濕熱四君子補陽明虛

清暑益氣湯治暑熱成之○濕痰之為病宜二陳

湯加木苓柏治之

○清暑益氣湯治熱傷肺氣虛成痿

黃耆

一錢身熱自汗少減半暑邪干衛

人參

五分火傷氣

白朮

五分胃氣

蒼朮

一錢除濕

升麻

一錢熱風勝濕也

甘草

炙三分益氣

乾葛

二錢升麻功

五味

九箇暑傷金

當歸

三錢養血

澤瀉

五分滲濕

陳皮

五分助胃

神麴

五分食去痞

麥門冬

三錢五味子

青皮

三分同神麴

黃蘗

三錢水瀉火

知母

一錢救水

黃芩

一錢救金

健步丸治濕熱成痿

羌活

防風

柴胡

滑石

甘草炙

澤瀉

瓜蒌根

酒洗各五分

防已酒製一兩川烏

苦參

桂一錢

愈風湯下

秘方

氣虛四君子加蒼白朮苓藥痰加竹瀝○血虛

四物加蒼白朮黃蘗下補陰丸○濕痰二陳加

蒼朮白朮苓藥竹瀝

論瘖痺乃腎虛也

舌不語腎脈夾舌本腎氣厥不至

足不行腎氣不順

痺

脉沉微濇○遲則寒數則熱浮則風濡則濕滑則虛

治法各隨其宜

因風寒濕三氣合而成之寒氣勝者為痛痺寒則陰受之故

痛而濕氣勝者為着痺濕則肌肉筋脉着而不去風氣勝者為

行痺風則陽受之故

走注行而旦劇

證作於陰雨之時及三九月太陽寒水用事之時麻

木不仁或仁不仁或痛不痛或筋屈而不伸或引

而不縮寒則垂行熱則縱緩不相亂也皮痺不已

而成肉痺肉痺不已而成脉痺脉痺不已而成筋
痺筋痺不已而成骨痺久而不已內含其合難治
矣○痺論中議痺乃三氣皆可客於五臟其風寒
濕乘虛而客之故也其客於心則煩心上氣嗌乾
恐噫厥脹是也其客於肺使人煩滿喘而吐其客
於肝多飲數溲小腹痛如懷妊夜臥則驚其客於
痺四肢懈惰發咳嘔沫上爲大寒其客於腎善脹
尻以代踵脊以代頭其客於腸數飲而小不得中
氣喘爭時發飧泄夫大腸乃傳導爲沖和之氣乘
虛客之而和氣閉矣水道不通
使糟粕不化故
喘爭飧泄也其客於飽小腹膀胱按之內痛若

沃以湯小便澀上爲清涕

夫三氣客於胞中則氣不能化出故胞漏水道

不通隨經

其客於血脉隨血脉流通上下升降一

出鼻竅

身謂之周痺 華佗論痺乃邪氣合四時不正之

氣感於臟腑所爲有氣血筋肉骨之分其氣痺者

愁思喜怒過則氣結於上久而不消則傷肺生氣

衰邪氣勝留於上則胸腹痺而不能食注於下則

腰脚重而不能行貫於舌而不能言遺於腸而不

能溺壅則痛流則麻右寸脉沉而遲瀋者是也其

血痺者飲酒過多懷熱太甚或寒折於經絡或濕

犯於榮衛因而血搏漸成枯削失血之證左寸脉

結而不流利是也其肉痺者飲食不節肥美之爲
病肉不榮膚不澤則紋理踈三氣入之則四肢緩
而不收持右關脉舉按皆無力而澁也其筋痺者
由叫怒無時行舉奔急淫邪傷肝失其氣寒熱客
之流入筋會使筋急而不舒左關脉絃急而數浮
沉有力是也其骨痺者乃嗜慾傷於腎氣內消則
不能關禁邪氣妄入脉遲則寒數則熱浮則風濡
則溼滑則虛治法各隨其宜

治附子湯治風寒濕痺

附子炮去皮臍桂枝

白芍藥 甘草

茯苓

人參

各三錢

白朮

一兩

行痺加麻黃桂枝湯痛加附子薑茯苓湯胞痺加
苓湯腸痺加平胃散茱萸草苳蔻等

戴人法苦劑涌寒痰次與淡劑使

白朮

除濕

茯苓

養腎

桂枝

伐沫

薑附

寒勝則加

○忍冬藤膏治五痺拘攣

麻木

因證風濕熱下陷入血分陰中陽道不行亦有痰在
血分者其證合目則渾身麻木○痺者血不榮肌

賸

治

人參

黃芪

二味能助陽道當歸

行陰道甘草

黃蘗

白朮

蒼朮

茯苓

除濕熱

升麻

柴胡

芍藥

痰加二陳湯

治當活法

破傷風

脉證風則生熱也○風襲於瘡傳播經絡病如瘞狀

治同傷寒脉浮無力表之太陽也汗之而愈脉長有力陽明也下之而愈脉浮而絃少陽也和解之

大便秘小便赤汗不止病在裏可速下之脉沉在裏承氣下之

治背後搖者羌活獨活防風甘草向前搖者升麻白芷獨活防風甘草兩傍搖者柴胡防風甘草右搖加白芷

厲風

證治 血熱凝結其氣不清上體先見多者氣受之下體先見多者血受之宜醉僊散再造散樺皮散七聖七宣輩大下之

大風方任意加減

防風

白芷

荆芥

川芎

羌活

凌霄花

何首烏

僊靈

蒼茸

皂角

苦參

當歸

石菖蒲

白花蛇

烏蛇

蠶蠶

全蝎

雄黃

大黃

桃仁

梧桐淚

蘇方木

蜜虫

水蛭

紅花

肺風

證治皮燥開拆血出大痛乃肺熱生風也

苦參

皂角

蛇肉

荆芥

黃芩

冷丹

證治血風也

血熱也

痰血相搏也

通聖散

消風散

通治血風血熱也

蟬退

蠶蠶

荆芥

南星

治痰血相搏

又用吐法

痛風

證治血久得熱感寒冒濕不得運行所以作痛夜則

痛甚行於陰也亦有血虛痰逐經絡上下作痛

四物湯

桃仁

牛膝

陳皮

黃芩

甘草

白芷

草龍膽

在上屬風加羌活威靈二倍桂枝一倍在下屬
 濕加牛膝防已木通黃蘗二倍氣虛加人參白朮
 敗龜板○有痰多加南星○血虛加川芎當歸佐
 以桃仁紅花

歷節風

因證疼痛不可屈伸身體魁癭腫如脫痛如掣流注
 骨節自汗短氣頭眩欲吐○由風濕寒相搏而成

痛者寒多腫者濕多黃汗出歷節者風多○歷節
風痛走注不定○痛風有旦定而夜甚○鶴膝風
膝上痺或痛不痛筋動難或仁不仁飲痺往來如
歷節風○白虎飛尸痛淺按之便靜○附骨疽痛
深按之無益

治法當養陰行濕淡薄滋味氣虛補氣血虛補血○
若脉中有風脉見者先行風後服生血調氣之藥
宜靜保養而安

痊

因血氣內虛四氣外襲○因濕諸瘧項強皆屬於濕

寒濕同性故濕可傷太陽

○三因論狀身熱足寒頭疼項強急

惡寒時頭面熱赤獨頭動搖卒噤角弓反張皆因血虛筋無所養邪因入之故寒則緊縮熱則弛張風則絃急濕則脹緩又有因瘡口未合風入之爲破傷風濕入之爲破傷濕與瘧但爭頭強項急餘並相似又有因下過多又有產後怒氣致此病者○項強亦有痰者

證有汗而不惡寒名柔瘧無汗口噤脚攣名剛瘧

治宜流濕祛風緩表而安詳有無汗而藥之○柔瘧

葛根加桂湯○剛痊大承氣湯下之有裏証葛根
湯汗之有表証

傷寒

脉陽浮而陰弱謂之傷風邪在六經俱弦加之○風

榮氣弱也○脉浮緊而無汗謂之傷寒寒傷榮榮實則衛虛

○寒傷陰故牢堅○陽緊邪在上○脉浮頭項痛焦主欲嘔陰緊寒在下焦必欲利

腰脊強病在太陽○脉長身熱目疼鼻乾病在陽

明○脉弦胸脇痛而耳聾病在少陽○脉俱細噤

乾腹滿邪在太陰○脉俱沉口燥舌乾渴邪在少

陰○脉俱微緩煩滿囊縮邪在厥陰○脉陰陽俱

盛重感於寒而緊澹變為温瘧陰陽俱盛傷寒之脉也前病熱未已

後寒復感○脉陽浮滑陰濡弱更遇於風乘變為風温

陽浮而滑陰濡而弱皆風脉也前熱未歇風來乘熱○脉陽洪數陰實大遇

温熱兩合變為温毒洪數實大皆熱兩熱相合○脉陽濡陰弱

而陰弦緊更遇温氣變為温疫○病發熱脉沉而

細表得太陽名曰瘧○病太陽關節疼痛而煩脉

沉細名曰濕痺○病太陽身熱疼痛脉微弱弦芤

名曰中暍○若發汗已身灼然熱名曰風温風温為病

脉陰陽俱浮自汗出身重多眠睡軒語難小便不利更破其下若被火者微發黃色劇者則驚瀉

痲癰若火重則死矣

○脉沉細而疾身冷四肢冷煩燥不欲

飲水狂悶名曰陽厥○傷寒熱盛脉浮大者生沉

小者死已汗沉小者生浮大者死○脉有神不問

數極遲敗當中有神焉神者血氣之先也

○温病二三日體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而

疾者八日死○温病四五日頭痛腹滿而吐脉來

細強者十二日死○温病八九日頭身不疼目不

赤色不變而反利脉來牒牒按之不強手時大心

下堅十七日死○温病汗不出出不至足者死厥

逆汗出堅脉彊急者生虛緩者死○温病下痢腹

中痛甚者死○熱病七八日當汗反下脉絕者死
○熱病得汗脉躁者死來轉大者死○厥逆呼不
應脉絕者死陽厥有力者生陰厥按之大者生○
熱病七八日脉不躁不數後三日有汗不汗四日
死○熱病脉濇小疾腹滿臈脹身熱不得大小便
死○熱病脉浮洪腸鳴腹滿四肢清注泄死○熱
病脉浮大絕而短氣大衄不止腹中痛死○熱病
脉絕動疾便血奪形肉身熱甚死○熱病脉小欬
喘眩悸奪形肉身熱死○熱病腹脹便血脉大時
時小絕汗出而喘口乾視不見死○熱病脉轉小

身熱甚欬而便血目陷妄言循衣縫躁擾不臥死

○熱病嘔血喘欬煩滿身黃腹鼓脹泄不止脉絕

死○熱病瘈瘲狂走不能食腹滿胃痛引腰脊嘔

血死○脉浮而洪邪氣勝也身體如油正氣脫也喘而休水

漿不下胃氣盡也體麻不仁榮衛不行乍靜乍亂正邪爭也故為

命也○熱病喘逆欬吐血手足腹腫面黃振慄不

言名肺絕死丁日死後做此○熱病頭痛嘔宿汁嘔逆吐

血水漿不入狂妄腹大滿名脾絕死○熱病煩滿

骨痛嗌腫不可咽欲欬不能欲歌哭而笑名心

絕死○熱病僵臥足不安地嘔血血妄血崩遺屎

溺名肝絕死○熱病喘悸吐逆骨痛短氣目視不明汗如珠腎絕死○太陽病脉反躁盛是陰陽交死得汗脉靜者生○少陰病惡寒而蹇下痢手足逆者死又吐痢躁逆者死○少陰病四逆惡寒而蹇其脉不至不煩而躁者死○少陰下痢止而眩時時自冒者死又七八日息高者死○少陰病脉微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐五六日自痢煩躁者不得臥寐者死若痢止惡寒而蹇手足温者可治○少陰病下痢止厥逆無脉而煩服湯藥其脉暴出緊者死微細緩者生○傷寒下痢厥逆躁

不得臥者死下痢至厥不止者死○傷寒厥逆

七日不利便發熱而利者生汗出利不止者死有陰

無陽故也

○傷寒五六日不結胃腹濡脉虛復厥者不

可下下之亡血死○熱病不知所痛不能自收口

乾陽熱甚陰頗有寒熱在骨髓死○熱病在腎渴

口乾舌焦黃赤日夜飲不止腹大脹尚飲目無精

光死○傷寒欬逆上氣其脉散者死謂其形損故

○傷寒下痢日十餘行脉反實者死○病者脇

下素有痞而下在臍傍痛引小腹入陰俠陰筋爲

藏結死○結胸證悉具而躁者死○直視譫語喘

滿者死若下痢亦死

因房勞辛苦之過腠理開泄少陰不藏觸冒冬時殺厲之氣嚴寒之毒中而卽病曰傷寒不卽病寒毒藏於肌膚之間至春變爲溫病至夏變爲熱病皆以發生故也皆熱不得發泄鬱於內遇感而發雖曰傷寒實是不同春爲溫疫夏爲暑熱及殮泄秋爲疫瘡冬生咳嗽皆因感四時不正之氣今人總名曰傷寒而施治之實壞仲景立法之本意也

證治自外而入內傳經絡

太陽證頭發熱惡寒腰脊強脉浮而緊無汗謂之

傷風可汗宜麻黃湯脉浮緩自汗謂之傷風宜

桂枝湯忌利小便重汗下大便

陽明證身熱目疼鼻乾不得臥不惡風寒而自汗

尺寸脉俱長宜白虎湯脉浮沉按之有力宜大

承氣湯宜胃血也忌汗利小便

少陽證往來寒熱胸脇痛而嘔耳聾脉弦宜和解

之小柴胡湯膽無出入水火之間忌汗忌利大小便下犯太陽

汗利犯陽明汗利下皆不可

太陰證腹滿咽乾手足自温自利不渴時腹痛脉

沉細其藏寒宜四逆湯脉浮可汗宜桂枝湯又大

實痛可
下用詳
忌三法宜三法
詳用

少陰證口噤舌乾而渴脉沉實宜大承氣脉沉細
遲者宜溫之四逆湯身涼脉沉細而虛宜瀉心
湯身熱而煩躁不寧大小便自利脉浮洪無力
按之全無宜附子瀉心湯其吐瀉不渴脉微弱
理中湯主之渴而脉沉有力而疾宜五苓散少
陰證脉沉發熱當汗麻黃細辛附子湯少陰證
下痢色不青當溫色青口燥當下脉弱忌下乾
燥忌汗

厥陰證煩滿而囊縮大小便不通發熱引飲腹滿

脉俱微沉實按之有力當下無力當温厥陰乃兩陰交

盡曰厥陰為生化之源喜温而惡清○大抵三陰非胃實不可下

此三陰無傳經止胃實可下也

太陽標本不同標熱太陽發熱本寒膀胱惡寒故宜汗○陽

明從中氣標陽肌熱本實妄語標陽故宜解肌本實

故宜下○少陽標陽發熱本火惡寒前有陽明後有

太陰故宜和解○太陰標陰本濕腹脹滿或噎乾身目黃

從本治宜泄滿下濕○少陰標陰爪甲青本熱

脉沉實舌乾渴標宜温本宜下○厥陰中氣宜温煩滿囊縮

故為熱宜苦辛下之

麻黃桂枝之輩汗而發之 葛根升麻之屬因其
輕而揚之 承氣陷胸之輩引而竭之 瀉心十
棗之類中滿而泄之

在表宜汗在裏宜下在半表半裏宜和表多裏少
和而少汗之裏多表少和而微下之在上者吐之

中氣與脉微者温之脉亦同法又當求本假令腹痛用桂

枝芍藥湯何不用芍藥却用桂枝湯內加之要
知從太陽中來故太陽為本又如結胸用麻黃亦

也然

劉法分病及脉以五臟言之諸在皮者汗之麻黃

湯內加表之在內者下之麻黃細辛附子湯

下之

此言臟者五臟也通經入
藏物之藏者府也方可也

○麻黃湯治外

證之外麻黃細辛附子湯治內證之外○得肝

脉外證善潔面青善怒脉弦前方加羌活防風

三內證滿秘便難淋洩轉筋脉沉而弦後方同

前○心脉外證面赤口乾善笑脉浮而洪前方

加芩石膏

各三錢

內證煩心心痛掌中熱而噦脉

沉後方如同前○肺脉外證面白善嚏悲愁欲

哭脉浮而澁前方加薑桂

各三錢

內證喘咳灑淅

寒熱脉沉後方加生薑桂枝○脾脉外證面黃

善噫善思味脉浮而緩前加白朮防已內證腹

本草林序卷一
張滿食不消怠惰脉沉後方同前○腎脉外證
面黑善恐脉浮前方加附子生薑內證泄如下
重脛寒脉沉後方加同前

已前外證皆表之表汗而發之內證者裏之表也

清形以汗如脉沉復有裏證

裏證為發熱引飲便利赤泄下赤水或

秘按之內痛此為裏證

宜速下之依方加大黃錢三如邪未盡

復加大黃錢二

錢二

劉張又相繼論人多勞役饑飽者得之火化大擾
治之宜以辛涼比及年少性急勞役豈非火乎
遲脉年老之人可以辛溫解之可製雙解散治

諸傷寒時氣在表裏皆服之

表裏證有相似藥不可差

傷寒表證發熱惡寒而渴獨頭痛身熱目疼鼻

乾不得臥乃陽明經病也白虎湯主之雜病裏證亦同但目赤者藏病也脉亦洪大甚則衄血

先有形也乃手太陰肺不足不能管領陽氣宜以拘杞地黃等

補瀉當審虛實

假如洪弦相雜洪容也弦主也于能令母實又肝弦無表證是東方

實西方虛也又前來者為實邪依此補瀉餘依此行之

表汗

通聖散

雙解散

半表半裏

涼膈散

柴胡湯裏下

右平實承氣左手實抵當

不分浮沉但實可下

氣主

三承氣

溫

四逆湯

真武湯

解劑 五苓散 甘露飲 解毒湯 白虎湯

發黃 茵陳湯 梔子湯

傷寒得傷風脉傷風得傷寒脉假如太陽證得而身熱自汗惡風脉

弦當緩而反緊傷風得傷寒也餘以例推之 桂枝麻黃各半湯

羌活湯尤妙

吐 瓜蒂散 瓜蒂 赤小豆 豉豉湯一錢

結胃脉浮大者不可下下之死 大陷胃湯半夏 薑 黃連 瓜蒌實

大陷胃丸 大黃五錢 苦葶藶炒三錢

芒硝一錢 杏仁十二箇炒

右為細末將杏仁芒硝研如脂作丸如彈

子大每服一丸入甘遂末三字蜜半七水煎至半温服

六經餘證

太陽

痙

汗多

熱痢

誤下變證

陽明

煩躁

火入于肺煩也火入于腎躁也梔子豉湯宿食加大黃

狂譫

實熱

發斑

胃火

嘔吐噦

少陽

潮熱

有平旦日晡之分見前

太陰

腹痛

有部同雜證治

痞有虛實

實便秘虛便利

少陰

心驚悸

見雜證

吐瀉

同霍亂證治

芎朴實

咽喉

熱寸草寒枯
極寒熱合方

下痢

色青下
不青溫

欬逆

陰消陽逆或兼以舌攣語
言不正昏胃咽痛大承氣

陰厥

羌活湯

解利傷寒不問何經
并兩感傷寒出劉

羌活

二兩

防風

川芎

甘草

炙

黃芩

地黃

各一兩

細辛

二錢半

白朮

二兩

身熱加石膏

四錢

腹痛加芍藥

三錢

往來寒熱加柴

胡

一兩半夏

五錢

心下痞加枳實

一錢

裏證加大黃

三錢

邪盡止之

治疫

麻黃兩一

甘草五錢一兩

石膏

滑石

黃芩

各二兩

白朮

兩四

煎服表汗

解痢太羗活湯治兩感傷寒

出李

防風

羗活

獨活

防已

甘草炙

黃芩

黃連

蒼朮

白朮

川芎

細辛

各三錢

知母

生地黃

各一兩

白芷

陽明加之

雙解散混解不問風寒

出張李劉皆用

梔子豉湯

出李

消毒飲子治疫時毒

黃芩

黃連

各半兩

連翹

錢一

人參

陳皮

桔梗

玄參

各三錢

甘草

黍粘子

板藍根

馬勃

螻蟻

升麻

錢七

柴胡

錢五

薄荷

川芎

錢五

大黃

便硬加之

水煎服

傷寒中寒說

傷寒為外寒鬱內熱○傷寒面慘而不舒惡寒

不惡風○中寒為乘其膚腠不分經絡踈豁一

身無熱可發溫補自安此胃氣之太虛也

風溼不可汗下論

春夏之交病如傷寒自汗肢體重痛轉側難小
便不利此名風濕非傷寒也因陰雨卑濕或引
飲多有此證宜與五苓散

切忌汗下

四證類傷寒

傷食

右手緊盛痞滿

脚氣

如傷寒證但病起於脚膝耳

痰證

嘔逆頭痛脉浮而滑痞滿

虛煩

不惡寒不頭痛身疼

陽毒

身重腰脊痛狂言或吐血下痢脉浮大數喉咽
痛吐血面赤如錦文五六日可治

陰毒

身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下
堅嘔逆唇青面黑四肢冷脉沉細緊數身如被
打五六日可治

陰盛格陽

目赤煩躁不渴或渴不欲水脉七八至按之不
鼓薑附湯主之

陽盛拒陰

身表涼疼痛四肢冷諸陰證脉沉數而有力承
氣湯主之

陽厥極深

或時鄭聲指甲面色青黑勢困脉附骨取之有
按之無因陽氣怫鬱不得營運於四肢以致身
冷先涼膈養陰退陽以待心胃微暖方可承氣
下之

陰證身靜語無聲氣難布息目睛不了了鼻中呼
不出吸不入口鼻中氣冷水漿不入二便不禁
面上惡寒有如刀刺

陽證身動輕語有聲目睛了了鼻中呼吸出入能
往能來口鼻氣熱

傷風氣出麓合口不開面光而不慘惡風不惡寒

傷食口無味液不納息勻

兩感一日太陽受之即與少陰俱病頭痛口乾煩

滿而渴者二日陽明受之即與太陰俱病腹滿

身熱不欲食讖語三日少陽受之與厥陰俱病

煩滿囊縮水漿不入不知人六日死

痊太陽病發熱無汗反惡寒者名剛痊

無汗為表實惡寒為

重感寒名剛痊

○太陽病發熱有汗不惡寒者名柔痊

表虛感濕

○其病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱

面赤目脉赤頭搖卒口噤背反張

中濕見前脉其病一身盡黃頭疼頭汗出欲水而

不能飲反欲近火頭汗乃邪搏諸陽熱者得越津液上

湊又見自汗條下

手足汗有熱聚於胃則便鞭有寒則便澹不能食

小便不利煩躁有熱傳於內胃中有熱關前有虛

因汗吐下虛協餘熱身不疼脈不緊數宜補。又初解胃弱強食胃脈浮洪

胎皆心經之熱淺深也白而滑乃邪在半表半裏也白而澀熱在裏也黃而

乾熱在胃也黑者宜下噦皆胃疾或寒或妄下之虛

厥手足冷有寒有熱先熱而後厥者熱伏於內先厥而後熱者陰退陽氣復始得之

便厥皆陽不足而陰勝也厥主為寒

譫語四證

傷寒謔語屬陽明經乃胃有熱脉洪大者是宜
調胃承氣湯○身不熱身困者謂之鄭聲病退
人虛脉和平宜補○婦人經來適邪氣乘入於
血海左關脉數者是小柴胡湯○有邪祟者言
語涉邪頗有意思脉狀多變與病相違也

氣喘七證

傷寒太陽證下之微喘者內虛外熱故也宜解
其表○飲水過多水停心下胃膈滿而喘者宜
利其小便○病本無喘因藥下之瀉止而喘其
氣已脫不治○喘而噫者不治○喘而魚口者

不治○喘而目閉面裏者不治

目瞪四證

傷寒至目瞪不省人事此中風瘖證以藥開關吐痰痰退眼開觀後證以治之○傷寒病已過經疾退無熱人困不語脉和目瞪謂之戴陽下虛故也○陽毒不解熱毒之氣伏於太陽之經故使目瞪六脉絃勁漸作魚口氣粗者死○太陰痰潮上灌七竅兩目瞪與小兒驚風之類同下痰則愈

舌卷唇焦乃心肺熱極三焦津液不生可治舌卷

卯縮者厥陰絕也又云肝熱

厥逆迷悶三證

陰毒傷冷四肢逆冷心膈迷悶默默思睡脉沉伏者是○傷發汗下後又戰汗過多人困身冷不動者亡陽也○傷發未三日身冷額汗面赤心煩者非陰毒證也謂之陰盛格陽陰氣并於外陽氣伏於內其脉沉數也

咽乾二證

少陽證口苦咽乾乃膽熱也小柴胡○少陰證口燥咽乾乃腎熱津液不生宜下

惡寒三證

發熱惡寒發於陽脉浮數宜麻黃桂枝汗之

無熱惡寒發於陰脉沉細宜四逆溫裏○發汗後反惡寒氣虛也脉微弱宜補虛芍藥附子甘草湯主之

惡風三證

汗出而脉緩宜桂枝加葛根湯使遍身潤○太陽病發汗過多亡陽胃虛惡風當溫其經宜桂枝加附子湯○風濕相搏骨節煩疼不得屈伸汗出惡風不欲去衣宜甘草附子湯

汗後熱并再傷八證

發汗後不入格其病不解宜再汗○發汗後再傷風邪而熱宜重發汗○再傷風寒而熱隨證當消息治之○汗後溫溫熱脈弦小而數者有餘熱也宜和解之○汗後溫溫熱脈靜身無痛處虛熱也宜平補之○汗後溫溫熱或渴或煩或胃滿或腹急有裏證宜下之脈必沉數○勞力而再熱平解勞倦宜柴胡鱉甲散○過食而熱者宜消化其食也

中暍

夏月發熱惡寒小便已灑然毛聳脉弦細而芤
暹宜白虎人參湯忌汗下

中暑

背寒面垢手足微冷煩躁引飲四肢不疼脉虛
宜五苓散白虎湯

中温

冬月冒寒至春夏再感乖常之氣

風濕

先傷風後傷濕頭痛自汗體重息如喘但默默
欲眠尺寸俱浮風濕之脉當浮○風温同證

濕溫

先傷濕後傷暑是為濕溫

濕毒

汗吐下表未解毒邪入藏身有斑陽洪數陰實
大之脉也

溫疫

衆人病一般脉陽濡弱陰絛緊

潮熱

申酉時也胃實宜下○寒熱相繼在他時○太
陽病熱在寅卯○少陽病熱在巳午

汗自出

太陽經自汗榮弱衛強也○中風太陽脉緩○

風濕脉沉而細○風温身重多睡脉浮緩也與

濕同○少陰咽痛四肢拘急疼厥逆自汗亡陽

也○太陽亡陽自汗○柔痊同前

除中者死

傷寒六七脉遲下痢而熱今與黃芩湯徹其熱

腹中惡冷當不能食今反能食名曰除中脾經

受邪則下痢而熱今與黃芩邪熱未去而胃氣

先去

禁忌

厥陰心痛發斑不欲食食則吐虵下之則痢不止四肢厥逆不可下○五六日不結胸腹滿脈虛復厥者不可下○當下反必汗口爛少陰脈沉細數病在裏忌汗○微者忌汗尺弱瀉者復不可下之

太陰腹滿吐食不下自痢時腹自痛忌下下之胸下結硬脈弱自便痢雖用下宜減之

少陽不可汗忌痢小便忌痢大便犯之各隨上下前後本變及中變諸變例

太陽小便不利不可利之邪氣入裏不能解○
咽乾淋衄小便不利曾汗不可汗表在不可
下下之動丘○誤犯之成結胸痞氣汗之成
血畜於胸中當汗而下之成協熱痢○太陽
證一下有八變脉浮者必結胸 緊者必咽
痛 弦者必兩脇拘急 浮滑者必下血
細數者頭痛不止 沉緊必欲吐 沉滑者
必熱利

陽明證不當發汗發汗成畜血上焦爲衄○不
當下下之血畜下焦發狂○有年夏患時熱

狂妄服附者愈服寒涼者死

足太陽未渴小便清者禁利 咽乾禁汗汗之

成畜血 禁下大早 已渴五苓散 譚語

潮熱大渴宜下 便黃遲宜利

足陽明禁汗禁利小便 腹滿宜下

足少陽三禁 胃實可下

足太陰禁下

足少陰脉沉口燥咽乾而渴禁汗脉澀而弱禁

下

三陰非胃實不可下

治三焦便有膽少陽經作風治不宜汗下利小便

治心便有腎少陰故本熱標寒故脉沉細按之
洪大用承氣酒製熱飲是也

治膀胱便有少陽太陽故本寒標陽故脉緊數
按之不鼓而空虛用薑附寒飲頓服

治肺便有脾太陰故塞因塞用大黃枳實下之
治陽明純陽大腸喜清惡熱當以涼治熱胃喜
熱惡寒當以熱治寒

治厥陰純陰肝宜清惡熱當以涼治熱包絡亦

然

許學士解利外感

傷風者惡風用防風錢二甘草麻黃錢一頭痛加川

芎項背腰痛加羌活錢一身重加蒼朮肢節痛加羌

活目痛鼻乾及痛加升麻或乾嘔或寒熱或脇

下痛加柴胡○傷寒者惡寒麻黃錢二防風甘草

錢一頭沉悶加羌活錢一○凡治傷寒以甘草為君

防風白朮為佐是寒宜甘用發散也看他證加

減○傷風以防風為君甘草白朮為佐是風宜

辛用發散也○其傷寒表證以石膏滑石知母

甘草葱豉之類汗出卽解如熱在半表半裏與小柴胡汗出而愈熱甚大柴胡下之更甚小承氣裏熱甚大承氣發狂者茵陳蒿湯下之結胸者陷胸湯下之

內傷見於右手

內傷躁作寒已寒作躁已不相併但有間且晡時必減乃胃氣得令潮作之時精神困倦乃真氣不足

外傷見於左手

外傷但無間耳晡時必作劇乃氣盛潮作之時

精神有餘乃邪氣勝 寒邪不能食 表虛不
作表虛治或勞役於涼處解衣或陰處新浴表
虛為風寒所遏切不可妄解表

大頭腫痛

附蝦蟆瘟

因陽明邪熱大甚故資實少陽相火而為之也濕熱
為腫或為痛明矣治之當視其腫勢在何部分隨
經而取治之此天行之病也

治黃芩

炒

黃連

炒

甘草

大黃

煨

黍粘子

炒

芒硝

陽明渴加石膏

少陽渴加瓜蒌根

陽明行經

升麻芍藥葛根甘草 太陽行經羗活防風

蝦蟆瘟

因風熱

治解毒丸下之 側柏葉自然汁調蚯蚓糞付燒灰大妙

車前草葉汁服之尤佳 丁香尖附子尖南星醋

磨付皆可 五葉藤汁付亦可

霍亂

脉脉微澁或代或伏 滑者為霍亂 大者生 微

遲者死 脉洪者熱 脉絃者滑者膈有宿食身

却不熱 脉細者死 弦甚者死

因其氣有三一曰火二曰風三曰濕乘胃之虛吐爲熱也邪在上焦則吐下焦則瀉中焦則吐且利吐爲噎熱也瀉爲濕也風勝則動故轉筋也或因大渴而飲或饑而飽甚傷損胃氣陰陽交爭而不和此爲急病也不死

證其狀心腹卒痛嘔吐下利增寒發熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹瀉則先下心腹俱痛吐利並作甚則轉筋入腹則死不然則名吐瀉

乾霍亂者心腹脹滿絞刺痛欲吐不吐欲利不利

須臾即死以鹽湯大吐之佳

外有衝惡病同而名異

治五苓散治熱多欲水

關上脉洪者熱也宜解之

理中丸治寒多不欲水身不熱者

半夏湯治霍亂轉筋吐利不止

身痛不止者宜加桂枝湯

半夏曲

茯苓

陳皮

白朮

薄桂

甘草

和解散治霍亂乾霍亂者內有所積外有邪氣所

遏甚吐法吐之

二陳湯

和解散

川芎

蒼朮

防風 白芷

瘟疫病

證衆人病一般者是

治有三法 宜補 宜散 宜降

方 大黃 黃芩 黃連 人參

桔梗 蒼朮 防風 滑石

香附 人中黃

神麴糊爲丸隨證作湯送下 氣虛宜四君子

湯 血虛宜四物湯 痰宜二陳湯 熱甚宜

便作湯送下

春夏不服麻黃

秋冬不服桂枝

夏不服青龍

冬不服白虎

為醫者當謹之

瘧

脉瘧脉自弦弦數多熱風發也弦遲多寒○弦小緊者
可下之弦遲者可溫之緊數者可汗之灸之浮大者
可吐之○風發者以飲食消息止之寒宜溫之風宜
汗之痰宜吐之

因夏暑舍于榮衛之間腠理不密遇秋之風玄府受

之復遇慘愴之寒風閉而不出舍于腸胃之外與
榮衛並行晝行于陽夜行于陰併則病作離則病
止併於陽則熱併於陰則寒淺則日作深則間日
在氣則早在血則晏○因汗鬱成痰○因虛弱陰
陽相乘○外因從六淫有寒溫痺濕牝

寒則先寒後熱 溫則先熱後寒 痺則但熱

不寒 濕則身重骨節痛 牝則寒多不熱

內因臟氣不和鬱結涎飲所致有肝心脾肺腎之

說見後

不內外因 疫瘧一歲之內大小相似 鬼瘧夢

寐不祥 瘡瘡乍有乍已 食瘡因飲食得之

勞瘡因瘡得之 母瘡有母塊

李論夏傷於暑秋為疫瘡

暑者季夏濕土濕令不行則土虧矣所勝

木氣太過少陽旺也所生者受病則肺金

不勝者侮之水乘土之分者坤坤在

火水入土即水火相干則陰陽交

灑浙惡寒土虛少陽乘之則為

濕熱則申酉之分故也

證治 先寒而熱謂之寒瘡先熱而寒謂

宜乎中也中者少陽也渴者燥勝

也又有得之于冬而發于暑邪

有藏之于心內熱畜於肺手

謂之痺瘧足陽明也○在太

之陽明經謂之熱瘧宜下之

和解之此傷之淺也在陰經則

瘧宜從太陰經論之此傷之重

太陽經頭重腰痛寒從背起先寒後

羌活地黃湯

少陽經心體解休寒熱不甚惡見人熱多

小柴胡湯

陽明經先寒久乃熱執

桂枝二白虎一湯

少陰經嘔吐悶熱多言

柴胡加半夏湯

太陰經好太息

裏

厥陰

力可

肝瘧

脾瘧

身身

甘草湯

胃瘧旦病也善饑不

湯主之

腎瘧腰脊痛宛轉便難

芍藥湯

經年不瘥瘥後復熱熱作