



濟生三方
中

十武
232
2



門 武 9
冊 232
卷 2



濟生三方卷中

阿片第二

物埴耳曰。サク。ラ。ヒ。タ。エ。ア。シ。コ。ラ。シ。ル。キ。ユ。ム。ス。ペ。

ク。テ。ア。ゲ。ン。チ。ビ。ユ。ス。エ。ス。ト。オ。ビ。ウ。ム。シ。ム。バ。ヘ。口。

カ。ロ。ン。チ。ス。イ。ン。マ。ニ。ユ。イ。ム。ペ。リ。チ。心。按。ニ。用。阿。片。ハ。細。

カ。ハ。貴。重。ナル。生。活。ヲ。得。セ。シ。ノ。庸。醫。カ。ロ。ン。手。ハ。假。獄。ハ。

使。神。其。艇。ヲ。以。テ。古。雅。ニ。シ。テ。新。難。キ。ガ。故。ス。者。此。

ヲ。原。語。ニ。掲。グ。



若狹 杉田信成卿 譯

濟生三方卷中 阿片第二 一 天眞婁成反

此ニ論スル者ハ。第二將軍ニシテ。即阿片是ナリ。此藥ハ其力甚大ニシテ。靈妙非常。其能甚奧微ニシテ。悟ルベカラズ。天地モ此草ノ成熟ニ當テハ。コレニ冠ヲ賦與ス。○吾輩之ヲ將軍ト呼フ。寔ニ理アリ。何トナレバ。此藥悉將軍ノ性ヲ具スルヲ以テナリ。此物ハ其力能。生命ノ本源。身軀ノ深奥ニ達シ。其功能。生殺ヲ擅ニシ。病將ニ變セムトスルノ際ニ當テ。投施機ニ中レバ。能。生ヲ救フベク。機ヲ誤レバ。能。死ヲ致スベシ。而シテ此功持。此藥ニ在リテ。他藥ノ以テ代フベキ者ナシ。故ニ從來醫家ノ世ニ於テ。玉トナリ。帝トナリテ。能。人ヲ

利シ。又能。人ヲ害セシナリ。

古賢物^テ堙^レ耳。其^レオ^レヒオ^レロ^レチ^レイ^レ。寔ニ萬世

不刊ト謂フベシ。曰ク。サク^レラ^レヒ^レタ^レエ^レ。ア^レン^レコ^レラ^レシ^レル^レキ^レユ

ムス。ヘク^レテ^レ。ア^レゲ^レン^レチ^レビ^レユ^レス。エ^レスト^レオ^レヒ^レウ^レム。シ^レム^レバ^レ。ヘ

ロ。カ^レロ^レン^レチ^レス。イ^レン^レマ^レニ^レユ^レイ^レム^レペ^レリ^レチ。○阿片ハ是一把

ノ兩刃刀。コレヲ良工ニ托スレバ。則貴靈ノ天資。コレ

ヲ庸手ニ假セバ。則暴殺ノ苛毒ナリ。○嗚呼如何ゾコ

レヲ良工ニノミ托シテ。コレヲ庸手ニ奪フヲ得ベ

ケムヤ。

阿片ノ史ハ。即是醫ノ史ナリ。○夫古往今來醫術ノ盛

衰阿片常ニコレニ從ハザルヲ無シ。或ハ天賦ノ靈藥ト貴バレテ。盛ニ世ニ用井ラレ。或ハ恐レテ拋棄セラ。然レモ其缺クベカラザルヲ以テ。復再舉ゲ用井ラル。大醫先生瓦列奴斯^{カニ}舍電沈^シ忽弗滿^ホ物耳^ル忽^ホ共ニハ極ノテ此藥ヲ貴ビ。此藥ナカリセバ。醫ヲ行フベカラスト謂ヘリ。○近世ニ至テモ。人皆阿片ヲ以テ各病ヲ治スベシト謂ヒ。醫各腰ニ阿片ノ瓶子ヲ帶スルニ至レリ。此時ニ至テハ。百千ノ醫藥皆其伍ヲ退キテ。阿片獨戰ヲ擅ニス。然レバ阿片實ニ醫術ノ長トナリ。醫法モ亦大ニコレガ為ニ變革ヲ受ケタリ。是ニ於テカ百病

ノ原性ヲ論シテ。皆陰性ト為スニ至レリ。凡此ニ偏セザレバ。必彼ニ僻スルハ。世間百事ノ常ニシテ。阿片ニ於ルモ亦然リ。夫然ク大ニ阿片ヲ愛重セシニヨリ。又從テ誤用モ多カリシカバ。近年マデ阿片ヲ以テ人ヲ害セシ^トモ亦多カリシナリ。コレニ加フルニ。庸醫阿片ノ真功ヲ知ラザルノ蒙昧ヨリ。今ハ人人大ニ阿片ヲ懼ル。一^ニ至レリ。是ニ於テカ醫術貴靈ノ一藥ヲ失ヒ。幾多ノ患者必當無二ノ救途ヲ喪フニ至ル。

即今ハ正ニ是此兩偏ヲ衡平シ。正中ヲ索ノ得テ。以テ

古來貴靈ノ一藥ヲシテ。再其真知遇ヲ得セシムベキ
 ノ時ナリ。故ニ今此篇ヲ著スハ。人ヲシテ阿片ノカラ
 確知セシメ。且コレニ不易ノ範則ヲ立テ。又兼子テ少
 年醫輩ヲシテ。コレガ權衡ヲ得テ以テ誤用ノ過ナク。
 必當ノ症ニ於テコレヲ施サシメムヲ願フノミ。此
 ニハ死生利害。悉其本能ヲ知り。其主治ヲ定メ。且其必
 須ノ諸症ヲ明辨スルノ三件ニアリ。

夫藥ハ本能ヲ知り。其真性ヲ定ムルハ。是第一ノ要務
 ナリ。○凡各病皆其本性アリテ。然モ人身活機ノ内ニ

在リ。而シテ各藥ノ功能亦然リ。夫一藥ノ能ハ即是人
 作ノ病ナレバ。其真性ヲ問ハズ。亦必其藥力ニ因テ發
 スル所ノ生機ノ變換ニアルベシ。然レバ一藥ノ本能
 ヲ舉ゲムニハ。次ノ件件ヲ察スルニアリ。即先其藥全
 身ニ如何ノ變ヲ起スカ。又其力如何カ各系ニ達スル
 カ。又特ニ何レノ系ニ達スルカトイフヲ明ニシ。特
 ニ其正能ト奇能トヲ辨スルニアリ。○此ニハ唯阿片
 曾テ功ヲ奏セシ所ノ病名ヲ舉グルノミヲ以テ。足レ
 リトスベカラズ。是唯試驗ノ學ヲ博ムルノミ。又舍密
 術ヲ以テ其質ヲ分解スルモ。亦未足レリトスベカラ

濟生三才 卷中
ズ。其故ハ藥ノ能力。常ニ必人身特生ノ區域ニ屬スルヲ以テナリ。又彼ノ一家ノ理論ノ如キハ。固ヨリ從フベカラズ。是其建議ノ風。東西アルニ從テ。常ニ向背ナキヲ得ザレバナリ。○然レバ藥ノ本能ヲ定ムルニハ。唯其生體上ニ於テスルノ功ヲ以テ憑據トスベシ。特ニ其功人ノ耳目ノ及ブキ所ニ在ル者ニ據ルベシトス。○蓋又特ニ其能ノ直發真正確實ナル者ニ據ルベクシテ。其藥ヲ用井タル後ニ發スル所ノ百般ノ諸症ヲ擧取スベカラズ。此ノ如キハ猶忽沒越阿巴智醫流ノ為ス所ノゴトシ。必真功ノ外。更ニ偶發ニシテ。

唯其患者ノミニ在ル所ノ諸因。及内外偶發ノ諸感カヲ併セテ其藥ノ能ヲ變ゼザルヲ得ズ。

然レバ方今ノ業宜ク經驗ニ就テ。阿片ノ直發真正確實ノ能能即正ト。迂回偶發ノ能即奇トヲ辨スルニアルベシ。

大哉區域難哉辨議。夫百千年来阿片ノ試驗極メテ多ケレバ。今コレニ因テ其本能ヲ知ルハ。人或ハ看テ以テ容易トスベシ。是特ニ然ラズ。其故ハ幾多ノ試驗中。其功能特ニ其患者ノ天稟ニ因ル者。病ニ由テ變易セシル抗拒ニ因ル者。地方病性流行病性ニ由テ生機大ニ

變スルニ因ル者。習癖ニ因ル者。即東方諸國ニ於ルガ如キ。及試者ノ意ニ因ル者トヲ辨識スルヲ要スレバナリ。特ニ驗者ノ眼鏡ニ由テ真象大ニ變シ。コレニ因テ幾多ノ妄論僻說世ニ出ブルニ至レリ。今予此無數ノ試験。及予ガ多年ノ實驗中ニ於テ。其最信スベキ者ヲ舉ゲ定ノムトス。特ニ近世貌樂運名ノ治術大ニ此ニ益アリ。蓋貌樂運ノ治術ハ。從來阿片ヲ人ニ用井タル最弘最大ノ試験ト謂フベキナリ。

必見之症

今阿片ヲ以テ生體ニ觸レシムルハ。其觸ル、一ノ

内面外面ヨリスルヲ論ゼズ。必次ノ症ヲ發ス。第一脉興奮シ實トナリカヲ得ル。○此功ハ用後直ニ發スル者ニシテ。且必見ノ症トス。其ヲシテ疾トナラシムルガ如キハ。一定ノ功ナラズ。生カノ強弱ニ從テ異ナリ。健全ノ時ニ於テハ。脉稍疾トナルヲ以テ常トス。生力増盛ノ時ニ於テモ亦然リ。然レモ若衰弱ノ為ニ脉既ニ疾ヲナス者ニ於テハ。阿片能コレヲ除キ。其ヲシテ徐ナラシメ。且齊ナラシム。又多量ニ用井レバ。脉ヲ徐トナシテ。猶卒厥ノ脉ノ如クナラシム。第二血沸漲ス。○其徵ハ則脉實トナリ。諸脉管膨脹シ。

新ニ血積ヲ起スヲ以テ知ルナリ。此症ハ常ニ頭ニ發シ。肺ニ發シ。或ハ彼此ノ素因アル部ニ發シ。動レバ出血ヲ致シ。或ハ炊衝ヲ發セシム。

夫此血液沸漲ハ阿片固有ノ能ニシテ。特ニコレヲ標示セザルヲ得ズ。古人モコレヲ血液稀釋ト名ヅケ。阿片ノ本能ト謂ヒシナリ。而シテ此功ハ實ニ每發必見ノ者ニシテ。大衰弱血虚ノ患者ト雖。脉必實大ヲナス。是實ニ人為ノ多血。假虚ノ多血ナリ。蓋阿片ヲ用井テ後。頭部血積ノ危害ヲ致シ易ク。或ハ又血溶解シ。生體ノ和合分潰シ易キハコレガ為ナリ。

第三生温増加ス。○是血液沸漲。運行増進ノ必由テ致ス所ニシテ。又阿片必見ノ功ナリ。

第四神經系。特ニ腦直ニ強ク侵制セラレ。特ニ其力制抑セラレ。知覺ノ機減衰ス。是ニ因テ麻醉嗜眠昏睡等ヲ發シ。又局處ニ用井テ其部ノ知覺ヲ奪ヒ。麻痺セシメ。痙及痛ヲ祛ク。或ハ又内服ノ後。却テ神氣爽快ヲ為シ。腦神活發シ。或ハ終ニ譫妄狂躁ヲ起スヲアリ。然レモ。是一時ノ興奮ニ由テ致ス所ナルガ故ニ。速ニ復虚衰ニ陥ルナリ。而シテ此功極メテ確實ナラス。或ハ其量ニ關リ。或ハ患者ノ性ニ關ル。蓋其理一ニハ。人身抗

拒ノ力奮起シテ。阿片ノ猛毒ヲ防ガムトシ。以テ常ヲ
 失スルニ因テ。外表ニ神經諸症ヲ呈スト雖。終ニ阿片
 ノ麻毒勝ヲ得ルニ至ルノ由テ致ス所ニ係リ。又一ニ
 ハ。阿片ノ力能。血ヲ催進シテ腦ニ入ラシムルヲ以テ。
 此血腦ヲ刺衝シテ其運機ヲ増進セシムルヲ猶其他
 ノ腦中血積腦焮衝等ノ諸症ニ於ルガコトキニ由テ
 致ス所ナリ。凡毒活體ヲ侵スノ本力ヲ確知セムト欲
 セバ。其局處ノ功ヲ見ルヲ最要トス。而シテ阿片局發
 ノ功ハ。常ニ覺機ヲ抑制スルニアリ。即コレヲ腸ニ用
 井レバ。其運機ヲ休歇セシメ。皮表ニ施セバ痛及瘡ヲ

鎮止スルヲ以テ知ルベシ。但其皮ニ施スハ。表皮ヲ剥
 セザル部ニ施スヲ謂フナリ。若夫表皮剝離セル部ハ。
 外物コレニ觸レテ必輕痛ヲ起セバナリ。特ニ脂類ハ
 此力多シ。

自注ニ曰ク。阿片ノ純真ノ功ヲ知ラムト欲セバ。唯
 宜クコレニ慣レザル人ニ用井テ知ルベシ。譬ヘバ
 度兒格及東方諸州ノ人ノ如キ。及和蘭人モ久服シ
 テコレニ慣ル者ニ在テハ。生體既ニ阿片ニ慣レ
 テ。其刺衝ニ感スルヲ少ク。以テ一種ノ病性ヲ為ス
 ニ因テ。阿片ノ功亦從テ變ゼザルヲ得ズ。度兒格

ノ人阿片ヲ用井テ其驍勇ヲ増スハ其理蓋阿片消
 長二極ノカニ因ルナリ。即其消極トイフ者ハ阿片
 麻醉ノカニ由リテ危ヲ輕シ己ヲ忘レシムルノ功
 フ謂ヒ其長極トイフ者ハ血腦ト心トニ進入スル
 勢ニ因テ精カト勇氣トヲシテ共ニ増盛セシムル
 ノ功ヲ謂フナリ。○又和蘭ニ在テモ久ク阿片ヲ過
 用スル者ニ於テハ多量ヲ服シテ唯己ノ痛楚ヲ忘
 レ病ノ身ニ在ルヲ知ラザルニ至リ是ニ因テ精神
 爽快ヲ得ルノミニシテ他ノ症ヲ發セザル者多シ。
 第五大便閉止シ咽乾燥ス是内服ノ後消食管及其分

泌管局處ノ麻痺ヲ受クルニ因ル。○即是腸ノ麻痺腸
 ノ眠ナリ。

第六皮表ノ分泌増進シ汗出ヅ。○是阿片興奮ノ力其
 動脈ノ運機ヲ催進スル功。及中心ヨリ外表ニ發越ス
 レ功ト。又其鎮靖ノ力皮膚ノ痙攣ヲ弛ムル功。及尿管
 ロヲ開達スル功ト。一併シテ此機ヲ發スルニ係ル。蓋
 阿片常ニ釀膿ヲ進メ。又熱病ニ用井テ屢粟疹ヲ發シ
 紫斑ヲ發シ。及驚口瘡ヲ發セシムルハ此能ニ因ルナ
 リ。

第七以上論載スル所ノ外更ニ陰部ト尿管トニカヲ

致シ。二器ノ機能ヲ増盛セシム。此功殆必見ト稱スベシ。但特ニ陰部ニ於テ顯著トス。即淫蕩ノ夢想。陰莖ノ勃起。精液ノ漏泄等ヲ發スルヲ以テ知ルベシ。其泄尿ヲ増進スルモ亦屢驗スル所ナリト雖。未以テ必見ト稱スベカラズ。且果シテ泌尿ヲ増進スルカ。抑刺衝ノ力唯泄尿ヲ促スノミナルカ未疑ヲ免レザル所ナリ。第八多量ニ用井或ハ久服スレバ血溶解シ生體ノ和合分潰シ腐敗シ寒壞疽ヲ發シ死後速ニ腐壞ス。此力ハ阿片ノ奇能トイヘド。多量ニ服スル間或ハ服後自註ニ曰ク若クハ久ク過用スル後ニ於テ必見ノ症即阿片中毒

トス。凡熱病ニ多量ノ阿片ヲ與フレバ。必腐敗熱ニ變シ。焮衝ニ用井レバ寒壞疽ニ陷ラシム。又慢性病ニ於ルモ阿片ヲ連用スルノ後ハ體質溶解セムトシ。及出血シ易キノ症ヲ發スルナリ。彼ノ都兒格人ノ如キモ。過服ノ後ニハ遂ニ底野迦病ヲ發ス。其症ハ則過大ノ出血ヲ發シテ。漸衰死スルニ至ルナリ。又此症ニテ死セル屍ノ速ニ腐敗スルハ。亦必見ノ一事ナリ。此力ニ於テハ。阿片實ニ電ニ同ト謂フベシ。其故ハ雷震ノ人屍亦其腐敗速ナルヲ以テナリ。

本能

本能

十

夫然ク阿片ノ功ヲ詳察スレバ。興奮ノ力ニ兼子テ鎮
 靖ノ功ヲ具ヘ。活發ノ勢ニ兼子テ剋殺ノ威ヲ具フル
 一。寔ニ特異無比ニシテ驚異スベキ者ナリ。是蓋此藥
 ノ他藥ニ異ナル所ニシテ。又施治ノ際ニ於テ此藥ノ
 特拔貴重ナル所ナリ。○覺機ト神經生トヲ抑制シ或
 ハ全ク之ヲ奪除シ而シテ却テ心臟ノ刺衝機及血生
 即機性造育ノ源生ヲ興奮シ且之ヲ強盛ナラシメ是
 ト共ニ身中ノ生機ヲ増盛催促シ遂ニ動化ノ尤極ニ
 至ラシメ造成ノ力ヲ消滅シ及舍密ノ分解ヲ催起ス
 ル。是此靈藥ノ真性ニシテ。即其本能ナリ。○衰弱ニ因

テ脉沈ナル者ヲ速ニ興奮シ。實トナラシメ又衰弱ニ
 因テ脉疾トナル者ヲ遅トナラシメ。劇キ血積ヲ發
 シ。或ハ焮衝ヲ起サシメ。又寒壞疽溶潰過炭化腐敗ヲ
 起ス一極ノテ速ナルハ。是皆此本能ヨリ出ヅル所ナ
 リ。

然レバ阿片ハ真ニ一大強心藥ニシテ。予コレニ過グ
 ル者アルヲ知ラス。○蓋其能實ニ衝突直入スル者
 ニシテ。途ヲ彼此ニ假リ。良能ノ對抗ヲ待テ而シテ後
 見ル者ニアラス。即生力極メテ虚憊セル患者ニ試

用シテ。以テ明驗ヲ得ベシ。蓋藥能ヲ確定セムニハ。當
 ニ健全ノ人ニ試ルノミナラス。病時ノ生カラ検査ス
 ルノ極メテ切要ナル。亦コレニ因テ明ナリ。見ズヤ
 彼ノ窒扶斯性熱。惡性痘等ニ因テ。生カ沈衰耗竭セル
 者ニ阿片ヲ用井レバ。則其功ノ神速驚クベキヲ。嗚
 呼其脉認ノ難ク。疾ニシテ振戰シ。且間歇スル者。忽實
 トナリ。齊トナリ。カラ得ルニ至リ。皮表一齊ニ温ラ生
 シ。生カ均ク發越シ。患者自生ヲ得カラ得。勇ヲ得。快ヲ
 得ルヲ覺エ。分利機是ニ於テ一頓ニ旺發シ。良全ノ諸
 機始メテ萌生シ。分利泌別其途ヲ得ル。豈顯著ノ功

ニアラスヤ。
 阿片ニ然ク強心ノ功アル。古賢モ既ニ熟知シテ
 コレヲ運用セシ所ナレ。貌樂運名ニ至テ最能。此能
 ヲ詳明セリ。但他ノ一能ヲ遺忘セルノミ。他ノ一能ト
 ハ何ゾ。此藥又兼子テ神経系ヲ鎮靖シ。且其興奮ノカ
 峻烈ニシテ。深ク生カノ本源ニ達シ。却テ速ニ大衰弱
 ニ變シ。或ハ竟ニ麻痺ニ至ラシムルヲ謂フナリ。然レ
 バ此藥未曾テ真正持久ノ強壯カアリト謂フベカラズ。
 故ニ彼ノ所謂刺衝興奮未以テ阿片ノ能ヲ盡スニ足
 ラス。又其刺衝大過ノ説。及後能ノ論。其ニ未備レリト

スベカラス。其故ハ阿片ノ能更ニ深遠ニ達スルヲ以テナリ。夫阿片ノ力ハ其興奮ノ功ト共ニ直ニ生命ノ源ヲ侵シ。活體舍密ノ和合ヲ制シ。其刺衝大過ハ又兼子テ生活大過トナリ。生機ヲシテ自然ノ限界ヲ踰エシムルニ至ル。即阿片ノ力能速ニ腐敗ヲ致シ。寒壞疽ヲ生シ。溶解ヲ促スヲ以テコレヲ證スベシ。

夫阿片ニ興奮ノ功能アリテ。特ニ生活ノ元運ヲ奮發スルハ固ヨリ其本能ナリ。而シテ鎮靖ノ功亦等ク確ナリ。此功ハ尋常ノ説ノ如ク。刺衝大過ノ所由ナル奇道ノ能ニ非ズシテ。特立ナル一猶興奮ノ能ノゴトク。

而シテ直ニ神經ヲ制スル者ナリ。即局處ニ用井テ緩和止痛鎮痙ノ功ヲ奏シ。或ハ全ク其部ノ機能ヲ阻遏スルヲ以テ。コレヲ證スベシ。

故ニ予ハ謂ヘラク。吾輩貯フル所ハ百藥中其能峻烈直入兼子テ多性ニシテ生機ノ全系ニ達シ。特ニ生力ノ本源ニ達スル一阿片ノ如キハ未コレアラズト。凡阿片ヲ用井ル者ハ。是生死ノ權ヲ掌握スル人ナリ。而シテ其生ト死ト相界スル一毫髮ノ如シ。信哉舍電沁ノ言。曰ク。阿片ナカリセバ醫術至ラズシテ且完カラザラムト。

功理

阿片ノ功然ク驚異スベク。且二箇相反ノカヲ具ヘ。他
 藥中コレニ類スル者ナキ。如何シテ其理ヲ窮ノム。
 是推理ノ各家疑ヲ抱ク所ナリ。
 此一問ハ。數百年來醫家ヲシテ。心ヲ費シ神ヲ勞セシ
 ムルノ一事ナリ。是蓋皇天理家ニ擬スルノ一謎ニシ
 テ。極メテ尤大可學ノ一事ナリ。而シテ從來コレヲ猜
 セムトテ。建立セル論議極メテ多シ。悉コレヲ舉ゲム
 ニハ。實ニ倦ムベキノ事ナリト雖。亦以テ人智ノ漸明
 ナルト。理學ノ漸闡クルトヲ觀ルベク。又此靈藥生體

ノ深源ニ感應スル者ナルガ故ニ。以テ兼テ古來生機
 ヲ説ケル本論ノ沿革ヲ觀ルニ足ル。

其説ノ最古キ者ハ。人身ノ生氣原レヘンス。阿片ニ

由テ枷鎖セラレ。恰魅セラレ、ガ如シト。自注ニ曰大

ヘリユラムハ阿片ノ功ヲ説キテ尚ホ曰ク生氣此藥

ニヨリテ表ヨリ驅逐セラレ最裏ニ聚積スト

レニ次テ瓦列奴斯名ノ寒温説起レリ。其説ハ阿片ヲ

以テ寒性ノ物トナス。故ニ又常ニ芳辛藥ヲ加ヘ用井

タリ。○次ニ悉兒彪斯名ノ説起レリ。此人本舍密ヲ以

テ萬物ノ理ヲ論辨ス。而シテ阿片ニ於ル亦一種ノ揮

發硫黃氣アリテ。其功力皆コレニ舍ルト謂ヘリ。○歌

爾蒙突名ハ阿片ノ功ヲ其亞爾加歐斯按ニ萬物ヲ生シ諸機ヲ發スルカニ達スト謂ヒコレヲ以テ其効驗ヲ辨明セリ○醫家更ニ器械ノ學ヲ執ル者アリ阿片ノ能ヲ論シテ其細小管ヲ過塞スルニ因ルト謂ヘリ○コレニ次テ又一説アリ博ク世ニ傳ヘテ久ク醫家ノ通論タリキ其説ハ則阿片ノ功唯其血ヲ沸漲セシムルニ在リト云名括弗毘堉兒忽弗滿名ノ如キモ殆此説ニ左祖セリ○此ヨリ後神經系ノ學更ニ精微ニ入り且其生機ニ交渉スルノ大ナルヲ闡發ス法兒列爾名ノ大發明ヲ以テ知覺刺衝ノ二機大ニ相異ナルヲ詳ニ

セシヨリ生理ト病理ノ二學亦一變シ神經性病理學起リコレニ從テ阿片ノ功ヲ説ク一亦一革シ説者皆阿片ノ功ヲ以テ專ラ神經ニ達スト謂ヘリ鳩盧連名ノ如キ最然リ自註ニ曰佛郎西ノ學者貌極傑突名ノ尚其千八百二十年ノ著書ニ於テ此説ヲ取リ○近世ニ至テ二説アリ共ニ記載スルニ足ル其一ハ留散忽弗滿名ノ發明ニ出ヅ自註ニ曰堉兒忽弗滿後ルハ一五十年ノ人ナリ看者或曰凡細尿管及其ハ混セルヲ恐ル故ニコレヲ辨ズ曰凡細尿管及其末稍ハ心臟及大尿管ニ比スレバ刺衝機劣弱ナリ故ニ阿片ノ刺戟ニ因テ其刺衝機ヲ失フ一ハ心ト大管ヨリ速ナリコレニ因テ細管中血液ノ運行妨礙セラレ

此抗拒ニ因テ心臟ノ對抗却テ増盛スト云。其二ハ彼ノ貌樂運ノ説ニシテ。世人ノ多ク知ル所ナリ。其説ニ阿片ハ活體ノ全系ヲ刺衝スルヲ最強ク最疾ニシテ。而シテ其力速ニ消散ス。故ニ其能始メハ劇ク全身ノ刺衝ヲ起シ。次テ速ニ生カヲ耗竭セシムルヲ極メテ甚シ。此衰耗ハ即奇道ノ衰弱ナリト云。○更ニ近今ノ説アリ。理學ノ一派ト刺里帝突トボ所按ニ越天地的兒實窟ト濕突ノニカヲ以テ兩問ノ萬為ヲ講明シ又コノ説ヲ本トシ。再舍密ノ論ニ近ツケリ。

當今ノ諸家ハ。槩阿片ノ功ヲ以テ活體ノ全系ヲ刺衝スル者トナシ。其麻醉ノ能ハ過度ノ刺衝奇道ノ衰弱ニ由ルト謂ヘリ。然レモ予ハ此ニ二件ノ疑問アリ。其一ハ則別ニ揮發ニシテ特ニ血管ヲ興奮スルヲ全ク彼ノ如キ藥アリ。即麝香ニ諸模尼亞ト葛私多ト儂ト等是ナリ。此等ノ藥然ク阿片ノ如ク麻醉ノ能アラザルハ何グヤ。其二ハ則更ニ麻醉ノ藥アリ。毫モ血管系ヲ刺衝スルヲナク。脈ヲ變スルヲナク。温ヲ變スルヲナク。或ハ却テ脈ヲ遲ナラシメ。然ク心臟ノ機能ヲ減殺シテ。而シテ最劇麻醉ノ能ヲ呈スハ何ゾヤ。○此二件ニ由

テ考フルニ。麻醉分ハモト特立ノ物ニシテ。敢テ心臓
 血管ヲ刺衝スルカニ関ラズ。特ニ神経系ニ直達シテ
 コレヲ鎮壓抑制スル者ニシテ。固ヨリ過度ノ刺衝ニ
 由ラザルヲ明ナリ。而シテ阿片亦明ニ此麻分ヲ含有
 ス。其證左ノ如シ。第一阿片特異ノ香是ナリ。此香ハ則
 菲^ヒ臘^オ沙^シ密^ミ曼^マ陀^タ羅^ラ華^ハ及^キ他^ノ麻^毒アル草類ノ香ニ同ク
 シテ。此香アレバ毎ニ麻分アルヲ知ルベシ。次ニ阿
 片局處ノ鎮靖力是ナリ。夫阿片ハ外敷シテ亦止痛鎮
 靖ノ功アリ。而シテ毫モ血管系ヲ興奮スルヲナシ。特
 ニ多量ニ久ク外用スレバ。毫モ血管ヲ興奮セズ。唯神

經ノ交感ニ由テ腦ニ達シ。麻醉ノ症ヲ發セシム。是予
 嘗^テ夏^ニ日^ニ阿^片ノ大塊ヲ握持シテ。自試驗セル所ナリ。註自

ニ曰或ハ阿片ノ能ク以テ全ク葡萄酒ノ能ニ同ト云者アリ然レモ最強ノ亞爾箇兒未曾此功アラズ又
 單ニコレヲ顛顛ニ敷キテ睡ヲ生ゼシム。自註ニ曰予

方アリ神經性患者ノ不寐ニ毎クコレヲ兩顛顛ニ貼セシメ以テ此苦患ヲ免レシム其方菲臘硬膏四錢ニ
 阿片一刃又内服ノ時其胃ニ達スルニ方テ直ニ胃ノ

局處ノ覺機ト神經機トヲ奪ヒ。食思消化力及蠕動機
 ヲ除却シ。又灌腸藥ニ和シ用井テ直ニ腸ノ蠕動機ヲ

除却ス。次ニ阿片ノ蒸氣ハ即其單純ノ麻分ノミニシ
 テ。而シテ能^ク麻醉ノ能ヲ致ス。即阿片水^{アタオノ如レ}。

此物單ニ揮發ノ蒸氣ヲ含_ミ。舍密術ヲ以テモ亦コレヲ檢出スベカラズ。而シテ眼焮衝ニ用井テ能軟和ノ功ヲ奏ス。次ニ又其水製越_エ幾_キ斯_スハ。麻醉止痛鎮靖ノ功アリテ。而シテ血管系ヲ興奮セザル_{コト}。恰_モ菲_ヒ臘_ハ沙_ハ密_ニ曼陀羅華等ノ單純麻藥ノ如クニシテ。其脂製越_エ幾_キ斯_スハ却テ興奮ノ功ヲ致ス等ヲ以テコレヲ觀レバ。則阿片ニ一個ノ麻分アリテ。此分ハ脉管血液ヲ興奮スル_{コト}ナク。能力ヲ呈_ス。明ナリ。况_ヤ阿片ニ消石等ノ消焮藥ヲ加フレバ。能_ク其催熱ノ力ヲ奪_フベクシテ。而シテ鎮靖ノ力ハ異ナラザルニ於テヲヤ。

然レバ阿片ニ鎮靖興奮ノ二力各異ニ存スル_{コト}疑ナシ。而シテ其功理ヲ原子ムニハ。次ノ如ク説クヲ以テ真且純ト謂フベシ。阿片ニ二分アリテ特異精密ニ和合ス。其一ハ麻分ニシテ專_ラ神經系ニカ_ク致_シ。其一ハ興奮分ニシテ專_ラ血管系ニカ_ク致_ス。コレヲ證スルニ。唯有力ノ麻藥ヲ舉ゲテ以テ足レリトスベシ。乃此二分各異ニ特立シ。其麻醉ノ功未必シモ興奮ノ功ニ率ハザル_{コト}ヲ知ルベシ。若夫二功唯一ノ刺衝カニ出ヅル_ハ。必互ニ相率ハザル_{コト}ヲ得ズ。曼陀羅華ハ阿片ニ亞テ最強ノ麻藥トス。而シテ屢獸ニ與ヘテ試驗

スルニ。毫モ脉ト血管系トヲ興奮スルヲナシ。第艾答
 利斯ハ却テ脉ヲ鎮靖シ。莨菪ハコレニ反シテ稍脉ヲ
 興奮ス。而シテ青酸ハ知覺ノ全機ヲ殲滅シ。毫モ心ト
 血管トヲ興奮スルヲナシ。○麻藥ノ功然ク差異アル
 ニ由レバ。予ハ謂フニ。以テ生體ノ原力ナル知覺刺衝
 ノ二機各異ナルヲ證スルニ足ルト。

予今此ニ舍密加ニ就テ。阿片ハ如何ノ成分ヨリ成レ
 ルカヲ問ハムトス。庶幾クハ其諸種ノ功理ヲ究ムル
 ニ足ラムカ。○古昔ノ舍密家ハ。阿片ヲ水葡萄酒或ハ

燒酒ニ溶解シ。其溶クル者ト溶ケザル者トヲ分チテ
 足レリトス。而シテ其水ニ溶クル者^{エキスタラクチユ}
^{シユムモ}ハ功力稍弱シト雖。尚麻酔ノ能アリテ而シテ
 絶エテ催熱ノ能ナシ。故ニ其催熱ノ能ハ哈爾斯性ニ
 シテ水ニ溶ケザル部ニアリトス。是ヲ以テ醫家血ノ
 興奮及焮衝ヲ懼ルベキ症ニハ。水製阿片ヲ用井タリ。
 近時ノ舍密家ハ。其學大ニ進ミ。更ニ造化ノ秘奧ニ入
 ルベキノ新途ヲ啓キ。又其力ヲ阿片ニ試シ。檢査精詳
 ヲ究メテ。其窒素炭素水素ヨリ成レルヲ發明シ。又
 其近成分ハ四ナリト云。即模兒彪母默格紐母那耳格

智澀及越幾斯分是ナリ。自註ニ曰予ハ謂フニ此越幾
シテ而ハ輕テ世ノ舍密家總テ此方ヲ輕視シ特ニ阿片ニ
於テハ輕テ世ノ舍密家總テ此方ヲ輕視シ特ニ阿片ニ
知ルヨリ能ハザル物ノ名ヲ然レバ越幾斯分ノ名ヲ命
セムヨリ寧須檢分ノ名ヲ然レバ越幾斯分ノ名ヲ命
レド其功ト性トヲ論スルニ至テハ諸家一定セズ唯
模兒彪母ハ單用シテ功少キヲ疑フベカラズ此物功
ヲ致サムニハ必先一個ノ酸ニ和スルヲ要ス而シ
テ其酸ニ和セル者ハ其功殆阿片ニ同ク過用シテ死
ニ至ラシムベシ又其那耳格智澀即極樂斯澀ニ至テ
ハ或ハ大能アリト謂ヒ或ハ能少シト謂ヘリ又那耳
格智澀ハ興奮ノ功ヲ奏シ模兒彪母ハ鎮靖ノ能ヲ致

スト云説未確定セザル所ナリ更ニ越幾斯分アリ聖
 際亞國ノ舍密家森度別兒窟宋名ノ説ニ此物ハ阿片
 中最カアル者ナルベシト言ヘルハ宜ナリ。

舍密家然ク検査ヲ究メテ而シテ醫家ノ得ル所何モ
 ノゾ○單模兒彪母既ニ阿片ニ非ズ。默格紐母亦阿片
 ニ非ズ。那耳格智澀亦阿片ニ非ズ。越幾斯分亦阿片ニ
 非ズ。舍密ノ巨擘窩兒斐拉名モ亦言ヘルガ如ク阿片
 ノ能ハ此四分ノ和合ヨリ出ヅ予ハ更ニコレニ次言
 ラ加フ曰其和合成立全ク特異ニシテ而シテ舍密ノ
 分離ニ因テ破潰ス然レバ醫家ノ宜ク記スベキ所次

ノ如シ。凡阿片ヲ用井ムト欲スル者ハ宜ク直ニ阿片ヲ用井ルベシ。○然ルキハ阿片含ム所ノ諸分ヲ用井ルヲ疑ナク。特ニ其特異機性ノ和合ニ於テ用井ルヲ得ルナリ。蓋此和合ハ萬物成立ノ源ニシテ其基本ノ存スル所ナリ。

醫家ニ在テハ古昔ノ二方却テ要緊ナリトス。即揮發溶液及水製溶液ニシテ。甲ヲ「チンクチュラオピイ」ト名ツケ。乙ヲ「エキスタラクチュム」ト名ツク。○甲ハ麻醉ニ兼子テ血積ヲ起シ。心臓ノ機カラ増進シ。乙ハ麻醉ノ能アリテ。催熱ノ力甚少シ。○此二種ノ別

ハ試驗ニ據リテ確定セル所ニシテ。施治ノ際ニ方テ要緊ノ事件ナリ。即鎮靖ノ力ニ兼子テ興奮ノ力ヲ要スル症ニハ。甲ヲ用井。又單ニ鎮靖ノ功ヲ要シテ興奮沸血ノ力ヲ懼ル者ニハ。乙ヲ用井ル等ナリ。

舍密學ニ於テモ亦右ノ區別ヲ切要トス。其故ハ其水ニ溶クル者ハ。單ニ麻醉ノ力ヲ致シ。燒酒ニ溶クル者ハ。麻力ノ外更ニ興奮ノ力アルヲ以テ。其興奮ノ力ハ麻カトハ自異ナルヲ明ナレバナリ。而シテ甲ハ則然格紐母酸模兒彪母ト。越幾斯分ノニシテ。乙ハ則純模兒彪母及那耳格智涅ナリ。

予更ニ予カ検査ノ論ヲ舉グ。看者以テ贅トナスコ勿
 レ。○夫刺衝機ハ啻其名覺機ト異ナルノミナラス。實
 ニ覺機トハ別ニシテ。特ニ存シ。自其機能ノ源ヲ有ス。
 而シテ神經ノカニ由テ感動變易セラルト雖。本神
 經ノカニ賴テ而シテ起ル者ニ非ザルナリ。○此論ニ
 至テハ。法兒列爾ル名ノ説理アリト謂フベシ。而シテコ
 レヲ證セムニハ。唯心臟ヲ細檢シ。其壯大ノカニ比ス
 レバ神經甚少キヲ見テ知ルベシ。又胚胎初成ノ時。心
 ノ部ニ鼓動スル一點ヲ生シ。此點神經ナレト雖。能張

縮スルヲ見テ悟ルベシ。自註ニ曰。予尚ホ二證ヲ舉ゲテ
 テ生體ニ固有スルカナルヲ明ス。其一ハ神經ヲ斷
 セル後。舍密性ハ器械性ノ刺衝物ヲ以テ。筋纖維ニ
 未收縮振盪ヲ所起シシハ。即運動ノ力陸續スル者ニ在テ。
 常ニ疲困セ諸機ハ。必疲困セザルノ縮張ノ如シ。若夫
 神經ニ關ルハ機ハ。特異ニシテ。其部ニ舍リ。且自
 以テ。亦刺衝機ノ固有ナルテ。證スルニ足ル。但其機
 能ヲ明辨セムガ為ニ。宜ク刺衝機及刺衝系ヲ統攝ス
 ベシ。故ニ予ハコレヲ血生及血管系ト名フク。蓋此中
 ニ生活スル所ノ物ハ。本血ナルガ故ナリ。夫血ハ主ナ
 リ。血ノ為ニシテ心アリ。又血行アリ。彼ノ常論ニ所謂
 心ノ為ニ血アルニハ非ズ。○血ハ生ノ源ニシテ。又其

濟生三考 卷中

三

神真樓藏板

伴ナリ。神經ハ然ラズ。神經ハ血ニ由テ始メテ其生ヲ得ルナリ。夫流體ハ凝體ニ先タツテ成ル。凡生アル者必流體ヨリ成ル。是膏ニ其初成ノ時ノミナラス。其存スルノ間常ニ然リ。然レバ血ト血管系トハ彼ノ機性生活ノ源ニシテ。即造育生活ノ本ナリ。故ニ血ハ生ノ材ニシテ神經ハ生ノ工ナリ。○是ヲ以テ外感ノ感受モ亦常ニ只神經系ニノミ係リ。特ニ神經ニ頼テ而シテ起リ。然ク唯奇道ノ感傳ニ由テノミ血生ニ傳フル者ニ非ズ。能直ニ血ニ傳ヘ。特ニ其和合ト其生トニ感スル。猶其直ニ神經ニ感スルガゴトクナリ。予コレ

ヲ證スルニ。近ク刺絡ノ功ヲ以テス。夫刺絡ハ直ニ血ノ和合ヲ變セシムル。固ヨリ論ナシ。温モ亦然リ。夫温ハ直ニ血ノ沸漲ヲ進メ。血管ノ生ヲ増盛スル。未曾神經系ノ接ヲ得テ而シテ始メテ然ルニアラズ。○阿片亦然ク一齊ニ直ニ神經ト血トニカラ達シ。瞬間ニ血ノ生カラ壯盛ス。即服後直ニ顯著ノ沸漲ヲ呈ス。ヲ以テ知ルベク。又心ノ機能増盛スルニ由リ。且直ニ血ヨリ成ル所ノ生物。即釀膿等ノ健運ニ由テ悟ルベク。及生機總テ亢盛シ。コレニ因テ血速ニ溶解腐敗ニ進ム等ヲ以テ明ラムベシ。○吾輩今日生カノ名ヲ以

テ理會スル所。往日ニ比スレバ唯更ニ大ニ更ニ廣カ
 ラムヲ要スルノミ。見ズヤ植物ハ亦生活ノ機性體
 ニシテ。神經ナシト雖。然モ生カアルト刺衝機アリテ
 存スルノ明ナルヲ。又見ズヤ各自神經ナシト雖。諸
 種未觸ノ物。能其生カヲ増上セシメ。或ハ抑制シ。或ハ
 枯死セシムルニ至ルヲ。是乃今時ノ試験ニ因テ知
 ル所ナリ。而シテ又カダト若キ植生。即動物内生ノ基ナリト
 イフ。豈非ナラムヤ。
 約シテコレヲ言ハバ。阿片ノ能ハ。他藥ノ如ク刺衝興
 奮等ヲ以テ説明スベキ者ニ非ズ。猶造化ノ重器ナル

温光越列幾等ノ如ク直ニ功ヲ生カニ致シ。其諸支諸
 流ニ入り生カニ透徹シテ其内ニ充在ス。而シテ特ニ
 生活ノ機性造育ノ力。即其本源造成ノ勢ヲ増盛シ。却
 テ知覺ノカヲ抑制ス。

主治

阿片ノ本能已ニ明ナルキハ。其應用ノ主治亦自明ナ
 リ。即左ノ如シ。
 癩。神經性症。即覺機常ヲ失ヒ。増進スル者。詳ニコレヲ
 言ハバ。血管系ト血生トノ生カ虚衰スル者。○但此症
 ハ其全身ニ在ルト。局處ニ在ルトニ論ナク。又其急性

ト慢性トニ論ナシ。

神経系ノ興奮愈盛ニ。心ト血管系トノ生力。即生活本系ノカナル者。愈沈衰シ約シテコレヲ言ハバ。生力實ニ虚衰スルヲ愈多ケレバ。阿片愈適應シ。愈合當ス。是實ニ阿片ノ一大勲ニシテ。コレニ因テ能急劇ノ危篤ヲ防ク所ナリ。例スルニ惡性瘰癧寒壞疽及室扶斯ニ於ルガ如シ。

是故ニ先脱液。或ハ人為ノ瀉血。及腸胃ノ泄出ニ因テ。身體虚衰セル者ニハ。阿片愈適應ス。故ニ神経系ノ興奮ヲ鎮靖シ其不整ノ機能ヲ整理シ

此分ニ屬ス病亦瘵ヲ除キ特ニ痛ヲ止メ心及機性生活ノカヲ壯盛ニス。○是即吾輩阿片ヲ用井ルニ當テ專率由スル所ナリ。

特異ニ分テコレヲ言ハバ。疼痛發汗スベキ症總テ中心ヨリ周圍ニ血行ヲ進ムベキノ症腸ノ泄出衰憊ヲ致スベキ者等。是ナリ。

主治已ニ明ナレバ。其禁忌亦隨テ知ルベシ。第一多血及焮衝是ナリ。○凡刺絡主治ノ症尚在ル間ハ。阿片ハ懼ルベキノ苛毒ナリ。其故ハ。阿片ハ血積ヲ増サシムルヲ尤劇ク。特ニ頭腦ニ進メ。且焮衝性ノ刺戟ヲ増盛

スレバナリ。○諸熱病其初起ニ於テハ必常ニ焮衝ノ性ヲ具ス。故ニ阿片ハ禁ズベシ。若シ誤テコレヲ用井ル片ハ其熱皆窒扶斯ニ變スルナリ。是貌樂運ノ醫流世ニ盛ナル間吾輩屢見聞スル所ニシテ予ハ則予ガ今為神經熱論中ニ説キタリ。

第二胃中汚物鬱滯スル症是ナリ。此症アレバ阿片適應セザルノミナラズ其汚物ヲ留瀦セシムルニ因テ害アリ。

第三血質甚溶解シ腐敗ニ傾ク症是ナリ。此症ハ阿片ニ因テ益増進ス。

應用

此偉大ノカヲ各病各症ニ應用スルヲ論スルハ固ヨリ予ガ敢望ム所ニ非ズ。若コレヲ為サムト欲セバ須一部ノ原病學ヲ著スヲ要スベシ。其故ハ凡有ノ病患上ノ主治ヲ以テ言ハバ阿片ヲ施スベカラザル者ナキヲ以テナリ。○故ニ予今唯阿片ノ應用特異無雙ナル諸症其應用疑フベクシテ精詳ノ辨識ヲ要スル諸症及當今世人未其應用ヲ明知セザル諸症ノミヲ列舉ス。

局處焮衝

阿片ノ功其最ナル者ハ局處焮衝ナリ。是蓋當今幾多ノ消熱醫流當ニ掉頭スベキ所ナリ。○然レモ是實ニ然リ。而シテ予ハ謂フニ。焮衝ニ阿片ヲ應用スルハ。是今ノ醫術。往日ニ勝ル所ニシテ。又醫ノ良巧ヲ見ルベキ所ナリ。○夫局處ノ焮衝ニ全身及局處ノ瀉血ヲ行ヒ。又他ノ消焮諸藥ヲ用井テ後。屢其諸症未全ク除カザルコトアリ。或ハ一タビ減退スルモ。再強劇ニ發スルコト亦屢コレアリ。譬バ脇胸痛ニ於ル刺疼。咳嗽短息ノ如シ。而シテ其脉ハ則疾ニシテ熱ヲ帶ブルト雖。小ニシテ復刺絡ヲ行フベキニ非ズ。此症ニ於テハ。消焮ノ

治法ニ因テ血ト血管系トノ所患ハ全ク除キ。唯焮衝部ノ神経系ノ刺衝ノミ尚残留スル者ナリ。此刺衝ハ即増進覺機ニシテ。或ハ又瘥ト名ツク。而シテ多量ノ刺絡ヲ以テ衰弱ヲ致スニ因テ。愈強盛ヲナスベシ。故ニ此時ニ於テ更ニ瀉血ヲ行ヘバ。疼痛及局處ノ諸症益增長ス。此症ニ在テハ阿片ヲ以テ無雙ノ神藥トス。此藥一晝夜間ニ能焮衝ノ殘餘ヲ一掃ス。蓋此藥此ニ要須ナルニカラ併有スルコト。他藥ノナキ所ナルニ由テ然リ。即一ニハ其焮衝セル部ノ増進覺機即瘥ヲ消除シ。一ニハ衰弱シテ機能廢絶セル血管ヲ興奮シ。コ

レニ因テ其部ノ機能ヲシテ。滲出瀦留セル血ヲ吸收
 シ。毎ニ必須ナル局處及全身ノ分利機ヲ完成スルニ
 適セシム。但此二件ハ消焮療法ヲ連用スレバ。愈險惡
 ニ進マザルヲ得ザル者ナリ。

胸脇痛即肺焮衝ノ痛アル者ニ在テ。右ノ症ニ遇フ
 特ニ多シ。而シテ阿片ノ用法度ニ適スルハ。患者ノ
 血ヲ費ス_ト甚シシ。或ハ唯阿片ノ_ニ以テ生命ヲ救フ
 ベキ_トアリ。但其症ヲ診決スル_ト極メテ難シ。蓋良工
 ノ良工タル所。是ニ於テ見ルベシ。其故ハ此症若阿片
 ヲ誤用スルキハ。其大害又測ルベカラズ。彼ノ貌樂運

ノ醫流行ハル。時ノ如キ。先刺絡ヲ行フヲ須タズ始
 ヲリ直_チニ阿片ヲ用井ルヲ常トス。然ルキハ其痛ハ能
 止ムト雖。煩悶除カズ。焮衝又消散セズ。或ハ變シテ寒
 壞疽トナリ死ニ陥リ。或ハ硬結膿潰ニ變ズ。故ニ患者
 一旦輕快ヲ得ル_ト覺エ。醫亦阿片ノ功ヲ稱讚スト
 雖。却テ知ラズ。患者已ニ將死ノ胚胎ヲ抱キテ。早晚肺
 勞ニ陥ル_トヲ。○阿片ノ危險ナルハ。然ク一時痛ヲ止
 メ。病苦ヲ除クガ為ナリ。コレニ因テ醫モ患者モ輕快
 ヲ得ルト謂ヒ。又コレニ因テ有カナル藥ヲ投スベキ
 ノ時日ヲ間過スルニ至ル。

故ニ先適應ノ瀉血ヲ行ヒ。適應ノ消焮法ヲ施シテ後。胸中ノ刺疼退カズ。或ハ一夕ビ退クモ必再發シ。或ハ其勢更ニ劇ク。羌青膏亦功ナク。其脉ハ則小ニシテ軟復刺絡ヲ行フベカラザルニ至テ。方ニ阿片ヲ施スベキノ良期トス。是概第五日第六日ニ在リ。此時ニ方テハ阿片一匁ヲ拵歇兒散トナシ。臨卧ニ與フレバ。一夜間ニ能焮衝ノ殘餘ヲ厭絶シ。局處及全身ノ分利尚整ハザル者ヲ完成ス。或ハ又此症ニ予ガ屢試用シテ峻功ヲ取レル所ノ加汞劑ヲ與フベシ。蓋此汞ハ焮衝ノ遺症ノル淋發ノ凝留ヲ疏解シ。且吸収セシムルノ能

アルニ因ル。

其方

甘汞 六匁

阿片 一匁

白糖 二錢

右研和シ六包ニ分チ。二小時或ハ三小時ゴトニ一包ヲ與フ。

右ノ症ヲ完治スルニ。唯此散劑ヲ連用スルヲ一晝夜。乃至二晝夜兼子テ祛痰飲ヲ温服セシムルノミヲ以テ足ルヲ多シ。即疼痛消除シ。呼吸緩解シ。痰出デ。汗發

レ。而シテ熱狀ノ脉鎮靖ス。

單純焮衝様。痺麻質性胸脇痛ノ初起ニ於ル。亦唯其臂

ニ峻カノ刺絡謂按ニ七ハ十錢ヲ行ヒ。而シテ後直チニ

挖歇兒散一服ヲ與フルノミヲ以テ完治スルヲ多シ。

予曾心焮衝ノ一症ヲ見タリ。醫己ニ多量ノ刺絡ヲ行

ヒ。復血ヲ瀉スベカラザルニ至リ。而シテ心悸強劇。煩

悶死セムトシテ止マス。老利兒結兒斯水亦功ナシ。予

乃阿片ヲ與ヘテ速ニ此殘患ヲ掃除スルヲ得タリ。

但諸焮衝病ニ阿片ヲ用井ルニ方テ。宜ク子細ニ其脉

ニ注意スベシ。コレ阿片ノ當否ヲ決スベキ確徵ナリ。

故ニ上ニ既ニ説ケルガ如ク。脉其カト緊トヲ失ハザ

ル間ハ。此藥ヲ與フベカラザルヲ固ヨリ論ナシ。又已

ニ用井ルノ後モ。子細ニ脉ヲ檢點スベシ。若其脉再緊

トナリ疾トナラバ。コレ血ノ焮衝狀ノ殘餘アリテ。阿

片ニ因テ再興奮セラル、ノ證ナリ。然ルハ阿片ヲ

用井ルヲ尚早キニ過ギタリ。寧阿片ヲ止メテ菲溫沙

密。老利兒結兒斯水。第芟答利斯等。催熱ノカナキ麻藥

ヲ用井ルニ如カズ。

諸他部ノ局處焮衝。亦右ノ規則ニ從フベシ。○即腹部

諸臟ノ焮衝。肝焮衝。脾焮衝。胃焮衝等ニ於ルガ如シ。特

ニ胃焮衝ニ於テハ。其部ノ覺機ト神經交感トノ大ナルニ因テ。病神經性ヲ得ルヲ甚大ニシテ。患者本焮衝ノ為ニハ死セズ。却テコレニ因テ發起スル全身ノ神經痙ニ因テ死スルヲ多キヲ以テ。阿片獨無二ノ救生藥タルヲ最多シ。○吾輩屢急性霍亂ニ於テ同症ヲ見ルヲ多シ。又亞細亞霍亂ノ治法ハ。總テ劇症胃焮衝ノ治法ニ異ナルヲナシ。即適宜ノ瀉血ヲ行ヒテ後。阿片ニ甘汞ヲ加ヘ。粘滑ノ油劑ニ伍シ用井ルヲ無二ノ救途トス。○又腸焮衝焮衝性吐糞ニ於テ。適宜ノ瀉血ヲ行ヒテ後。焮衝ノ神經性殘患ニ因テ。腸攣縮シ大便閉

止シテ通セザル時ハ。コレヲ通利セシムルニハ。甘汞ニ阿片ヲ加ヘ用井。温浴法ヲ行フニ如クヲナシ。或ハ峻下藥ヲ要スル者アリ。此時ニ方テモ亦阿片ヲ加フベキヲ多シ。近時頑固ノ吐糞ニ巴豆油ヲ用井テ功ナク。阿片ヲ加ヘテ始メテ利セシメテアリ。○膀胱焮衝焮衝性尿閉ニ於ルモ亦然リ。若夫瀉血功ナク測胞子及利尿藥其勲ヲ顯サバルキハ。則阿片能尿ヲ利セシムベシ。

咽焮衝特ニ格摟痲ハ又宜ク注意スベキノ一症ナリ。諸種ノ咽焮衝特ニ格摟痲ニ於テ。醫宜ク銘記スベキ

ノ一事ハ。已ニ適宜ノ消焮法ヲ行ヒ。血ノ刺衝已ニ除
 キテ後。神經ノ焮衝尚留^ホマル者アリ。即嚥器及^レ聲器ニ
 於テ痙性ノ患狀殘留シ。其患嚥器ニアレバ。嚥下困難
 除カズ。聲器ニアレバ。呼吸困難除カザル^レ。猶焮衝尚^ホ
 存スル時ノゴトシ。而シテ此患能終ニ死ヲ致ス^レア
 リ。○此時ニ至テハ。消焮法ヲ連用スルモ亦寸功ナシ。
 是此症ノ焮衝ニ非ズシテ。其殘患ノ痙ナルヲ以テナ
 リ。故ニ唯阿片。或ハ他ノ有カナル鎮痙藥ヲ用井。頸圍
 ニ芫青膏ヲ貼シ。或ハ鎮痙軟和ノ^ギ布ヲ施ス等。始メ
 テ功ヲ奏スベシ。○特ニ格樓^ゴ痺^ヒニ於テハ。世醫或ハ單

ニ焮衝ニ注意シ。消焮ノ法ノミヲ固執スル^レアリ。コ
 レニ因テ患者遂ニ治セズ。若夫此時ニ至テ。阿片或ハ
 麝香ヲ與フ^レバ。速ニ殘患ヲ一掃シ。窒塞ノ危害ヲ消
 除シ。以テ生命ヲ救フ^レヲ得ルナリ。○世醫格樓^ゴ痺^ヒヲ
 論シテ。或ハ焮衝性トナシ。或ハ痙性トナス。蓋其藥ノ
 功ニ因テ言フ所ニシテ。共ニ理ナキニ非ズ。其故ハ此
 病其本性ト初起トニ於テハ。固ヨリ焮衝性ニシテ。唯
 消焮ノ藥ノミヲ以テ能治スル^レ多シト雖。亦其焮衝
 期。屢速ニ痙性神經性期ニ變スル^レアリテ。此期ニ至
 テハ。唯有力ノ鎮痙藥ノミ能^クコレヲ救フ^レヲ得^レバ

ナリ。
 腦焮衝亦全ク前則ニ從テ療スルヲ要トス。特ニ此症
 ニ於テハ阿片ヲ以テ特異治腦ノ藥トナスベシ。夫此
 症ニ適宜ノ瀉血ヲ行ヒ寒暄ヲ施シ清涼下劑ヲ與ヘ
 テ後麻醉醒ノズ或ハ譫妄息マズ其脉復瀉血ヲ行フ
 ベカラザルハハ是焮衝已ニ腦ノ神經性患狀ニ變ス
 ル者ニシテ或ハ腦中已ニ洩^レビ^テヲ滲出スル^ル^ルアルベ
 シ。此時ニ至テハ唯阿片ヨク此殘患ヲ除キ得ベシ。但
 其洩^レビ^テノ滲漏アルベキ者ニハ更ニ甘汞ヲ加フルヲ
 要トス。○近世ノ諸家此病ヲ療スルニ多クハ單ニ消

焮法ヲ執リテ阿片ヲ遺忘セリ。予近日阿片ノ耽飲譫
 妄ニ良功アルニヨリテ再其腦焮衝ヲ治スルノ利用
 ヲ興復スル^ルヲ得タリ。但予深ク自喜ブノミナラズ。
 又深ク世人ノ予ガ説ヲ以テ新奇トナス^ルヲ怪ムナ
 リ。其故ハ腦焮衝其本性神經性ナル者。及血ノ焮衝已
 ニ消除スル者ニ阿片ヲ用井ルハ。往昔ヨリ明知セル
 一事ニシテ名工巨擘ハ既ニ稱用セル所ナルヲ以テ
 ナリ。
 右ノ規則ニ率ヒ用井テ阿片ノ眼焮衝ニ偉勲アル^ル
 ハ。當今世人ノ普ク知ル所ナリ。

神經熱及窒扶斯

右ニ説ク所ニ據リテ。又阿片ノ神經熱及窒扶斯ニ利
 アルヲ知ルベシ。○夫神經熱ハ其因必シモ腦焮衝
 ナルニ非ズト雖。又其腦ト神經系トノ所患ヲ兼子ザ
 ルハ少シ。而シテ其腦本病ノ中心トナルヲ猶心臟ノ
 焮衝熱ニ於ルガ如シ。○凡局處ノ刺衝アレバ則血積
 ヲ生シ易シ。今此病ニ於ルモ亦然リ。然レモ血積ト焮
 衝トハ尚膏壤ノ懸隔アリテ。且其血積常ニ副症ニシ
 テ本症ニハ非ザルナリ。○但阿片ヲ用井ムト欲スル
 ニ方テハ。血積亦甚大ニ恐ルベキノ一症ナリ。故ニ此

症ニ於テ。腦ト神經系トノ神經性所患ヲ治セムニハ。
 阿片ヲ以テ適應トナスト雖。若コレニ兼子テ腦ニ血
 積アルカ。或ハ焮衝アルカハ。其害亦甚大ナリ。而シテ
 阿片ノ力。唯此病ノ昏睡及卒厥ニ陷ルヲ促スベキノ
 一。其證ハ則彼ノ貌樂運ノ醫流行ハル、間。吾輩屢哀
 ムベキノ諸症ヲ目撃セルヲ以テ知ルベシ。○當今ハ
 世人貌樂運流ノ害アルヲ懼ル、ヨリ。遂ニ阿片ノ功
 用ヲ遺忘スルニ至レリ。故ニ予今此ニコレヲ辨明シ。
 阿片ヲシテ其本分ノ聲價ヲ得セシメムト欲スルナ
 リ。

神經熱ニ阿片最良功アリテ必要闕クベカラザルノ
症四アリ。

其一。神經熱其初ヨリ單純神經性ナル者。即虚衰ノ熱
ニシテ。精カヲ過勞シ。交媾手淫ヲ過行シ。若クハ過飲
等ニヨリテ發シ。或ハ既ニ神經性ナル人ニ發シ。或ハ
毫モ焮衝ノ候ナキ者。是ナリ。此症ニ於テハ少シク瀉
劑ヲ用井テ後。直ニ阿片ヲ與フベクシテ。更ニ他藥ヲ
要セザルヲ多シ。當今阿片ヲ耽飲譫妄ニ稱用スルハ。
其理亦此ニアルナリ。○又一種ノ神經熱アリ。特ニ少
年脆弱神經性ノ人ニ發ス。大抵患者大ニ疲レ。其脉刺

衝セララル。狀アリ。而シテ唯輕キ譫妄アルノミニシ
テ。別ニ局處ノ患狀ナク。又脉ニ焮衝ノ候ナク。又頭部
ニ血積ノ徵ナキ者ナリ。此症ニ於テハ。消火ノ諸藥稍
功ヲ奏スト雖。熱ト譫妄トハ稽留シテ八日ヨリ十四
日ニ至ル。此ニハ唯其消焮ノ湯液ニ。少量ノ阿片丁幾
ヲ加フルヲ以テ足レリトス。コレニ由テ熱譫妄共ニ
速ニ消ス。

其二。已ニ適宜ノ瀉血ヲ行ヒ。寒罨ヲ施シ。下藥ヲ用井
テ後。血積ノ徵除クト雖。譫妄尚止マズ。或ハ却テ狂躁
ニ變スル者アリ。是純然タル神經性ノ者トス。阿片以

テコレヲ完治スルニ足ル。但甘汞ヲ加フルト前方ノ如クニシテ更ニ良ナリ。

予嘗阿片ヲ以テ予ノ同僚ヲ救ヒシトアリ。當時ノ喜遂ニ忘ルベカラズ。予ガコレヲ診スル時ハ劇症窒扶斯ノ第七日ニアリ。脈小ニシテ殆數フベカラズ。昏睡醒メズ。譫妄シ。又筋惕アリ。瀉血寒罨下劑。甘汞已ニ多量ニコレヲ施セリト云フ。予乃前方ノ如ク阿片甘汞ノ和劑ヲ與フ。六服ノ後脈稍徐トナリ。且大ニ顯レ。瘵症消除シ。頭部輕キヲ覺エ。分利始メテ起リ。遂ニ全治スルトヲ得タリ。○此ノ如キ治例。予悉コレヲ舉ゲム

ニハ其幾許ナルトヲ知ラズ。ニハ其幾許ナルトヲ知ラズ。其三窒扶斯其初發ヨリ泄瀉痢霍亂等ヲ兼子發シ。コレニ因テ已ニ血ヲ腦ヨリ誘導スルトヲ得タリト雖。又其生力耗竭シ。真虚ニ因テ死スベキノ恐愈多キ者アリ。此症ニ於テ其泄利ヲ過ノ腸ノ刺衝ヲ鎮靖シ。以テ性命ヲ救フニ於テハ。阿片ヲ以テ無二ノ藥トス。○千八百六年及千八百七年文化三年ニ於テ。字漏生國名ニ流行セル軍中疫ハ。實ニ窒扶斯ノ瀉下ニ合併セル者ニシテ。唯阿片ノミヲ以テ能コレヲ救フトヲ得タリ。

其四。生力全ク耗竭シ。保生法「インチカチオロタリス」按ニ唯生ヲ保ツヲ主ト
スル療法 主治ノ候顯レ。有力ノ神經藥及興奮藥ヲ與
フ云フ フレ。其脈沈小ニシテ疾ナル者興復スルヲ得ザ
ル症。是ナリ。此時ニ在テハ他ノ刺衝藥ニ阿片液ヲ加
ヘ。少量ニ屢用井ルヲ以テ最大良法トス。
此症ニ於テハ。阿片能一夜間ニ其小疾ノ脈ヲ鎮靖シ。
實ニシテ且カアラシメ。譫妄ヲ鎮メ。神識ヲ醒起シ。虚
衰セシムルノ泄出ヲ遏止シ。以テ望外ノ變革ヲ致ス
一。實ニコレヲ貴靈ノ天資ト稱スルニ足レリ。
然リト雖。凡神經熱ヲ療スルニ方テハ。宜ク先下藥ヲ

用井テ。頭腦ヨリ導降シ。而シテ後始メテ阿片ヲ與フ
ベシ。切ニ其早キニ失スルヲ勿レ。

間歇熱

阿片ノ功又間歇熱ニ於テ最昭明ナリ。特ニ惡性間歇
熱ニ於テ著シ。此病ニ於テハ。實ニ阿片ヲ無二ノ救生
藥ト稱スベシ。而シテ吾輩阿片ノ此カヲ知リテヨリ。
始メテ能此病ヲ治スト言フヲ得ルナリ。蓋此カヲ
發明セシハ。實ニ留散「ホドク」忽弗滿「ホフマン」名ニ在リ。夫間歇熱阿片
ヲ施スベキノ症ハ。其發作ゴトニ卒厥昏睡等。生命危
殆ノ症ヲ兼子發シ。大抵第二發或ハ第三發ニシテ死

ニ至ル者ナリ。此症ニ於テハ。阿片二般ノ方ヲ以テ能ク
 生命ヲ救全ス。即其一ハ此卒厥ノ發作中ニ用井ルニ
 在リ。凡、刺絡ヲ以テ此卒厥ヲ救ハムト欲スル者ハ甚
 惑ヘリ。此症ハ全ク痙攣ヨリ他ナクシテ。而シテ能ク
 レヲ除キ。其厥症ヲ復セシムルヲ得ルハ。特、阿片ノ
 ミナリ。其二ハ發作ヲ防止スルガ為ニ用井ルニ在リ。
 此發作ハ即間歇熱ノ發動ニシテ。コレヲ預防シ。務メ
 テ速ニ熱ヲ遏止スレバ。即病全ク治ス。然レモ此發動
 ヲ遏止スルニハ。次方ヲ施スヨリ的切ナルハナシ。其
 方ハ則發作ノ間時ニ於テ。新ニ研末セル黃幾那八錢

ヲ與ヘ。其終服ニ阿片一匁ヲ加ヘテ。次ノ發作前ニコ
 レヲ與フ。此方ハ總テ頑固ノ間歇熱ヲ截スル最確ノ
 方ト稱スベシ。

痙

痙性神經病ニ阿片ノ一大藥タルハ。世人ノ普ク知
 レル所ニシテ。又常ニ多ク此症ニ施用ス。故ニ庸醫ト
 雖。痙ノ名ヲ聞ケバ阿片ノ名ヲ舉ゲザル者ナシ。而シ
 テ大不幸正ニ其中ニ在リ。其故ハ痙ニ阿片能クコレヲ
 救フベキ者ト。阿片能クコレヲ害シ。能ク死ニ至ラシムベ
 キ者アリテ。其差別啻ニ霄壤ノミナラザルヲ以テナ

リ。○蓋能コレヲ辯識シ。且コレニ注意スル者幾人ゾ
ヤ。故ニ予此ニコレヲ説カザルヲ得ズ。

阿片ヲ用井ムト欲スルニ方テ宜ク辯明スベキノ症
ニアリ。其一ハ則其瘧多血或ハ頭腦血積ヲ兼子。或ハ
焮衝性ヲ兼子。或ハ單ニ焮衝ニ因テ發スル者。其二ハ
則瘧胃腸汚物ヲ兼スル者。或ハコレニ因テ發スル者。
其三ハ則瘧右等ノ合併症ナク。單純神經性ノ者是ナ
リ。其第一症ハ少年ノ人ニ多ク。特ニ小兒生齒ノ時ニ
發スル症ニシテ。阿片能其瘧ヲ増進シ。或ハ卒厥ヲ發
シテ死ニ至ラシムベシ。此症ハ必先瀉血ヲ行ヒ。消焮

誘導ノ藥ヲ施シテ。其血積ヲ掃除スルヲ要トス。大抵

此法ニ因テ瘧全ク治スルコト多シ。按ニ世ニ所謂小兒

ベシ。若夫右ノ方法ヲ施セ。瘧尚留連スル者ハ。始メテ

阿片ノ施用ヲ許スベシ。然レモ仍先無熱ノ鎮瘧藥即

菲脛沙密。老利兒結爾斯水。亞鉛等ヲ與ヘ。其功ヲ奏セ

ザル時ニ至テ。始メテ阿片ヲ用井ルヲ以テ勝レリト

ス。○其第二症ニ於ルモ亦阿片功ナクシテ害アルベ

シ。此症ハ宜ク先吐下藥ヲ以テ胃腸ヲ淨滌スベシ。大

抵コレニ因テ瘧ヲ鎮ムルニ足ル。而シテ若瘧尚止マ

ザル片ハ。始メテ阿片ヲ與フベシ。○其第三症ハ則阿

ニ興奮セラレ、カ。或ハ黑膽質ノ人ニ多キガ如ク。病ノ本因。腦ト神経系トニ在ラズシテ。却テ腹部諸臓ノ壅塞鬱蓄ニ在ルキハ。阿片只害アリテ益ナシ。但其有形ノ因既ニ除キテ後。病單純神經性トナリテ留連スルキハ。阿片能功ヲ奏スベシ。○又神經性譫妄ニ阿片ヲ用井ルハ。内服スルヨリハ。灌腸藥トシテ用井テ其功勝ルヲ多シ。

咳及胸患

咳ト胸患トハ。亦阿片ヲ施スニ方テ。宜ク明辨スベキノ一症ナリ。○夫諸種ノ咳。或ハ諸種ノ肺勞。阿片ニ因

テ治スルヲ固ヨリ多シ。然レモ又阿片ニ因テ却テ險重シ。或ハコレニ因テ始メテ真ノ肺癆衝ニ至リ。遂ニ真肺勞ニ陷ルヲ更ニ多シ。其理蓋胸患ノ性各異ナルニ因ルナリ。而シテ其各異ヲ辨識スルハ。即醫ノ術ナリ。若夫其咳歟衝性ノ者ナルカ。或ハ肺ノ歟衝若クハ血積ニ因スルカ。或ハ否ザルモ是等ノ症狀ニ兼ヌルキハ。阿片常ニ害アルベシ。聖京咳ニ於ルモ亦然リ。其歟衝狀ノ刺衝ヲ兼ヌル間ハ。阿片常ニ害アリ。又腸胃性ノ咳ハ。唯吐藥ヲ以テノミ治スベクシテ。阿片ニ因テハ必險重ス。若夫其咳單純神經性ナルカ。或ハ痙性

關ルヲ以テナリ。依ヒトモ昆セン堉セン兎セン性依斯的里性ノ人ハ其覺機特異ニ内部ニ引縮スルガ故ニ。外感ニ應スベキノ感受機衰弱シ。コレニ因テ傳染病流行病ニ罹ルト少キモ亦一顯證ナリ。

但毒ニ二種アリ生毒傳染死毒是ナリ。是宜ク辨識スベキ所ナリ。

其生毒ニ於テハ阿片唯二般ノ應用アリ。其一ハ其神經ヲ痲鈍ニシ。神經力覺機即衰弱セシムルノ能ナリ。其二ハ其汗ヲ發シ。毒ヲ揮散驅逐スルノ力ナリ。○但古昔ノ醫輩ハ阿片ノ血行ヲ増進シ。熱ヲ起シ。炊衝

ヲ催スノカラ詳察セザリシナリ。コレニ因テ誤用極メテ多ク。世ニ大不幸ヲ播セリ。蓋其説ニ急性諸熱病。皆傳染毒ノ致ス所ナルヲ以テ。宜クコレヲ驅散スベシト謂ヒテ。普ク阿片ヲ用井タルカ故ニ。諸種ノ熱病。多クハ惡性腐敗性ニ變シ。粟疹紫斑ヲ兼ヌルニ至ラザル者殆ト少シ。

急性傳染毒ニ於テハ。阿片然ク常ニ大害アルベシ。但其傳染ノ初ニ於テハ。抱ド歇キ兒散一服ヲ服シテ温覆發汗シ。能一晝夜ニシテ其病ノ萌芽ヲ刈リ盡ストアルト。

慢性傳染毒ニ於テハ然ラズ。此ニハ阿片ノ血ヲ興奮
シ。皮表ニ導達シ。揮散セシムルノ大能。最善ク適應シ。
此症ニ於テ屢生體ノ抗拒缺乏スル者ヲ補フヲ得
ベシ。

慢性傳染毒中第一黴毒ヲ論ゼザルヲ得ズ。幾多ノ
試験ニ據ルニ。黴毒ノ殘患。水銀功ナキ者ニハ。阿片ヲ
以テ峻藥トナスベシ。千七百八十年我安永ヨリ千七
百八十五年我天明ニ至ル間。英吉利ニテ汞ヲ用井ズ
單ニ阿片ヲ以テ黴毒ヲ治スルノ説ヲ唱へ。且多ク其
試説ヲ刊行セリ。夫然ク單ニ阿片ヲ以テ黴毒ノ諸症

ヲ消除シ得ルコト。固ヨリ疑フベキニ非ズ。列爾那兒度
名ノ治黴秘方ハ。阿片ト亞爾加里トヲ以テ製スル者
ニシテ。其功亦著シ。予ガ親驗スル所。及諸家ノ驗説ニ
據テ考フルニ。汞ノ特異黴毒ヲ殺スノカハ。阿片ノ能
得テ代ルベキ所ニ非ズト雖。黴毒ニ因テ發スル所ノ
諸症。生體ノ抗拒。及病毒ノ分利ト排泄トハ。阿片ノ力
ヲ以テ能コレヲ催進調理スルヲ得ルナリ。傳染ハ
第二期。煽衝ノ狀除キテ後。阿片ヲ加へ用井テ。著ク汞
ノカヲ強進スルヲ得ルハ。予カ屢驗スル所ナリ。經
久黴毒。特ニ屢汞ヲ誤用シテ變性セル者ニ於テハ。阿

是ニ由テ。予又阿片理家毒按ニ即テ上ニ所謂死毒ニテ。專ラ金石ノ毒ヲ謂フヲ解スルノカヲ舉ゲザルコトヲ得ズ。理家毒トハ特ニ礦性ノ毒ニシテ。汞毒、鉛毒及砒毒ニ謂フナリ。凡是等ノ毒。已ニ局處按腸ニカラ奮テ後。第二道ナル血管全系統ニ遷移スルハ。阿片ヲ以テ隊長トナスベシ。鉛毒ニ於テハ先第一道ヲ掃滌シテ後。阿片ヲ以テ主藥トナスハ。世ニ知ル所ナリ。又慢性ノ汞毒、砒毒ニ於ルモ亦同。但此ニハ舍密化調ノ大藥ナル硫黃ヲ兼用スルヲ要トス。又阿片流涎ヲ防グノ力。其理蓋亦此ニ基ク。此力ニ由テ。汞ニ伍用シテ能流涎ヲ預防シ。又其已ニ來

レル者ヲ治ス。但此力ハ其理又其皮表ニ導達シ。汗ヲ發シ。コレニ由テ誘導對衝スルノ能ニ關ルコトアリ。即次條ニコレヲ辨明スベシ。

蝮蛇咬等ノ動物毒ニ阿片ノ功アルハ亦專其速ニ汗ヲ發シ。分利ヲ起スニ由ル。

分利 使皮膚活發

皮膚ノ全系ニ分利ヲ進メ活發セシメ其病性ノ泌別ヲ起サシムルハ實ニ阿片ノ特異秀抜ノカナリ。此力ハ次ノ二症ニ於テ最彰明ナリ。

其一ハ痘ナリ。若夫惡性神經性痘見點後第五日。或ハ

能ト謂フ苦痛ヲ軟和シ意思ヲ鎮靖興奮シ且死ヲ輕易ニスルノ能是ナリ。○夫不治必死ノ症ニ於テハ生命實ニ痛苦ノ羈絆ニシテ其死スルニ方テモ尚且幾多ノ苦ヲ受クルヲ免レザル者多シ。此時ニ於テハ阿片ノ此一能亦多トスルニ足レリ。况ヤ其生ヲ勸慰スルヲ阿片ニ如ク者ナキニ於テヲヤ。○故ニ予ハ謂ヘラク阿片假令更ニ一個ノ他能ナキモ此一事實ニ天ノ貴賚ト稱スルニ足ルト。○亦其苦痛ヲ鎮スルニ千百ノ醫藥中痛苦ヲ鎮メ然モ久クコレヲ消除セシムルヲ阿片ノ如キ者ハアラス。予ガ療スル所ノ患者

宵ニ阿片ヲ服シ。詰且ニ至テ全ク症ヲ改メ。言語態容ヲ一新スル者。予ガ驗スル所常ニ百回ノミナラス。而シテ其功持留スルヲ常ニ一晝夜ニ至ル。

予今其症ノ一二ヲ舉ゲムニ。肺勞ノ患者。已ニ其回生ニ望ナク。煩悶ト大氣ノ缺損ニ因テ。漸消耗スルガ如キ。不治ノ癌病。日夜痛楚ヲ受クルガ如キ。胸水ノ患者。久ク死悶ヲ受クルガ如キ等是ナリ。○此症ニ遇テハ。阿片ナクンバ誰カ醫タルヲ願ハムヤ。此ノ如キ患者。阿片ニ因テ其狂迷ヲ免ル者。幾許ナルヲ知ラズ。蓋阿片ノコレヲ救フハ。常ニ其身體ノ痛楚ヲ除ク

ノミニアラス。更ニ精神ニ一異ノカヲ與ヘ。且、コレヲ
擧起シテ。自安息セシムルニ在リ。
此鎮靖ノ力最昭然タルハ。其險症ニ於テ死ヲ易クシ。
令終ヲ得セシムルニ在リ。若夫醫己ニ其命緒ヲ繫ク
ト能ハザルニ至テハ。此一事實ニ亦醫ノ仁術ニシテ
且其好福ナリ。此時ニ方テハ。阿片膏ニ將死ノ痛苦ヲ
除クノミナラス。更ニ死スベキノ勇トカトヲ與ヘ。其
意思ヲシテ魂魄歸スル所アルノ理ニ安ンゼシム。
予ガ實驗スル所固ヨリ多シト雖。今此ニ近日驗スル
所ノ一症ヲ舉ゲテ。他ヲ類推セシム。

一男子。已ニ久ク胸病ニ罹リ。肺ニ膿囊ヲ生ジ。正ニ死
ニ瀕セリ。將死ノ苦悶極メテ劇ク。窒塞ノ恐休ム時ナ
ク。遂ニ真ノ狂迷ニ陥リ。其状態殆傍觀スルニ堪ヘザ
ルニ至ル。○乃其干牌ヨリ。每一小時ニ阿片半片ヲ服
セシム。三小時ノ後患者安息シ。二片ヲ服シテ後睡ニ
就キ。數時間安眠シ。詰旦睡醒メテ意思爽快。痛ナク悶
ナク。精神又強壯鎮靖シ。其親眷ニ向テ徐ニ別ヲ告ゲ。
更ニ己ノ福ヲ語り。又幾多ノ良戒ヲ遺シ。而シテ再睡
ニ就キ。睡中ニ生ヲ畢ハレリ。

危害

阿片ノ危害ニ於テハ予更ニ此ニ一言セザルヲ得
ズ。嘆ズベシ其危害甚大ニシテ。阿片ノ世ニ害アル其
世ニ利アルト未以テ大小ヲ定ムベカラズ。然レモ是
刺絡ニ於ルモ火藥ニ於ルモ亦然リ。凡^ツ天地間ノ大威
大カアル者。皆然ラザルハナシ。譬ヘバ火ノ如シ。凡^ツ物
世ニ利スルノ力愈大ナレバ。其世ニ害スルノ力亦愈
大ナリ。豈其誤用ノ害アルヲ以テコレヲ無キニ如カ
スト謂フベケムヤ。

其危険ノ第一最大ナル者ハ。其殄殺ノ力ニアラズシ
テ。却テ其誑誘ノ力ニアリ。○阿片ヲ多量ニ服スレバ。

疼痛煩悶。痙攣及其他ノ苦惱等。實ニ良能救援ヲ呼喚
スル所ノ音容ナル者ヲ鎮靖シ。更ニ意志ヲ強クシ。想
像ヲ盛ニシ。精神ヲ勇壯ナラシメ。コレニ由テ患者ト
醫ト共ニ其真狀ヲ察スルヲ得ズ。又其危篤ヲ悟ル
ヲ得ズシテ。輕忽ニ望ヲ養ヒ。是ヲ以テ有力ノ救援
必^ト湏ニシテ。尚^ホ其濟ルヲ希フベキノ時日ヲ錯過スル
ニ至ル。

其第二ノ危険ハ則卒厥狀ノ腦患ナリ。○此害特ニ一
歳ノ小兒ニ於テ最大ナリ。予今阿片ヲ禁戒セムト欲
スルモ。筆其意ヲ盡ス^レ能ハズ。此ニハ一滴ノ阿片液。

已ニ過強ノ量トナスベシ。只危篤ノ極。必須ノ症。譬へ
 バ大瀉下。精カラ耗竭スル者ノ如キ。始メテ阿片ヲ與
 フベシ。但、仍灌腸藥トナスヲ以テ勝レリトス。若夫内
 服ニハ。一滴ヲ砂糖ニ研和シ。四分シテ其一ヲ與フル
 ヲ以テ適量トス。

其第三ハ。陽性焮衝ニ於テ焮衝ヲ増進シ。膿潰ヲ促シ
 或ハ寒壞疽ニ變セシムルニ在リ。

其第四ハ。胃腸ノ汚物ヲ澁閉シ。腹部諸臟ノ閉塞硬結
 ヲ致シ。且門脉系ニ血ノ蓄積ヲ増加スルニ在リ。

其第五ハ。血ノ溶解腐敗ヲ増進シ。崩汗ヲ促シ。粟疹紫

斑。驚。瘡ヲ起スニ在リ。諸熱病ニ於テ投施時ニ適ハ
 ズ。或ハ其量過大。或ハ其服用過久ナレバ。此害ヲ招キ
 易シ。特ニ腸胃熱ニ於テハ最然リ。

其第六ハ。習慣ニ在リ。○凡經久病。阿片ヲ連用スレバ。
 終ニコレニ習慣シテ。常日ノ必須トナリ。病已ニ治ス
 ルノ後モ。仍_ナ全身ノ覺機ヲ興奮シテ。健康活發ノ度ニ
 至ラレヌ。以テ形體ト精神トヲシテ。日用ニ足ラシム
 ルガ為ニ。不_レ缺ノ要藥トナルニ至ル。猶燒酒家ノ終
 ニ燒酒ニ習慣シテ。日常ノ必須トナルニ至ルガゴト
 シ。而シテ其由テ致ス所ハ。則毎ニ其量ヲ加フルニア

リ。是所謂阿片癖ニシテ。全ク耽飲ノ癖ニ同^レテ其
 所發ノ症ハ則神經ノ衰弱常ニ増加シ。諸部振戰シ。消
 食カト補給カト共ニ廢絶シ。終ニ振惕譫妄ヲ發シ。神
 識五神共ニ遲鈍シ。出血ヲ發シ。血溶解シ。勞瘵ヲ致ス
 等ナリ。

濟生三方卷中終

