

1032

醫方集錦 三

除痰之

劑

痰之源不一

有因熱而生痰者

有因痰而生熱者

有因氣而生者

有因風而生者

有因寒而生者

有因濕而生者

有因暑而生者

有因驚而生者

31622

有因多食而成者

有傷冷物而成者

有嗜酒而成者

有脾虛而成者

俗云百病皆由痰起然內經有飲字而無痰字

至仲景始立五飲之名而痰飲居其一

龐安常曰善治痰者不治痰而治氣

氣順則一身津液亦隨氣而順矣

準繩云 痰之生 由於脾氣不足 不能致精于肺

而淤以成者也

治痰 宜先補脾 脾復健運之常 而痰自化矣

腎虛不能制水 水泛為痰 是無火之痰

痰清而稀

陰虛 火動 火結為痰 是有火之痰

痰稠而濁

痰症初起 發熱頭痛 類外感來症 久則朝咳夜重

又則朝咳 夜重

又類 陰火內傷 走注肢節疼痛

又類 風症

但肌色如故

脈滑不勻 為異耳

濕痰

治一切痰飲為病 咳嗽脹滿 嘔吐惡心 頭眩心悸

批脾虛不能健運 則生痰飲

稠者為痰

水濕其本也

稀者為飲

陳

得火則結 為痰 隨氣生降

湯

在肺則咳

在胃則嘔

局牙

在頭 則眩

在心 則悸

在背 則冷

在脇 則脹

其變不可勝窮也

本方用

半夏

善製
二分

陳皮

去白

茯苓

一分

甘草

五分

加姜

黃

善能制半夏之毒

陳皮

半夏

貴其陳久則無燥散之患

故名二陳

治痰通用二陳

風痰

加南星、白附、皂角、竹瀝

寒痰

加半夏、薑汁

火痰

加石膏、青礬

濕痰

加蒼朮、白朮

燥痰

加瓜蒌、杏仁

食痰

加山楂、麦芽、神曲

老痰

加枳實、海石、芒硝

氣痰

加香附、枳殼

△ 脇痰 在皮裏膜外

加 白芥子

△ 肢痰

加 竹瀝

此是 太陰 陽明 藥上

批 半夏

性^辛溫 體滑 性燥 行水 利痰

為 君

痰因氣滯 氣順則痰降 故以橘紅

橘紅

利氣

痰由濕生 濕去則痰消 故以茯苓

茯苓

滲濕

為 臣

又以甘草

和中補土

為佐也

經曰有痰而渴

宜去半夏

代以貝母

瓜蒌

吳鶴皋曰

渴而喜飲水者

易之

渴而不能飲水者

雖渴猶宜半夏也

此濕為水

濕極而兼勝已之化非真象也

熱為標

按貝母

寒潤

主肺家燥痰

半夏

溫燥

主脾家濕痰

雖俱化痰 而寒溫燥潤 各異脫

或悞從貽害 匪淺用者 宜審之

有血不足 陰火上逆 肺家受傷 肅清之令 不得下血行

由是津液 渾濁生痰

不生血者 名燥痰 當用潤劑

如地黃 門冬 枸杞 之類 滋陰降火 而痰自清

若投 二陳 立見危殆

有痰飲 流入一肢 肩背痠痛 手足罷軟 誤以為風

誤以為風 則非其治

宜導痰湯 加水香 薑黃

大凡痰飲

變生諸症

當以治飲為先

飲消則病諸症自愈

如頭風 眉稜骨痛

投以風藥 不效

投以痰藥 見功

又如眼赤羞明

與之涼藥 不瘳

與以痰劑 獲愈

凡此之類 不一而足

有人坐處吐痰滿地 不甚稠粘 只是沫多

此因氣虛 不能攝涎 不可用利藥

宜服六君子

加益智仁 以攝之

△本方添加人參 白朮

治氣虛有痰

名六君子湯

△本方內除去 茯苓 甘草

名陳皮半夏湯

再加 桔梗

名桔梗半夏湯

△本方內去 陳皮 甘草

名半夏茯苓湯

再加 生薑

名小半夏加茯苓湯

金匱並治水氣嘔惡

△本方添加 黃芩

名茯苓半夏湯

本方添加 黃連

梔子 生薑

名二陳加梔連生薑湯

治腸上熱痰 令人嘔吐

去生薑

治噎噤

本方添加 砂仁

枳殼

名砂枳二陳湯

行痰 利氣

本方添加

胆星

枳實

名導痰湯

治頑痰 膠固

非二陳所能除者

加胆星 以助半夏

加枳實 以成衝墻

之功 倒壁

加胆星以助半夏

加枳實以成衝墻 倒壁之功

△再加 菖蒲

治驚悸健忘 怔忡不寐

△導痰湯方

加木香 香附

名順氣導痰湯

治痰結胸滿 喘咳上氣

△本方添加

枳實 瓜蒌 蘇子 山查 神曲

治食積痰嗽 發熱

本方添加

蒼朮 枳殼

片姜黃

名加味二陳湯

仁者

治痰攻眼腫

併酒家手臂重痛

麻木

本方內除去

甘草

加干姜

姜汁糊丸

名溫中化痰湯

寶鑑

治胸膈寒痰不快

本方內除去

茯苓

甘草

加黃連 麩糊丸

薑湯下

名三聖丸

治痰火 嘈雜 心懸如飢

單用 陳皮 生薑

名橘皮湯

金匱 治干嘔穢 及手足厥者

单用 半夏 姜汁 名生薑半夏湯

金匱 治似喘不喘 似嘔不嘔 似噦不噦 心中憤憤然

然魚柰者

本方用 半夏 醋煮 除陳皮 姜汁丸 名消暑丸

見暑門

腸痰
即二腎散

潤
治腸中痰飲

下
本方用 廣陳皮 去白以寸
鹽水浸洗

甘草 二寸
炙 蒸餅糊丸

或將陳皮 鹽水煮爛 晒干同甘草 為末 名二腎散

丸
引善湯下

如濕勝 加星夏

頭勝 加苓連

此足少陰 陽明藥也

批 陳皮

燥濕而利氣 濕去則痰涸 氣順則痰行

食鹽潤下而軟堅 潤下則痰降

軟堅則痰消 痰在膈中故用甘草引之

甘草 蜜炙

引之入胃 且草經蜜炙 能健脾調胃

脾胃健 則痰自行矣

虛弱人 慎用

朱丹溪曰 胃氣亦賴

痰以養 攻盡則虛而愈弱

痰飲

治心下有痰飲 胸脇支滿 目眩

批 稀者為飲

稠者為痰

痰者積於厥陰心包 則胸脇支滿

痰飲阻其胞中之陽 水精不能上布 故目眩

桂 苓 甘 朮 湯

本方用

茯苓一分

桂枝

白朮二分

甘草二分

金匱 此是太陰 藥也

喻嘉言曰

批 茯苓

治痰飲 代腎邪 滲水道

桂枝

通陽氣 開經絡 和榮衛

白朮

燥痰水 除脹滿 治風眩

甘草

得 茯苓

則不資滿 而反泄滿

故本草曰

甘草能下氣 除煩滿

此症為痰飲 阻抑其陽 故用陽藥 以升陽而化氣也

金匱曰

短氣有微飲者

當從小便去之

桂苓甘朮湯

主之

腎

氣丸

易主之

按腎氣丸亦通陽行水之藥也

引痰而橫行變生諸症不可紀極

痰積於五臟

痰積於五臟

亦有餘則為水

亦有餘則為水

亦有餘則為水

茯苓

此藥飲之能利小便而通五

桂枝

此藥能通經絡而助陽氣

芍藥

此藥能養血而和營衛

甘草

此藥能補氣而和諸藥

茯苓

此藥能利小便而通五

故本草曰

甘草能下氣除煩滿

此症為痰飲阻抑其陽故用陽藥以升陽而化氣也

無病者

亦宜斷其根也

上

清氣化痰丸

治熱痰

批熱痰者

痰因火盛也

痰疾有形之火

火即無形之痰

痰隨火而升降

火引痰而橫行

變生諸症不可紀極

火借氣氣五臟

痰借液于五味

氣有餘則為火

液有餘則為痰

故以痰者必降其火

治火者 必順其氣也

△本方用

半夏 善製

胆星 一廿半

橘紅

枳實

麩炒

杏仁

去皮尖

瓜蒌仁 去油

黃芩 酒炒

茯苓 一廿

薑汁糊丸

引淡善湯

此手送 太陰之藥也 治痰火之通劑也

批氣能發火 火能後痰

註

半夏

南星

以燥濕氣

黃芩

瓜蒌

以平熱氣

陳皮
以順氣

杏仁
以降逆氣

枳實
以破積氣

茯苓
以瀉行水氣
水濕火熱
皆生痰之本也

蓋氣之亢而為火 猶民之反而為賊 賊平則還為良民

而復其業矣

火退則還為正氣 而安其位矣

故以化痰 必以清氣為先也

本方用

此以外科新必以青藤散以之

女壯則血氣五磨 而此方以之

此方用

蓋原之六 而歲大 前月之必 而昔娘 想平 國至 崇夏月

此方用 必以青藤散以之

此方用

此方用

此方用

食痰

治酒食生痰 胸膈膨悶 五更咳嗽

批 過飲則脾濕 多食辛熱油膩之物 皆能生痰

壅於胸膈 故滿悶 五更咳嗽

由胃有食積 至此時 火氣流入 肺中故嗽

本方用 半夏 善製 胆星 一斤 青皮 陳皮 去白 萊菔子 生

蘇子 沉水者 炒 山查炒 麥芽炒 神曲炒 葛根

杏仁 去皮尖 製香附 各一司

姜汁和燕餅糊丸

一方 半夏 南星 各一斤 白礬 皂角 生姜 各一斤

同者安至南星無白点為度

去皂角 薑 切同晒干用

此手是太陰藥也

批 痰由濕生

註 半夏 南星 所以燥濕 痰由氣升

蘇子

蘇子 所以降氣 痰由氣滯

杏仁

青皮 陳皮 香附 所以導滯 痰因于酒食

痰因于酒食

葛根 神曲

所以解酒

山楂 麦芽

所以化食

湿去 食消 則痰不生 氣順

氣順 則咳嗽止

痰滯 既去 滿悶自除也

久嗽 有痰者 燥脾化痰

血痰者 清金降火

蓋外感久 則鬱熱內傷 久則火炎 俱要開玉潤燥

其又情氣逆者

順氣為先

停水宿食者

分導為要

氣虛者

補之 飲之

不宜妄用瀉劑

山查 枳實

枳實 枳實

葛根 枳實

枳實 枳實

枳實 枳實

痰嗽

治痰湿 氣逆 而咳嗽

清

批 肺受火傷 則氣逆 而為咳

燥脾化痰

因脾有停湿 則生痰 而作嗽

肺

病有五臟

六腑

之殊

其要皆歸于肺

以肺為五臟華蓋

下通膀胱

外達皮毛

為氣之主

飲

為氣之主 而出聲也

天法

新嗽

脈浮

為表邪 宜發散

脈實

脈實 為內熱 宜清利

脈濡散

為肺虛 宜溫補

久嗽 曾經解利 以致肺胃俱虛 飲食不進

宜溫中助胃 兼治嗽藥

素問曰

肺之能令人咳 何也

曰五臟六腑

皆令人咳 非獨肺也

皮毛者 肺之合也

皮毛先受邪氣 邪氣以從其合也

五臟各以其時 又病非其時 各傳以乘之

有自外傳者得 肺主皮毛 風寒暑濕之邪 自皮毛入內

傳臟腑 而為嗽也

有自發者 七情飢飽 內有所傷 則邪氣上逆

肺為氣出入之道 故五臟之邪 上蒸于肺

而為嗽也

然風寒暑濕 有不為嗽者

蓋所感者重 不留于皮毛 徑傷臟腑而成

傷寒 溫熱 七情 亦有不為嗽者

亦有不為嗽者

蓋病尚淺

只在本臟

未傳入肺

所以傷寒

所以傷寒 以有嗽 為輕

而必情飢飽之嗽 必久而後發也

本方用

杏仁 去皮尖

貝母

茯苓

一

桔梗

甘草

炙

糯米 五升

加姜

煎

食遠服

以時 加減法

春時傷風咳嗽

鼻流清涕

宜清解

加薄荷

防風

紫蘇

炒苓

夏令夏多火熱

宜清降

加桑皮 麦冬 黄苓 知母 石膏

秋多湿熟 宜清熟 利湿

加苍朮 桑皮 防风 栀子 黄苓 黄苓

冬多風寒 宜解表行痰

加麻黄 桂枝 干姜 生姜 半夏 防风

外加减法

如火嗽者

本方添加 青黛 瓜蒂 海石

若食積痰

△本方添加 香附 山查 枳實

如濕痰者

△本方添 擦除去貝母 加 半夏 南星

如燥痰者

△本方添加 水蘊 知母 天門冬

如午煎嗽者 屬胃火 宜清胃

△本方加 石膏 黃連

如午後嗽者 屬陰虛 宜滋陰降火

△本方加 川芎 當歸 白芍 地黃 知母 黃柏 三冬

竹瀝 姜汁

傳送黃昏嗽者

為火浮于肺不可用

宜五倍五味訶子

以斂而降之

若勞嗽見血者 是肺受邪熱

本方添加 當歸 白芍 阿膠 天冬 知母 款冬 紫苑 類

若久嗽者 肺虛

本方添加 人參 黃芪

如肺熱 去人參 用沙參 可止

此手太陰之藥

治肺之通利也

批

杏仁

解肌散寒

降氣潤燥

貝母

清火散結

潤肺化痰

之味

斂肺而寧嗽

茯苓

除濕而理脾

橘紅

行氣

甘草

和中

桔梗

清肺利膈

載藥上浮

而又能開鬱發表也

金沸草散

活人

治肺經傷風 頭目昏痛 咳嗽多痰

批 風盛則氣壅 氣壅則痰生 故頭目昏痛而咳嗽

直指方云

咳嗽感風者 鼻塞声痛

傷冷者 博清怯寒

挾熱 為焦煩

受濕 為纏滯

瘀血 則膈間腥悶

停水 則心下怔忡

或實
虛

痰之黃白

唾之稀稠

從可治也

本方用

旋覆花

即金沸草也

前胡

細辛一分

荆芥一分半

赤茯苓

半夏五子

炙甘草三分

加善煮

局方 加麻黃 赤芍

無赤苓

細辛

玉机微義曰局方辛平

活人辛溫

如滿悶

△本方添加 枳殼 桔梗

有熱

△本方添加 柴胡 黃苓

頭痛

△本方添加 川芎

此手^太陰藥也

批 風熱上壅

荆芥

辛輕 發汗而散風

痰涎内結
前胡
旋覆

消痰而降氣

半夏

燥痰而散逆

甘草

發散而和中

茯苓

行水

細辛

溫經並痰必挾火而蒸濕
故下氣利濕而症自平

赤茯苓

用赤者

入血分而瀉丙丁也

註小腸 為丙火
心為丁火

三因方云一婦人牙痛 治療不效

口頰皆腫 以金沸草散 天劑煎湯 薰漱而愈

痰味

治喘嗽不已 或痰中有血 虛人尤宜

百

本方用 百合 欬冬花 葶藶子 透丸 龍眼大

花

食後 臨卧 引姜湯送下

或吟化

膏

本方添加 紫苑 百部 烏梅 各加味百花膏

治同煎亦可

此手太陰藥也

此方批

欵冬

泻熱下氣

清血除痰

百合

潤肺寧心

補中益氣

並為理嗽要藥矣

膏 芥 百

本方用

百合

發冬芥

數片

食對甜相

信美

副藥

瓜

泡熟中育也

盡入水宜

藥

氣痰

治中脫氣滯痰涎不利

三

批 按氣滯不通 為氣痰 走注刺痛 亦曰氣痰

仙本方用 南星麩 半夏麩 香附

糊丸 引 姜湯送下

丹

此是陽明 手太陰 藥也

百方

註 南星夏 以燥痰肺胃之痰

香附 以快三焦之氣 使行氣 則痰行也

五机微義

曰 此方其局方

四×湯

皆行痰 而兼用氣药也

指迷茯苓丸

即嚴氏

氣順則痰自下之意

然

紫蘇

枳殼

肺氣药也

厚朴

脾胃氣药也

香附

肝氣药也

隨藏氣 而用 不可不分

又云嚴氏

以人之×情鬱結

氣滯生痰

氣道通利 痰自降下

又有原有積痰

其氣因痰而結滯者

必先逐去痰結 則氣自行

有一咳痰即出者
脾湿勝而痰滑也

宜半夏 南星 皂角 之属 燥其脾

若利氣之劑 所当忌也

有連咳痰不出者

肺燥勝而痰清也

宜枳殼 杏仁 紫蘇 之属 利其肺

若燥脾之劑 所当忌也

有連家法不立

神醫傳記卷之四

直隸

神醫傳記卷之四

神醫傳記卷之四

神醫傳記卷之四

神醫傳記卷之四

半夏天麻白朮湯

治脾胃內傷 眼黑頭眩 頭痛如裂 身重如山

惡心煩悶 肢厥冷

謂之足太陰 痰厥頭痛

批痰厥者 濕痰厥逆而上也

痰逆則上石實 故令頭痛目眩 眼見黑色也

東垣曰 太陰頭痛 必有痰也

少陰頭痛 足寒而氣逆也

太陰

二經 雖不上頭

少陰

然痰 與氣 逆壅于膈中

頭上氣不得暢 而為痛也

本方用

半夏 羊鬃

麥芽 一分半

炒神曲

白朮 一分

蒼朮 酒浸

人參

黃芪 煨炙

陳皮

茯苓

澤瀉

天麻 五分

干姜 三分

黃柏 酒洗 二分

每服五分

此是太陰病也

批 痰厥 頭痛 非半夏 不能除 而能和胃

頭眩眼黑 虛風內作 非天麻 不能定

天麻有風不動 名定風草

黃芪 人參 甘溫 可以瀉火 亦可以補中

二朮 甘苦而溫 可以除痰 亦可以益氣

去濕 故除痰 健脾 故益氣

苓 瀉 瀉熱導水

陳皮 調氣升陽

神曲 消食 蕩胃中滯氣

麥芽

化結 助戊巳運行

胃為戊土 脾為巳土

乾薑

辛熱 以滌中寒

黃柏

苦寒 酒洗以療少火在泉 發躁也

李東垣曰

夫風從上受之 風寒傷上 邪從外入 令人頭痛 身重惡寒

此傷寒頭痛也

頭痛 耳鳴 九竅不利 腸胃之所生 乃氣虛頭痛也

心煩 頭痛者 過在手 太陽 火陰 乃濕熱頭痛也

如氣上不下 頭痛顛疾者 下虛 上實也

通在足 太陽 少陰 甚則入腎 屈濕頭痛也

如頭半寒痛者

先取手 太陽 陽明

此偏頭痛也

次取足 少陽 陽明

有厥逆 頭痛者

所犯大寒 內至骨髓 髓者以腦為主

腦逆 故令頭痛 齒亦痛

有真頭痛者 甚者腦盡痛 手足寒 至節

至節 死

不治

頭痛 每以風藥治之者 高山巔之上 唯風可到

味之薄者 陰中之陽 乃自地升天者也

太陽頭痛 惡風寒

脈浮緊

宜川芎 羌活 獨活 麻黃 之類 為主

少陽頭痛

脈弦細

往來寒熱

宜柴胡 黃苓

之類 為主

陽明頭痛 自汗發熱 惡寒

太陰 頭痛 必有痰 體重

宜 升麻 白芷 葛根 石膏 之類 為主

或腹痛 為痰癖

其脈沉緩

宜 蒼朮 半夏 南星 之類 為主

△宜 蒼朮 半夏 南星 為主

少陰 頭痛 三陰 三陽 經 不流行

而足寒 氣逆 為寒厥

其脈 沉細

△宜 麻黃附子細辛湯

主之

厥陰 頭頂痛 或吐涎沫 厥冷

△脈 浮緩

△宜 吳茱萸湯

主之

血虛 頭痛

宜 当归 川芎

為主

氣虛 頭痛

宜 人參 黃芪

為主

氣血俱虛 頭痛

宜 補中益氣湯

加 川芎 細辛 蔓荊子

空清膏

風濕頭痛 藥也

白朮半夏天麻湯

痰厥頭痛藥也

羌活附子湯

厥逆頭痛藥也

如濕氣在頭者

以苦吐之 不可執方而治

昂按 以苦吐之

瓜蒂散 濃茶之類 是也

咳喘麻五能春

頭痛

風濕

風濕

以苦

藥

藥

白

停痰 劈痛

治痰停中腕 兩臂疼痛

批 飲伏于内 停滯中腕 主脾一肢 脾滯而氣不下

故上行政臂

其脈沉細者 是也

苓 丸

本方用

半夏麴 一升

茯苓 乳汁拌

枳殼 五分 麴炒

風化硝 二分半 如一時未易成 但以朴硝 散盤中 火時成

置雪風處即干 如芒硝 刮取亦可用

指迷方

薑汁糊丸
引善湯送下

此足太陰陽明藥也

批 半夏 燥濕

茯苓 滲水

枳殼 行氣

化硝 軟堅 去堅痰

生薑 製半夏之毒 而除痰 使痰行氣通

妙

喻嘉言曰 痰病雖多 此方甚效

臂痛自止矣

痰飲流入一肢
令人肩背酸痛
兩手羅轉
言以虛

則非其治

宜導痰湯

加水香

薑黃 各五子

輕者

指迷 茯苓丸

重者

控涎丹

外有血虛

不能榮筋 而致臂痛

宜蠲

痺一物湯

各半貼和服

血虛不能榮筋而致臂痛

宜蠲痺一物湯

各半貼和服

痰涎 一名妙應丹

控

治人忽患胸背手足腰項筋骨牽引釣痛

走易不定或手足冷痺氣脈不通

此乃痰涎在胸膈上下誤認癰痰非也

涎

本方用甘遂 煮心 大戟 去皮 白芥子 等分 為末

糊丸 每五丸 臨卧 姜湯送下 至十九丸

丹

因方

如痰猛 加丸數

脚氣 加 楳柳 木水 松脂 卷柏

△驚風痰

加硃砂 全蝎

△驚風氣成塊

加穿山甲 鱉甲 延胡索 蓬朮

△熱痰

加益硝

△寒痰

加胡椒 丁香 干姜 桂

此手足太陽 太陰藥也

△十棗湯

加減行水例藥 亦屬劑

李時珍曰

痰涎為物 隨氣升降 無處不到

入心則迷成癲癩

入肝 則膈痛 乾嘔 寒熱往來

入經絡 則麻痺 疼痛

入筋骨 則牽引 釣痛

入皮肉 則癰瘡 癰腫

陳無擇 三因方

並以控涎丹 主之 殊有奇效

此乃治痰之本 痰之本 水也 濕也

得氣與火 則結為痰

批
天 戟

能泄臟腑水濕

甘 遂

能行經隧水濕

直達水氣所結之處
以攻決為用

白芥子

能散皮裏膜外痰氣

為善用者 能收奇功也

氣痰

治老人氣實痰盛 喘滿懶食

批痰不自動 因火而動 氣有餘 便是火

氣盛上湧 故喘 痰火塞胸 故懶食

本方用 紫蘇子 沉水者 白芥子 萊菔子 各微炒研

無服 或等子

或看病所主 為君

此手足太陰 藥也

知悉

湯親養子三

批 白芥子

除痰

紫蘇子

行氣

萊菔子

消食

然皆行氣豁痰之藥

氣行則火降而痰消矣

吳鶴臯曰

治痰 先理氣 此治標耳

終不若 二陳湯 能健脾去濕 有治本之功也

李士材曰

治病 先攻其甚 若氣實而喘 則氣喘反為本

李士材曰

治病先攻其甚

若氣實而喘則氣反為本痰反為標矣

是在智者

神而明之

若氣虛者非所宜也

卷之五

卷之五

卷之五

卷之五

卷之五

卷之五

風痰

治中風痰迷心竅 舌強不能言者

滌

批 心在竅 為舌

心別脈繫舌根

痰

脾脈連舌本 散舌下

腎脈挾舌本

湯

三脈虛 則痰涎乘虛 閉其脈道

嚴氏

故舌不能轉運言語也

若三脈亡血 不能榮養 而瘖者 又當加補血藥

若三脉亡血 不能榮養 而瘖者

又當加補血藥

風痰塞其經絡 舌強不能言 其症為重

若壅熱上攻 舌腫不能轉者 其症為輕

本方用

半夏 姜製 胆星 二小半 橘紅 枳實

茯苓 二小 人參 菖蒲 一分 竹茹 ×子

甘草 五分

引 姜

卷

此手少陰足太陰藥也

批心脾不足

風邪乘之而痰火塞其經絡

故百本強而難語也

註曰

人参

茯苓

甘草

補心益脾而瀉火

陳皮

南星

半夏

利氣燥湿而祛痰

菖蒲

開竅通心

枳實

破痰利膈

竹茹

清燥 開鬱

使痰消

火降 則經通 而吾柔矣

喻嘉言曰

此症最急

此药最緩 有兩不相當之勢

審其屬熱

用此湯調下 牛黃丸

審其屬虛

用此湯調下 二丹丸

庶足開痰通竅

二丹丸

附

二丹丸

用

丹砂 人參 葛蒲 遠志 五小
麥冬 茯苓 甘草 一丹

遠丸

安神養血 清熱息風 服之得睡

有風中心脾者

有痰塞心竅者

有風寒壅滯者

致吾本水強

又有氣虛

血虛

腎虛

及老人暴不能言者

列后

心宜十全大補湯

加 菖蒲 遠志

礞石滾痰丸

治實熱老痰 怪症百病

批風水太過 剋製脾土 氣不運化 積滯生痰 壅塞上中二焦

迴薄腸胃曲折之處 謂之老痰 變生百病 不可測識

非尋常葯餌 所能療也 此丸主之

本方用 青礞石 一曰 沉香 五分 大黃 酒蒸 黃芩 八日

右將礞石打碎 用朴硝 一曰 同入瓦罐 鹽泥固濟

晒干火煨石色如金為度 研末 和諸葯取丸 量人虛實服之

引 姜湯送下

服藥後 仰臥 令藥在胸膈之間 除隨上焦痰滯 不宜飲水 行動

昂按凡用藥 必先入胃 然後能分布某經某絡 胃乃人身分金之爐也 安有常在膈中者 而可以見功者乎

若曰膈中必須在膈

將治頭痛之藥 亦必令之 上駐於頭也

吐痰水上 以礞石末摻之 痰即隨下 故為利痰 聖藥 礞石煨過 無金色者 不堪用 陳久者佳

此手足太陰陽明

批礞石

剽悍之性

能除攻陳久積伏歷之痰

大黃

蕩滌熱去濕

以開下行之路

黃芩

瀉肺涼心

以行上僭之火

沉香

能升降諸氣

上至天而下至泉

以導諸藥為使也

然皆峻劑

非體實

不可輕投

王隱君曰 痰症古今未詳

方書雖有五飲 諸飲之異而究 莫知其為病之源

或頭風作眩 目運 耳鳴 或口眼蠕動 眉稜耳輪痛痒

或一肢游風腫硬 似疼非疼 或為齒頰痒痛

牙齒浮而痛痒

或變氣吞酸 心下嘈雜 或痛 或噦 或咽嗑不利

咯之不出 嚥之不下 其痰似墨 有如破絮桃膠

蜆肉之壯

或心下如停冰鉄 心氣冷痛

或夢寐奇怪之壯 或足腕酸軟 腰背骨節卒痛

或一肢筋骨痛疼 難以名壯 並無常處

以致手背麻痛 壯若風濕 故脊上一條如線之寒起者

△或渾身習習 如卧芒刺者

△或眼粘濕痒 口糜舌爛 喉閉等症

△或達達項結核 壯若瘰癧

△或胸腹間 如有二氣交組 噎息煩悶 有如烟火上衝

頭面烘熱 或為失志癩瘡

△或中風癱瘓

△或勞瘵荏苒之疾

△或風毒脚氣 或心下怔忡 如畏人捕

或喘嗽嘔吐 或嘔冷涎 綠水黑汁

甚為肺癆腸毒 便膿掌跛 內外為病

內外為病 百端皆痰所致 其壯不同 難以盡述

蓋津液 能凝為痰 不復周潤三焦

故口燥咽干 大便秘結 面如枯骨 毛髮焦稿

婦人則因此 月水不通

若能遂去敗痰 自然服餌有效

餘用滾痰丸 以愈諸疾 不可勝數 特相傳于世云

本方
加玄胡粉
硃砂
治同

本方減 大黃 黃芩 各六分 加橘紅 半夏 各二分

甘草一分 竹瀝 薑汁為丸

名竹瀝達痰丸 治同

力稍和緩

單用礞石一味 治如前法 名奪命丹

楊氏 薄荷 自然汁 寧調溫服

治小兒急慢驚風 痰涎壅盛 葯不可下 命在須臾

牛

治風癰迷悶

涎潮抽掣

批

風癰

或因母腹中受驚

或因大驚而得

蓋小兒神氣尚弱

驚則神不守舍

舍空則痰^涎歸之

以致痰迷心竅

黃

或感風寒暑濕

或飲食不節

逆於臟氣

鬱而生成

閉塞諸經

厥而乃成

或數年一發

或一日數發

丸

發則眩仆倒地

昏不知人

瘵癩抽掣

口眼喎邪

或隨臟氣作六畜之聲

本方用

胆星

全蝎

去足焙

蟬蛻

二小五

牛黃

白附子

羌活

洗焙

防風

天麻

一八五子

射香

五子

△ 煑枣肉 和凡水破 五子 細研入药末為丸

引 荆芥 姜 湯送下

此手少陰 巨太陰 厥陰 药也

批 牛黃 清心解熱 開竅利痰

△ 天麻 防風 南星 全蝎 辛散之味

△ 殭蚕 蟬蛻 清化之品

△ 白附子 頭面之药 去頭面之游風 皆能搜肝風

肝風

射香

通竅

水硯

劫痰

引以善芥者亦以逐風而行痰也

按牛黃丸之方頗多互有異同

然大要在于搜風化痰寧心通竅多用水射牛雄金珠

犀珀若中臟者宜之

如中腑中血脉者

反能引風入骨

此方药味頗身簡 故姑錄之 以概其餘也

喻嘉言曰

牛黃丸 與蘇合丸 異

治熱阻閉竅

宜牛黃丸

寒阻閉竅

宜蘇合丸

若手撒口開 遺尿 等症 死

救 急用參附 變補 間有生者

辰

治風痰諸癇

癲狂心疾

批

諸癇

因驚恐憂怒

火盛于心

痰塞心竅

發時卒倒

搐掣呌吼

吐涎

食頑乃醒

砂

身熱

脈浮在表者

陽癇

屬六腑

易治

散

身冷

脈沈

在裏者

陰癇

屬五臟

難治

灵苑

其實痰火

其驚焉

而已

癲狂亦出于此矣

△本方用

辰砂

光明者
一升

乳香

光明者

炒枣仁

五小

温酒调下

恣飲沉醉

聽睡一二月勿動

萬一驚寤

不可復治

此手太陰药也

批
辰砂

鎮心瀉心火

△乳香

入心散瘀血

△枣仁

補肝胆而寧心

△本方加人參一升

寤丸
彈子大

名寧志膏

本方加 人参 一日 密丸 弹子大

名 寧志膏

本方

每服一丸

引 薄荷湯送下 治同

痰血迷心

治癲狂失心者

批 癲

多喜笑

尚知畏懼

症屬不足

狂

多忿怒

人不能制

症屬有餘

此病多因驚恐憂 痰血

痰血塞于心竅 所致

難經曰 諸陽為狂

諸陰為癲

喜 属心

二、經 皆火 有餘之地也

怒 属肝

本方用

白礬 三月

鬱金 ×廿

薄荷糊丸

此手 少陰 药上

批 白礬

酸鹹 能軟頑痰

鬱金

苦辛 能去惡血 痰血去 則心竅開

而痰已矣

風痰

青州白丸方

治風痰湧盛

嘔吐涎沫

口眼喎邪

手足癱瘓

痰不食

小兒驚風

皆風痰壅塞經絡

及痰盛泄瀉

肥人

滑泄

多屬之痰

脈滑

責之

痰不食

不飢

責之痰

痰不食

本方用

白附子生

南星二月生

半夏

水浸生衣
生用二月

川烏

去皮臍
生用五分

苦末

考末 絹袋盛之

水摆出粉

未盡盪再搖再摆

以盡為度

甕磁盪

日暴 夜露

春 五日

夏 三日

晒干 糯米糊丸 录豆大

秋 十日

冬 十日

每服十丸

姜湯送下

白蠶馬風

薄荷湯下

五丸

此是厥陰 太陰 芍也

痰之生也 由風 由寒 由濕

批 故用

半夏 南星 之辛溫 以燥濕 散寒

白附 之辛熱 以溫經 逐風

浸而暴之者 殺其毒也

喻嘉言曰

此治風痰之上藥也

然熱痰迷竅者

非所宜施

風痰

治中風痰盛

體肥不渴者

星

本方用

胆星

以水

木香

二分

為末

服

香

或加全蝎

散

此是厥陰藥也

批南星

燥痰之品

制衣以牛胆

以殺其毒

且胆有益肝胆之功

肝胆之經屬風水

佐以木香

取其行氣 以利痰也

肥而不渴 宜燥可知

加全蝎 者以散肝風也

中風體虛 有痰者

宜 一君子

或六君子

湯 調下此散

却痰截截

常

治瘡久不已者

用此截之

批瘡初起

不宜禁

禁則邪氣未盡

變生他症

發久則可截之

山 飲

本方用

常山

燒酒炒五分

草果煨

檳榔

知母 貝母

一分

烏梅 三了

引姜

三片

棗

一枚

酒水

各半盞

露一宿

日未出時

面東

空心溫服

渣用酒浸

渣用酒浸 煎待瘡將發時

先服一方

有良薑 甘草 魚板柳

一方加穿山甲 甘草

此是 少陰 太陰 藥也

古云 魚痰 不作瘡

批 常山 引吐行水 祛老痰積飲

板柳 下氣破積 能消食行痰

陰陽不和 則瘡作

陽勝則熱 陰勝則寒

陰陽不和 則瘡作 陽勝則熱 陰勝則寒 生津退熱

草果

辛熱 能治太陰獨勝之寒

貝母

清火 散結瀉熱 除痰

烏梅

酸斂 濡收 生津退熱 斂陰故退熱

合為截瘧之劑也

趙以德

常究本草

知母 草果 常山 甘草 烏梅 板榔 穿山甲

皆因云 治瘧集 以成方者 為

知母 性寒 入足 陽明 經 治獨勝之熱

使退就 太陰

草果

溫燥 治足太陰 獨勝之寒 使退就

陽明二經 和則無陰陽交錯之變 是為君藥

常山

主寒熱 瘧吐 胸中痰結 是為臣藥

甘草

和諸藥

烏梅

去痰

枳殼

除痰瘕 破滯氣 是為佐藥

穿山甲

穴山而居 遇水而入 則是出入陰陽 貫穿經絡

經絡于滯分 以破暑結之邪 為使藥

此法若脾胃有鬱痰者

李士材曰

常山

生用多用則吐

與甘草同用

亦必吐

若酒浸炒透

但用小許

每見奇功

未見奇或吐也

世人泥于老人

以病

忌服之說

使良藥見疑

沉疴難起亦可愚耶

李時珍曰

常山

蜀漆

結痰

截瘧

須在發散表邪

反提出陽分之後

用之得宜

得甘草則吐

○得大黃 則利

○得烏梅 山甲 則入肝

○得小麥 竹葉 則入心

○得秫米 麻黃 則入肺

○得龍骨 附子 則入腎

○得草果 樞榔 則入脾

蓋魚痿不作瘡 一物之功 亦在驅逐痿水而已

截 治實瘧久發不止

瘧 寸口脈弦滑浮大者

脈弦為肝 風滑為痰

浮為在表

瘧有經瘧 臟瘧 寒瘧 風瘧 溫瘧 暑瘧

寶 飲 濕瘧 痰瘧 食瘧 瘴瘧 鬼瘧

各之別

不問 食瘧 鬼瘧 並皆治之

大為陽 若脈沉濇細者 禁用

本草方用

常山

酒炒

草果煨

板柳

青皮

厚朴

陳皮

甘草

等子

用酒水各一中

煎熟 孫棉蓋之

露一宿

于寅發之早 面東 溫服

癰正發時 不可服藥

經曰 工不能治身已

發為其氣逆也

若正發而服藥

反能助寒

助熱

此足 少陰 太陰 藥也

批 常山

能吐老痰積飲

核 榔

能下食積痰結

草 果

能消太陰膏梁之痰

陳 皮

利 氣

厚 朴

平 胃

青 皮

伐 肝

癰為肝邪

皆為溫散行痰之品

加 甘 草

入 胃

佐常山以吐癰痰也

玉机微義曰

上方乃溫脾 燥裂之藥 蓋作脾寒治也

用之亦效者

值病人陰陽相并 脾氣鬱結 濁液凝痰

閉塞中脘 因得燥熱 亦以漸開

所以氣通 而疾也止

若中氣虛弱 內有鬱火之人 復用燥熱 愈劫愈虛

咎將誰執

楊仁齋

曰

瘧有水

惟水飲 所以作寒熱

惟瘀血 所以增寒熱

常山 能逐水固土

若是血症

當加五靈脂 桃仁 為佐

入生薑 桑寄生同煎

苟魚行血之品 何以收十全之功耶

保命集 云

瘧發之時 分明

瘧

夜發者 乃邪氣深遠 而入血分 為陰經有邪

宜加 桃仁 干桂 麻黃湯

此湯中 發散血中之風寒

此瘧

晝

發 屬 風 氣

夜

發 屬 血