

乾 隆 四 十 六 年 新 鑄

鼎久可先生著 麻科附後

重訂痘症心法

于黎黃畏叢校 大興堂藏板

活幼心法大全序

善矣先輩陳邦瞻之序活幼心法集曰世之不得已而用者二兵之於敵藥之於病是也是二者其道皆以攻伐爲事以克爲功以速爲功而世醫不諸病機損之則疑實而益之則疑虛燠之則疑陽而冷之則疑陰於是曲爲調停之論以圖持久之計而嘗處於不見功不見害之間久之而功愈遠害愈近此猶庸將振兵智勇俱困鼯鼯自保而徒甲詞重幣乞盟於敵冀其自退敵脆可也敵堅蔑不覆矣蓋凡病盡然而主兒症之有痘則

受毒自始生其伏不可窺其發不可留生死在呼吸變
化在俄瞬而亦御以調停持久之法此其謬光甚譬言之
古者齊晉秦楚相遇中原強弱已形勝負可決苟非摩
壘而進卽當交繙而退若借言中制暗于事機昧于戰
守失其先發制人之策則其受害頃刻間矣此吾之所
以獨重吾友久可明府之論痘也曰毒可逐而不可解
也治可急而不可緩也於是創爲一書盡破近世似是
而非之論庶幾提抱中物不至枉死蓋其見卓矣卽倉
扁復生不能易也兩部讀之因爲三復起曰昔孫子不

云乎解雜亂紛糾者不捲捲救鬪者不搏擊机亢擣屈形格勢禁則自爲解耳然則久可先生之所謂可逐而不可解者是固所以淡解之也矣是治痘之說也而卽治兵之說也又其於痘證之後復附有痧麻驚癇疳渴吐熱諸病方論其立說也簡以詳其製方也精以當是其所以活幼者甚全該而備余嘗按書施治百無一失遂不忍自秘已苟而粹行於世俾世間幼者得無失其爲幼與世間司幼者并不至以活幼者而誤至殺幼則否成一父母之心卽以共成此天地大父母之心矣久

可先生孫之清江人姓聶名尚恒於萬曆時以鄉進士出知福建汀州府寧化縣事卓有政聲惜當時以儒宦顯不列名於醫林故其姓名不傳於今世岐黃之日卽有活幼心法一書亦不傳於今世岐黃之日至其治男婦諸病也則並著有奇効醫述四十九篇但惜年久淪沒噫世遠代湮失於見聞不及者詎止一編久可著述已哉此古人之懸金搆書良有以也且其書考其自序則著於前之丙辰而余之闡發此書復合歲紀又在今之丙辰聞之世運以六十載必爲一更爲其甲子遇也

今此刊也其久可先生獨著之精神有不可終爲湮沒者歟而故藉運會之當然以假手於余之簡校復救斯世赤子於襁褓中也歟時

康熙十五年歲次丙辰嘉平望日向山堂夕惕主人周

京雨郇氏叙

活幼心法大全目錄

卷之一 痘

論受病之源

折諸家之衷

闢時醫之謬

辨虛實寒熱之異

晰氣血盈虧消長之理

精炮製用藥之法

卷之二 痘症

痘症

卷之三 初發熱至痘出齊數日內調治法

備載數日內各變症方論治法

卷之三 方症

痘出齊後起發灌膿數日內調治法

備載數日內各變症方論治法

卷之四 痘症

漿足回水至結痂還元數日內調治法

備載數日內各變症方論治法

卷之五 痘症

備用繁要諸症方論

夾班丹

夾麻疹

倒靨

癰

痛

內脹

發疔

發癰

臭爛

衄血

水泡

口瘡

咽喉

失聲

哈水

小便不利

患眼以上各症治法

并附古今治症要方

卷之六

痘症

痘證或問六條

卷之七 痘症

治痘醫案十一條

卷之八

痧症
三方
麻疹同惜心法止論發熱見形留毒
因詳補孟氏諸症治法以成全卷

痧疹治法總論

初發熱欲出未出時用治法

已見形一二日內用治法

已出而紅腫大甚用治法

痧證四五六日同時各症用治法

卷之九

雜症

雜症論

急驚風

卽陽病

慢驚風

卽陰病

吐瀉

痢

腹痛

發熱

病症

活幼心法大全卷之一

明清江鼎尚恒久可父者

清肝黎黃光會畏嚴父校

論受病之源

痘瘡之源有謂兒在胎時食母血穢而致者有謂父母慾火所致者慾火之說出於臆測固無明據然嘗見孕婦飲食清淡者生子出痘多稀少而平順恣食厚味者生子出痘多稠密而陰危則其病源受毒於母胎血穢似有明驗蓋飲食淡則血氣清而胎毒輕飲食厚則血

氣濁而胎毒重受毒輕故出痘少受毒重故出痘多。其理易明也。近有好爲奇論者謂胡人豈無慾火胎毒而獨不出痘。則此二說皆非也。諸痈癰瘍瘍皆屬心火。以中國地對胡地分四方。則中國屬東南。胡地屬西北。東南屬火。故心火旺而有痘瘍。西北屬水。故心火不旺而無痘瘍。又以胡人居中國則亦出痘。中國人居胡地則亦不出痘爲證。此論似是而實非也。若痘非胎毒果因地方火旺而有之。則閩廣等極東南之地。其人出痘當至再至三。何以一生止一次與中國同也。慧者胡地極

寒無屋居火食犯風霜冰雪腠理秘密若無毒然卽有胎毒當爲別症不能宣發於皮膚而爲痘瘡是以胡人不出痘也不可執此而謂痘非胎毒也夫胎毒潛伏於五臟有觸則發無觸則不發故其發有遲速當其未發時形氣俱混無可端倪若未燧之火何處尋覓又何可解釋故余以爲古立預解痘毒諸方若無故而逐寇於通都不近理也及其有觸而發則勃然不可禦蓋其毒氣發自五臟實動五臟真氣全賴血氣送毒氣而出之於外運化之而成漿收結之而成癰而後臟腑可安若

血氣送毒氣不出則毒氣反攻臟腑如寇作於都城中
主者不能操謀奮武逐之於外致令操戈內攻安得不
危故用藥如用兵不可不透此理也

折諸家之衷

治痘之家多矣劉河間悉用寒涼偏害非小至於錢仲
陽立方亦以解毒爲主而多用寒涼少用溫補張潔古
王海藏咸宗之此其意俱本於內經諸瘡癆屬心火之
一言故以寒涼瀉火也厥後陳文中立方力矯其偏專
主溫補凡痘瘡已出未出之間諸症悉用十一味木香

散已出之間諸症悉用十二味異功散。其意歸重于太陰一經。蓋以手太陰肺主皮毛。足太陰脾主肌肉。肺金恐寒。脾土惡濕。故用丁香官桂以治肺之寒。用术附半夏以治脾之湿。二方用之得其當。其效固大。然不分寒熱。虛實而一槩用之。則宜於虛寒。不宜於實熱。其偏害又可知也。朱丹溪辨之是矣。至丹溪立論。矯陳氏之偏。而取錢氏之長。主於解毒和中安表。似爲的當。舉世宗之數百年來無敢議其失者。予則以爲丹溪治他病多妙論。獨於治痘則孟浪而未盡其妙。儻亦工慮之失乎。

蓋其矯偏于陳氏而不敢輕用木香丁香桂附等熱劑。
似乎因噎而廢食。懲羹而吹鼈。其取長于錢氏而必用
芩蓮牛蒡連翹之類。以監製參耆歸术等補劑。似乎用
將而中制。用兵而外監也。其失亦起於泥內。經瘡瘍屬
心火之言而未透其理。也不知痘瘡雖屬心火。却與諸
瘡不同。諸瘡之毒當其初發而未成形。可用藥解散。內
消而愈。及其已形而未成膿。又可用藥逐散。未成膿而
愈。痘毒發自五臟。必藉血氣送出于皮膚。運化之而成
膿。收結之而成痂。而後收全功也。可內消而愈乎。可未

成膿而愈乎。故諸瘡以解毒爲主。能解毒於早則輕。不能解毒於早則重。痘瘡以血氣爲主。血氣能送毒以灌膿結痂。則生血氣不能送毒。以灌膿結痂則死。解毒之藥多損血氣。不顧血氣之虧損。而急于解毒。是猶不慮我兵之羸弱。而急于殺敵也。故毒有不必解者。又有不可解者。若小兒稟賦強壯。脾胃氣好。飲食如常者。其血氣自旺。自能送毒氣以成功。其痘自始至終。多順症。此不必解毒者也。若其稟賦素弱。脾胃又弱。出痘時。飲食又少。或渴或渴。或腹脹或手足冷。或氣短促。或失聲。痘

或出不快。或根窠不紅活。或色白而頂陷。或當灌膿。不灌膿。或當結痂。不結痂。皆由血氣不能送毒氣。此不可解毒者也。當速用溫補以扶胃氣而助血氣。若用參著歸朮等而力不及。卽加入木香丁香桂附等佐之。亦不爲過。又何可參入芩蓮芍翹等涼品以監制溫補之力。而損血氣乎。所謂丹溪未盡其妙者此也。丹溪又教人用犀角地黃湯以解痘毒。後人沿其說失其初意。相習用之。以爲奇妙。而不知其害。蓋心者血之主。心之所以能主血者。以其屬火也。痘瘡屬心火。正藉心火以運用。

一毒之血而成功。豈心火可瀉而去之乎。蓋人身之血溫則流行。寒則凝滯。犀角地黃湯涼心經而瀉心火。心經既涼。心火既瀉。則一身之血俱凝滯不行。何以運化痘毒而成膿結癰乎。則內攻之患作。而竟以告斃者。瀉心火之藥實殺之。而人竟不知也。醫亦竟不悟也。可慚也。故予謂痘已出之後。未癰之前。凡一切涼心之藥。如犀角生地之類。姑禁絕不用。直至結癰後。用之解餘毒可也。或曰。若然則未收結之前。毒俱不可解乎。曰。奚爲皆不可。若其血氣與毒氣俱盛者。脉必洪數。痘或初出。

卽帶紫黑。或既出而稠密紅紫。內症則煩悶燥渴。小便赤澁。大便秘結。此則屬實熱。宜速用清涼之劑。以解毒如大便久秘者。量入酒炒大黃微利之可也。若其毒氣雖盛。而血氣未旺者。以解毒爲主。而兼活血養氣。則參著歸木之類。亦不可離也。

近世痘方多宗黃西丘。其書自始至終。俱分順逆。而立三圖說。其爲順者不必服藥。是也。謂陰者宜以保元。湯加減調治。猶近理也。但謂逆者俱不可治。治之徒勞無益。是教人袖手待斃矣。其言不仁之甚。而貽害于世。

不。小。也。此。爲。俗。醫。圖。利。計。則。甚。便。而。於。救。濟。生。靈。之。術。
則。甚。乖。也。蓋。醫。者。仁。術。聖。人。以。之。贊。助。造。化。之。不。及。所。
貴。者。扶。危。救。困。起。死。迴。生。耳。若。治。其。易。治。者。而。棄。其。難。
治。者。則。何。以。醫。爲。惟。俗。醫。意。在。圖。利。又。恐。壞。名。見。症。有。
不。順。者。輒。委。棄。之。彼。誠。恐。利。未。必。得。而。徒。冒。不。識。症。之。
名。若。仁。人。君。子。當。爲。之。死。裏。求。生。豈。忍。斷。其。必。死。而。坐。
視。不。治。故。曰。西。丘。之。言。便。於。俗。醫。而。非。所。以。濟。世。也。且。
其。所。指。逆。症。多。端。痘。瘡。稠。密。者。多。有。之。如。初。熱。而。驚。悸。
吐。瀉。報。痘。而。先。發。于。印。堂。司。空。天。庭。等。處。初。出。而。根。窠。

虛寒

無暈既出而色白灰陷或發水泡或瘡塌或當行漿而不行漿或痂未落而寒戰咬牙等症皆其圖說所謂逆而不治者予每治之而得生者多矣奈何悉謂治之無益而戒人勿治乎惟初出形狀蠶種既出而紫黑乾枯者難以灌漿多不可救耳然寧救之而不活不忍坐視而不救也。

近年有庠生管樞編集保赤全書載痘疹方論頗爲詳備然其人博而不精未諳妙理所論氣血虛實寒熱等理多混雜未能融通所論某症該用某方多鹵莽又

乖舛而不得其宜。在明者得之猶可備參考。若昧者執而用之。鮮不悞事。予恐其無益于世。而反惑世也。故表而出之。

闢時醫之謬

痘症與他症不同。自初發熱以至於結痂。限日限時。救困扶危當用之藥。宜及時而用。如救焚拯溺不可緩也。蓋痘毒發自五臟。實動五臟之真氣。其出痘多者。真氣發洩亦多。當此之時。人之血氣幾絕。岌岌乎殆哉。如油盡之燈。不速爲之增油。則燈焰熄如風中之燭。不速爲

之蔽風則燭光滅也。時醫則不然。輕視人命而重視財利。其愚而不知用藥者。姑無論已。即稍知用藥者。亦不肯及時用藥。欲因禍大而顯功。直待諸惡症出。然後乘人父母之驚懼。而要重利。遲延至於血氣已絕。不可復續。雖有對症之藥。緩不及事。因而悞人性命者多矣。嗟。天地鬼神昭布森列。不可欺罔。此輩以貪利而殺人。心術不善。豈無幽責。豈無冥誅。殃必及身。必及子孫。不可逃也。此醫家之害。而病家不可不知也。又時醫識見淺陋。未諳妙理。執泥祖傳舊方。不知通變。遇痘症之輕。

者猶可動手調治而自以爲功一遇危險重症便束手無策不能救療甚至治一家十人而不活者七八人則以爲痘症原惡而不自咎其術之拙病家亦以爲痘症本惡而不歸咎醫之拙殊不知痘瘡常數若無甚惡之症而調治得宜十可十生間有極惡之症必不可救療者十不過一二今治十人而死者七八何惡症之多也無亦術之不精乎予深憫之故不得不爲之著論立方

也

辨虛實寒熱之異

凡治病必先辨虛實寒熱四症。望聞問切無非辨此。四

者而已。四者了然于胸中。則用藥取效。其應如響。四者不能分辨。而執成方以用藥。鮮有不悞者。卽或中病而愈。亦幸而偶中也。至於痘瘡之虛實寒熱。尤爲緊要。辨之不明。用藥多致敗事。何以成功。奈何歷代治痘之家。著論立方。互相異同。至於虛實寒熱。多略而不辨。或辨而不明。致令檢方者。漫無下手處。竟不知某症屬虛。屬寒。當用某方。某症屬實屬熱。當用某方。則雖有千百妙方。千百妙論。無益於用也。無怪乎自古至今。治痘者之。

多迷途而慈幼之術疎也。且痘瘡之虛實寒熱與諸病之虛實寒熱其異同固自有辨。諸病有虛者元氣自虛也宜補也。痘瘡有表虛有裏虛亦元氣自虛也宜補也此其相同者也。諸病有實者邪氣實也可瀉也。痘瘡有表實有裏實此則元氣完固而毒氣不能爲害不可瀉亦不必瀉也。此其不同者也。諸病有虛之甚者陰有餘陽不足則寒自虛生宜溫熱之劑補之也。痘瘡有虛之甚者亦陰有餘陽不足而寒自虛生亦宜溫熱之劑補之也。此其相同者也。諸病有寒自外入者外感是也當。

其在表宜發散之。久而人裏則鬱而爲熱。宜清解之。痘出而風寒外襲。宜溫而散之。或外寒入內而爲吐瀉。諸症亦宜溫之而已。外不可發汗。內不可清解也。諸病有

虛熱者。元氣虛津液竭而火從虛中起。補之則熱自除。也不必解熱也。痘瘡亦有虛熱者。元氣虛而毒氣肆也。當以補元氣爲主。而略兼解毒可也。三者皆同而有不同者也。諸病有實熱者。血氣未虧而邪氣壅盛。單用寒涼瀉之可也。痘瘡亦有實熱者。稟氣強血氣盛而毒氣亦盛。亦單用清涼解之可也。此又其相同者也。今自發

熱之初以至還元之後。俱先辨症之虛實寒熱而遂立方。於其後令人細心審症而後用藥。庶不至于虛虛而實實乎。不至干損不足而補有餘乎。不至干以水益寒而以火益熱乎。然痘之虛實寒熱較之他病猶顯明而易察。蓋自見點以至結痂。其形其色既昭然可覩。若又聽其聲音。觀其靜燥。視其飲食之多少。審其大小便之利滯。三歲以上者。診其脈之遲數洪微。其辨虛實寒熱當如黑白之分明而用藥取效易易矣。

晰氣血盈虧消長之理

痘癆全憑氣血成功而氣血之盈虧消長其理精微不可不透悟也蓋氣體天而親上血體地而親下痘之出也其高起之疱氣之位也上也氣宜克焉其四暈根脚血之位也下也血宜附焉疱尖而色白潤是氣克而居其親上之尊也四圍有暈而色紅活是血附而安其親下之分也氣居其尊血安其分氣血和順而載毒出外此最吉之痘可勿藥而愈也頂陷則氣反親下此氣虧而不能克也法當補氣四圍根脚無紅暈此血虧而不能附也法當補血此其理猶易明也其有通頂紅色成

血。癰者。是血反親上也。此症最險。必不能成漿。至八九
日後。則癟瘍而死。然此非血之獨盈。乃由氣虧而失其
活。尊之常。故血得以妄行。而僭居其位也。急宜大補其
氣。氣克則能統血。血自不得泛濫。妄行而癰轉白矣。世
人不識此理。見其癰紅。則謬認爲血熱。而用涼血行血
之劑。致令氣愈虧。而癰愈速也。不亦悲乎。故氣血盈虧
之理。微妙而難識也。至於調治痘瘡。氣血其氣獨虛者。
固宜專補氣。而不宜補血。蓋陽不能從陰。陰愈長。則陽
愈消也。其有血虛者。多由冒氣損傷。元氣不足所致。蓋

陰必從陽。陽生則陰長也。黃汝言明醫雜著乃謂血虛而用參蓍以補氣。則陽旺而陰血愈消甚矣。其不明於陰陽消長之理而謬立此言。爲世太害也。予每治便血之虛滑者。婦人產後去血過多而大發熱者。婦人血虛崩漏而下血不止者。俱用參蓍薑附爲主。而佐以血藥。與升提藥。皆獲奇效。安在血病不可補氣乎。若小兒痘瘡。以胃氣爲主。則補血必先補氣明矣。故氣血消長之理。不可不深明也。

精炮製用藥之法

凡用寒涼藥品除陽症傷寒熱積癆症及諸實熱等症
外其餘若用之降炎上之火用之清血分之火俱有寒
因熱用之義須依酒炒酒製之法最爲緊要同一寒藥
也依法用之則取效不依法用之則爲害若痘瘡中前
後所用解毒諸寒藥皆因毒火燥血而用入血分以涼
血活血者是以芩蓮梔柏花粉大黃等味必用酒拌濕
炒燥牛蒡子必炒香研碎當歸白芍生地紅花紫草牡
丹皮地骨皮之類必以酒臨時洗用此要法也而時醫
苟簡粗率每每不依法炒製而生用寒涼不惟無益而

反以致害者多矣。此其失非小而人不知也。不惟病家
莫之知而醫家亦竟不悟也。倘悟其失。豈其省此微勞
而貽此大害哉。予故表而出之。以訓將來也。製之大槩
有熱者。甘草黃蓍白芍俱生用。虛寒者。甘草炙熟黃蓍
蜜炙白芍酒炒。

活幼心法大全卷之二

明清江聶尚恒久可父著

清旴黎黃光會畏巖父校

初發熱至痘出齊數日內調治法。

大凡調治痘瘡自發熱之初見點之時卽須思及何如起發何如灌漿何如收結一動手用藥便要顧首顧尾憚其初以善其後然後次第調治可保萬全也
一發熱之初若身熱和緩或熱或退神清氣爽飲食如常則不必用藥發汗但戒葷禁風調護而已蓋痘有腫

而不必治者。不輕治。卽所以調治之也。其或增寒壯

熱頭疼。壯熱頭痛。咳嗽鼻流清涕者。多因於外感。不可

不發散也。當視兒強弱而用藥發汗。兒體氣素壯實者。

用加味升麻葛根湯。汗之。體氣素怯弱者。用加味參蘇

飲汗之。然皆不可出汗。多恐發虛。其表後難起。脹灌

漿也。既經發汗。而身並無緩。兒頗安靜者。其痘出必

稀少。此爲順候。且勿服藥以待之。亦有發熱和緩後痘多者。血氣虛也。

如味升麻葛根湯。此二方卽是傷感而非痘疹服之發汗亦無妨。

白粉葛一錢。升麻八分。亦芍六分。甘草。

桔梗。

防風

去蘆去尾各三分

蘇葉

五分

小川芎四分山楂淨肉分八

牛蒡子

碎用五分揀淨炒香研。

生薑三片同煎熟服取汗

加味參蘇飲

扶弱服

人參三分

蘇葉五分

小川芎

桔梗去蘆前胡各四

分

陳皮

甘草

各二分

白茯苓去皮粉葛八分

分製半夏分

三

牛蒡子

製同前四分

山楂肉

大分生薑五分

三片同煎熟服取汗

三

發汗之後或身熱不退而煩燥者。且勿峻攻。姑少待之。
其或煩悶燥渴而妄語者。用敗毒和中散清之。切不可

輕用傷寒家柴胡黃芩乾葛花粉等清解之劑。此藥若

用差一劑解虛其表。至七八日後，漿訟不行，雖極力補助，莫能救療。其瘡枯焦癢爛而死矣。蓋痘瘡以裏爲根，以表爲基。一虛其表，是猶築室而圯其基也。是以治痘與治傷寒大不同也。近時管樞著書，不知此理，而首以發表解表立說，豈謂痘疹可與傷寒同治乎？惑世悞人爲害甚大。姑舉其一以闢其餘。

敗毒和中散

連翹

去心蒂。
研碎。

牛蒡子

製同前。
各六分。

酒炒黃連

陳枳殼

炒各

七分防風

荆芥

各五分。

桔梗

紫草莖

酒洗。

蟬退

洗去頭。

足

小川芎

分

前胡

木通

各五

升麻

一分

甘草

各四

大黃一錢

二分

微利之

麥門冬去心入分大便秘澀者加酒炒大黃一錢。二分微利之。
不秘者勿加。服此覺煩悶少解。節止勿服。聽其痘。

出外則中自安也。

或有腹痛腰痛而煩悶者。此其毒氣誠重然只當用此敗毒和中散主之。大便秘則加酒炒大黃微利之。聽其痘毒出外。則內痛自止。然後看其痘。或稠密。或紅紫帶黑。又議解毒可也。切不可純用寒涼以阻遏其毒出之勢。立致內攻。告變世人不知此理。多純用寒涼解毒或。

用硝黃峻下因而速驚而卒不悟者多矣。當時令衆人出痘時小兒或有發熱稍緩其熱或作或止其紅點或未見或微見而未明或是出痘或非出痘正在疑似之間當此之時不如且勿服藥以待其自定但禁風禁葷調護之而已所謂不輕治正所以深治之者此也有等富貴之家珍愛太過見其如此屢投以清涼解毒之劑不知若是痘症則其毒氣發動於五臟勃勃欲出外其勢決不可阻遏屢用清涼阻遏其勢卽所以迫之內攻而禍速矣故犯此者多有報痘數日卽煩悶驚搐而

死此解毒之劑幾之也正如寇在宮牆之內不遂之出
外近遇其出路圍而攻之宮中之人有不遭殘害者乎
然醫者曰吾用解毒藥何至於殺人既不自任其咎病
家亦曰彼用解毒藥何至於殺吾人亦不歸咎於醫殺
人於冥冥之中而已不悟也人不知也噫亦可悲也已
予故表而出之以戒世之愛而反害者語曰久腊者毒
必厚痘毒稟於胎元伏於五臟其輕者無論已其重者
深藏久蓄不爲不厚矣一旦觸發於倏然忽然之頃其
勢猛銳欲出斷不可禦是以必藉氣血載毒出外成漿

結。而。然。後。毒。散。而。功。成。此。病。機。亦。生。機。也。此。豈。若。諸。瘡。
之。毒。可。以。驟。然。而。解。散。者。故。解。之。於。既。出。之。後。是。順。其。
欲。散。之。勢。猶。爲。近。理。解。之。於。未。出。之。先。是。遏。其。猛。銳。欲。
出。之。勢。其。禍。甚。遠。如。初。決。之。堤。水。勢。排。出。而。欲。捧。上。塞。
之。有。是。理。乎。奈。何。自。古。治。痘。之。家。其。卑。者。固。不。足。道。其。
高。者。亦。未。深。悟。此。理。每。每。於。痘。瘡。發。熱。之。初。欲。出。未。出。
之。際。輒。以。解。毒。爲。王。且。曰。服。某。藥。則。毒。可。解。而。痘。出。以。
稀。不。知。痘。之。稀。由。其。初。受。毒。之。輕。耳。豈。將。出。之。時。所。能。
驟。解。乎。致。瘡。後。之。庸。醫。訛。以。承。訛。見。痘。瘡。欲。出。未。出。之。

間。毒氣熾盛。則多用寒涼以解之。或妄下以解之。彼自以爲對症之妙劑。而不知反致內攻之奇禍。至於殺人而終不悟。前覆而後不鑒。其禍又無窮也。予覩近時庸醫治痘。多犯此失。以致童幼數日而死者甚多。則皆茫然委於症惡難救。而舉世莫覺其致死之由。殊可矜惻也。故不得不三發明其理。以救將來。發熱之際。有偶感風寒。飲食停滯。而腹痛者。用升消平胃散一劑。其痛立止。

升消平胃散

小川芎 炒香附 蒼朮 紫蘇 蕃沖炒過厚朴

各五分

藿香

砂仁

研碎

白芷

夫白陳皮

各三分

炙甘草

二分炒麥芽

六分

山楂肉

一錢

生薑三片同煎帶熱服。

然停食作腹痛與毒氣作腹痛其症不同停食痛者其
痛多急疾而啼叫必甚多在臍以上痛面必青白唇淡
手足冷。毒氣痛者痛稍延緩而有作有止多在臍以下
或連腰而痛面或紅色而唇紫手足不冷此兩者必分
辨明白方可用藥。

發熱之際有嘔吐者有泄瀉者有吐瀉交作者全要辨

虛實寒熱而用藥。或吐瀉交作而胸腹痛甚者。此感
寒而停食也。仍用前升消平胃散主之。一服立效。或
胃氣弱而有寒。嘔吐不思飲食。或食下卽吐。其吐多順
快而無聲。面青白。唇淡精神倦怠。宜用參砂和胃散主
之。或脾氣虛弱。飲食不化。而泄瀉者。其泄滑利而色

帶白。宜用术苓調脾散主之。

參砂和胃散

治虛寒嘔吐

人參 砂仁 研碎。各四分。白术去蘆刮。白茯苓

大皮各

藿香

陳皮

各三分

灸甘草

二分

煨薑去皮三

五分

藿香

陳皮

各三分

灸甘草

二分

煨薑去皮三

君同煎。

才子胡脾散

治虛泄

白术

白茯苓

製俱如前各七分

酒炒白芍

真神廻炒

炙甘草

各五分

白扁豆

薑汁浸去壳炒各八分

砂仁

炒香附

製厚朴

各三分

煨薑二片大棗一枚去核同煎。

或加

人參三分

或有毒氣作吐瀉者其吐必酸刺而有聲神氣不甚困倦其泄必黃色臭穢雖或吐泄交作胸腹多不痛此則毒氣由吐泄而發洩所謂吐泄爲順候而不必止者惟

此一症耳。若虛寒吐泄與此迥異者亦多矣。張絜古等
乃一槩謂痘前吐瀉慎勿亂治而多吉並不分虛實寒
熱何其孟浪之甚耶。

身熱至二三日後痘欲出不出或煩悶驚搐或狂言譖
語切不可驚惶失措惟詳審虛實寒熱而治之要知此
等症皆由毒氣在內不得宣發於外而作然毒氣不得
宜發症有不同不可不辨一有毒氣壅盛於內不能驟
發於外而驚搐狂燥者宜用清解散以宣之有內毒
本盛外爲風邪所束鬱滯不得出而驚搐狂燥者宜蘇

解散發之。又有血氣虛弱送毒氣不出而驚搐狂燥者宜用溫中益氣湯以托之辨此驚狂諸症最宜精詳觀形察色審聲問症又參之以脈然後可以分別察

其痘影紅紫面赤唇紫聲音亮口氣粗手足熱脈洪數此毒氣壅盛者也或形色多同前但體重鼻塞或鼻涕脈浮數者此毒盛而爲風寒所束者也然此症多在

寒涼之月或不謹避風寒者然後有之察其痘影淡

淡在皮下不見紅活唇淡而白或帶青脈又遲緩雖煩

燥驚狂譖語亦是血氣虛而送毒氣不出者也三者分

別明而用藥。當一劑之後。痘出而驚狂定矣。昔人謂痘未出之前。驚搐爲順。而皆不必治。豈其然乎。

清解散 毒氣壅盛用之

防風 荆芥 蟬退 桔梗 小川芎各四分 前胡

乾葛 升麻各五分 酒炒芩連 紫草 木通各六分

牛蒡 連翹製俱同前各七分 山楂肉 八分 甘草 三分

生

薑三片同煎溫服

蘇解散 爲風寒所束者服之

前方去芩蓮加紫蘇白芷各五分。羌活四分。生薑三片。

同煎帶熱服。

溫中益氣湯

治痘前虛症三四日內用此托之 痘
影淡自者宜

人參

白朮

製同前 各五分

黃芪

各四分

當歸身

酒洗

白茯苓

各六分

炙甘草

川芎

各四分

白芷

防風

各三分

南木香

官桂

各二分

山楂肉

六分

生薑

一片

大棗一枚去核

煎一服中病即止

幼兒初出痘有發熱二三日全無痘點形影而忽然驚
搐狀與急驚風一樣者此亦痘氣壅盛不能宣發所致。
宜用前清解散以宣之痘出即驚定矣若醫者不知是

痘而快作急驚施治。或單以寒涼投之。或以驅痰藥峻
下之。其兒必死。何者。阻遏其毒。使不得出而內攻也。故
才痘之兒。若遇此等症。卽當經疑。恐是出痘不可作急

驚治

又有發熱稍輕。至三四日而痘尚隱隱不出者。最要詳
察。不可一槩認爲毒輕痘少。而漫不加意。若發熱和緩。
精神清爽。飲食如常。出痘少而點數明。頭粒尖漸漸長
大紅活。此爲毒輕痘少無疑矣。若身熱雖輕。至三四日
而怠倦嗜臥。不思飲食。所出之痘影影淡白。點粒不明。

此非痘毒輕少亦是血氣虛弱送毒氣不出也急宜用
前溫中益氣湯以托之甚者必連服二三劑痘始出齊。
其痘必多若因其安靜袖手玩視而不急托痘出外延
至五六日後毒氣內攻須臾告變不可救療甚足畏也。
昔人熱輕則痘輕之說可盡信乎而六日已前痘未出
齊勿用溫補之說可盡拘乎

自有方書治痘以來其時不啻二千年其人不啻數百
家然皆詳於已出之後略於未出之前深言出速而棚
密之危不言留中而不出之禍不知已出之毒外發也。

未出之毒。內寇也。出速而稠密者。外攻也。留中而不
者。內攻也。內寇與外寇勢孰急。內攻與外攻禍孰烈。故
短已出而死者多在旬日之外。痘不出而死者多在六
日之內。徒知禦外寇。而不知逐內寇。自古以來。諸賢之
爲計疏也。然其失計安在。惟在痘未出而急於解毒。緩
於逐毒也。不知未出之毒不可解。說已見前但當汲汲逐之。
出外也。予深悟其理。而明鑒其失。故長顧鄰慮。爲未出
以前諸症設法。惟明辨其虛實寒熱。以施治。實熱者宣
發。其壅滯以逐毒出外。虛寒者補助其氣血。以逐毒出。

外。至於急用。寒涼遏毒。內攻等弊。則諱諱致戒。不厭再三。一以救前哲之失。一以開後人之迷。雖岐黃復起。不易吾言矣。

一發熱至三四日報痘形如粟米曰鼻腮耳年壽之間先發數點淡紅潤澤者最吉不必服藥若身熱一二日即出痘先發於天庭司空印堂等處者或一齊出而利密者或乾枯而紫黑者或成片不分顆粒者皆血氣滯滯而毒氣肆行最爲可憂急宜活血養氣而送毒川

調元化毒湯

綿黃芪

生用八分

人參

四分

白芍

生用六分

當歸

酒洗六分

牛蒡

連翹

各七分

酒炒芩連

各八分

防風

荆芥

桔梗

前胡

木通各五分

紫草茸

酒洗六分

紅花

生地黃俱酒洗各

生薑

同煎八分

溫服

腹痛者去

參芪加炒枳殼

八分

大便久秘者

去參芪加酒炒

大黃

一錢

微利之

大便通仍除之

若血氣與毒氣俱旺而脈洪數者歸芍減三之一去

參芪

此方以參芪養氣當歸

紅花生地活血

梔旁

芩連翹防前桔紫蟬通車解毒

加山楂疏氣

若痘出不快者其症不同最宜分別

有痘色紅紫乾

此

連翹防前桔紫蟬通車解毒

加山楂疏氣

芩連翹防前桔紫蟬通車解毒

加山楂疏氣

芩連翹防前桔紫蟬通車解毒

加山楂疏氣

芩連翹防前桔紫蟬通車解毒

加山楂疏氣

桂枝或寄如薑。種或一片不分顆粒。身熱大便秘而出不快者。此毒氣鬱滯血氣不流行也。用前調元化毒湯去。

參苗加小川芎清之。

有斑色淡白飲食減少。身涼手足冷。小便清大便滑而出不快者。此氣血怯弱不能載毒出外也。用前溫中益氣湯托之。有鼻塞聲重咳嗽惡寒而出不快者。風寒蔽之也。宜發散之用。怯弱不能載毒出外也。用前溫中湯托之。

加減參蘇飲

蘇葉 六分 人參 陳皮 小川芎 羌活 防風

荆芥

各四分

桔梗

白芷

各三

甘草

各三

冬加麻黃

五分

生薑三片同煎。

帶熱服。但不可出汗。

或有因邪穢所觸。伏陷而出不快者。其痘必癧。宜用平和湯解之。外以蒼朮、紅棗、沉檀等燒之。以辟其氣。

平和湯。

四味保元湯加桔梗

香改木香。卽是參芪實表湯。

加芍藥改芎蘇。改朴四

人參

當歸

桔梗

白芍

紫蘇

黃芪

各四

防風

白芷

甘草

各二分

官桂

沉香

檀香

乳香

藿香

各二分

生薑

一片同煎溫服。

痘正出時。忽然傳風。眼直視。牙關緊者。此調護不謹。痘正出時。忽然傳風。眼直視。牙關緊者。此調護不謹。

而爲風邪所襲也。風氣用驅風峻藥宜用。

齧附湯

白附子二錢

老生薑二錢
切細

二味濃煎湯灌下。二酒盃出。微汗即愈。

痘正出時。身微煩而不熱。不寒者爲佳。或熱輕和緩。亦無妨。惟大熱者可憂。若出齊發熱尤可憂。其痘必稠密。必紅紫。必乾枯。仍用調元化毒湯去參芪主之。

有痘出齊與否。以腳心爲驗。腳心有痘則出齊矣。若痘稀少者。不必拘此。以身不熱爲出齊。

內食不可太早必待痘出齊而身不熱方可食。猪肉若熟未退而食肉以助火邪必成大患。鷄肉首尾俱不可食。惟起脹時怯弱者可食。以助行漿壯盛者亦忌之。諸魚皆腥牛羊皆羶痘家最忌並宜禁絕。

活幼心法大全卷之二

活幼心法大全卷之三

明清江聶尚恒久可父著

清肝黎黃光會畏巖父校

痘出齊後起發灌膿數日內調治法

報痘三日後痘已出齊身體溫和精神清爽顆粒尖圓潤澤根腳紅活脣背稀疎飲食如常二便不澁此順候也不必服藥但節飲食避風寒防穢氣而已

痘出齊後三日內其時日十分緊要其形色症候最宜精察蓋好痘全要膿漿濃滿其次亦要六七分膿漿方

可。無。虞。痘。一。出。齊。形。色。顯。然。其。膿。之。成。與。不。成。足。與。
不。足。皆。可。逆。覩。矣。除。以。上。順。候。自。然。膿。足。不。必。服。藥。外。
其。有。不。順。者。後。必。無。膿。或。膿。少。而。清。急。於。此。三。日。內。觀。
形。察。色。分。別。寒。熱。虛。實。用。藥。調。治。以。爲。灌。膿。計。猶。可。及。
也。失。此。不。治。多。有。緩。不。及。事。而。竟。不。成。膿。者。矣。痘。之。生。
死。判。於。膿。之。有。無。有。膿。則。毒。從。外。散。故。生。無。膿。則。毒。留。
內。攻。故。死。是以。膿。濃。滿。而。痂。厚。者。上。也。膿。未。滿。而。痂。薄。
者。次。也。其。下。若。偏。身。俱。水。疱。然。水。疱。七。八。分。而。間。有。二。
三。分。膿。疱。者。猶。可。生。也。其。最。下。者。密。不。成。顆。串。爲。一。片。

而其皮下有膿漿。又或疽密而潰。膿水濕漬猶可。至生也。惟乾枯無肉。或薄漿不滿二三分者。必瘡塌而死。無生意矣。是以出齊而調治灌膿。如拯溺救焚。不可緩也。

氣血流暢。則毒化爲膿。膿之不成。其病有二。毒氣熾盛。則血燥而凝。故不能運化而成膿。元氣虛弱。則血寒而縮。亦不能運化而成膿。故痘色紅紫乾枯。或帶焦黑者。毒熾而血凝者也。必不成膿。急宜清毒活血湯。痘色淡白。痘不尖圓。根無紅暈者。氣虛而血縮者也。必

不。成。膿。急。宜。用。參。歸。鹿。茸。湯。或。子。金。內。托。散。

清。毒。活。血。湯。

治紫陷二劑其痘立轉灌膿時六七日不大便亦此方起脹時同

紫草茸

當歸

俱酒洗

前胡

牛旁

木通

各六分

生地

黃。生。白。芍。

俱酒洗連翹

桔梗

各五分

酒炒芩連

各七分

甘草

四分

山楂肉

入分

人參

三分

生黃芪

八分

生薑

一片同煎煩渴者去參

芪加麥門冬

酒炒花粉

各八分

參歸鹿茸湯

治白陷灰二三日尚

陷痘不光溜

瘡虛漿清行膿

一

嫩綿黃芪

錢五分

當歸身

鹿茸

酒全灸去毛勿用

恐其燭也

三錢

酥

不克滿皆可服以托痘

一

蜜炙

錢五分

當歸身

酒洗一錢

五分

炙甘草

六分

人參

一分

生薑

一片

好龍眼肉

一錢

三箇同前。去酒。一盃溫服。兒有能飲酒者。

自濃煎藥汁與酒相半和服亦好。虛弱未甚者服此。

一二劑其痘卽轉紅活行漿。因倦于足冷。飲食少。

者加木香三十粒。官桂各五分。

寒戰肢牙者再加官桂

三分。製附子八分。泄瀉者去當歸。加炒白芍。

白术。酒炒白芍。

自茯苓各八分。木香丁桂各三分。另用秦木散止瀉。

方見後

托膜之劑莫妙於此方。以鹿茸補血力峻。與草木諸補藥不同。然恐鹿茸未必得。故又錄千金方備用。

千金內托散

舊方有桔梗治白喉瘍等與鹿茸湯同

人參一錢當歸身

蜜炙黃芪各一錢

酒炒白芍

各一錢

大川芎

各六分

官桂

炙甘草

山楂肉

各五分

南木香

防風

白芷

炒厚朴

各三分

生薑

一片龍眼肉三箇

同煎入奸酒和服隨症加減法同上

有用人乳

和藥服者

雖於灌膿有理但人乳性涼脾胃弱而大

便滑者忌之泄者尤忌之

出齊後當治不治則漿不行而五陷之症作矣五陷者

白陷灰陷紫陷黑陷血陷也

痘稠密紅紫而頂陷者紫陷也甚則轉而爲黑陷也此

毒熱熾盛蔽其氣凝其血而陷也。仍用前清毒活血湯治之。其隨症加減法亦如之。然當其紫陷時。不過一二劑。而痘立起。其效如神。及至黑陷。則受毒已深。雖用此方救治而不活者。十嘗八九矣。

痘雖稠密。其色淡白。根無紅暈。而頂陷者。自陷也。甚則轉而爲灰陷也。此血氣虛寒。不能運化毒氣以成漿。故陷也。宜用前參歸鹿�湯。或千金內托散治之。其隨症加減法亦如之。

又有一種痘瘡。頭粒通紅。成血庖而未成漿者。此氣虛

不能統血而血溢妄居氣位也。詳見前論氣血條。宜用

參芪湯大補其氣。

參芪湯

人參一錢
蜜炙黃芪各五錢
甘草一錢
官桂五分
生薑

二片同煎溫服。服此瘤卽轉白而成漿。

血瘤失治則氣愈虛而爲血陷。然治之亦不外此方。血

陷與紫陷相類。但血陷雖紅然淡而不紫也。紫陷屬熱。

氣粗身熱血陷屬虛氣少身涼不可不辨。

身熱身涼虛實顯然

何西丘論五陷說。脈臟不明管機論之。尤外錯可悲。

痘出齊二三日後。毒熱化爲膿漿。漸漸克滿。起頂光滑。
明潤身體。溫和飲食能進。小便清利。大便二三日一次。
此順候也。不必服藥。但節飲食。護風寒。避穢氣而已。

犯五陷者。治已見前。其或雖不陷頂。而痘不光潤。或疮虛而漿不過三四分。或雖有漿而清薄。或行膿至二三日。尚不克滿。此皆難以收疕。宜用參歸鹿茸湯。催足其弊。
無根窠不能灌漿。漿不足不能結疕。此時看漿爲主。

膿漿不滿。鷄冠血酒亦可用。用三五年以上大雄鷄。先將好酒一盃。頓溫。次刺鷄冠血。滴入和勻。仍頓溫服之。

服後或燥痛一時無妨其鷄不可殺

又有一種出痘稠密毒火既盛然元氣虛血氣弱津液枯竭不能制火以致虛火炎蒸或煩或渴或咽喉痛或鼻時出血難任溫補痘必不能成漿結痂大凡年長之男女嗜慾久開血氣既耗者多有此症最爲難治時醫見其多熱候率用清涼如犀角地黃湯之類不知原因血氣不能勝毒氣而致有此症今又純用寒涼則血氣愈虧損而毒氣愈肆行豈復有可生之理是以此等痘症時醫治之十無一生殊可哀憐今特製參葵清補湯

以補之

參麥清補湯

與後清肺湯不同此兼補耳

人參八分。麥門冬。去心酒蒸。白花粉酒蒸。生黃芪各一錢。前胡。牛蒡各一分炒。炙甘草各五分。生甘草各三分酒炒。

白芍。生白芍各四分。當歸酒洗八分。紅花酒洗三分。大川芎。

生地黃三分。桔梗三分。山楂肉五分。生薑一片。龍

眼三箇。同煎溫服。遇此症者。此藥當頻頻服。

痘出五六日內至七八日。若膿漿不行。亦當用前參歸

麗草湯托之。黃芩生用不必加減。若膿漿不起。則無生意矣。若有

四五分膿猶可望生
起發灌膿時有吐泄者症各不同。

吐有三端。吐而酸苦有聲。吐訛反快者。毒火上騰也。梔連二陳湯止之。
此痘色必紅紫。

梔連二陳湯

薑汁炒黃連

薑汁炒梔子

各五分

白茯苓

八分

剝半

夏

四分

去白陳皮

炙甘草

各二分

生薑

一片

同煎緩

緩服。吐止卽勿服

茯半

恐燥陽明也

此而有物無聲。不酸不苦。吐訛困倦。不思飲食者。胃氣。

損也。參砂和胃主之。方見前此痘色必淡。

泄有二端。泄而糞黃臭穢小便赤澁者。毒氣奔越也。痘色必紅紫。加味四苓散主之。泄而糞青白澁利者。虛寒也。痘色必淡白。參木散主之。如虛滑不止。兼用七味豆蔻丸。

加味四苓散

此方治熱泄下二方治虛寒。泄濁如神。

朱苓

木通

各八分

澤瀉

赤茯苓

各七分

車前子

略炒

黃連

黃芩

俱半

牛蒡

製兌前

燈心

一團同煎

食前服。

參木散

正渴良方

專治虛寒

卷之三

痘症

卷之三

痘症

日本

用裏白無油者。去皮炒。兩

人參

白茯苓

去皮砂仁

炙甘草

去皮

薏苡仁

炒熟

家蓮子

去心

真神麴

炒

山楂肉

各五錢

肉豆蔻

麵裹煨熟。

去麵切細

用火紙包打去油。

柯子

煨取肉去

核。廣陳皮

洗净去肋膜

晒各四錢

南木香

三錢以上共爲極細

米。每用二錢清米飲調食前溫服。兒有不肯服者。人
山稀粥內和服亦可。

七味豆蔻丸

米引浸透研爛和粥食之爲妙。

帶肉豆蔻

柯子

製俱

同前

砂仁

南木香

白龍骨

煅各

五錢

亦石脂

煅枯白礬各七錢

麵糊爲丸。如蚕豆大。每用清

米飲下三十丸或二十丸量兒大小與之兒有不能
吞丸者將丸研碎入粥內服之亦可

此等丸散治痘之家必須豫製以防虛滑泄瀉若痘起
服或收結時驟然泄瀉不止危在旦夕矣然止瀉用湯
藥多不效有服至異功散而不止者惟此丸散可以止
之惟毒熱作瀉者加味四苓散二三服即可止。起脹
瀉膿暗或有六七日不大便而寒悶腹痛者毒盛而秘
也。用前清毒活血湯去參芪加懷牛膝一錢紫草當歸
各加至二錢煎藥熟去渣八生蜜半酒盃服之如又不

通用前藥加酒炒大黃三錢微利之若仍不通用猪膽
汁滴人穀道中即通終不可用硝黃大下恐下後變他
症則危矣

身涼而汗不止者歸芪湯主之

歸芪湯

當歸身五錢蜜炒黃芪三錢酸棗仁炒研水煎服

有痰用白附子熟水磨服切不可用二陳湯恐燥陽明
孤陽無陰不能施化也至收醫時用之無妨

活幼心法大全卷之四

明清江 尚桓久可父著

清旴黎黃光會畏嚴父校

漿足回水至結痂還元數日內調治法

病出八九日膿漿克滿顏色蒼者上也若無他症勿
藥可也然痘出稠密而膿不甚溝者至此時飲食多
疾液多盛宜用

瘡散膏

養胃開瘀湯

人參 白朮 羊甘草 白芍芩 田杏肉 山藥

炒

家蓮子

去心炒各五分

去白陳皮

製半夏

桔梗各三分

分

灌。腹。時。忌。用。木。苓。半。夏。恐。其。以。乾。津。液。膿。紫。不。行。也。
至。此。將。醫。時。可。用。矣。以上十味。用。生。薑。一。片。同。煎。

溫。服。渴。者。去。半。夏。加。麥。門。冬。六。分。北。五。味。研碎。九。粒。

吐逆者加藿香砂仁

各三分

此時有欬逆者。俗呼喉氣上越也。取真黃土鼻邊聞之立止。用極細絲黃乾極將童便潤軟貼鼻兩間聞之。

此時漿滿或爲寒所薄。一時痘俱紫黑如紫他萄色。不必驚恐急以上刦之桂磨湯或煎湯服之立見如舊。

有寒戰咬牙者此真氣外發而內虛寒也宜建中湯大補之

建中湯

人參二錢蜜炙黃芪三錢白朮

當歸身各一錢

五分

大

川芎八分大附子製乾薑

炒鹽黑角

肉桂

炙甘草各一

錢

丁香五分生薑一片同煎溫服

一服立止甚者不過

二服收醫後寒戰咬牙者用此方調治

或謂寒獸咬牙之症有熱有寒如痘色紅紫齊勇掀發
身熱煩燥作渴大便秘小便赤濁脉來洪數者熱也蓋

胃熱則咬牙。肺熱則寒戰也。如痘色淡白皮薄頂陷身涼惡寒大小便利脈來沉遲者寒甚。益問寒則咬牙。肺寒則寒戰也。此說當矣。然此症屬火者十九。屬熱者十一。一見於七八日之前。猶間有屬熱者。但見於七八日之後。其屬熱者寡矣。是以不爲熱者立。水之候也。蓋真陽運化。其水自然冰鑑而收鑑也。其回水之候也。蓋真陽運化。其水自然冰鑑而收鑑也。其元氣不足者。則不能及時回水。而當不鑑矣。此虛寒症也。必身涼而手足冷。須大補氣血。助之。收結宜用。

溫表調中湯

蜜炙黃芪二錢 人參 白朮 白茯苓 官桂

大川芎 當歸身 炙甘草 炒乾薑 各一錢 防風八分

白芷 丁香 附子各五分 生薑一片 同煎溫服

其有發熱蒸蒸而當屬不屬者。毒氣未解也。退其熱則

痘白收。宜用

清表解毒湯

黃地骨皮 麥門冬 酒炒花粉各八分 牛蒡 連翹

當歸各五分 朱苓 澤瀉 酒炒黃芩 木通 生甘

草各四分

水煎温服

或用砂糖半酒盃。百沸湯調作一碗溫服。謂之甘露回天飲能令熱退。痘收亦好。但毒盛者恐未必效。

調治吐渴分別寒熱用藥俱同前。

痘癰時有外潰而膿水淋漓者。謂之水癰。宜用新瓦爲未。篩令極細。用絹袋包。挾患處。若乾痂堆積不落。內又密膿。卽以瓦粉用鴨蛋調敷。立收而落。

當癰時或忽然腹痛。其痛着在中臍。此熱毒凝滯瘀血。

作痛適用

清毒散血湯

牛蒡 生白芍

酒洗

桃仁 炒去皮尖研爛

酒炒大黃各一

紅花 酒洗

沒藥

乳香

俱用燈心同研細煎

藥將熟投入各五分水煎溫

服。一服立愈。

結癩厚實無他症者不必服藥。

結癩後發熱或煩渴者當辨其虛實寒熱調治發熱壯盛胸腹手足頭面俱熱大便秘滯小便赤澁者餘毒盛也卽當解毒大連翹飲主之若解毒遲則癩落後必發

癩毒。

大連翹飲 內涼藥多俱要製過斟酌用

連翹 牛蒡 柴胡 去蘆當歸 赤芍 防風 各八分

木通 車前子 荆芥 酒炒黃芩 酒炒山梔

滑石 甘草 蟬退 各五分 生薑一片同煎大便秘者

加酒炒 大黃 一錢

若其發熱稍緩頭熱面不甚熱手心腳心熱手背腳背
不熱精神困倦大小便利者虛熱也宜用

補中益氣湯

人參 八分 蜜炙黃芪 一錢 白朮 當歸身 各八分 柴胡

升麻

川芎

各四分

炙甘草

五分

陳皮

四分

渴者加麥

門冬

一錢

五味子

九粒

生薑

一片

同煎溫服

癥落還元後或癰落一半後忽然徧身大熱者餘毒欲
發癰也或手足四肢頭項胞背有一二處熱更甚者卽
癰之所在也此在膿漿不滿而結癰浮溝者速收速落
者多有之急宜用前大連翹飲以退其熱大便秘者加
酒炒大黃微利之如熱不退須連服幾劑必須熱退身
涼癰毒方可內消

此時又有忽然頭頂大痛者餘毒上攻也或因多服熱

粟所致。若不急治其毒。必注於兩目。而目病大作矣。宜用大連翹飲去木通。車前滑石。加升麻桔梗各六分。川芎三分。各四分薄荷服數劑以解散。上攻之毒庶可免目患。

癰落後有精神困倦。飲食減少。胸腹頭項手足心發熱而煩渴者。內虛也。動用補中益氣湯主之。

或有雖不發熱。而倦怠嗜臥。不思飲食。或手足冷。或津液少而渴。或癥白不紅。皆內虛之候也。亦宜用補中益氣湯調治。不然恐生他症。

須知出痘多者。收結之時。還元之後。五臟真氣發洩已。

多一身血氣耗散已盡雖或毒氣未淨而其正氣獨虛是以用涼藥解毒必須用酒炒製其體氣弱者或時加入參芪歸芍之類以救血氣切不可因其有熱症而遽投以生三黃生梔子生大黃生石膏之類此時正氣微弱驟用寒涼峻攻多有一投而輒斃者戒之戒之

治痘之家既謹其始又必謹其終蓋痘之危險不測者有二一曰毒盛一日體虛當其未出之時或三五日而速癰者皆因毒盛也及其結痂還元之時或誤投一藥誤進一飲一食而輒斃者皆因體虛也然毒盛欲出不

出者能順其勢以導之出而不妄施解毒以阻遏撲逆
之則未必致斃故前論再三戒諭深爲謹始者慮也體
虛者能察其虛而補養之又防其虛而不峻攻之則可
保無虞惟玩其收結還元而忽易不加謹者多致悞事
故又深爲謹終者警也

活幼心法大全卷之四

禁

活幼心法大全卷之五

明清江聶尚恒久可父著

清江聶黃光會畏巖父校

備用緊要諸症方論

丹斑夾

痘有夾班而出者，有紅赤點而無頭粒多隨出而隨沒。又有夾丹而出者，紅赤成片如雲頭而突起此皆毒火浮游散漫於皮膚之間也。遇此者不必驚惶但用玄參升麻湯一二劑散其游火其班丹自退。

玄參升麻湯

舌動心去

卷之五 痘症

五參去蘆升麻

去散小根各二錢

甘草八分防風

荆芥

牛蒡子各六分水煎溫服其效甚速

自後日服

有夾麻疹而出者用前方加桔梗酒炒黃芩各六分令其
麻疹先退痘瘡自當起發

痘瘡初見一二日細小四五日漸大頂平至太七日腳

漸潤頂愈平陷其色金白形如豆殼者名曰倒臘此氣

血大虛而漿不行也宜用前參歸鹿茸湯加官桂白术

川芎各八分南木香四分大便溏泄者兼用參术散

方見前

痘瘡者表虛也此爲危症宜用

參芪實表湯

與平和湯意之相形

蜜炙黃芪

一錢五分

人參一錢

蜜炙甘草

官桂

防風

白芷各八分

當歸川芎桔梗

厚朴各六分

南木香

三分生薑一片同煎溫服。

一方外治痘痒。用荆芥穗爲末。紙裹緊。糊粘紙頭。令不散。仍焙乾。燈上燃之。却於桌上。春去灰。指定痒痘頭。用荆芥火點。痒處一下。患者自以爲妙。每痒痘悉點之。

古方

痘痒必定屬虛。管櫛乃謂有氣盛血熱而痒者。此無稽。

謬說也。又有謂因血上行氣分。血味本鹹。醃蟶皮肉作
痒。似爲近理。然灰白之痘。不惟氣虛。而血虛亦甚矣。豈
能上行而醃皮肉。而痒癩最甚。則此說亦未必然也。有
穢氣觸犯而痒者。急燒蒼术紅棗或黃茶葉以辟之。甚
者內服平和湯。方見前

表虛之痘。膿漿不滿。多有痒者。其在幼兒。或兒雖長。其
神氣困者。必不能禁其手搔。須令其着舊軟絹衣袖。長
者用絹條縛其袖口。令不得爪搔。爲妙如無絹衣。或作
軟絹袋。裹兒手。亦可。有一大歲女孩。其痘不正。膿漿淋

痘

內
帳

漓而痒甚。曾用此法。得不搔破其後。頭面亦無疤痕。若不用此法。而爪破已多。縱性命能保。惡疤決難免也。
 痘痛爲實。此爲吉兆。用生白芍爲細末。酒調下一錢五分。立丘甚者。不過二服。

痘出齊後。有面白腫脹。而痘不脹者。此血氣虛弱。不能拘攝。毒氣以成膿。故其毒散慢。妄行肉分也。此爲危候。急宜大補氣血。以收攝其毒。則痘灌膿而腫脹自消矣。以參歸大補湯主之。恐難治。

參歸大補湯

與和平湯參芪實表湯相似。
 湯去官桂加山柰紫草。

卽實表

人參當歸

蜜炙黃芪

各一錢

川芎

桔梗

山楂肉

麻炙甘草

各八分

防風

白芷

薑炒厚朴

紫草茸

各六分

南木香三分

生薑一片同煎溫服

發
疔出齊數目後其間有紫黑膿硬獨大而無根者痘疔也用四聖膏填入或拔毒散點之

四聖膏

珍珠一碗豆

俱燒存性

亂髮灰

三分

冰片半分

用油胭脂點成膏先將金銀簪撥開疔口將藥填入

瘡內卽轉紅活

拔毒散

雄黄

一錢
研細

胭脂濃浸水調點疔頭上卽時紅活

痘毒發於肌膚而氣血不能悉運化以成膿結癰則有
鬱熱不散赤腫而成癰者其發於未收以前者少而發
於既收以後者多未收以前必膿漿少而薄者有之若
膿漿濃滿者無有也既收以後必結痂浮薄而遠結速
落者有之若結痂厚實而緩結緩落者無有也此毒氣
發洩盡與不盡之明驗也又有不虛而服補劑不寒而
服熱劑以致發癰者醫之悞也凡兆俱大連翹飲主之

方見

但當其初發熱發腫時。內外攻急。消散之爲上。
至於成膿。則兒小之兒多難堪。而在頭項胸腹腰背者。
甚險也。慎之慎之外。治以三豆漿塗之。

黑豆 菜豆 赤小豆 各用一合

以酸醋浸脹搗

研醃漿。時時以鵝翎刷之。紅腫退去。其效如神。

又方用赤小豆爲細末。清水調敷乾則易之。

痘瘡原多潰爛收結後。或手足等處。仍作熱臭爛出。膿水不止者。生肌散捲之。

生肌散

地骨皮

黃連

少

貞柏

炒

五倍子

生甘草

等分

爲細末乾摻之卽熱退結痂而愈其有仍作熱作膿而不卽愈者內毒未淨也仍用大連翹飲解之又有餘毒流注各處出清水者綿璽散摻之

綿璽散

出蟻綿璽不拘多少用生明礬末填在內燒令汁盡成灰爲末乾摻之

痘有鼻中衄血者毒氣上衝於肺也此其毒氣外洩亦非惡候不必驚惶只用髮灰散或清肺湯治之切不可

峻。用。寒。涼。如。犀。角。生。地。山。梔。生。三。黃。之。類。水。火。其。血。必。
爲。大。害。世。人。不。諳。此。理。一。遇。痘。瘡。有。衄。血。咽。喉。口。舌。等。
症。卽。認。爲。實。熱。遽。投。以。寒。涼。冰。凝。血。脈。以。致。痘。瘡。不。得。
成。膿。而。變。爲。壞。症。者。多。矣。是。治。未。而。妨。其。本。昧。之。甚。者。
也。

髮灰散

用少壯無病人。剪髮。不拘男女。肥皂。洗净。油垢。氣又。
用溫湯洗净。肥白。氣焰。乾量髮多小用新瓦罐。一箇。
將髮填入內。令。潔淨。瓦片蓋口。鹽和泥封之。又全封。

瓦罐晒干用木炭火閨罐一半煅一炷香久取出似
冷其灰成塊研令極細每用二錢童便七分酒三分
調服立止輕者只用灰吹鼻亦止此方極妙不惟
可用之痘瘡凡始血症皆可用

清肺湯

與前參苓清補湯不同

酒炒

花粉

麥門冬去心

天門冬去心皮

酒蒸甘草

桔梗

當歸

酒洗各五分

桔梗

梗

當歸

酒洗各五分

酒浸生白芍

酒炒

片芩

酒洗

牡丹皮

蜜炒知母

各四分

生薑

一片同煎

一二服立

止如有髮次入

一錢調服尤妙

痘有水疱無膿者。血少不能化膿也。急宜用參歸鹿茸湯峻補其血。方見前若膿疱與水疱相半者。無大妨害。如十分中有二三分膿疱者。猶有生意。惟渾身水疱全無。膿漿則危矣。然胃氣好。而飲食如常者。亦可望生。但其毒氣未散。須防發癰耳。

其或見小痘多。則血氣有限。不能盡成膿漿。而水疱與膿疱相間。此常理也。若無他症。不必施治。

痘有口舌生瘡者。或是熱毒。或是虛火。富以痘色辨之。一切不可槩認爲實熱。而純用寒涼解毒。如痘色紅紫濃

盛者熱毒也用清上飲主之如痘色淡白者虛火也用
參麥清補湯主之方見前外用赴筵散搽之

清上飲

薄荷

防風

甘草

各四分

白粉葛

牛蒡

連翹

桔梗

酒炒芩連

酒炒花粉

麥門冬

各六分

生薑

一片同煎溫服

赴筵散

薄荷葉

黃柏

各等分

爲細末入青黛少許

和勑搽之

搽之

或口舌有瘡。而腫碍者。痘癧自愈。不必治。治亦不效。
痘有咽喉腫痛者。首尾俱用利咽解毒湯。外用玉鎖匙
吹之。

利咽解毒湯

山豆根大寒

麥門冬

各一錢

玄參

桔梗

牛蒡子

各七分

防風

甘草

各五分

生薑

一片同煎食後良久溫服每

藥一煎分二三起緩緩服

玉鎖匙

朋砂

一錢

朴硝

五分

姜鹽

一條

片腦

五厘

右爲細末。以竹管吹之。

失聲

痘有音啞者。當細辨痘色。以分順逆。若痘色紅者。行漿而音啞者。以氣喉有痘也。是以外痘行漿時。內痘亦行漿。窒碍氣道。而音不亮也。待外痘膿則內痘亦消。而音口亮矣。此不必別加調治也。若痘色虛陷。灰白而音啞者。乃血氣虛弱。送毒不出。毒留於肺。肺氣受傷。以致失音。此則危矣。宜參麥清補湯主之。方見前 兼用千金內托散。方見前

痘有咽喉喰水者。順逆不同。須當分辨。若痘灌膿時。

喎水者。喉中有痘也。外痘成漿則內痘亦成漿壅於會厭門而喎也。蓋是門乃飲食所進之處。既有所壅。則飲水必溢。入氣喉而發喎。若食物有渣。自能咽下。不犯氣道。故不喎也。待外痘癧則內自瘡。不藥而愈矣。然此雖喎水。其喉不甚痛也。若痘未行漿而喉先喎水。此則毒氣壅塞其喉。必痛。宜用前治咽喉方治之。

利咽解毒湯

痘有小便赤澁者用

導赤散

木通

赤茯苓

去皮

麥門冬

各一分

八車前子

微炒

生地

黃各四甘草人參各二燈心一團如龍眼大同前

飢時服

痘毒入眼。有赤腫而痛不能開者。有翳膜遮蔽而不能視者。自古方書所論。及俗說所傳。皆以爲痘瘡人眼。而不知此非有形之瘡。乃無形之毒也。其遮睛之翳。有似痘瘡而實非也。蓋有形之瘡。發於咽喉者有之。發於口舌者有之。然皆外瘡起。脣時內瘡亦盛。外瘡收。脣時內瘡亦消。惟入眼之毒。必作於收脣之時。或還元之後。與咽喉口舌之痘迥異。此以知其非有形之瘡也。蓋眼者。

五臟氣血之精華也。痘毒之鬱滯於肌膚者爲癰爲癧。
而其留滯於精華者則發爲眼患矣。毒已留於氣血精
華之分。則其受病也深。故患此者當從容調治。收功於
數十劑之後。切不可鹵莽躁率。責效於數劑之間。可也。
痘後之人。元氣已弱。受毒又深。而其毒火發露在表。又
在至高之位。若驟用寒涼峻攻其裏。而疏利其下。則旣
傷其元氣。又拂逆其病勢。未有不至於喪明者。且或生
他症。而爲大患者多矣。須用清毒撥翳湯從容調治。使
其毒氣漸退。而元氣不損。此萬不失一之術也。又忌用

寒涼之藥點洗亦多致失明。

消毒撥翳湯

加減逍遙散入花粉牛蒡桔梗白蒺藜
甘菊幾精木賊生地草決明九味而已

酒炒黃連

當歸

酒洗

天花粉酒

蒸

牛蒡

草決明

桔梗

甘草

白蒺藜

炒磧去刺各五分

真甘菊花

蜜蒙

花

穀精草

川木賊

白粉葛各四分

川芎

羌活各三分

柴胡

防風

薄荷

生地黃

酒炒山梔各三

生薑

一片同煎

食後良久服大便秘滯者加酒炒大

黃一錢

五分服一二劑後仍去之此方毒輕者不滿十劑

而愈毒重者服數十劑然後可獲全効。

再附古今治痘要方

十神解毒湯

當歸梢

生地黃

紅花

俱酒洗極淨薑

牡丹皮

桔梗

赤

芍藥

大腹皮

洗極淨薑汁拌晒

木通

連翹

去心蒂碎碑碎

小川

芎

各五分

此方以涼血行血爲主而佐以桔梗川芎有開提發散之義引以大腹木通有疎利之能臣以連翹牡丹皮有清解之良視古方純用寒涼水伏熱毒者大不

同痘已出未出二三日間煩悶燥渴小便赤澀睡臥

不寢者可用之此方可與初發熱條敗毒和中散

參用。

九昧神功散

人參 黃芪 甘草 牛蒡子 紅花 前胡 生

地黃 紫草 薏苡 各等分水煎服

此方初出而稠密紅紫或帶焦黑色者可用

荆防解毒湯

防風

去蘆

荆芥穗

升麻

各四分

酒炒黃芩

酒炒黃

桔

玄參

牛蒡子

炒研六分

水煎服

此方治痘夾班夾麻夾丹者。俱可用。

四聖散

紫草 黃芪 甘草 木通

各一錢水煎服

鼠粘子湯 牛旁子卽鼠粘子

牛旁子 炒研當歸身 多甘草 柴胡 連翹 酒

炒黃芩 黃芪 地骨皮 各等分水煎服

此方痘癰身熱不退者宜用。

黃芪 三錢 人參 甘草 鑑

老生薑一片。大棗一枚。去核同煎。

有熱者。黃芪甘

草生用虛者。黃芪蜜炙。草炒熟。更加官桂五分。

異功散

痘灰白痴瘍咬牙寒戰泄瀉腹脹宜用此方。
此方與四君二陳平胃三方相合去甘草昌

木加丁香木香當歸
內藥官桂附子六味人參 白术 茯苓 當歸

陳皮 厚朴 薑炒製半夏 木香 丁香

肉藥裹

煨熟。去麪製附子 官桂 加薑棗水煎服

木香散

南木香

臨時用酒磨入藥

大腹皮

黑豆汁洗淨用

人參

赤茯苓皮去

前胡

青皮

去穰炒

半夏

洗七次

丁香

甘草

荊子

薑湯泡

肉桂

官桂

各分

三

生薑三片

棗一枚去核同煎。

回生丹

痘灰白虛寒吐瀉手足冷者可用此方以應急

丁香九枚

乾薑一錢

水煎熟服

八正散

小便濇秘服導赤散不效者用此方

赤茯苓

瞿麥

萹蓄

車前子

山梔仁

木通

各八分

滑石末二錢

甘草四分

水二鍾燈心 圍煎至一鍾食前服 熱盛大便亦

秘者。加大黃一錢。

無價散

黑陷欲死者用此以應急

用無病小兒糞陰乾將傾銀罐二箇上下合定鹽泥
固濟火燭通紅取出爲末蜜水調服一錢 一方加
麝香水片少許

辰砂益元散

治痘熱毒太甚狂言燥渴欲飲水者

滑石

飛過六兩

甘草木

一兩

辰砂

飛過二錢

右合勻每服小兒一錢大人二錢燈心湯下

是編治痘諸方多隨症立法而不拘於見成而以上十
方皆古今治痘之最要者。因附錄於後以備參用。

紙撚照法

用學書竹紙或燒錢草紙烘乾作撚子。如小指大蘸清
油於燈上往來薰熾令紙條無泡不爆咤又飽蘸油略
薰熾令油無泡卽點撚子將患者房內牕門閉令黑暗。
看其左額有何色點右額有何色點中庭有何色點觀
兩額宜以撚子在兩耳邊及鼻邊平照觀中庭宜以撚
子在兩日角邊平照看其皮中歷歷可指是赤是紫是

塊是點。曉然明白。若是麻疹。則浮於皮外肉內。無根蒂。
是痘疹。根在肉內極深。若以撫子當額及中庭正照。則
點而不見。撫子有灰。卽揩去。令明。如此照之。病情在內
者可以預見。若以天日光觀之。亦不見矣。

附痘疹避忌

避穢氣

腋下狐臭氣 房中淫液氣 行遠勞汙氣。
溝糞濁惡氣 婦人經候氣 諸瘡腥臭氣。
砒硫收烟氣 誤燒頭髮氣 吹滅燈燭氣。

柴烟魚骨氣。葱蒜韭薤氣。煎炒油烟氣。

醉酒葷腥氣。麝香燥穢氣。

守禁忌。

生人往來。

言罵呼怒。

對橋頭。

對搔癢。

勿掃地。

勿對荒言。

勿使僧道師巫入房。

勿對飲食調樂。

以上諸避忌謹之則重可變輕不謹則輕變重矣。

活幼心法大全卷之五

終