

P.L. 3497  
194  
1625-96  
C.I.  
V.5-6  
Cal 18  
1-5

# HORTI INDICI MALABARICI PARS QUINTA DE ARBORIBUS ET FRUTICIBUS BACCIFERIS. REGNI MALABARICI,

*Latinis, Malabaricis, Arabicis, Brachmanum Characteribus Nominibusque expressis,  
Unà cum Floribus, Fructibus & Seminibus, naturali magnitudine à peritissimis pictoribus  
delineatis, & ad vivum exhibitis.*

*Addita insuper accuratè earundem descriptione, quā colores, odores, sapore, facultates,  
& præcipue in Medicina vires exaltissimè exhibentur.*

A D O R N A T A

Per Nobilissimum ac Generosissimum D. D.

HENRICUM VAN RHEEDE, TOT DRAAKESTEIN,

Toparcham in Mydrecht, quondam Malabarici Regni Gubernatorem, supremi Confessus apud  
Indos Belgas Senatorem Extraordinarium; nunc vero Equestris ordinis nomine Illustribus ac  
Præpotentibus Provincie Ultrajectinae Proceribus adscriptum,

E T

JOANNEM MUNNICKS, M. D.

In eadem facultate Anatomes ac Botanices in Academia Ultrajectina Professorem,  
& Recip. Ultraj. Poliatrum,

*Notis adauxit, & Commentariis illustravit*

JOANNES COMMELINUS;



Mo. Bot. Garden,

AMSTELODAMI,

Sumptibus Viduae JOANNIS van SOMEREN, Hæredum JOANNIS van DYCK,  
HENRICI & Viduae THEODORI BCOM<sup>m</sup>

(Anno cœc Lxxxv,

ILLUSTRISSIMO AC NOBILISSIMO  
V I R O  
D.D. G O D A R T O  
A D R I A N O,

Libero Baroni de Reede , Toparchæ in Amerongen , Ginckel , Elst , &c. Equiti Regii Daniæ Ordinis , qui ab Elephante nomen habet : Ex ordine Equestri , Præpotentibus Reipublicæ Ultrajectinæ Proceribus adscripto , ejusdemque Collegii nomine ad unitarum Provinciarum generale concilium delegato ; Atque etiamnunc extra ordinem Legato ad Celsissimos Brandenburgiæ & Saxonie Electores .



*Ulla ad defessum aut aberrantem animum recolligendum aptior medela est , quam amoena instruclissimi alicujus viridarii contemplatio ; ubi plantarum varie micantes flosculi sensum ita reficere valent , ut omnes à variis curis inductæ molestiæ discuti facile & levari queant . Quod Tibi etiam , Vir Nobilissime , nunc in longè dissitis Regionibus versanti optandum est . Quapropter , licet tam latè patens Germaniæ Imperium , in eoque*

## D E D I C A T I O.

variorum Principum (Electorum puta Brandenburgiae, Saxoniae, & Bavariae) aulæ sufficien-  
tem ad animum recreandum materiam suppeditare  
queant, peregrinum insuper Hortum Tibi repræ-  
sento, quem animo, oculisque perambulare ali-  
quando poteris; ejusdemque quintam partem Ti-  
bi offero & inscribo. Accipe igitur, Vir Illustris-  
sime, benigne hoc opus, & scias me Tui nunquam  
non memorem esse, cum sim

Vir Nobilissime ac Illustrissime

*virtutum Tuarum*

Observantissimus Cultor

Dabam Trajecti ad Rhenum  
31 Julii 1684.

HENRICUS VAN RHEEDE,  
TOT DRAAKESTEIN.

JO-

JOHANNES MUNNICKS  
LECTORI BOTANOPHILO

S. P.

**H**Abes hic, Amice Lector, quintam Horti Malabarici partem; tertiam nostrâ operâ editam. Polliciti aliquando literato orbi sumus, integrum tandem stirpium Malabaricarum historiam nos perfecturos: Sed quandoquidem plurimis curis cum Academicis in primis, tum practicis in diversa trahimur, ut geminorum voluminum editio singulis annis à nobis vix sperari possit; imo vix unum tomum absolvere nobis, occupationum mole impeditis, detur: Typographi tarditatis hujus pertæsi, imprimis quandoquidem novem perficienda volumina restent, iteratò nos compellarunt, num Malabaricus hic Hortus tardè succrescens non citius perfici posse? Quod cum sine publici nostri muneris (quod præcipue nobis cordi est) detrimento fieri nequeat, hortum hunc omittere coacti fuimus. Ipsis vero, & præsertim Nobilissimo D. De Rheede ut satisficeret, insignem aliquem virum, eruditionis famâ celebrem,

Pars V.

\* \*

plan-

A D L E C T O R E M.

plantarum descriptionibus delineandis idoneum requisivimus , tandemque offendimus virum doctissimum pariter ac diligentissimum , *Theodorum Jansonium ab Almeloveen.* M. D. Discipulum quondam gratissimum , nunc Amicum candidum : is amore in exiūm hoc opus Botanicum flagrans , illam curam lubens in se suscepit ; Cæterum reliqua in Horto hoc disponēda & perficienda ipsi relinquimus . A cuius eruditione & indefessā diligentia omnia bona sperare oportet .

Vale.

JOAN.

JOANNES COMMELINUS  
REI HERBARIAE  
STUDIOSO  
LECTORI

S.

Uum quintum hoc Malabarici Horti volumen, Lector Humanissime, multas, nulli hactenus notas, vel animadversas, omnes, exceptis paucis, bacciferas, in se contineat, sive frutices sive arbores, justum ordinem sequi non potuimus. Quippe multarum obscurissima cognitio, notarum characteristica summa diversitas, cum descriptis omnibusque vulgaribus conferre, adeoque in communem dispescere ordinem prohibuit, quemadmodum sequentia evidentissime quoque demonstrabunt. Ut autem hic evitaretur error, nova investiganda forent stigmata, novus instituendus ordo; quod ea propter Te P. L. monere volui, ut benivolo animo commissis ignosceres erroribus. Sunt autem, quas Nobil. Autor, solo duntaxat de indigenis suis benemerendi collegit communicavitque animo, plane novæ incognitæque plantæ, quas absolutionibus commentariis illustrare potis non fui,

A D L E C T O R E M.

præcipue quum longe præstantius putem silere,  
quam incertum quid in medium producere. In  
bonam itaque accipias partem, quodcunque à me  
præstitum sit, velim, & Dei temporisque benefi-  
cio, sequentia exspectes. Vale.



HOR-

Mail-Eloï

Lat.

పుల్క

Mal.

Dari-Rinti

Brah.

పుల్క

Arab.



## KATOU-MAIL-ELOU.

Tab. 2.

 *Atou-mail-Elou* Malabarensibus, *Davi-riuit* Brachmanis, *Carilha de Serra Lusitanis*, *Wil-de loop-beffen* Belgis, Arbor est vastæ magnitudinis, præcedente altior, ramulis viridibus, quadrangulis, atque lanuginosis in orbem diffusis ornata; *Lignum albo-striatum*, cortice munitum furvo, intus rufo.

*Radix* crassa, fibrata, albicans, rubro, intusque flavescente cortice tecta, odora, insipida.

*Folia* geminata brevibus petiolis ordine parallelo longis, rotundis, crassis, ac lanuginosis ramulis inhærent, oblongo-rotunda, crassa, mollia, tomentosa, supernè atroviridia, infernè subviridia; costa media crassa, & in adversa parte extuberans, è qua nervuli transversi plures superiora versus excurrunt, qui in se invicem arcuatim deferuntur: sapor austerus, odor nullus.

*Flosculi* numerosi circa extremos ramulos ubique inter folia glomeratim, non sparsim producuntur, sensimque porrectis columellis umbellæ specie panduntur, *Mail-Elou* flosculis haud absimiles, at majores.

*Fructus* calycibus suis excepti, pari fertilitate flosculis succedunt, *Mail-Elou* fructibus similes.

Nascitur montanis & petrosis Regni Malabarici locis, prælertim in Candenate, & circa Cochin; semper viret, quotannis floret, frugetque, ac ducentos ultra annos superstes manet.

Porro lignum arboris operæ fabrili accomodum. Adhæc insignes ejusdem arboris vires extolluntur in diarrhæa, dysenteria, & tenesmo. Ex foliis cum pipere, & femine *Codda-pala* in oryzæ infuso coctis Antidotum fit fer-

Pars V.

B

pen-

pentum, scorpionum, aliorumque venenatorum animalium iectibus. E cortice contuso & cocto medicamentum conficitur, ad sanguinem ex casu in corpore coagulatum dissolvendum.

## Tab. I. 2.

Flors *Katou-mail* albo-purpurascentes sunt. Videntur autem duæ hæc arbores *Tini* species;



Parili

وَرَقَ دَارِل

أَلْهَلْ

Arab.



## P A R I L I.

Tab. 3.



*Arili Malabarenibus, Pariloffi Brachmanis,  
Arbore Bitanha Lufitanis, Speen-bessen Belgis,  
Arbor est procera, caudice crasso, albican-  
te, cinereo cortice obdueto, multisque  
atro-purpureis ramulis in orbem diffusis  
donato.*

*Radix* flavescens, subalbicante cortice cincta, amara, graveolens.

*Folia* geminata brevibus ac rubescentibus petiolis circa extremos ramulos ordine parallelo proveniunt, oblongo-teretia, acuminata, & in ambitu ferrata, crassa, densa, glabra, nitentia, subviridia, nervis aliquot è media costa purpurascente, ac inferius prominente in latera excurrentibus: sapor amarus, odor sylvestris.

*Flosculi* ramulorum extremis racematim proveniunt, vitis viniferae flosculis haud absimiles, quatuor candidis & acuminatis foliolis constantes, inodori, amari.

*Flosculis* decidentibus succedunt *Bacca* rotundae, tripartitae, viridi-rubescentes, glabro, crassoque cortice cinctae, carne intus succulentâ, adstringente, ac inodora refertae, intra quam officulum continetur albicans, tria continens *semina* oblonga, candida, amara.

Crescit in variis Regni Malabarici locis, praesertim circa Moutan; semper viret, floret Augusto, frugetque Novembri & Decembri mensibus, atque non raro bis in anno maturos exhibit fructus.

Cæterum arboris radix & folia sanguinis constitutio-  
nen melancholicam & atrabiliam corrigunt, ac acidos,  
fallidosque humores temperant. Ex foliis, cum foliis *Ca-  
retti*, in parte 2<sup>da</sup>. descriptæ, in lacteo nucis Indicæ succo  
coctis, potio conficitur, quæ cum externarum, tum inter-  
narum hæmorrhoidum doloribus mitigandis conduit.

Pars V.

C

BEENEL.

Béené *etc.*  
బెన్నె  
جِنَّةٌ *Arab.*



## B E È N E L

Tab. 4

**B**énel Malabarensibus, *Manā* Brachmanis, *Catusa* Lusitanis, *Papekuppen* Belgis, *Arbuscula humilis* est, duodecim circiter pedes alta, caudice tenui, ramulis in orbem diffusis eleganter ornato; qui cortice primum viridi, dein subcinereo, saporisque acris & aromatici, obducti, atque molli & albicante medullâ intus referti sunt: *Lignum tamen prædorum*, albicans, insipidum, inodorum.

*Radix* similiter albicans, rubescente cortice cincta, aromaticata.

*Folia* ordine decussato, petiolis crassis, subviridibus, circa ramulos proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, crassa, glabra, supernè colore atro-viridi splendentia, infernè viridi dilutiore; nervis aliquot e media costa viridi, ac in adversa parte valde extuberante, in latera excurrentibus: odor & sapor aromaticus.

*Flores* suaveolentes, circa extremos ramulos gloriam, non sparsim producuntur, sensimque porrectis columellis umbellæ specie panduntur; constant ii quatuor oblongo-teretibus, cuspidatis, rigidis, interius cochleato-cavis & albicantibus, exterius viridescentibus, atque stellæ in modum expansis foliolis, octo candidis, furectis, latis ac similiter expansis staminulis medium occupantibus; inter quæ globulus prodit viridescens, cum basi flavescente.

*Floribus fructus* succedunt subrotundi, & ferè quadrilateri, cum cuspipe brevi in vertice, crasso, viridique cortice cincti, carne intus viridi-fuscâ, odoris, saporisque aromatici, referti; intra quam officulum contine-

Pars V.

D

tur

HORTUS MALABARICUS.  
tur quadripartitum , quatuor candida ac oblongo-ro-  
tunda in distinctis loculis continens *semina*.

Crescit arenosis & montanis Regni Malabarici locis,  
præsertim in Baypyn ; semper viret , quotannis floret ,  
frugetque.

Porro ex arboris radice in sesami oleo cocta linimen-  
tum paratur , contra cephalæam , artuumque dolores  
inveteratos.



Patisjotti Lac

पात्योत्री ब्रह्म  
Patisjotti lac  
पात्योत्री ब्रह्म



## P A T S J O T T I.

Tab. 5.



*Atsjotti* Malabarenibus & Brachmanis, quibus etiam *Sameno* nuncupatur, *Olheira Lusitanis*, *Oogappelen Belgis*, Arbor est pruno magnitudine similis, caudice haud ita tenui, cinereo, saporisque amaro-dulcis cortice munito, nec non ramulis subviridibus in orbem diffusis ornato.

*Radix* fibrata, albicans, nigricante cortice cincta, saporis amaro-dulcis.

*Folia* oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu ferrata, crassa, denfa, glabra, nitentia, supernè atro-viridia, infernè subviridia, nervis aliquot e media costa in latera excurrentibus, sapor amaro-dulcis, sylvestris.

*Flosculi* albicantes ac suaveolentes racematis furculis inhaerent, quinque oblongo-teretibus cuspidatis foliolis constantes, quinque flavescentibus staminibus medium occupantibus.

*Flosculis* pari modo succedunt *Fructus* rotundi, furcto florum calyce in vertice coronati, primum virides, dein cæruleo-nigricantes, ac nigricans continentis officulum, quod *Nucleum* includit albicanter, dulcis, adstringentisque saporis.

Naescitur locis arenosis ac petrosis in Oedeampere & Candenate, semper viret, quotannis floret, ac mense Decembri maturo exhibet fructus.

Cæterum arboris folia oleo incocta oculorum vitia corrigere ferunt. Radicis cortex cum cinnabaris pauxillo, & lacte muliebri tritus ophthalmiae medetur: Ex eo-

Pars V.

E

dem

dem cum zinzibere & semine cumini in aqua cocto potus conficitur, qui ventris doloribus placandis mirificè confort.

## Tab. 5.

Arboris hujus fructus cum formâ , tum colore , *pi americanæ sylvestris Pisemis*; propterea tamen ean-  
& sapore haud absimilis est Fructui Cambuy seu Myrræ dem esse arborem , affirmare nequo.



PERIN-



Perim-Patsjoti Lat.  
ପ୍ରତିକାଳିନ୍ ମାଲ  
جَنْبَلَةُ

Arab.

## PERIN-PATSSJOTTI.

Tab. 6.



Rbuscula quæ Malabarenibus *Perin-patsjotti*,  
Brachmanis *Dasameno*, Lusitanis *Salaõ d'orra*,  
Belgis *Tamme Lerick* nuncupatur, humilis est,  
septem circiter pedes alta, ac præcedenti  
similis.

*Folia* ordine decussato, ramulis inhærent, oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu crenata, crassa, densa, glabra, splendentia, nervis aliquot e media costa in latera excurrentibus.

*Flosculi* non surculis foliaceis, at ipsis ramis inhærent, quinque candidis, oblongo-rotundis, & acuminatis foliolis constantes, numerosis staminulis albicantibus, flavescentibus apicibus ornatis, medium occupantibus, inter quæ stylus prodit exiguis, obtusus.

*Flosculis* succedunt *Bacca* rotundæ, quadripartitæ, vidi-flavescentes, quatuor intus continentes *semina* rubicunda, oblongo-rotunda.

Provenit similiter in Candenate; semper viret, fructus fert Septembri & Octobri mensibus.

Cæterum ex arboris foliis in lacte vaccino & sesami oleo coctis linimentum paratur ophthalmicum, & cephalicum.

Katou - Patjotti  
كَتُو - بَطْجُوتٌ  
Mal.  
Arab.



## K A T O U - P A T S J O T T I.

Tab. 7.



*Atou-patsjotti & Tsjotti* Malabarensibus, *Same-*  
*notti* Brachmanis, *Salaō* Lusitanis, *Lerick* Bel-  
*gis*, *Arbuscula humilis* est, caudice tenui,  
*albicante*, *cortice obducto cinereo-rube-*  
*sciente*.

*Radix* subalbicans, rufo cortice cincta,  
*graveolens*, unctuosa.

*Folia* oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu crena-  
ta, crassa, supernè colore atro-viridi splendentia, in-  
fernè subviridia, mollia, ac tomentosa; nervis aliquot e  
media costa in latera excurrentibus.

*Flores* ad foliorum exortum racematum surculis inhæ-  
rent, tribus rubro-flavescensibus, subrotundis, ac co-  
chleato-cavis foliis constantes; odor nullus.

*Fructus* calycibus quinquepartitis excepti floribus pari  
modo succedunt, subrotundi anterius in acutum mucro-  
nem definentes, tribus angulis sulcati, crasso, viridique  
cortice tecti: in meditullio tria latitant *semina* oblongo-  
rotunda, triquetra, purpureo-nigricantia, membrana-  
ceis pelliculis sejuncta, ita ut singula in singulis latitent  
cellulis.

Provenit variis regni Malabarici locis, præsertim in  
Candenate, semper viret, quotannis fructus fert, Se-  
ptembri viz. & Octobri mensibus.

In re medica nullus ejus usus est.

Akára-Patsjóti Lsc.  
ଅକାରା ପତ୍ଜୋତି Mal.  
عَكَارَةُ بَاجِنَّا طَحِينٌ Arab.



## ACARIA-PATSIOTTI.

Tab. 8.



*Cara-patsjotti* Malabarenibus, *Tilo Sameno* Brachmanis, *Salaõ Femea* Lusitanis, *Lerick wyfken* Belgis, humili quoque *Arbuscula* est, præcedentium æmula. *Folia* tamen minus lata, & in ambitu non crenata.

*Flores* candidissimi, suaveolentes, ramulorum extremis numerosi proveniunt, atque calyci viridi, in quatuor lacinias subrotundas secto, inhærent, quatuor oblongo-rotundis, ac versus exteriora reflexis foliis constantes, staminorum albantium, carneis ac subrotundis apicibus ornatorum, congerie medium floris cavitatem & umbilicum occupante; inter quæ globulus prodit oblongus, acuminatus, quadripartitus, quatuor seminum, in fructu dein succrescentium, rudimentum.

*Fructus* subrotundi, cum cuspide in vertice, quadripartiti, virides primum, dein atro-rubentes ac nitentes, e calyce florum occluso constantes, quatuor oblongo-rotunda, subviridia, ac distinctis suis pelliculis inclusa *semina* continentis; sapor ingratus & sylvestris.

Provenit etiam locis montanis & petrofis in Candenate; semper viret, Septembri & Octobri mensibus fructus fert.

Ex arboris foliis in oryzae infuso coctis gargarisma paratur, quod aphthis potenter medetur.

Tab. 6.7.8.

Quanquam peregrinae hæc, & a nullo Botanico magna tamen in notis Essentialibus cernitur differe propositæ arbores *Patsjotti* nomine innotescunt; rentia, adeo ut diverse merito censcantur species.

Mila Poenna Lat

مِلَّةٌ مِنْ مَلَّةٍ Mal

مَلَّةٌ بَقْرَعَةٌ Arab.



## MALA POENNA.

Tab. 9.

**A**Rbor quæ Malabarenibus *Mala poenna*, Brachmanis *Nalal suri*, Lusitanis *Saritos*, Belgis *Brons-boom* nuncupatur, procera est, caudice flavescente, cortice obducto cæruleo-albicante, rugoso, odoris, saporisque sylvestris, nec non ramulis subcineris ac lanuginosis, in orbem diffusis, ornato.

*Radix* rubescens, furvo cortice cincta, amara.

*Folia* brevibus, crassis, ac hirsutis petiolis densâ congerie circa ramulos proveniunt, oblongo-teretia, crassa densa, glabra, splendentia, supernè atro-viridia, infernè subviridia, ac lanuginea; nervis aliquot e media costa crassa, viridi-albicante, hirsuta, ac in adverfa parte extuberante, in latera excurrentibus: sapor amarus ac sylvestris.

Interim ipsis ramis *Gemmae* proveniunt subvirides, exiguae, rotundæ, quadripartitæ, quibus apertis quinque prodeunt *Flosculi*, quatuor vel quinque oblongo-rotundis, viridi-albicantibus, ac inferius subrubescientibus foliolis singuli constantes, octo vel decem albicantibus, surrectis staminulis, flavescentibus apicibus ornatis, medium occupantibus.

*Flosculis* succedunt *Bacca* subrotundæ cum cuspidi in vertice, viridi-fuscæ, glabræ, nitentes, saporis subamari & aromatici, unum intus *Nucleum* continentis.

Nascitur variis regni Malabarici locis, præsertim in Rapolyn; semper viret, quotannis floret, frugetque.

Pars V.

I

Cæ-

Cæterum arboris folia cum siccato Elephantis fimo in pulverem redacta, & relictis post curatas variolas ulcusculis insperfa, iisdem mederi fertur.

## Tab. 9.

*Pinnæ* seu *Poennæ* nomine plures arbores in horto Malabario occurunt, inter quas tamen magnum observatur disserimen.





Pareta su  
پارٹا سو مل  
Cita-Matiki  
କିତାମତିକି ଓରା  
تکبیج ل

*P A V E T T A,*

*seu*

*M A L L E A M O T H E.*

Tab. 10.



*Avetta* Malabarensibus, *Cita Mataqui Brachmanis*, *Fruita Gradinha Lusitanis*, *Scheel-coorn Belgis*, *Arbuscula humilis* est, seu potius *Frutex*, trium circiter pedum altitudine, caudice tenui, albicante, cortice cincto cinereo, ramulisque viridibus, in orbem diffusis, ornato.

*Radix* fibrata, albicans, saporis amari, odoris aromatici.

*Folia* geminata ordine parallelo ramulis inhærent, oblongo-rotunda, acuminata, crassa, mollia, viridia, supernè splendentia, infernè nequaquam; nervis aliquot e media costa viridi-albicante, ac in adversa parte eminente, in latera excurrentibus; odor gravis, sapor acidus, vinofus.

*Flores* in umbellas expansi extremis ramulis proveniunt, odori, quatuor candidis, acuminatis, ac stellæ in modis expansis foliolis constantes: folia hæc totidem intercedunt staminula alba, similiter expansa; medium occupante tenui, oblongo, candidoque stylo.

Floribus pari modo succedunt *Baccæ* rotundæ, glabro, viridi-fusco, ac nitente cortice tectæ, carneque intus aqueâ, viridi, saporisque subacidi refertæ; intra quam *Nucleus* continetur rotundus, albicans, durâ cartilagino-faque pelliculâ cinctus.

Pars V.

K

Crescit

Crescit multis Regni Malabarici locis, præsertim in Warapouli; semper viret, quotannis floret, ac maturos exhibet fructus.

Porro ex arboris radice cultrorum capulæ conficiuntur. Cum foliis stercorantur agri. Adhæc ex foliis in palmæ oleo fribis linimentum fit ad tollendam impetiginem, & variolas exsicandas: Ex iisdem in aqua communis coctis fomentum paratur, ad hæmorrhoidum dolores placandos. Radix cum zinzibere & croco in pulverem redacta, & cum oryzæ infuso exhibita, hydropem fanat, ferositates superfluas per vias urinarias potenter educendo.

### Tab. 10.

Arborem hanc prolixè describit Christoph. Acosta arboris mentionem Casparus Bauhinus in pinace, il-  
aromat. lib. cap. XIV. nomine Pavate, additique Vasa-  
veli etiam nuncupari, quemadmodum & Lufita-  
nis Arbor contra his Zeripolis. Facit quoque ejusdem que Arborem Malabarense fructu Lentisci vocat; ut  
& Job. Nieuhof in itinerario fol. 167.



T S JE



Tsieriam-Cottam Lec.

۱۷۸۲۳. ۱۰ ۳۸ - Mal.

Pávara-Pónni

பாவா போனி Brah:

جَهْرُوكَامْ قَنْجَامْ Arab.

## T S J E R I A M - C O T T A M.

Tab. II.



*Sjeriam-Cottam* Malabarenibus, *Pattara-ponni* Brachmanis, *Ramisoli* Lusitanis, *Lijss-beffen* Belgis, Arbuscula est humilis, caudice candido, cortice obducto cinereo, inodoro, acri.

*Radix* albicans, acris, inodora.

*Folia* crassis, brevibusque petiolis circa ramulos proveniunt, oblongo-rotunda, crassa, densa, glabra, superne viridia, inferne subviridia; costa media albicans, & in adversa parte quodammodo extuberans, è qua plures exiles nervuli superiora versus exoriuntur, qui in se invicem arcuatim deferuntur: sapor adstringens & sylvestris.

*Flosculi* racematis proveniunt, exigui, suaveolentes, constant ii quinis, viridi-fuscis, subrotundis, ac expansis foliolis, quinque e viridi flavescentibus staminulis medium occupantibus, inter quæ stilus prodit tenuis, viridi-dilutus, capitulo rotundo.

*Flosculis* pari modo succedunt *Bacca* rotundæ, cum cuspide in vertice, primum viridi-albicantes, dein rubescentes, carne intus humidâ, saporisque acidi refertæ, Ribibus nostratis haud multum absimiles, præterquam quod unicum tantummodo in singulis continetur *oficulum* scabrum, albicans, plano-rotundum.

Crescit multis in locis Regni Malabarici, præsertim in Warapoli & Paloerti; semper viret, quotannis semel, nonnunquam bis floret, frugetque.

Pars V.

L

Por-

## 22 HORTUS MALABARICUS.

Porro ex arboris foliis in aqua coctis fit oris collutio, gingivis flaccidis ac prætumidis curandis utilis. Etiam e cortice cum semine cumini in lactis fero decocto gargarisma paratur , quod aphthis potenter mederi dicitur.

## Tab. II.

*Tijeriam-Cottam* ad cæteras *Cottam* species part. 1. | omnes namque humiles sunt arbusculæ bacciferæ,  
Tab. 56. & part. 2. Tab. 16. meritò refertur; est | flore pentapetalō.  
que tertia illarum, ut note genericæ indicant:





Besdāl ۱۰  
مَسْدَل مَاء  
Vilengi  
مَسْدَل بَرَق  
مسدَل آسَاد

## BASSAAL.

Tab. 12.



Rbor quæ *Basaal* Malabarensibus, *Vilengi* Brachmanis, *Fruita Pedrica Lusitanis*, *Swynbessen* Belgis nuncupatur, mediocris est magnitudinis, caudice tenui, albicante, cortice obducto cinereo-fusco; nec non pluribus ramulis subviridibus, ac subcinereis donato.

*Radix* albicans, crassa, subrufoque cortice testa, saporis amaricantis.

*Folia* circa extremos ramulos brevibus petiolis proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, mollia, flaccida, atro-viridia; costa media crassa, e qua plures superiora versus exoriuntur costulæ, in adversa parte extuberantes: fapor amarus, odor acris.

*Flosculi* numerosi racematum proveniunt, candidi primum, dein ex albo rufescentes, suaveolentes, calycique exiguo, subrufo, in quinque lacinias acuminatas secto inhærent, quinis oblongo-teretibus, ac stellæ in modum expansis foliolis constantes: foliola hæc totidem intercedunt staminula alba, surrecta, subrufis apicibus ornata; medium occupante stylo exiguo.

*Flosculis* simili fertilitate succedunt *Bacca* rotundæ, rubefcentes, cum cuspide in vertice, inferius calyce quinquangulo exceptæ, carne succulentâ ac subdulci intus refertæ; intra quam officulum locatur albicans, planorotundum, Nucleum continens candidum, amaro dulcem.

Provenit locis arenosis, præsertim fertili solo circa Cochin; quotannis floret, frugetque, atque a primo fationis anno ad quintum decimum frugifera esse folet.

Pars V.

M

Cæte-

Cæterum e tenerioribus arboris foliis , addito zinzi-  
bere, in aqua coctis gargarisma paratur , faucium affecti-  
bus tollendis utile. E baccis in butyro frixis unguentum  
conficitur , quod fronti ac temporibus illitum phreni-  
ticis valde prodesse dicitur . Nuclei vero earundem as-  
sumpti lumbricos necant. Radicis cortex siccatus, & do-  
lenti denti adhibitus odontalgiæ mederi perhibetur.

## Tab. 12.

Arboris hujus fructui haud dissimilis Fructus provenit in Java, circa Bataviam , isque Malaccis Bon-Bu-  
ria , Javanis Kanne koeni nuncupatur.



Kare-Kandel

Linn.

କର୍ମକାଳୀ

Hindi

Carolo

Brah.

କାର୍ଲୋ

Brah.

କାରାଲିଆ

Arab.



## K A R E · K A N D E L.

Tab. 13.

**K**are-Kandel vel Kandeque Malabarenibus, Kandelo Brachmanis, Arbore da pao Salgado & Salgeira Lusitanis, Kandeke seu Run-boom Belgis, Arbor est procula, quadraginta circiter pedes alta, caudice crasso, denso, cortice obducto crasso, cinereo, intus rubescente, multiflora ramulis nodosis ac geniculatis donato.

*Radix* itidem crassa, fibrata.

*Folia* bina aut terna simul juncta extremis ramulis inhærent, oblongo-rotunda, glabra, densa, supernè colore atro-viridi splendentia, infernè viridi dilutiore; nervis aliquot in adverfa parte eminentibus, e media costa in latera excurrentibus.

*Flores* umbellæ in modum longis ac viridi-striatis petioliis, circa foliorum exortum proveniunt, inodori, exigui, suntque quasi gemmulæ e septem acuminatis, viridibusque foliolis constantes: ex umbilico prodeunt statim quatuordecim; quorum septem albicantia, apicibus crispis, candidisque ornata, flosculi foliola intercedunt; septem vero longiora, rotundis flavisque nodulis dotata medium flosculi cavitatem occupant, altiusque eminent, inter quæ stylus prodit albicans, supernè velutstellulâ candidâ septem cuspidum exornatus.

*Fructus* consimili modo frequentes succrescunt, suntque *Bacca* rotundæ, umbilico exiguo in vertice præditæ, primum virides, dein rubescentes, tandem rubro-nigrantes, ac resinosis, albicantibusque striis obductæ, carne intus rubicundâ ac subacidâ refertæ, intra quam officulum locatur atro-purpureum.

Pars V.

N

Nasci-

Nascitur ubique in Malabar; semper viret, quotannis floret, frugetque.

Porrò cum arboris foliis agri stercorantur. Etiam ex iisdem tenerioribus in oryzæ infuso coctis, oris collutio fit, aphthis curandis summè utilis.

Tab. 13.

*Kart-Kandel* seu *Kandeque* inter bacciferas merito referunt; plures tamen arbores ejusdem nominis intium quoque hujus arboris mentionem facit, at ter filios partē scqq. exhibebuntur. *Zannius Kandal* vocat.



CORINTI

Corinti *Panell* L.

جِرِنْتِي مَدِينَة

Kerinti

कोरिटि ब्रह्म

مُحْرَقْ طَبِيْبٌ سُكَّان



## CORINTI PANEL.

Tab. 14.



Rbuscula quæ Malabarensibus *Corinti Panel*, Brachmanis *Corinti & Apocaro*, Lusitanis *Pao Coftus do Mato*, Belgis *Heyl-wortel* nuncupatur, altera *Narum-Panel* part. 2. Tab. 10. descriptæ species est, similique modo, ac pari altitudine excrescit.

*Radix* albicans, cinereo ac lanuginoso cortice tecta; sapor acris, odor aromaticus.

*Folia* fine ordine ramulis inhærent oblongo-rotunda, acuminata, crassa, densa, glabra, nitentia, supernè atro-viridia, infernè subviridia; costa media crassa, infernè eminens, e qua plurimi superiora verius exoruntur nervuli, qui in se invicem arcuatim deferuntur: odor ac sapor acris, & aromaticus.

*Flores* racematis proveniunt, constantque sex viridis, oblongo-rotundis, ac extrorsum reflexis foliis, medium occupante globulo plano-rotundo, viridi, qui ipsius fructus rudimentum est.

Floribus pari modo succedunt *Baccæ* rotundæ, primum virides, dein rubicundæ, carne subdulci intus refertæ, intra quam ossiculum locatur rotundum, rubro-fuscum, *Nucleum* continens albicantem.

Crescit ubique in Malabar, & præsertim locis arenosis ac petrosis in Candenate; quotannis floret, fructusque fert, mensibus viz. Julio & Augusto.

Vires autem & facultates hujus arboris eadem sunt, ac *Narum-panel* part. 2. Tab. 10. descriptæ.

Tab. 14.

Arboris hujus duæ species in parte 2. Tab. 9. &c *Nimbo* esse putavi; at maledicere ut alibi latius do. 10. exhibentur; viz. *Panel*, & *Narum-panel*, quas cui.

Pars V.

O

PERIN-



Perin Panel. Lat.

جَلْجَلْ مَنْدَبْ مَالِ:

جَلْجَلْ بَرَاهِ بَرَاهِ:

جَلْجَلْ سُكُونْ سُكُونْ:

## P E R I N - P A N E L.

Tab. 15.

**P**erin-panel Malabarenibus, *Cali apocaro & Cuncto Brachmanis*, *Paō-coſtus Lufitanis*, *Groot Heyl-wortel Belgis*, Frutex est seu Arbuſcula humiliſ, quatuor circiter pedes alta, caudicetenui, albicante, cortice obducto cinereo, intus viridi, aromatico.

Radix densa, albicans, furvo cortice tecta, faporis acris, odoris aromatici.

Folia geminata ordine parallelo circa ramulos crassis ac subviridibus petiolis proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, tenuia, supernè colore atro-viridi splendentia, infernè viridi dilutiore; costa media crassa, & in adversa parte altè extuberans, e qua plurimi superiora versus exoriuntur nervuli, qui in ſe invicem arcuatim deferuntur: fapor sylvestris.

Flores racematis proveniunt, candidi primum, dein rufescentes, quinque teretibus acuminatis, ac extrorſum reflexis foliis constantes; totidem albicantibus ſtaminulis, flavescentibus apicibus ornatis, medium floris cavitatem & umbilicum occupantibus, inter quæ ſtilus prodit surrectus.

Floribus deciduis succedunt *Bacca* oblongo-rotundæ, acuminatæ, crasso, duro, & atro-viridi cortice cinctæ, pulpâ intus albicante primum, dein subcæruleâ, aquosâ, ac insipidâ refertæ. In meditullio decuſſatim quatuor latitant *ſemina* albicantia, dura, oblongo-rotunda, membranaceis pelliculis a ſe invicem fejuncta.

Nascitur Regni Malabarici variis in locis, præfertim in Berkenkour; ſemper viret, floret, frugetque.

Cæterum ex fruticis hujus, seu arbusculæ foliis siccatis, & prunis impositis, suffumigium fit, quod paroxysmos hystericos potenter solvere fertur.





Tsjérrou - Pánel Linn.  
ତୁର୍ପବୃକ୍ଷ ଫୁଲ

Apacáru

ଅପାଳୁ  
جَعْلَرُ جَعْلَرُ Arab.

## T S F E R O U · P A N E L.

Tab. 16.



*Sjerou Panel* seu *Baala paleti* Malabarenibus,  
*Apacaro Brachmanis*, *Clyn Heylvortel Belgis*,  
*Arbuscula humilis* est, atque tertium genus  
*Narum-panel* part. 2. Tab. 10. descriptæ, cui  
tum caudice, tum radice, & crescendi mo-  
do similis est.

*Folia* fine ordine ramulis inhærent, oblongo-rotunda;  
acuminata, crassa, densa, glabra, supernè atro-viridia  
& splendentia, infernè subviridia; costa media crassa,  
viridi-flavescens, ac in adversa parte extuberans, è qua  
plures exiles nervuli exoriuntur, qui in se invicem ar-  
cuatim deferuntur: odor ac sapor acris, & aromaticus.

*Flores* rotundis, viridibus, ac lanuginosis petiolis circa ex-  
tremos ramulos proveniunt, rubescentes, calycique exi-  
guo, subviridi, ac tripartito inhærent, sex oblongo-ter-  
tibus, cuspidatis, ac stellæ in modum expansis foliolis con-  
stantes, medium occupante capitulo globoso, albicante  
primum, dein rufescente, punctis minutissimis in super-  
ficie notato; quod ipsius fructus rudimentum est.

*Floribus* succedunt *Fructus* rotundi, nigricantes, gla-  
bri, carne intus succulentâ, acido-dulci referti, intra  
quam officulum continetur rotundum, nigricans; *Nu-  
cleum* includens albicantem.

Crescit multis Regni Malabarici locis, præsertim in  
Angiccaimal; semper viret, floret, frugetque.

Cæterum expressus ex arboris foliis succus, & cum  
opii tantillo in initio febrium intermittentum exhibitus,  
illarum paroxysmos mitigat: Ex iisdem in aqua commu-  
ni coctis semicupium paratur ad arthriticos dolores pla-  
candos.



Kal Tijerou Panel

କାଳ ତିଜେରୁ ପାଣ୍ଠ

ଶାଖାଟାଙ୍ଗ

କାଲତିଜେରୁ

Brah

Arab.

## KALTSJEROU-PANEL,

seu


## PANEL MONTANA MINOR.

Tab. 17.

**K**altsjerou-panel Malabarenibus, *Avali-apocaro* Brachmanis, *Pao Costus da serra menor Lusitanis*, *Berg Heylvortel Belgis*, Arbuscula humili est, seu potius Frutex, atque quarta *Narum-panel* species; præcedentibus haud absimilis, præterquam quod *Folia* minora sint, oblongo-teretia, acuminata, suaveolentia, aromatica.

Provenit locis montanis & petrofisis circa Paracaro; semper viret, floret, frugetque.

Vires autem & facultates hujus arbusculæ eadem sunt, ac *Narum-panel*.





Kasjou Panel etc  
காஸ்ஜூ மல.  
Apacaru

अपाकुरु ब्रह.  
عْلَمْ كَهْ كَهْ عَلْمْ Arab.

KATS JAU-PANEL,

seu

PANEL STYLVESTRIS.

Tab. 18.

**A**Rbuscula quæ Malabarenibus *Kasjau-panel*, Brachmanis *Pee-apacaro*, Lusitanis *Pao Coftus Bravo*, Belgis *Wild Heylwortel* nuncupatur, humili est, quatuor circiter pedes alta, caudice tenui, multisque ramulis subviridibus donato; Lignum albicans, cortice cinereo, intus viridi, saporis acris & aromatici munitum; nec non rufelcente ac fungosâ intus medullâ refertum. *Radix* vero insipida, inodora.

*Folia* oblongo-rotunda, acuminata, crassa, densa, glabra, supernè atro-viridia & splendentia, infernè sub-viridia; nervulis aliquot tenuioribus, ac vix conspicuis e costa media, viridi-albicante in latera excurrentibus: odor gratus, sapor subacris.

*Flores & Fructus* *Tsjerou-panel* floribus & fructibus similes.

Nascitur locis montanis circa *Mangatti*, semper viret, floret, frugetve.

De viribus autem, & facultatibus nihil constat.

Tab. 16. 17. 18.

Quanquam Lusitani omnes *Panel* species ob sa- patet ex *Dioscoride lib. i. cap. 5.* At nulla apud Botani- porem aromaticum vulgo *Cofti* nomine appellant, cos (quod sciam) *Panel* mentio fit, nullam tamen cum coto similitudinem habent, uti



○○○○



Kayaro-Maram Lst.  
A3253 02. Mal  
सनने भारतीय अरब  
Arab

## K A S J A V O M A R A M.

Tab. 19.



Rbor hæc Malabarenibus *Kasjavo Maram*, Brachmanis *Sarani*, Lusitanis *Palins*, Belgis *Lieverboom* appellatur, Estque justæ magnitudinis, caudice mediocriter crasso, multisque ramulis nodosis donato; Lignum prædurum, albicans, furvo cortice munitum.

*Radix* fibrata, albicans, rubicundo cortice cincta, inodora, subadstringens.

*Folia* geminata ordine parallelo ramulis inhærent, oblongo-rotunda, acuminata, glabra, nitentia, supernè atro-viridia, infernè subviridia, subacido-adstringentia.

*Flosculi* inodori, subcærulei primum, dein purpurascentes, ad foliorum exortum racematum surculis proveniunt, calycique exiguo, rubicundo, ac quadripartito inhærent, quatuor subrotundis foliolis constantes, octo staminulis, rotundis apicibus ornatis, medium occupantibus; inter quæ stylus prodit tenuis, surrectus.

*Fructus* rotundi, glabri, nitentes, virides primum, dein albicantes & subcærulei, tandem cæruleo-nigricantes, carne intus cæruleo-albicante, succulentâ, dulcique referti; intra quam officulum continetur, Nucleum includens albicanter.

Crescit locis sylvestribus circa Cochin; semper viret, floret, frugetque.

Cæterum ex arboris foliis cum viridi curcuma in oleo cocta linimentum conficitur, hydatidibus pellendis utile: Foliorum succus cum linteis pone aures positus Lipitardinem curat. Ex radice in oleo cocta litus paratur contra arthritidem & Cephalæam.

Bellutta-Kanneli L.

മലബാറിന്റെ മല

Davi-Bedusi

پادی بودی

Brah

جعْنَقْبَرْ

Arab



## BELLUTA-KANNELI.

Tab. 20.

**B**elluta-Kanneli, seu Ben njævel aut Poutsja Malabarenibus, Davi Bedoesi Brachmanis, Fruita Cauri Lusitanis, Dwergen appelen Belgis, Arbor est mediæ magnitudinis, caudice duro, albicante, furvo cortice munito; Nonnunquam vero plures caudices unicae radice excrescunt.

*Radix* rubescens, odora, aromaticæ.

*Folia* geminata ordine parallelo circa ramulos proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, crassa, densa, glabra, splendentia; costa media albicans, ac infernè eminens, e qua nervuli plurimi parallelo ductu versus superiora excurrunt, qui in se invicem arcuatim deferuntur: odor & sapor aromaticus.

*Flores* racematis in furculis proveniunt, suaveolentes: constant ii unico viridi-albicante foliolo seu calyce, sed in quinque leves incifuras seu lacinias diviso, numerosis fibris candidis, subflavescientibus ac rotundis apicibus ornatis, medium occupantibus; inter quas stilos prodit albicans, surrectus.

Floribus pari modo *Fructus* succedunt rotundi, & in vertice calyce seu foliolo florum surrecto coronati, virides primum, dein albicantes, tandem candidi, tenui pelliculâ cincti, intusque albicante, molli, subdulci; adstringente, odorisque aromatici carne referti; intra quam tenue continetur officulum, Nucleum includens rotundum, viridem, aromaticum.

Pars V.

V

Pro-

40 HORTUS MALABARICUS.

Provenit in Coeroernade, vicinique locis montanis & petrosis; semper viret, floret, frugetque.

Cæterum arboris folia siccata, & in pulverem redacta, atque cum lactis sero exhibita, diarrhœam sanant: Ex foliis in aqua coctis Balnæum paratur contra quoscunque articulorum dolores.

Tab. 20.

*Belluta Tijampakan* in parte tertia descripta, quam-  
quam idem ejus cum hac arbores pronomen, in mul-  
tis tamen ab invicem differunt, uti ex figuris & de-  
scriptionibus cernere licet.




Ponnagam

போங்கம்

Mal

مَلَكَةَ

crab



*PONNAGAM.*

Tab. 21.



Rbor quæ Malabarensibus *Ponnagam*, Brachmanis *Benissa*, Lusitanis *Arola*, Belgis *Himpen* nuncupatur, procera est, triginta circiter pedes alta, caudice mediocriter crasso, multisque ramulis in orbem diffusis donato: Lignum densum, albicans, cinereo cortice obductum.

*Radix* rubescens albicante cortice cincta, odoris, saporisque sylvestris.

*Folia* petiolis longis, rotundis, subrubescientibus circa ramulos proveniunt; oblongo-rotunda, acuminata, crassa, densa, glabra, superne colore viridi-fusco splendentia, inferne subviridia; a pediculo ad apicem folii conspicuus nervus decurrit, minores quosdam emittens, e quibus transversæ multæ venulæ parallelæ excurrunt: odor & sapor ingratus, ac sylvestris.

*Flores* inodori extremis furculis spicatum proveniunt, calycique exiguo subrubescenti inhærent, tribus, rarius quatuor oblongo-teretibus, viridescentibus, intusque lanuginosis ac striatis constantes foliolis, quæ e globulo rubicundo, oblongo-rotundo, prodeuntia, ac latè expansa jucundum intueuntibus adspectum exhibent; medium occupantibus staminulis tenuissimis, brevissimis.

Singulis flosculis singuli succedunt *Fructus* rotundi, tribus, interdum quatuor angulis constantes, viridi-rubescentes: totidem distinctis loculis *semina* solida continent, cuticulâ nigricante ac nitente intecta, medullâ albâ, ex rotundo oblonga, sapore adstringente, cum subsequente ardore.

Pars V.

X

Prove-

Provenit in Paroe ; semper viret , floret, frugetque  
Augusto & Septembri mensibus.

Cæterum ex arboris foliis & fructibus cum melle con-  
tus cataplasma paratur , quod iectibus ac morsibus fer-  
pentum, aliorumque venenatorum animalium imposi-  
tum, eos potenter sanat. Similiter radix trita , & cata-  
plasmatis formâ locis contusis imposita , sanguinem coa-  
gulatum dissolvit, & contusiones curat.



TSJE.

Tjéru - Ponnagam  
ஒங்காப்பு தீ. Mal.  
جُنْجُونْ جِعْنَاعَمْ Arab.



०८०

## T S J E R O U - P O N N A G A M.

Tab. 22.



*Sjerou-Ponnagam* Malabarenibus, *Davo-benissa* Brachmanis, *Arola menor* Lusitanis, *Roode Himpfen* Belgis, altera *Ponnagam* species est; sed minor.


*Radix furva, aromatica, acris.*

*Folia* præcedentis arboris foliolis similia; at minora, & suaveolentia. Similiter *Flores* *Ponnagam* flosculis haud absimiles: praeter quos tamen alii exigui insuper adfunt *Flosculi*, quibus *Ponnagam* destituitur.

Floribus succedunt *Fructus* rotundi, in vertice umbilico trium filamentorum subviridium ac lanuginosorum coronati, tenui, purpurascente, ac lanuginoso cortice cincti; Nucem continent albicantem, tria distinctis loculis includentem *semina* nigricantia, nitentia.

Crescit locis arenaosis in Baypin; semper viret, quotannis maturos exhibit fructus, mense circiter Septembri.

Vires autem & facultates hujus arboris eadem sunt, ac præcedentis.



Pee Tjerou-Ponnagam.Lat.

ରବରିନ୍ ମୁଦ୍ରା. Mal.

ପୀତ୍ଜେରୁ ପଣ୍ଣାଗମ

Arab



## PEE-TSJEROU-PONNAGAM.

Tab. 23.



Rbor hæc Malabarenibus *Pee-Tsjerou-ponnagam*, Brachmanis *Tabenissa*, Lusitanis *Arola da serra*, Belgis *Bergh-Himpen* nuncupatur; Estque major *Ponnagam* species, altiusque excrescit, cæteroquin ei valde similis.

*Fructus* tamen a præcedentium specierum fructibus quodammodo differunt. Sunt iidem Baccæ tricoccæ, *hoc est*, ex tribus globosis lateribus constantes, ac si ex tribus globulis unitis sint formatæ, viridi-flavescentes, lanuginosæ, tria distinctis loculis *semina* continentes subrotunda, nitentia, Nucleo intus candido.

Nascitur montanis Regni Malabarici locis, præfertim in Canjoer, semper viret, quotannis floret, ac maturosexhibet fructus, mense circiter Augusto.

De viribus autem, & facultatibus hujus arboris nihil constat.





Pee-Ponnagam L.

பீ போந்தம். Mal.

بِهِ بُونَجَامٌ

Arab.

## P E E - P O N N A G A M.

Tab. 24.



*Ee-ponnagam* Malabarenibus, *Soubenissa* Brachmanis, *Arola-penachozo* Lusitanis, *Pluym Himpfen* Belgis, Arbuscula humilis est, duodecim circiter pedes alta, caudice mediocriter crasso, multisque ramulis in orbem diffusis donato; Lignum albicans, cinereo ac lanuginoso cortice munitum.

*Radix* Ponnagam radici similis. Quemadmodum & *folia* præcedentium arborum foliorum æmula.

*Flores* circa extremos ramulos oblongis, & florigeris petiolis confertim proveniunt; suntque spicæ, seu potius virgulæ plumosæ, viridi-flaveſcentes.

*Fructus* subrotundi, quatuor angulis constantes, virides, quadripartito in vertice umbilico coronati; quatuor distinctis loculis *semina* continent exigua, oblonga rufa, nientia.

Provenit in Mangatti, semper viret, quotannis floret, frugetque, mense viz. Augusto.

Cæterum ex radicis & foliorum succo cum melle cocto linimentum paratur, potentissimum adversus venenatorum animalium iectus, morbusve præsidium. Idem præstat Balneum, quod ex foliis hisce cum allio decoctis conficitur.


Tab. 21. 22. 23. 24.

Omnis hic *Ponnagam* species arbores sunt semper videntes Bacciferæ, & a nemine quod sciam de scriptæ.

Molago - Marami L.

23 29 180 Mal.

مَلَّا غُوْ بَغْرَمْ Arab.



## BELLUTA-KANNELI.

Tab. 20.



*Elluta-Kanneli*, seu *Ben njavel* aut *Poutsja* Malabarenibus, *Davi Bedoesi* Brachmanis, *Fruitæ Cauri* Lusitanis, *Dwergen appelen Belgis*, Arbor est mediæ magnitudinis, caudice duro, albicante, furvo cortice munito; Nonnunquam vero plures caudices unica e radice ex crescunt.

*Radix* rubescens, odora, aromaticæ.

*Folia* geminata ordine parallelo circa ramulos proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, craffa, densa, glabra, splendentia; costa media albicans, ac infernè eminens, e qua nervuli plurimi parallelo ductu versus superiora excurrunt, qui in se invicem arcuatim deferuntur: odor & sapor aromaticus.

*Flores* racematis in furculis proveniunt, suaveolentes: constant ii unico viridi-albicante foliolo seu calyce, sed in quinque leves incisuras seu lacinias diviso, numerosis fibris candidis, subflavescenscentibus ac rotundis apicibus ornatis, medium occupantibus; inter quas stilos prodit albicans, surrectus.

*Floribus* pari modo *Fructus* succedunt rotundi, & in vertice calyce seu foliolo florum surrecto coronati, virides primum, dein albicantes, tandem candidi, tenui pelliculâ cincti, intusque albicante, molli, subdulci; adstringente, odorisque aromatici carne referti; intra quam tenue continetur ossiculum, Nucleum includens rotundum, viridem, aromaticum.

Provenit in Coeroernade, vicinisque locis montanis & petrosis; semper viret, floret, frugetque.

Cæterum arboris folia siccata, & in pulverem redacta, atque cum lactis sero exhibita, diarrhœam sanant: Ex foliis in aqua coctis Balnæum paratur contra quoscunque articulorum dolores.

## Tab. 20.


*Bellata Tjampakan* in parte tertia descripta, quam idem ejus cum hac arbore pronomen, in multis tamen ab invicem differunt, uti ex figuris & descriptionibus cernere licet.



*Ponnagam* L.

பொங்கம் Mal.

بُونَاجَامْ Arab.



## PONNAGAM.

Tab. 21.

**A**rbor quæ Malabarenibus *Ponnagam*, Brachmanis *Benissa*, Lusitanis *Arola*, Belgis *Himpen* nuncupatur, procera est, triginta circiter pedes alta, caudice mediocriter crasso, multisque ramulis in orbem diffusis donato: Lignum densum, albicans, cinereo cortice obductum.

*Radix* rubescens albicante cortice cincta, odoris, saporisque sylvestris.

*Folia* petiolis longis, rotundis, subrubescientibus circa ramulos proveniunt; oblongo-rotunda, acuminata, crassa, densa, glabra, superne colore viridi-fusco splendenta, inferne subviridia; a pediculo ad apicem folii conspicuus nervus decurrit, minores quosdam emittens, e quibus transversæ multæ venulæ parallelæ excurrunt: odor & sapor ingratus, ac sylvestris.

*Flores* inodori extremis furculis spicatum proveniunt, calycique exiguo subrubescenti inhærent, tribus, rarius quatuor oblongo-teretibus, viridescentibus, intusque lanuginosis ac striatis constantes foliolis, quæ e globulo rubicundo, oblongo-rotundo, prodeuntia, ac latè expansa jucundum intueuntibus adspicuum exhibent; medium occupantibus staminulis tenuissimis, brevissimis.

Singulis flosculis singuli succedunt *Fructus* rotundi, tribus, interdum quatuor angulis constantes, viridi-rubescentes: totidem distinctis loculis *semina* solida continent, cuticulâ nigricante ac nitente intecta, medullâ albâ, ex rotundo oblonga, sapore adstringente, cum subsecente ardore.

Pars V.

X

Prove-

Provenit in Paroe ; semper viret , floret, frugetque  
Augusto & Septembri mensibus.

Cæterum ex arboris foliis & fructibus cum melle con-  
tus cataplasma paratur , quod iectibus ac morsibus fer-  
pentum, aliorumque venenatorum animalium imposi-  
tum, eos potenter sanat. Similiter radix trita , & cata-  
plasmatis formâ locis contusis imposita , sanguinem coa-  
gulatum dissolvit, & contusiones curat.



TSFE.



Tsjérū - Ponnagamī Lat.  
ත්‍රිජේරු පොන්ගම් කා.  
جُهْرُوفٌ بِعَنَاعَمٌ Arab.

## T S J E R O U - P O N N A G A M.

Tab. 22.

**S**jerou-Ponnagam Malabarenibus, *Davo-benissa* Brachmanis, *Arola menor* Lusitanis, *Roode Himpfen* Belgis, altera *Ponnagam* species est; sed minor.


*Radix* furva, aromatica, acris.

*Folia* præcedentis arboris foliolis similia; at minora, & suaveolentia. Similiter *Flores* Ponnagam flosculis haud absimiles: præter quos tamen alii exigui insuper adsunt *Flosculi*, quibus Ponnagam destituitur.

Floribus succedunt *Fructus* rotundi, in vertice umbilico trium filamentorum subviridium ac lanuginosorum coronati, tenui, purpurascente, ac lanuginoso cortice cincti; Nucem continent albicantem, tria distinctis loculis includentem *semina* nigricantia, nitentia.

Crescit locis arenosis in Baypin; semper viret, quotannis maturos exhibet fructus, mense circiter Septembri.

Vires autem & facultates hujus arboris eadem sunt, ac præcedentis.



*Pee Tjeroni-Ponnagam*

ஒவை விதி மல

குப்பீகம் அடி



## P E E - T S J E R O U - P O N N A G A M.

Tab. 23.



Rbor hæc Malabarenibus *Pee-Tsjerou-pon-nagam*, Brachmanis *Tabenissa*, Lusitanis *Arola da serra*, Belgis *Bergh-Himpen* nuncupatur; Estque major *Ponnagam* species, altiusque excrescit, cæteroquin ei valde similis.

*Fructus* tamen a præcedentium specierum fructibus quodammodo differunt. Sunt iidem Baccæ tricoccæ, *hoc est*, ex tribus globofis lateribus constantes, ac si ex tribus globulis unitis sint formatæ, viridi-flavescentes, lanuginosæ, tria distinctis loculis *semina* continentes subrotunda, nitentia, Nucleo intus candido.

Nascitur montanis Regni Malabarici locis, præsertim in Canjoer, semper viret, quotannis floret, ac maturosexhibet fructus, mense circiter Augusto.

De viribus autem, & facultatibus hujus arboris nihil constat.



Pee-Ponnagam Lat.  
பூ வெட்டங்கி. Mal.  
بِهِ بُونَاجَمْ Arab.



## P E E · P O N N A G A M.

Tab. 24.



*Ee-ponnagam* Malabarenibus, *Soubenissa* Brachmanis, *Arola-penachozo* Lusitanis, *Pluym* *Himpen* Belgis, *Arbuscula* humilis est, duodecim circiter pedes alta, caudice mediocriter crasso, multisque ramulis in orbem diffusis donato; *Lignum albicans*, cinereo ac lanuginoso cortice munitum.

*Radix* *Ponnagam* radici similis. Quemadmodum & *folia* præcedentium arborum foliorum æmula.

*Flores* circa extremos ramulos oblongis, & florigeris petiolis confertim proveniunt; suntque spicæ, seu potius virgulæ plumosæ, viridi-flaveſcentes.

*Fructus* subrotundi, quatuor angulis constantes, virides, quadripartito in vertice umbilico coronati; quatuor distinctis loculis *semina* continent exigua, oblonga rufa, nittentia.

Provenit in Mangatti, semper viret, quotannis floret, frugetque, mense viz. Augusto.

Cæterum ex radicis & foliorum fucco cum melle cocto linimentum paratur, potentissimum adversus venenatorum animalium iectus, morbusve præsidium. Idem præstat Balneum, quod ex foliis hisce cum allio decoctis conficitur.


Tab. 21. 22. 23. 24.

Omnis hæc *Ponnagam* species arbores sunt semper videntes Bacciferæ, & a nemine quod sciam decriptæ.

Molago-Maram

مَلَوْجَه مَارَمَه

مُهَلَّا عُجُونَ يَغْرِيمَ



*MOLAGO-MARAM.*

Tab. 25.

**M**olago-Maram Malabarenibus, Mirisato Brachmanis, Arbore da pimiento falso Lusitanis, wilde peeper Boom Belgis, arbor procera est, caudice crasso, multisque ramulis rotundis, viridi-flavescentibus, ac tomentosis donata; Lignum densum, albo-flavescentibus, cortice munitum crassō, cinereo, aspero.

*Radix rufa, graveolens, insipida.*

*Folia* terrena simul juncta petiolis longis, rotundis, actomentosis proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu crenata, superne lanuginosa, inferne lenia; Nervis aliquot è costa media, viridi-albicante, ordine parallelo in latera excurrentibus: odor, & sapor ingratius ac sylvestris.

*Flosculi* numerosi petiolis longis ac lanuginosis insident, constant ii unico rufo & piloso foliolo seu calyce, staminulis tribus candidis, apicibus ornatis, medium occupantibus.

Singulis flosculis singulæ succedunt *Baccæ* rotundæ, atrovirentes primum, dein viridi-albicantes, ac lanuginosæ, carne intus viscosâ ac subdulci refertæ; intra quam *semen* continetur solidum, albicans, nucleo candido.

Nascitur sylvestribus Regni Malabarici locis, præferunt in Paroë; semper viret, floret, frugetque.

Uſus autem hujus arboris in re Medica nullus est.

Tab. 25.

Quamquam arbor haec piperis sylvestris nomine Malabarenibus innotescit, nulla tamen inter arborem hanc & piperis plantam similitudo est.

Pars V.

B b

Mo. Bot. Garden,  
1893 MAIL-

Kail-Kombi  
କାଳପୋଇ  
Ona  
ଓନା

ଖୁଲ୍ଲେ ଅ



*MAIL-O MBI.*

Tab. 26.



*Ail-ombi* Malabarenibus, *Ona* & *Jammana* Brachmanis, *Saloins* Lusitanis, *Wars-boom* Belgis. Arbor est Mali magnitudine, caudice mediocriter crasso, multisque ramulis in orbem diffusis donato: Lignum molle, flavescentia, furvo cortice munitum, cuius matrix dura, rufescens.

*Radix* furva, acris, inodora.

*Folia* oblongo-rotunda, acuminata, crassa, densa, glabra, supernè atro-viridia & splendentia, infernè subviridia; costa media crassa & in adversa parte extuberans, e qua nervuli transversi plures superiora verlus excurrunt, qui in se invicem arcuatim deferuntur: sapor subacris, odor nullus.

*Flosculi* viridi-fusci, ac nitentes racematum furculis inhærent, calycique exiguo, rotundo arctè insident: sunt Gemmæ rotundæ, exiguae; intres, quatuorve leves incisuras seu lacinias divisæ.

*Flosculis* pari fertilitate succedunt *Baccæ* subrotundæ, in vertice umbilico, in totidem ut Gemmulæ incisuras seu lacinias diviso, coronatæ, viridi-fuscae, carne intus aqueâ, ingrati ac sylvestris saporis refertæ; intra quam *semen* continetur solidum, oblongo-rotundum.

Provenit multis Regni Malabarici locis, præfertim in Cranganoor; semper viret, quotannis bis maturos exhibet fructus, Aprilo viz & Septembri mensibus.

De viribus autem, & facultatibus hujus arboris nihil constat.


Tab. 26.

*Mail-Ombi* ex notis suis genericis *Barberi* species videtur.

Pars V.

Cc

NJARA



Njara. Lat.

232. Mal.

વेदी Brab.

جے Arab.

## N F A R A.

Tab. 27.



Rbor hæc Malabarenibus *Njara*; Brach-  
manis *Bedouſi*, Lusitanis *Gibique* & *graõ do gato*,  
Belgis *Stram-boom* of *Katers-ballen* nuncupat-  
tur, procera est, triginta circiter pedes al-  
ta, caudice mediocriter crasso, cinereo cor-  
tice munito, ramulisque in orbem diffusis  
donato.

*Radix* crassa, fibrata, nigricans.

*Folia* bina & bina fibi invicem opposita, oblongo - ro-  
tunda, ac in mucrone n desinentia, crassa, densa, gla-  
bra, supernè atro - viridia & splendentia, infernè sub-  
viridia; costa media albo - flavescentia, ac protuberans,  
è qua nervuli transversi plurimi superiora versus excur-  
runt, qui in se invicem arcuatim deferuntur: sapor ad-  
stringens & subacidus, odor nullus.

*Flores* candidi, inodori, circa extremos ramulos glome-  
ratim, non sparsim producuntur, sensimque porrectis  
columellis umbellæ specie panduntur; constant ii qua-  
tuor rotundis cochleato - cavis foliolis, numerosis stami-  
nulis albicantibus, flavescentibus apicibus ornatis, me-  
dium occupantibus, inter quæ stilus candidus, crassus-  
que prodit.

*Floribus* succedunt *Fruſtus* rotundi, virides primum,  
dein rubescentes, tandem nigricantes ac nitentes, umbi-  
lico in vertice stelliformi coronati, tenui cortice cincti,  
carneque intus succulentâ ac subdulci referti; intra quod  
officulum continetur, *Nucleum* habens viridi-albicantem.

Nascitur montanis Regni Malabarici locis; quotannis  
floret, frugetque.

Cæterum arboris radix variis modis usurpatur ad ocu-  
lorum, palpebrarumque affectus curandos.

Pars V.

D d

KAKA-



Kaka Njara  
કಾಕಾ ನ್ಯಾರಾ

كاكا نجارة

## KAKA-NJARAA.

Tab. 28.



Rbor quæ Malabarenibus *Kaka - Njara*, Brachmanis *Nilbedouſi*, Lusitanis *Fruita gibique preto*, Belgis *Swart Stram-boom* nuncupatur, præcedentis species est humilior, quatuordecim circiter pedes alta, caudice tenui, albicante, cortice munito furvo, intus flavescente; nec non ramulis viridi-fuscis, in orbem diffusis, donato.

*Radix* fibrata, nigricante, intus subrubescente cortice cincta.

*Folia* oblongo-rotunda, crassa; densa, glabra, supernè atro-viridia, infernè sub viridia, *Nervis* aliquot e media costa in latera excurrentibus, sapor subacido-adstringens, odor nullus.

*Flores* haud secus ac præcedentis arboris, extremis surculis proveniunt, inodori, quinque oblongo-teretibus, acuminatis, rigidis, crassis, colorisque carnei foliis constantes, totidem staminulis albicantibus, flavo-rubescentibus apicibus ornatis, medium occupantibus; inter quæ stylus prodit viridi-albicans, ipsius fructus rudimentum.

Floribus pari modo succedunt *Bacca* oblongo-rotundæ, calycique exiguo, viridi, in quinque lacinias lecto inherent, virides primum, dein albescentes, post rubescentes, tandem nigricantes ac nitentes, carne intus subrubescente ac subdulci refertæ, ossiculo albicante, plano-rotundo.

Provenit in Porca & Moutan, semper viret, quotannis floret, fructusque fert, mense viz. Augusto.

Cæterum expressus ex arboris foliis suecus, & cum laeteo nucis Indicæ succo exhibitus lumbricos necat: & cum muria epotus eodem expellit.

Pars V.

Ee

PERIN-



Perin-Njara Lat.

292 Mal.

بَرْنَجَةَ Arab.

بنج Arabic

## P E R I N - N J A R A.

Tab. 29.



Rbor hæc Malabarenibus *Perin-njara* seu *Ina-*  
*lel*, Brachmanis *Madanaka*, Lusitanis *Graō do*  
*gato*, Belgis *Katers-ballen* nuncupatur; Estque  
justæ magnitudinis, quadraginta circiter pe-  
des alta, caudice crasso, candido, cortice  
obducto furvo, multisque ramulis viridi-  
bus, ceu frondibus umbrosis in latum diffusis, donato.

*Radix rufa*, nigricante cortice tecta, aromatica.

*Folia* geminata ordine parallelo extremis ramulis inhæ-  
rent, oblongo - rotunda, ac in mucronem desinentia,  
densa, glabra, atro - viridia, splendentia, nervulis plu-  
rimis e media costa in latera excurrentibus; sapor amarus,  
odor aromaticus.

*Flores* pediculis oblongis circa ramos teneriores prove-  
niunt, copiosi, hoc est, terni, quaterni, aut plures si-  
mul ferè congesti, inodori, amari; constant ii e calyce  
exiguo, rotundo, viridi-albicante, numerosis staminulis al-  
bicantibus, luteis apicibus ornatis, medium occupantibus.

Floribus pari fertilitate succedunt *Fructus* prunorum æ-  
muli, oblongo-rotundi, exterius gibbi, interius leviter  
sinuosi, exiguo juxta verticem umbilico prædicti, atro-  
purplei, glabri, nitentes, carne intus succulenta, al-  
bo-rufescente, amaro-dulci & aromaticâ referti; intra  
quam *Nucleus* continetur viridis, rufâ pelliculâ cinctus,  
saporis acris & amari.

Nascitur ubique in Malabar, præsertim circa Porka;  
semper viret, quotannis fructus fert, Augusto viz. & se-  
ptembri mensibus, atque per sesquiseculum non raro  
frugifera manet.

Pars V.

F f

Cæte-

58 HORTUS MALABARICUS.

Cæterum ex arboris cortice in aqua cocto fit oris collutio pro Aphthis. Radix siccata, pulverisata, & exhibita Diarrhæam, Dysenteriam, & Tenesinum curare dicitur. E fructibus in aqua coctis Gargarisma conficitur, faucium affectibus tollendis utile.

Tab. 27. 28. 29.

*Njara* seu *Inara* dictæ arbores inter se tum florum, tum fructuum ratione differunt, & à nullo Botanico, quod sciam, descriptæ.



VETA

Vetadagu

وَادِي سُوند

Polly

پلی

وَرْطَحَةٌ مُجَلَّفَةٌ



## V E T A D A G O U.

Tab. 30.

**A**RBOR hæc Malabarensibus *Vetadagon*, Brachmanis *Polti*, Lusitanis *Nani*, Belgis *Craambessen* nuncupatur, Estque humilis, septem circiter pedes alta, caudice mediocriter crassio, albicante, cinereo cortice munito, multisque ramulis viridi-rubescientibus, ceu frondibus umbrosis in latum diffusis, donato.

*Radix* fibrata, albo-rufescens, inodora.

*Folia* oblongo-rotunda, crassa, mollia, glabra, splendentia supernè, nequaquam infernè; nervis aliquot e media costa in latera excurrentibus: sapor subamarus.

*Flosculi* albantes, quinis subrotundis foliolis constantes; odor nullus.

*Flosculis* succedunt *Bacca* rotundæ, atro-purpurascentes, quinque intus continentes Semina solida, triquetra, albicantia primum, dein rubescientia, tandem nigricantia.

Nascitur variis Regni Malabarici locis, præsertim in Angieaimal; semper viret, bis in anno fructus fert, Martio viz. & Septembri mensibus.

Cæterum ex arboris foliis contusis, & cum Sesami oleo coctis linimentum paratur, quod abdomini illitum difficulti partui succurrere, & retentas secundinas expellere fertur.

*Kal-Vetidasoni* Lax.

मूर्ति श्री मल.

तिक्ता ब्रह.

وَرْبَةُ سِنْجَرٍ اَرَاب.



## K A L - V E T A D A G O U.

Tab. 31.

**E**st insuper altera *Vetadagon* species, quæ Malabarenibus *Kal-vetadagon*, Brachmanis *Adolia* & *Polti*, Lusitanis *Nanida serra*, Belgis *Berg-Craambessen* nuncupatur; præcedenti persimilis, præterquam quod *Folia* minora sint, & magis teretia; *Flores* rubicundi; *Baccæ* malii aurantii coloris, acidique faporis.

Provenit locis montanis & petrofis in Teckencour; viret perpetuò, quotannis floret, fructusque fert, mensa circiter Februario.

Viret autem & facultates hujus arboris eadem sunt, ac præcedentis.

Tab. 30. 31.

Due hæ *vatadagou* species magnam habent similitudinem cum *Niraria* in parte 2<sup>da</sup> descripta. *Brey-* bit, nomine *Fruticu Æthiopici Bacciferi foliis myrtilli*. Est autem *Vatadagou* *vitis idæa* species.

*nus cent. cap. 5.* duas haud dissimiles plantas descri-



Pars V.


H h

W A T-

Watta Taly

وَتَّا تَلِي

طَلَيْ طَلَيْ



## W A T T A - T A L I.

Tab. 32.

**W**Atta-tali Malabarensibus, *Comati* Brachmannis, *Folhas da minta* Lusitanis, *Loog Boom* Belgis, Arbor est justæ magnitudinis, viginti circiter pedes alta, caudice mediocriter crasso, multisque ramulis in orbem diffusis donato: Lignum albicans, densum, cortice munitum crasso, furvo, inodoro, saporis unctuosi, nec non medullâ intus refertum flavescente.

*Radix* itidem furva, subsalsa, mucilaginosa.

*Folia* subrotunda, acuminata, oblongis, rotundisque petiolis circa ramulos proveniunt, supernè eleganti virore splendentia, infernè subviridia, inodora, insipida; Nervis aliquot e media costa viridi-albicante, hirsuta, ac in adversa parte extuberante, in latera excurrentibus.

*Flosculi* ad foliorum exortum spicatum proveniunt: sunt ii gemmulæ rotundæ, muscosæ, viridi-flavescentes, quæ apertæ duobus constant foliolis, binis staminulis transversis, exteriora versus reflexis, pluribusque flavescentibus apicibus ornatis, emittebantibus.

*Flosculis* succedunt *Bacca* rotundæ, viridi-flavescentes, inodoræ, insipidæ, unicum intus includentes Semen rotundum, viride.

Provenit variis Regni Malabarici locis, præsertim circa Cranganoor; semper viret, quotannis floret, frugetque, Januario viz. & Februario mensibus.

Cæterum arboris folia cum viridi tabaco & oryzæ infuso trita, ac ulceribus inveteratis & verminosis imposita, potenter iis medentur. Ex iisdem foliis in aqua coctis

Pars V.

I i

Bal-

64 HORTUS MALABARICUS.

Balneum paratur adversus algidas febres. E floribus & fructibus contusis, & in nodulum colligatis, lactique muliebri incoctis conficitur errhinum, quod algidis febris mederi fertur.



KARET

Katou Velutta Amel-Podi

காடு வெள்ள மலர் போி

كَاتُوْ فَلُوتَّا أَمِيلَ-بُودِي



Kareta-Amel-Podi

காரெடா அமீல் போி

كَارِيَّة-أَمِيلَ-بُودِي



## KARETTA AMELPODI.

Tab. 33.

**A**Rbuscula quæ Malabarenibus *Kareta Amelodi*, Brachmanis *Ameli*, Lusitanis *Raiz da Cobra*, Belgis *Slange wortel of swart slange wortel* nuncupatur; humilis est, septem circiter pedes geometricos alta, caudice tenui, albicans, furvo cortice obducto, ramulisque viridi-fuscis & geniculatis pluribus donato.

*Radix* fibrata, nigricans, amara.

*Folia* geminata circa ramulos proveniunt, oblango-rotunda, acuminata, crassa, densa, mollia, glabra, superne atro-viridia & splendentia, inferne subviridia, inodora, insipida, Nervis aliquotè mediocosta in latera excurrentibus.

*Flosculi* candidi extremis surculis numerosi proveniunt, porrectisque columellis umbellæ specie panduntur, quinque crassis, acuminatis, intus candidis, extus rubescientibus lineolis striatis foliolis constantes; quinque staminulis albicantibus, subrubescientibus apicibus ornatis, medium floris cavitatem & umbilicum occupantibus; inter quæ stylus prodit purpureus, supernè bifidus.

Floribus marcescentibus aut decadentibus eorum umbili in *Fructus* excrescunt; *Baccas* viz. tricoccas, rotundas, colore viridi fusco striatas, ac nitentes, inodoras, insipidas.

Crescit locis arenosis & petrosis in Betsjour & Calecut, semper viret, quotannis floret, frugetque, mense circiter Augusto.

Porro arboris folia in aqua communi si decoquantur, eaque decoctione exhibeat, colicum dolorem potenter mitigat. Radix antidotum perhibetur adversus serpentum iectus, morbusve, si in pera tantum geratur Ex fo-

Pars V.

K k

liis,

liis, & radicibus in oleo olivarum coctis linimentum paratur, quod magnos tumores potenter digerit, resolvitque.

## KATOU BELLUTTA AMELPODI.

**Q**uae *Katou Bellutta Amelpodi* Malabarenibus, *Gorallo Brachmanis*, *Raz da Cobra branca do mato Lusitanis*, *wilde witte Slange-wortel Belgis* dicitur *Arbuscula*, *Karettä Amelpodi* species est, sed humilior; alioquin ei valde similis, nisi quod *Radix albicans* sit, Flores candidi omnino.

Crescit locis montanis & sylvestribus in Peratevidi, ac aliis Regni Malabarici locis, quotannis floret, frugetque, Julio viz. & Augusto mensibus.


De viribus vix constat, faltem inferior habetur Karettä Amelpodi.

## Tab. 33.

Plures sunt plantæ, quæ *Amelpodi* nomine appellantur; & tamen nullam cum hac arbore habent similitudinem; Utipatebit ex iis, que in seqq. exhibebuntur.



MOULI



Mouli-ila  
ମୁଲିଇଲା

Topali  
ଟୋପାଳି

ଫୁଲି

*M O U L I - I L A,*

*seu*

*M O U L E L A V O U.*

Tab. 34.



Rbor hæc Malabarenſibus *Mouli-ila* seu *Moul Elavou*, Brachmanis *Tipali & Agadini*, Lusitanis *Limaõ Pimentoſa*, Belgis *Peeper-limoenen* nuncupatur; Estque mediæ magnitudinis, quindecim circiter pedes alta, caudice crasso, ramulisque geniculatis, in orbem longè latéquè diffusis ornato, qui cortice viridi-fusco, faporis subacris & aromatici cincti, & crassis, duris, rigidis, acutisque spinis insuper muniti sunt.

*Radix* rufescens, aromatica, subadstringens.

*Folia* in ramis viridibus rotundis bina opposita, oblongo-teretia, acuminata, mollia, supernè atro-viridia, infernè subviridia, splendentia; Nervis aliquot è media costa albicante, ac in adverſa parte extuberante, in late-ra excurrentibus: fapor subacris.

*Flosculi* in umbellas expansi extremis ramulis numerosi proveniunt, quatuor oblongo-rotundis, subviridibus, ac uniformibus foliolis constantes, totidem staminulis viridi-albicantibus, flavescentibus apicibus ornatis, medium occupantibus; inter quæ stilus prodit exiguis, viridis.

*Flosculis* pari modo succedunt *Fructus* rotundi, cortice cincti viridi-fusco, crasso, inæquali, odore corticum citri, sapore quoque, at acriore & quasi ardente, pul-paque intus referti succulentâ, acidâ. Quam ob causam cibis incoquuntur limonum & piperis loco. Hinc & faccharo vel melle condiuntur, & comeduntur ad ventricu-

lum roborandum, & alimentorum in eo fermentationem juvandam, vermesque necandos: Insuper muriā & ace-to condiuntur in Atsjaar, additis viz.alliis, finapi, & zin-zibere.

Provenit in Palacattatsjirri, ubi studiosè in hortis colitur; semper viret, floret, frugetque.

### Tab. 34.

Spinosa hæc Mouli-ila genus est J dou Mouli in parte quarta descriptæ.



B E N.



Benkara Lat.

στιθια Mal.

ફટે બ્રાહ્મ.

عَلِيَّاً Arab.

## B E N - K A R A.

Tab. 35.



Rbuscula quæ Malabarenibus *Ben-Kara*, Brachmanis *Gali* seu *Babouli*, Lusitanis *Espinho d'urso*, Belgis *Aapel-doorn* nuncupatur, humiliis est, duodecim circiter pedes alta, caudice tenui, albicante, multisque ramis in orbem diffusis donato; qui cortice cinereo, & furvo cincti, ac spinis insuper oblongis, duris, aculeatis, muniti sunt.

*Radix* fibrata, albicans, atro-purpurascente cortice testa.

*Folia* bina opposita ramulis inhærent oblongo-rotunda, acuminata, crassa, densa, glabra, supernè atro-viridia & splendentia, infernè subviridia, Nervis aliquot è mediâ costâ in latera excurrentibus; sapor subadstringens, odor nullus.

*Flores* suaveolentes, viridi-purpurascentes è foliorum alis, summisque caulis spicatim exeunt, (viz. singulis furculis flores multos in spicas dispositos sustinentibus) quinque plurimum oblongo-rotundis; acuminatis, tenuibusque foliolis constantes, atque calyci viridi, in quinque lacinias acuminatas sesto inhærentes; totidem brevissimis, tenuissimis, candidisque staminulis, oblongis accinereo-striatis apicibus ornatis, medium floris cavitatem occupantibus; inter quæ stilus prominet viridi-albicans, planus, capitulo oblongo, albicante.

Floribus pari modo succedunt *Bacca* rotundæ, exiguo in vertice umbilico præditæ, virides primum, dein purpurascentes, hinc nigricantes & splendentes, crassiore cortice cinctæ, carneque intus densâ, humidâ, saporis que subdulcis & subadstringentis refertæ; intra quam Se-

Pars V.

M m

mina

mina continentur scabra, angulosa, membranaceis pelliculis, ceu parietibus integerrimis sejuncta, ita ut tria quatuorve plerumque in singulis latitent cellulis.

Nascitur circa Cochin; semper viret, maturos bis quotannis fert fructus, Martio viz. & Septembri mensibus.

Cæterum arboris radix siccata, in pulverem redacta, & exhibita, fœtum mortuum, ac secundinas post partum in utero relictas expellit, nec non menstrua obstructa provocat. Fructus immaturi diarrhæam compescunt, & nimium mensium fluxum imminuunt.



Kanden-kara ex.

கந்தை மல.

କନ୍ଦାର  
Brah.

كَانْدَةَرَةُ  
Arab.



## K A N D E N - K A R A.

Tab. 36.



*Anden-Kara* Malabarensibus, *Pouli-gali* Brachmanis, *Espinho Malinho* Lusitanis, *Strom-doorn* Belgis, Arbor est justæ magnitudinis, viginti circiter pedes alta, caudice mediocriter crasso, multisque ramis in orbem longè latéque diffusis donato; qui cortice cinereo tecti, ac spinis insuper longis, crassis, acuminitisque, uti & caudex, muniti sunt. Hæ autem spinæ omnis virulentiae atque malignitatis expertes non sunt, ut pote vulnera ab eis inflicta non raro lethalia observari solent.

*Radix* fibrata, albicans, atro-purpureo cortice cincta.

*Folia* oblongo-teretia, tenuia, lenia, viridia, bina aut terna simul juncta circa ramulos proveniunt, inodora, saporis sylvestris ac ingrati; à pediculo ad apicem folii *Nervus* decurrit rotundus, subviridis, infernè eminens, è quo plurimi exoriuntur nervuli exigui, contortuplicati.

*Flosculi* suaveolentes in racemos digesti ad foliorum exortum circa ramulos proveniunt, calycique viridi, exiguo inhærent, viridi-albantes, monopetali quadripartiti, *hoc est*, ex unico foliolo in quatuor lacinias acuminas diviso constantes; staminulis aliquot albicantibus, subrufis apicibus ornatis, medium occupantibus, inter quæ stilus prodit crassior, candidus, capitulo viridi.

*Flosculis* pari modo succedunt *Bacca* plano-rotundæ, virides primum, dein flavescentes, tandem maturiores purpureo-subcæruleæ, carneque intus succulentâ, dulci, gratique saporis refertæ; intra quam duo continentur officula furva, plana, carne intercedente à se invicem disjuncta.

Pars V.

N n

Pro-

Provenit in variis Regni Malabarici locis, præsertim circa Cochin; bis quotannis fructus fert, Martio viz. & Septembri mensibus, ac semper viret.

In Medicina nullum habet usum.



HORTUS MALABARICUS

PTEROU

Tjérū-Kára

ପ୍ରକାଶିତ

Canti

କାନ୍ତି

جَهْرُقْ حَمَارُعْ



## T S F E R O U K A R A.

Tab. 37.



Sjerou-Kara Malabarenibus, Canti & Bidani Galili Brachmanis, Spinho Salfedo Lusitanis, Bitterdoorn Belgis, Arbuſcula humilis est, seu potius Frutex, sex septemve circiter pedes altus, caudice mediocriter crasso, multisque ramulis cinereis, spinis rigidis munitis, ac in orbem diffusis, ornato.

*Radix* rubescens, suaveolens, amara.

*Folia* bina, terna, vel plura simul juncta circa ramulos proveniunt, oblongo-teretia, crassa, densa, superne atro-viridia, glabra, splendentia, inferne subviridia, hirsuta; è costa media crassa, rotunda, & in adverſa parte extuberante, plures aliae superiora versus exoriuntur costulæ, quæ in se invicem arcuatim deferuntur: sapor fylvestris, subamarus.

*Flores* inodori, subvirides, exigui, plures simul juncti ad foliorum & spinarum exortum ramulis inhærent, pentapetalodes, (è quinque viz. foliolis acuminatus, & stellæ in modum expansis, constantes, quæ tamen simul decidunt) calycique exiguo, viridi, in quinque lacinias acuminatas secto inhærentes; staminulis quinque viridi-albicantibus, flavo-rufescitibus apicibus ornatis, medium floris cavitatem & umbilicum occupantibus; inter quæ stilus prodit crassus, albicans, inferne pilis candidis obsitus, superne cuspidatus, nodulo rotundo, flavescente.

*Flosculis* *Bacca* succedunt virides, plano-rotundæ, bicoccæ, umbilico lato in vertice coronatæ, intusque carne viridi, humidâ, ac amarâ refertæ; intra quam duo continentur Semina oblonga, seorsim locata.

Pars V.

O o

Pro-

Provenit in variis Regni Malabarici locis, præsertim in Bellange; semper viret, floret, frugetque.

Cæterum ex arboris foliis in aqua coctis fit oris collutio contra aphthas. Radix contusa, ac similiter in aqua cocta, ejus decoctum si fumatur, hepatis obstrunctiones aperit, sanguinemque purgat, & exhilarat patientem.

Tab. 35. 36. 37.

Quaenam plures arbores Malabarcensibus Kātis constat essentialibus. Inter has autem Ben-Kātē, & Brachmanis Gali nomine appellantur, non & Tyerou-Kāta species sunt Rhamni. tamen ejusdem speciei censendae sunt, uti ex no-



Talir-Cára

ତାଲିର୍ କାରା

ତାଲିର୍ କାରା



## TALIRR - KARRA.

Tab. 38.



*Aliir-Kara* Malabarenibus, *Talir-Gali* Brachmanis, *Espinho Capado* Lusitanis, *Queendoorn* Belgis, Arbor est procera, triginta circiter pedes alta, caudice crasso, albicante, cortice cincto cinereo-furvo, glabro, ramulisque pluribus, in orbem longè latè que diffusis, donato; qui oblongis, duris, rigidisque spinis insuper muniti sunt.


*Radix* albicans, furvo cortice tecta, odoris gravis, saporis adstringentis.

*Folia* oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu leviter crenata, crassa, densa, splendentia, supernè viridia, infernè subviridia; Nervis aliquot è media costa in latera excurrentibus: odor gravis, sapor sylvestris ac adstringens. At vero folia teneriora, ex vertice ramorum prodeuntia, plerumque rubro-purpurea sunt.

*Flores & Fruktus*, quod hactenus saltem innotescit, non fert.

Provenit variis Regni Malabarici locis, præsertim circa Warapoli; semper viret, diuque superstes manet.

Cæterum ex arboris radice in aqua cocta potus conficitur, qui acidos saltosque humores per diaphoresin potenter evacuat. Ex foliis cum viridi curcuma in oleo frixis paratur linimentum, quod ad scabiem tollendam valdè laudatur.



## COUROU - MOELL.

Tab. 39.



*Ourou - Moelli* Malabarenibus, *Babouli*-canti & obadali Brachmanis, *Espinho dos Bugios* Lusitanis, *Wasdoorn* Belgis, Arbuscula humilis est, seu potius frutex, quatuor quinqueve pedes altus, caudice tenui, cinereo cortice cincto, nec non ramulis viridibus, aculeis armatis plurimisque virgulis pullulantibus donato.

*Radix* fibrata, rufescens, inodora, insipida.

*Folia* in ramulis aculeatis proveniunt, oblongo-rotunda, in ambitu vix crenata, crassa, densa, superne atroviridia & splendentia, inferne subviridia, nervulis aliquotè media costula in latera excurrentibus, fapor ingratius, odor nullus.

*Flosculi* subvirides, graveolentes, quinque acuminatis, expansisque foliolis constantes; Numerosis staminulis viridi-albicantibus, flavescentibus apicibus ornatis, ac in orbem expansis, medium occupantibus.

*Flosculis* succedunt *Bacca* rotundæ, virides primum, dein rubræ, & per maturitatem nigricantes ac nitentes, carne intus succulentâ & acidâ refertæ; intra quam Semina continentur dura, ossea, aspera, angulosa.

Nascitur in Baypin, aliisque locis arenosis circa Cochin; semper viret, floret, frugetque.

Cæterum ex arboris foliis cum radice in lacte vaccino coctis potus fit, qui antidotum habetur contra serpentinum morsus, ictusve. Ex cortice in oleo frixo linimentum conficitur contra arthritidem. Fruktus maturi in deliciis ab Indigenis comeduntur.

Tab. 39.

*Courou-Moelli* meritò *Rhamni* species censetur.

Pars V.

Q q

SON-

Sundari

no. 213 ④

سُورَضَارِي



## S O N D A R I.

Tab. 40.



Rbuscula quæ Malabarensibus *Sondari* & *Kappa ponna*, Brachmanis *Ajomato*, Lusitanis *Tiloins*, Belgis *Maarboom* nuncupatur, humilis est, decem circiter pedes alta, caudice mediocriter crasso, ramulisque viridibus in orbem diffusis ornato: Lignum albicans, furvo cortice cinctum, nec non rufescente intus medulla refertum.

*Radix* nigricans, odora, saporis haud ingrati.

*Folia* oblongo-rotunda, acuminata, supernè atro-viridia & splendentia, infernè subviridia, costa media crassa, lignosa, viridi-albicans, ac in adversa parte extuberans, è qua plures exiles nervuli superiora versus exoriuntur, qui in se invicem arcuatim deferuntur: sapor sylvestris ac ingratus.

*Flores* exigui, suaveolentes, candidi, calycibus exiguis subviridibus, in quinque lacinias acuminatas secti, inherentes, extremis ramulis umbellatim proveniunt, pentaphylli; è quinis sc. acuminatis foliolis, inferius junctis constantes; totidem staminulis albicotibus, rufescientibus apicibus ornatis, medium occupantibus: inter quæ stylus prodit exiguus, viridi-albicans, ac supernè bifidus, cuiusbasis est globulus exiguis, viridis.

*Flosculis* pari modo succedunt *Bacca* tetracoccæ, aliquando pentacoccæ, virides primum & nitentes, dein flavescentes, tandem maturiores nigricantes, carne intus refertæ succulentâ, nigricante, aromaticâ, intra quam quatuor plurimum continentur ossicula scabra, triquetra, albo-rufescientia.

Pars V.

R r

Crescit

80 HORTUS MALABARICUS.

Crescit in variis Regni Malabarici locis, præsertim circa Cranganoor; semper viret, quotannis floret, ac maturos exhibit fructus, mense viz. Septembri.

In Medicina verò Arbor hæc vix ullum habet usum.

Tab. 40.

Zanonius in Catalogo plantarum Malabaricum Cap. 13. arborem hanc nuncupat undari.




KAKA-

Kaka-Toddaly. Lat.

(മലിന കുഞ്ചം). Mal.

ବ୍ରାହ୍ମ. Brah.

جع و خضاخا سر. Arab.



○○○

## KAKA-TODDALI.

Tab. 41.



*Aka-toddali* Malabarenibus, *Boriti* Brachmanis, *Espinho do ladrão* Lusitanis, *Praatkens* Belgis, *Arbuscula humilis* est, multisque ramulis rotundis, longè latèque diffusis ornata, qui cortice atro-viridi cincti, & spinis insuper numerosis, brevibus, rigidis, acutisque muniti sunt.

*Radix* fibrata, atro-purpurea, graveolens, urens, ac causticam vim habet.

*Folia* terna simul juncta longis ac spinosis petiolis proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu crenata, crassa, densa, glabra, supernè atro-viridia, infernè subviridia; *Nervis* aliquot è costa media albicante, ac in adversa parte altè extuberante, spinisque rigidis obsitâ, in latera excurrentibus: odor fortis, sapor amarus, urens.

*Flosculi* graveolentes, candidi, è foliorum alis & summis caulibus spicatum exeunt, quinque acuminatis ac expansis foliolis constantes, totidem albicantibus staminulis, rufescensibus apicibus donatis, medium occupantibus; inter quæ stylus prodit brevis, surrectus, cuspidatus.

*Flosculis* pari modo succedunt *Bacca* plano-rotundæ, tricoccæ, virides primum, dein subfuscæ coloris: intus continentur tria Semina oblonga, spadicea, saporis acris urentisque, membranaceis quibusdam pelliculis à se invicem sejuncta.

Naescitur in toto Regno Malabarico, locis viz. sylvestribus; semper viret, maturos fert fructus Augusto & Septembri mensibus.

Pars V.

S s

Cæte-

82 HORTUS MALABARICUS.

Cæterum ex radice & viridibus fructibus in oleo frixis linimentum paratur contra dolores arthriticos. Ex foliis in aqua coctis Balneum conficitur ad cachexiam, analectam, pedum tumores œdematosos, simileque affectus exabundante sero natos, tollendos.



BRUXA-



*Brixaneli*  
ବ୍ରିକ୍ଷାନେଲି

بُرْجَانِ عَلِيٌّ

ଫେଦ୍ଦା

ଫୁଲ

## B R U X A N E L I.

Tab. 42.



*Ruxaneli Malabarenibus, Sarpalo Brachmannis, Arinho Lusitanis, Drielingh Belgis, Arbor est procera, circiter mali magnitudine, multisque viridibus ramulis in orbem diffusis donata; Lignum albicans, molle, cortice cinctum subcinereo, adstringente, graveolente.*

*Radix fibrata, rufa, furvo cortice cincta, subsalsa, unctuosa, graveolens.*

*Folia oblongo-rotunda, acuminata, crassa, densa, glabra, supernè atro-viridia, infernè subviridia; Nervis aliquot è mediâ costâ in latera excurrentibus: odor gravis.*

*Flores exigui, purpurei, suaveolentes, spicatim extremis ramulis proveniunt, calycique exiguo, rotundo, viridi-purpureo arctè inhærent, quatuor acuminatis, expansisque foliolis constantes, totidem staminulis tenuibus, purpureis apicibus ornatis, medium occupantibus; inter quæ stilus prodit crassior, oblongior.*

*Flosculis succedunt *Bacca* bicoccæ, nonnunquam tricoccæ, exiguo nigricante umbilico in vertice coronatæ, virides, inodoræ, subsalæ, cartilaginofo & quasi corneo cortice cinctæ; qui tenui viridique pelliculâ obdutus est, intusque continent bina, ternave Semina dura, cinereo-albicantia, dissepimentis ab invicem sejuncta.*

*Provenit locis montanis & sylvestribus Regni Malabarici, præsertim in Paracaroo & Mangatti; Floret Julio & Augusto mensibus, Novembri autem & Decembri maturos fert fructus, diuque superstes manet.*

*Cæterum ex arboris hujus foliorum succo cum recenti butyro mixto linimentum paratur, quod in carbuncu-*

Pars V.

T t

lorum

lorum cura usurpare solent. Decoctione corticis ipsius arboris diuretica habetur.

Ex radicis cortice cum zinzibere & curcuma in ebutterato latte cocto latamentum conficitur, quod adarthriticos dolores tollendos summoperè commendatur.



Perin Nirouri Ma Nirouri Lat.

ପିନ ନିରୁରି Panapaja Mal.

ପାନପ୍ରୁ

Brah.

ପିନନିରୁରି

Arist.



## PERIN NIROURI,

seu

## MA NIROURI.

Tab. 43.

**A**Rbor quæ Malabarenibus *Perin Nirouri*, *Ma Nirouri*, & *Mapana-poja*, Brachmanis *Poja*, Lusitanis *Fruita da Trinidade*, Belgis *Maagde-lynen* nuncupatur, mediæ est magnitudinis, quatuordecim circiter pedes alta, caudice mediocriter crasso, albicante, duro, cor-  
tice obducto glabro, furvo, multisque viridibus ramu-  
lis, in orbem longè latéque diffusis, ornato.

*Radix* rufa, adstringens, odoris ingratia ac sylvestris.

*Folia* exigua, oblongo-rotunda, crassa, mollia, nu-  
merosa circa surculos proveniunt, supernè atro-viridia,  
infernè viridia & splendentia, Nervulis aliquot è media  
costula in latera excurrentibus.

*Flores* exigui, subvirides, exiguis brevibusque petiolis  
ad foliorum exortum hinc inde circa ramulos prove-  
niunt, sex rotundis foliolis constantes, numerosis intus  
tenuibus staminulis, in quorum medio rotundus prodit  
globulus, qui sensim incrementum sumens, ac auctus in  
*Fruictum* excrescit, marcescente interim flore; adeo ut flos  
emarcidus fructui pro calyce inserviat. Sunt autem *Fruictus*  
hi rotundi, tribus angulis fulcati, & lato cavoque umbi-  
lico in vertice coronati, purpurascentes, tenui pelliculâ  
cincti, carneque intus densâ, albicante, subdulci refer-  
ti, intra quam Nucula continetur fragilis, aurei coloris,  
sex includens Semina oblonga, triquetra, triplici ordi-  
ne locata, ac membranaceis quibusdam pelliculis, ceu

Pars V.

V v

parie-

86 HORTUS MALABARICUS.  
parietibus integerrimis sejuncta, ita ut bina in singulis  
latitent cellulis.

Nascitur in variis Regni Malabarici locis, præsertim  
circa Cranganoor; quotannis floret & fructus fert, diu-  
que superstes manet.

Cæterum ex arboris foliis, fructibus & radicibus in a-  
qua cum pipere longo & cumini Semine coctis potus  
conficitur, qui in asthmate, tussi, pthisi, similibusque  
pulmonis affectibus valde commendatur. Folia cum cor-  
tice in oryzae infuso cocta, & in cataplasmati formam  
redacta, ac tumoribus imposita, potenter eos maturare  
fertur. Ex arboris cortice cum lacte, melle, & butyro  
cocto Balsamus paratur, quem intus sumptum, &  
foris illum pleuritidem sanare dicunt.

Est & altera hujus arboris species, huic persimilis, ea-  
que describitur & delineatur in parte 2<sup>da</sup> Tab. 27. nomine  
*Nirouri seu Niruri.*



Katorū - Nirvūri

କାତୁରୁ

Pána - Pói

ପାନପୋଇ

ପାନପୋଇ



## T S F E R I A N I R O U R I.

E T

## K A T O U N I R O U R I.

Tab. 44.



*Sjeria Nirouri* tertia *Nirouri* species est ; ac  
*Manirouri* persimilis ; quamobrem nova fi-  
gura adjuncta non est. Crescit abundè circa  
Cochin.

Quarta autem *Nirouri* species arbuscula  
humilis est, quæ Malabarensibus *Katou Ni-*  
*rouri*, Brachmanis *Panepojoe*, Lusitanis *Folhas de dentes*, Bel-  
gis wild *Maagdelyn* appellatur ; Estque secundæ speciei  
part. 2. Tab. 27. descriptæ, nomine *Niruri*, valdè similis.

*Flores* exigui, rubescentes, tenuibus, viridibusque pe-  
tiolis ad foliorum exortum, & extremis furculis prove-  
niunt, sex oblongo-rotundis ac expansis foliolis constan-  
tes. Quibus succedunt *Fructus* haud siccus ac Tab. præced.  
de *Ma Nirouri* exposuimus. Sunt ii *Bacca* plano-rotundæ,  
tricoccæ plurimum, rubro - cæruleæ primum, dein  
cæruleo-nigricantes, semina sex semilunata intus conti-  
nentes.

Provenit locis humidis ac arenosis circa Cochin; sem-  
per viret, floret, frugetque.

Cæterum ex arboris foliis in aqua communi coctis oris  
collutio conficitur, ad erosas gingivas sanandas, dentes-  
que vacillantes roborandos. Ex foliis cum fructibus,  
cortice, & radice coctis Balnaeum fit antearthriticum.  
Ex radicis cortice cum pipere longo, & zinzibere cocto  
potus paratur, qui ad ventriculum roborandum, pitui-  
tososque humores incidendos & attenuandos summè u-  
tilis perhibetur.



Cametti

கோதை

Vro

காட்டு

قَبَّةِ

## C A M M E T T I.

Tab. 45.



*Ammetti Malabarenibus, Ouro Brachmanis,  
Guard' olhos Lusitanis, Tygers melckboom Belgis,  
Arbor est vaftæ magnitudinis, quadraginta  
plusquam pedes alta, caudice crasso,  
multisque ramulis cinereis in orbem diffusis  
ornato; Lignum albicans, matrice rufe-  
scente, ac cortice obductum cinereo, qui vulneratus  
acrem lacteum succum fundit.*

*Radix fibrata, rufa, flavecente cortice cincta, qui in-  
citus itidem acrem lacteum succum stillat.*

*Folia oblongo-rotunda, acuminata, crassa, densa, gla-  
bra, superne atro-viridia, inferne subviridia, intus acri  
lacte turgentia; Nervis aliquot è media costa viridi-al-  
bicante in latera obliquè excurrentibus.*

*Flosculi suaveolentes, viridi-albantes, in spicas dispo-  
siti extremis furculis proveniunt; Sunt ii gemmulæ exi-  
guæ, laetio succo turgentes, medium occupantibus  
staminulis tribus surrectis, apicibus ornatis.*

*Flosculis pari modo succedunt Baccæ tricoccæ, virides,  
umbilico in vertice coronatae exiguo, tripartito, atro-  
viridi, acerrimo laetio succo turgentes, intulque con-  
tinentes semina terna, dura, albicantia, rotunda.*

*Nascitur in variis Regni Malabarici locis uliginosis,  
prælertim circa Cochin in Raypyn & Paloerty; plerum-  
que floret, frugetque.*

*Cæterum ex arboris foliis in aqua coctis Balnæum con-  
ficitur antearthriticum. Eodem decocto siulcera antiqua  
& verminosa laventur, vermes necantur, ac ulceræ po-*

Pars V.

Y y

ten-

tenter mundantur. Ex lācteo arboris succo & pulvere  
Carcapulæ pilulæ fiunt, quæ in hydrope miris laudibus  
extolluntur.

## Tab. 45.

Arbor hæc meritò *Tubymalus arboreus* dici potest, ejusque mentionem nullus unquam fecit Botanicus.





Pai-Pircea

ପାଇ ପିର୍ଚା

Pai-Pircea

ପାଇ ପିର୍ଚା

पाई पिर्चा ल. Couradi

କାନ୍ଧି ପାଇ ପିର୍ଚା

P A I · P A R O E A,

feu

C O U R A D I.

Tab. 46.

**P**ai-paroea seu Couradi Malabarenibus, Ben-darli Brachmanis, Garſilha Lusitanis, Nier-pluy-men Belgis, Arbuscula humilis est, seu potius Frutex sex circiter pedes altus, caudice medioſriter craſſo, cortice vefito ſpadiceo, ramulisque ejusdem coloris ac lanuginofis in orbem diſfufis ornato.

Radix fibrata, rubefcens, nigricante cortice cincta, acriſ, aromatica.

Folia oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu crenata, spinulisque exiguis hic inde obſita, craſſa, aspera, atro-viridia, ſupernè ſplendentia, infernè nequaquam, Ner-vis aliquot è mediâ costâ in latera excurrentibus; fapor amarus, aromaticus.

Flores inodori, plures ſimul juncti petiolo longo inſurculis proveniunt, quinque oblongo-teretibus, acuminatis, intus alblicantibus, extus viridibus ac ſubasperis, & exteriora verſus reflexis foliis conſtantibus; ſtaminulis aliquot alblicantibus, flavescentibus apicibus ornatis, medium occupantibus: inter quæ ſtilus prodiit viridis, ſorrectus, capitulo plano.

Floribus ſuccedunt Baccæ plano-rotundæ, virides pri-mum, dein flavescentes ac croceæ longisque alblicantibus pilis obſitæ: intus continentur officula quatuor dura, albificantia; Nucleos inſcludentia candidos amaros.

Pars V.

Z z

Pro-

92 HORTUS MALABARICUS.

Provenit variis Regni Malabarici locis, præsertim circa Porca, Cochin, & Calicolan; semper viret, quotannis mensæ Julio floret, Novembri autem maturos fert fructus.

Cæterum ex arboris foliis, radicibus, fructibusque in aqua coctis Apozema conficitur, quod in arthritide per quam utile perhibetur.

Tab. 46.

Prima perœæ species in parte prima descripta est nomine *Tinda-parna*.



KATA-

Katapa  
કડપાણિ  
Kari  
રવા  
خاط آپل



## K A T A P A.

Tab. 47.



Rbor quæ Malabarensibus *Katapa*, Brachmanis *Kari*, Lusitanis *Arvore santenella*, Belgis *waackbouw* nuncupatur, humilis est, tredecim circiter pedes alta, haud ita crassò caudice, multisque rotundis, viridibusque ramulis donato; Lignum albicans, densum, rufescente cortice cinctum, nec non molliore intus matrice refertum.

*Radix* albicans, furvo cortice tecta, amara, graveolens.

*Folia* subrotunda ferè, acuminata, in ambitu leviter crenata, mollia, levia, supernè atroviridia & splendentia, infernè subviridia; *Nervis* aliquot è media costa rotunda & albicante obliquè in latera excurrentibus: odor nulus, fapor amarus.

*Flosculi* ad foliorum alas bini ternive simul juncti proveniunt, inodori, amari, pentaphylli, stelliformes, virides, disco medio diversi à petalis coloris, flavescente viz. staminulis quinque viridibus, flavescentibus apicibus ornatis, ac inter petala expansis, umbilicum occupantibus; inter quæ stylus prodit viridis, brevis.

*Flosculis* pari modo succedunt *Bacca* rotundæ, tricoccæ, umbilico trifido in vertice coronatæ, calycique exiguo arctè inhærentes, subvirides, albicante cartilaginofoque cortice cinctæ, qui tenui pelliculâ insuper obdutus est; intus continentur semina tria, triquetra, albicantia primum, at per maturitatem nigra, amara, membraneis pelliculis ab invicem sejuncta, ita ut singula in singulis latitent loculamentis.

Crescit variis Regni Malabarici locis, præfertim in agris

Pars V.

A a a

oryzæ

## 94 HORTUS MALABARICUS.

oryzæ culturæ dicatis, quos immunes servare fertur ab insectis cuiuscunque generis, tenerioribus plantulis sumo perè noxiis; semper viret, quotannis floret, frugetque.

Ex arboris radice decoctio conficitur, quæ Maniacis medendis summè utilis perhibetur.



TS 70-

Tsjocati  
چیا چھوٹی



## T S F O C A T T I

Tab. 48.



Rbor hæc Malabarenibus *Tsjocatti*, Brachmanis *Valermani*, Lusitanis *Foula Paolista*, Belgis *Sotte bollen* appellatur, Estque humilis, duodecim circiter pedes alta, caudice tenui, multisque ramulis lignosis donato; Lignum albicans, rufescente cortice cinctum, matrice viridescente, molliore.

*Radix* albicans, amara, aromatica.

*Folia* oblongo-teretia, acuminata, in ambitu leviter crenata, crassa, densa, glabra, splendentia, supernè atro-viridia, infernè subviridia; costa media crassa, è quaque exigui nervuli ordinatim ad prominentes dentatasque oras exeunt: sapor amarus.

*Flores* flavescentes, inodori, umbellatim extremis surculis proveniunt, calicique rubro-flavescenti, in quinque lacinias oblongo-rotundas secto inhærent, quinque oblongo-teretibus ac stellæ in modum expansis foliolis constantes, luteis aliquot staminulis surrectis acuminatis que medium occupantibus; inter quæ capitulum prodit planum, albicans, quinquepartitum, è cuius vertice stilus exit tenuis, albicans, longus, ac supra staminula eminentis.

Floribus deciduis succedunt *Baccæ* tetracoccæ, aliquando pentacoccæ, subvirides primum, at per maturitatem rubentes ac nitentes, calicique atro-rubenti inhærent; sapor acido-amarus. Intus continentur semina quaterna plurimum, alblicantia, renalis figuræ, saporis amaro-dulcis.

Provenit variis Regni Malabarici locis, præsertim in Candenate; semper viret, floret, frugetque.

Cæterum ex arboris foliis cum sero lactis decoctione conficitur, quæ in Cardialgia valde commendatur. Ex iisdem


Pars V.


B b b

foliis

96 HORTUS MALABARICUS.

foliis cum floribus & fructibus in aqua communi coctis oris collutio fit ad erosas gingivas sanandas, dentesque vacillantes firmandos. Ex radice cum cumini semine in lacte cocta potus conficitur, qui potenter vomitum fedat. Eadem radix tanquam amuleum ventri appensa colicos dolores mitigare perhibetur.





Nir-Notsjil  
ନୀରନ୍ତ୍ସଜିଲ  
Cirila-Mari  
ଶିରାମାରି  
ଶିରାମାରି

## NIIR - NOTS JILL.

Tab. 49.



*Iir-Notjil Malabarensibus, Negunda & Cirta  
Mari Brachmanis, Nochil Lufitanis, Water  
Kuys-boom Belgis, Arbuscula humili se est, seu  
potius Frutex sex circiter pedes altus,  
caudice tenui, albicante, cortice cincto  
cinereo, intus viridi, furculisque rubro-  
purpureis ac nitentibus pluribus donato.*

*Radix lignosa, fibrata, albicans, flavescente cortice  
tecta, graveolens, amara.*

*Folia fine ordine ramulis inhærent, oblongo-rotunda,  
crassa, glabra, lènia; Nervis aliquot è media costa albi-  
cante in latera excurrentibus: sapòr acris, odor gravis.*

*Flores petiolis longis, tenuibus, rubro-purpureis, in  
ramulos & extremis furculis proveniunt, candidi, pen-  
tapetalides, perianthio excepti quinquepartito, viridi-  
purpureo; staminulis quinque tenuibus, longis, pur-  
purâ-splendentibus, croceis falcatis apicibus ornatis,  
medium occupantibus: inter quæ filius prodit tenuis,  
longus, purpurascentia.*

*Floribus succedunt Baccæ oblongo-rotundæ, tetracoc-  
cæ, virides primum, dein purpurascentes ac nitentes,  
calycique profundo arctè inhærent, carne intus succu-  
lentâ ac subamarâ refertæ, intra quam Semina continen-  
tur quaterna, oblonga, triquetra, dura, Nucleis albis,  
amaris.*

*Nascitur locis aquosis & in fluminum ripis circa Co-  
chin, Porca, & Paroe; semper viret, floret, frugetque.*

*Cæterum arboris folia siccata, in pulverem redacta, ac  
exhibita quotidiè cum saccharo & oryzæ infuso luem Ve-  
nereum sanare fertur. Ex eisdem foliis coctis & pistatis  
cum ovi vitello cataplasma paratur, quod bubonibus in-*

Pars V.

Ccc

gui-

98 HORTUS MALABARICUS.

guinum venereis impositum potenter iis prodeesse statuunt. Ex foliis & radicibus in aqua coctis Balnæum fit, quod phrenitidi, Maniæ , aliisque cephalicis affectibus per quam utile censetur. Ex radice in olco cocta linimentum conficitur antiarthriticum.

Tab. 49.

*Nir-Noſſ* species videtur *Negundo* seu *Cara-Noſſ* in parte 2<sup>a</sup> descriptæ.



TS f E.



Tijerou-Kanneli

ତିଜେରୁ କନ୍ନେଲି

କଣଳି

چَعْرُوْ فَخَانَتَبَرْ

*T S J E R O U K C A N N E L I.*

Tab. 50.

**R**buscula quæ Malabarenibus *Tsjerou Kanneli*, Brachmanis *Bedouſi*, Lusitanis *Fruita Caui do mato*, Belgis *wilde dwerg-appelen* nuncupatur, altera *Bellutta Kanneli* præced. Tab. 20. descriptæ species est, eique haud multum ab-similis; præterquam quod humilior sit, octo circiter pedes alta, caudice haud ita craffo, ramulisque & surculis tenerioribus in orbem diffusis donato.

*Radix* rubescens, amara, aromaticæ.

*Folia* oblongo-rotunda, acuminata, craffa, densa, glabra, splendentia, Nervis aliquot ex media costa albican-te in latera excurrentibus; odor & lapor aromaticus.

*Flosculi* in surculis multi simul juncti proveniunt, inodori, albicantes, hexaphylli, numerosis fibris candidis, sub-flavescentibus apicibus ornatis, medium occupantibus; inter quos stylus prodit albicans, surrectus.

*Flosculis* succedunt *Bacca tricoccæ*, virides primum, dein albicantes, tenui pelliculâ cinctæ, intusque carne molli, acido-amarâ ac aromaticâ refertæ; intra quam tria continentur Semina dura, rotunda.

Crescit variis Regni Malabaraci locis, præsertim in Bay-pyn, Aroe, & Bardette; semper viret, floret, frugetque.

Amel-Podi  
அமேல்போடி

اميل بودي



## AMELPODI.

Tab. 51.



*Melpodi* Malabarensibus, *Amelpo* Brachmanis, *Raiz da Cobra* Lusitanis, *Slange-wortel* Belgis, Arbor est justæ magnitudinis, caudice albicante, cinereo cortice obducto, ramulisque viridibus & geniculatis pluribus donato.

*Radix* fibrata, flavescens, inodora, amara.

*Folia* geminata ordine decussato petiolis rufis circa ramos proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, crassa, densa, mollia, glabra, supernè splendentia, infernè nequaquam, Nervulis aliquot e media costa in latera excurrentibus, ad quorum exortum noduli exigui, virides, in adversa folii parte conspicuntur; odor acidus, sapor sylvestris.

*Flores* exigui, candidi, extremis surculis numerosi proveniunt, porrectisque columellis umbellæ specie panduntur, quatuor acuminatis foliolis constantes, inodori, sapore subamaro.

Crescit locis petrosis ac montanis circa Kandenate: semper viret, Junio, Julio, Augusto mensibus floret; Fructus vero nullos fert affirmantibus indigenis.

Radix vero hujus arboris secum gestata Antidotum habetur serpentibus venenatis, atque ideo magni vulgo aestimatur.

Tab. 51.

Hæc arbor cum cæteris *Melpodi* speciebus nullam planè habet similitudinem, uti ad præced. Tab. 33. indicavimus.

Pua-Tsjetti

ପୁଅତ୍ଶେତ୍ତି

پُعَجْ جَفْتَجِين



## POEATS ET TITI.

Tab. 52.



*Oeatsjetti* Malabarenibus, *Gara* Brachmanis,  
*Fruitta-Baretto* Lusitanis, *Paape-kappen* Belgis,  
Arbuscula humilis est, decem circiter pe-  
des alta, caudice haud ita crasso, albican-  
te, cortice obducto rubicundo, ramulif-  
que viridibus, fungosâ intus medullâ re-  
fertis, pluribus donato.

*Radix* fibrata, albicans, rufo cortice tecta, amara, odo-  
ris sylvestris.

*Folia* fine ordine circa ramulos proveniunt, oblongo-  
teretia, in ambitu leviter crenata, glabra, densa, fragilia,  
splendentia, inodora, amara, Nervis aliquot exiguis, &  
penè invisibilibus e media costa in latera excurrentibus.

*Flores* petiolis oblongis circa plumosas virgulas prove-  
niunt, inodori, quinque luteis, acuminatis, & stellæ in  
modum expansis foliolis constantes, quibus totidem al-  
ternatim posita calyculi foliola viridia subjiciuntur, no-  
vem apicibus luteis umbilicum curvosum viridianem cum  
stylo candido quinquangulo occupantibus.

Singulis flosculis singuli succedunt *Fructus*, seu singulæ  
filique quinquangulæ rubentes totidem distinctis loculis  
*semina* parva solida continent, cuticulâ rufâ intecta, medul-  
la alba, figura ex rotundo oblonga, sapore nauseabundo.

Provenit locis montanis & petrofis circa Kandenate;  
semper viret, quotannis bis floret, frugetque, Martio viz.  
& Septembri mensibus, at diu superstes non est.

Cæterum folia contusa, in pulverem redacta, & ulceri-  
bus inspersa luxuriantem ac fungosam carnem tollit. Ea-

Pars V.

F f f

dem

dem assumpta sudores movendo febris intermittentis paroxysimum minuit. Ex cortice & radice pulverisatis, ac cum oleo mixtis unguentum conficitur ad scabiem, similesque cutaneos affectus.

## Tab. 52.

Arbor haec ex floribus & Baccis, *Euonymi* genus videtur: Folia quoque magnam habent similitudinem cum foliis *Euonymi primæ Clusi*.



KATOU-


Katoo - Karua

କାତୁ

Tiki

ଟିକି

خانق



## K A T O U - K A R U A.

Tab. 53.



Uæ in Regno Malabarico crescunt *Canella* species, quarum altera delineatur & describitur in parte prima Tab. 57. nomine *Karua*; quæ licet Zeilonensi inferior sit, & ab ea in multis differat, pro sylvestritamen haberi non potest. Altera autem species, quæ Malabarensibus *Katou-Karua*, Brachmanis *Davo Bahena* & *Tiqui*, Lusitanis *Canella do Mato*, Belgis *wilde Caneel* appellatur, verè sylvestris est: Nihilominus tamen priori haud absimilis cum odore, tum sapore, nisi quod arbor hæc major sit ac altior. *Folia* itidem prægrandia, oblongo-rotunda, longitudine duas spithamas, latitudine duos palmos circiter æquantia; à pediculo ad apicem folii tres Nervi crassiores transcurrent, è quibus transversè multæ venulæ excurrunt.

*Flosculi* in umbellas expansi extremis ramulis proveniunt; inodori, viridi-albicantes, pentapetalides, quinque viridibus brevibusque staminulis, viridi-flavis apiculis; ornatis, medium occupantibus.

*Flosculis* succedunt *Bacca* exiguae, ribium nostratum instar.

Provenit locis montanis in Teckencour, Berkencour, aliisque vicinis Provinciis; semper viret, Julio & Augusto mensibus floret, Decembri autem & Januario maturos fert fructus, diuque superstes manet.

Cæterum ex arboris foliis in aqua coctis Balneum fit contra quoscunque articulorum dolores. Ex radice cortice cum cardamomo & nucemoschata in aqua cocta po-

Pars V.

G g g

tus

106 HORTUS MALABARICUS.  
tus conficitur, qui ad ventris tormina sedanda valdè laudatur.

Tab. 53.

Arbor hæc *prima canelle sylvestris* species est. Altera minus odorus, quam *cinnamomum zeilanicum*, at species describitur in parte prima *Karue* nomine, ubi que apud aromatarios ubique innoteſcit ac venditur C. L. doctissima D. Seyen p. m. commentaria inspi- nomine *Canelle dō matō*. Cortex autem *Karue* in par- cire potest. Videntur autem duæ hæc species differre potissimum foli natalis ratione, uti hoc in cina- parte primâ descriptâ *Pharmacopœia* nomine *Caffia li-*  
momozeilanico, & aliis in plantis non raro obser- *gne*: Foliastub nomine etiam, nonne sint *Malaba-*  
vatur. Cortex hujus *Karue* - *Karue* crassior est, & *trum* seu *Tamalapatrum* *Dioscoridis* & *Plinii*? quæ ha-  
etenus non innutere.



AMVET-



*Amreti*

ଅମ୍ରେତି

ମାଲ

ଦାକକ

Lat.

Mal.

Brah.

مَرْبُطَةٌ

Arab.

*A M V E T T I,*

*seu*

*V E T T I - T A L I.*

Tab. 54.



*Mvetti seu Vetti-tali Malabarenibus, Ana da-laqui Brachmanis, Querilhas macho Lusitanis, Harzhaer manneken Belgis, Kari-vetti & Pevetti*  
Tab. 54. & 55. partis quartæ descript. species est, atque arbor humilior, tredecim circiter pedes alta, caudice mediocriter crasso, cortice cincto cinereo, intus rubescente; ramulisque viridibus pluribus donato.

*Radix fibrata, rufescens, odoris & saporis sylvestris ac amari.*

*Folia oblongo - rotunda, acuminata, crassa, denfa, glabra, atro-viridia supernè & splendentia, infernè sub-viridia, Nervis aliquot è media costa in latera excurrentibus; sapor sylvestris, amarus.*

*Flosculi inodori, viridi-flavescentes, ad foliorum alas circa surculos spicatim proveniunt: constant ii unico foliolo, sed in quatuor profundas lacinias diviso, sic ut plura videantur, staminulis albicantibus, flavescentibus apicibus ornatis, medium occupantibus.*

*Flosculis emarcescentibus semina perquam exigua, rufa, inodora, insipida, vasculis fccis per maturitatem inclusa, succedunt.*

*Nascitur locis maritimis circa Cochin; Zeylon, & Calicolan; semper viret, quotannis floret, & Semina perficit.*

*Cæterum ex arboris radice in aqua cocta Apozema conficitur, quodassumptum, alvum laxat, nec non he-*

Pars V.

H h h

patis,

patis, lienisque obstrunctiones potenter aperit. Foliis Tengam arborem fricant Indi, ubi rami sunt abscissi, ut hoc modo potum *Zuri* dictum elicere queant; de quo potus genere in parte primâ latius actum est.

## Tab. 54.

Arbor haec cum aliis *Annonati* speciebus vix ullam habet similitudinem. Illæ quippe arbores bacciferæ sunt; haec autem lanigera.



MALA-



Mala Eleni  
ءے دیں

ملا علی

## MALA - E L E N G I.

Tab. 55.



*Ala-Eleni* Malabarenibus, *Getri-madi* Brachmanis, *Alona* Lusitanis, *Leverhout* Belgis, Arbor est justæ magnitudinis, viginti circiter pedes alta, caudice crasso, flavescente, cinereo cortice cincto, ramulisque viridibus pluribus donato.

*Radix* albo-flavesens, amara, inodora.

*Folia* oblongo - rotunda, acuminata, crassa, glabra, laetitia, superne atro-viridia, inferne viridia, inodora; Nervis aliquot è media costa albicante, & in adversa parte extuberante, in latera excurrentibus.

*Flores* inodori, albantes, oblongis, tenuibusque petiolis circa ramulos proveniunt, è quinque floribus fistularibus compositi; singulis florem totalem componentibus flosculis suis privatis calicibus donatis, staminibus binis viridibus medium occupantibus; inter quae capitulum prodit viridi-albicans, è cuius summo stylas emicat crassior, brevis.

*Flosculis* decidentibus succedunt *Fructus* oblongo-rotundi, viridi - flavescentes, cum cuipide nigro in vertice, crasso ac amaricante cortice cincti; intra quam Nucleus continetur albicans, subamarus.

Crescit variis Regni Malabarici locis, praesertim in Baypyn, Warapoli, & Angieaimaal; semper viret, quotannis floret, frugetque.

Ex arboris foliis cum pipere & calamo aromatico infusami oleo excoctis linimentum paratur, quod in vertigine, Epilepsia, similibusque cephalicis affectibus valde laudatur capiti inunctum. Ex cortice cum thure & auri-

Pars V.

I i i

pigmen-

110 HORTUS MALABARICUS.

pigmento unguentum conficitur, quod hepatis regioni inunctum affectibus ejus potenter mederi fertur. Fruetum Nuclei cum pipere nodulo inclusi è collo gestantur pro amuleto ad arcendam epilepsiam.


Tab. 55.

*Mala-Elengi* genus est *Elengi* in parte prima Tab. 20. descriptæ; quapropter B. L. commentaria ibidem videre potest.



Tsjerou-Poëam  
تصویر

چهارم باغ



## TSJEROU POEAM.

Tab. 56.



*Sjeron Poëam Malabarenibus, Patarola Brachmanis, Nilha Lusitanis, Quelbessen Belgis, Arbuscula humilis est, caudice tenui, albicante, cortice cincto nigricante, intus viridi, multisque geniculatis ramulis donato.*

*Radix flavescentia, rufo cortice testa, odoris ac saporis sylvestris, & ingratia.*

*Folia oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu leviter crenata, lenia, supernè atro-viridia & splendentia, infernè subviridia ac lanuginosa; Nervis aliquot è media costa albicante, & in adversa parte extuberante in latera excurrentibus: odor & sapor sylvestris, ac ingratus.*

*Flores inodori, viridi-albicantes, racematum ad foliorum alas in surculis proveniunt, calycique viridi tripartito inhærent, tripetali; è tribus viz. oblongo-rotundis, acuminatis, expansisque foliolis constantes, medium occupante globulo viridi; è quo exsurgit stylus tenuis, oblongus, viridi-flavescentia, capitulo rotundo.*

*Floribus pari modo succedunt Baccæ oblongo-rotundæ, tricoccæ, virides, calycibus exceptæ, tria intus continent Semina viridi-albicantia, amara, membranaceis pelliculis sejuncta, ita ut singula in singulis latitent loculamentis.*

*Provenit variis Regni Malabarici locis, præsertim circa Repolyn, semper viret, floret, frugetque.*

*Cæterum ex arboris floribus, fructibus, & cortice in oleo coctis linimentum paratur, quod capiti inunctum cephalalgiam sanare fertur. Folia recentia contusa, & parti erysipelate laboranti imposita id tollere dicunt.*



Bem-Moenja

ନାରାଯୋଳୋ

ନାରାଯୋଳ

ନାରାଯୋଳ

بِرْم مُهْنَجْا

## B E N - M O E N J A.

Tab. 57.



Rbor quæ Malabarenibus *Ben - Moenja*,  
*Brachmanis Naravolo*, *Lusitanis Pao da verge*,  
*Belgis Draack wortel* nuncupatur , procera  
est , triginta circiter pedes alta , caudice  
mediocriter crasso , furvo cortice cincto ,  
ramulisque rufis lignosis ac geniculatis plu-  
ribus donato.

*Radix* albicans , amara , aromatica.

*Folia* geminata in surculis proveniunt , oblongo-rotun-  
da , acuminata , tenuia , lenia , glabra , supernè viridia ,  
infernè subviridia , nervis aliquot è media costa in latera  
excurrentibus ; odor gratus , hortensis .

*Flores* nec *Fructus* fert , quod innoteſcit ſaltem .

Provenit variis Regni Malabarici locis , præfertim cir-  
ca Aroë & Poedegoyl , ſemper viret .

Cæterum ex arboris radice cum aqua decoctio fit alexi-  
pharmacæ , quæ in febribus malignis valdè extollitur . Ex  
cortice cum calamo aromatico & sale in oryzæ infuso co-  
cto potuſ conficitur , qui vomitum sanguineum è morsu  
serpentis excitatum protinus sanare fertur .





*Piti*  
ପିତି  
پتی

## B I T I.

Tab. 58.

**B**iti Malabarensibus, *Bitolo* Brachmanis, *Pao do Pilao* Lusitanis, *yserbont* Belgis, Arbor est procera, caudice crasso, multisque cinereis ramulis in orbem diffusis donato; Lignum atro-rubescens ac purpureo-striatum, densum, ponderosum, subacidi odoris, saporisque, cortice munitum cinereo. *Radix* itidem atro-purpurea.

*Folia* oblongo-rotunda, densa, glabra, supernè coloris subcinerei, infernè cinereo-viridia, nervis aliquot è mediâ costâ in latera excurrentibus; odor gratus.

*Flores* papilionacei, flavescentes, racemis oblongis numerosi proveniunt: Quibus *Siliqua* succedunt. Plura de iis addere non licet, quia icon desideratur.

Crescit locis montanis in Calicolan, Atsjencoil, & alibi; semper viret, quotannis floret, & fructus fert, diuque superstes manet.

Porro arboris lignum, ob singularem ejus duritiem, operæ fabrili accommodissimum censetur, ex eoque varia fiunt domestica instrumenta.

Tab. 58.

De hisce lignis inspiciatur *Casper Bauhinus pinac.* lib. xi. Sect. vi.



Pars V.

M m m

ASFA



Asjogam Lat.

اسوجام Mal.

Asjogam

অসজম Brah.

اجْجَاعَامْ Arab

## ASJOGAM.

Tab. 59.



Rbor hæc Malabarenibus *Asjogam*, Brachmanis *Asjogam & Caffibori*, Lusitanis *Fuladodiano*, Belgis *Tover bloemen* nuncupatur; Estque mediæ magnitudinis, quindecim circiter pedes alta, caudice mediocriter crasso, albicante, fusco - nigricante cortice cincto, ramulisque paucis in orbem diffusis donato.

*Radix* albicans, nigricante cortice tecta, inodora, profundè terræ inhærens, fibrisque suis latè per eam diffusa.

*Folia* ex adverso bina circa surculos proveniunt, oblongo-teretia, crassa, spithamam circiter longa, Nervis aliquot è mediâ costâ viridi-albicante in latera excurrentibus; odor & sapor sylvestris, ac ingratus.

*Flores* odori, flavescentes, in fascias collecti numerosi circa ramulos proveniunt; conflantur ii è tubo oblongo in quatuor segmenta subrotunda expanso, octo tenuibus rubro-splendentibus ac longis staminibus, atro-purpureis apicibus ornatis, medium occupantibus; inter quæ stilus prodit viridi-albicans, crassus, surrectus, acumine tereti.

Quales fert *Fructus* nondum compertum est.

Provenit variis Regni Malabarici locis circa Ethniconrum templa, qui istiusmodi arbores studiosè ibi colere solent, earundemque foliis & floribus uti in ceremoniis suis ad templa ornanda; semper viret, quotannis floret, Decembri viz. & Januario mensibus, diuque superstes manet.

Cæterum ex arboris foliis contusis succus exprimitur, qui cum semenis cumini pulvere exhibitus colicam passionem sanare fertur. Foliorum pulvis cum santalo citrino, ac saccharo assumptus sanguinem reficere ac purgare dicunt.

Pars V.

N n n

BEES-

*Melocanna* Rhee  
Pl. 5. Tab. 6.

Besha  
oal  
Zero  
Tal  
E. S.



B E E S H A.

## Tab. 60.



*Eèsha* Malabarenibus, *Zivo* Brachmanis,  
*Bambu d'escriver* Lusitanis, *Pylriet* Belgis, Ar-  
buscula humilis est, seu potius Frutex ar-  
borescens, sedecim circiter pedes altus,  
ramulisque teretibus, glabris, nodosis, me-  
dullâ farctis, donatus. Altera species est

*Bambu* in parte prima descriptæ, nomine *Ilii*.

*Folia* arundinacea, *Ilii* foliis perquam similia, at glabra.

Ad ramulorum nodos interim *spicæ* proveniunt confor-  
mes, acuminatæ, quibus insident *Flosculi* albantes, sta-  
minei, medium occupante globulo oblongo, è quo sti-  
lus erit viridiusculus.

*Flosculis* succedunt *Fruictus* oblongo - plano - rotundi,  
acuminati, carne intus densâ, albicante, insipidâ referti.

Provenit variis Regni Malabarici locis sylvestribus,  
præsertim in Betsjour, Corremaloer, & Teckenkour.

Cæterum ex hoc frutice indigenæ sagittas conficiunt,  
& corbes. Ex ramulis arundinaceis calamiflunt scriptorii.  
*Folia* si in aqua coquantur, eaque decoctio exhibeatur  
menstrua obstructa provocat: eodem decocto si os col-  
luatur erosas gingivas sanat, & odontalgiam tollit.

## N O L A - I L Y.

**E**st insuper tertia *Bambu* seu *Ily* species, quæ Mala-  
barensibus *Nola-ily*, Brach-manis, *Vasinola*, Lusi-  
tanis *Bambu Gorri*, Belgis *Pyp-riet* nuncupatur, Primæ  
& secundæ speciei persimilis, præterquam quod inter-  
nodia tenuiora sint, & longiora.

Crescit in Calicolan, & Tekencour.

Pars V.

O o o

Hæ

Hæ autem arundines pro mercatura transmittuntur in Persiam, Arabiam, aliasque vicinas regiones, ubi fistulae ex iis parantur quibus tabacum fumisfactione sumitur.

## Tab. 60.

De arundine scriptoria consule *Lobelium*, & *Casp. Bambinum* pinac. lib. 1. sect. 3.



N O A D A

E  
Q  
A

# I N D E X.

<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>K.</b>	<b>M.</b>	<b>Pag. 15</b>	<b>N.</b>	<b>P.</b>	<b>S.</b>	<b>T.</b>	<b>V.</b>	<b>W.</b>	<b>63</b>	
<b>A</b> Cara-patsjotti						Molago-Maram							<b>49</b>
Amelpodi					101	Mouli-ila							<b>67</b>
Amvetti, seu vetti-tali					107								<b>53</b>
Asjogam					117								<b>97</b>
													<b>119</b>
<b>B</b> Afaal					23								
Beénel					7								
Beéscha					119								
Bellutta-Kanneli					39								
Ben-Kara					69								
Ben-Moenga					113								
Biti					115								
Bruxaneli					83								
<b>C</b> Ammetti					89								
Corinti Panel					27								
Courou-Moelli					77								
<b>K</b> Aden-Kara					71								
Kaka-Njara					55								
Kaka-toddali					81								
Kal-Vetadagou					61								
Kaltsjerou-panel					33								
Kare-Kandel					25								
Karetta Amelpodi					65								
Kasjavo Maram					57								
Katapa					93								
Katou Bellutta Amelpodi					66								
Katou-Karua					105								
Katou-Mail-Elou					3								
Katou-patsjotti					13								
Katsjau-Panel					35								
<b>M</b> Ail-Elou					1								
Mail-ombi.					51								
Mala-Engi					109								
Mala poenna					17								

## E R R A T A.

Pag. 4 lin. 7. pro Katou-Mail lege Katou-Mail-Elou. Pag. 15 lin. 4. Acara-Patsjottili, lege Acara-Patsjotti. Pag. 74. lin. ultima Rkamni lege Rhamni. Pag. 92. lin. ultima Peróex- lege Paroex. idem Tindæ-parusæ, lege Tindæ-parusæ.