

中華民國二十四年八月出版
中華民國二十五年三月再版

陸淵雷主 謝誦穆編

第二十號

中醫新生命

陸淵雷



本	期	目	錄
消暑厄言	徐瀛芳	冷廬醫話補	陸定圃
千慮一得	沈仲圭	漢藥之知識	久保田晴光
偶然隨筆	楊子鈞	中醫偽書考	衛原
習醫日記	孔伯毅	幾種發疹病的鑑別診斷	王惠蒼
良方萃	譙養方	溫病論衡	謝誦穆
胃病醫案選	章次公	醫案	陸淵雷
		課卷	孔伯毅
		答問一	鄔亮
		答問二	前人
		答問三	張公讓
		答問四	王文達
		答問五	馬本良
		孫培文君來書	
		答孫君培文	陸淵雷
		答楊篤因	陸淵雷
		流行病須知	陸淵雷

減費函授中醫學

本醫室開辦遙從。函授科學化之中醫學。業已二年。學者皆深表滿意。今續招新學員。凡國文通順。有志學醫者。不限年齡性別。皆可入學。尤宜於後開各界人士。(一)謀家庭衛生。欲得醫藥知識者。(二)感中醫學說太玄奧。欲得科學化合理化之醫學學說者。(三)西醫欲兼學中醫者。(四)舊中醫欲補充新學說。及臨診上之知識技能者。國府新頒中醫條例。中醫須有傳染病及他種與西醫相同之知識。此種知識。遙從講義中。最爲詳備。

今應外來要求。適應衰落之社會經濟。將學費減輕。計三十箇月習完。只費銀七十一元五角。可謂學醫之最低代價。交費法詳章程中。函索附郵五分。空函不答。欠資信不收。

上海帖嶺路人安里 淵雷醫室啓

陸著醫書

金匱要略今釋

本書比傷寒論爲難讀。故古今注解極少。近出參以新理者。尤渺不可得。遑論精粗。淵雷此著。後於傷寒今釋三年。自謂發明新義極多。比傷寒今釋更善。連史紙精裝八厚册。定價十二元。實售七折。郵費四角。國外酌加。

傷寒論今釋

用科學解釋最有價值之舊醫書。說解詳明。徵引極博。可以作研讀古書之鎖鑰。亦可以實際應用。與金匱今釋同爲中醫學必讀之書。連史紙精裝八厚册。定價十元。實售七折。郵費三角。國外酌加。

陸氏論醫集

淵雷歷年論醫文字。文言白話長篇短篇都有。議論精警。趣味雋永。連史紙精裝四大册。定價五元。實售六折。郵費二角。國外酌加。

發行處 上海帖嶺路人安里陸淵雷醫室內

代售處 上海三馬路千頃堂書局
上海四馬路二八三號國醫印書館

中醫新生命定單

茲定閱
續定

中醫新生命 期自第 期起至第 期止匯上大

洋 元 角 分即希查收入冊並請照後開地址將雜誌

按期寄下為荷此致

陸淵雷醫室台照

定閱者姓名

詳細地址

如皋中醫月刊

全年連郵三角

如皋育德所中醫公會出版

湖北醫學月刊

全年連郵二元

湖北新市場上側永福里一號

敬送腎病與肺癆

余患吐血肺癆及腎虧滑精念餘年百醫無效久病知醫治愈痼疾特將經驗編成指南兩册分送同病聊盡天職函索附郵五分寄杭州糧道山慈航居士即奉

江都國醫報

主編 樊天徒

發行人 周勵庭 林芝庭

學說新穎說理透切富有研究性及創作性為現代國醫界最新之刊物治醫者尤宜人手一編

每月一册 定價一角二分

全年十二册 定價一元二角

國內郵資在內國外郵資另加一元

總發行所揚州古旗亭三十六號

神州國醫學報

上海神州國醫學會出版

每月一期現已出版至第三卷第十二期
每期大洋一角 全年十二期大洋壹元
國內寄費不加 國外寄費另加壹元二角
本報由上海神州國醫學會創辦已有三年之久
所聘特約撰述多為海內外知名之士內容豐富
材料新穎持論平正不偏不倚發揮固有之真理
融會西來之新說原原本本彈見博聞出版以來
早為海內外人士所共賞不脛而走風行一時且
按月出版未嘗愆期尤博得社會之信用凡研究
國醫學術者不可不讀
以前各期除第一卷第一至第五期現已無存外
其餘各期尙可配補然亦所存無多惠購諸君尙
祈從速
上海廈門路尊德里五十四號神州國醫學會啓

小言論

卷頭語

周作人說。「研究本國的古文學。不是國民的義務。乃是國民的權利。我的一個朋友。近來從西京寫信來說道。歎息前人給我們留下了無數的綾羅綢緞。祇沒有裁剪成衣。此時正應該利用他。下一番裁縫工夫。蔑視經驗。是我們的愚陋。抹殺前人。是我們的罪過。」我以為研究中國的古醫學。也是國民的權利。而非國民的義務。

本刊以公正的態度。出現於這混亂的醫壇之上。我們沒有什麼企圖。只有一顆為國醫而努力的赤心。一年的光陰。已匆匆的過去。對於中醫界有多大的影響。我們自己不敢下肯定的答案。只有再繼續的努力。希望能夠達到我們預期的目標。在這第一年之末。我們先寫上這寥寥幾句話。作一個簡單的紀念。

姜白鷗君的脈學檢討。本期不及編入。准於下期續登。中央國醫館最近頒發第二次統一病名草案。我們覺得這事情很重要。下期起。擬發表一篇中醫病名之研究。

前一期說預備刊印一點古書。但以舊書充篇幅。與本刊的素志。不大符合。所以改排淵雷夫子的流行病須知。從前醫

報出版的時候。流行病須知逐期登載。備受讀者的歡迎。醫報停刊已久。第一期尤不易購得。現在將流行病須知從頭刊起。以慰一般讀者的渴望。（編者）

研究

消暑卮言

徐瀛芳

釋名 說文。暑熱也。從日。者聲。者字。先秦於前古音。讀如養。暑於六書爲諧聲。又養渚字皆從者。俱讀出×音。古今聲韻變遷。如下字。古音亦讀如×。詩經老子中韻語。多可考見。大抵六朝以後。乃讀如今音矣。

定義 書洪範疏。暑是熱之極。釋名。暑。養也。熱如水養物也。暑蓋含溼熱蒸之意。故又稱溽暑。暑之熱力。全由於日光。北溫帶之地。夏至以後。日在極北。距離近而正照時長。故熱度極高。江海之水。及土中潮溼。被高熱蒸發。空氣中溼度濃厚。五行家亦以溼土支配長夏。是故夏至後。繼以小暑大暑二中氣。至立秋後半月。盛暑方止。是爲處暑。說文。處。止也。詩疏亦同。於斯時也。地球軌道已移。日晷漸短。熱力乃殺。可見暑爲太陽之熱。與他種熱力不同。古人製字從日之義。蓋如此。昔醫以夏至爲病暑。頗有理由。今爲畫定其起迄。應以小暑至處暑。爲暑令正候。而前自夏至。後至白露。均鄰接暑。

期。固不能全無暑氣也。

病理 單純之暑證。蓋屬物理病。與化學性細菌性無關。即風寒飲食。均非正因。其證狀不過發熱汗出。口渴面垢。心煩溺短而已。然混合證候極多。單純暑證絕少。良由斯時微生物發育最繁。食品發酵變腐極速。酷熱外燠。伏陰在內。氣血疲勞。消化遲鈍。人復喜食生冷物以解煩苛。且日夜汗流。毛竅開張。而露臥取快。夜間冷氣流沈蕩空際。衛氣夜行於陰。不足以溫分肉。充腠理。故偶一覺寒。即已感冒。吐瀉霍亂。惡寒頭痛。種種內外證。且雜單純之暑病以俱至。即秋後瘧痢諸端。亦多先蘊暑氣。後遇誘因而發。後人遂創伏暑之名。不佞專作門業醫已六七年。據平時統計。惟暑令。則壯年男子患病者始多。其餘三時。則老弱婦孺。病居十之八九。可見暑期民病。混合多因。未可概泥一暑字。俗書有六般暑證之稱。乃不經之甚者也。

救護 單純暑證。白虎益元。西瓜雪梨。已無餘蘊。虛煩倦怠。厥有生脈。至兼證。以感寒夾食爲多。原因已如上述。疏表和中。在所當務。表劑自以香薷飲爲主。香薷發汗之功頗著。夏月服三錢內外。即起作用。感受風寒無汗者。可加荊防。表解即止。自汗惡風。舌不甚絳者。宜桂枝湯。桂枝雖負謗於天下。勿聽悠悠之口。若安和腸胃。近寒者。六和湯。近熱者。半夏瀉心湯。夾食參保和丸。甚者溫下寒下。隨證可施。普通胃腸炎證。已可了事。果爲霍亂。自有專方在。至於大順散理中附子等湯。爲內傷生冷或陰寒虛脫者設。俗書竟立陰暑之名。血枯筋燥。受暑感寒。手足瘳蕪。又有暑風之號。是皆不可爲訓。若中暑猝倒。金匱雖有中暈之名。而敝證不指昏厥。西醫謂爲日射病。因頭部驟熱。爲腦充血故。或由感受穢惡之氣。而

致鬱冒。宜用適量之紫雲丹。蟾酥痧氣丸。安宮牛黃丸。汗出過多。神倦煩燥。大熱不退者。白虎加人參湯。血熱再加生地黃。自汗脈虛。清陽不振。復兼溼熱者。清暑益氣湯去升麻葛根。惟長夏患病。若非有受暑微象。即不必因時令而皆冠一暑字。亦猶隆冬患病之不必皆冠一寒字耳。

析疑 暑令之病。如果受暑。雖見他證。必兼面垢口渴。小便短黃。惟大汗大瀉以後。專就口渴及小便短黃。未必即為熱證。又暑病多汗。半係生理功能。但未至氣促神昏。亦不虞虛脫。至病人體溫。酷暑時。常高過四十度。苟非持續太久。亦不必張皇。蓋平人體溫約三十七度。已合華氏九十八度六分。南方盛暑。房屋溫度。往往達華氏九十五度以上。體溫為空氣中高熱所束。不能充分放散。故必假神經之節溫機能。刺激汗腺。流出汗液。內熱始藉放出。若稍兼寒邪客於腠理。汗液不能隨時放散。體溫輒昇至四十度。實不比他時傷寒等證之可危。不佞為實踐之致用醫。非高談之考古醫也。

調攝 今人動言轉地避暑。此為特種生活。非普通所能。但須勿觸烈日。勿居蔭溼。勿露宿貪涼。勿食生冷肥膩。食量宜減於平時。頓數可增一次。入浴當於日未暮時。用冷水取毛巾乾擦。亦間用溫水浴。蚊蠅蚤蟲。勤於驅除。業務不必完全停止。元氣既充。抵抗力自強。可無致病之慮。總之。嚴寒時。空氣宜溫暖。腹內究不宜燥烈。酷暑時。空氣宜清涼。腹內究不宜陰冷。是為卻病要旨。若夫華堂酒肉。徹夜笙歌。或如王次回詩所謂。『猶記鬢邊花落。半身涼月倚闌干。』則非吾所敢知矣。

冷廬醫話補

陸定圃原著

吳楚輯

桐鄉陸以潛。字定圃。幼事舉業。弱冠以是授徒。三十五歲通籍。宦游武昌。未逾年。改官歸。復理舊業。三十八歲官杭州教諭。所著有再續名醫類案。冷廬醫話。冷廬雜識等。昔魯照於趙恕軒。串雅之外。掇拾鈴醫遺術。爲串雅補。余取冷廬雜識中論醫語。輯爲一編。以足補冷廬醫話之闕也。故申魯照之例。而名之曰冷廬醫話補。定圃議論。間不免膠戾。鄙人佞古成癖。多不肯割愛。刪汰不嚴。瑕瑜雜陳。幸讀者取其意而略其辭。擷其醇而棄其疵。乙亥秋。吳楚識。

鴉胆子

鴉胆子治休息痢。歙程杏軒文圃醫案。甚稱其功效。用三十粒。去殼取仁。外包龍眼肉。熬丸。每晨米湯送下一二服。或三四服即愈。此藥味大苦而寒。力能至大腸曲折之處。搜逐溼熱。本草不載。見於幼幼集成。稱爲至聖丹。卽苦參子也。藥肆多有之。吾里名醫張雲寰先生李瀛。亦嘗以方傳人。吾母周太孺人。喜施方藥。以治休息痢。無不應驗。兼治腸風便血。凡熱痢色赤久不愈者。亦可治。惟虛寒下痢忌之。

鬚髮早白

氣血衰則鬚髮易白。每於此徵年祚焉。余觀晉書王彪之傳云。年二十。鬚髮皓白。時人謂之王白鬚。而官至光祿大夫。儀同三司。卒年七十三。此殆異稟。不可以常情測矣。又宋杜祁公年過四十。鬚髮盡白。卒年八十。

何書田

青浦何書田茂才其偉。居北彝山下。工詩。家世能醫。書田益精其業。名滿大江南北。侯官林文忠公則徐。撫蘇時得軟脚

病。何治之獲痊。贈以聯云。菊井活人真壽客。蕺山編集老詩豪。由是投分甚密。而何介節自持。未嘗干以私。人皆重之。

蠮螋

蠮螋音嬰搜。蟲名。玉篇曰。蠮螋。博雅曰。蠮螋。昌黎詩。蛇垣亂蠮螋。卽此。吾鄉俗呼爲蝮蝮。二鬚多足。狀如小蜈蚣。而體較短闊。匿居隱處。溺射人影。令人生瘡。如熱癩而大。身作寒熱。千金方云。晝地作蠮螋形。以刀細取腹中土。以唾和塗之。再塗之卽愈。近又傳一方云。入夜以燈照生瘡處之影於壁。以百滾湯澆之卽愈。此皆以影治影之法。氣類相感。抑何奇耶。
(案此條似不經。)

張夢廬

同邑張夢廬學博千里。醫名隆赫。道光間應閩浙總督無錫孫文靖公之聘。至閩。時公患水脹已劇。猶篤信草澤醫。服攻水之藥。自謂可痊。張乃詳論病情。反覆數千言。勸其止藥。私謂其僚屬曰。元氣已竭。難延至旬日矣。越七日果卒。其論大略云。專科以草藥爲丸爲醴。峻劑逐水。或從兩足滂溢。或從大腸直瀉。所用之藥。雖祕不肯洩。然投劑少而見效速。其猛利可知。夫用藥猶用兵。攻守之法。參伍錯綜。必主於有利而無弊。從未有病經兩年。發已數次。不辨病之淺深。體之虛實。祇以峻下一法。爲可屢投而屢效者。蓋此症之起。初因飲啖兼人。胃強脾弱。繼則憂勞過度。氣竭肝傷。流之壅。由乎源之塞。若再守飲食之厲禁。進暴戾之劫劑。不啻勦寇用兵而無節制。則兵反爲寇。濟師無餉而專驅迫。則民盡爲讎。公何忍以千金之軀。輕其孤注之擲耶。彼草澤無知。守一己之師傳。圖僥倖於萬一。以治藜藿勞形之法。概施諸君民倚賴之身。

效則國之福。不效則雖食其肉。猶可道乎。此余之所痛心疾首。而進停藥之說也。語殊切直。特錄之以告世之溺惑於庸醫者。張有謁孫宮保句云。身思報國仔息重。病爲憂民措手難。見所刊閩游草中。

蒼耳草蟲

蒼耳子草。夏秋之交陰雨後。梗中霉爛生蟲。取就薰爐上烘乾。藏小竹筒內。隨身攜帶。（或藏錫瓶。勿令出氣。）患疔毒者。以蟲研細末。置疔膏藥上貼之。一宿疔即拔出而愈。（貼時須先以針挑針頭出水。）余在台州。僕周錦種之盈畦。取蟲救人。屢著神效。比在杭郡。學舍旁蒼耳草蟲甚多。以療疔毒。無不獲效。同邑友人鄭拙言學博鳳鏘。攜至開化。亦救治數人。彼地無蒼耳草。書來索種以傳。又青蒿蟲治小兒驚風最靈。余孫榮霖。曾賴此得生。此二方皆見本草綱目。而世罕知其效。特誌之。（青蒿蟲亦在梗中。焙乾研末。和燈灰湯調送下。）案蒼耳蟲及青蒿蟲。亦見冷廬醫話卷五。（未完）

千慮一得

沈仲圭

楊君孝緒。患遺精腦弱。其腦症狀爲不能多閱艱深之科學書。及微受刺激下部即有似欲遺精之感覺。求治於余。余以滋陰平腦固精之藥進退爲方。服二月。遺精雖減而未痊。余囑其長服桂枝加龍牡湯先除腦弱之根源。（遺精）病根既刈。再注意睡眠飲食空氣運動等衛生療法。自可漸復健康。此乙亥春月余在祥林醫局中醫療養室時爲渠治療之情形也。後楊君游嘉善。月餘始返。適余脫離祥林醫局。余與楊君。因診病而成良友。六橋徐步。湖心蕩漿。幾於無日不見。

今相距較遠。過從遂疎。一昨楊君來訪。謂遺精服桂枝龍牡湯頓差。腦弱吞兔腦丸亦効。所謂兔腦丸者。卽上海博濟書藥局登報贈送之腎腦再造丸也。方爲人參一錢。土炒於朮錢半。雲茯神二錢。天麥冬各錢半。遠志一錢。石菖蒲一錢。取汁。清炙甘草一錢。(按此卽定志丸。治思慮傷神。遺精腦弱之病。)淡菴蓉二錢。獼肝一具。淨棗仁二錢。歸身二錢。泡益智仁錢半。牡狗精一錢二。杭芍錢半。熟地五錢。兔腦一具。上藥研末。煉蜜爲丸。血珀爲衣。再被極薄青黛一層。每服六粒。日服三次。飯後開水下。去臘楊君合此丸時。曾詢余可否服用。余爲之刪去菴蓉牡狗精二味。及今思之。以雄鼠辜丸一二對代替牡狗精。易熟地爲生地。并將獼肝兔腦鼠腎三物。取鮮者搗爛。和藥末加蜜爲丸。似尤妥善。因獼肝含維他命甲。兔腦含磷。鼠腎含內分泌。皆神經衰弱之要藥。餘如菖蒲遠志棗仁。古人認爲健忘不眠等症之專藥。近世亦延用之。地芍歸參朮茯苓。卽八珍湯去川芎。八珍對此病。據金正愚君之經驗。亦有效。故余認此方可爲神經衰弱者服食之資。惟一日量祇十八粒。抑何少耶。

漢藥之知識

久保田晴光博士述

目次

緒言

第一章 漢藥之概念

一 漢藥之種類 三 漢藥之起源及其發達

二 現在中國之漢藥 四 將來漢藥研究之進路

第二章 中國歷代本草之概觀

一 漢時代 四 五代及宋時代 六 明時代

二 魏晉南北朝時代 五 金及元時代 七 清時代

三 隋唐時代

第三章 和漢藥與新藥

一 鎮靜鎮痛藥 四 驅蛔藥

二 鎮咳祛痰藥 五 強心藥

三 尿防腐藥

第四章 結語

緒言

照大概之順序。擬先說漢藥之概念。次述與漢藥關係密接不可離之本草學大要。最後選漢藥中與現在醫學直接有關係。或將結關係之若干種。而述其來歷及效用之大概。蓋近時不論醫界與俗界。漢藥之名。膾炙人口。通俗者固屬門

外漢。即醫家對漢藥。抱有明確觀念者。亦信必無多。古來醫家。就漢藥各味之藥效。有種種議論。其各藥品藥效之大要。非全無意義。其大部分於化學的或藥理學的。未見研究。故其藥效。但如古醫書或本草書所載。未可以一概律之也。

第一章 漢藥之概念

一 漢藥之種類

且先以概括的說明何謂漢藥。

普通一稱漢藥。即聯想草根樹皮。自其種類言之。其實不但植物。即礦物性以及動物性。亦包含在內。或生藥原形用之。毫不加工。如法半夏抱朮之簡單加工者有之。又如膽南星人中黃等之調合物。合植礦各種生藥。為一種複雜之漢藥者有之。更如米麥穀類野菜藥物。甚至衣服器具。亦講究為藥物。又調製藥物之水火。亦為本草之對象。要之。謂其網羅地上萬有物質。亦非過言。蓋以各時代各地方之民間藥為母胎。依調劑加工技劑之進步。多年累聚蓄積之結果也。日本德川時代之本草藥學。所以離却以藥物為對象之本草本來目的。專為博物學而發達者。亦為此故也。（案中國古代。無獨立之博物學科。大抵皆存在於本草中。清吳其濬著植物名實圖考長編。與今植物學書。最為相合。取材於本草者亦不少。商務編植物大辭典時。則本草綱目尤時見引用。）

如是之漢藥中。雖包含有種種物質。皆宜看做生藥。就中最多者為植物性生藥。所以謂之本草。或稱草根木皮者也。在中國以藥物為專門之書籍者。確為神農本草經。此書如次章所述。為歿於西紀五三六年（梁代）之陶宏景所校正。

神農本草經所收載藥品有三六五種。其中重複者一八種。實數得三四七種。分類之大體如次。

草部	一六四種	果部	一一種
穀部	七種	本部	四四種
菜部	一三種	植物二三九種	
土部	二種		
金石部	四一種	鑛物四三種	
蟲部	二九種	禽部	二九種
介部	八種	獸部	一五種
鱗部	七種	人部	一一種
		動物六五種	
水部	四三種		

即植物性生藥。比動物性及鑛物性。自昔斷然居多。其後藥品之種類漸增。陶宏景於前記神農本草經之外。另輯錄漢晉名醫所用之藥品三六五種。題曰名醫別錄。及唐之新修本草。則總數達八五〇種。宋之開寶本草九八三種。嘉祐本草則一〇八二種。證類本草一四五六種。及明李時珍之本草綱目。實有一八九二種之多。今將本草綱目之內容。分類之如下。

火部 一一種

土部 六一種

金石部 一六一種 } 鑛物二二二種

草部 六一〇種 果部 一二七種

穀部 七三種 木部 一七九種 } 植物一〇九四種

菜部 一〇五種

服器部 七九種

蟲部 一〇六種 禽部 七六種

鱗部 九四種 獸部 八六種 } 動物四四三種

介部 四六種 人部 三五種

即動物及鑛物之數。比植物雖頗增加。然植物性生藥。依然占絕對多數。又水部火部服器部等。為神農本草經所無。水及服器。乃取自名醫別錄。火則自陳藏器之本草拾遺以後。始有記載也。

於此不可不一言。即神農本草經之三六五味。乃藥品之數。本草綱目者。乃植物或動物之種類之數。非皆示藥品之數也。即雖屬同一植物。依其子葉根莖。而藥效不同者有之。又動物亦以骨肉臟蹄。而效能各別者多。故欲用此等為藥品。

當然不可不區別。如是則本草綱目所載之藥品。總數當甚夥也。更就乾隆三十年趙學敏之本草綱目拾遺考之。就綱目所漏之藥品七百餘種。補記其藥效。可見漢藥之種類數。實如恆河沙數之多也。（未完）

偶然隨筆（續）

楊子鈞

陽明腑症之發熱。必以潮熱爲準。故傷寒有其熱不潮者。未可與承氣湯之文。陽明經症之發熱。必以無表證爲準。（卽汗出不惡寒反惡熱。亦有背微惡寒之白虎證。究非周身惡寒之表證可比。）故傷寒有其表不解者。不可與白虎湯之文。蓄血症之小腹鞭滿。必以小便自利爲準。故傷寒有小腹鞭。小便不利者爲無血。及小便自利。其人如狂者。血症諦也之文。

手足汗出。與腸胃燥矢之關係。亦是一種病能外現。故傷寒有手足戢然汗出者。此大便已鞭也。及但發潮熱。手足漿漿汗出。大便難而詰語者。下之則愈。宜大承氣湯之文。故手足出汗。亦爲用承氣之一種證據。

頭汗約略分兩種。1 裏熱盛。鬱不得達。則蒸發而爲頭汗。如傷寒²³⁵條心中懊憹。飢不能食。但頭汗出者。梔子豉湯主之。209 條陽明病。被火。額上微汗出。小便不利者必發黃。141 條若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃。143 條但結胸無大熱者。此爲水結在胸脅也。但頭微汗出者。大陷胸湯主之。2 若虛陽上浮。頭汗而手足逆冷。徧身津潤。

者。則非大劑姜附回陽不可。雖舌色焦枯。亦屬假象。然大半皆因誤下等而致。如228條下之則額上生汗。手足逆冷。25條陰陽俱虛竭。身體則枯燥。但頭汗出。劑額而還。及金匱濕家下之。額上汗出。微喘。小便利者死。又濕家其人但頭汗出。背強欲得覆被向火云云。準此。則知前者之頭汗。是屬於陽盛而蒸發。屬實。後者之頭汗。是屬於陰盛隔陽。屬虛是也。(未完)

中醫偽書考(續)

衛原

內經

內經命名之意義 丹波元堅曰。漢書藝文志。載黃帝內經十八卷。外經三十七卷。及白氏扁鵲內外經之目。內外猶韓詩內外傳。春秋內外傳。莊子內外篇。韓非內外諸說。相對名之焉爾。不必有深意。而吳崐王九達。並曰。五內陰陽謂之內。張介賓曰。內者生命之道。楊珣曰。內者深奧也。方以智曰。岐黃曰內經。言身內也。然則其外經者。載身外之事。其言不深奧者與。既收諸醫經中。則諸家之說。不可從也。經字。孔安國訓爲常。劉熙釋爲徑。按漢時有緯書。因攷經原取之機縷。縱曰經。橫曰緯。荀悅申鑒曰。五典以經之。羣籍以緯之是也。禮記大全。嚴陵方氏云。經者緯之對。經有一定之體。故爲常。緯則錯綜往來。故爲變。此說得之矣。張華曰。聖人制作曰經。非也。

內經之內容 今之內經。爲素問九卷。靈樞九卷。素問名見張仲景傷寒論序。序稱撰用素問九卷。靈樞綜概謂九卷

卽是靈樞。甲乙經曰。按七略藝文志。黃帝內經十八卷。今有鍼經九卷。素問九卷。二九十八卷。卽內經也。宋林億作新校正。謂王氏指靈樞爲鍼經。李濂引呂復云。王冰更九靈之名爲靈樞。自是以後。遂以內經爲素問靈樞之合稱。內經之真僞。章學誠曰。聖人制作。守於官司。及周末文勝。軼爲百家口耳之學。不能無差。則著於竹帛。以授之其人。所以求傳習之廣焉。是以義農黃帝之書。雜出於戰國。連類於漢魏。其後有卓越之人。爲衆宗仰。法度猶傳。筆札未錄。則知之者亦述之而仍其人。此正古人言公之旨。不必以誠僞規度者也。如素問……難經……雖有僞附。又不能定其著書之人。然終不當與虛造者華視。今四庫所著錄。諸家書目所臚列。醫藥術之數書。獨多依托。良由此等學說。不憑書籍以傳耳。一章學誠爲遜清一代史家。其學貴於致用。其言內經爲僞書之所以然。亦甚公允。內經之僞。約有四端。

(一) 史事 內經中所載史事。類非古代所有。如禁服篇中「敵血而受。」陰陽離合論中「聖人南面而立。」上古天真論中「以酒爲漿。以妄爲常。」皆非當時之事。桑悅曰。「素問乃先秦戰國之書。作黃岐手筆。其稱上古中古。亦一左證。」姚際恆曰。或謂此書失侯失王之語。秦滅六國。漢諸侯王國除。始有失侯失王者。予按其中言黔首。又藏器法時曰。夜半曰平旦。日出曰日中。日日映。曰下晡。不言十二支。當是秦人作。又有言歲甲子。言寅時。則又漢後人作。故其中所言。有古近之分。未可一概論也。案其他如「方士」「歲星熒惑」明爲秦漢時代之各詞。而「天師」「按蹻」「掣引」等。皆道家之伎倆。

(二)文字 丁福保曰。余嘗以內經之文與秦漢時各書相似之處。彙錄而參攷之。如上古天真論云。「美其食。任其服。樂其俗。」老子八十章云。「甘其食。美其服。安其居。樂其俗。」又云。「以酒爲漿。」漢書鮑宣傳。「漿酒藿肉。」四氣調神大論云。「渴而穿井。戰而鑄兵。」晏子春秋云。「臨難而遽鑄兵。噫而遽拙井。」陰陽應象大論云。「因其輕而揚之。因其重而減之。因其衰而彰之。」呂氏春秋盡數篇云。精氣之來也。因輕而揚之。因走而行之。因美而良之。」陰陽別論云。「一陰一陽結謂之喉痺。」春秋繁露云。「陰陽之動。使人足病喉痺。」六節藏象論云。「立端於始。表正於中。推餘於終。而天度畢矣。」文元年左傳云。「先王之正時也。履端於始。舉正於中。歸餘於終。」又云。草生五色。五色之變。不可勝視。草生五味。五味之美。不可勝極。」孫子兵勢篇云。聲不過五。五聲之變。不可勝聽也。色不過五。五色之變。不可勝觀也。味不過五。五味之變。不可勝嘗也。」脈要精微論云。「陰盛則夢涉大水恐懼。陽盛則夢大火燔灼。陰陽俱盛。則夢相殺毀傷。上盛則夢飛。下盛則夢墜。甚飽則夢予。甚饑則夢取。」列子穆王篇云。「陰氣壯。則夢涉大水而恐懼。陽氣壯。則夢涉大火而燔灼。陰陽俱盛。則夢生殺。甚飽則夢予。甚饑則夢取。」氣穴論云。「發蒙解惑。未足以論也。」枚乘七發云。「發夢解惑。未足以言也。」營衛生會篇云。「上焦如霧。中焦如瀉。下焦如瀆。」白虎通引禮運記云。「上焦如竅。中焦如編。下焦如瀆。」本神篇云。「生之來謂之精。兩精相搏謂之神。隨神往來者謂之魂。並精而出者謂之魄。所以任物者謂之心。心有所憶謂之意。意之所存謂之志。因志而存變謂之思。因思而遠慕謂之慮。因慮處物謂之智。」此一節全同子華子。其他文勢語氣。類淮南子者頗多。」桑悅曰。「其論五藏四時收受之

法。呂不韋著月令似之。其論五氣鬱散之異。董仲舒郭景純敘五行災異祖之。」（未完）

習醫日記 自序

導字一九五學生孔伯毅

鄙人從陸淵雷夫子習醫以來。瞬將半載。平時勤求古訓。博採新知。書報中獨到之言。師友間切磋之語。碎金屑玉。在在堪珍。影響於我之所學。蓋至深且鉅。第以人事牽輓。過而輒忘。夫子曰。一盞最而記之。日知其所無。月無忘其所能。淺深甘苦。身體力行。必能孟進而上躋高深也。小子未嘗不深踐其言。自惟雖東鱗西爪。竹頭木屑。記之殊覺蕪雜散漫。然亦可以自驗其學識之進退。與氣力之消長也。因日記數條。以自課焉。其中無體例。無系統。或鈔書報。或錄驗方。或記師友之至言。或寫修習之所得。信手劄記。不加詮次。要皆在國醫學範圍以內。而於西方醫學。則採其有價值之理論。以資參證而已。方今國醫學說。風雨飄搖。詆毀摧殘。無所不至。而余乃研絕學於舉世不爲之日。豈真執迷不悟。而頑固未化者哉。無亦認定國醫學確有其不朽之價值。非攻擊謾罵所能低昂左右。信仰既堅。研究斯篤。自以爲存亡續絕。非異人任而已。此余所以不憚煩瑣。而有習醫日記之編著也。（正文待續）

幾種發疹病的鑑別診斷

王惠蒼

導言

中醫新生命 第十二號 研究

一七

我們於臨牀診病時。常常可以遇到發疹的病人。此時若不細心診察。則每易誤甲爲乙。指鹿爲馬。以致處方不確。治療亦隨之而不驗。蓋發疹的疾病。有十餘種之多。其見證則大都大同小異。若欲確斷其果爲某病。則非留心其經過情形。與現在見證。及一切副證狀不可。茲將各種發疹病的一般症候。及其特點。與鑑別法。一一記錄於後。俾便臨牀時之借鏡。惟淺陋如愚。識見幼稚。難免掛一漏萬。所望世之高明。進而正之。則拋磚引玉。是所企禱。

定義及其範圍

傷寒。副傷寒。發疹傷寒。猩紅熱。第四病。急性全身粟粒結核。登革熱。麻疹。風疹。痘瘡。水痘。等病。其經過中。均有發疹見象。惟各病雖同見發疹。但亦各有其特徵及主要之見證。如臨牀時。能細心鑑別。其異同之點。則欲診斷之正確。亦不大難也。今當先言各病之證狀。

一般症候

傷寒之主要證候。第一週。體溫爲階梯狀上昇。上午稍微下降。晚間則上昇。常有頭痛。食慾缺乏。渴不欲飲。舌苔垢膩。第二週。體溫稽留於高度。胸腹部發生薔薇疹。腹痛雷鳴。或下痢。或便秘。第三四週。呈弛張熱。重篤者。則呈心臟衰弱。轉變爲腸穿孔。穿孔性腹膜炎而亡。症象輕微者。則體溫漸下降。諸症緩解。漸移行於恢復期。副傷寒。經過頗似輕症傷寒。以惡寒戰慄而發熱。但體溫上昇。多不能延長至四週之久。有薔薇疹。匍行疹。間有發生腸出血。及穿孔性腹膜炎者。預後多佳良。

發疹傷寒。亦以惡寒戰慄而發熱。體溫稽留於四十度。有劇烈之頭痛。及四肢痛。眼結膜出血。便秘。間或下利。初期多有嘔吐。經四至六日後。脾藏腫大。皮膚呈固有之發疹。形狀不規則。爲帽針頭大。乃至豌豆大之斑點。最初見於胸部及腹部。次乃互於全身。顏面常不發疹。重症者。則發生紫斑。患者高度脫力。昏迷話語。舌煤黑色。脈搏小數。有時超過一百念次。經過良好者。則於第十三日至第十七日。逐漸恢復。重症者。於第三週左右。死于心臟麻痺。及昏睡狀態。

猩紅熱。多流行於寒冷時期。尤以春秋爲多。前驅症爲嘔吐頭痛。頰部潮紅。脈搏頻數。體溫上昇。咽喉潮紅腫脹。舌上有白色厚苔。經數小時乃至一晝夜。入於發疹期。爲鮮紅色微細點狀。一二日後。互相融合。發疹最初見於頭部。次向胸部項部。四肢蔓延。經一日夜而遍佈於全身。但口唇周圍。及頤部無疹。而呈蒼白色。是爲猩紅熱固有之口輪現象。發疹經三五日後。依發生之程序而消失。患者咽喉概潮紅腫脹。有併發壞死性扁桃性炎者。舌上白苔。於發病第三四日退去。呈鮮紅色。(覆盆子舌亦貓舌)脈搏與體溫一致上昇。上述症狀。於第五日即逐漸減退。於發病之第三週。即移行於落屑期。依發病之程序。逐漸落屑。成爲片狀。或膜狀。於發病第六七週。始落屑終了。

麻疹。俗名痧子。亦名瘡子。前驅期約三日。呈上氣道炎症。發熱頭痛。食慾不振。嘔吐下痢等。口腔粘膜呈特有之粘膜炎。約帽針頭大。呈鮮紅色。其中央有珍珠樣白色圓點。稍爲隆起。約有六至二十個。有時見於臉結膜。名考不列氏斑。其後乃達發疹期。體溫先暫時下降。又隨發疹同時上昇。一切症狀增重。咳嗽頻發。結膜潮紅羞明。頭痛。食慾不振。皮膚上發生帽針頭大乃至豌豆大之皮疹。先見於顏面。漸向全身蔓延。經過一二日。體溫即突然下降。如於發疹後第四日體溫

仍不下降者。須注意合併症之發生。其後移行於恢復期。一切症象輕快。

風疹多見於一二歲之小兒。多無前驅症。亦有於發疹前一二日。有發熱惡寒。不快。食慾減退等症狀者。發疹先自顏面開始。漸次下行。於翌日偏及全身。爲小針頭大。淡赤色斑。爲散在性。體溫多在三十七度至三十八度之間。偶有達於三十九度者。發疹經二至四日。即完全消退。有時遺留少許色素。粘膜雖有加答兒症狀。但無考不列氏斑。

第四病無前驅症。酷似極輕微之不全型猩紅熱。乃微細點狀猩紅熱樣發疹。於數小時內即遍佈於全身。無猩紅熱舌。頸腺及項腺中等度腫脹。輕度發熱。發疹迅速消退。有輕度之鱗片落屑。二三週後。傳染性始消失。

痘瘡又名天花。潛伏期十日乃至十四日。前驅期約二三日。此時惡寒戰慄。發熱四十度。頭痛腰痛。下利嘔吐。初生兒常有發生瘰癧者。於發病第二日。來麻疹樣或猩紅熱樣之前驅發疹。以下腹部及上腿內面爲最著明。其後體溫下降。而移行於固有之發疹期。此時發疹一般爲帽針頭大之紅斑點。先見於顏面。軀幹四肢。於一晝夜內。蔓延於全身。發疹漸增大如碗豆。表面隆起。呈丘疹狀。於第六日。成爲水疱。中央陷凹。是爲痘瘡臍窩。至第八九日。入於化膿期。體溫再度上升。同時水疱變成膿疱。周圍有赤暈。因之皮膚腫脹痛。痒感著明。其後第十一二日。逐漸乾燥結痂。痒感更甚。自第十六日起。開始落屑。成褐赤色之斑點。侵犯真皮者。遺留癍痕。終生不退。以上爲定型的痘瘡經過。是爲真痘。如經過輕緩。膿疱甚少。化膿不劇者。則名假痘。發疹僅限於顏面及手。發生癍痕者極少。即使發生癍痕。亦頗淺表。

水痘。本病最易侵犯小兒。與痘瘡全非一事。發病時有輕度全身障礙。及中等度之發熱。發生癍性薔薇樣發疹。其分佈

狀態與痘瘡不同。特易見於胸部及毛髮部。其後移行於水疱。中央形成臍窩。周圍有赤暈。內容透明。化膿者極少。其後乾燥而不遺留癍痕。皮疹概漸次發生。故一部雖已結成痂皮。而他部則尚有始為透明之水疱者。水疱亦可見於粘膜。及女性外陰部等。

登革熱。多流行於熱帶及亞熱帶地方。以突然惡寒而發高熱。膝關節疼痛。強直。其他關節及脊柱亦有時被其侵及。舌苔甚厚。食慾減退。皮膚突然潮紅。經三日後。分利退熱。顏面及前臂發生猩紅熱樣或癩疹樣發疹。經三日後。即消退落屑。經過多良好。

急性全身粟粒結核。本病多為續發性。易發於幼年。其原因由於結核菌侵入血行。輸送於全體。各部發生無數粟粒結核。可分為以下三型。一。傷寒型。體溫突然上昇。達三十九至四十度。呼吸及脈搏增加。神識障礙。詰語。此外尚有脾腫。鼓腸。薔薇樣發疹。下痢等。於短時日內死於衰弱。二。肺藏型。肺症狀著明。三。腦膜型。易見於小兒。呈腦症狀。(肺藏型及腦膜型。因無發疹狀態。故略。)

以上為各病之一般症候。次當言其特徵與其鑑別法。

各病之特徵及鑑別法

傷寒之發疹。多見於發病後第二週。且患者體溫雖高。而脈搏數則甚少。一般不超過八十至一百次。乃本病之特徵。與急性全身粟粒結核之傷寒型發疹。祇須留心其熱型。脈搏數。則其異同立判。副傷寒之發疹。雖與傷寒略同。但體溫上

昇。多不能延長至四週之久。且多以惡寒戰慄而發熱。是爲與傷寒不同之點。

發疹傷寒。須根據本病。初起以惡寒戰慄而發熱。固有之發疹。及脾腫早期發現。脈搏頻數等。與以傷寒鑑別。麻疹之特徵。爲考不列氏斑。上氣道炎症。發疹之形態。風疹則無考不列氏斑。

痘瘡初起。雖形同麻疹。但多無上氣道炎症。及考不列氏斑。其後則易與水痘混淆。惟水痘之疹。其分佈狀態。與痘瘡不同。特易見於胸部及毛髮部。且其皮疹漸次發生。若能根據此點。則痘瘡與水痘。亦易鑑別。

猩紅熱有覆盆子舌。口輪現象。咽頭潮紅等症爲特徵。故第四病雖酷似猩紅熱。若根據上述之特徵。則亦不難辨別。登革熱雖發生猩紅熱樣或麻疹樣發疹。但多流行於熱帶。及亞熱帶地方。且有關節疼痛強直症。故亦易鑑別。

尾聲

各種發疹病之鑑別大要。既如上述。尙有流行性腦脊髓膜炎。外耳氏病。敗血症。血清病。藥疹。汗疹等。其經過中亦往往現發疹狀態（非絕對的）但各病均各有其要證。與前述諸病不相伴。稍明醫藥常識者。亦能辨別。故不贅。

良方萃

謹養方

糜瘡。爛脚。脚丫濕癢。用蘆甘石四錢。硫黃、枯礬、煨石膏。各三錢。輕粉二錢。冰片一錢五分。水銀一錢。同研極細。先用溫湯將患處洗淨。然後搽上。神效之至。

久年凍瘡。於伏日時。搗大蒜頭如泥。敷於生過凍瘡之處。越宿洗去。更搗敷之。須俟起泡破皮。方可止敷。從此雖至冬寒料峭。亦不再發。按此方載在驗方新編。但該書謂須遲三四日一敷。俾不至起泡破皮。然鄙人曾如法自試。不意一至冬令。仍凍爛如故。復於翌年。敷至起泡破皮。迄已數載。未嘗一發。

乾疥。搽外科金鑑中繡毬丸甚效。方爲川椒、輕粉、樟腦、雄黃、枯白礬。各二錢。分研細末。外加水銀二錢。大楓子肉百枚。柏油一兩。共研攪勻作丸。以二掌合搓。如圓眼大。先以鼻聞。次搽患處。按搽法。以指拈藥在患處用力磨擦。使發生熱度。藥性易入。其效尤能立時止癢。

感冒風寒。感冒風寒。證現惡寒發熱。頭疼腰痛。勿論有汗無汗。以觀音柳（卽西河柳）一握。煎服。立能鎮痛退熱。不

亞於桂麻二湯。蓋本品含有水楊酸鈉。有發汗之作用。與西醫之成藥「阿司匹林」同功。

瘡疾外治法。於瘡發前四五小時。用斑蝥一頭。研末。放臍眼中。外貼膏藥。按使熨貼。瘡即不發。俟過發瘡期。再行揭去。臍即起泡而愈。又凡瘡疾已治或未治。一見口唇起泡。卽爲將愈之兆。屢見不爽。

溫病論衡（續）

謝誦穆

（六）葉派溫病治術之批評

嘗謂天士之學。出于喻西昌爲多。而溫病滋陰之法。尤與西昌默契而合符也。西昌之論溫證曰。

緣真陰爲熱邪久耗。無以制亢陽而燎原不熄也。以故病溫之人。邪退而陰氣猶存一綫者。方可得生。然多骨瘦皮乾。津枯肉燥。經年始復未病之體。

以此雜天士鞠通書中。幾不辨楮葉。何其神似之。至於斯也。天士主滋陰之說。刺取而條列之如左。

溫邪逆傳臆中……必兼滋清……溫熱門 30

高年熱病……當滋清去邪——全上 19

甘寒清氣藥中。必佐存陰。—— 13

邪雖外達陽氣亦泄……當以育陰清熱爲主。—— 47

陰中伏邪……與育陰清邪熱法—— 53

溫邪久伏少陰。古人立法。全以育陰祛熱—— 53

腎陰不承……議以三才陽滋水制熱—— 54

至其所以滋陰之理。則不外陰虛液涸。故云

風溫熱灼之後。津液未復——風溫門 9

溫邪發熱津傷——溫熱門 6

邪入心胞絡中。深怕液涸神昏。—— 19

陰液已涸。舌強音縮。—— 36

陽根未固。陰液漸涸。—— 57

承葉氏之遺說而祖述之者。皆以滋陰爲治溫之要著。

吳鞠通曰。熱病未有不耗陰者。其耗之未盡則生。盡則陽無留戀。必脫而死也。真能體味斯言。思過半矣。汪瑟庵曰。葉氏必以保津液爲要。

王孟英曰。陰耗之而未盡者。尙有一綫之生機可望。若耗盡而陰竭。如旱苗之根已枯矣。沛然下雨。亦曷濟耶。

吳坤安曰。大抵溫熱之證。陰精內耗。強陽無制。新邪一觸。則燎原之勢。直從裏發。故初起卽見壯熱煩渴口乾舌燥等證。而以存津液爲要旨。

葉氏子雨。對滋陰療法有微辭。陸九芝則深致不滿。痛加懲劄。

葉子雨曰。治溫暑保津液。固爲第一義。知瀉其陽之有餘。卽所以補其陰之不足。則進乎道矣。

陸九芝曰。急去熱邪。陰始可保。一去其熱。陰卽不傷。

又曰。蓋人之所病者寒也。溫也。熱也。只去其寒與溫與熱。其人而陰本不虛者。無傷也。卽其人而本屬陰虛者。亦無恙也。乃不防其陽盛傷陰。而獨防陰虛邪戀。於是防其劫津。防其發疹。防其風動。防其熱入心包。至末而防其脫。夫旣曰劫曰發曰動曰入。則自有劫之發之動之入之物。在不去其劫之發之動之入之物。而藥反留邪以劫津。引邪以

發疹助邪以動風。領邪以入心包。而同歸於脫。防云何哉。陽之方盛。徒曰存陰。陰既不能以些微之藥而存。而三五日間。陽邪之足以傷陰者。方且勢如奔馬。涸液枯津。是其陰之傷於藥後者。不更甚乎。總之。使病速去。陰始不傷。欲保其陰。必速去病。去病之藥。十餘味耳。亦甚平常。並非險峻。有歷驗者。非空言也。

又曰。然則生地石斛。將始終不可用乎。則又非也。當夫芩連石膏兩三劑後。熱退身涼。神清脈靜。得此八字佳境。已出死關。而津虧液傷。元陰尙難遽復。稀粥爛飯。胃納始得微開。卽以生地養陰。石斛養胃。徐徐而作善後之圖。亦爲要藥。只是遲早先後間。則有確乎其有不可易者。

臨證指南中溫熱門。席姓一案。葉氏謂古人立法。全以育陰祛熱。仿河間濁藥輕投法。不爲上焦熱阻。下焦根柢自立。冀其煩躁熱蒸自緩。用藥則熟地之炭。遠志之炭。淡菴。秦川。斷五味等補腎斂瀉之藥。膩膈留邪。卒至不救。以生地滋陰。取其甘寒多液。易爲熟地。燒之成炭。則尤育陰之下乘矣。

滋陰之法。導源於朱丹溪。然丹溪之治溫熱病。無一滋陰方。又謂黃連黃芩梔子黃柏降火。非陰中之火不可用。其說當否。姑置不論。然丹溪之意可知矣。故天士滋陰之法。非純乎丹溪者也。襲古說而遺其半。以移治不可滋陰之病機。則其悖謬而僨事也固宜。

老友趙錫庠君。有急性熱病之滋陰療法一文。源流清晰。辨析精微。趙君爲余最心折之一人。此文尤一讀一擊節。余與趙君傾蓋訂交。六年如一日。是殆喬答摩之所謂夙緣歟。葉氏以辛涼輕劑治犯肺之溫病。尋常感冒。或足以了之。若肺

脹（此處以肺脹代肺炎）則輕劑無能爲力。故陸九芝曰。

果如其說。則所稱溫熱者。不過小小感冒。卽俗所謂小風熱小風溫。如目赤頤腫喉梗牙疼之類。卻只須辛涼輕劑。其病立愈。然何以不出數日。遽入心包。爲一場大病。以至於死。若不數日而病卽入心。卽可死者。則必非如其所說。只須輕劑之辛涼。且何以如其所言。不卽愈於辛涼之輕劑耶。

蓋可以辛涼輕劑愈之者。不過如九芝先生所說之小風熱小風溫。而辛涼輕劑所不能愈者。則肺脹之類也。以輕劑統治一切。此葉吳之所以流毒於無窮也。九芝先生以葛根芩連治溫病。此但可以療腸窒扶斯耳。肺脹則亦非其治也。故淵雷夫子曰。

九芝先生痛斥吳瑭。誠非無的放矢。然以葛根芩連爲溫病主方。猶未得爲定論。觀溫病風溫之證候。舍麻杏甘石及白虎。殆無的當之方矣。

淵雷夫子以此兩方治仲景之所謂溫病風溫。固堅卓不易。以麻杏石甘移治葉派溫病中之肺脹。亦巧合無間。

金匱要略肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證治第七。有肺脹三條。

上氣喘而躁者。屬肺脹。欲作風水。發汗則愈。

欬而上氣。此爲肺脹。其人目如脫狀。脈浮大者。越婢加半夏湯。（淵雷夫子曰。『此條證候。是毛細枝氣管炎及肺炎。其咯痰呼吸。非常困難。又易成水腫。此因呼吸困難肺循環鬱血。引起全身急性鬱血故也。』越婢湯爲麻黃石膏半

夏生薑大棗甘草。

肺脹。欬而上氣。煩躁而喘。脈浮者。心下有水。小青龍加石膏湯主之。

上氣。面浮腫。肩息。其脈浮大。不治。下利又加甚。案此節註家亦釋爲肺脹。丹波元堅云。肺脹一證。諸家未有云。後世某證者。考下文云。肺脹欬而上氣。又云。欬而上氣。此爲肺脹。由此觀之。卽後世所謂呷嗽哮喘之屬。巢源云。痰氣相擊。隨嗽動息。呷呷有聲。謂之呷嗽。本事續方云。哮喘如拽鋸是也。淵雷案。呷嗽哮喘之證候。卽枝氣管性氣喘。枝氣管性氣管炎。及枝氣管性肺炎也。

以舊說考之。則肺脹之所包含。不止肺炎一病。以肺炎屬肺脹。則事理俱愜。以肺脹爲肺炎。則不合邏輯。故吾以肺脹名肺炎。亦假定之辭耳。(下期續完)

治驗

胃病醫案選

張氏醫通嘔吐噎門

章次公著
張德正藏

周慎齋治一人。餘食如常。每遇子時即吐。大便秘。詢其人必有苦慮。憂思脾氣鬱結。故幽門不通。宜扶脾開竅爲主。用人參白朮（以蒼朮拌炒）茯苓各一錢。炙甘草五分。附子煑烏藥三分。水煎服愈。

按 病者每遇子時必吐。卽西醫籍神經性定期嘔吐之症。此症在發作時。甚感苦痛。故有因嘔吐而致衰弱者。但嘔吐止。病人立刻復原。

陸氏三世醫驗

嘉靖辛酉年。湖有水患。至壬戌春夏間。米貴民飢。本府督糧廳李公。於慈感寺煮粥賑飢。是日人衆。公正在內進飯。忽聞外邊爭嚷。急急吃完。出外解紛。下午僧具小酒奉之。公獨飲數杯。覺得臍下小腹作痛。升至胃脘即嘔。嘔訖痛止。少頃又從下痛上復嘔。嘔訖痛緩。勉強登肩輿回衙。痛嘔益頻。自疑中毒。以淡鹽湯薑汁探吐之。一無所出。令人延予。予適往潞村。另請一醫進看。投藿香正氣散二劑。不效。連夜差人追予。比至已四鼓。卽進診視。值痛初止。其脈浮按細數。稍重卽伏。沉按甚堅。予曰。大人非飲食過飽。卽急遽所致。李公備悉其故。命人去取藥囊。予曰。不須取。卽於袖中出潤字丸百十顆。令淡姜汁服之。少頃連瀉數行。痛隨利減。李公留宿衙內。清晨公謝曰。公在外何以預知吾病。而以對症之藥。備之袖中乎。古稱越人隔垣知人之肺腑。公料吾病於十里之外。更賢於古人矣。

按 在內進飯。聞外邊爭嚷。急急吃完。則食物未經口齒之嚼化。而逕入胃腸。刺激胃腸粘膜。發生加答。所以臍下少腹作痛。用下劑排除難以消化之食物。故痛隨利減。

附陸氏潤字丸 開結通腸。通痰去垢。

橘紅一兩 杏仁二兩 牙皂一兩 前胡 天花粉 枳實 山查肉各二兩 甘草三錢 檳榔七錢 半夏一兩 生大黃十二兩 水法丸 空心白滾湯下二三錢 (未完)

醫案(續)

陸淵雷

鄧夫人 體虛有虛熱。月事廿餘日一行。近因驚懼。薄暮輒覺胸次氣浮而毛戴。又善嘔。脈甚遲軟。舌苔微黃。

人參錢半 煨牡蠣一兩 桂枝一錢後下

於朮三錢 雲苓五錢 製香附錢半

棗仁四錢研 姜夏四錢 炙草一錢

天王補心丹五錢包煎

陳先生 酒後驟之冷氣間。遂腹脹腿強。此病及神經。不速治。或成痼疾。脈遲。右尤沉細。

赤白芍各二錢 黑附塊先煎二錢 木瓜三錢

炙草一錢 木香炒八分 檳榔錢半

葛根二錢 枳椇子三錢

施先生 感寒咳嗽。服西藥效止。而忽胸悶嘔酸。當是藥帶滯性之故。

葛根二錢 姜 夏四錢 製香附二錢

桂枝二錢 良薑一錢 射干二錢

赤芍三錢 炒烏藥三錢 象貝三錢

桔梗錢半 炙草一錢

劉小姐 月事常阻。服藥小通。次月又停。臍下似有癥。脈弦數。舌質中裂甚深。

雲苓五錢 丹皮三錢 柴胡錢半

桂枝錢半後下 赤白芍各二錢 鼈甲四錢

桃仁四錢打 生白朮二錢 懷膝五錢

全當歸三錢 製香附二錢

丁寶寶 先洞泄。轉爲痢。紅白雜下。日三四行。神色飲食自若。脈不數。舌色淡。

藿香三錢 赤白芍各二錢 陳皮二錢

桔梗一錢 枳實錢半 乾薑一錢

淡芩一錢 查炭三錢 炙草八分

中醫新生命 第十二號 治驗

中醫新生命 第十二號 治驗

朱寶寶 發熱五日。欬嗽。目紅潤。今日見疹點。宜忌口避風。

葛 根三錢 象 貝三錢 枳 壳錢半

桂 枝一錢 杏 仁三錢 桔 梗錢半

赤 芍二錢 西河柳三錢 炙 草八分

鮮茅根四錢 另西河柳一兩薰洗

歐寶寶 食少多嘔。時咬人。舌黃。根有厚苔。手掌熱。但平時胃弱。不耐大涼劑。

淡竹葉三錢 查 炭三錢 赤 芍三錢

生石膏四錢打 川 連四分 蘇 全三錢

焦麥芽三錢 姜 夏四錢 萸 仁三錢

硃燈心三紮

鄔先生 肩背痛差而未盡。午起口中甚膩。舌苔黃厚。頭痛。大便無序。此皆胃腸不健之徵。

川 連四分 乾 薑八分 葛 根四錢

淡 芩二錢 太 子參三錢 桂 枝一錢

姜 夏四錢 鮮茅根四錢 赤 芍三錢

炒麥芽三錢 六一散四錢包 赤 苓四錢

又診 肩背之攣痛。服藥即差。藥停即作。但較輕耳。其胸滿大便無序舌膩如故。脈右大。胃腸仍有溼積。

葛 根生用二兩 生 耆三兩 桔 梗八錢

桂 枝一兩 當 歸七錢 炒 茅朮八錢

赤 芍一兩 枳 殼一兩 陳 皮一兩

炙 草五錢

以上十味研細末。水泛丸如菉豆大。每早晚用薑二片。紅棗三枚。煎湯送服三四錢。

又診 攣痛幾全愈。食不甚多。大便仍未暢。舌上有黃苔。脈右弦大。左平。

川 連五錢 太 子參三兩 赤 白芍各二兩

淡 芩一兩 姜 夏三兩 桂 枝一兩

藁 全三兩 柴 胡一兩 葛 根生用二兩

雲 苓三兩 生 白朮二兩 炙 草八錢

生 耆三兩 當 歸一兩

右作細末。水丸如菉豆大。每日早晚用薑二片。棗三枚。煎湯送服四錢。(待續)

課卷

腺體之研究（續）

孔伯毅

乳腺係附屬於生殖作用者。無論男女。當發育時。此腺長成。而有顯著之現象。在男子為未成熟的。然在成年之女子。則頗發達。娠妊後。即與此生理的預備。以必要之刺激。而有分泌之活動。以養育即將生產之嬰孩。乳中所含之質。為脂肪。乳糖鹽及蛋白質。若於授乳期內。重復行經。則乳糖減少。而脂肪與蛋白質增加。若於授乳期內。重復娠妊。則乳質不佳。脂尤缺少。故乳兒之母。若懷孕。與其繼續飲乳。無寧斷乳為佳。

乳汁之分泌。與母之飲食。有密切之關係。其質與量。亦可因食物之選擇而改變。母之神經系統狀況。於乳汁有更大之影響。驚怒或強烈之感情。可使乳汁大為改變。致有害於嬰兒。故疲乏。愁煩。失眠等。亦均為乳母所應避。

乳膿腫。因乳頭之皮破裂。而受染所致。膿成於腺葉之間。至乳後膿腫。則膿成於腺後面之筋膜中。又乳癰亦為腺病。其主要原因為肝鬱。

（5）淚腺

淚腺居於額骨之內眶弓外側端之下。名曰淚凹。其腺爲扁平之葡萄狀。有數細管通於眼球之表面。卽上下眼臉之內角。內角各有小凸處。是名淚乳頭。卽淚腺開口處也。此腺分泌淚。流過眼球。滋潤有感覺性之結合膜。洗去灰塵纖屑。及其他異物之細粒。然若容灰塵等附着於結合膜。則爲害甚大。淚由小管通至淚囊。及鼻淚管。由鼻淚管以入鼻腔。淚乃稀薄之鹽液。故對於黏液膜。並無刺激。然母哭泣。淚墮于目中。則令子傷睛生翳。此理不能明瞭。（案此理不可解。或母有目疾。以淚爲介。而傳染於子。亦未可知。誦穆附註。）

（6）耵聍腺

此腺居耳竅之內。分泌耳蠟（耳垢）。以保護耳鼓膜。使勿爲浮於氣流中之異物所傷。其味甚苦。且有劇毒。蟲類入耳。卽爲所殺。乃天然之保護物也。

（7）皮膚腺

（甲）皮脂腺
（乙）汗腺

皮膚居於真皮內。其管經過表皮。通於皮面。皮膚有二。一曰皮脂腺。二曰汗腺。分述如下。

（甲）皮脂腺——此腺分泌脂肪。名曰皮脂。此皮脂能潤澤皮膚。及毛髮。其腺體甚小。作囊狀或葡萄狀。其口通於皮面。或毛囊內。全體除掌躅等處均有之。而以頭頂及面部爲最多。毛髮之柔軟光澤。皮膚之滋潤細膩。皆皮脂腺分泌之功也。

(乙)汗腺——汗腺爲一蟠曲之細管。略如螺旋狀。末端如球。藏於真皮內。有導管通至皮面。壯健之人。平均每日所分泌之汗。約爲二鎊。出汗之動作。日無停止。人每不之覺。因出汗時。其潮濕之氣。由蒸發作用而消散。是爲不顯明之出汗。若其消散之速度。不及出汗之量。則所出之汗。積於皮上。而爲顯明之出汗矣。

汗爲人體生理上由新陳代謝而來之組織廢料之溶液。藉汗腺排泄於體外。且可使水分行至皮面。以調節全身之溫度。汗腺徧佈全身。以腋下爲最多。掌蹠次之。其他各部又次之。惟黏膜之部。如脣邊紅色處。及舌面鼻孔肛門等處。則無之。凡患狐臭者。卽液下汗腺所分泌之臭氣也。其臭有等差。病淺者僅爲腋氣。病深者則爲狐臭。無論淺深。皆不可治。強治之。則晚年必耳聾。此亦病理之不可解者。

(8)淋巴腺

此腺徧佈全身。自成系統。營淋巴循環之工作。淋巴管在身體之組織內。細小異常。目不能見。謂之淋巴毛細管。但彼此一再連合而成較大之管。(仍極細小。)最後成爲兩大導管。卽胸導管與右淋巴導管。胸導管最大。長約十八英寸。其直徑平均如一小鵝翎。此管起於第二腰椎骨之乳糜池。由主動脈之後上行。經過膈。乃繼續向上。經胸而至與第七頸椎骨相平之地位。卽彎曲如弓形。而入左鎖骨下靜脈。故淋巴與乳糜。乃與靜脈血流匯合赴心。以循環於全身。右淋巴導管較小。長約半英寸。在與右頸內靜脈交連處。通入右鎖骨下靜脈。淋巴液經過此管。與靜脈血匯合人心。(未完)



鄔亮問導字二二四號

傷寒今釋卷三第三頁後五行。所引苦酒一味。不知何物。

淵雷夫子答

苦酒卽是米醋。用鎮江滴醋甚佳。

鄔亮問

傷寒今釋三卷五十四頁後頁桂枝加桂湯症下。有上衝經針灸而爲奔豚者。是否爲針灸之燥氣。使其變本加厲。致原有上衝之氣。更引達上。遂爲奔豚之象乎。

淵雷夫子答

不必針灸所致。因臨證上有並不經針。自發奔豚者。可知雖不針亦將發。

張公讓問

中醫新生命 第十二號 答問

石羔 先生謂爲鹼性物。在體內可中和酸性物。以解高熱。查石羔爲 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 乃中性之性類物。無中和酸質之能。現尙未明其吸收及排泄情形。其在體內之作用如何。仍須考究。其在水內之溶解度。僅百分之一二。似乎在三十八度時爲最高。(化學書上似乎如此說。此書不在手。他日再爲文詳考。投之雜誌。)如此說果確。則我輩多用石羔。而不能完全溶解。豈非與少用石羔而能完全溶解。至飽和量相同乎。前時與一化學專家討論。他說石羔或能使血內增加鈣質。然亦不能據爲確論也。生從張壽甫先生法。最喜用石羔。而不得其故。他日當詳考之。

茲有一二問題請教。請即詳爲指教。生來羊僅月餘。見本地之藥商與中醫生。與敵處微有相異處。如其藥物多用水漂。藥味較淡。(亦非一概如此。須剪切者則多半如此。)醫生用藥。有極奇者。有用細辛(原味)十兩。川椒(原味)八兩。胡椒原味六兩。及其他辛熱之藥。動輒數兩一劑。合共二斤四兩云。(其他藥忘記其名。)服後甚安。且病愈云。此事由朋友傳說。生不知其病證。亦未見其處方。然當是眞事。又其他炮天雄(味淡)二兩。干姜(原味)兩半者。生則曾見其方。曾問其病。如此重量之姜附。服之不致中毒。且能愈病。生頗不解其故。是以急欲請教。

姜附一類之辛熱藥。服後是否可以引起腹部充血。而可使身體上部之炎症消失。如每見頭痛喉痛。(喉部不紅腫而大痛。其神經受何刺激。)兩額紅腫。有用大劑四逆湯而愈者。該頭喉痛兩額紅腫。豈非充血之炎症耶。何以可以重用姜附而愈。此與腸炎泄瀉下痢之虛症。用四逆而愈。是否相同。(泄痢久多見虛症)

每見發高熱症。(虛症舊醫謂陰爭於內。陽擾於外。)用姜附桂而熱退。請問何故。惲鐵樵先生曾解釋過。然非科學。終

不能明。東垣謂甘溫退大熱。其理如何。是否與此相同。

每見屬乾性之肺癆病人。不發熱。少咳。常見吐血。有薄痰。脈軟弱帶遲。（凡此病人多極高瘦。多在四五十歲曾患病。至二十年者。）須用姜附桂川椒波蔻砂仁一類辛熱藥。始能對症治之。熟地一類陰滯藥俱不宜。舊醫稱此為痰飲病。卽在吐血時仍須用附姜桂等。才能止其吐血。生頗不解其故。何以乾性肺癆後期。多成痰飲症。何以當其吐血時。可用姜附等止血。姜附爲強心逐飲之品。是否可以增加其細胞之活力。而使其血管之傷口能自收縮。

以上數問。俱一貫之理。請先生用科學解釋。

淵雷夫子答

石膏鹼性之云。當時似據湯本之說。其真正作用及吸收排泄情狀。今實難知。惟此藥用五錢以下殆不效用。一兩以上而無弊。（藥證相反者除外。）則藥湯中過飽和量之不溶解物。或亦發生藥效歟。以石膏一味煎湯。見其溷濁有沉澱。是所服之藥。乃非全部溶解。亦必有沈澱物在焉。似曾聞余雲岫亦嘗用此。乃未服而非煎服。其意可知。

用大量薑附辛熱之物。愚所見聞者甚多。有其病本無顯然之薑附證。竟投大量者。有雖具薑附證。依理未須大量。而竟用大量者。其結果病愈者有之。不愈亦不加劇者有之。病劇或致死者。聞見反少。不但辛熱藥。卽參耆補劑。亦有常用數兩乃至半斤許大量者。惟消黃一類。則未見重用之人。此等吾視爲中醫藥上一重疑案。不但重劑可疑。反之。輕劑亦可疑。藥量之輕。莫如鐵樵先生。晚年尤甚。荆防諸藥。皆以分計。鮮有用錢外者。其言曰。『藥雖對病。量重反不效。』西醫研

究中醫者。常病本草不載用量。而渴欲知中藥之極限量。意者。中藥竟無可極限歟。必欲求一說明。當不出於下二端。一者草根樹皮。本甚和平。其所謂毒藥。乃絕非砒藥之比。雖用之過量。人體獨能調節。二者。今人服藥。皆市諸藥舖。鄉村藥舖。選貨較低。效力自減。都市藥舖。選貨雖高。因欲美觀之故。漂浸使利於剪切。至再至三。效力亦減。若如古醫家自采藥自用之。又不經漂製者。恐不能質然用爾許大量也。至憚先生之輕例。乃類於待期療法。先生晚歲名聲既著。遇較重之病。輒辭勿為治。其受治者。心理上得所安慰。又對證之藥。雖較不無助力。是以不見其不效耶。乾薑川椒之類。依理當能令腹部充血。附子強壯興奮。似亦能引起充血。然其効力不局於腹部。而遍於全身。遍於全身則不能充血。何者。全身之血。祇有此量。充於此者。貧於彼。無從令全身悉充故也。至頭痛喉痛。用大劑四逆而愈者。乃別有說。非腹部充血之誘導作用。中醫法自有所謂陰證喉痛。其痛如刀割而不紅不腫。即腫矣。其色或淡或紫黑。不鮮紅。雖有頰紅等假證。乃是虛性興奮。中醫謂之「載陽」「格陽」。說詳金匱今釋中。既是陰證。故是四逆所治矣。此病與腸炎虛證。理固相同。然腸炎。吾以為與他處炎證不同。他器官熱則興奮。寒則麻痺。即不麻痺。得寒其機能必較減。惟腸之蠕動。得寒反亢進。得熱反衰減。此理因感寒之腹痛。及吸雅片人之便秘。推而知之。不知生理上。確然如此否。

所謂乾性肺癆。何名為乾。吾殊不知。若此種病。吾固嘗治愈一人。其人姓張。名柵。字小樓。為外交部老員司。嘗任朝鮮日本領事。年五十餘。病欬嗽吐血多年。經中西名醫無數。前年病亟。以為必死。因無子。乃來上海寄居其壻家。意蓋依壻料理身後事也。其人學佛而貧。問佛友有良醫而可以除欠者乎。佛友介紹吾往治。吾視之。無顯著之結核證。而有顯著之

痰飲證。乃告以病非癆。尙可治。所用不過蒼桂朮甘加附子之類。彼初懼附桂。不利吐血。告以此吐血不過氣管因欬震傷。非結核之比。大約其人先試半劑。覺無他。乃盡劑。又覺病減。始放膽服吾藥。病愈後。自作書畫謝吾。跋語有云。「治余二十餘年之略紅。決爲痰飲。服藥十九劑而愈。」今其人仍供職外交部。甚健好。遂爲友朋。此等病驟視頗似結核。然病經二十年。其手指不作鼓槌形。與常人無異。又因其腕部之自覺證。（證記不真。）故斷爲痰飲。乃體腔中某一種體液過贖之病。今閣下謂乾性結核。不知曾有驗菌之例否。若仍據外證。恐未確耳。既是痰飲。自宜燥熱芳香。不宜滋膩矣。抑乾薑桂枝。有時亦爲吐血要藥。傷寒今釋中。曾論及乾薑。近人治吐血。一味用甘寒。必有殺人者。

王文達問

何謂乳石毒

誦穆答

六朝時代之士大夫。迷信道家之說。喜鍊服若干種礦石。如石鍾乳雲母石英等。云餌之可以長生。實際上非但不得長生。且往往中毒。世謂之乳石毒。巢源千金千金翼外臺等。論此甚詳。

馬本良問

有一種木舌病。舌腫如木。腫而且脹。塞滿口中。堅硬如甲。憎寒壯熱。語言難出。飲食難進。此是何病。乞示。

誦穆答

此卽西醫之巨舌症。爲舌之淋巴管腫。



孫培文君來書

淵翁大國手先生有道。敬啓者。頃由上海雜誌公司。寄來大著中醫新生命一冊。讜言危論。欽折無似。暨讀覆魏先生書。並復中央國醫館意見函。益見先生之品格。超越凡流。議論主張。光明磊落。招人忌妬。自屬常情。夫學醫難事。前賢明訓。不才如修。乃欲妄事研究。亦多見其不自量耳。然而借助心切。何憚煩勞。對於應運而生之改進國醫書報雜誌。靡不揀選購讀。求如大作。能確實抱定以科學原理。糾正中國醫藥舛謬。闡發古義精微者。不數數觀。尤可異者。江南久負盛名之□□□。(聘充□□社社董。)乃抄襲陳修園非驚論。披露於堂皇之□□醫藥雜誌。炫爲己作。以欺讀者。不第暴示其鄙卑。無亦輕視中醫界無人乎。口誌如此。口名醫尙敢如此。其他概可想而知矣。再者。修久以中國醫籍論藏腑。右肺左肝之位置。舛誤不經。以之談診斷病理。當然不能確實。再以似是而非。捉摸不定之診象。竟能探討藏腑得病之由來而論。自欺欺人。稍明生理者。均能言其得失。若以修數年研究脈學及臨牀診斷。(間與家人偶患小恙時。百般診察。以討究竟。)之所得。則大謬不然。所謂兼脈。滑數弦緊芤革等等。大覺難乎其難。百思而不得其可以判別之標準。亦會以

此項疑問。請教於光華社。並晉省名醫之薛某。孰知亦無若何明確之解釋。光華徐君。即以肝雖居右。而病發於左。脾雖居左。而病即發於右。舍混答復。薛君對於診斷及兼脈等說。即抱定一部中國醫學史為藍本。引證解說。自鳴博學。究其結語。仍以神而明之。存乎其人。為不傳之祕。似若中國切脈斷病之學術。有神妙不能明言之勢。嗚呼。我國解釋藏腑。診斷脈理。是耶。非耶。果竟如斯簡單。可以寥寥數語。而盡之耶。修以為欲改進國醫學術。非由此根本入手。不為功。藏腑位置不定。所有言診斷也。病狀也。烏能正確。此種根本舛誤。不加糾正。而反大唱改進論調。其亦何以塞反對者之口。而望國醫或有一日可以科學化耶。况值茲理重實際之科學時代。僅恃氣化哲理。玄妙古說。欲擯棄一切。徒以雄辯勝事實。能耶否耶。修為探詢真理。希冀依據新學說。打破舊日迷夢。裨益學術。此不憚曉瀆四出。請益於諸明哲之侈愆也。近讀先生書。闡發中西醫理。透澈詳明。毫無假借。修區區久懸不決之質疑。當能慨示金針。釋我迷惑。謹書大略。敬求指教。

(一) 中國醫籍所論藏腑位置。如左肝胆小腸。右脾胃大腸。證以近世解剖上目驗所得之部位。諸多倒置。然則今日欲改進中醫。應從舊說耶。抑捨舊從新。較為確當歟。

(二) 中醫所定藏腑位置根本上既已舛誤。而診斷上以左手分配心肝腎。右手分配肺脾胃等說。當然不能成立。然而現今名醫諸醫案。猶本是理。津津樂道。究竟所言切脈病狀。是否可以為據。此種根本舛誤藏腑位置說。應否推翻。而依據切實可證之科學理論。另闢診斷上之途徑耶。

修以爲以上二問題。如能解決。所論病理診斷等學術。乃可迎刃而解。漸入光明之路。否則人云亦云。不了解。究於整理改進諸大端。有何稍益。而能堅人信仰。杜見仇者之所快耶。未附瑣事數則。敢請公餘先爲處理。以慰渴望。尤所企禱。後學孫培文謹呈

再啓者。貴室所組織函授中醫學辦法。注重講義耶。抑由學者隨意自修。僅負通函指導之責歟。希將詳細章則。檢示一份爲盼。(二)黃君所稱贊之章次公藥物學。已否出版。貴室可以代購否。(中略)(四)脈學輯要。每部售價若干。何處經售。可否爲研究脈學之確而有用之書籍。我國最近。有無運用科學方法。解釋中國診斷學術。不涉空泛精切適用之著作。有則。敢祈指示一二種。醫界黑暗。欣逢明燈。因緣機會。能覺我數年迷夢。歡慰爲何如耶。是以敢冒不韙。瑣瀆至再。尙望覽諒。愚忱。進而教之。後學孫培文又呈。

答孫君培文

手示祇悉。中醫學說之不安帖處。不僅所示兩端。惟此兩端。尤顯然繆誤。人人見到。獨所謂中醫者。猶不恤百計曲說。以迴護古人耳。今就鄙見所及。答如下。當否幸自擇。

(一)中國固有之學術。以道家爲最高。道家之學。始不過清靜謙退。爲君人臨上之術。其後雜入方士。有爐鼎鉛汞長生之術。中醫所奉爲至寶之內經。乃亦戰國道家所爲。惟其道家。故託於黃帝。其左肝右肺等說。蓋亦道家修練所用。初非生理之本。然中世名醫。如皇甫士安孫真人之徒。皆以道士爲醫。故內經之說遂通行。此所謂醫經家者也。至於經方

家。乃不屑屑於臟腑部位。甚至並不按斷爲某臟某腑之病。惟務「依證用藥。」伊尹湯液經仲景傷寒論。蓋皆如此。此一派。全憑經驗用藥。言其然而不言其所以然。後人依其經驗。可以愈病。就其依證用藥之法。用生理病理藥理諸新說推證之。可以確得其所。以然之理。是以鄙人治醫。主張用新學研究經方。姑置醫經不問。庶幾學術實際有進步。不爲道家玄妙難曉之說所束縛也。且經方道家之說。縱使別有其理。要非人人可學。人人可能者。是以師徒遇合甚難。而良醫乃曠世一見也。今之醫學。須自喻喻人。可以教授中資。則舍經方及科學外無他途。其醫經一派。不妨聽能者於醫學外別行研究。至市醫拾醫經語句爲案斷者。吾知其非真能曉醫經者也。抑中醫之癥結。不獨在臟腑部位。尤在其功用。後世不知學術派別。混經方醫經爲一家。相循至宋元。以迄清季。遂成世俗心目中之所謂中醫學。其學雖餽餽雜脍不足道。然行世最久而最廣。驟難捫絕。且披沙簡金。亦時有精蘊。於是不得不爲整理。僕認爲整理中醫。莫先於術語及臟腑功用之解釋。而裝點門面如病名藥名之統一。乃屬最後末節。不圖國醫館舍本求末。偏欲從統一病名入手也。敝處遙從講義中之生理補證等編。不獨用以教學。亦爲整理上最先要着。新生命中披露一二。閣下試閱之。加以批評。匡其不逮。幸甚。

(二)經方家治病偏重證。間參以脈。脈初無左右分部之說。而甚簡單。不若後世之繁複。卽左右分部。亦約有三說不同。內經王叔和李瀕湖是也。此等當然不足據。脈學輯要雖是舊說。要爲言脈最簡明切要之書。作者丹波元堅。學問通貫。絕非中土醫家(惟徐靈胎差可比肩)可

比也。書不知能得否。若有。價當不出二元。

其他新出書。雖有揭藥科學整理者。以僕視之。似皆未能名副其實。

答楊篤因

書悉。本經疏證。究竟是做文章。算不得切實說藥性。現在未有完美藥書。可先買本草備要（汪昂撰。通行本石印木版。各處俱有。易買）看之。每藥另有小字提要。或二字。或四五字。易記得。若有數藥類似。則從原文大字中細辯別之。例如來書所舉犀角羚羊。實大殊異。人以其同是貴藥涼藥。故等視耳。犀角專屬血。羚羊專屬風。風者神經證狀也。犀角固亦治風。然由涼血而間接的。羚羊是直接的。又犀角惟其屬血。故有解毒之功。毒多在血中故也。羚羊則無此功。就吾所論。於備要中尋之。當能例推至他藥之區別。講義只餘小部分未成。

代	郵	補	白
有署名新生命讀者。投函本刊。謂鈎尖力薄。何以止用四分。案新生命十一號三十三頁十二行。及三十四頁四行。鈎尖四分之分。應作錢字。係謄寫之誤。		流行病須知。刊登於二十一年出版之醫報。	

本刊徵求定戶

本刊原為不定期刊物。茲應讀者之要求。並請郵局掛號。從第二號起。改為定期刊物。每月出一號。月底出版。

本刊第一號業經再版。仍贈閱。索閱者請開具姓名地址。附郵票五分。即寄贈一冊。空函及汗損之郵票。恕不照贈。第二號以後照下開定價表發售。

遙從同學定閱者。照定價八折取費。
外埠定閱。最好用匯票。郵票以上海通用。(四川郵票限本省用者不收)一角以內者為限。請用蠟紙黏帖。仍作九五折計。

中醫
華民國廿五年三月三十日再版
華民國廿四年八月三十日出版
醫生命第十二號

不許轉載

主任兼 陸淵雷
編輯 謝誦穆
編及 陸淵雷醫室
發行處 上海估獄路人安里

本刊廣告價目

四分之一面	半面	全面	一期	三期	六期	十二期
三元	五元	十元	每期	每期	每期	每期
二角四分	四元	八元	每期	每期	每期	每期
八角	三元	六元	每期	每期	每期	每期
一元五角	二元五角	五元	每期	每期	每期	每期

裏封面底面及顏色紙加
頁均照表加
半均用銅加
諸版者另加
製版費另加
顏版印者另
議刊費先惠

定價	本刊
一角半	一號
七角半	六號
一元四角	十二號
國外每十二號一元	郵費國內不加

陸淵雷著 金匱今釋

印行報紙西裝本
廉價發售

此書初印千部。現已將次售完。頗有寒士愛讀。來函要求另印廉價本者。因改用報紙兩面印。西裝兩厚冊。書品較原印連史本爲小。一切以價廉爲目的。然內容與原本完全一樣。印刷裝訂。雖不求美觀。但仍求清朗堅實。實價四元二角。較連史本價廉一半。郵費二角。國外酌加。

發行處

上海牯嶺路人安里十一號陸淵雷醫室

電話九三二八六

介紹 慈谿魏氏驗案類編初集

作者魏文燿先生。精學精醫。爲人治病。必詳記其治療之經過。以備考校。歲久成帙。益爲四卷。顏曰魏氏驗案類編初集。其書認證正確。用藥恰當。初學讀之。足爲臨床之臂助。鉛印洋裝兩冊。連郵一元。浙江慈谿城內回生堂經售。