

醫方類聚卷之二百三十八

婦人門 三十三

產後九

瑞竹堂方


治婦人吹妳

鼠糞五十粒麝香壹字

右為細末食後用熱酒壹盞調服立愈衛生

易簡方同

治產後血痢生姜不拘多少切作小棊子片



以麪拌 和捏成毬子慢火炒令焦黃研  
為細末米飲湯調三錢空心服

產後血塊腹痛

京芎炒 ○南北經驗方 川當歸炒 乾地黄  
洗○玉機微 芍藥已上各半兩 ○蒲黃分  
義熟地黄 鈹內隔 紙炒赤

右同為細末每服三錢空心溫湯調服

拔粹方

三之壹湯治產後虛勞雖日久而脈盛浮疾

柴胡八錢 黃芩 人參 半夏洗 甘草炒 川

芎 芍藥 熟地黄 當歸各參錢

右為籠末依小柴胡湯煎服 如日久虛

勞微有寒熱脈沉而遲宜柴胡四物湯珍

方右咬咀每服八錢木二盞生薑全  
片棗膏枚煎至八分去渣溫服無時

加減羌活湯治產後頭痛血虛氣弱痰厥皆  
能頭痛

羌活 川芎 防風 附子炒 熟地黄各  
兩白芷壹兩 石膏二兩 細辛二錢 當歸五錢 甘

草五錢 蒼朮去麤皮 壹兩半

右為麤末每服壹兩水煎服無時 如有

汗者是氣弱頭痛也前方中加芍藥三兩

桂一兩半生姜煎 如痰癖頭痛加半夏

三兩茯苓壹兩半生姜煎 如熱頭痛復

加白芷三兩石膏三兩知母壹兩半 如

寒厥頭痛加天麻三兩附子壹兩半生姜煎

荆芥散治產後血風眩脊精神昏昧

荆芥穗一兩 桃仁五錢炒

叁錢 去尖

右為細末溫水調下三錢 如微喘加杏

仁炒去尖 甘草炒二錢半 同煎

產後三證

產後往來寒熱而脉弦者少陽也小柴胡加

生地黃湯

柴胡二兩 黃芩七錢半 徐氏人參 五錢 夏

壹兩五錢 甘草七錢 大棗叁枚 生地黃 梔子

枳殼五錢 麩炒各

右如前修服○胎產方右吐咀每服一兩

薑五片煎熱服

產後虛煩不得眠芍藥梔鼓湯

芍藥 當歸 梔子 各五 香鼓 半

右如前修服 徐氏胎產方右吹咀 產後傷

寒便同下後變證

產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

產後虛損食飲不下加建中人參白朮茯苓

諸虛不足飲食不進加建中湯

產後血痢臍腹痛四物內加槐花黃連御

米殼等分

產後血崩如豆汁澁黑過多者加蒲黃生地

黃汁阿膠薊根艾白芷痢臍腹痛大便

自利經事類併加白芍藥

經効方治產後中風腰背強直時時反張名

曰風痙

防風 乾葛 川芎 地黃 各二 麻黃 去

甘草 桂心 獨活 羌活 秦艽 防

巳 各四 杏仁 五十介去

右咬咀每服壹兩水煎有汗者不可服小續命湯連進數服愈

又方治先患冷氣因產後發腹痛

芍藥 桂心 當歸 茯苓 吳茱萸

芍藥 甘草 各壹兩半 桃仁 二兩半

右咬咀水七升煮取二升去滓分三服類

鈐方同

治腹中絞痛不可忍

延胡索 當歸 白芍藥 川芎 乾姜

各等分

右為末每服三錢溫酒調下神效名方同

桂心丸治產後血氣不散積聚成塊上攻心

腹或成寒熱四肢羸瘦煩疼

青皮 乾黍 炒烟盡各七錢半 沒藥 檳榔 當

歸 桂心 赤芍藥 牡丹皮 各半兩 大黃

炒桃仁 尖皮 鱉甲 酥炙 厚朴 製 三稜 煨 延胡

索 各壹兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服三四十九

溫酒下

黃耆丸治產後蓐勞寒熱進退頭目眩痛百  
骨節疼疲氣力羸乏

黃耆 鱉甲 當歸炒各兩 桂心 白芍藥

續斷 川芎 牛膝 菴蓉 沉香 栝

子仁 枳殼各七錢半 五味子 熟地黃各半兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服四五十九  
粥飲下食後

療產後嘔吐不止

橘紅兩一 半夏兩 甘草各半兩 藿香各兩

右為細末每服三錢姜三片水煎

黃連丸治產後赤白痢腹中絞痛不可忍

黃連四兩 阿膠 蒲黃 梔子仁各壹兩 當歸

壹兩 黃芩二兩 黃蘗叁兩

右為細末煉蜜為丸桐子大每服表半丸  
米飲下日三夜一

立效方下乳汁

粳米 糯米各半合 藜蘆子一合並淘淨 生甘草

半兩

右煎汁壹升研藥令細去滓分作三服立下

增損柴胡湯治產後經水適斷感於異證手足攣搐咬牙昏冒繫屬上焦

柴胡刪錢○袖珍方一錢黃芩四錢人參參錢甘草四錢

炒石膏錢四知母錢三黃耆錢五半夏錢半

右為麤末每服半兩生姜棗同煎○袖珍方右咬咀每服八錢生姜二片棗壹枚煎

至八分去渣溫服無時

秦艽湯前證已去次服此以去其風邪

秦艽捌錢芍藥半兩柴胡捌錢防風錢黃芩各四錢

人參半錢各參錢炙甘草四錢

右為羅末水煎

荆芥散二三日後經水復行前證俱退宜此

小柴胡湯一料加荆芥穗五錢 枳殼炒

去穢五錢

右為麤末同小柴胡煎法

防風湯三二日後宜正脾胃之氣兼除風邪

蒼朮四兩防風參兩當歸兩羌活壹兩

右為麤末水煎

三分散治產後日久虛勞針灸小藥俱不効

者神效名方治產後虛勞不進飲食或大崩後

川芎 熟地黃 當歸 芍藥 白朮

茯苓 黃耆已上各壹兩 柴胡 人參各壹兩

黃芩 半夏名方洗切 甘草各六錢

右為麤末水煎服清○袖珍方右咬咀每

服八錢水壹盞半生薑三片棗一枚煎至

八分去滓進口食前服名方右為麤末每

服一兩水壹大盞煎至半盞去滓溫服日

二服

血風湯治產諸風痿攣無力

秦艽 羌活 防風 白芷 川芎 芍

藥 當歸 地黃 白朮 茯苓各等分 加

半夏 黃耆

右為細末一半為丸煉蜜如桐子大壹半

為散溫酒調下丸藥五七十九

治血運血結或聚於胃中或偏於少腹或運

於脇助四物湯四兩倍當歸川芎鬼箭紅

花玄胡各壹兩同為麤末如四物湯服清

調

沒藥散服之

蟲蟲去羽足壹錢微炒水蛭二錢炒麝香少許沒藥一錢

右為細末煎前藥調服血下痛止只服前

藥

加減四服湯治產後頭痛血虛氣弱痰癖寒

厥皆令頭痛

羌活 川芎 防風 香附子炒各壹兩細辛

膏香白芷壹兩半蒼朮一兩六錢去皮

右為齋末每服壹兩水煎 如有汗者是

氣弱頭痛也前方中加芍藥三兩桂壹兩

半生姜煎 如頭痛痰癖者加半夏三兩

茯苓一兩半生姜煎 如熱厥頭痛加白

芷二兩石膏三兩知母壹兩半 如寒厥

頭痛加天麻三兩附子壹兩半生姜煎

四物湯治諸變證方見通治

紅花散治婦人產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣皆治之

乾荷葉 牡丹皮 當歸 紅花 蒲黃

炒各等分

右為細末每服半兩酒煎和滓溫服如衣不下別末榆白皮煎湯調下半兩立効當歸散治婦人惡物不下

當歸 芫花炒

右為細末酒調三錢

又一方好墨醋淬末之小便酒調下

治妳汁少

芫萋根 薄荷幹身等分酒調服

右為籠末先喫羊骨汁壹椀次服藥後再喫葱孫羊羹湯少汗出効

醫方大成

濟生方八珍散治產後血迷心竅言語不正

狀如癲狂

人參 石菖蒲 生地黄 川芎 各壹兩 朱

砂 別研 防風 去蘆各半兩 細辛 淨洗壹錢 〇 承 甘

草 炙半兩

右為末每服壹錢薄荷湯下不拘時地黄

多戀膈脾胃不快者以當歸代之 醫方集成南北

經驗方補珍方同

濟生方黑龍丹治產後敗血衝心不省人事

狂言如癲

五靈脂 當歸 去蘆酒浸 生地黄 川芎 高

良姜 剉各叁兩

以上剉入沙鍋內紙筋搥泥固濟炭火

煨令通紅火冷取出細研入後藥

百草霜 乳香 生硫黃 琥珀 花藥

石

右五味壹兩壹錢細末同前藥和勻米醋

煮麵糊圓如彈子大每服壹圓服時再入

炭火煨藥通紅入薑汁內浸碎以無灰酒

合童子小便頓服神效不可迷醫方集成

方袖珍方永類鈴方同

醫方集成

濟生方橋杏丸治產後體弱大便虛秘南北經驗

方袖珍方永類鈴方同方見大方科大小便門

濟生方黑龍丹治姪娠胎產臨生或胎衣不

下

產後血暈不省人事及惡露不盡腹中刺

痛血入心經語言恍惚並宜服之南北經驗方袖

珍方永類鈴方同方見醫方大成

濟生方當歸羊肉湯治產後發熱自汗肢體

疼痛名曰蓐勞永類鈴方發熱自汗肢體疼

椒鹽醋作粥佳

當歸去蘆人參各七錢黃耆去蘆生薑半兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉

入前藥煎四盞去滓作六服早晚頻進北

經驗方袖珍方同

南北經驗方

徐同知經驗加減四物湯治婦人諸虛不足

當歸酒浸壹宿熟乾地黄 白芍藥 川芎各一兩

右收咀為剉散隨病證加減後藥煎服

血氣不調加吳茱萸壹兩甘草半兩 胎

動下血加熟艾一塊阿膠七片末一錢

補下元加乾姜半兩甘草七分 血崩淋

瀝不斷加炮附子壹个赤白石壹兩 便

血及帶下加荆芥地椒油珍方地榆血氣滯腹

內刺痛加桂 產後傷風頭痛加石膏壹

兩甘草半兩 血風勞加荆芥柴胡 潮

熱加前胡子乾葛人參黃芩 虛熱口乾

加門冬半兩黃芩壹兩 嘔吐不止加藿

香白朮半兩人參壹錢產後虛憊血熱煩

悶加生地黃 產後腹脹加枳殼肉桂各

三錢 產惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛

膝 產後寒熱往來加柴胡門冬各半兩

經血淋瀝不斷加乾瑞蓮房炒入藥 血

滯不通加紅花桃仁各一分 大便閉加  
大黃桃仁各一分 產後悶亂加伏神遠  
志各半兩 虛而多汗加煨牡蠣麻黃粉  
各半兩 妊娠心腹加竹茹一塊 如有  
敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟  
地黃以生者

徐同知神仙索金散治婦人產後血暈血虛  
積血不散寒熱往來鬲不快氣喘不進飲食  
骨節疼痛生血肌瘡山藥逐惡血生新而止

肚痛

金膝 川牛膝 當歸 川芎 麻黃  
玄胡索 官桂 神曲 荆芥 粉草  
赤芍藥 熟地黃 雄墨豆 各二兩  
爲末溫酒調或當歸童子小便任下 方 袖珍

袖珍方

產後衆疾

四味湯療產後一切諸疾纔方分免一服喫  
尤妙

婦科  
卷之三  
一十三

當歸 心膈煩 玄胡索 氣悶喘 血竭 惡露不

錢 沒藥 心腹撮痛

右等分爲末每服抄半錢用童子小便壹

盞煎○水類鈴方右爲末每一錢童便壹

盞煎六分通口服

當歸散療產後氣血俱虛慎無大補恐增寒

熱別致他病常令惡露快利爲佳

當歸 芍藥 川芎 黃芩 各壹兩 白朮 五錢

右爲末每服二錢溫童便或酒調下

橘香散治乳雍未破卽散已結卽潰極痛不

可忍者藥下卽不疼神驗歌云謂因小兒

吹妳變成右以陳皮去白日于面炒黃爲

末麝香研酒調下二錢

治婦人吹妳奇効右用大車頭邊油垢九楮

桐子大每服五十九溫酒下

枳實芍藥湯治產後腹痛煩滿不得卧

枳實 燒存性 芍藥

右咬咀等分每服八錢水一盞半煎至八

分去渣溫服無時

治產後生腸不收右用枳殼煎湯溫浸良久  
卽入

治婦人子宮不收

荆芥 藿香 臭椿皮

右咬咀等分煎湯薰洗

治婦人子宮大痛不可忍

五倍子 白朮

右爲末溫湯泡洗干摻亦可

血竭破棺丹治婦人產後血閉血迷血運血  
勞嗽血男子傷力勞嗽吐血皆可治之

乳香 血竭 箭頭砂

各壹錢

右爲末巴豆仁研泥爲膏磁器盛之如用  
丸如雞頭大婦人狗膽冷酒下男子冷酒  
下

返魂丹治婦人生產一十九証

野天麻四五月間紫衣花時將花葉子陰  
乾右將天麻搗末煉蜜丸如彈大服一丸

類身言  
十一  
隨飲子下 一子死腹中大爲卒病臟腑  
熱極其胎是子死蓋子死不居子宮墜胎  
腹間冷痛小便沫出腹脹四肢逆冷爪甲  
青是也臨產時服此一丸安魂魄血氣自  
然調順諸病不生破血補虛止痛養血調  
經童便酒各停煎沸溫化下 一產難者  
胎成形食母血十月足餘血結塊俗呼兒  
枕欲產時血塊先破敗血裏子是難產或  
產後惡血不盡臍腹刺痛惡露上衝童便

酒各停化下 一產時面垢顏赤衣不下  
產了臟腑虛羸五心煩燥敗血入衣中衣  
難不發寒熱有冷汗出但去其敗血衣自  
下如帶斷服此效或橫生不順心悶欲死  
童便酒化薄苛自然汁鹽湯下 一產後  
三四日起卧不得眼前黑暗生花蓋血氣  
未定運走五臟入肝則目昏俗爲暗風醫  
家以風治之或血熱口乾煩渴心正亂如  
見鬼神狂言不省人事童便酒薄苛汁亦

妙 一產後口乾心悶煩渴七日來血氣  
未定食熱麵與血結積滯在心是致熱煩  
渴俗爲胃膈壅塞太陽沉痛呵吹怔忡氣  
短肌體羸瘦不思飲食血風手足頑麻身  
熱百節疼痛不可忍者溫米飲下依前化  
下 一產後四肢浮腫及寒熱者蓋敗血  
流於五臟滲入四肢停留日久化爲膿狀  
氣喘小便澀或咳嗽胃膈不利惡心口吐  
酸水兩脇疼痛舉發失力酒下 一產後

寒熱往來蓋因敗血入心則熱入脾則寒  
瘧疾狀是也如或濟腸作痛或作聲米飲  
湯下桂枝湯亦可蒸 一產後中風牙關緊  
急半身不遂失音不語童便酒依前化下  
一產後大便秘結口苦煩渴非時不語以  
敗血衝心而秘其心孔童便酒化下薄葺  
自然汁亦可 一產後痢疾因未經月滿  
或食冷物下與血相攻擊別有所積受溫  
如此瓊湯煎亦可 一產後身體疼痛百

妙 一產後口乾心悶煩渴七日來血氣未定食熱麵與血結積滯在心是致熱煩渴俗爲胃膈壅塞太陽沉痛呵吹怔忡氣短肌體羸瘦不思飲食血風手足頑麻身熱百節疼痛不可忍者溫米飲下依前化下 一產後四肢浮腫及寒熱者蓋敗血流於五臟滲入四肢停留日久化爲膿狀氣喘小便澁或咳嗽胃膈不利惡心口吐酸水兩脇疼痛舉發失力酒下 一產後

寒熱往來蓋因敗血入心則熱入脾則寒瘧疾狀是也如或濟腸作痛或作聲米飲湯下桂枝湯亦可 一產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒依前化下一產後大便秘結口苦煩渴非時不語以敗血衝心而秘其心孔童便酒化下薄苛自然汁亦可 一產後痢疾因未經月滿或食冷物下與血相攻擊別有所積受溫如此棗湯煎亦可 一產後身體疼痛百

節開張血流入臍中停留不散疼痛溫米  
飲下 一產後崩中漏下不止者蓋是傷  
酸物狀如鷄干脊背悶倦煎糯米秦艽湯  
當歸桂枝湯亦可 一產後未經月滿血  
氣不通蓋因月水未通或食熱麪壅結成  
塊喘嗽四枝無力睡而汗出不止月水不  
調久而不治成骨蒸勞服此後幼童便酒  
依前化 一產後吐逆不止敗血停於脾  
胃卽發吐逆胃膈虛脹俗呼翻胃酒化下

一產後赤白帶下煎秦艽湯下加糯米同  
煎炒

### 三不治證

一產後氣急喉中貓聲因敗血衝心入喉  
中萬無壹生 一產後中風者蓋自七日  
未滿勞動百日之中傷房事中風初病之  
狀眼澁腰強筋急角弓反張牙關緊急若  
此者非外也自傷死也 一產後面色黃  
及遍身黑靨者乃敗血入皮膚百無生矣

○經驗良方治婦人胎前產後諸疾危證  
此係吉安文江高師禹備財禮求名醫而  
得之後施此藥獲安而得活者多人能依  
法合施亦陰德事也其効神妙右用赤  
箭野天麻葉似艾葉開紫花如紅蓼花形  
名茺蔚子是也又名益母又名益明又名  
大札又名貞蔚又名負擔四五月採取陰  
乾用葉及花子磁器研爲末煉蜜丸如彈  
子大隨後治證嚼服其根燒存性爲末酒

調服功與黑神散不相上下胎前臍腹  
作痛或作聲者溫米飲下胎前產後臍腹  
刺痛胎動不安下血不止水煎秦苧糯米  
湯下或當歸湯亦可如產時徐氏胎產方如產後  
先用一丸以童子小便化下安魂定魄氣  
血自然調順諸病不生又能破血止痛養  
脉息調經絡溫酒下產後胎衣不下落  
在胞中及橫生不順死胎經日不下者脹  
滿腹中心悶心痛炒搥湯下產後中風

牙關緊急半身不遂失音不語童子小便  
無灰酒各半下 產後咳嗽胃膈不利惡  
心口吐酸水面目浮腫兩脇痛舉動失力  
者溫酒下 產後兩太陽痛呵欠心忪氣  
短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑  
麻百節疼痛溫米飲湯下 產後眼前黑  
暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不  
省人事薄荷自然汁如無生者濃煎薄荷  
湯下及童子小便酒各半亦可 產後垢

面顏赤五心煩熱或結或血塊臍腹奔痛  
時發寒熱有冷汗者童子小便酒各半下  
溫薄荷自然汁下亦可 產後餘血惡露  
不盡結滯腸臍刺痛惡物上衝心胃主悶  
者童子小便酒各半下 產後大小便不  
通煩燥口苦者薄荷自然汁下如無生薄  
荷濃煎薄荷湯下 產後瀉血者水煎棗  
湯下 產後白帶下者煎膠艾湯下 月  
水不調溫酒下 血崩漏下溫酒下 婦

人久無子息溫酒下服至十丸二十凡亦  
能注喜

荷葉散療產後惡露不下腹中疼痛心神煩

悶

乾荷葉二兩 鬼箭壹兩 桃仁半兩 劉寄奴 蒲黃

各壹兩

右咬咀每服三錢童子小便壹大盞生姜

三片生地黃壹分同煎

延胡索散治產後兒枕腹痛効

延胡索

當歸

琥珀

蒲黃

各壹分

芍藥

五錢

肉桂

叁分

紅藍花

二錢

右爲末童子便合酒溫酒調三錢食前服

漢防已散治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防已

猪苓

枳殼

桑白皮

各一兩

陸 甘草

各叁分

右咬咀每服八錢水壹盞半生姜三片煎

至八分去滓溫服無時

三分散治產後日久虛勞針灸服藥俱不效

者方見拔

千金散治証同前

大黃四兩 麥蘖一分 小茴香 枳榔頭 瞿麥

篇蓄各五錢 槐鵝 血竭各叁錢

右末每服八錢熱酒調下一服三次調服

如乾血氣先服前藥壹丸至三更熱酒調

下六分下藥時看病人虛實用如無前藥

可服一兩重其効皆同天明取下血片服

白粥三二日

承類鈴方

漏蘆散乳婦氣脉壅盛乳脉不行及經絡凝

滯邪毒脹痛作癰

漏蘆二兩 蛇蛻十條 栝樓十介急火燒

右為末酒調二錢一方有牡蠣並燒存性

壹方只用牡蠣煨為末酒調

一方治同上

葵菜子炒 砂仁分

右細末熱酒調

連翹湯治妬乳并癰

方見千金方

又方以生地黄汁塗服前藥以有熟証當詳

虛實

產後顛狂用小柴胡湯加生地黄同煎百餘服安又有服逍遙散加遠志桃仁蘇木紅花每服加乙錢重服後安再服平胃散安此理血而後理脾者○經驗良方廬陵北鄉劉秀才妻產後或然顛狂醫者投以鎮心之藥乍愈數日復發里中胡倉使乃宋

登科人也善醫遂命胡倉使診其脉曰補藥實其心矣此病難治 又一婦人產後

顛狂未服補心藥胡倉使以小柴胡湯加

生地黄同煎日三服凡服百餘服而安以

後生產如故小柴胡湯

方見傷寒門

又一婦人

不因產而患顛疾歌唱無時踰墻上屋經

壹月餘或以爲祟治不安遇一巫人觀之

曰非祟也令服局方逍遙散每服加遠志

去朴仁

去皮尖

蘇木紅花各壹錢重用水壹

藥集卷之八

三十五

盞半煎壹盞服後病退却用平胃散內減  
 厚朴三分之一加生蒼朮二倍川升麻等  
 蒼朮壹半川壹盞半水煎壹盞服之全安  
 須常服前平胃散百餘日以絕前患  
 傷寒括要當歸散產後氣血俱虛慎勿大補  
 恐增客熱致他疾常令惡露快利  
 當歸 芍藥 川芎 黃芩 各壹兩 白朮 半兩  
 右細末童便或酒調二錢  
 琥珀散治產後壹切危急之疾

琥珀 朱砂 麝香 香墨 醋炙 殭蠶 當歸 各壹兩 鯉魚鱗 炒焦 桂心 百草霜 白附子  
各壹兩 梁上塵 炒令烟出篩淨各半兩  
 右細末炒生薑熟酒調二錢奇效  
 許仁則方治產後雖甚通利但心腹滿悶脇  
 脹咳嗽不食大便不通眼澁行坐心腹時痛  
 白木 當歸 桑白皮 大黃 各參兩 細辛  
 桂心 各二兩 生薑 四兩  
 右咬咀水二升煎壹升分三服當得利微

卽止大黃產後不可輕用此緣病熱不得已也

花藥石散治產後惡露不盡迷暈氣絕胎衣不下胎死腹中心頭尚暖兼治金瘡打傷○簡奇方治產後氣欲絕緣敗血不盡血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭暖急以童子小便調一錢取下惡血如猪肝終身無血風血氣疾膈上有血化爲黃水卽吐出或小便中出也若先下胎衣則泛

泛之藥不能達若先治血悶則尋常之藥無此功無如此藥有兩全之効也

花藥石

青斤

上色硫黃

四兩

全用黃豆代煎

右二兩拌勻紙筋和搗泥固濟瓦罐子壹个候乾入藥密泥封口候乾安在四方磚上書八卦五行字以炭壹秤籠疊周匝自巳午時從下生火漸漸上徹直至經宿火冷炭盡又放經宿罐冷取出細研絹羅至細麤合收之若金瘡打傷體出血者急以

糝之其血自化為黃水血入臟腑熱煎童  
便入酒服婦人產後敗血諸證並用童便  
調下

牛膝散妊娠五六月墮胎胞衣不出

牛膝 川芎 朴消 蒲黃各送桂心兩

當歸兩半

右和末每四錢姜三片生地黃壹分煎溫

服

和刺芎歸湯加減治產後去血過多暈煩不

醒

當歸洗川芎各等分腹中刺痛加白芍藥

煩渴加烏梅麥門冬 發寒熱加乾姜白

芍藥水停心下微有嘔逆加茯苓生薑

虛煩不眠加人參竹葉 大便閉澀加熟

地黃陳皮杏仁 小便不利加車前子

腹脇膨脹加制厚朴 血崩不止加制香

附子 咳嗽痰多加紫苑半夏生薑 腰

脚痛加牛膝 心下疼痛加玄胡索 惡

露不下腰腹重痛加牡丹皮

產後惡露不下惡露口  
盡見枕

和劑生料五積散產後惡露不快腹痛或有

塊及發寒熱加醋少許煎通口服亦治血

崩方見大方  
科傷寒門

產後惡露不盡結聚小腹疼痛

當歸參分香附子制一兩琥珀一兩沒藥一兩青皮

赤芍藥一兩木香一兩桂心各半兩

右細末以烏豆淋酒調二錢

惡露敗血走刺心腹兒枕痛坐卧不得

乾薑參分燒盡  
餅中存性附子半介

右細末童便調痛止血下

產後餘血搶心痛腹痛脇脹痛身  
痛腰痛脚氣

千金治產後餘疾腹中絞痛瘦乏不下食

當歸一兩黃芪一兩芍藥各六分乾地黄一兩白朮

各八分桂心各四分甘草各四分大棗十四介

右咬咀水二升煮八合空心二服忌生葱

姜黃散治產後腹痛

沒藥壹分姜黃末叁分

右水同童便各半煎通口服立止

經效產後血氣脇肋脹痛

當歸十二分芍藥 苦梗 檳榔 枳殼制各

八分桂心 青木香 柴胡各六分

右咬咀水二升煎八合空心溫分二服

濟生增損四物湯產後陰陽不和乍寒乍熱

惡露停滯亦令令寒熱但看小腹急痛為

異方見三因方

又方小烏沉湯燒荔枝核灰研和服

黑龍丹產後惡露不盡腹中刺痛方見大科癰癩門

治產後風冷腰痛者腎繫於胞脉腎主腰也

獨活 川芎 芍藥 桂心 續斷 生

姜 桑寄生各六分當歸 防風各八分

右咬咀水三升煮壹升空心分二服

如神湯治男子婦人腰痛

延胡索 當歸 桂心各等分壹方無當歸有杜仲

右剉味溫酒調二錢空心兼服生料五積

散加桃仁亦妙逐敗血去風濕  
小續命湯治產後熱悶掣縱驚悸心煩嘔吐  
氣上為脚氣之證宜服之加木瓜煎或畏  
附子者宜服獨活寄生湯濟生若嘔者去  
地黃倍加生薑

產後中風諸證

中風證治具見鈴方至於產後血氣俱虛所  
下過多虛極生風有暴虛胃悶汗出不省或  
口噤背強發癩狀搖頭馬鳴角弓反張汗出

如雨不止變成瘧者

有心血不統諸臟俱虛心驚恍惚狂言譫語  
如見鬼神眩暈昏悶不語者治各不同

大全集小續命湯治中風剛柔二瘧見和劑諸風

門又引三因方云產後汗出多變瘧服此

湯有麻黃肉桂防己黃芩不若大豆湯然

活人書言凡剛柔瘧小續命並可加減若

柔瘧自汗者有去麻黃加葛根之說古人

之意當詳於此

活人桂枝加葛根湯治白汗口噤角弓反張  
 名柔痙桂枝加葛根麻黃治無汗口噤角  
 弓反張名剛痙葛根湯二方見活人書  
 千金治產後風虛汗出不止小便難四肢微  
 急難以屈伸

甘草炙附子炮半桂心芍藥各壹兩半

右咬咀每三錢姜四片棗一個水煎空心  
 溫服忌猪肉冷水生葱

經效產後汗出不止

黃芪分白朮牡蠣茯苓防風

麥門冬去心生地黃各八分大棗七

右咬咀水二升煎七合空心分溫二服

和劑大聖澤蘭散治產後因驚收血冲心昏  
 悶發狂如有神祟凡產前產後諸病通治

澤蘭葉石膏研各二兩白茯苓卷栢栢

子微炒防風制厚朴細辛淨桔梗

吳茱萸泡炒各一兩人參藁本乾姜炮五

味子白芷川椒開口者炒出汗白朮黃芪

川烏炮丹參各一分當歸制燕萸赤甘草微炒

炙川芎芍藥各一分生乾地黄一兩肉桂一分白薇兩阿膠炒半兩

右細末每二錢空心臨卧熱酒調下加辰砂末一字煎酸棗仁湯調膏服安

琥珀地黄元治產後惡露不行增寒發熱如瘧晝日明了暮則譫言當作熱入血室

琥珀別研延胡索糯米炒當歸各一分蒲黃四兩

煨生地黄裂汁生薑各二斤研汁留滓以香姜汁石器內炒地黄

澤以地黃汁炒姜滓各令汁乾

右為末蜜元彈大空心當歸湯化下兼服四物湯只用生地黄加北柴胡煎未退小柴胡加生地黄黃芩

栝子仁散產後血虛挾邪攻心狂言亂語栝子仁遠志人參桑寄生防風

琥珀別研當歸炒生地黄焙甘草等分

右粗末先用白羊心膏个切片水壹盞煮九分去羊心入藥末五錢煎無時

頭聚重天

三五

茯神散產後血邪心神恍惚言語失度睡卧不安

茯神兩 人參 龍齒研 琥珀研 赤芍藥

黃芪 牛膝各一分 生地黃一兩半 桂心兩

右為末每三錢水煎溫服無時

七寶散初產後調和血氣補虛安神壓驚悸

辰砂研 桂心 當歸 川芎 人參 茯

苓 羚羊角燒存性 乾姜錢

右為末每壹錢用羌活豆淋酒調 心煩

熱悶加麥門冬去心更加痛童便調 心

胸煩熱即減姜桂冷即加之 腹痛加當

歸 心悶加羚羊角 心虛氣怯加桂心

不下食或惡心加人參 虛顛加茯苓

一方產後心虛驚悸神思不安

龍齒 黃芪 白薇 生地黃各壹兩 人參

茯神 遠志肉 羌活各叁分 甘草 桂心

防風各半兩壹分無黃芪有荆芥與銀

右粗末每三錢姜三片棗壹个水煎服無

時

一方產後臟腑虛心怔驚悸言語錯亂

麥門冬去心人參各八錢牛黃研白薇各二兩扶

神獨活遠志生地黃朱砂飛防

風天竺黃甘草龍齒研各四錢龍腦

麝香並細研各一錢

右為末薄荷酒調二錢

一方治血虛多驚及產後敗血諸疾

辰砂琥珀沒藥並細研當歸

右為末等分每二錢空心白湯日三服

經効治產後風虛頭目痛語言邪僻

防風乾葛茯苓各八分麥門冬去心芍

藥黃芩各六分犀角四分甘草一分

右水二升煮七合分兩服

濟生起痛散產後血滯筋脉拘攣腰背強直

身痛方見三因方

黑龍丹產後血暈不省血入心經語言恍惚

方見醫方大成

產後血渴

楊氏黃芩散產後血渴飲水不止

黃芩 麥門冬等分

右水煎溫服無時

產後傷寒

人參當歸散產後陰虛主熱心胃煩悶頭痛短氣骨節疼痛時輒甚與大病虛煩相似

人參 當歸 生乾地黄 桂心 麥門

冬去心各兩 白芍藥二兩

右咬咀每半兩水三盞先以粳米一合淡

竹葉十片煎一盞入藥去米葉加棗二个

煎溫服虛甚者用熟地黄

增損柴胡湯產後發寒熱方見婦人

產後喉中氣急喘促

參蘇散產後血入於肺面黑發喘欲死

人參一兩別為末蘇木二兩槌碎濃煎調

參末灌神效不可言

產後月水不調血崩

治產後崩中頭眩神昏四肢煩亂不知人事

熟地黃 赤石脂各壹兩 鹿茸 牡蠣 當

歸各半兩

右細末米飲調

經驗良方

婦人產後諸證

治產後血暈川舊漆器猛燒烟逼而熏之

治用毒藥攻胎藥毒衝心外證牙關緊急口

不能言兩手強直握拳頸低自汗身微熱

外證與中風相似但其脉浮而軟斗死斗

生醫多不職但作中風治之必死無疑用

白扁豆生細末新汲水調下

治產後生腸不收用枳殼煎湯溫浸良久即

不入徐氏胎產方同

治婦人產後子宮脫出鄰婦生產子宮不收

一日遂用藥水噴或熏皆不効忽有一老

婦云我昔受此苦用酸豚音草俗名老鴉

酸煎湯川草坐不開孔纔熏收言半稍溫

下手洗前收入而安

治產後秘結葱白十數莖煎湯點好茶連葱嚼服神効不動真氣最妙

治婦人產後遍身疼痛腰背不得轉側手脚不得動搖身熱頭痛若作傷寒醫遲則變生他病婦人女子遍身疼痛身脚不能動

牛膝炒酒浸當歸去蘆白朮黃耆肉桂不見

火獨活去蘆

右等分咬咀每服三錢水壹盞半姜五片

薤白七寸煎七分去滓熱服

治產後血泄不止作塊下血弥痛

治產後腹痛右用天台烏藥杜當歸二味爲末炒黑豆淋酒調下二錢

凡方產不可便飲酒及以酒調藥服之酒散

五臟四肢致成百病凡一切藥只用水煎

壹兩日後方可飲酒此爲大忌

凡產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂

心神氣息欲絕暈悶不知人口噤手足瘳

心

癡醫者不識呼爲暗風誠爲謬矣大抵產後傷動血氣勞損經絡腠理空踈勞役大早風邪乘間而入始則客於皮膚次則入於筋脉又其次也傳於臟腑或身體緩急或頑痺不仁或口目不正或奄奄忽忽神情悶亂又有產後五七日強力下床或一月之內傷於房室或懷憂發怒動擾冲和或汗出多變成瘧證口噤不開身背強直搖頭馬鳴身反折如癘狀此乃自取其病

非的爾中風所得也宜踈風安血散血隨證治之

治產後感風頭疼身痛惡寒壯熱不問陰陽二證皆體虛所致煎局方異功五積散立效

治產後中風諸形如角弓反張口噤涎潮證悉具豆淋獨活酒右用黑豆半升淨鐵銚中妙令焦黑候煙起以無灰好酒二升沃之安磁器中每用酒壹盞去豆入獨活半

兩碎切同煎約至八分去滓溫服日進無  
時以差爲度或卒中未有獨活止連服前  
豆淋酒亦効莫如加獨活効速凡產後服  
黑神散皆宜以豆淋酒調服活血祛風最  
爲要藥

治子宮不收

荆芥穗 藿香葉 臭椿樹皮 各等分

右將前藥煎湯熏子宮卽入 徐氏胎產方同

劉觀復外郎傳已用驗方治子宮脫出

革麻葉 有了角兒者好 飛過白糝 各等分

右爲細末以紙片攤藥末放紙上手托紙

藥於脫處用手徐捺托肛門脫處便入

治婦人子宮出痛不可忍右用五倍子白糝

爲末溫湯泡洗 徐氏胎產方同

又方先用淡竹根煎湯洗後仍用此藥乾摻

立驗 治牛亦會用効

又方用黃栢壹兩爲末浸冷水洗

治婦人癰疾 卽可 右用溫水先洗軟卽用飛

鼠糞燒烟熏入

又方用草麻子塗頂心吸入如入卽洗去藥

亦妙

徐氏胎產方同

治下乳右用麥門冬不拘多少去心焙爲末

以酒磨犀角約壹錢末多温酒調麥門冬

末二錢不過二服便下不拘時候

吹妳結實疼痛陳皮一兩甘草壹錢水二碗

煎壹碗分二次服次用荆芥羌活獨活煎

湯熏之温則洗之則安

又方連翹消毒飲用連翹三錢牛蒡子防風

荆芥穗各壹錢甘草壹錢並爲粗末每服

四錢水壹盞半煎七分去滓食後服加甜

萸實內子每壹个取四分之壹研碎入藥

又以生甜萸去殼取子同生姜壹小塊研

勻炒酒隨意服

吹妳用皂角刺燒灰蚌蛤粉乳香少許並爲

細末熱酒調服用手揉散卽可

又方以水粉炒令黃色以紙攤在地上出火

毒研作末新汲水調傅之

樺皮散治婦人吹妳腫痛不可忍右川樺皮

燒存性研為細末每服二錢熱酒調下一

日三服不計時候○神效名方治婦人吹

妳以樺皮燒灰存性熱酒調下二錢壹兩參錢

食後服之衛生易簡方同

醫林方

當歸散治產後惡血上行搶心痛疼惡血過多血暈不省人事或惡血不下行婦人初產

并不可服黑神散內有葛桂恐後又有餘證可服當歸散

牡丹皮 川芎 蒲黃各二兩 桂半兩 大豆卷

二兩

右為末每服二錢米飲調下血暈童子小

便調下

烏金散治婦人產後血暈牙關不開者可治張口死不治也

黑牛角胎用醋燒 蘇各遍

右為細末龍腦少許每服三錢童子小便調下

黑白散治產後見枕大痛者

烏金石用醋燒七遍寒水石燒紅存性各等分

右為細末每服錢半米飲調下和滓服

紫金丹治產後敗血衝心脇肋痛

代者石壹兩燒紅醋桃仁去皮尖大黃錢

右為細末薄荷水打麪糊為丸每服三十

丸加至五十凡臍腹痛煎四物湯送下血

癖酒煎四物湯加玄胡索

羌活湯治產後頭痛血虛弱痰癖

羌活 川芎 防風 香附子 熟地黃

白芷已上各等一兩石膏二兩細辛二錢當歸五錢甘

草五錢蒼朮六錢

右為細末每服一兩水二大盞同煎至一

盞無論時候服之

寸金散治婦人子腸下不收

蛇麻子 韶腦 胡椒 紫霜花

右件各等分爲細末每服五七錢水半椀煎淋洗之三二遍爲效

紫金丹治產後衝脹胃中如有物者噎氣不除

代赭石 礞礮石

各等分

右爲細末醋糊爲丸如桐子大每服三五十九溫酒下如胃腹疼痛當歸湯下久服

治血癖

治初產了熱運血運咬定牙關者生張口者

死可服烏金散

治產後中風五七日不省人事咬定牙關者

荆芥末

二錢 桃仁

青錢

右爲末水調煎每服三錢服之○衛生易簡方爲末每服三錢亦盪蒸煎八分溫服

須臾便者極驗

崩霞聖效方

鐵柱丸治婦人產後血風腰腿疼痛

臨清張先

生傳方

草烏頭

壹兩生為細末

右用葱白二根燒熟去麤皮將藥末同漉得所於白內搗極爛丸如桐子大每服七丸溫酒送下食前日進二服婦人產後用溫醋湯下

救苦散治婦人產後一切血氣不調癍塊疼痛不忍者皆治臘月獐猪兒糞不以多少右先地上掘窩相似留烟出處寬窄可盛一斗五升裏頭先著熟火上放藥在內門

口大煨火壹時辰封閉不透風來口早晨取出研為細末每服三五錢熱酒空心調服忌濕麵冷硬之物勿輕藥寡累經神驗治產後惡物不盡

升麻

參兩

右清油五升煮取二升去滓分兩服當吐出惡物勿輕極良又方用蒜不以多少研爛熱醋服施圓端效方

琥珀散治產後血氣不和臍腹塊硬痛疼臨

李壽

當歸焙 川芎 廣茂煨各一兩 赤芍藥二兩 陳皮

半兩 乾薑炮

右為細末每服二錢酒水各半煮同煎至

六分和滓食前日進二服

大烏金散治婦人產血昏迷不省人事血塊

疼痛惡血不通黃也李濟方

烏金石炭鐵是自然銅金色者碎為末醋熬各二兩

大黃童子小便浸壹宿臘月陰乾 川當歸焙各一兩

右為細末每服二錢煎紅花酒半煮童子

小便半盞同調下食前日進二服惺靜血

行止服

大進黑神散治產後諸疾一胎死二難產三

衣不下四血昏迷五煩渴六寒熱往來七虛

腫八恍惚狂言九神昏不語十腹痛泄痢十

一遍身疼十二小便血十三血崩十四咳嗽

十五腹脹嘔逆十六鼻衄血十七喉噎氣十

八中風口噤身強直並皆治之產寶

川當歸焙芍藥甘草炒乾姜炮生地黃

無用蒲黃炒官桂雄黑豆炒去皮

右為細末每服二錢熱酒調下食前日進

二服

柴胡當歸湯治產後傷寒寒喘急煩燥或戰

而作寒陰陽俱虛不可汗下宜此主之朱奉議方

柴胡茸參白朮二人參甘草炒川當歸

芍藥五味子木通各壹兩

右為剉散每服四錢水壹盞半生薑四片

棗二枚同煎至七分去滓溫服不拘時候

日進二三服

椒朴丸治婦人血海虛冷臍腹疔痛崩漏赤

白男子腎虛下元久弱臨漳李公方

川椒去目炒出蒼朮去皮酒浸乾薑四兩切

厚朴二兩細切與

右為細末酒糊為丸如梧子大每服三十

丸溫酒送下食前

得聖丸治婦人產後血氣虛冷腰腹大痛便

痢膿血馬公正方

川烏炮去皮壹兩五靈脂二兩沒藥二錢

右爲細末醋糊爲丸如豆大每服二三十丸食前酒下

吳氏集驗方

縛手散治產後肚痒右以大蘿蔔壹寸細切上煨黃存性酒和童子小便各半盞煎六分溫服

神效名方

治產後惡物上潮痞結大小便不通

芒硝 蒲黃 細墨各等分

右爲末用童子小便半盞水半盞調下服之

治婦人產後虛弱和血通經

當歸壹兩芍藥二兩香附子叁兩

右爲細末每服一二錢米飲調下服之無時

治婦人產後惡物不出上攻心痛赤伏龍肝

竈底焦土研細酒調三五錢瀉出惡物立止

百花散治婦人產中咳嗽

黃蘗 桑白皮 用蜜塗以慢火炙黃為度用之二味各等分

右為細末每服三錢水壹盞入糯米二十粒同煎至六分以欵冬花燒炙六錢攪在

藥內同調溫服之

治婦人吹妳

以馬明退 燒灰五錢 輕粉 錢 麝香 少許

右為細末每服二錢熱酒調下服之

又方以皂角燒灰蛤粉和熱酒將來調數字

下得喉嚨笑呵呵○衛生易簡方用皂角

燒灰為末蛤粉等分酒調壹錢服

又方以淘米木杓上砂子七箇酒下以吹簫

杖透乳孔 衛生易簡方同

事林廣記

產後瀉痢用五積散如常煎服

產後血暈鰓膠燒灰存性為末三五錢童子

小便調酒下

山居四要

兒枕疼用陳年蟹殼燒灰酒調下

徐氏胎產方

產後諸疾

婦人產後血暈不知人狂語顛倒健忘失志

紫礪壹兩

右細研溫酒調二錢匕服

又方用蘇合香丸童子小便煎一二沸調下

妙

產後血暈昏迷心氣絕夏枯草絞汁服壹瓊

妙

產後血暈連心頭硬悶亂氣絕手脚煩熱及

寒熱不禁續斷皮二兩衛生易簡方壹握判以水

三升煎取壹升分作三服溫服如人行二

三里再服無忌雖垂死者亦愈

產後氣喘為孤陽絕陰不治者用胡桃肉不

去皮同人參等分每服五錢水壹盞半煎

七分頻頻呷之屢效  
產後鬱冒血厥閉目昏默先以倉公散取嚏

後服白薇湯

產後血不下夏枯草絞汁每服一小瓊入酒

壹合溫攪勻服

婦人產後敗血未盡心腹脹滿

生姜五兩切

右以水五升煮三升分三服立效

產後血癖痛

大黃兩 當歸兩 官桂二錢

右以酒三升煮十沸頓服

產後內虛寒氣入腹腹中絞痛及兩脇當臍

急痛名曰寒疝

肥羊肉斤 當歸 甘草 芍藥炒 人參各

兩

右咬咀以水壹斗先煮取七升入藥更煮

再二升去滓分二服

產後血瘦痛臍下脹不下食

當歸二兩桂心兩半芍藥兩半血竭兩一蒲黃兩半延

胡索兩壹

脇肋脹去血蝎加栝榔柴胡青木香夏

右為細末每服二錢温酒調下

產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參壹兩另蘇合香兩二

右以水二碗煮蘇合香至壹碗去滓調參

末隨多少如神效

產後惡露不下三四日嘔逆壯熱

芍藥二兩知母兩二生姜 當歸 蒲黃二

兩紅花五錢荷葉中心帶七分生地黃汁壹錢

右以水二升煎至壹升去滓下蒲黃煎四

沸空心分作三服

產後嘔吐不止

陳皮兩壹半夏曲 甘草各半藿香兩二

右為細末每服三錢姜三片煎熱服

產後頭痛

川芎 當歸 荆芥穗各等分

右咬川每服五錢水煎熱服

產後下血不止炙桑白皮煮水飲之良

產後陰下脫順火草壹斤陰干水五升煮取汁

分温服以鐵爐中紫塵羊脂二味攪令稠

布裏炙熱熨推納之差

產後中風寒遍身冷直口噤不識人

白朮二兩川芎兩當歸壹兩生薑一兩

右以酒三升煎取一升頓服

產後中風語澁四肢拘急

羌活兩當歸兩官桂半兩杏仁半兩去

右為末每服五錢酒水各半瓊煎去滓温

服

產後中風腰強直時時反張或半身不遂口

眼喎斜手足戰掉語言蹇澁小續命湯

防己肉桂皮黃芩杏仁去皮尖炒芍藥

甘草川芎麻黃去根大參各壹兩防風

青兩附子去皮臍

右咬咀每服五錢水煎瓊姜五片棗壹枚

煎七分熱服 若藏寒下利者去防已黃  
 芩加白朮附子壹倍 若自汗者去麻黃  
 杏仁加白朮黃耆 若失音者加杏仁壹  
 倍

產後虛渴煎人參五味子麥門冬去心湯調益  
 元散服良

產後虛羸發寒熱飲食少腹脹增損柴胡散

柴胡 人參 甘草 半夏湯洗 陳皮 川  
 芎 白芍藥各等分

右咬咀每服五錢姜五片棗二枚水煎食  
 後服咳嗽加桑白皮地骨皮

產後赤白痢腹中絞痛不可忍黃連丸

阿膠 蒲黃 樞子仁各壹兩 黃連四兩 當歸

兩 黃芩 二兩 黃栢 兩 芍藥 二兩

右為細末煉蜜為丸桐子大每服六十九  
 米飲下日三夜壹

又方芍藥錢叁 黃芩半 當歸二錢 甘草壹錢

右咬咀水一升煎七分溫服食前裏急後

重加枳殼枳榔

產後虛汗不止

牡蠣煨小麥麩炒黃

右等分爲細末煮生豬汁調下二錢無時

候

產後經脉不調四肢煩疼飲食全少日漸羸

瘦

琥珀 牛膝 生地黄 當歸各一兩 桃仁

赤芍藥各半兩

右粗末每服三五錢水壹瓊姜三片煎去滓温服

產後心膈迷悶腹藏撮痛氣急月信不通

烏藥二兩 當歸壹兩 莪朮壹兩

右爲細末每服二錢温酒調下服後以食

厭之大忌生冷油膩等物

苡蓼散治乳汁少

苡蓼根 薄荷幹等小爲末酒調服

右先喫羊腎汁壹椀次服藥後再喫葱絲

羊羹少時微汗出效

下乳散

粳米各半糯米各半高粱苳子壹合並生甘草

兩半

右煎汁壹升研藥令極細去滓分作三服

立下

玉機微義

卒瘕

活人舉卿舉敗散治新產血虛瘕者汗後中

風發搐亦然荆芥穗不以多少微炒為末

大豆黃卷熟以酒沃之去黃卷取汁調細

末三五錢和查飲之其効如神一方只

以好酒調服

按此太陽厥陰經藥也按本草荆芥能發

汗破結氣下瘀血除風濕痺亦是攻邪之

藥若血氣果虛之人亦非所宜也

產後雜方

局方芎歸湯 黑神散方並見本方

按此手少陰足厥陰太陰陽明表裏血榮也立方大意見前丹溪之論矣令人以為治產後百兩率用之故收入然用若自宜通變

人參當歸散當歸黃芪湯失笑散方並見和

劑崩經驗方三聖散方見是嚴氏清魂散

抵聖湯方並見當歸羊肉湯方見醫方集成方

良方茯苓散治產後心虛怔忡不定言語錯

亂

人參 甘草 山藥 當歸各壹錢 生薑

遠志 茯苓 桂心 麥門冬各半錢 大棗

右咬咀水煎

機要增損柴胡湯治產後經水適斷感於其證手足攣搐咬牙昏冒

柴胡八錢 黃芩四錢半 人參參錢 甘草炒四錢 石膏

四知母去錢 黃芪五錢半 夏參錢

右為粗末每半兩入薑棗煎

血風湯治產諸風痿攣無方

秦艽 羌活 防風 白芷 川芎 芍

藥 白朮 當歸 地黃 茯苓 半夏

黃芪 等分

右為末 膏半為丸 煉蜜桐子大 壹半為散

溫酒送下 五七十九

愈風散 方見簡易方

獨行散 方見續錄

當歸散 方見婦人

大在 良方

黃芪湯 治產後汗不止 因陰虛而得

黃芪 錢三 白朮 防風 熟地黃 牡蠣 煨

白茯苓 麥門冬 甘草 炙各半錢

右咬咀 每半兩入棗煎

加減四物湯 治產後陰虛發熱 或日間明了

暮則發熱 增寒

當歸 川芎 生地黃 芫胡

右等分 每四五錢 水煎

瑞竹堂方 治產後血塊腹痛 方見本方

丹溪參朮膏 治產後胞損 成淋瀝證

人參 壹錢 白朮 二錢 桃仁 陳皮 各壹錢 黃芪

壹錢 茯苓一錢 甘草半錢

右咬咀水煎猪羊胞後入藥作壹服

丹溪曰嘗見尿胞因收生者不謹以致破損而得淋瀝證有徐氏婦於壯年得此因思肌肉破傷在外者且可補完胞雖在腹恐亦可治診其脉虛甚因悟曰難產之人多是氣虛難產之役血氣尤虛因用峻補以參朮膏煎以猪羊胞極飢時與之每劑用壹兩至一月而安恐是氣血驟長其胞

可完若稍遲緩恐難成功

嚴氏趁痛散 方見三因方

按此手足三陰藥出太陽例治表之劑也然惡露不盡絞痛不止宜良方芎歸湯散治裏之劑以大黃桃仁等藥下之血畜經絡成血塊宜沒藥丸以蜜虫水蛭等藥逐之皆變法也茲不詳錄故已上諸方皆調理之劑餘有異證 詳見大金良方謹按產後血滯於經多成癰腫或有致不

救者蓋氣血虛損逆之甚也大抵此兼陰  
虛火動凡辛溫之劑宜慎之矧產後用藥  
有三禁我丹溪先生謂產後如無惡阻當  
大補氣血雖有雜證以末治之如中風切  
不可作風治與小續命湯必先補氣血然  
後治痰當以左右手之脉分其氣血多少  
而治如發熱惡寒皆是氣血左手脉不足  
用補血藥多於補氣藥右手脉不足用補  
氣藥多於補血藥惡寒發熱腹痛者當去

惡血以求通變之意也

壽域神方

坤道部

產下三五日用圓麻石六七團早起用龕谷  
糠火煨紅或日晚或人睡靜時用瓦盆盛  
好醋一大瓶用草蓆四圍帳密產婦立於  
內以紅石團於醋內取氣蒸上汗則流但  
放石逐壹團於多放則氣大難禁如此四  
五日蒸壹次則產婦諸風不染顏色亦無

痿黃今嶺南不問貧富產婦皆用此法也  
產一月之內可用

治無乳用精豬肉或猪蹄煮清汁和美味調  
益元散五七錢食後連服三五服更用木  
梳梳乳周回乳汁自下衛生易簡方同

一方用三稜三箇水二碗煎一碗洗妳取汁

極效衛生易簡方同

一方用蔞苣菜衛生易簡方三五根煎湯飲之妙用冬  
葵子煎湯服之亦妙

治吹乳用芭蕉葉搗爛傅貼衛生易簡方同

一方用白丁香半兩為末每服一錢匕溫酒

調下衛生易簡方同

衛生易簡方

腸脫陰腫

治產後陰腫下脫腸出玉戶不閉用鯽魚頭  
焙乾為末半服半梳即收上

治產後脫腸不收用油五升煉熟以盆盛候  
溫令產婦坐油盆中約一頓飯久用皂角

炙脆去粗皮筋子爲末以少許吹入鼻中  
令作嚏立差神效

治產後陰腫用桃仁燒搗爛傅之

又方用葱白乳香同搗爛貼腫上

又方用枳殼半斤剉細炒熱故帛裹熨冷卽

易之

又方用柑子皮爲末每服二錢溫酒調下或  
用陳皮亦可

產後血暈

治產後血暈用炭燒紅以醋溲薰之一

又方用穿山甲壹兩童便浸一宿炙黃爲末  
每服壹錢拘攢少許熱酒調下

治產後心悶血暈手足煩熱用接骨木卽蒴

藿破如筭子一握水壹升煎半升溫分二  
服或小便數惡血不止服之卽差

治產後或落胎血不止用桑白皮炙水煎服

又方用百草霜三錢研細好酒調服

治產後餘血不去用麻子五升酒壹斗漬壹

宿明且溫服壹升未差夜再服不得與男  
子通壹月將養如初

治產後惡物不盡腹中疴痛用麻黃去節爲  
末酒調方寸匕日二三服血下盡則止

治產後猶有餘血水氣者宜服豆淋酒用黑  
豆五升熬煙絕傾甕器中以酒壹斗乘熱  
沃之旋服

治產後血暈用好醋煎熱稍稍噉嚙卽愈  
治產後敗血上衝發爲血暈用陳艾一兩煎

湯入醋服之極効

治產後血不乾或一月之後黃如灰汁者日  
久成帶用竹紙楮皮紙各五張燒灰荆芥  
穗一握半夏半錢酒水同煎食前服

治產後血風攻腦頭旋悶絕不省人事用喝  
起草嫩心卽纔出土蒼耳苗是也陰乾爲  
末每服三錢溫酒壹盞服當時通頂門  
卽甦省

產後中風

治產後中風語四澁肢拘急用羌活三兩爲末每服五錢水酒各半盞煎溫服

治產後中風用木蘇壹握酒二鍾煎壹鍾眼若崩中帶下血痢肺痿水煎服

治產後中風角弓反張口噤川大蒜三十辨水三升煮取壹升幹開口灌之卽省

治產後中風口噤舌縮不語用芥菜子壹升爲末好醋三升煮取壹升頻傅額頰下遂愈

治產後中風并角弓風眼反上四肢搐搦用荆芥子一兩爲末每服二錢溫酒調下神

效

治產後風虛用白鮮皮獨活各三兩爲粗末酒水各二盞煎取二盞分三服或單用白鮮皮亦妙

治血風虛冷月候不勻五心煩熱或頭面浮腫或身體頑麻用川烏一斤去皮臍小油四兩解搗四兩於砂鍋內砂裂如桑椹子

色爲度回爲末五靈脂四兩別研和勻酒  
浸蒸餅圓如桐子人每服十圓空心溫酒  
或塩湯送下日二服大效  
乳汁少

治乳令汁多燒野猪膏每用壹匙和酒卅盞  
每日三服十日後可供三四孩兒飲  
治乳汁少用葵子煎湯飲兼治五淋滑腸動  
風惟宜服丹不火  
又方用狐狸脂炙熟溫酒研服

又方用鍾乳石爲末每服壹錢酒調下

又方用白藥子爲末每服壹錢煎猪蹄湯調  
下

又方用漏蘆爲末每服壹錢溫酒調下

又方用白蠟爲末每服二錢酒壹盞芝麻  
茶少許同調熱服仍用木梳於妳上梳十

遍乳汁自足  
又方用赤小豆煮汁頓飲乳如泉流

吹乳

治吹乳用男子梳上百齒霜飯丸如桐子大  
又酒下三丸

又方用蠶退燒灰五錢輕粉三錢麝香少許  
爲末每服二錢熱酒調下

又方用頭垢丸如桐子大五丸以無根水下  
治吹乳惟寒壯熱用猪肪脂冷水浸搗熱卽  
易

又方用葛蔓燒灰爲末每服二錢七熱酒調  
天下不過三服愈

又方用女人更吮之吮時先口中含煖水旋  
吐數吮卽差

治男子妬乳腫用蕪菁根生搗和搗醋漿水  
煮汁洗之五六度差  
又搗和鷄子白封之亦妙

治乳癰汁不出內結膿腫用蜂房燒灰每服  
二錢水一盞煎六分去滓溫服

產後

治產後發渴用煉蜜以熱水溫調服

治產後口乾舌縮用雞子一箇傾入壹盞滾水內攪勻蓋少時服

治產後血痢用生姜切細以麪拌捏成毬子慢火炒焦黃爲末每服三錢空心米飲調下

治產後惡露上潮痞結大小便不通用芒硝蒲黃細墨等分爲末童便水各半蒸調三錢服

治產後虛弱和血通經用當歸壹兩芍藥香

附子炒各二兩爲末每服二錢米飲調下  
治產後心氣痛用鷄子壹箇熱酒壹鐘打勻服

治產後喉乾咳嗽用猪脂胡粉煨過爲末白湯調漱

治產後腹中如錐刺痛用敗醬草五兩水四升酒二升煮取二升每服七合食前日三服大驗

又方川羌活爲末每服三錢酒煎服

治婦人兒枕疼用陳蟹殼燒灰爲末酒調服  
金匱鈎玄

產後當清熱補氣補血  
產後大宜補氣血雖有雜證以末治之  
產婦因火動胎送上作喘者急可用條芩香  
附之類將條芩沉於水中取沉重者用之  
產後壹切病不可表散

產後補虛藥

人參錢一白朮錢一黃芩 歸身 犀 陳皮

川芎各半 炙甘草三分 有熱加生薑三分 茯苓錢壹

右咬咀水煎服

產後消血塊

滑石錢三 沒藥錢三 騏驎竭二錢 無則用牡丹皮

右爲末醋糊丸

如惡血不下以五靈脂爲末神曲糊丸白朮

陳皮湯下

產後泄瀉

川芎 黃芩 白朮 茯苓 乾薑 滑

石 陳皮炒 白芍炒

右咬咀水煎服

產後惡露不盡小腹作痛

五靈脂 香附米等分

右為末醋糊丸甚則加桃仁不去尖

產後一切病皆不可發表

產後中風不可作風治切不可與小續命湯

服必大補氣血然後治痰當以左右手脉

分其氣血多少而治

產後口眼喎斜亦不可服小續命湯

產後大發熱必用乾薑輕用茯苓淡滲其熱

一應若寒發表藥皆不可用

產後才見身大不可發表

產後發熱惡寒皆是氣血右手脉不足補血

藥多於補氣藥左手脉不足補氣藥多於

補血藥

凡惡寒發熱腹痛者當去惡血

產後不可用白芍藥以其酸寒能伐生發之氣故也

備預百要方

產後惡血不止或腹中塊痛等方乾地黃當歸白芍藥芎藭等分麤末每以四錢水壹椀煎至七分去滓溫服

產後腹痛方清蜜和酒飲

又戶根下土以熱酒服之

又地笋作蔬食之小蘇也

產後血不止方以水洗馬舌飲之

產後血結瘦損不食方絳石水煎服酒煎亦

可

產後虛勞百病血氣不調腹痛血暈昏憤煩

燥不下食方生地黃汁藕汁各一升薑汁

二合蜜四合相和煎如稀飴煖酒入壹匙空心

服

產後血不調結痛悸憤及赤白痢方馬齒莧

一升紅米二合相和煮粥食之

女人夢與鬼交方鹿角末一撮清酒和服則  
鬼精出不用落角  
產後食治

食醫心鑑

夫產生之理吁可大歟十月既足百骨并肥  
肉開解兒始能生百日之內猶尚虛羸時人  
將為一月便云平復豈不謬乎飲食失節冷  
熱乖衰血氣虛損因此成疾藥餌不知更增  
諸疾且以飲食調理慶為良工爾

治初產腹中瘀血及痕血結痛虛損無力宜  
食地黃粥方

生地黃汁

參合○聖 生薑 壹兩取汁○聖

養老書壽紋 粳米 三合

右煮粥

聖惠方此下有熟字 下地黃生薑汁攪令

勻空心服之

治產後血痕痛惡露不多下宜與桃人粥方

右桃人一兩去尖皮研以水濾取汁煮米  
作粥食之○聖惠方治產後而癢疼痛不

多食桃人 一兩湯浸去皮尖瘦人 粳米 二合 右以水二

大盞爛研桃人絞取汁作粥空心食之不

治產後血氣不調不能下食虛損無力方

白羊肉 半斤 紅米 三合

右調和五味椒葱作粥食之

治產後積血風腫補中益氣利小便冬麻子

粥方

冬麻子 一升搗所以紅米 合

右以麻汁和米煮粥食之

治產後中風血氣擁驚邪憂恚 聖惠方 天猪

心羹方右猪心壹枚煮熟切以葱 聖惠方

握去鬚 搥調和作羹食之入少胡椒末亦

佳○聖惠方右以豉汁搥椒米同作羹食

之

治產後血痕兒枕痛秤錘酒方

鐵秤錘 壹枚斧頭 酒 壹升

右燒秤錘令赤投酒中良久去錘量力服

治產後虛羸無力腹肚冷 聖惠方 血氣不調

及傷風頭疼聖惠方云頭中風冷汗出不止羊肉脂膳方

右羊肉聖惠方壹斤切如常法調和作膳

膳食之者羹亦得聖惠方空

治產後風虛五緩六急手足頑痺頭眩目眩

及血氣不調方右黑豆一升炒以酒三升

浸之一宿隨性煖服○衛生易簡方治產

後百病血熱中風背強熱渴身腫嘔逆痰

癍疼痛用大豆五升急水淘淨炒微溫置

釜中以無灰酒一斗沃之經壹日服酒一

升以差為度如素不飲酒量多少服若口

噤加獨活半斤搥破同沃仍增酒一斗二

升逐月旋作恐酸壞又可為豆腐食之

治產後風眩瘦病五勞七傷心虛驚悸羊頭

肉方右白羊頭壹枚治如法煮熟切於五

味中食之

治產後虛勞百病血氣不調腹肚結痛血暈

惛憤心煩躁不多下食地黄煎方

生地黄汁各壹升藕汁各壹升生薑汁二合蜜四合

右相和煎如稀飴空心煖酒入壹匙服之

治產後百病血暈心煩悸愔憤口乾生地黃

汁方

生地黄汁合參藕汁三童子小便合

右相和煎壹兩沸分爲二服

治產後赤白痢腰臍肚絞痛不下食炮猪肝

方

猪肝四兩○聖惠蕪荑壹兩末○壽親方去筋膜養老書壹錢

右薄起猪肝糝蕪荑末於川葉中洩麪裏

養老書於肝葉中五味調和更以濕紙重裹聖惠方參五重裹

於塘灰中炮令熟去紙及麪空心食之

治產後赤白痢臍肚痛不可忍不可下食鯽

魚粥方

鯽魚一斤半○聖紅米參合○聖惠方粟惠方壹斤米參合別煮粥

右以紙各裹魚於塘灰中炮令熟去骨研

煮粥熟下鯽魚攪令勻空心食塩葱醬如

常○聖惠方右用濕紙裹魚煨熟去骨細

研候粥熟下魚入塩醋調和空心食之

治產後傷中消渴小便數腸僻下痢補五藏  
益氣黃雌鷄粥方

黃雌鷄 壹隻治紅米參  
如常合

右切取肉和米煮粥著薑葱醬食之

治產後羸勞乍寒乍熱猪腎羹方 聖惠方名  
猪腎粥

猪腎 壹隻去  
脂膜 紅米 壹合○聖惠  
方粟米參合

右著葱白薑搥醬煮作羹喫之○聖惠方

右以豉汁五味入米作粥空心食之

治產後虛損乳汁不下猪蹄粥方 聖惠方名  
猪蹄羹

治如常○聖  
惠方一具 白米半升 聖惠方  
粟米參

右煮令爛取肉切投米煮粥著薑醬葱白  
椒薑和食之

治產後乳汁不下閉妨痛猪肝羹方

猪肝一具 切紅米  
壹合葱白搥豉等

右以肝如常法作羹食作粥亦得

治產後血氣不調積聚結痛兼血暈悻憤及

赤白痢馬齒粥方

馬齒菜一斤紅米二合

右相和煮作粥食之塩醬任情著食

治產後赤白痢瘕肚痛不下食鯽魚鱠方

鯽魚一斤作鱠○蒔蘿 橘皮聖惠方去瓢焙 蕪

荑 乾薑聖惠方炮 胡椒各壹分

右以鱠投熱豉汁中良久聖惠方右豉汁中煮鱠臨熟

下諸末壽親養老書調和食之聖惠方空心食之

治產後赤白痢瘕腰痛薤白粥方右以薤白

切一升聖惠方紅米三合聖惠方煮粥

空心食之

治產後痢腰腹肚痛野雞肉餛飩方右以野

雞壹隻治如常作餛飩麩皮作餛飩熟煮

空心食之

聖惠方

食治產後諸方

治產後血氣虛弱不能下食粟米粥方

粟米合參羊肉半斤去脂膜揀

右以水五大盞下米羊肉同煮欲熟入塩

醫椒葱更煮粥令熟空心食之

治產後腹中積血及中風汗出益氣肥健利

小便冬麻子粥方

冬麻子

壹合以水研  
取汁叁升

薏苡人

壹合  
搗碎

粳米二合

右用冬麻子汁煮二味作粥空心食之

治產後虛勞血氣不調腹肚結痛血運昏憤

心熱煩躁不多食益母草汁粥

益母草汁

二合 生地黄汁

二合 藕汁

二合 生薑汁

半合 蜜

二合 白梁米

壹合水淘  
研令細

右先以水一大盞煮米作粥次入諸藥汁

更煎三兩沸每服喫貳合日三服

治產後乳不下閉悶妨瀉豬肝羹方

豬肝一具 粟米

一合

右壹如常法作羹粥空心食之

治產後風眩瘦病五勞七傷心虛驚悸方

右爛煮羊頭於豉汁中入五味調和空心食

之

治產後下痢腰痛方右用艾葉擣麤羅為末

如常作餛飩空腹服之

產寶

療產後諸痢方煮薤白食之唯多益 肥羊

肉炙食之唯多好 羊腎脂炒薤白空腹

食之佳神巧萬全方婦人大全良方同○衛生易簡方用

薤白和肥羊肉去脂作炙食或以羊腰脂

炒薤白食

簡易方

蘇麻粥治婦人產後有三種疾鬱胃則多汗

汗則大便秘故難於用藥唯此粥最佳且穩

備預百要方同

紫蘇子 大麻子二味各半合淨洗研通細用水再研慮汁壹盞

分二次煮粥啜○婦人大全良方各二合壽親養老書濾汁 盞

右此粥不獨產後可服大抵老人諸虛人

風秘皆得力經驗秘方同嘗有一貴人母年八

十四忽腹滿頭疼惡心不能食醫家供補

脾進食治風清頭目藥數日疾益甚懇予

辨之予曰誤矣此老人風秘臟腑壅滯聚

經驗良方氣聚膈中則腹脹惡心不喜食至頭痛  
 神昏良方氣上攻頭如得臟腑流暢諸疾  
 悉去子進此而氣洩下結糞如胡椒十餘  
 少間通利諸證悉去胎產救急方治產  
 後血虛藏燥大便秘澁紫蘇子大麻子仁  
 等分淨洗右研清汁取秬米煮粥和服滑利最  
 穩

壽親養老書

產後諸病

鮑魚羹治產後乳汁不下

鮑魚肉一斤麻子仁一斤半葱白參香  
別研

豉半合

右先將水三升煮魚肉熟後入後三味煮  
 作羹任意食之

豬蹄粥治產後乳汁不下

母豬蹄壹隻治如食法以水王瓜根洗木  
參盡煮取二盞去蹄

通判漏蘆去蘆頭

右四味除豬蹄汁外粗擣篩每服三錢匕

以煮猪蹄汁二盞先煎藥至壹盞半去滓  
入葱豉五味等并白米半合煮作粥任意  
食之

猪蹄羹

猪蹄一具 粳米一合  
洗到淨淘

右用不拘多少入五味煮作羹任意食作  
粥亦得

牛肉羹治產後乳無汁

牛肉淨洗切  
牛鼻肉作小片

右用水煮爛入五味如常法煮作羹任意  
食之

鹿肉臠治產後乳無汁

鹿肉四兩  
洗切

右用水三椀煮入五味作臠任意食之

三肉臠治產後乳汁不下

龜肉三兩 羊肉參兩 麋肉參兩  
洗切 洗切 洗切

右用水不拘多少入五味煮為臠食之  
茯苓粥治產後無所苦欲睡而不得睡

白茯苓

去黑皮取

粳米

合

右二味以米淘淨煮粥半熟卽下茯苓末

粥熟任意食之

紫菀粥治產後前赤白痢

紫菀葉

細剉

粳米

合

右先以水煎菀葉取汁去滓下米煮粥空

心食之立瘥

滑石粥治產後小便不利淋瀝

滑石

半兩

瞿麥穗

兩

粳米

合

右以水三升先煎瞿麥取二升半濾去滓將汁入米煮如常粥將熟入鹽少許葱白三寸方入滑石末煮令稀稠得所分作三度食之

羊肉粥治產後七日後宜喫此粥

白羊肉

去脂膜四兩細切

粳米

淨淘

生地黄

汁

桂

去粗皮剉取末一分

右以水煮肉并米熟後入地黄汁并桂末令得所以五味調和空心任意食之

猪腎粥治產後寒熱狀如瘧猪腎粥方

猪腎去脂膜細切壹對香豉壹合白粳米叁合葱叁莖細切

右四味以水三升煮猪腎豉葱至二升去滓下米煮如常法以五味調和作粥食之未瘥更作

黃雌雞飯治產後虛羸補益

黃雌雞壹隻去毛及腸肚生百合淨洗擇壹果白粳米

飯壹盞

右將粳米飯百合入在雞腹內以線縫定

用五味汁煮雞令熟開肚取百合粳米飯和雞汁調和食之食雞肉亦妙

黃雌雞羹治產後虛損

黃雌雞壹隻肥者理如食法葱白五莖切粳米半升

右三味依常法以五味調和為羹任意食之

猪肚羹治產後積熱勞極四肢乾瘦飲食不生肌肉

猪肚壹件淨洗先以小麥煮令半熟取出肚煮切令安膏處黃耆

劉碎人參參 粳米參 蓮實劉碎

右以水五升煮猪肚入人參黃耆蓮實候爛濾去藥并肚澄其引令清方入米煮臨熟入葱白五味調和作粥任意食

鯽魚羹治產後乳無汁

鯽魚壹斤 鱗鱒五斤

右依常法煮羹食後食之

脯雞糝治產後心虛忪悸徧身痛

黃雌雞壹隻 去毛頭足腸胃淨洗以小麥兩合水五升煮雞半熟即取出

去蜀椒去目并閉口炒 茈胡去青 乾薑末

半錢 粳米叁合

右先取水再煮雞及米令爛入葱薤椒薑茈胡末等次又入五味搗醬取熟任意食之

猪腎臚治產後風虛勞冷百骨節疼身體煩

熱

猪腎壹對 去脂 羊腎壹對 去脂

右以五味并葱白豉為臚如常食之不拘

時

冬瓜撥刀治產後血壅消渴日夜不止

冬瓜研取汁小麥麩四地黃汁叁

右三味壹處搜和如常麩切為撥刀先將  
獐肉四兩細切用五味調和煮汁熟後却  
漉去肉取汁下撥刀麩煮令熟不拘多少  
任意食之

生藕汁飲治產後惡血不利壯熱虛煩

生藕汁 地黃汁各半 蜜壹匙 淡竹葉壹握切以

水膏壹半煎取汁半蓋

右四味同煎沸熟溫分三服日二夜一

又方治婦人蓐中好食熱麩酒肉變成渴燥

生藕汁 生地黃汁各半

右二味相和溫煖分為三服

產後禁忌

胎產救急方

產後避忌

古今例言婦人有百二十日產假禮記其載

入月則夫妻異寢得子三月方廟見其夜  
妻遂適寢令人多不知此未弥月而歸房  
百疾由此而生輕則爲痒爲痛爲疔蝕磨  
等則爲崩中帶下初雖不覺久則必成痼  
疾

反說產前忌力十日產後忌一日

### 產後食忌

產後食雞肉早令乳汁不行又令惡露不斷  
多食羊肉令兒患風癩多食辛熱令兒生  
熱瘡多食生冷之物令兒患吐瀉寒瘧

自亦冬疾凡食物或偏好酸或偏好甜或  
多食平生所嗜者中年以後或發病或盡  
不喜食之

### 產後藥忌

產後血虛得傷寒證欲解表者只宜葱豉葛  
根之屬切不可服麻黃出汗多則冒昧  
產後服黑神散及合服理中湯者斟酌加附

子

### 產後鍼灸

衛生寶鑑

灸婦人崩漏及諸疾

氣門二穴灸五十壯治婦人產後惡露不止

及諸淋炷如小麥大

石關二穴灸五十壯主產後兩脇急痛不可

忍

承漿一穴在唇下灸五壯主婦人卒口噤語

音不出風癰之疾

凡婦人產後氣血俱虛灸臍下一寸至四寸

各百壯炷如大麥大元氣自生

壽域神方

治無乳針肩井二穴効

醫方類聚卷之二百三十八