



歸源後全散濟生方治妊娠面赤口苦心煩腹脹

川芎

苧根

白芍藥

麥門冬志

當歸去芦酒浸

白朮各一兩

糯米半合

甘草炙半兩

右交咀每服四錢水一盞半煎至一盞去粗溫服不拘時

大腹皮散濟生方治妊娠大小便赤澀

枳殼去白

大腹皮

甘草炙各二錢

赤茯苓去皮二錢

右為末每服一錢濃煎葱白湯調下不拘時

赤茯苓散濟生方治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈臥則

冬葵子三錢

赤茯苓去皮二錢

右為末每服二錢米飲調服不拘時如小便利則住服如不通恐

是轉胎加參黃少許極妙

流注散濟生方治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多卧少起

旋覆花

川芎

細辛洗去土

人參

甘草炙各半兩

半夏湯洗七次

赤茯苓去皮  
當歸去苦酒浸  
乾生姜

陳皮去白各二兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎七分去粗溫服不拘時

《人參半真者》濟生方治妊娠惡阻醋心胃腹冷痛吐逆不食

半夏湯洗七次 人參 乾生薑各半兩

右為末以生地黃汁浸餅九如梧桐子每服四十九粒飲下

《羅漢湯》濟生方治妊娠胎水不利胃滿腹脹小便不通遍身浮腫

或胎動腹中並能治之

當歸 白芍藥 白茯苓

白木各等分

右咬咀每服四錢用鯉魚一尾不拘大小破去鱗腸白米煮熟

魚每服用魚汁浸平生薑七片橘皮少許同煎一盞空心服以胎

水去其為甚

詞子麩夏瀉去移 白木各一兩 陳皮去白

高良姜炙 木香不見火 白芍藥

陳米炒 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎服忌食生冷之物

《天聖散》濟生方治妊娠以食停滯裏多散寒腹痛脹坐臥不安

白茯苓去皮 川芎 麥門冬去心

黃耆去苦蜜炙 當歸去苦酒浸各一兩

木香不見火 人參 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎七分去粗溫服不拘時

《紫蘇散》濟生方治胎氣不和撲上心腹脹滿疼痛嘔吐之患

大腹皮 川芎 白芍藥 當歸去苦酒浸各一兩

陳皮去白 紫蘇葉 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎七分去粗溫服不拘時

《白半產》濟生方治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月而胎各

乾姜炮 何陳蛤粉炒 芍藥

五味子各一兩 黃耆去苦蜜炙 當歸去苦酒浸

白朮

人參

右以咀每服四升水一盞煎前服不拘時

清美方治妊娠小便澁少遂成淋瀝

麥門冬去心

當歸去苦酒浸

人參

右為細末每服二升煎麥門冬湯調服不拘時

用桑椹煎二十升為細末每服二升空心米飲調下

白朮各一分

白芍藥各一分

白朮

右為末每服三升食前溫酒調服

家美清美方治妊娠下利赤白穀道腫痛冷熱皆可服之

乾姜炮

川芎

黃連去須

阿膠蛤粉炒

宿砂仁炒

白朮各二兩

乳香二兩別研

右為末用鹽梅三不取肉入少醋糊同杵丸如梧桐子每服四升

丸白朮乾姜湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾姜甘草湯下

白芍藥

澤瀉

川芎各二兩

白朮各二兩

紫蘇葉

白朮

乾薑各二兩

右以咀每服四升水一盞煎五片葱白三寸煎服

百合散 濟生方治妊娠風癰咳嗽痰多喘滿

百合蒸

白芍藥

桔梗去苦炒各二兩 甘草炙兩

紫苑茸洗

前胡去芦

貝母去心

赤茯苓去皮

赤芍藥各兩半

杜仲去皮炒

木香白不見火

甘草各半兩

通草

灯心

細辛各一分

滑石各一分

甘草各半兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎八分去粗溫服不拘時

驅邪散

高良姜炒

白朮

藿香葉

草菓仁

宿砂仁

白茯苓去皮各一兩甘草炙半兩

平安散 右以咀每服四升水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

厚朴去皮姜汁炒

生薑各二升

乾姜炮

陳皮去白各一升

川芎半升

木香二升半

右以咀每服四升水一盞入燒鹽一捻煎服不拘時

濟生方治妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脹痛

或眼項腫核

石膏煨

甘菊花去枝梗

防風去芦

荆芥穗

川羌活去芦

羚羊角錢

川芎

大豆黃卷炒

當歸去芦酒浸

白芷各一兩

甘草炙半兩

天門冬飲 右以咀每服四錢水一盞入好茶半錢煎至八分去粗溫服食後

天門冬去心

知母

防風去芦半兩

五味子

茯苓去皮

川羌活去芦

人參各七錢半

勝金散 右以咀每服四錢水一盞姜三片煎八分食後去粗溫服

吳茱萸酒浸炒

陳皮去白

生薑

乾姜炮

川芎

厚朴去皮

宿砂仁炒

甘草各等分

金液丸 右為末每服一錢鹽湯調服不拘時

飛生毛半升火燒如腋下毛尤佳

無病女人髮燒灰各半錢

硃砂半錢別研

公母羊糞燒灰  
空龜心土一錢

黑鉛二錢用銚子火上溶投水銀半錢急攪結成砂子傾出  
研令極細

右為末用粽子角為丸如粟巨大遇難產以倒流水吞五九  
**催生錠** 濟生方治橫逆難產

用黑鉛一子用小銚子火上溶投水銀一錢急攪結成砂子傾出  
用熟約衫角細作丸子如粟巨大臨產時香水吞下二九便生下  
**催生如聖** 濟生方

用黃蜀葵子不拘多少為細末每服二錢用熱酒調服熱湯亦可  
**香桂散** 濟生方下死胎

麝香五分分別研 官桂三錢為末

右和勻只作一服溫酒調下須臾即下  
**來廷** 濟生方治臨產用力太過氣血暈悶不省人事

木香不見火 神麩炒 陳皮去白

麥蘗炒 黃耆白芍 生薑炒黑

阿膠蛤粉炒 白芍藥各一子 糯米一合半

片根洗淨一子 甘草炙三子

右以四指服四子水一盞煎開口灌連進為愈

**無名散** 濟生方治胎前氣逆胎前難產

常痛去苦酒浸 川芎 白芍藥各三子

木香不見火 甘草炙各一錢半 枳殼去白炒

乳香別研各三子 血餘髮灰一錢半 猪血和之

右吹咀每服三錢水一盞煎八分去相溫服不拘時

**辟瘴安身散** 濟生方治臨產暴然氣逆目翻口沫面黑唇青沫

出口中子母俱損茵陳散紅子死母活修合時勿令婦安雞犬見

蛇退一條入瓦罐內煨 金銀箔各七片 馬鳴即吞滾燒一子

丁香半子別研 髮灰一子

黑鉛二子半 水銀七分半依前法候用

千里馬路上左脚旧草鞋一隻洗淨燒灰一錢

右為末以猪猪心血丸如梧桐子倒流水灌下二九如灌不下研

開亦得

**益母丸** 醫方大成專治產後難橫逆并安胎順氣

用益母草其葉類火麻葉莖方花紫色白者不是五月五日採其

葉華陰乾不見日足鉄器以石磨為末煉蜜丸如彈子大每服一  
丸睡產時以童子小便温酒送下若氣不順用木香參湯并艾  
醋湯送下此草今人誤作猪麻

**宣明翁方治安養胎氣調和經候癥瘕癖塊有似妊孕**  
可以久服血氣通和熱寬膈美食

枳實全

檳榔

黃連

黃藥

黃芩

當歸

阿膠灰炒研

木香各半兩

右為末水和丸如小豆大温米飲下三十九不計時日進三服

**黃芩湯** 宣明方治婦人孕胎不安

白朮

黃芩各等分

右為末每服三錢水二盞入當歸一根同煎至一盞温服

**枳殼湯** 按釋方治婦人胎漏下血及因爭下血

枳殼 去穢炒

黃芩各半兩

白朮一兩

右為末水煎食前温服

**立効散** 按釋方治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰

川芎

當歸各等分

右為粗末每服三錢水煎食前温服

**地黃湯** 按釋方治婦人有孕胎痛

當歸一兩

熟地黃二兩

右為末作一服水三升前一升去滓頓服

**大龍散** 按釋方治妊娠心氣痛

艾葉末炒一兩半茴香炒

川練子

右為末水煎服之

**獨聖散** 按釋方治難產

芙蓉子炒七十粒

研爛酒服濟君急

若也危難產時

免得全家俱哭泣

**白朮散** 按釋方治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣未安或時吐逆不下食

白朮

橘紅

人參

前胡

川芎

麥門冬

赤茯苓已上各一兩甘草

半夏洗炒各半兩

右以咀咀服四升姜四片竹茹二升半水煎去滓無時温服

**升麻散** 按粹方治妊娠傷寒頭痛身體熱

升麻

蒼朮炒

麥門冬

麻黃去節各二兩

黃芩

大青各半兩

石膏二兩

右為粗末每服四錢生薑四片淡竹葉二十七片水同煎

**安胎散** 按粹方治婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脉沉者

太陰也宜服此藥

芍藥

白朮各一兩

甘草

茯苓各五錢

黃芪二兩

右剉細每服一兩水煎

**安胎散** 按粹方治胎動不安下在

小腹痛引腰脇小便赤下血

當歸

阿膠

川芎

人參各一兩

桑子二斤

艾一虎口

右細切酒水各三升人參至三升內膠令烊分二服腹中當安小

便煖也一方有甘草無參桑

**安胎散** 按粹方治胎動不安常處亦各阻病

旋覆花一兩

厚朴

白朮

根散

黃芩

茯苓各三兩

作安炒一方無

芍藥

生薑各二兩

右交咀每服一兩水製畢前至一匙要溫服食前忌羊肉錫醋

桃李肉

**安胎散** 按粹方治妊娠八月中風寒有所犯觸身體及夜乍寒

乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞脐下寒時時小便白如米汁或青黃

寒慄腰背苦冷痛面自視茫茫

芍藥一兩

人參

當歸

甘草各三兩

白朮一兩

厚朴二兩

雄白切一升

生薑切四兩

右水五升酒四升合煮取三升分三服日再夜一忌海藻松菜

桃李雀肉等

**白朮散** 按粹方治惡阻吐清水甚重早余日粥漿不入者

白朮一兩

人參五錢

丁香一分



甘草一升

右以咀每服一兩生薑五片煎至一盞去滓溫服食前

人參去芦

橘皮

白朮

麥門冬去心各二兩甘草三升

厚朴製

白茯苓各半兩

右以咀每服一兩水一盞用姜三片竹茹一彈大煎至一盞去滓溫服食前集驗方無茯苓麥門冬有甘草

人參丁香散 大全良方治妊娠惡阻胃呆吐逆翻胃吐食及心

腹刺痛

人參五升

丁香

藿香葉各五升半

右以咀每服五升水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

保生湯 大全良方治婦女經候不行身先病似病脉滑大而六脉俱

勻乃是孕婦之脉也精神如故惡阻食氣或復者一物或大吐或時吐清水此各惡阻切勿作完病治之宜服此藥如竟惡心嘔吐加丁香生薑煎

人參

甘草各二升半

白朮

香附子

烏藥

檳榔各五升

右以咀每服一兩水一盞半用生薑五片煎七分去滓溫服不拘時候或為末調服亦可

二香散 聖惠方療妊娠胎動不安氣不升降飲食不羨嘔吐醋水起坐竟重宜服

香附子一兩

藿香葉

甘草各三升

右為細末每服一兩薑湯調下

安胎散 永類錄方治懷胎五六月至九月惡阻病者中清悶頭重目眩

四肢沉重懈怠不欲飲食惡聞食氣或嘔酸多睡少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腸疼痛或時下血及妊娠一切病疾並皆治

甘草炙

茯苓去皮

當歸去苦

熟地黃酒蒸焙

川芎

白朮

黃耆去苗

白芍藥

半夏泡洗七次切炒

阿膠粉炒

地榆等分

右以咀每服八分水盞半姜四片煎至八分去滓溫服无時候  
一方無半夏地榆有人參桑寄生一方無白朮黃耆半夏地榆有  
艾是膠艾湯加白茯苓

**當歸湯** 大全良方治妊娠胎動虛心懸絕煩燥口乾橫生倒產上衝  
下築迷悶辰巳青黑手足厥冷產科名保安飲一方無甘草有川芎  
厚朴產原方有川芎

當歸 人參各一兩半 阿膠二兩炒

右以咀每服錢水一盞半連根葱白一握煎至八分去滓溫服  
**白朮湯** 千金方治妊娠卒心痛欲死不可忍者

白朮三兩去黑心 赤芍藥二兩 黃芩二兩去黑心  
右以咀每服分水一盞半煎至八分去滓不拘時服忌桃李雀  
肉

**香木散** 大全良方治妊娠五个月已後常覺腹間氣刺痛或腸鳴  
以致嘔逆減食此由喜怒憂思過度飲食失節所致茶元聖龍人有  
子夫久怒欲逐之遂病醫官主師復處此方二服而愈後用果驗

香木根二兩 丁香五子 甘草一分

右為細末每服一匙空心鹽湯調吞如物接下之狀  
**養胎散** 大全良方治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食

白茯苓 白朮 川芎 陳皮各二兩  
阿膠心各七匙半 當歸炒 生薑三片 棗三個

右以咀每服八分水一盞半煎至八分去滓食前溫服  
**當歸散** 大全良方治妊娠中惡心腹疔痛

當歸 丁香 川芎各三刀

右為細末每時溫酒調一匙服  
**通氣散** 大全良方治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故布不以多少瓦上炒令香熟  
右為末嚼胡桃肉半空心溫酒調下二匙

**食不下氣湯** 大全良方治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食四肢  
無力

羌活

赤芍藥

甘草

檳榔

青皮

大腹皮

陳皮

赤茯苓

半夏

桑白皮

官桂各五分

紫蘇二兩

右以咀每服八分生薑五片棗一枚水一盞半煎至八分去滓溫服食前一方無時服

**黃芩散** 大全良方療產後胎不長宜服安胎和氣惠食利肉服

川芎

甘草各五分

黃耆

白朮

陳皮

麥門冬

白茯苓

前胡

人參各三分

右以咀每服八分生薑三片棗三枚水一盞半煎至八分食前溫服

**龍骨散** 大全良方療因損胎下惡血不止

龍骨

當歸

地黃各八分

艾葉炒四分

地榆

阿膠

芍藥

乾姜各五分

蒲黃五分

牛角膠炙焦五分

右為末食前米飲調服

**知母丸** 聖惠方治日月未足而痛如欲產者煎冷產難交子損

右用知母為末煉蜜丸如雞頭大每服一丸溫酒嚼下日一服

方如梧桐子大服二十九粥飲送下

**槐子丸** 大全良方治妊娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子

蒲黃等分

右為末用煉蜜丸桐子大溫酒下二十九以痛止為度

**取月者湯** 大全良方治妊娠腰腫

茯苓

白朮各四分

甘草各二分

杏仁三分

右以咀每服八錢水二盞煎至一盞半淨通口食前服

**五皮散** 大全良方治胎前常脾虛腫滿亦治

大腹皮

桑白皮

茯苓皮

陳皮

生薑皮等分

右以咀每服八錢水二盞濃煎末香水一盞同煎至八分去滓溫服不拘時一方空心服

**催生如意散** 聖惠方臨產腰疼方可服

人參為末一升

乳香一升

辰砂半升

右一處研臨產之時急用雞子清一個調藥末再用姜汁調開冷服如橫生倒生即時順子母平安

**催生神功聖藥** 大全良方臨產腰疼方可服

玄胡索

沒藥

白朮

香白芷焙

姜黃焙

當歸焙

桂心等分

右為細末每服三錢燒犁頭令紅淬酒調下臨陣疼時服一二服立產

**柴胡散** 聖惠方治妊娠熱病骨節煩痛頭疼吐熱若熱不治則損胎

柴胡

葛根

知母

枳實

甘草各五升

石膏二兩

大青

茯苓

升麻各七升半

右以咀每服八錢水一盞半葱白七寸煎至八分去滓通口服不拘時候一方有黃芩無誤也

**聖惠方治妊娠五六月傷寒頭痛壯熱四肢煩疼**

麻黃

桂心

柴胡

赤芍藥各二兩

甘草半兩

右以咀每服八錢半姜二片水一盞半煎至八分去滓通口服不拘時候

**聖惠方治妊娠時氣六七日熱甚大小便不利最宜服之**

川芎一兩細研 葵子二兩搗

右為末每服五錢溫水調下無時一方水一大盞煎至一盞三分去滓不計時溫服

**馬兜鈴散** 大全良方治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴

桔梗

人參

甘草

貝母各五升

陳皮去白

大腹皮

紫蘇

桑白皮各二兩

五味子七文重

石以咀每服八錢生姜三片水一盞半煎至八分去滓溫服食後

**當歸散** 大全良方療妊娠被驚胎動不安小腹腹痛連腰下血

當歸

川芎各八分

阿膠炒

人參各六分

艾葉四分

大東來二十个

茯苓十分

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服食前

**膏腸湯** 按粹方治妊娠先忽患中心腹痛如刀刺

川芎

人參

茯苓

官桂

吳茱萸

當歸二兩

厚朴製

白芍藥各二兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候一方有

桔梗無官桂

**黃耆解肌湯** 聖惠方治妊娠傷風自汗

人參

黃耆

當歸

川芎

甘草各五两

芍藥六两

右咬咀每服八錢水二盞煎至八分去滓溫服不拘時候加蒼朮生

地黃亦可

**合身婦大便必通** 大全良方

枳殼麩炒三兩

防風去芦二兩

甘草炙二兩

右為末每服二錢白湯調下空心食前日三服

治兒在腹中哭經驗方

右用多年空屋下鼠穴中土一塊令產婦嚙之即止

又方經驗方

用川黃連濃煎母哈之

治胎動出血產門痛

右黃連末酒調一錢日三服

治產難及日月未足而痛如欲產者聖惠方

右用知母為末蜜丸如雞頭大酒化下

催生散聖惠方

右用朴硝不以多少日晒夜露七七日取為末如產難中少調二

三錢立下及止痛

**麻黃散** 聖惠方治妊娠外傷寒風冷痰逆咳嗽不食

麻黃

陳皮

前胡各一兩

半夏

人參

白朮

枳殼

貝母

甘草各五錢

右吹咀每服八錢水一盞半葱白五寸姜三片枣三个煎至八分去滓通口服不拘時候

百合散聖惠方治妊娠咳嗽心胸不利煩滿不食

川百合

紫苑

麥門冬

桔梗

桑白皮各一兩

甘草半兩

竹茹一團

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣入蜜半匙再煎一二沸去滓溫服食後一方熱時服

紫苑湯宋類鈴方治妊娠咳嗽不止胎動不安

甘草

杏仁各一分

紫苑

天門冬去心各一兩桔梗二分

桑白皮一分

右吹咀每服八錢水一盞半竹茹一團煎至八分去滓入蜜半匙再煎一二沸溫服

竹茹湯大全良方療妊娠煩躁或胎不安

淡青竹茹一兩

右用水一大升煮四合徐徐服盡為度

聖惠方療妊娠心煩情煩嘔吐逆惡聞食氣頭眩四肢

沉重百節疼痛多自少起

麥門冬

子芩

赤茯苓各一兩

柴胡

赤芍藥

陳皮

人參

桔梗

桑寄生

甘草

旋覆各五錢

生地黄二兩

右吹咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓溫服食前

柴胡散聖惠方治妊娠心煩頭目昏重不思飲食或嘔吐

柴胡一兩半

赤茯苓

麥門冬各一兩

枇杷葉去毛

人參

橘皮

甘草各五錢

右吹咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓溫服無時

人參散聖惠方治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩燥壅熱口舌乾

渴

人參

麥門冬

赤茯苓

地骨皮

家葛根

黃芩

犀角屑各半 甘草五两

右吹咀每服八升水一盞半煎至八分去滓温服

**防風散** 大全良方治妊娠中風卒倒心神悶乱口噤不能言四肢強急

防風

菊花

秦艽

茯神

寄生

防已

當歸

甘草

葛根各一两

細辛

官桂

羚羊角各五两

右吹咀每服八升水一盞半生姜三片煎至八分去滓竹瀝半合温服不拘時候

**葛根湯** 聖惠方療妊娠月因發風痙忽悶慣不識人吐逆眩倒小

醒復發名曰子痲

葛根

防已

川芎

澤瀉

貝母

防風

白茯苓

甘草各二两

牡丹皮志

當歸

官桂

石膏

人參各二两

右吹咀每服八錢水一盞煎至八分去滓温服無時

**四物湯** 大全良方治妊娠產前腹痛及治月事或前或後胎氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不下宜服

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃各一两一方用生地黃

右吹咀每服一两水一盞煎至一盞去滓食前温服妊孕下血即

入艾葉六七上何橋末一錢同煎疾勢甚去散黃芩及以四味各

半两均水四盞煎至一盞半去滓分四服食前熱服一日中分盞

以知為度產乳服至三服止如虛弱血虛不調至一月止因產後

熱熱血搏口舌乾渴飲水者如花柳一两麥門冬三分腹中

刺痛惡物不下如當歸芍藥各一分如崩如地黃蒲黃各一两因

熱生風加川芎一分柴胡五分身熱脉躁頭昏項強加柴胡黃芩

各半两大便秘結加大黃半两桃仁一分炒如大便滑加桂心

熟附子各一分發寒熱加乾姜牡丹皮芍藥一分嘔者加白朮人

參各半两腹脹加厚朴枳實各一分虛煩不得眠加竹葉人參各

一分煩燥大渴加知母石膏各五錢水停心下微吐逆加猪苓在  
苓防己各一分虛寒狀類傷寒加人參柴胡芍藥各三分  
表虛六合湯聖惠方若妊娠傷寒中風表虛自汗頭暈身熱  
寒熱浮而弱太陽經病宜服

四物湯四兩

桂枝

地骨皮各五錢

表實六合湯聖惠方若妊娠傷寒頭暈身熱無汗脈浮緊太陽經病  
宜服

四物湯四兩

麻黃

細辛各半兩

風濕六合湯聖惠方若妊娠傷寒中風濕熱之氣肢節煩及麻痺而熱  
頭暈太陽標病也宜服

四物湯四兩

芍藥

蒼朮各五錢

柴胡六合湯聖惠方若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發斑如錦文  
宜服

四物湯四兩

升麻

連翹各七錢

柴胡六合湯聖惠方若妊娠傷寒胃脇滿痛而脈弦少陽頭暈項強  
宜服

四物湯四兩

柴胡

黃芩各七錢

明太陽本病也急下之宜服

四物湯四兩

大黃五錢

人參六合湯聖惠方若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜服

四物湯四兩

人參

五味子各五錢

厚朴六合湯聖惠方若婦人妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本  
虛也宜服亦治咳嗽喘滿

四物湯四兩

厚朴

枳實黃芩各五錢

聖惠六合湯聖惠方若妊娠傷寒身熱大渴蒸熱而煩脈長而大者  
宜服

四物湯四兩

梔子

黃芩各五錢

石膏六合湯聖惠方若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜服

四物湯四兩

石膏

知母各五錢



四物湯四兩

扶苓

澤瀉各五子

聖惠方

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜服

四物湯四兩

琥珀

扶苓各五子

聖惠方

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜服

四物湯四兩

阿膠

艾葉各五子

聖惠方

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脉沉

而遲少陰病也宜服

四物湯四兩

附子炮去皮脐

桂各五子

聖惠方

若妊娠傷寒畜血証不宜隨胎藥下之宜服

四物湯四兩

生地黃

大黃酒浸各五子

聖惠方

治妊婦傷寒頭痛生熱肢節煩疼

石膏七二分

前胡六分

甜竹葉三分

黃芩

長三五分

知母

梔子仁各四分

右咬咀每服八分水一盞半葱白二寸煎至八分去滓溫服不拍

特外甚無掛竹葉

聖惠方

治妊婦寒熱頭痛嘔吐不欲食脇下痛喘逆痰氣

差後傷寒熱入胞宮

安熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不

解宜服

柴胡去若一兩

黃芩

人參

甘草各二分七分半

右咬咀每服八分水一盞半煎至八分去滓溫服無時

聖惠方

治妊婦傷暑頭痛惡寒身熱燥悶四肢疼痛項

背拘急口乾燥宜服

柴胡四兩

甘草二兩

石膏八兩

右咬咀每服八分水一盞半生薑五片煎八分去滓溫服無時若

虛冷加入參四兩

聖惠方

治妊婦傷寒四日以來加心腹脹上氣渴不

止飲食不多腰疼体重

枳實各一兩

陳皮三分 麥門冬去心五子

右咬咀每服一兩水一盞半生薑半分葱白七寸煎八分溫服

欬落  
拖子仁飲子 大全良方治妊娠熱病班出黑色小便如血氣急絕胎

拖子仁 石膏

地黃各三兩 黃芩 大青各二兩

耳破四十九粒救急有杏仁无地黃石膏同

葱白七寸

右咬咀每服半兩水一盞煎至五分去滓无時温服一方加青黛  
無大青艾方以陳艾如雞子大酒煮服救妊婦危困

大黃飲子 聖惠方治妊娠熱病六七日熱入腹中大小便秘澀煩熱

大黃微炒 巨骨各二兩 知母

前胡 赤茯苓各三兩 拖子仁

甘草 黃芩各五兩

右咬咀每服八分水一盞生地黃一分煎至七分去滓温服食前

黑龍丹 濟生方治妊娠難生或胎衣不下產後血暈不省人事

狀如中國血崩惡露不止腹中刺痛血滯浮腫血入心經語言顛倒

如見鬼神血風相搏身熱頭暈或頸痠疾胎前產後一切急症狼狽

垂死以此藥灌之四九無不救活者

五靈脂 當歸酒浸 生薑黃

川芎 良姜各三兩

右剉入砂鍋內紙筋搗固濟炭火煨通紅候火滅冷取出研細

入後涼

百草霜 乳香 生硫黃

琥珀 花蕊石

右五味計一兩一錢細末同煎藥和勻米醋煮麵糊為丸如彈子  
大每要服用炭火煨煎通紅投入生薑自然汁浸碎之以無灰酒

併合童子使頓服神効不可及迷

崩漏 聖惠方療逆產橫生瘦胎兼產前產後虛損月脉不調

崩漏一名催生黑散一名烏金散一名二神散

百草霜 白芷不見火為末

右等分研勻服二錢於臨產之時以童子小便并少米醋打為膏  
沸湯調下集驗方用童便酒各半盞煎臨沸即調停熱服甚者不

過再服

二黃散 後將方治婦人有孕胎漏

生地黃

熟地黃各等分

右為細末煎白朮枳殼湯調下一錢食前服

內灸散 和劑方治婦人產前產後一切血疾血崩虛癩腹脇疼痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下五色腹中虛鳴氣滯堅脹淋血腰疼口吐青水類產血衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血暈血凝時發疼痛頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷母露不乾體虛多汗手足逆冷宜服方見婦人衆疾門

聖惠方催生神效

益元散一兩方見暑門

此退一糸燒灰存性酒要培頭及驚一

蟬退全者五个

男子亂髮入香油一兩熬化

川山甲一片燒存性

右為末用鹽水一碗入藥一處煎一沸入油頭髮乾冷定服

聖惠集方治產前服之則安胎產後惡露血不欠胎衣不下

右等分以咀每服三錢水二盞酒少許同煎去滓溫服

人參

石膏各二兩

前胡

黃芩各七錢半

家高根

麥門冬各五錢

右以咀每服一兩水一盞生薑三片棗二枚竹茹一分煎至一盞去滓服不拘時

永類錄方治妊娠中風頭暈目眩身熱脈急言語蹇澀痰涎不消或時發搐不省人事各白子桐

羌羊角錢

川獨活去芦

酸棗仁炒去殼

五加皮云木各半錢防風去芦

當歸去芦酒浸

川芎

茯神去木

杏仁去皮尖又白分

木香不見火

甘草各二分半

黃連以仁炒四分

右以咀每服四錢水一盞薑五片煎七分不拘時服

金匱方治血氣不旺胎前產後

麝香一錢

益母二兩桂青布袋裏燒令紅急研金細

右為末取科錢燒紅以酒淬之調服二不脈

# 產後眾疾

言婦病和劑方治產後去血過多昏暈不醒一切去血並宜服之

芍藥

當歸去芦洗焙各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去粗熱服不拘時腹中刺痛加

白芍藥白乾煩渴加烏梅麥門冬酸寒熱加乾姜白芍藥水停心

下微有嘔逆加茯苓生薑虛煩不得眠加入參竹葉大便閉澀加

熟地黃橘紅杏仁小便不利加車前子腹脇膨脹加厚朴枳實不

止加香附子咳嗽痰多加紫苑半夏生薑腰脇痛加牛膝心下

夜痛如玄胡索無血不下腰腹重痛加牡蛎皮煎

白芍藥二兩

人參去芦

乾姜炮

白朮各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服二十九空心米飲下

和劑方 方載折傷門治產後胎衣不下極有神効

和劑方治婦人產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心

黑豆炒半升

熟乾地黄

當歸去芦酒浸

肉桂去皮

乾姜炮

甘草炙

芍藥

蒲黃各四兩

右為末每服二錢熱酒調下入童子小便勻為佳濟生方除蒲黃加附子

旋覆湯和劑方治產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅塞

麻黃去節

前胡

杏仁去皮尖麩炒

五味子揀

旋覆花

甘草炙

茯苓

赤芍藥

荆芥去梗

半夏麴各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎七分溫服

人參當歸散和劑方治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱其證

心腎煩滿吸短氣頭痛悶亂晡時轉甚與大病後虛煩相類急宜服之

乾地黄

人參去芦

當歸去芦

肉桂去皮

麥門冬去心各一兩白芍藥二兩

右咬咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎至一盞

去米葉入藥并棗三枚煎溫服血熱甚者加生地黃

當歸養血丸和劑方治產後惡血不盡發熱身痛經閉者並治之

肉桂一兩

當歸去芦

赤芍藥

牡丹皮

玄胡索炒各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九空心溫酒米飲任下

四神散和劑方治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

當歸

乾姜炮

川芎

赤芍藥各等分

右為末每服一錢溫酒調下

當歸黃耆湯和劑方治產後失血過多腰脚痠痛壯熱自汗

當歸去芦三兩

黃耆

芍藥各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎服不拘時

失笑散和劑方治產後心腹絞痛欲絕者

蒲黃炒

五靈脂酒研淘去沙石各等分

右為末先用酸醋二錢熬成膏入水一中煎七分熱服

交加散濟生方治產後中風腰脇不得轉動

生地黄二兩研取汁生姜五兩研取汁

右交互以汁浸滓一夕次日清盡汁各炒黃焙為末酒調下

濟生方治產後血入衣中脹滿衝心久而不下或去血過多

肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治之証急宜取鞋底炙熟小腹上下

灸之次進此藥

附子炮去皮臍半兩牡丹皮去心

乾漆炒令烟尺各一兩

右為末用酸醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥丸如梧桐子每

服五七丸溫酒送下

清血散濟生方治產後血暈昏不知人更宜取乾漆燒烟鼻中熏

之頻置醋於房內以進此藥

澤蘭葉

人參去芦各一兩 荆芥穗四兩

甘草炙六分

川芎二兩

右為末每服二升熱湯溫酒各半盞調勻灌下

見現方

濟生方治產後血氣耗散口乾煩悶心下痞痛

高良姜炒

姜黃洗

藜蘆茹

陳皮去白

蓬朮炮

人參

京三稜炮各二兩

右為末用羅高慢火煮令極熟研爛將餘汁煮稠如梧子每服五十九丸就用羅高湯吞下

**消積散** 治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露未及停滯胞絡亦能令人定熱但小腹急痛為異

當歸去芦酒浸 白芍藥 川芎 人參各一兩 甘草炙半兩 乾姜二兩

右以咀每服四升水一盞姜三片煎服不拘時

**調經散** 治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮腫不可作水氣治之但調經水腫自消又有去血過多心虛身驚加生龍腦一握煎服

沒藥別研 肉桂不見火各一升 細辛洗半升 琥珀別研一升 赤芍藥 當歸去芦酒浸各一兩 甘草炙二升 射香半升別研

右為末每服二錢生薑汁溫酒任意調下

**八珍散** 治產後敗血停積心迷室心驚苦

良姜炒 當歸去芦酒浸 肉桂不見火 白芍藥 附子炮去皮 川芎各一兩 甘草炙 人參各半兩

右以咀每服二升水一盞煎服

**止痛散** 治產後帶筋脉拘挛腰背強直遍身疼痛

當歸去芦酒浸 官桂不見火 白木 川牛膝去芦酒浸各半兩 甘草炙三升 生薑各半兩 黃耆去芦 獨活去芦

右以咀每服四升水一盞煎服加桑寄生半兩尤佳

**麻仁丸** 治產後去血過多津液枯竭不能傳送大便閉澀

弱則用橘杏丸以潤滑之

麻子仁另研 枳殼去白蒸炒 人參 大黃各半升

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九丸溫酒米飲任下

**橘杏丸** 濟生方 方載松結門 治產後體弱大便虛秘

**固經丸** 濟生方 治產後崩中暴下淋瀝不已如有腹脹則是瘀血使

然此藥又非其治

赤石脂煨 艾葉 補骨脂炒

木賊各半兩 附子一个炮去皮脐

右為末陳米飲和丸如梧桐子每服五十九丸温酒送下

**聖藥湯** 治產後血氣傷于脾胃腹脇滿悶嘔逆惡心

赤芍藥 半夏湯泡 澤蘭葉

陳皮去白 人參各二兩 甘草炙

生姜半兩

右咬咀每服四升水一盞煎服不拘時

**大黃湯** 濟生方 治產後血氣衝心時發疼痛甚者宜進玄胡索湯

方見本門調經環疾

熟地黃酒蒸焙 當歸去老酒浸 川獨活去芦

白芍藥 細辛洗 吳茱萸炒

桂心不見火 小豆 乾姜炮各二兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎服不拘時

**清血湯** 濟生方 治產後下血過多虛弱生風唇青肉冷汗不止

太陰玄精石別研 乳香炒 五靈脂 卷柏生

硫黃別研 桑寄生 陳皮去白

阿膠蛤粉炒各等分

右將前四味同研切石器內微火炒勿令焦再研極細却入後四

味藥末用生地黄汁丸如梧桐子每服五十九丸當歸酒下

**聖藥丹** 濟生方 方載胎前門 治妊婦臨產臨生或胎衣不下產後

血暈不省人事及惡露不盡腹中刺痛血入心經語言恍惚並宜服

**當歸羊肉湯** 濟生方 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰尋常

當歸去老酒浸 人參各七兩 黃耆去老二兩

生姜半兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大匙去肉入煎藥前酌盞去渣作

六服早晚頓進

**猪腰子粥** 濟生方 治產後身勞發熱

用猪腰子一隻去白膜切作柳葉片用鹽酒拌之先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盤底用熟粥蓋之如作會產病狀空心服之

**漏乳** 濟生方治乳婦氣脈壅塞乳汁不行

漏乳二兩半

蛇蛻炙十條

武姜半木急火燒存

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候仍喫熱羹助之

**熟地黃湯**

治產後虛渴不止少氣脚弱眼花飲食無味

熟地黃一兩淨洗酒浸蒸焙

人參去苦

麥門冬去心各二兩甘草炙半兩

括樓根四兩

**猪蹄湯**

治婦氣少力衰脈澁不行絕無乳汁

猪蹄一隻

通草五兩

右將猪蹄淨洗依食法事治次用水一斗同通草浸煮得四五升取汁飲之

**當歸酒浸**

治婦人諸虛不足

當歸酒浸一宿

熟地黃

白芍藥

川芎各二兩

當歸酒浸一宿

熟地黃

白芍藥

川芎各二兩

右以咀為劑散胎病證如減後藥煎服

血氣不調加吳茱萸一兩

甘草半兩

胎動下血加熟艾塊

阿膠七片末一錢

補下元加乾姜半兩

甘草七分

血崩淋瀝不斷加炮附子一个

赤石脂一兩

便血及帶下加荆芥

地椒

血氣滯腹內刺痛加桂

柴胡

產後傷風頭痛如膏一兩

甘草半兩

血風勞加荆芥

柴胡

潮熱加前胡

乾薑

人參

黃芩

虛熱口乾加麥門冬半兩

黃芩一兩

嘔吐不止加藿香

白朮半兩

人參一兩

產後虛熱血熱煩悶加生地黃

產後腹脹加枳殼肉桂各三兩

產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝



產後寒熱往來加柴胡門冬各半兩  
經血淋瀝不斷加乾瑞蓮房炒入藥  
血滯不通加紅花桃仁各一分

產後悶亂加伏神遠志各半兩  
虛而多汗加煨牡蛎麻黃根各半兩  
妊娠心腹煩加竹茹一塊

如有敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟地黃以生者大便  
閉加大黃桃仁各一分

**地黃散** 按粹方 治產後惡物不尽腹中疝痛

生乾地黃 當歸並炒各二兩

生姜半兩細切如蠅頭大新瓦上炒令焦黑

右為細末姜酒調下二服

**卷荷散** 按粹方 治產後血上冲心血刺血暈血氣腹痛惡露不

快

初出卷荷一兩 紅花一兩 當歸一兩

蒲黃並炒 牡丹皮各半兩

右為細末每服三茶匙心鹽酒調下 臘內用童子小便調

**治產後血暈** 瑞竹堂方

荆芥炒 川當歸炒 乾地黃洗

芍藥各半兩 蒲黃二分半紙內搗碎炒赤

右同為細末每服三茶匙心鹽酒調服

**治產後血暈** 瑞竹堂方

乾地黃二兩

右器內搗為末每服三茶匙食前熱酒調服連進三服

**神心散** 按粹方 治婦人產後血暈血虛積血不散寒熱往

來膈不快氣喘不進飲食骨節疼痛生血肌瘡此藥逐惡血生新血

止肚痛

金藤 川牛膝 當歸

川芎 麻黃 玄胡索炒

官桂 神曲 荆芥

粉草 赤芍藥 熟地黃

雄黑豆各二兩

右為末每服二勺溫酒調或當歸童子小便任下不拘時

**四味湯** 聖惠方療產後一切諸疾絕方分免一服更不效

當歸心膈煩加半勺 玄胡索氣悶喘急加半勺

血竭惡露不快加半勺 沒藥心腹撮痛加半勺

右等分為細末每服各半勺用童子小便一盞與六分通服

**五寶散** 大全良方治產後乳脉行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便澀滯悉能治之涼膈厭熱下乳

人參 白茯苓 甘草各半兩

桔梗炒 川芎 白芷各一兩

當歸二勺半 芍藥七勺半

右以咀每服四勺水一盞半煎至七分去渣溫服食後如頭熱甚大便秘加大黃二勺半

**四寶散** 按粹方治產後血暈昏迷不省衛心悶絕

五靈脂半生半炒二兩

右為末溫酒調下二勺口噤者初開口灌之入疾即愈一方加荆芥等分為末童便調服如血崩不止加當歸酒浸煎半盞服

**明氏瓜散** 大全良方治產後閉且不語

右以白凡研細熟水調下二勺

**當歸散** 大全良方療產後血暈虛損無大補功增寒熱別致他病常令與露快利為佳

當歸 芍藥 川芎

黃芩各二兩 白木五勺

右為細末每服二勺溫酒或酒調下

**金剛散** 大全良方治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失志及產後百病

沒藥 血竭

右等分為末才產下使用童便與細酒各半盞煎一二沸調下二勺良久再服其惡血自下行更不衝上免生百病專治婦人方

只用白湯調下

**七珍散** 大全良方論白產後不語有何答曰人心有七孔三毛產後

虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服此藥

人參

川芎各二兩

辰砂另研各五升

一方加甘草半兩名八珍散

右為末每服一升薄荷湯調下不拘時候

胎下堅痛

當歸炒

血竭

蓬朮炮

芍藥各二兩

五靈脂四兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五六十丸溫酒送下或粥清下

空心食前

普濟方一名烏散治產後頭痛

烏麻皮真天合者大川芎

右等分為細末每服三升秤鍾許酒調服

普濟方產後如乳并癰

連翹

小麻

玄參

芍藥

芒硝各升  
白欬

防巴

射干各八升

大黃十二升

甘草六升

杏仁八十升

右以咀每服八錢水一盞半煎至八分下芒硝去渣通口服食後

聖惠方治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍若

藥下即不疼神效蓋因小兒吹妳交成

右以陳皮湯浸去白日干麩炒黃為末麝香研酒調下二錢

治婦人吹妳可也秘方

右用大車頭邊油柴丸如梧桐子大每服五十九溫酒下

聖惠方治產後腹痛煩滿不得卧

枳實燒存性 為藥

右以重湯分每服八錢水一盞半煎至八分去渣溫服無時一方

為末服之十日三

經驗方

右用枳殼一兩去穢煎湯溫服良久即入

聖惠方

朱砂末一錢

膩粉一錢

右為末每服二錢煎滑石當歸酒調下食前服即出一方無滑石

**存下胎或產後血暈** 經驗方  
右用鬱金燒灰存性為末每服二錢米醋一呷調灌之立活

**聖惠方**

荊芥穗

臭椿皮

右咬咀等分煎湯薰洗子宮即入

**治婦人子宮大痛不可忍** 聖惠方

五倍子

白朮

右為末溫湯泡洗干摻亦可

**治產後血暈** 經驗方

右用紅花一兩好子者為末作二服酒二盞煎取一盞併服如口

**血暈** 秘方治婦人產後血閉血迷血暈血勞嗽血男子傷

力勞嗽吐血皆可治之

乳香

血竭

箭頭砂各錢

右為末巴豆仁研泥為膏磁器盛之如用丸如雞頭大婦人狗膽

冷酒下男子冷酒下

**聖惠方** 治婦人生產二十九証

野天麻四五月間紫衣花時採花葉子陰乾

右將天麻搗末煉蜜丸如彈大服一丸隨飲子下

子死腹中大為卒病臍胸熱極然其胎莫子死蓋子死居子宮墜上胎

腹間冷痛小便沫出腹脹四肢逆冷入甲青是也臨產時服此一

丸安竟氣血氣自然調順諸病不生破血補虛止痛養調經童

便酒各停煎沸溫化下

一產難者胎成形食母血十月足餘血結塊俗呼兒枕臨產時血塊

先破敗血果子是難產或產後惡血不尽臍腹刺痛惡露衝童

便酒各停化下

一產時面垢頰赤衣不下產子臍胸裏羸五心煩燥敗血入衣中衣

難出發寒熱有冷汗出但去其敗血衣自下如帶斷服此效或橫

生不順心悶欲死童便酒化薄葶自然汁盪湯下

一產後三四日起卧不得眼前黑暗生花蓋血氣未定運走五臟入

肝則目昏俗為暗風醫家以風治之或血熱口乾煩渴心悶亂如

見鬼神狂言不省人爭重便酒薄苛亦妙

一產後口乾心悶煩渴七日来血氣未定食熱麩與血結積滯在心是致熱煩渴俗為胃膈壅塞太陽沉痛呵欠怔忡氣短肌体羸瘦不思飲食血風手足頑麻身熱百節疼痛不可忍者溫米飲下依前化下

一產後四肢浮腫及寒熱者蓋敗血流入五臟滲入四肢停留日久化為膿狀氣喘小便澀或咳嗽胃膈不利惡心吐酸水兩脇疼痛舉發失力酒下

一產後寒熱往來蓋因敗血入心則熱入脾則寒瘧疾狀是也如或臍腸作痛或作聲米飲湯下桂枝湯亦可

一產後中風牙關緊急半身不遂失音不語重便酒後前化下

一產後大便秘結口舌煩渴非時不語以敗血衝心而熱其心孔童便酒化下薄苛自然汁亦可

一產後痢疾因未經月滿或食冷物下與血相攻擊別有所積受濕如此棗湯煎亦可

一產後身疼夜痛百節開張血流入腸中停流不散疼痛溫米飲下

一產後崩口漏下不止者蓋是傷酸物狀如鷄肝者皆因傷酸前化下米黍丸湯下當歸桂枝湯亦可

一產後未經月滿血氣不通蓋因月水未通或食熱麩積成塊噎嗽四肢無力睡而汗出不止月水不調久而不治成骨蒸勞服此後效童便酒後前化

一產後吐逆不止敗血停於脾胃即發吐逆胃膈虛脹俗呼翻胃酒化下

一產後鼻衄口乾重蓋因血入心臟熱則舌黑鼻衄也童便酒各七分化下

一產後赤白帶下煎黍丸湯下加糯米同煎妙

○不洽證

一產後氣急喉中猶聲因敗血衝心入喉中萬無一生

一產後中風者蓋自七日未滿勞動百日之中傷房事中國初病之狀眼澁腰強筋急角弓反張牙關緊急若此者非外也自傷死也

一產後面色黑及遍身黑澀者乃敗血入皮膚百無生矣

〔長〕一湯 濟生方治產後虛勞雖日久而脈盛浮疾

柴胡八分

黃芩

人參

半夏洗

甘草炒

川芎

為藥

熟地黃

當歸各三分

右咬咀每服八分水二盞生薑二片棗一枚煎至八分去渣溫服

〔聖惠方〕治產後經水通斷感寒異証手足搐搦咬牙

昏冒眼赤痛上焦

柴胡八分

黃芩四分半

人參二分

甘草

石膏各五分

知母二分

黃耆五分

半夏三分

右咬咀每服八分生薑二片棗一枚水一盞半煎至八分去渣溫

服無時

〔聖惠方〕治產後諸虛不足發熱盜汗

當歸去頭尾

人參

右等分為末猪腰子一佳去膜切作片子以水三升糯米半合煮

白二莖煮米熟取清汁煮入藥一不煎至八分不拘時服

〔聖惠方〕治產後中風口吐牙關緊急手足攣攣如雀舌狀亦

治血暈四肢強直不省人事或築心眼倒吐涎欲如死

荆芥畧炒

右為末每服三分豆淋酒調下用童子小便亦可其効如神忌食

者瀉之忌斷禁食者吹鼻中皆効

〔聖惠方〕產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉二兩

鬼箭羽一两

劉寄奴

桃仁半兩湯浸去皮尖麸炒

蒲黃各二兩

右咬咀每服三分童子小便一大盞生薑二片生地黃一分煎至

六分去粗執服無時候

〔聖惠方〕治產後用梳腹腹痛効

延胡索

當歸各一分

琥珀

蒲黃炒各三分

赤芍藥五分

肉桂三分

紅藍花二分

右為末童子便合酒溫調三分食前服

**天仙藤散** 聖惠方治產後腹痛不止及一切血氣腹痛

天仙藤炒焦五兩

石為末每服二升產後腹痛用炒姜小使和酒調下

常服氣血用溫酒調下

**溫酒散** 大全良方治產後腹痛

右當歸為末每服二升水一盞煎食前溫服

**天全良方** 治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱頭痛

不思飲食亦治以有瘀血月水不調黃瘦不思飲食並皆治之亦療

心痛與失血散同

五靈脂水淘去石砂乾研為末

直隸蒲黃

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃末搜和丸如

櫻桃大每服一丸水與童子便各半盞煎七分令氣化溫服少頃

再一服惡露即下以有瘀血成塊者行不利者並用酒磨下

**大聖惠方** 治產後血虛惡露不消氣為敗濁凝滯榮衛不

調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫痛皆氣不平之所為也

大豆一兩半炒去皮扶神一兩去衣 琥珀一升

右為末每服三錢濃煎烏豆汁送下

**濟生方** 治產後虛弱發熱飲食不腹脹

柴胡

人參

甘草

半夏

陳皮

川芎

白芍藥

右等分炒咀每服八分水一盞半生薑五片棗二枚煎至八分去

滓不拘時通口服

**白茯苓散** 聖惠方治產後腹勞苦羸弱生疔日淺以坐多語運動用

力遂致頭目四肢疼痛寒熱如癰狀

白茯苓一兩

當歸

川芎

桂心

白芍藥

黃耆

人參

熟地黃各五升

右以咀先用水三盞入猪腎一雙去脂膜細研生薑三片棗子二

个同煎至一盞去腎姜棗入藥水煮取七分去滓食前分溫

二服

**大全良方** 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽有痰

當歸

柴胡

川芎  
前胡各三兩半

黃耆各五兩

右咬咀每服五升水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅各枚生

姜一片煎至八分去滓溫服如有痰去烏梅

**白木散** 聖惠方治產後霍亂吐利腹痛煩渴手足逆冷

白木

橘皮

麥門冬

人參

乾姜炮各二兩

甘草五兩

右咬咀每服八錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓無時服

**二母散** 聖惠方治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽如傷風痰嗽

用尋常傷風藥不効宜服

知母

貝母

白茯苓

人參各五兩

桃仁去皮尖六分

杏仁去皮尖六分

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服食後

**參蘇飲** 聖惠方治婦人產後血入於肺面黑發喘必死者

人參一兩為末

蘇木二兩搗碎

右水兩碗煮取一碗去滓調人參末隨時加減服神効

**白豆蔻** 聖惠方治產後心煩咳嗽不止脾胃虛寒衛氣逆逆

白豆蔻

丁香各五兩

伏龍肝一兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一升如人行五里再服

**石蓮散** 聖惠方治氣吃噎又治吐逆心怔目暈可思飲食

石蓮肉一兩半炒 白茯苓一兩

丁香五兩

右為細末每服三升米飲調下無時

**石蓮散** 聖惠方治產後惡血崩漏狀如泉永

瑞蓮一百枚燒存性 棕櫚燒存性

當歸

官桂各二兩

枚榔二枚

鯉魚鱗炒

川芎七兩半

右為細末每服三升煨生薑酒調如未止更進一服或時血崩此

藥可治但進三服即止

**塊斷散** 聖惠方治產後經脈不調四肢煩疼飲食全少日漸羸瘦

塊斷

牛膝

生地黃

當歸各二兩

桃仁

赤芍藥各五兩

右咬咀每服八升水二盞生薑三片煎至八分去滓溫服無時



方加桂心半兩

大全良方治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防已

猪苓

枳殼

桑白皮各二兩

商陸

甘草各七兩半

右咬咀每服八分水一盞半生薑二片煎至八分去滓溫服無時一方空心服

三分散 濟寧方治產後日久虛勞針灸服藥俱不効者

川芎

當歸

熟地黃

芍藥

白朮

白茯苓

黃耆各五兩

柴胡

人參各二兩六分

黃芩

半夏

甘草各五分

右咬咀每服八分水一盞半生薑二片煎至八分去滓溫服口食前服一方無姜藥

千金散 秘方治証同前

大黃四兩

麥蘗二兩六分

小茴香

枳殼頭末

瞿麥

烏梅各五分

槐穗

血竭各三分

右末每服八錢熱酒調下一服分作三次調服若病人虛寒用末

明眼卞血片服白粥三三日

聖藥方治婦人產前產後大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼各四兩製

甘草各五分

右咬咀每服一兩用生薑二片棗子一枚水一盞煎至三盞去渣

溫服不拘時候忌動風物

敗毒散 張子和方治男子往來寒熱婦人產後骨蒸血暈

大芩

芩蘗子

紫荷車

赤芍藥

甘草等分

右為末每服五錢發熱用冷水調如發寒用煎生薑三片棗湯同調下

此藥能治婦人

聖藥方治產後血暈血虛百病

劉寄奴

甘草等分

右咬咀每服五分水一盞煎至一盞入酒再煎去滓溫服

**地黃飲子** 聖惠方治產後血暈心忪氣絕

以生地黃肥嫩者搗自然汁每服半匙兩沸服之未効再服一方用酒相和頓服

**言病散** 聖惠方治胎衣不下

芍藥

當歸焙各半兩

榆白皮一兩剉

右為細末每服三勺用生地黃汁溫調下未下再服以下為度

**聖惠方** 治產無乳汁

蜂房炒三枚剉碎

右為細末每服二勺酒調下不拘時

**治乳** 秘方

用猪牙皂角去皮弦蜜炙為末酒調服之

**又方** 秘方

用遠志酒煎服治傳患處

**又方** 秘方

用野椒葉和藥一同搗膏敷患處

**又方** 秘方

用鼠粘子加射酒吞下

**聖惠方** 治產後乳汁不泄結滯不消執毒

蔓刺子燒

皂刺燒

右各等分為末每服二勺溫酒調下無時

### 小兒方

小兒初生受胎氣之有憂者疾病自出或賦怯弱者又將藥力以扶植元氣何況養護不謹或受驚馬觸或飲食過度衝胃宗暑以致變生諸證調治之法又須察脈觀證審之而後投以藥餌更係數方子後以備倉卒

### 重舌木舌

**治小兒** 湯氏方

用針刺去惡血即愈

**治小兒** 千金方

用竹瀝清芙蓉葉時點舌上亦有用作其補其塗亦可

治小兒口瘡 和濟方

用紫雪二分竹麻半合細研和勻頻置口中以及為度

### 鵝口口瘡

治小兒口瘡 葛氏方

用髮雞指頭離井花水拭舌上如不脫濃者栗木汁以綿纏筋

治小兒口瘡 葛氏方

頭拭之却用煨過共丹搽之

治小兒口瘡 楊氏方

今見言語不發可搗之微有血細室口如不止燒髮灰搽之

用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋調塗亦可

用芙蓉連去苦為末茶水調服

和劑方治口瘡鵝口不能乳者

用硃砂細研白丸等分為末使亂髮纏指指舌上令淨以取傳之

